



仁齋直指

七

特別
79
183
7



門武
號 183
卷 7

書田文庫

仁齋小兒方論序

虹橋涉川足以為福
田乎溱洧濟人不足
為惠然成者有時而壞也
紅粟揮飢足以
為陰德乎醫桑待哺不能家給
然利者有
時而病也人生天地間溥万物為一體
參
大造為全仁盍思所以廣其濟余每見人
以疾痛為憂財匱者無力召鑿力到者無
鑿能療雜藥徧嘗付性命於一擲未嘗不
為之扼腕焉於是竊暇燈函研精脉法上
稽靈素之書下及湯液之論張長沙鳴於

責監



漢孫地仙鳴於唐與夫晉宋而下諸賢之所撰次者搜覽迨盡將以推廣不忍人之仁就是而得三昧竊謂大科傷寒法度為甚嚴小科驚風方論為難盡傷寒治法表裏陰陽出入傳變若網在綱固不容紊若夫嬰兒驚風急轉而慢實俄而虛形似實非尤難臆度自非審脉驗證達變知幾鮮有不以嬰兒為戲此驚風詎治指要之所由作也證以言驚風之狀治以言驚風之方指者直訣以曉人要者精義以致用王氏

非無家傳然方粹而證不詳錢氏非無訣法然義深而方難用是編所作本之前聖大賢之方論叅之聞人高士之見聞得之先疇已試之効虛實補瀉之辨其証參苓桂木之隨其方覽者歷歷可曉惠之方來傳之同志使據病可以識證因證可以得方為天下揆耄回生立命起僊扶衰倘執此以登廬扁之門或可為涓埃万分之一助周流人間衛生救物獨不得如封君達之用心乎徑刺諸梓嘉與四方共之庶幾廣

齊於無窮也或曰子胡不秘諸已為家傳
計余應之曰喜捨方便釋氏書第一義也
政使學者復之教之推是以及人之勿耳
若南陽一書余嘗紬繹其說目曰活人愜
括嗣此以求其傳堂上呼盧喝六作五小
子則不敢知景定庚申開翔三山郡址后
曹楊士瀛登父自序



新刊仁齋直指小兒附遺方論目錄

刊行

○卷之一

初生

- 小兒初生總說
- 相兒壽夭謠
- 附乳子調護歌
- 小兒無患謠
- 小兒常安
- 附視證
- 觀形氣
- 面部觀形察色圖
- 察病形色歌
- 附察雜病生死證
- 附尅絕歌
- 候氏絕証
- 漢東王氏絕證
- 風髓絕證
- 驗五臟氣絕證論
- 五臟相尅雜證
- 小兒形証歌
- 小兒證雜病狀
- 初生禁風撮口臍風方論
- 禁風撮口臍風證

風禁方

控痰散

益脾散

辰砂膏

僵蚕方

甘草湯

撮風散

蜈蚣方

蜘蛛方

牛沫方

立聖散

安膈散

傳臍方

濟風鐵口方

千金龍膽湯

朱銀圓

天麻圓

定命丹

附方

秘傳立聖散

秘傳蝎梢散

秘傳神効方

伏苓圓

治胎寒腹痛方

初生不乳證治

附方

治惡穢入腹令兒嘔吐不止方

附方

定命散

變蒸

變蒸方論

變蒸證治

柴胡湯

紫陽黑散

紫圓子

當歸散

調氣散

附方

人參散

秘傳平和飲子

敬馬

○急風慢風慢脾風總論

虎口三關紋訣法

指掌圖

附辨虎口手訣

附定指上三關

指紋脉主病

附脉指哥

附入門候哥

三關哥

附詳解脉紋

附辨三部脉證

小兒診脉論

附門關六脉生死哥

附訣脉逆順哥

附脉証直訣

附太衝尺脉

附太衝陽脉

驚風方論

驚風證治

全蝎散

羌活膏

來復丹方見暑門
星香散

本事人參散

至寶圓

驅癩散又方

雌黃散

消驚馬圓

厭驚馬圓

安驚馬圓

參砂膏

定心圓

琥珀抱龍圓

驚熱方論

銀棗湯

驚熱證治

犀角湯

膽星圓

清心圓

伏神圓

祛風羌活散

羚羊角湯

附方

胎驚

胎驚方論

胎驚證治

太一散

參蜎散

猪乳膏

全蜎散

朱麝散

獨活湯

朱銀圓

千金龍膽湯

附方

青金圓

胎驚

定驚

通關定驚方論

通關定驚證治

開關散

開牙散

寔驚散

開關聖散

截風定搐治法

人參羌活散見瘡門

一字散

陽癇散

擒風湯

定搐散

瀉青圓

木通散

清寧散

阿膠散

定命丹

利驚圓

防風湯

宣風散

枳殼散

小柴胡湯方見發瘡門

治驚稍重下法

揭風湯

朱砂膏

疎風散

小柴胡湯

治驚重下法

青金圓

天麻圓

蘆薈散

牛黃涼膈圓

青金丹

王監京墨圓

○和胃助氣治法

生氣散

銀白散

伏苓二陳湯

異功散

天麻蘇合香圓

天麻防風圓

蘇合香圓方見血

參苓白水散

和中散

醒脾散方見慢

定志圓

温膽湯

定心圓

百枝膏

附方

驚風搖握拳

秘傳經驗定驚圓

驚風握拳圓

卷之二

慢驚

○方傳慢驚證治

太一保生丹

聚寶丹

蟬蝎散

神保既濟丹

來復丹方見血

王氏惺惺散

醒脾散

大醒脾散

温白圓

○已傳慢驚證治

星香全蝎散

定命散

四聖散

烏蝎四君子湯

南星散

烏沉湯

沉香散

○慢驚下痰證治

天南星圓

蘇合香圓方見血

白圓子方見痰

神保既濟丹方見前

礞石散

靈脂圓

七珍圓

○慢脾風生胃回陽治法

黑附湯

川烏散

金液丹方見血

生附四君子湯

蝎附散

陰癇散

靈砂

震靈丹方見血

壽星錠

鎮心餅

急慢脾風

○慢脾風下痰證治神保既濟丹方見慢白僵蚕圓

辰砂膏

七寶妙砂丹

急慢脾風證治 星蘇散

神聖圓

虎蝎圓

木通湯

鎮心圓

木香湯

南星醒神散

太一萬金丹

香餅子

乳麝圓

蟾蜍散

快脾湯

至聖保命丹

沉附湯

鎮痰圓

助胃膏

加味大醒脾散

利痰圓

客忤

客忤方論

客忤證治

雄麝散

蘇合香圓

麝香飲

犀角散

安神圓

伏龍肝方

千金龍膽湯

馬尾方

驚風雜治

敬馬積方論

驚積證治

浪沙膏

青龍圓

朱銀圓

天癆方論

天癆證治

釣藤飲

保命丹

驚風內癆方論

附盤腸氣虫痛

驚風內癆證治

乳香圓

木香圓

白豆蔻散

蘿蔔子散

化虫圓

安息香圓

茴香散

芎歸散

麴藤飲

養臟湯

附方

中風

中風方論

五臟俞穴

中風證治

排風湯

小續命湯

交濟湯

攝生飲

星香飲

附子散

阿膠散

追風毒剉散

肥兒圓

星蘇散 方見前

木通湯

通關散 方見前

附方

驅風散

疎風散

白圓子

痙

痙症方論

痙症證治

小續命湯 方見中

防風溫膽湯

敗毒散

小柴胡湯

大承氣湯

麻黃葛根湯

桂枝葛根湯

理中湯

三生飲

附方

至聖散

附症病強直語

發

發癩方論

諸癩不治證候

風癩證治

散風丹

保安圓

獨活湯

細辛大黃湯

牛黃圓

驚癩證治

北金膏

鎮驚圓

虎睛圓

七寶鎮心圓

清神湯

密陀僧飲

紫霜圓

妙聖丹

天麻圓 方見急心驚重下門

錢氏五癩圓

南星散 方見已傳

定癩治法

本事雌黃圓

蛇黃圓

猪心湯

當歸大黃湯

蝎虎散

斷癩圓

日應丹

地龍散

代赭石散

全蝎五癩圓

金朱丹

定癩圓

千金龍膽湯 見胎驚門

猪膽南星散

肥兒圓 方見中風門

星朱散

驚啼方

論髮際穴

論腦麝銀粉巴硝等不可輕用

論蜈蚣有毒

附方

獨活散

化風丹

疥

諸疔方論

囊疔散

脂連圓

至聖圓

天麻圓

走馬疔方

靈脂圓

黃連圓

楊圓子

蚶蚩圓 又方

換疔圓 方見積類

諸疔證治

黃連肥兒圓

五疔良方

通神圓

生熟地黃湯

清肺飲

下虫圓

香寇圓

黃耆湯

十全丹

小黃連阿膠圓

秘傳保安圓

集聖圓

大蘆薈圓

胡黃連圓

伏神圓

地黃圓

化蠶圓

龍膽圓

木香圓

警益煎

五珍圓 方見積類

龍膽湯

布袋圓



積

五疔保童圓

疔瘡方論

子丑散

疔瘡證治

猪肚黃連圓

積滯方論

和劑異香散

五珍圓

青龍圓 方見驚門

痞結證治

癖氣證治

換疔圓

快隔消積圓

三稜圓

三稜蓬木圓

木香圓

和劑流氣飲 並服下積圓

換積圓 方見驚門

朱銀圓 方見驚門

聖惠甘遂散

木香圓 方見驚門

代赭圓

香稜圓

秘傳保安圓 方見驚門

大異香散 方見驚門

下積圓

辰砂膏 方見風門

取疔圓

消積圓

熱

諸執方論

人參芎歸散

清解散

大連翹飲

諸熱證治

諸膽圓

附方

梨漿飲

加味清涼飲

龍膽草圓

辰砂湯

卷之四

傷寒

傷寒方論

香蘇散

理中湯

五苓散

人參潤肺湯

傷寒證治

升麻葛根湯

甘露飲

參蘇飲

紫霜圓

桂枝麻黃湯

小柴胡湯

四順飲

人參羌活散

人參敗毒散

附方

香葛散

喉疳散

竹葉石膏湯

薄荷散

白虎加人參湯

寒

寒瘧證治

清皮飲

常山散

葶藶散

附方

虛寒

虛寒證治

地黃圓

虛汗

虛汗證治

團參湯

撲汗方

附方

牡蠣散

痰嗽

痰涎證治

奪命散

風痰證治

青州謝家白圓子

朱砂圓

小兒用錄

七

咳喘

咳嗽喘嗽證治

杏仁膏

紫苑湯

人參枳實湯

神應散

清肺飲

補肺散

神應散

脾胃

胃氣虛寒證治

和脾胃進飲食證治

附方

守胃散

溫脾湯

助胃膏

四君子湯

參苓白朮散規

人參白朮膏

吐瀉

嘔吐證治

消乳丹

益胃散

半夏散

吐瀉證治

雞舌香散

交泰散

不換金正氣散

方見寒類

保和圓

二陳湯方見痰癯

藿香正氣散

泄瀉證治

鍾乳震靈丹方見瀉類

木香益黃散

肉蔻散

和安散

香椿餅

錢氏白朮散

胃苓湯

柴苓湯並見大人痢門

參苓白朮散方見前

瀉痢證治

沒石子圓

赤痢肚熱方

宜寇香連圓

養臟湯

胃風湯

並見大人痢門

腹瀉證治

四順清涼飲熱積門

指迷七氣湯方見氣門

蘇合香圓方見痢門

桔梗枳殼湯方見氣門

附方

保童圓

腫脹

腫脹證治

葶藶散

分氣飲

陰腫證治

桃仁圓

傳藥

母蠣散

附方

溫脾散

分氣飲

南星腹皮散

青木香圓

大小便諸證

遺尿證治

雞腸散

尿白證治

伏苓散

諸淋證治

葵子散

導赤散

尿血方

大小便不通證

沒藥散

脫肛證治

龍骨散

丹毒

丹毒證治

敗毒散

又方

衄血

吐血衄血證治

蒲黃散

地黄汁方

鼻衄方

附方

龍腦雞蘇圓

雜證

顛陷證治

顛填證治

解顛證治

錢氏地黄圓

口舌證治

口角瘡爛方

附秘方

重舌證治

木舌證治

滯頤證治

喉痺證治

喉痺腫痛方

語遲證治

葛蒲圓

夜啼證治

鈎藤散

眼病證治

眼睛白膜方

耳病證治

龍骨散

月蝕耳方又方

龜背證治

龜背證治

臍病證治

安臍散

臍瘡方

鶴節證治

行遲證治

地黃圓方見腎

虎骨圓

五加皮散

癩疔證治

五苓散方見水

當歸散

川練散

瘡癬證治

鯽魚方又參方

涌瘡方

諸瘡久不瘥方

癩瘡方

魚臍瘡方

蠅蝮瘡方

癬方

前甲散

附方

七寶洗心散

涼膈散

大連翹飲子

水通散

臘茶散又方

○卷之五

瘡疹

瘡疹方論

瘡疹條論

瘡疹證候

壞瘡治法

論升麻葛根湯

瘡疹惡證

瘡疹證治

參蘇飲

惺惺散

升麻葛根湯方見

人參敗毒散方見

化毒湯

消風散方見

加味四聖湯

紫草飲子又方

紫草木香湯

紫草木通湯

快班散

絲瓜湯

犀角地黃湯

大連翹湯

人參羌活散方見

天麻防風圓

甘露飲方見

五苓散方見

小柴胡湯方見

四順清涼飲方見

大如聖湯

鼠粘子湯

麻黃黃芩湯

桔梗枳殼湯方見

二陳湯方見

甘草散

烏梅湯

木香理中湯

甘草乾薑湯

獨聖散

宣風散

五福化毒丹

加味宣風散

調解散

不換金正氣散

黃柏膏

豆皮飲

蟬蛻散

治諸眼昏翳

班翳方

扁鵲油劑方

灌藥服藥法

察小兒眼中神法

附遺

原豆論

看耳後紅筋點謂戒燒香烟避穢

失於禁戒輕則變逆

禁忌法

小兒麻痘脉訣

察形

驗色

稀稠

痘疹當分輕重治之

治痘三法

魏氏三法圖式

附痘圖式

始出圖

圓混圖

形色圖

起發圖

漿行圖

漿足圖

漿老圖

血盡圖

結痂圖

還元圖

氣血偏勝受傷圖頂陷圖

倒陷圖

陽毒圖

陰毒圖

疔毒圖

內潰圖

保元湯加減總要

保元湯

升麻葛根湯

和鮮湯

四順清涼飲

鮮毒湯

大連翹飲

參蘇飲

四君子湯

生麥散

甘桔湯

參苓白朮散

四苓湯

白螺散

金華散

生肌散

紫草膏

猪尾膏

木香散

異功散

綿繭散

麥湯散

蒼朮散

菊花散

新刊仁齋直指小兒附遺目錄終

古云不能察其幼小者是以別為一家調理耳小兒所重形質壽命長短者全在乎精血二者和而有妊在母之胎中十月而生一月如珠露二月似桃花三月男女分四月形像具五月筋骨成六月毛髮生七月遊其魂兒能動左手八月遊其魄兒能動右手九月三轉身十月受氣足又顯顯經云十一月胎胞精血凝也十二月胎形成胎也三月陽神為三魂四月陰靈為七魄五月五行分五臟六月六律足六腑七月精閉竅通光明也八月原神具降真靈也九月宮室罗布以定生人也十月受氣足萬象成而生也大抵壽夭窮通聰明愚癡皆以預定豈能逃乎小兒所稟全習父母之餘氣以長形質故肥不可生瘦不可生肥大小與父母不等則難養也初生雖多患若形体相稱則壽也小兒回舒轉首遲滯稍費人雕琢者壽之兆也若小兒預知人意身輕力懦者難養也古人有言譬如**海心**早發不觀歲**寒****白**初晚榮終於年事故知晚成者壽之兆也若小兒陰大而

黑與身相等者可養之子若陰小而白者難養也若小兒形体弱頭面多青脉精神昏瘁者難養也若小兒剛悍眼目俊朗神氣爽健髮緝而澤者壽之兆也若小兒精神突則少病故易養衰成也若形瘁而多病者難養也若小兒眼內黑珠少白睛大面色皸白者非壽之相也縱長不及天年若眼中黑珠大而白睛少面色黑形不淡者亦要觀其小兒眼中黑白分明表裏相稱曰壽曰康若黑珠動搖光明閃爍縱長亦憂目疾壽亦不及四旬矣凡嬰孩始生坐婆急以**綿**裹指拭兒口中**惡物**令淨方可浴穢若不急拭啼聲一出嚔下則生百病矣如或浴水未到且以**綿**包裹暖大人懷中浴湯極湏調和若冷熱失所則令兒驚亦致五臟疾矣雖浴出亦當煖之若遇暑月亦未可去其**綿**乍出母腹不可令冒寒氣也宜以預先煎下**沸湯**以瓶收之臨時漸煖不犯生水則兒不生蒼如此一月為佳自然長而少為矣初生小兒未乳之先用**黃連**些少浸汁調乾**臘脂**一蠅

殼抹兒口中去其腹中旧糞方可與兒乳之一日內以少硃砂入蜜些少調灌半蠅殼一臈以牛黃少許徐徐抹兒口中若兒多睡煩勿強與乳之新生浴兒用雀膽一枚取汁和入湯中浴兒則終身不生瘡疥又用五根湯浴兒亦可五根者桃柳棟梅槐加之苦參白芷煎湯浴之辟諸不祥大凡小兒冬不可久浴浴則傷令夏不可久浴七則傷熱頻浴則背冷而發驚若遇熱時以軟縮蘸湯拭之小兒肌膚未成不可煖衣煖則令筋骨軟弱時常宜見風日若愛惜不見風日令兒肌膚脆軟便易傷損當將父母穿過旧絮着衣少假父母之餘氣幸勿以新綿着兒遇其天氣和暖無風之時令人抱向日中嬉戲數見風日則血凝氣剛肌膚堅密堪耐風寒不致疾病若藏惟帳之中重衣温煖壁言如草木生於陰地不見風日軟脆不耐風寒又當消息衣服無令衣多七則令兒汗出汗多則致虛損風邪易感夫小兒當慎風池在頤項筋兩轅之間諸疾從此而發小兒將帶未

不可頻浴頻浴則脐中入水撮口耳背從此起不不可
刀前人之成說實後人之龜鑑者歟

附相兒壽夭詩

身軟腸癆頭四破 脐小脐高肉不就 髮稀二喘聲喘
遍體青筋俱不壽 尻腫臍骨着不成 能強能行能立死
脐深色老性尊持 方是人家長命子

附乳子調護歌

養小須調護 看承莫縱馳 乳多終損胃 食壅即傷脾
衾厚非為益 衣單正所宜 無風頻見日 寒暑順天時

附小兒無患歌

孩兒常體貌 情態兒殊然 鼻內乾無涕 喉中絕沒涎
頭如青黛染 唇似點珠鮮 臉方花映竹 頰綻水浮蓮
喜引方纔笑 非時口不宣 縱哭無多哭 雖眠不久眠
意同波浪靜 性若鏡中天 此患俱安吉 何愁患再纏

形 色 圖



附 面部觀形察色圖

觀形觀氣要精通
隨機用藥見奇功

稟受元來自不同

細察盈虧明部分

附 觀形氣

三因曰經云視精明者五臟精明聚於目精全則自明神定則視當察其面之五色乃氣之精華也赤欲如帛裹朱不欲如赭如羅裹雄黃不欲如黄土黑欲如漆重澤不欲如炭察五色精敗則生死見立談間矣

附 視証

四時欲得小兒安
自然諸疾不相干

附 小兒常安

常要一分飢與寒

但願人皆依此法

附察病形色歌

大病唇紅不可醫

看來眼慢不相宜

時青頰赤并青黑

髮直鵝聲轉淚啼

手足無紋指頭白

鼻乾燥熱口角垂

昏沉口豎不開眼

便是神仙難治之

五臟精明面上窺

假如肝病面青時

三春白氣如形見

此候須亡餘做之

目如赤白并青黑

面若黃時病亦瘳

目黑與青并赤白

面無黃色救無由

正口常紅四體和

青黃必定積驚多

乾燥脾家皆有執

黑色來時怎奈何

人中若有點點黑

只因瀉痢難逃厄

若還平蒲出分明

任是盧醫救不得

鼻頭無病要微黃

黃甚長憂入死鄉

黑色必當煩燥死

靈丹何必救其殃

山根黑者死未侵

紫色曾因飲食驚

青色必添八呼驚

醫上子細辨其形

印堂青色受人驚

紅白皆緣水火侵

若要安然無疾病

鎮驚定搐使安寧

額上青紋先受驚

忽然紅白命途危

何如早早求靈藥

莫使根源漸七深

兩眉紅色夜多啼

紫色由遺風熱隨

若見赤紅千萬死

何須苦苦拜伸醫

兩眼根源本屬肝

黑瞳黃色定傷寒

白睛黃色皆因積

黑白分明仔細看

太陽若有兩紋青

此是皆緣第二驚

若要安然無疾病

驚紋入耳不惺惺

風池若有青黃色

其子必然多吐逆

青色呼為小小驚

醫士何用千金力

金匱望之青 却緣先受驚 用藥宜先早 何勞辨其形

兩頰赤色曾驚熱 多哭多啼無休歇 醫士見者不須憂 一服清涼便喜悅

年上微黃為正色 若平更陷天難禁 忽然痢疾黑危後 霍亂吐時黃色深

鼻準微黃赤白平 土黃燥黑死蕪并 人中短縮亡因痢 蛔咬心烏黑主唇反傾

承漿青色食時驚 黑主驚風所感生 吐逆心黃紅則痢 要須子細與推尋

白睛青色是肝風 若是黃時有積攻 或見黑睛黃色現 傷寒病證此其蹤

風氣二池黃吐逆 若還青色定為風 驚啼煩燥紅為驗 兩頭如蓮客熱攻

地閣赤色號滿順 冷積痰涎久在脾 喘叫至眠方得息

下涎去積莫遲疑

頰門未腫忽如吹 五臟風熱早宜醫 速與瀉疎為大妙

腫痛須知是死期 積氣未朝恰似湯 早用涼心調五臟

兩頰赤色應南方 何須更向別求方 積氣未朝恰似湯 早用涼心調五臟

面上春白夏中黑 秋赤冬黃為鬼色 若還有患卒難襟 五行相逆為死厄

天門有色發如針 入目須知死氣臨 勸君不用勞心力 魂已飄揚不可尋

臉上青紋來入口 性命難存如木朽 餘色寬時亦大凶 此候誰人先下手

武臺紅脉欲未尋 吐瀉之候漸漸成 却又驚風為惡候 明醫良藥便惺惺

附察雜病生死證

形証

內外俱虛身體多汗出微嘔而煩擾手足厥逆體不安靜者死形羸不能服藥穀氣絕也一病絕已一病復生五行勝復相乘也其人必死

尅絕歌

五臟相形尅 推之數可量 耳焦并鼻黑 戊巳丙丁當
目陷唇枯縮 庚辛甲乙方 舌青并紫腫 壬癸入泉鄉
尅絕者病在心 證主舌絕壬癸水 病在肝 證主目絕庚辛金 病在脾 證主唇絕甲一木 病在肺 證主鼻絕丙丁火 病在腎 證主耳絕戊巳土

附 候氏絕證

吐瀉驚風眼上膜 風在掌中抓不覺 急驚過了喘無休
慢驚過子皮膚薄 盤腸氣過心中孤 嗽吐嘔逆心四惡
傷寒赤脉青相交 結熱而黑皮毛落 疳子入腹眼不閉
熱瀉出蟲口乾惡 鎖口腰低唇鼻青 借痢脾毒唇卷縮

此病因驚蕪有積 豈有神仙留妙藥

附 漢東王氏絕證

小兒死候卒難測 滿口痰涎喉中塞 吐瀉無時加咳嗽
身上皮膚死血色 汗出如油頭巉峻 目無光彩鼻中黑
浮胷心突牽撮口 手足如冰脚面直 搖擗眼斜連唇口
將手抱頭難可改 眼眶青色多焦渴 飲水百盞花不歇
臉腫眼浮脉不末 是物粘身將口呷 啼哭無淚及鷓聲
喉中牽鋸口吹沫 此疾誠難可療之 免彼時人道醫殺

附 風髓絕證

眼上赤脉下貫瞳人 水火顛門腫起無及作坑 鼻乾黑燥
肚大青筋不絕氣 目多直視 五臟不轉睛 指甲黑色
啼作啞聲 氣入脉絕也 虛舌出口 總齒齒咬人 魚口氣急
魚甲木之狀是 啼不作聲 蛇虫既出 冷熱皆出 胃必是死
形用藥連救十無一生

附驗五臟氣絕証論

心絕病証

顛腫顛陷汗出不流汗出如珠如油舒舌出口舌腫發 瀉黑
黧血髮直如麻皮膚無色並死壬癸日

肝絕病証

病重啼哭無泪病重不哭下淚爪甲青黑眼深如陷舌卷囊縮
發搐目斜連唇口動手如抱頭之壯或脚面直素問云其華在
爪其充在筋並死庚辛日

脾絕病証

人中滿人中黑唇縮翻張唇焦枯燥唇乾紫黑唇不蓋齒血腫
尿血舌縮或卷鼻孔開張齒噤冷涎如油撮口如囊面如土色
四肢逆冷如濕石之壯喫乳不收瀉糞赤黑並死甲乙日

肺絕病証

有熱嘔湯水并藥食喉中鳴是胃管直水不能蔭肺此證醫書

罕有蓋累曾有驗必死不治目直青睛目直氣喘下回喫食多
噎嗽痰頑涎塞口候中鳴響鼻乾黑燥鼻塞不通肺脹胃膈頭
汗肢冷並死丙丁日

腎絕病証

面黑神昏眼黑睛腫目無光彩耳輪青黃耳論焦枯牙齒焦枯
疳牙齒落髮疎黃燥膚黑皮燥驚風咬妳驚風長齒洩死發驚
黑色遶口並死戊巳日

附五臟相尅雜證

心病目黑腎尅心壬癸日絕。肝病脾黑肺尅肝庚辛日絕

脾病唇青肝尅脾甲乙日絕

肺病頰腫目赤心尅肺丙丁日絕

腎病面腫唇黃脾尅腎戊巳日絕

附小兒形症歌

搖頭揉目 肝熱生風 眇淚憎明 三焦積熱

鼻生清涕	肺受其寒	頰赤面黃	風傷腑熱
霍亂吐逆	胃積氣傷	瀉痢不常	氣攻腸滑
面青呵欠	驚氣傳疳	盜汗頻七	臟腑虛熱
傷寒驚搐	風盛發狂	胃熱生斑	氣傷冷厥
長吁齧齒	風盛氣生	上竅搖頭	延高胃結
肺壅氣傷	咳嗽咯血	涎盛發靨	積傷風熱
小便淋赤	熱聚膀胱	疝氣因啼	胎中積結
妳脾痞瘕	因物所傷	喉閉丹痧	肺之受熱
愛喫泥土	脾臟生疳	嘔逆痰涎	蛔蠱上出
脫肛瀉血	冷熱積傷	消渴口瘡	心家受熱
面黃浮腫	積氣所攻	鶴膝解顛	因風腑熱
行遲語澁	胎積氣傷	項硬肝風	氣傷木舌
醫經要略	病源辨別	審而用之	細詳使藥

小兒諸雜病狀論

小兒驚哭聲沉不響者是病重用藥難痊若聲浮者輕調驚即
 瘥頰皮乾枯筋脈緊急唇外赤而肉白有瘡瘕如無津至者熱
 驚而難痊此是熱過極矣赤眼是肝積熱怕明心肝有驚牙疳
 妳食之毒喫食不消是脾積冷耳聾是腎之積胎癩是肺積風
 漸熱是因驚而得喉內如鋸是膈上客風入肺及因驚入大腸
 而得或悲或要歌是邪入脾口瘡肚脹疳氣逆吐蟲心與大腸
 熱瘡疾是脾之積開口睡是五臟毒盛多哭是驚風入肺愛喫
 泥土是脾生蟲夜多盜汗是虛熱疳氣不順五心熱是疳勞停
 耳是腎積風腹脹惡心是肺中積愛喫布脚是肺生蟲愛喫夫
 炭是肝生蟲愛喫鹽腎生蟲愛喫茶末是心生蟲愛喫酸物是
 膽生蟲

膏梁之腹與藜藿之腹不同

初生禁風撮口瘳風方論

初生禁風撮口瘳風是三者一種病也禁風者眼閉口禁啼聲

漸小舌上聚肉如粟米狀吮乳不得口吐白沫大小便皆通蓋由胎中感受熱氣流毒於心脾故形見於喉舌間也抑亦生下復為風邪擊搏致之自涌月至百二十日見此名曰犯風噤依法將護防於未然則無此患○撮口者面目黃赤氣息喘急啼聲不出蓋由胎氣挾熱兼風邪入臍流毒心脾之經故令舌強唇青聚口撮面飲乳有妨若口出白沫而四肢冷者不可救藥其或肚脹青筋吊陽邪內氣引痛皆腸胃鬱結不通致之治法貴乎疎利撮口最為惡候一臍內見之尤急○臍風者斷臍之後為水濕風冷所乘風濕之氣入於臍而流於心脾遂令肚脹臍腫身軀重着四肢柔直日夜多啼不能吮乳甚則發為風搖若臍邊青黑撮口不問是為內搖不治瓜甲黑者即死其或熱在胃堂伸引弩氣亦令臍腫可與千金龍膽湯如前三者受病之源非一朝夕大抵裏氣鬱結壅閉不通並用取下胎毒天麻圓定命丹朱銀圓輩可量與之千金論云小兒始生其胎氣尚

盛若有微患即瀉下之若不瀉下則成大疾疾成則難療矣

紫圓子 方見變蒸門

瘰風撮口臍風證治

風藥 先用**控痰散**吐風涎次與**益脾散**和胃又用**辰砂膏**利

驚即愈或手捉拳瘰口不開者不治

控痰散

蝎尾 銅青 各半錢 朱砂 一錢

膩粉 一字 麝 少許

右為末每服一字臘茶清調下先吐風涎然後和胃或後段

益脾散

白茯苓 人參 草果 木香 濕紙裹熟

甘草炒 陳皮 厚朴 製 蘇子 炒

右等分為末每一錢姜棗煎服

辰砂膏

辰砂三錢

鵬砂

馬牙硝銛半玄明粉二錢

全蝎

真珠末各一錢

麝一字

右為末和畢用好單包起自然成膏每服一豆粒許治諸驚

金銀薄荷湯下潮熱**甘草湯**下月內用**乳石**調傳妳上令乳下

僵蚕方 治撮口

直僵蚕二枚去背略炒為末蜜調傳唇口中

甘草湯 治撮口取吐

甘草生一錢

右剉煎服令吐出痰涎却以**猪乳**點入口中即差

撮風散 治撮口

赤脚蜈蚣半條炙

釣藤一分

朱砂

直僵蚕焙

血蝎稍焙一麝一字

右為末每服一字取**竹瀝**調下**竹瀝**解熱

蜈蚣方 治口噤不開不能收乳

赤足蜈蚣半枚去足炙令焦

右為末入**猪乳**少許以**猪乳**二合和之分叁服**猪乳**主小兒口

噤不開最良

蜘蛛方 治口噤不開不能吮乳

蜘蛛壹枚去足及口炙令焦細研

右用**猪乳**一合調和為叁服徐徐灌之神妙**牙疳**亦用**蜘蛛**

并**麝香**

牛漆方 取東行**牛白漆**塗兒口及額上即效

立聖散 治小兒口噤

蝎梢七箇

乾蜘蛛一個去口足先以新竹於火上炙取竹油

右同末研極細入**猪乳**少許每壹字用**猪乳**調時時滴入口中

安胎散 小兒斷臍後便傳之

赤蜈蚣一錢

鈴羊角一錢亂髮一團燒令烟欲

麝 少許

雀甕 三枚

右為末斷脬後便傳之

傳脬方

瓜蒂

南星

白欬

赤小豆等分

右為末每叁錢用芭蕉自然汁調傳脬四邊

脬風鑠口方

金頭蜈蚣 个 蝎梢 五箇

直僵蚕 七箇 瞿麥 半斤

右為末每壹字吹入鼻內啼則可醫仍用薄荷湯調壹字服

千金龍膽湯

方見胎驚門

朱銀丸

方見胎驚門

天麻丸 定命丹 急驚下劑

附方

秘傳正聖散 治脬風撮口

赤蜈蚣 一條 酒炙 蝎梢 七箇

瞿麥 五分

僵蚕 七箇

蟬退

右為末先用雞毛管吹少許入鼻內啼則可醫仍用薄荷湯

調下

秘傳消積散

治胎風及月內撮口脬風

蝎梢 四十

改个

僵蚕 四十

去殼生薑汁

腦子 另研

麝 各少許

右先將蝎梢每壹箇用薄荷葉包定以線扎放砂銚內炒令

薄荷乾為度同僵蚕研細入腦子末研勻用紫羅羅二片

煎湯調下

秘傳神效方 治脬風

取蝎梢 一條

將尾鬚二根剪斷自然出水滴入脬內少刻

即愈其蝎在多年牆毛內取人家水缸底亦有

初生不乳溢治

嬰兒初出胞胎其聲未發急以手拭掠其口令惡血淨盡不得下咽則無他病若拭口不前惡穢入腹則腹涌氣短不能飲乳

或產婦取冷過度胎中受寒則令兒腹痛不肯飲乳惡穢入腹
宜用伏苓丸

赤伏苓

川黃連去鬚枳殼炒

右等分爲末煉蜜圓桐子大每壹丸乳汁調灌下

治胎寒腹痛方

木香

陳橘皮

檳榔各一分 辣桂

川白薑生

甘草各半分

右末取壹捻水煎以綿蘸與之

治惡穢入腹令兒嘔吐不止方

木香

乾薑生

伏苓

甘草各一分

酸木瓜

丁香各半分

右麤末壹捻水煎以綿與之

附方

定命散治初生兒口噤不乳

蟬退六七枚

全蝎二七箇

右爲極細末入輕粉少許和研用乳汁乳遠調化服

變蒸

變蒸方論

變蒸者陰陽水火蒸於血氣而使形躰成就就是五臟之變氣而
七情之所由生也三十二日一變其後三大蒸總五百七十有
六日變者上氣蒸者躰熱每經一變情態即異輕則發熱微汗
其狀似驚重則壯熱脈亂而數或吐或汗或煩啼燥渴輕者五
日解重者七八日解其候與傷寒相若亦有更蒸之餘續感寒
邪者但變蒸則耳冷眦冷上唇發泡狀如濁珠若寒邪搏之則
寒執妄爭腹中作痛而啼叫之聲日夜不絕變者易也蒸於肝
則目昏微赤蒸於肺則噴嗽毛聳凡五臟六腑筋脈骨節皆循
環一匝各有證應其陰陽水火之變故治法和平之劑微表熱

實者微利之或不治亦自愈

變蒸証治

此胡湯 治變蒸骨熱心煩啼叫不已

人參

甘草微炙

麥門冬

柴胡各二錢

龍膽草

防風各一錢

右剉散每服三字煎服

紫陽煎散 解利抗氣

麻黃仁兩

去節大黃半兩

杏仁去皮

右件同一處擣和並略燒存性再以少許研膏和之密器盛每用一且許乳汁和咽之

紫龍子 疎利積氣實無

代赭一兩燒醋淬

赤石脂七錢

巴豆二十枚去心

杏仁五十箇

右代赭赤石脂先擣末和杏仁巴豆擣三千杵若硬加蜜少

許更廣圓如粟米入用密器收每服二圓以乳汁送下如更
有熱不泄明日再與二圓此藥兼治驚積痰消食癩溫壯諸疾

當歸散 治變蒸有寒無熱

當歸二錢

木香

官桂辣者

甘草炙

人參各一錢

右剉散每服一錢量寒煎食前服

調氣散 治變蒸吐瀉不乳多啼

木香

香附

厚朴製

人參

橘皮

霍香

甘草炙

各一錢

右為末每服三字量寒煎服

附方

人參散 治變蒸骨熱心煩啼叫

人參

甘草

麥門冬心

柴胡各二

防風祛

龍膽草各一

一方加升麻

右劉散每服三字水一盞煎服

秘傳平和飲子治嬰孩小兒變蒸前三日後三日進一服可免百病及百日内宜服

人參法

甘草各五分

川升麻二分

白茯苓錢半

右咬咀用水煎不以時候服稟受弱者加白朮一錢肥大壯實者不用



驚

急風慢風慢脾風總論

小兒急慢驚風古所謂陰陽痼是爾急者屬陽陽盛而陰虧傷者屬陰陽虧而陰盛陽動而燥疾陰靜而遲緩其始也皆因臟腑虛而得之虛能發熱則生風是以風生於肝痰生於脾驚出於心熱出於肺而心亦主熱大官疾醫注云肺氣熱心氣次之驚風痰熱合為四證四證已具八候生焉搖頭掣顛反引

視日八候 凡搭眼搖頭張口出舌唇紅臉赤面青眼青唇青為

青太陽髮際印堂青筋三關虎口紋紅紫或青者皆驚風狀也

大抵辨論虛實證別逆順治有後先蓋實熱為急驚虛熱為慢

驚慢驚本無熱所以發熱者虛使然爾急驚屬陽用藥以寒慢

驚屬陰用藥以溫甚不可以陰陽無別故曰熱論虛實者此也

男搖左視左女搖右視右男眼上竄女眼下竄男握拇指出外

女握拇指入裏男引手晚左直右曲女引手挽右直左曲凡此

順反之則逆亦有先搖左而後雙搖者但搖順則無聲搖逆

則有聲其指紋形勢彎弓入裏者順出外者逆出入相半者難

痊 目屬肝肝受風熱則目直視或上竄或兩眦頻搭若無險赤

五心煩熱之證亦不發搐必挾心熱則用風心火二者交爭而

發搐也但竄視直視者與傷青筋更加發搐者以去肝風亦散降心

火切勿新書以為要藥故曰證別逆順者此也 陽病陰脉陰病

陰病陽脉陰病陽脉

陽脈亦反

熱盛生痰

盛生驚

盛生風

盛發搐

治搐先於

截風

治風先於

利驚

治驚先於

豁痰

治痰先於

解熱

其若四證

俱有又當兼

施並理一或

有遺必生他

證故曰治有

先後者此

也綱領如此

若析急慢脾

風而言之則

暴烈者為急

驚沉重者

為慢驚而慢

脾則重而深

矣急驚之候

牙關緊急壯

熱涎潮竄

視反張搖擗

顫動

唇青十指開

合

唇口眉眼引

頰併口中熱

氣頰赤唇紅

大小便黃赤

其脈浮數洪

緊蓋由內有

實熱外挾

風邪心家受

熱而積驚肝

家生風而發

搐肝風心火

二臟交爭

血亂氣并痰

涎壅塞所以

百脈凝滯開

竅不通風氣

蓄盛而無

所泄故暴烈

也治法大要

用藥有序通

開以後且與

截風尚作迺下之痰熱一泄又須急與和胃定心之劑如搐定而痰無多則但用輕藥消痰除熱可也然急驚難當下切不可過用寒涼及

粉巴霜但能斟酌大黃可也欲下之法須當審問前人已下未下或曾經吐瀉否已下及吐瀉者不可再下但驅風化痰消熱而已大約痰熱十分且泄其三之二下劑中須以

氣通心之類佐之蓋急驚急在一時治之不可寬緩稍緩則證候轉深若一時辨認未明又不可妄施藥餌○截風定搐先與

通開噫驚車次則人參羌活散截風回一字散陽驚散擒風湯定搐散瀉青丸木通散清寧散阿膠散以意擇用○下劑有三

輕下則用定命丹利驚圓防風湯宣風散枳殼散小柴胡湯葷

○稍重下則用揚風湯朱砂膏疎風散柴胡加大黃湯葷○重

下則用青金圓天麻圓盧會散牛黃涼膈圓青金丹王監驚墨

圓葷○下後和胃助氣如生氣散銀白散伏苓二陳湯異功散

天麻蘇合香圓參苓白朮散和中散醒脾散之類皆可用○

定志寧神則以定志圓益膽湯定心圓百枝膏與之他如太乙

傷風 驚風 不冷不熱祛風鎮驚之劑又當繼此以

防其再發也下之後諸證猶存者未易痊愈更勿再下當作慢

驚理之○其有搐搦反張斜視而牙關不緊口無痰涎者未可

直指以為驚風恐是傷風傷寒傷食成三等證或夾驚而成如

錢氏假搐之說傷風夾驚神困昏悻頭疼氣壅先用人參羌活

散 祛風散消風散 葶藶散其表次與天麻防風花柳傷食夾驚身

熱溫壯或吐不思食大便酸臭先用人參羌活散加青皮紫蘇

取表消積次用驅風鎮驚之劑比搐搦者不可把握但扶持之

否則風癩逆入經絡遂使手足拘攣以成廢疾此治急驚之大

要然也傷驚之候或吐或瀉延鳴微喘眼開神緩睡則露睛驚

跳搐搦乍發乍靜或身熱或身冷或四肢熱或口鼻冷氣面色

淡白淡青眉間唇間或青或紫其脉沉遲散緩蓋由急驚過用

寒涼或轉下太驟傳變成之入有吐利不止而成者有氣虛暴

吐瀉而成者錢云夏月脾胃必熱大吐瀉者當將暑熱不可專

白濁 腸有臟腑虛洞泄成者風邪入於腸胃故大便不聚而瀉

有久痢氣脫成者有下積取瀉成者有吐血瀉血成者有感風

不解誤藥成者有傷寒變陰證成者有得之久嗽作癩者有

得之發癩不已者有得之中積衝心者有得之如腫疝氣腹痛

者其或日夜汗出脾困多睡煩燥引飲四肢浮腫大小便閉丹

瘤腫毒龍帶腰走馬急疝並傳慢候惟吐瀉積痢成虛致之

則證亦甚速經吐瀉便是慢驚須用溫中扶裏或搐來緊急

乃慢驚初傳尚有陽證不可誤作急驚用藥世言證慢慢為慢驚

非也若泥此往往指慢脾為慢驚矣凡慢驚男子以瀉得之為

重女子以吐得之為重治法大要須當審問源流不可既柔曰慢

證如吐瀉得之則用**中湯**加**木香**以溫其中**五苓散**以導其水

藏寒洞泄得之則先與**木附湯**下積取轉得之則先與**調氣散**

外感寒邪得之則先與**桂枝湯****解肌湯**輩其他可以類推矣然

慢驚雖屬陰亦須準較陰陽虧盛淺深如何不可純用溫藥及

驚風

燥烈太執之劑惟於生胃氣中加以截風定搐如**全蝎****花蛇****僵**
蚕**白附****天麻****南星**輩為良。方傳慢候而尚有陽證者八條尚
在不必回陽但直截風調胃可冷可熱均平陰陽而已。**大****一****保**
生丹**聚寶丹****補腦散****神保救濟丹****采復丹****王氏惺惺散****醒脾散**
大醒脾散**溫三九**可選用之。若陽虧陰盛病已傳過純屬慢
驚無搖掣反引竄視之證而但昏沉者與**犀香全蝎散****定命散**
四聖散**烏蝎四君子湯****天南星散****烏沉湯****沉香散**之屬。若手
足冰冷者方可回陽用**流黃****附子**。慢驚下痰身煖者**天南星**
九蘇合香白圓**痰盛者神保救濟丹****礞石散**虛甚而不可下
痰者**靈脂圓****小兒圓**如腦麝銀粉已霜寒涼通關利腸輩一切
禁止。麝香溫然性屬陰能化陽通脈其有陽已傳陰或者不知
但見引搐誤用腦麝銀粉及寒涼輩必為慢脾陰逆若慢驚之
候其眼半開半合則當預作慢脾風調理之於斯時也陰氣易
盛陽氣易微時刻少延則藥力不及頻併投藥則勢又不可終

進一二劑須審有無傳變稍定則和平為愈。此以剛劑投
之此治慢驚之大要然也。**慢脾風之候**面青額汗舌短頭低眼
合不開困睡中搖頭吐舌頻嘔腥臭噤口咬牙手足微搐而不
收或身冷或身溫而四肢冷其脉沉微陰氣極盛胃氣極虛十
救一二蓋由慢驚之後吐瀉損脾病傳已極總歸虛處惟脾所
受故曰脾風若逐風則無風可逐若療驚則無驚可療但脾間
痰涎虛熱往來其服合者脾困氣之神志沉迷痰涎凝滯然亦
世所謂慢風難療者慢脾風是也。然慢脾一名虛風凡小兒或
吐或瀉之後面色虛黃大勢虛損若因虛而發熱繼此必得慢
脾風總見搖頭斜視以手摸人昏困喜睡額上汗多身亦粘汗
其声沉小而焦即是脾風之證不必皆由急慢風傳次而至又
當識之治法大要生胃回陽**黑附湯****川烏散****益液****白圓**各
半**半附四君子湯**可斟酌用胃氣漸復則**集以散**輩溫平而調
理之如**蠲附散****陰翳散****靈砂****震靈**等亦可參用。若其眼半開

半合手足不冷證候尚在慢驚則勿用回陽○或已入慢脾而
陽氣未甚脫者亦不可用（疏黃附子）凡服（回陽湯）劑手足漸煖
者仍以（醒脾散）尋繼其後以調之○慢脾下痰輕者（神保既濟）
（回）（百僵套圓）重者（辰砂膏）其則（七寶妙砂）矣慢驚慢脾逆惡證
候諸藥不效者如有太衝脈則取（百會穴）灸之此治慢脾風之
大要然也（灸百會穴詳且于後）雖然小兒有病問之則勿不能
言望之則易驚易喜診之則或惕或動自六歲以下黃帝不載
其說者以其難也又况驚風一科古無全書則尤為難知前所
云固足以知三證之詳矣至於辨析體認通變之際有言而不
能盡其蘊者可不深加之意乎驚風一也痊症發癇卒中天癲
撮口亦風之種類焉○（癇）者手足水冷（癇）者牽身僵仆（癇）不
一病當以陽剛陰柔別之剛者有汗柔者無汗肢體強直腰身
反張甚於風癇大抵不治○（癇）者目睛凝流神氣鬱勃四体不
收沉默昏潰似死似生其聲惡叫（身軟時醒有聲者為癇身不

不醒無舌者為癇癇凡治驚過咬牙（加叶者須身通心行小便
劑癇亦多種錢氏有牛羊雞犬猪之法大抵以風驚食三證別
而治之○（中風）者五臟各有脉證隨五臟俞以施灸法與大科
則同特小小分劑耳○（天癲）者身軀壯熱翻眼擡精手足搖掣
其狀如魚之上釣（又內癲腹痛多啼唇黑陰腫僵僵反張眼有
紅筋吐血乃寒氣壅結兼驚得之）○（癲口）者一臟內之篤疾脐
風胎風鎖肚吊腸外疝俱至撮口蓋風入心脾故令小兒氣促
口撮如囊而不乳也○其有初生百日頻頻吐呢呵來噴去睡
裏多驚眼翻肚脹手足緩怠煩燥多啼者當作胎驚風理之○
又有變蒸亦發微驚不治自愈○又瘡豆欲發亦或搖掣如風
右鼻冷脚冷尻冷耳後有紅脉赤縷者必是瘡豆之證戒不可
以（腦）（關）開膝及（腦）（腦）轉下而水壓之是辨析之不可不審
也至若眼陷無光白睛灌人瓜甲青黑四体垂蹶（一臟氣絕不
可勉強下藥（面赤如緋面青背冷頭目仰後足冷目青腹脹胃

高手擎臂膈唇舌暈黑魚口氣麗顛腫坑啼哭無淚冷汗不止汗出如珠如油眼青瀉黑血悶延入心肺噓舌出口咬人五硬五軟五冷五乾皆惡證也。○**急驚**眼睛翻轉口中出血兩足擺跳腹肚搖動或神緩而摸躡尋衣或證罷而神昏氣促噴藥不下通關不噎心中痛絕忽大叫者難愈。○**慢驚**四肢厥冷吐瀉加嗽面黯唇慘胃痛鳴舌兩脇動氣口生白瘡胃閉損也髮直搖頭眼睛不轉涎鳴喘噎口眼手足一邊牽引者難痊。○**慢****脾**身冷粘汗直卧如尸喘嗽頭軟大小便不禁背母口噤頭搖者最難為力。○或者慢驚欲絕之時虛痰上攻咽喉引氣呼吸麓大脉來浮數是謂陰盛強陽錯認以為陽氣已復直與峻藥下痰下痰隨棄下氣隨痰絕人以醫殺咎之此則不識覆燈將絕之證雖不下藥亦無生意矣。○又有喉中痰涎聲如拽鋸一兩日問但閉目不開者此為虛候之極虛痰飽養其氣然也凌遽下痰亦未可保姑以**蘇合香****白圓子**輩與之。○他如急驚安靜

之後兩日再發面色變易又三四日定而復發其後淹延必至沉重若急驚證候徒知定搐不去驚執總見搐定遂指為安未幾復搐是為過街候。○若慢驚之候藥服已瘥尚虛乏數日未省者或妄攻之則前功俱廢是牀認之不可不精也。其或傷風傷寒傷暑傷濕傷食停積排勞煩渴盤腸肚瀉諸瘡疝益皆因之而發風邪當辨認隨其證察其病正病去則風自去矣按錢氏方小兒發搐身執喘急目斜露睛四肢逆冷李醫藥以定驚搐一劑與之殊無主對錢遂別之曰發搐為肝實身執喘急為肺虛目斜露睛為肝肺相勝四肢冷為脾虛治法先用益脾補肺胃氣稍復然後瀉肝涼驚而安。○一證直視而不能食或謂神祟使然錢知其為肝旺勝脾與之瀉肺而愈。○一證吐瀉或利小便過多以致脾虛不食錢用**益黃散**作效已經數日忽爾不語衆醫類以**宋****黃湯**劑主之竟無寸效錢氏用**龍黃圓**數劑補腎於是能言所以然者前平清利小便太過遂使脾腎俱虛

雖已補脾而腎尚虛故爾。○至論肺虛痰實治法當下故下之
必先益脾然後瀉肺。經云欲瀉其子先補其母此錢氏要訣錢
氏方瀉青龍瀉白散瀉肺散瀉黃散宣風散乃專五臟藥益胃
散白朮散阿膠散瀉心散瀉脾散瀉肝散瀉肺散瀉腎散
不退則與之助胃胃不虛則熱不生或胃虛不食又且大小便
難則不為之疏利蓋利之則胃愈虛而身必冷。○其有傷風寒
而吐瀉者欲止吐瀉不特溫脾須以發散之劑先之風寒散而
吐瀉自止矣不特此爾小兒平常服藥過多頑玩臟腑調和之
劑不愈則易之以攻擊固守之劑太過則時乎而疏利主治在
我不可不問源流不可徧徇病家所欲圓機達變消息輕重而
應之是通變之不可無法也大槩小兒臟腑柔嫩易實易虛易
冷易熱兒有大小壯弱病有輕重淺深所貴乎目視指切意度
心惟醫權藥衡斟酌對治用之得中約上矣

虎口三關紋訣法

虎口者以手處是也三關者第二指之三節是也除拇指為第一
一居近虎口第一節為初關亦名風關第二節為中關亦名氣
關近指端第三節為末關亦名命關男以左手女以右手側看
之驚風初得紋出虎口或在初關多是紅色傳至中關色赤而
紫者病又傳過其色紫青病勢深重其色青黑青而紋亂者病
深重若見純黑危惡不治大抵紅者風熱輕赤者風熱盛紫者
驚熱青者驚積青赤相半驚積風熱俱有主急驚風青而淡紫
伸縮來去主慢驚風紫絲青絲或黑絲隱隱相雜似出不出主
慢脾風凡手紋在初關者易治過中關者難治透末關者不治
三關直透大抵不治然紋勢彎曲入裏者病雖重而證順猶可
用力若紋勢弓反出外駸駸靠於指甲者斷不可回其有三關
紋如流珠流米三五點相連或形於面或形於身危惡尤甚。○
陽為男陰為女三關虎口紋男以左手女以右手驗之蓋取左
手屬陽男以陽為主右手屬陰女以陰為主耳然男女一身均

虎口脈紋

虎口脈紋

十一

其此陰陽左右两手亦當參驗左手之紋病應心肝右手之紋病應肺脾於此消息又得變而通之之意

附指掌圖

虎口三開指掌圖

虎口义手處是也
 三開第一指及三節
 風關第一節寅位
 氣關第二節卯位
 命關第三節辰位



嬰兒生下一月至三歲當看虎口內脉兩邊

附辨虎口手訣

夫三歲已前若存患須看虎口脉次指表節為命關次氣關次風關古人所謂初得風關病猶可傳入氣命定難陳是也湯氏云小兒初生至五歲血氣未定呼吸至數大過必辨虎口色脉方可察其病之的要者正謂此也男以左手觀之女以右手觀之

附定指上二關

辰關指頭 卯關指中 寅關指下節

脉紋從寅關起不至卯關者病易治若連於卯關者有病難治如寅關連卯關侵過辰關者十難救一若脉紋小或短者看病不紡

附指紋脉主病

初起寅關淺 紋侵過卯深 生技終不治 辰位實難禁

青色胎氣不全註驚悸

指脉深清卧不寧

青兼黑色盤腸瀉

紅色驚八脾竅

孩兒指脉深紅色

微紅下痢腹中疼

紫色胎驚馬熱

紫中紋生紫色深

微中紫色腸中痛

附脉指譜

小兒食指變三關

皆知初氣中風候

要知虎口氣紋脉

黃紅安樂五臟和

微青腹痛糞多青

發搐牽抽不暫停

發熱驚時身強直

吐瀉脾虛多不食

驚時哭泣又呻吟

吐瀉紋奇主惡心

男左女右一般看

末是命門易亦難

倒指看紋分五色

紅紫依稀有損益

紫青傷食氣虛煩

忽然純黑在其間

若也直上到風關

如鎗衝射驚風至

弓反乘順外為逆

又頭長短尤可救

男兒兩歲尚為嬰

五六次第年少長

九歲為童十稚子

十一癩疾號頑風

痞癖定為沉痼候

初看掌心中有熱

肚熱脚冷傷積定

額冷脚熱驚所得

青息之時氣候前

好手醫士心膽寒

粒米短長分兩端

分作枝叉有數般

順逆交連病已難

如此醫士仔細看

三歲四歲幼為名

七齧八齧漸論情

有病閑格辯其因

癩病還同勞病攻

退他潮熱不相同

便知身體熱相從

脾熱額熱是感風

瘡癩發未耳後紅

小兒有積宜與塌

傷寒三種解為宜

食瀉之時須有積

冷瀉須用與溫脾

水瀉宜與澁臟腑

先將滯腸散與之

孩兒無事忽大叫

不是驚風是天虧

大叫氣促長聲麗

誤喫熱毒悶心竅

急瀉吐下却和脾

若將驚藥真堪笑

痢疾努氣眉頭皺

不努不皺陽有風

冷熱不調分赤白

脫肛因毒熱相攻

十二種痢何為惡

禁口刮腸一作大不同

孩兒有病不可下

不熱自汗兼自瀉

神困顛陷四肢冷

乾嘔氣虛神怯怕

吐蟲面白毛焦穗

疳氣潮熱食不化

鼻塞咳嗽及虛痰

脉細腸鳴煩燥訝

若將有積與疎通

下了之時必生詫

孩兒實熱下無訪

面赤睛紅氣壯強

脉大弦洪肚上熱

胛腮喉痛尿如湯

屎硬腹脹脇肋滿

四肢浮腫夜啼長

遍體生瘡肚隱痛

下之必愈是為良

附入門候歌

五指稍頭冷

驚未不可當

若逢中指熱

必定是傷寒

中指獨自冷

麻且證相傳

女右男分左

分明仔細看

附三關一詞

左有紅紋

綠形

定知發熱又兼驚

右有紅紋

綠樣

脾腸驚積一齊生

紋頭若

樣

肺熱風痰夜有聲

青赤應

疔傷寒候

只見空紅定瀉生

虎口亂紋多

因知氣不和

色青驚積聚

下亂瀉相和

青即慢驚發

入掌內虧及

三關若通過

此病必沉痾

虎口麻紋

三關若通過

此病必沉痾

脉候若深青 情知四足驚 赤因水火得 紅色是人驚

面反風熱盛 弓紋弯食上停 但看义手处 方可辨直形

青色大小曲 人驚并四足 亦色大小曲 水火飛禽蹠

紫色大小曲 傷米麵魚肉 黑色大小曲 脾風微作搖

詳解脉紋

流珠只一點子紅色環珠其形差大長珠其形圓長以上非謂
圈子惣皆紅脉貫氣之如此來蛇即是長珠散一頭大一頭尖
去蛇亦如此乃分其上下朝故口來去角弓反張其裏外向裏
為順向外為逆鎗形直上魚骨分開水字即三脉並行針行即
過關一二粒米許射甲命脉射外透指命脉曲裏一十三位悉
有輕重元由一氣有微至著從初至惣輕重參詳前云五色者
黃紅紫青黑由其病感色能知如久又傳加進即越黃紅之色紅
盛作紫又有紅紫之色或盛紫又有紫青之色青盛作黑又
有青黑之色至於純黑之色者不可與而療治之也

魚刺為敬馬積 蛇來肝 水紋知食積

針樣執傷風 蟲捲肝虛散 咳嗽肝反弓

流珠中膈熱 惡受透關中

風閉青如魚刺易治是初敬馬候黑色難治

氣閉青如魚刺主虛勞身熱易治

命閉青如魚刺主虛風邪傳脾難治

風閉青黑如懸針主水驚

氣閉赤如懸針主痺蕪肺臟積熱

命閉青黑如懸針主人驚有此凡五色比皆是死候三關

通度如懸者主慢驚風難治

風閉如水字主驚風入肺咳嗽向赤

氣閉如水字主膈上有涎并痰積停滯

命閉如水字主驚風極不拘五色三關通度者不治

風閉如乙字主肝臟驚風易治

三關脉紋

氣閉如乙字主敬烏風

命閉如乙字青黑色主慢脾難治

風閉如曲蟲者肝病蟲聚胃前如橫排筭子肚皮似吹起若猪炮

氣閉如曲蟲主大腸穢積

命閉如曲蟲主心臟傳肝難治

風閉如環主肝臟疝有積聚

氣閉如環主疝入胃吐逆不治

命閉如環難治

此紋若在風氣二閉易治若在

命閉通度難治

此紋若在手或在上或在面上或左右驗過皆是死候

脈曲向外者是風疝

脈斜向左右是傷寒身熱不食無汗

脈斜向左是傷風身熱不食有汗

雙勾脈者是傷冷

脈三曲如長虫是傷硬物

脈兩曲如鈎是傷冷

脈一頭如環又有脚者是傷冷

頭面肚上有大脈并青驚並是食毒驚積難

面上有似點子並是再發之候

脈如亂虫是常疝亦有虫疝蛔虫食積之疝治之必瘥

九脈不足細者并是風氣但消疝然後取虫為効

辨三部脈證

上黑瀕知腎臟傳 中閔黑候又纏綿 人驚此患兩相雜

目多直視定痰涎 下黑瀕知是再驚 但宜風積便和平

上下是同因打撲 熱來悶閉沒心情 上清肝臟有風停

三關脈

脈

脈

脈

脈

目直便青面更青 中是人驚并四足 渴來發燥便惺惺
 下青原是再驚根 鮮熱宣腸是何論 上下俱青候是惡
 十箇之中得一存 上赤風多入肺停 或來發熱救聲頻
 中是風來入心臟 腸痛頻上下瀉青 下赤重驚見本宗
 但調心臟有神功 上下一同難治療 口開目下是知凶
 上青肝臟本因留 目閉身疼四体柔 中是水瀉并再撲
 熱來喘嗽不知休 下青因是再驚來 妙藥仙風定少灾
 上下若青俱發熱 四肢逆令奄泉臺 上黑之時目上瞪刀按
 大便流糞又兼青 中見之時狀消渴 下熱尿黃便安寧
 下黑若見赤相隨 氣多下瀉候如斯 上下俱同須看手
 虛煩燥渴速求醫

小兒診脉論

小兒脉三歲以上五歲以下然夜可看候與大人有異者為呼
 吸至八是常也九至病十至病益小兒純陽故脉息數促與大

人者為不同也小兒周歲以前脉息雖憑周歲以後方有脉
 寶鑑云五百七十六日乃成人血脉骨肉皆兼勞方可診候也

三關六脉生死謠

小兒有證須憑脉 一指三關定數息 須知風熱脉浮洪
 緊數驚風四肢掣 緊促之時痧痘生 浮緩傷風身汗出
 洪緊無汗是傷寒 醫士不辯誠無識 人迎緊盛傷於寒
 氣口緊盛傷於食 分明妙訣請君知 三至為脫二至卒
 五至為虛四至病 六至平和曰無病 七至八至病猶輕
 九至十至病勢極 十一十二死無疑 此訣萬中無一失

附訣脉逆順謠

傷寒脉大最相宜 腫滿浮洪病可醫 微細心疼終是順
 沉遲吐瀉必瀕危 蟲攻緊滑皆知急 渴飲沉微勢已衰
 敬為搖浮洪多易治 端鹿麤涎盛滑為奇

附脉証直訣

小兒脈大多風熱 沉細元因乳食結 弦長多是肝膈風

緊數驚風四肢掣 洪浮胃口是火燒 沉緊腹中痛不歇

虛濡有氣又驚驚 脈芤大小便中血 四至洪來若煩瀰

沉細腹中痛切上 滑中露濕冷所傷 弦急客忤分明說

小兒乳後多嘔逆 更兼脈亂無慮憂 弦急之時被氣纏

脈緩即是不消乳 緊數細快亦少苦 虛濡驚風邪氣助

痢下宣腸急痛時 浮大之脈歸泉路

附 太衝尺脈

寸關無脈已昏沉 脚面猶看尺脈存 此理恰如枝葉悴

尚餘生意在其根

附 太衝陽脈

太衝元在兩足大指本節後二寸陷中動脈是一云一寸半足

厥陰之所注診此者可决男子之死生或診太谿命門外元在

足内踝後跟骨上動脈陷中

驚風方論

驚者虛揚怔忡氣怯神散痰涎來去其瀉必青漸生風而未至

風也驚馬邪入心則面紅臉赤惕惕夜啼驚邪入肝則面目俱青

眼睛窳視驚邪入腎則面黑惡叫齒疔咬牙驚邪入肺則面色

淡白喘息氣乏驚邪入脾則嘔吐不食虛汗多睡面色淡黃據

脈觀之虛則散而濡實則數而駛治法鎮驚化痰安神定志亦

須究竟其臟受病之處而調理之然有所謂溫驚有所謂利驚

有所謂涼驚驚虛者溫之實者利之執者涼之是為活法 睡中驚馬

帝声浮者易治声沉不響者難痊

驚風證治

全蝎散 治小兒驚風不語通竅豁痰大人通用

全蝎柴枝各用紫蘇葉包塗蜜炙重包又塗蜜炙

右細末每服壹字薑汁入蜜搜和含化

卷之四

治小兒驚風痰涎

驚風

卷之四

十一

天麻 赤伏苓各半 羌活 防風各二
人參 全蝎 朱砂研 明硫黃

右硫黃水銀同研如泥次以柴味末夾和煉蜜九皂子大每
壹粒薄荷湯調下

來復丹方見暑門治小兒驚風昏塞以貳叁九薄荷泡湯研灌
下得泄即愈凡驚風對證用藥已效若覺未甚蘇省可與來復
丹九數酌量用

星香散治小兒急慢風搐搦窺視涎潮
南星圓白者 木香 橘紅各半 全蝎一枚

本事人參散治慢脾風神昏痰盛
右判細入姜錢四片慢煎熟灌下大便出涎即愈

人參半兩 圓白大南星一兩切片以生薑汁并藥
右末每壹錢水壹盞姜叁片各半 細少許同煎取半盞

作兩三次灌下

至寶圓治小兒驚風痰熱

螺青半兩 京墨四 巴豆去油 比五靈脂二
輕粉 腦各半 史君子十四個連殼煨取肉
麝一字 飛白麵三

右末并水搜圓桐子大每一丸水研下

驅癩散治諸癩口眼相引上視涎流手足抽掣頭項反張腰背
強直

朱砂研 雄黃研 蛇皮炙黃 石膏煨通紅出火
蜂房炒 遠志取肉薑 細辛革陰者 麻黃去節
直僵蚕炒 川大黃生 川芎 獨活各一分半

右末每一錢鈞藤入少蜜煎湯溫和調灌大兒增用

又方 雄黃 朱砂等分

右末每一錢猪心血夾蒸水調下

雌黃散 治顛癇方發瘰癧嚼舌眼暗聲惡

雌黃 黃丹微炒 麝各一兩 麝一分

右細末用酒半升撥熬成膏即入上項藥築和杵三伍

伯下丸如麻子大每三四丸溫熱水下日三服

消驚圓 治諸驚

人參 天麻 伏苓 朱砂

全蝎焙 直僵蚕炒 羚羊角 犀角各一分

牛膽酸南星四分 麝少許

右為末煉蜜丸桐子大每服一圓昌蒲煎湯調下

壓驚圓 治諸驚虛惕定心鎮痰所謂重可去怯之劑

紫石英 代赭石 蛇黃各燒紅 鐵粉篩過淨者

朱砂 龍齒 白附焙 遠志肉姜汁浸炒

右為末研極細稀麪糊丸桐子大每服一九金銀煎湯調下

凡煨石藥以裂為度不拘遍次研十分細

安驚圓 治諸驚風癇或大聲異物驚忤打墜不省人事並主之

遠志肉薑汁浸焙 淨鐵粉 朱砂 人參

伏神各半兩 全蝎二十一个 南星中者一个薑汁

白附子畧炮二分半 花蛇頭酒浸焙 麝半分

右為末煉蜜圓桐子大每服一圓昌蒲燈心煎湯調下建陽

劉宗議方

參砂膏 通心氣除隔熱去痰壅

朱砂 人參 南星炮 伏神

遠志肉薑汁浸焙 天麻 白附子 僵蚕炒等分

鵬砂半倍 麝少許

右為末煉蜜為膏桐子大金箔衣每一圓麥門冬湯調下

定心圓 溫驚用此

伏神 白附子炮 南星炮 人參

惠各付小兒卷一

廿

遠志肉姜製 蝎梢各一 直僵蚕十四 乳香三字
右為末 牛膽汁圓 桐子大每一圓 金銀煎湯調下

附方

琥珀抱龍圓 抱龍之義抱者保也龍者肝也肝應東方青龍木
木生火所謂生我者父母也肝為母心為子母安則子安况心
藏神肝藏魂神魂既定驚後何生故曰抱龍圓 理小兒諸驚四
時感冒風寒濕痰邪熱致煩燥不寧痰嗽氣急及瘡疹欲出發
搐並宜可投其藥性溫平不帶不燥常服祛風化痰鎮心解熱
和脾胃益精神

真琥珀 天竺黃 檀香細剉 人參去芦
白茯苓各一 粉草去節 枳殼去穢 枳實去穢
硃砂水飛過五兩先以 山藥去黑皮 金箔百片去護
南星兩半 藤經一兩 金箔兩同 乳鉢內極

和同煎藥末用

右前十二味除硃砂金箔不入碾內餘十味檀香不過火外
九味或曬或焙同研為末仍和勻硃砂金箔每一兩重取新
汲井水一兩重入乳鉢內畧杵勻隨手杵此樣○大粒陳乾
晴雲曩曠日色燥甚則拆裂宜頻放當風處取其自乾治法
並用湯無時化服或湯下暑天迷悶下痘瘡見
形有驚湯下心悸不安湯下暑天迷悶湯下
水下百日內嬰孩每凡作三次投二歲以上者止一丸或二
丸其品劑脩合之時但缺一味不依制度必無效矣常用瓦
瓶入湯同收母使被世氣味入湯末一兩合和名金珠
傳秘方嘗自精製出贖人多信用取者甚眾今推誠刊行願
與天下共之非敢自矜特以全嬰為念耳此方出活幼心書
屢用神効故附於此

驚風

直僵蚕十四

廿一

驚馬熱

驚馬執方論

驚執者內蘊實執鬱勃發驚甚則搐掣變而癇耳治法疏導其氣利驚定心亦有麥蒸微驚以其執盛得之但與輕藥或不治亦自愈

驚馬執證治

犀角湯 治心驚執盛

犀角

防風

木通

赤茯苓

桑白皮炒

甘草炙等分

右剉細每三字水煎服

銀棗湯 治驚執潮熱

麥門冬

地骨皮

遠志肉桂

人參

茯苓

防風

甘草焙

大黃濕紙裹

右為末每半錢煎服

清心丸 治驚執煩燥

人參

伏神

防風

朱砂

柴胡各二分 金箔三十片

右為末煉蜜丸桐子大每服一丸竹瀝調下

伏神丸 治壯執發驚痰壅直視

南星

胡黃連

天麻

伏神各三分

青黛

牙硝

朱砂各二分 麝一字

右為末粟米糊丸桐子大每服一丸石菖蒲煎湯調下

膽星丸 鎮心壓驚利痰解熱

牛膽南星研朱砂

防風各二分 麝一字

右用臘月黃半膽汁和南星末作餅子掛當風處四十九日和下項藥末研細浸牛膽皮湯為丸如桐子大每服一丸并

花水調下

驚馬執

卷之十寸卷之八

廿二

羚羊角湯治諸驚壯熱

羚羊角

蟬殼半分

伏神去心

麥門冬

柴胡

地骨皮各一分

黃芩

甘草炒半分

右判散每一錢姜棗煎服

附方

祛風羌活散敗風邪止驚搐退肌熱

羌活

粉草

天麻生

茯苓

川芎各二分

荆芥穗

白殘蚕炒

白朮

白附子炮各一分

桔梗二分

防風一分

全蝎去皮半分

硃砂五分

天南星炮一分

右為細末薄荷湯下



胎驚馬

胎驚方論

胎驚風以胎婦調適乖常飲酒嗜慾忿怒驚撲母有所觸胎必感之或外挾風邪有傷於胎故子乘母氣生下即病也其候月內溫壯翻眼握拳禁口咬牙身腰強直涎潮嘔吐搐掣驚啼體縮顛開或頰赤或面青眼合胎風眼合不可誤作慢脾疾用溫藥其有着唇撮口之類亦此一種之所發也視其眉間氣色紅赤鮮碧者可治若黯黑青黑者不治虎口指紋曲入裏者可治紋反出外者不治上法解散風邪利驚化涎調氣貼顛其則以

朱銀花利之

胎驚證治

大散治胎驚

天漿子法煨

南星

白附子各一分

天麻

防風

茯苓各二分

全蝎

朱砂各一分

麝少許

右為末每服半錢乳汁化下

胎驚方論

十二

參竭散 治胎驚定心神

天漿子

天竺黃

人參

朱砂

全蝎

天麻

蟬殼 半分

麝 少許

右為末煉蜜丸桐子大每服一丸金銀湯下

猪乳膏 治胎驚最妙

琥珀

防風 分

朱砂 半分

右為末猪乳調一字拭入口中

全蝎散 治諸驚胎癩

全蝎 一个焙

琥珀

朱砂 各少許

右為末每服一字麥門冬煎湯調下

朱麝散 治胎風心執痰壅

人參

朱砂 各一分

牛膽南星

天竺黃

牙硝

鐵粉 各半分

麝 少許

右為末每服一字生姜薄荷湯調下

獨活湯 治胎驚發散風邪

羌活

獨活 各一分

檳榔

天麻

麻黃

去節

甘草 各半分

右剉散每服半錢水煎服於內加南星末蜜調可貼額用

朱銀花

治胎風壯熱痰盛翻眼口噤取下胎中蘊受之毒亦治

驚積但量用之

水銀

一分蒸裏肉研如泥

白附子 一分

蝎 一分

南星

朱砂 一分

天漿子

牛黃

芦荟

各半分

鉛霜 半分和腦

一字

麝 半分

直羌蚕

炒七個

右為末粟米糊丸芥子大每一丸薄荷湯下如未通利加至

二丸

千金龍膽湯

治胎驚月內氣盛發執凡臍風撮口壯熱皆可用

龍膽草

釣藤

柴胡

黃芩

北梗
 蟻娘翅足多 赤芍藥 茯苓 甘草各半
 右為末每服一錢此藥前服或加防風 以道心熱黃

附方 治嬰孩小兒解散胎熱化痰涎鎮胎驚

人參去芦 天麻 茯苓去皮 白附子炮
 牛膽南星炒各 珠砂水飛 麝香一字 甘草炙 青黛水
 右為極細末煉蜜丸桐子大用釣藤皂莢子煎湯研化服

胎驚詞

胎驚搖獨口喎斜 筋骨拘拳臉似花 口垂涎沫哭声短
 手足相牽膽受邪 唇青齒齧多緊急 腹臍腫起似垂爪
 腹上額頭青脉見 逐涎安鯁命須除 面腫鵝声蛇眼視

名方謾說幾千車

定驚

通關定驚方論

諸風搖擗關竅不通皆由痰塞中脘留滯百節所致痰之所為
 朝塞者氣實使之治風痰雖不出南星 數輩亦
 須先用蘇合香丸 入宋砂 少許以姜汁侵薄荷湯調和與之蓋
 使氣下則痰下上則關竅自通

通關定驚證治

開關散

赤蜈蚣一條 直捷蚕 南星炮
 麝香一字 猪牙皂二錢 各半
 右為末以手點姜汁離藥少許擦牙或用物引滴入藥兩三
 點涎出自開

定驚

開牙散

華陰細辛

南星

朴消各一分

麝半分

蝎消五條

右為末以少許用烏梅肉搗和擦牙兼用細辛皂角荆芥末吹入鼻中

定驚散

半夏生一分

皂角半分

右為末用一豆許用管子吹入鼻立醒

開眼聖散

赤蜈蚣一條中分為兩片各用葱汁浸一宿全蝎一個亦中分為兩片各記左右以二味記左右作兩處

右各為末左眼翻左手搖以左藥末搖以左鼻孔右眼翻右手搖以右藥末搖入右鼻孔及眼翻双手搖兼用之

截風定搐治法

人參羌活散

方見瘡疹門

散風邪除風熱初作急風每服三字

輕者蘇薄荷湯調下搖制等緊急者前湯調下或

犀散加制木風亦可常用免得遽施

截風丸

大麻

直倭蚕沙

南星炮

麝少許

赤蜈蚣大者一條酒浸炙

白附子炮

防風

朱砂

全蝎焙各一分

右為末煉蜜丸桐子大每服一丸薄荷湯下

字散

全蝎是色者

赤蜈蚣一條並新瓦焙

朱砂半分

腦

麝少許

右為末每服一字薄荷湯調下先以此少用管子吹入鼻中

自然通竅

陽明散

朱砂

芦荟

白附子生各一分麝少許

定驚

治驚風搐痰熱

廿二

輕粉 一字
胡黃連 二分
蝎尾 十四个
直接蚕 十个

赤蜈蚣 一條
金箔 十片
右為末每服一字薄荷荆芥泡湯調下如口不開先吹入鼻中

白附 倭蚕 全蝎 各焙
川姜黃

赤蜈蚣 一個去足酒研生用
麻黃 去節 羌活 各一分
牙消 半条

定痛散 治急風定搐
右為末每服一字薄荷湯調下

赤蜈蚣 一條酒浸炙
麻黃 去節 南星 炮

白附子 直倭蚕 炒 羌活
代赭石 煨醋率
蝎梢 川姜黃 各一分 麝 半分 朱砂 一分

寫青龍 治鼠視發搐痰熱
右為末每服一字荆芥紫蘇煎湯調下如搐不止加烏梅

龍膽草 焙 梔子仁 大黃 溫紙煨 羌活
防風 各一分 川芎 一分半

木通散 能瀉肝風降心火最利驚挑
右為末煉蜜丸桐子大每服一九煎首葉泡薄荷湯調下

山梔 二分 大黃 溫紙煨 羌活
木通 赤茯苓 甘草 各一分

清血散 凡驚挑出於心肺須從小便利之
右為末每服一字紫蘇煎湯調下

桑白皮 炒 葶藶 炒 赤茯苓 車前子
梔子仁 等分 甘草 炙成半

白膠散 治風熱延潮喘促搐擊鼠視
右為末每服半錢姜棗煎服

透明阿膠 炒二分半 紫蘇 一分

右為末每服一錢入烏梅肉少許同煎灌下神效熱出於肺

定驚

烏梅肉

十一

枳則生風回膠清肺行小便故也肺風用之尤妙

治驚輕下法

定命丹

治急驚天吊撮口通利痰熱

全竭 七个

天麻

南星 炮

白附 各二分半

朱砂

青黛 各一分

麝 各半

腦 一字

右為末粟米糊丸豕豆大每服一九荆芥薄荷湯調下先研半丸吹入鼻中

利驚丸

利驚下痰消熱

龍膽草

防風

青黛

芦荟

南星 炮

釣藤 各二分

牙硝

鐵粉 各一分

腦

麝 少許

防風湯

治風熱痰壅大便不通

羌活

防風

枳實 各半兩

川芎

甘草 炒

大黃 溫經 各二分半

右剉末每服三字姜棗煎服

宣風散

疎導風熱

雞心楨榔仁甘草

橘紅 各半兩

牽牛 二兩半生用半炒

右為末每服半錢蜜湯調下

枳殼散

小兒虛中壅實以此導之

小柴胡湯

加枳殼防風最能利風熱解血熱免得用銀粉巴硝

治驚稍重下法

揭風湯

利下痰熱

青黛

蘆薈

全竭 各一分

南星 半兩為末水調

全蝎 煨令

朱砂 一分半

牙硝

輕粉 各三字

右為末每服一字煎金銀薄荷湯調下

朱砂膏

治驚風痰盛

定命丹

利驚丸

防風湯

宣風散

朱砂

半分

馬牙硝

二分

川靈脂

一分

薑膏 各一分半

右研細

豆厚膏 為圓象豆大金箔衣每服一圓薄荷湯調下

陳風散 治驚風痰熱俱盛

梅柳

陳皮 各二分

牽牛

大黃 各三分

右為末每服半錢生蜜調下

小柴胡湯

最利執實 方見發在門

加天南星少許

治驚重下法

青人齒 治風痰壅盛驚重下法

巴霜

如霜者 一字

青黛

南星 炮

輕粉

半分

滑石 二分

全蝎 一分

右為末稀麩糊圓麻子大每服一圓薄荷湯點茶送下

天麻圓

利驚下痰九鈞腸鎖肚撮口可通用

南星

炮二分

白甘字

炮

天麻

川靈脂

全蝎

各一分

輕粉 半分

右為末稀麩糊丸麻子大每服一九薄荷湯送下

言公散 治驚風痰盛發搐

全蝎

五个

巴霜 一字

輕粉 半分

南星

炮

朱砂 各一分

川鬱金 一分

腦

麝 各一字

右為末每服一字煎金銀薄荷湯調下

牛黃

治熱盛延潮

馬牙硝

寒水石

硬石膏

甘草 各半兩

牛膽南星

二分半

紫石英

一分

腦

麝 各半分

右為末甘草膏為丸菘豆大每服一九橘皮湯調下

青金

疎風利痰

芦荟

牙硝

青黛

各一分

定驚

史君子 三个

廿七

南鵬砂

輕粉 半斤

蝎梢

十四个

右為末用香墨水丸麻子大每服一九薄荷泡湯下

王監京墨丸 治痰執驚積

青黛

史君子

焙熟 芦荈

牛膽南星

川墨

各二分 膩粉

麝 半斤

腦 一字

右為末飛白麪糊丸桐子大每服一九薄荷湯調下楚州王監賣此藥著名大利痰執驚積疳積

和胃助氣治法

生氣散 諸風疏利後以此調氣

丁香 三字

白木

青皮 各二分

甘草 微炙

木香

人參 一分

右為末每服半錢沸湯點服或用和劑方調氣散亦得

銀白散 助胃祛風嘔吐作慢驚者通用

石蓮肉

白扁豆 制

伏苓 各一分 人參

天麻

白附 炮

全蝎 炒

木香

甘草 炒

霍香 半分

陳米 炒香 三分

右為末每服一錢姜錢一片入冬瓜子仁七粒同煎或用陳

米飲調下

伏苓一陳湯 和胃助氣加蓮子肉石昌蒲用姜東煎

異功散 溫中正氣吐瀉不食用此

人參

伏苓

白木

甘草 炒

橘紅

木香 各等分

右為末每服三字姜東煎服

天麻蘇合香丸 天麻防風丸蘇合香丸等分姜東煎湯調下

伏苓白木散 用酸棗仁石昌蒲煎湯調下

和中散 和胃氣止吐瀉

伏苓

石蓮肉 各一分

霍香

人參

天麻

白扁豆 制

木香

白木

定驚

定驚

四

甘草 炒各半分

右劉散每服三字前服

醒脾散

二方并

王氏

散

見初傳慢驚明皆和胃助氣

定志寧神治法

定志丸

驚風已退神志未定以此調之

琥珀

伏神

遠志 姜制焙

人參

白附子 炮

天麻

天門冬

酸棗仁

甘草 炙等分

右為末煉蜜丸皂子大

朱砂

為衣每服一九灯心薄荷湯調下

溫膽湯

治驚悸煩痰

半夏 制

枳實 各二

茯苓 半刀

橘紅

甘草 各半

酸棗仁 溫湯浸去

右劉散每服一錢入

朱砂

少許用姜棗煎服

定志丸

治驚悸煩燥

北參

遠志 姜制焙

伏神

天麻

犀角 各一分

朱砂 一分

麝 一字

百枝膏

安心寧神

右為末煉蜜丸皂子大金箔衣每服一九薄荷湯調下

人參

防風

天麻

伏神 各稱一

白附子

酸棗仁

琥珀

石昌蒲 絡一

麝 少許

右為末煉蜜丸皂子大麥門冬湯調下一圓

附方

秘傳經

治小兒一切驚風

熱甚發燥或因痘疹初出

傷寒發熱

跌撲而發驚風牙關緊急目竄上視並皆治之

南星

製法每兩切片用白附子粘蓉姜黃各三分

蟬退

去頭足

孩兒茶

礞石 金心者

薄荷

防風 祛

全蝎

去足尾用酒煎湯

真各付下已矣

四一

僵蚕洗去絲已去頭此妙 雄黃明者 硃砂

胡黃連 姜黃 薤活 天麻三上各

天竺黃二子 甘草直者 石膏 滑石各

牛黃直者 珍珠用豆腐 琥珀各 冰片

麝香各八分

右將硃砂牛黃 六味另研為極細末餘

藥亦研為細末和勻用占米糊為丸○大用一兩研極

細末為依丹用金箔二帖為外衣每服一圓薄荷燈心湯下

附驚風握拳圖



附驚風搖握拳

夫驚搖握拳者有陰陽兩證陰者拇指在內陽者拇指在外陽拳者順陰拳者逆又曰男子握拳於外為順於內為逆女子握拳於內為順於外為逆又指者惡候也

附急驚馬握拳詞

急驚欲發先握拳 蓋因胃中有毒涎 陰錯陽差為逆顛

男左女右搖頭汗 目白唇白應少睡 口啞舌卷更驚眠

又

纔發驚風看握拳 指分內外細須言握指在內外 內陰陽外斯為順

女右左男令搖先 太極閃涎衝入肺喘急 入心之內不能安

更將形證重重看 用藥開閉双眼前 速與凉心為治療

解驚調氣用湯圓 搖忌手心汗如水 此命端的屬九泉

其言內也
 治慢驚方傳慢驚馬
 治慢驚尚方陽證
 白附子
 直僵蚕
 牛膽南星
 防風
 朱砂
 天麻
 白附子
 麝香

新刊仁齋直指小兒附遺方論卷之一

慢驚

方傳慢驚馬證治

治慢驚尚方陽證

全蝎精首拾

白附子王

直僵蚕

牛膽南星

蟬殼

玃珀各二斤

麝半斤

防風

朱砂七

左為末栗米糊圓如桐子金薄衣每服一圓薄荷湯下

玃珀

天麻

南星

白附子

防風

麝香少許

烏蛇肉酒漫焙

朱砂半斤

右為末煉蜜圓桐子大每服三圓昌蒲湯調下

治方傳慢驚

受方

受方

全蝎七箇去尾 蝉殼二十箇 甘草二斤半 大天南星一箇

神保既靈丹

分陰陽平冷熱定吐瀉豁痰涎

硫黃 硃砂 五靈脂 青皮 陳皮 半夏麴炒等分

右硫硝夾研用磁器鑿汁傾出候冷再研細旋入諸藥末拌和粟米糊圓麻子大每服三圓食前米飲下

天復丹

升降陰陽疎風利痰方見血氣類

王氏惺惺散

治吐瀉脾困內虛

人三 伏苓 木香焙 天麻

白扁豆製 陳米炒 全蝎焙

右等分爲末每服半錢薑棗各煎服

醒脾散

治吐瀉脾困不食

人參 白伏苓 石菖蒲細切 木香

石蓮肉 白木各一分

右爲末每服參字薑棗煎服有熱者去木香

大醒脾散

南星 白伏苓 橘紅各一分 全蝎焙

北草炒 白附子炮 石蓮子 人參

木香各半分 陳倉米二百粒

右爲末每服參字薑棗煎服 醒脾兩方通用亦可酸乳

小兒胃虛不消乳食尤須節細

溫白圓

驅風豁痰 防風 白附子生 直僵蚕

人參 全蝎各德並 南星七次 天麻各二小

右爲末飛白麩糊圓桐子大每服一圓薑湯調下

已傳侵驚證治

星香全疇散

治慢驚風昏迷痰搐

南星溫 木香

全蝎炙 三箇 甘草炙 半分

人參

橘紅各一分

右劉細每服一錢入紫蘇薑棗濃煎旋以匙送下有執加

定命散

治慢驚吐瀉困重欲傳慢脾通用

圓白半夏生 伏苓

木香

老生薑切 一分

右為末每服半錢薑棗煎湯調下

四聖散

治慢驚痰滯虛熱若有鼠視搖擗證狀以少許用管吹

入單中

全蝎七箇

直僵蚕醋 四

大南星牝

真川烏並 半分

右將南星為末水調作餅裹四 湯溫 外用濕紙重包放火

灰中煨令赤色頓地上一伏時為末每服一字煎金銀湯點好茶清小許調下

烏蝎四君子湯

加川烏生

全蝎焙

為末各

半錢姜棗煎服如再服即去川烏

南星散

驅風豁痰

南星重 八分 九分 以上者用一箇就地上作小坑

用炭五斤 燒通紅以好米醋半盞 酒入坑中即燒

盆蓋其上伏時 取出洗淨 切焙

右為木入琥珀

全蝎末 各壹錢每服半錢煎生薑防風湯調下

烏沉湯

慢驚驅風助胃

天麻二錢 人參

真川烏生

全蝎焙

南星炮 木香

沉香各乙 半

甘草炒 半分

右劉散每服叁字姜三片慢火煎取其半與之

元香散

生胃氣止吐瀉

伏苓二錢

沉香

丁香

木香

藿香

川厚朴製

甘草炙 乙半

右為末每服一字米飲調下

慢驚下痰証治

天南星丸

治慢驚痰壅惟身熱者可服

南星

一斤每重一兩上下者用溫湯浸先刮去裏外浮皮并虛軟處令淨用法酒浸一宿用桑七蒸不住添熱湯取出用銅刀子切開一箇大者當少許不腐舌為

麝香研

丁香各乙兩龍腦研

辰砂別研木飛式兩

右為細末入研藥勻煉蜜并酒圓朱砂為衣每服一豆許生

蘇合香丸

一倍方見血氣類

白丸子

二倍方見痰飲類夾和每

服半錢姜湯調下

神保既濟丹

治慢驚痰盛見方傳慢驚門

礞石散

最能利痰急慢脾風通用

青礞石

揚碎兩焰消半兩同礞石入甘窩內用炭火煨令通紅候冷

右為末蜜糕薄糊圓綠豆大每服二丸急風瀉可剉水泡湯

調下慢風慢脾風用茵陳煎湯調下

雖能利痰然其性非胃家所好須以木香佐之

靈脂丸

治慢驚痰盛搐搦

五靈脂

醋潤白附子 罌炮 木香

直僵蚕各一分

全蝎

焙半分 朱砂一分

大南星 溫紙炮半兩

右為末米醋煮生半夏糊為圓麻子大每服二丸姜湯送下

七珍丸

治諸風頑痰壅盛大小通用

細辛

川靈脂

直僵蚕各一分半

白附子

一分 朱砂半分

全蝎 四箇焙

右為末用大南星生為末煮糊丸麻子大每服伍丸姜湯送下

慢脾風生胃回陽治法

皇附湯

治慢脾風盛四肢厥冷

附子

炮去皮 木香 乙多半

白附子 乙分 甘草 炙半多

右剉散每服三字姜伍片煎取其半以匙送下若手足煖而

蘇省即止後劑

川烏散 驅風回陽

真川烏乙生 全蝎

木香各半分

右為末每服三字薑四片煎取其半旋滴入口中嘔吐者加

丁香

金液丹 方見血氣類

白附子 等分祛風回陽二藥為末每服半

錢陳米飲調下

生附四君子湯 助胃回陽 **四君子湯** 加 **生附子** 末四分之一厥

逆者對加每服半錢菱五片慢火熟煎以匙送下

蝎附散 回陽氣豁風痰

全蝎七箇

附子炮二多 南星 炮

白附子炮

木香各乙系

右為末每服半錢菱四片慢火熟煎旋正

陰開散 祛風豁痰回陽正

白附子

黑附子

南星

半夏

並生 各一、八、九、半

右為末井水浸七日逐日換水浸訖控乾次入 **全蝎末** 二錢

每服一字生薑湯調下

靈砂 正胃回陽能止嘔吐溫利痰涎但瀉者勿用為細末以少

許米飲調下或用糕糊丸如粟米大兒兩三九米飲灌

震靈丹 方見血氣類治慢脾風吐瀉不止每服一九研細 **參**

南木香 煎湯乘熱調下 ○已上諸藥溫熱並乳食前服

附方

書四聖散 治嬰孩小兒急慢驚風

防風去毒 義

人參去芦

白木麩炒

遠志去心酒

茯苓去皮

茯神去皮

川芎

僵蠶去鬚

白芷

蓮肉不去

甘草炙各二

藿香葉一分

天麻煨

白附蜜湯煮

桔梗去芦

天南星去藤皮

羌活去芦

琥珀各半

鈎藤五系

全蝎去毒

辰砂水飛 蟬蛻去頭足二 麝香角

金箔二十 山藥三

右為極細末煉白蜜印錠用薄荷煎湯研化不物時候服之

鎮心錠 治嬰孩小兒急慢驚風

人參去芦 赤茯苓皮 甘草炙 山藥各五

辰砂水飛 桔梗各二 乳香半 麝香一分

急慢脾風

慢脾風下痰証治

神保既濟丹 見方傳慢驚門

白僵蚕丸 方傳慢脾陽氣未甚脫者可用亦能截風

牛膽釀南星二 五靈脂焙各一 直僵蚕炒 錢子地龍乾

右為末水煮生半夏糊丸麻子大每服伍丸姜湯下

辰砂膏 治慢脾冷痰壅滯手足冷而微搐

黑附子一枚入子重者六皮隨頂上刻一孔入辰砂末一

南星炮半兩 白附子炮 川五靈脂 蝎梢各一分

右為末煉蜜丸桐子大每服一丸生姜汁泡湯調下

七五砂丹 利痰奇效慢驚慢脾通用須以木香佐之開元通

玉錢 背後上下有兩月片者其色淡黑頗小諸錢以一箇放鐵

匙頭於炭火內燒少頃四圍上下各出黃白珠子將出候冷傾

入盞中只作一服南木香煎湯送下 人參煎湯亦得

急慢脾風証治

星酥散 治諸風口噤不語

天南星略炮 剉散每服三字菱四片紫蘇伍葉煎取其半却

入雄猪膽汁少許溫服九不語者大小便須要調導治慢

風不語只用南星更以人參石昌蒲為佐

木通湯 治諸風失音

木通

石昌蒲

防風

北梗

桑螵蛸

全蝎焙

直僵蚕

甘草各炒並用一分

南星零炮半兩

右剉散每服三字紫蘇三葉姜三片煎熟與之大便不通更

加厚散香

神聖丸 治驚風痰盛搐搦口眼牽引

烏蛇肉浸炙

直僵蚕炒

防風

天麻

南星牛膽製

五靈脂

代赭石煨

各一分

全蝎焙

朱砂各一各

右為末粟米糊丸桐子大每服一九急驚劇湯調下慢驚

用生姜湯

虎睛丸 治急驚上視搐搦胎風延期

虎睛一對

全蝎炒

天麻

防風

南星零

直僵蚕炒

烏蛇肉各一分

麝香一錢

右為末麪糊圓桐子大每服一圓薄荷湯調下

南星 治驚風痰熱

天南星不去皮切片

生姜切片

右用竹箒一條以南星并麥相間插定次用輕此子於

南星 片間風乾為末每服一字薄荷紫蘇泡湯調下大

人服半錢或吐或汗或下即病氣出也

鎮心丸 急驚化痰鎮心

朱砂

龍齒

牛黃各一各

鐵粉

琥珀

人參

伏神

防風各二錢

全蝎七個焙

右為末煉蜜丸桐子每服一九薄荷湯調下如無牛黃以

牛膽南星 代之

木香湯 治慢風慢脾得效

木香

七

南星温紙煨 白附子煨

天麻

木香

橘皮

白伏苓

石蓮肉絡一

黄耆

白木

石昌蒲

甘草炙各半分

右為麤末每服半錢姜棗煎服

乳鹿膠 治驚風掣手癱反折

赤蜈蚣全者一條去

花蛇肉酒浸

直僵蚕生

南星炮三錢

朱砂

蝎梢各一

乳香半

麝一字

右為末飛白麩糊圓桐子大每一丸金銀煎湯泡薄荷調下

○莆陽趙公施此多所全活

太一萬金丹 治驚風痰熱

代赭石煨醋

全蝎焙

朱砂

琥珀各一錢

南星温紙煨

白附子生

防風

烏蛇肉酒浸炙

天麻各一

右為末粟米糊圓桐子大每服壹圓急驚薄荷湯調下初傳

慢驚尚有陽證用**人參**湯

昏餅子 治慢驚初傳延潮昏搖

全蝎合四個

麻黃薑汁浸

薑汁又炙凡參

花蛇肉

烏蛇肉並酒

直僵蚕各

白附子焙

人參

天麻

防風各壹錢

乳香半錢

麝壹字

右為末用**南星末**煮糊圓桐子大捏作餅日乾每服壹餅薄

薑湯調下

至聖保命丹 治驚風搐掣胎驚馬夜啼

青色全蝎拾肆个

蟬殼

防風

天麻

白附子

白附子

直僵蚕炒各貳錢

南星炮參錢

鹿茸半錢

右為末粳米飯圓桐子大朱砂衣每壹圓薄荷湯調下

珠珀散 治慢驚身熱痰滯

寸道一、二、三

大乾蟾

壹个酥塗坐炙黃

直僵蚕

蟬殼

蝎尾

各焙

白附子

微炮

五靈脂

琥珀

各壹分

朱砂

麝香

右為末每服半錢防風煎湯調下

快脾湯

治慢驚脾因不食和胃祛風

大南星

壹兩判如藜子塊用薑汁洗去毒

兩切薑汁壹兩判

白伏苓

半兩

木香

人參

天麻

各貳錢半

全蝎

柒个焙

右為末每服半錢甘草生薑煎湯調下

助胃膏

治慢風吐瀉不進乳食

人參

白朮

石蓮肉

各貳錢

丁香

檀香

舶上茴香

白豆蔻

木香

甘草

炙各壹錢

右為末粟米糊圓桐子大每壹圓陳米飲調下脾困不舉

前湯

沉附湯

治慢脾風厥冷吐瀉

沉香

丁香

木香

黑附子

白附子

焙

全蝎

天麻

右為末每半錢炙甘草生薑煎湯調下身溫則表

鎮痰

治諸風頑痰喉風繩痺

北礬

火煨枯

直僵蚕

米醋浸焙

大南星

右為末稀糊圓麻子大每服五圓姜湯送下喉風用

水研開灌下

利痰

治諸風諸癰痰熱

圓白半夏

右為末旋入薑汁略拌鬆吹以香潤

末各壹錢

二錢夾和研

得所圓如麻子大每服四五圓薄荷生薑泡湯送下隨大小增減用

慢驚慢脾危惡證候藥力不到者但看兩脚面中間陷處有
太衝脉即灸百會穴具穴直取前後髮際折中橫取兩耳尖
折中在頭之中心端正旋毛處是也如有雙旋及旋毛不正
者非所捏艾杜約如小麥許但三五壯而止灸後仍與醒脾
之劑

附方

加味大醒脾散治小兒慢脾風內虛昏迷不醒

人參去芦 白附子炮 天麻煨 甘草炙

全蝎炒 石蓮肉去心 茯苓去 木香

白木去 石菖蒲細前 橘紅去 山藥炒

天南星去脐炮 肉苳蔻剉果煨去

確炒去殼一二 丁香半

右咬咀用生姜三片枣一箇去核同前釜煎服回湯加附子
去脐皮尖炮白薑

客忤

客忤方論

客忤者小兒神氣嫩弱外邪客氣獸畜異物暴觸而忤之其候
口吐青黃白沫水穀鮮雜面色交易喘息腹痛及側瘕瘕狀似
驚癇但眼不上穹鼠耳脉來弦急而數視其口中懸癰左右若有
小小腫核即以竹針刺潰之或以爪摘之治法辟邪正氣散驚
定心延久則難為力也

客忤

客忤證治

雄黃一字 乳香半字 麝香一字

右為細末每一字刺雞冠血調灌之

方見咳嗽門用薑湯調灌次用三合水濕掃為圓

客忤

客忤

十

如雞子大以摩兒額上及足心各五六遍次摩臍心及上下良
久壁開自有毛即擲之

射天丸

麝香少許研細乳汁調塗口中仍以母衣覆其身即愈

犀角散 治客忤驚啼壯熱

天麻 犀角 麥門冬 鈞藤

朱砂各一 鐵粉 雄黃 半斤 鹿茸 少許

右為末每服半錢以全銀煎湯調下

安神丸

生犀末 人參 茯苓 菖蒲

朱砂 雄黃等分

右為末研桃仁膏為圓如麻子大每三圓紫蘇湯下

右肝方

竈中黃土和醋搗圓裹于大麻子兒頭以五心

千金龍膽湯

方見胎驚風門

馬尾方

治中馬汗氣臭忤或馬鳴驚忤

馬尾燒煙熏兒面頻熏以瘥為度

驚風雜治

驚風積方論

驚風積者受驚日久而積成之其狀額上有汗喘息煩渴潮熱往
來肚皮有熱睡中竟腹內有物跳動瀉下如白脂豆沙是也治
法量輕重而疎導之仍與調氣和胃取愈大凡小兒腹肚或熱
或脹或硬皆為內實法當疏利

驚風積證治

辰砂膏

疏利驚積方見風禁門

青龍圓

治驚風積有熱

青黛

伏神

蘆薈會

南星 炮 一 子

驚風雜治

八付卷小兒卷三

十一

麝香 少許 輕粉 巴霜 一字 全蝎 三个 焙

右先將巴豆研如泥次入諸藥研令極細圓如粟米大朱砂衣每服一圓薄荷湯送下

朱銀圓 治驚積 方見胎驚風門

天藹方論

天藹壯熱驚悸眼目翻騰手足抽掣或啼或笑喜怒不常甚者瓜甲皆青如崇之狀蓋由乳母酒肉過度煩毒之氣入乳滯復乳兒遂使心肺生熱痰鬱氣滯加之外挾風邪致有此耳治法解利風熱取愈

天藹證治

釣藤飲

釣藤 白茯苓 各半 大黃 濕紙裹煨 二 半 半

防風 朱砂 蟬殼 羌活

獨活 青皮 甘草 各二 半 半

右為末雄猪膽汁為圓菴豆大先將井水調開一圓入量令

保命丹

全蝎 焙 蟬殼 直僵蚕 微炒 天麻

犀角 天漿子 薤子 白附子 南星 炮

青黛 朱砂 川姜黃 各等 麝香 少許

右為末雄猪膽汁為圓菴豆大先將井水調開一圓入量令噴吹以圖煎湯調服

驚風內癆方論 附盤腸氣虫痛

驚風內癆腹痛多啼唇黑囊腫偃僕及張眼內有紅筋班血者是蓋寒氣凝結兼驚風而得之又盤腸氣與虫證亦令腹痛多啼偃僕相若但盤腸氣痛則腰曲乾啼額上有汗是小腸為冷氣所搏然爾虫痛則嘔吐清沫痛有去來是疳化為蛔臟腑留滯然爾內癆用調氣疎風鎮驚之劑盤腸氣用溫和調氣之劑虫證用殺虫之劑條列于後請詳審之

發馬風雜治 付之小兒卷三 十二

驚風內癆證治

乳香圓 治驚風內癆腹痛驚馬啼

乳香 半手

沒藥

沉香 各一手

蝎梢 十四个

雞心檳榔 一手半

右為末煉蜜圓桐子大每服二圓宣痛釣藤煎湯調下

末香圓 治驚風內癆肚痛驚馬啼

沒藥

木香

舶上茴香 炒 釣藤 等分

全蝎

乳香 各半

右先將乳香沒藥別研次入諸藥末和畢取大蘇少許研細

和圓桐子六日乾每二圓釣藤湯下

白豆蔻散 治般腸氣痛

白豆蔻仁

縮砂仁

青皮

陳皮

甘草 炙

香附子

蓬義木 各等分

右為末每服一錢紫蘇煎湯調下

羅蔔子散 治般腸氣痛

羅蔔子炒黃不拘多少

右為末每服半錢陳桂煎湯調下或只入蘇合香圓則用薑

湯調下

化毒圓 治虫痛

蕪荑

川鶴虱

雞心檳榔

乾蝦蟇 炙焦各一分

蘆薈 半分

右為末雞心檳榔為圓麻子大每服五圓陳米飲下或史君

子煎湯送下九虫月首則頭向上凌晨可服藥

安息香圓 治內癆盤腸氣癆虫痛通用

安息香

桃仁 去皮炒

蓬義木 炮

史君子肉 各半兩

阿魏 一兩

茴香 炒

全蝎 各一分

右阿魏并安息香以酒少許就湯瓶口上以多盞盛蒸去沙

旋入桃仁同研次入諸藥末煉蜜圓桐子大每一圓生薑湯

大蘇

寸芒

十三

調下

香散 治小兒臍下氣塊疝痛

芸臺子炒 蓬莪朮 茴香炒 青皮

甘草各一分 辣桂 木香各半分

右為末每服半錢鹽湯調下

宮歸散 治內癆胎寒腹痛嘔啼

宮桂 當歸 川芎 香附各一分

川白薑 木香 甘草炒各半分

右為末每半錢白水煎乳食前服

養臟湯 治內癆腹痛挾冷作痛內癆一名癆腸

當歸 沉香 木香 桂

川芎各半兩 丁香二升

右為末每一錢用薑煎食前服

附方

中風

釣藤

全蝎去毒 天麻煨一分

右咬咀水煎不拘時服

中風

中風方論

小兒中風者以其血氣未定寒溫失調內則盛熱蘊蓄外則腠
理虛開故風邪乘其外虛而暴中之其狀昏不知人壯熱狂燥
搐掣氣逆口禁涎潮是也心中風則偃卧不能傾側發熱失音
其舌焦赤若汗流唇赤者可治灸心俞或唇間白黑青黃乃心
壞為水或面目青時上悚動者並不治肝中風則踞坐不得
低頭左脇疼痛諸筋攣急頭目瞶動上視多怒其目青若遠兩
目連額微青唇青面黃者可治灸肝俞或大段青黑其目一黃

一白者不治腎中風則踞坐面浮腰脊痛引小腹其耳黑若兩
脇左右未有苗色起者可治矣腎俞或脇間如黃土髮蒼黑而
齒黃赤者不治肺中風則偃卧曾涌喘息咳嗽燥悶汗出其鼻
白若目下至鼻四圍及口間白色者可治矣肺俞或色帶苗乃
肺實為血併手尋衣縫者不治脾中風則踞坐腹滿皮肉顫動
四肢不收其唇黃若一身通黃口吐鹹汁者可治矣脾俞或手
足青而厥冷者不治凡人為風邪所中皆從背上五臟俞入之
風入於頰頰之筋則口喎而牙噤風塞於咽喉舌音之門則語
不出而失音風與氣搏氣以痰隔則喉間如軒輪之響是風也
始入於腠膚次達於經絡而搏於筋脈筋得寒則拘急變痛得
熱則緩弛不隨風挾寒邪即攣急也風挾熱氣即緩弛也挾寒
而拘攣脈必浮緊挾熱而緩弛脈必浮洪寒者與小續命湯熱
者與追風膏散之類大抵脈浮者病在表脈實者病在裏脈
促者病在上在表則發散之在裏則疏導之促於上而曾隔遠

泮者湧吐之若虛寒證候則附子不可闕古人治法雖
以灼艾為本亦須消息權度而投劑焉此法自大人方論演觸
而得之若遇大人中風即以此推也雖然風寒暑溫皆能中人
况又有因氣而中者人之繫病莫若中風一時倉卒若未能精
審且先與下氣豁痰蓋諸中皆因痰鬱氣滯而作通關以還急
以南星南星治卒中下氣豁痰五寶木香煎湯和蘇合香圓灌
下牙緊者南星末之入麝香點擦目開進藥之後痰
消氣下病勢稍蘇即子細辨認五臟外證而調理之至若口開
手散噓氣龐大喉間軒輪瞪眼合眼瀉血遺尿或面色如緋或
面色黧慘或汗出如珠如油皆惡候也又一證小兒多因傷風
咳嗽不能發散遂成肺風其候喘促涎潮面色青黃目能認人
口不能言如此者當以桑白皮紫蘇麻黃阿膠主之仍灸肺俞
取愈○大人小兒凡病頭面冷如按瓜或鼻冷不回或汗出髮
潤其身如洗皆不可救

五臟俞穴

心俞二穴在背上第五椎骨下兩傍各一寸半
肝俞二穴在背上第九椎骨下兩傍各一寸半
脾俞二穴在背上第十一椎骨下兩傍各一寸半
肺俞二穴在背上第十四椎骨下兩傍各一寸半
腎俞二穴在背上第十七椎骨下兩傍各一寸半
小兒艾柱如小麥許但三五壯而止取分寸法大人小兒男取左手女取右手比量中指第一節為一寸見千金翼方第一節者指根是也

中風證治

排風湯治中風昏潰或狂語或失音

白鮮皮

白朮

芍藥

官桂去蘆皮

川芎

當歸

杏仁麩微炒

防風

甘草鞞略

麻黃去節

川獨活

白茯苓各七半

右細剉每服一錢薑二片煎

續命湯治中風不省人事涎鳴反張失音厥冷

麻黃去節

人參

黃芩

川芎

芍藥

甘草炒

杏仁去皮炒

防已

官桂去蘆皮

防風七半

附子炮去皮臍

右除附子外並槌為麩末次入二味夾和每一錢薑三片煎食前服

交濟湯治中風肢體緩弱筋上疼痛

續命湯二藥夾和

續命湯用生薑煎服次以烏藥順氣散加全蝎繼之

羅生飲治中風

南星大者湯紙罌

石昌蒲

蒼朮畧炒

甘草炒各半斤

細辛

半夏圓白者

南木香各一斤

蘇合香圓

一粒

右剉散每服一錢薑三片慢火煎取其半調蘇合香圓一粒

灌下痰盛者又加全蝎

羅生飲治中風

羅生飲治中風

南星製合炮 木香 橘皮 各一兩

全蝎 二个 焙 甘草 炒半兩

右剉細每服一錢薑二片慢火煎熟與之虛冷者加**乾附子**

川烏 少許添**薑**

附子散 治中風厥冷

生附子 一分 木香 半分

右剉細每服半錢薑四片煎服

阿膠散 專治小兒肺風喘促涎潮竄眼斜視

透明阿膠剉細炒如珠

右用紫蘇烏梅肉焙乾末之為衣煎**人參**湯送下或以**阿膠**炒為末和**人參****紫蘇****烏梅**同煎亦得**阿膠**育神凡驚風後眼中瞳人不正可以**阿膠**一倍**人參**半倍煎與之

追風毒剉散 治中風內外皆熱

大黃 一分 檳榔 桑白皮 酪烱 薤活 一兩

防風 半兩 郁李仁 一分 炒

右剉散每服一錢黑豆三十粒同煎乳食後服

肥兒疳 治風後瘡不能言

蕪荑 神麩 麥蘖 各炒 黃連 等分

右為末微曬干丸麻子大每服五圓用**陳皮****木香****厚朴**湯送下蓋**黃連**能去心竅惡血故爾

不語 治中風不語 方見急慢脾風諸方明

通幽散 方見急慢馬門

附子

驅風散 治嬰孩小兒卒暴中風全不能言口眼喎斜驚癱搐掣

痰實煩悶神昏有熱睡臥不穩 半夏 姜制 去

防風 去蘆又 天南星 生去 皮 薑 甘草 生

黃芩 炒 各

右咬咀用**生薑**三片同煎不拘時候服

中風

附子小兒卷三

十七

疎風散治嬰孩小兒五臟中風身軀不能自收冒悶不知疼痛口不能言筋脉拘急手足抽掣

防風去毒 犀角 麻黃去節 當歸去尾

川芎 羌活去節 人參去節 遠志去心

茯苓去皮 甘草炙各五分

右咬咀用水煎食前服永除根本不成癘疾

白圓子治嬰孩小兒驚風中風痰盛

白附子炮 天南星去脂 半夏生去毒 天麻煨

全蝎去毒 僵蠶去毒 川烏去皮尖煨

右為極細末生薑炙糊圓如黍米大用生薑煎湯不拘時侯服

痙症

痙症方論 痙音景 痙音翅 字異義同

發在證候先傷於風又感寒濕致之此虛極生熱也極生風之甚者也傷風發熱頭痛汗出又自嘔逆汗之必發痙濕家發汗稍多亦發痙婦人新產血虛汗出傷風發痙無疑矣項背強直腰身反張頭掣喉閉口不語發熱腹痛鎮日不醒其狀可畏病在足太陽經剛痙無汗柔痙有汗其面紅眼赤牙緊手張痰涎壅盛昏潰煩渴小便赤澀先識語而發者此剛痙也其大便滑泄不渴不語先手足冷而發者此柔痙也剛柔二痙亦如陰隔陽上隔陰之類剛痙為之發汗柔痙為之解肌並以水續命湯加減剛痙去附子用麻黃柔痙去麻黃用生附子大便利而厥逆者則以麻黃佐之其間一證身軀壯熱識語口乾手足反微寒大便反滑泄此為剛柔不分之痙可用生附子小續命湯要之得病以來無汗則麻黃按方有汗則麻黃謹勿用也其若痰塞氣盛則筒尾半夏以消其痰枳實陳皮以順其氣痰消則風止氣順則神醒治療之法先與消痰順氣為上嗣

痙症

廿二日

是病勢稍止然後審其熱之輕重而解利之熱輕者與敗毒散熱盛者與小柴胡湯壯熱曾滿口禁咬齒而大便秘結者是熱內實大承氣湯下之又法剛痊麻黃葛根湯柔痊桂枝加葛根湯痊最難痊十救其一過三日不治請早圖之餘見傷寒類書活人總括

瘧瘧證治

小續命湯

方見中風門

防風溫瘧湯消痰順氣疎風

半夏製

枳殼 雙炒

茯苓 各半兩

橘皮

防風 各二錢半

甘草 一錢半

右劉散每服一錢入生薑紫蘇煎服

敗毒散

人參

茯苓

甘草

芍藥

前胡

羌活

獨活

柴胡

北梗

枳殼

右加防風等分為麤末每服一錢薄荷少許煎服

小柴胡湯

治剛痊有熱

柴胡 一兩

黃芩

人參

半夏製

生薑 各三錢半

甘草 炒一錢半

右劉散每服三字入棗煎服

大承氣湯

治剛痊曾滿內實口噤咬齒

大黃

芒硝 各半兩 厚朴 一兩

枳殼 二枚

右劉散每服三字姜三片煎服

麻黃葛根湯

治剛痊無汗

麻黃 去節

赤芍藥 各一兩半 乾葛 兩

葱白 三莖

豉 半合

右劉散每服三字煎服

桂枝湯

治柔痊有汗

桂枝

芍藥

十九

桂枝 芍藥 甘草各六分 大棗四枚

右劉散每服三字煎服

理中湯 治柔痊厥冷自汗

人參 川白姜炮 甘草炒 白朮等分

右劉散每服三字煎服

三生散 治柔痊自汗肢體厥冷

天南星生 川烏生 附子各半兩 木香一分

右劉散每服一錢生姜伍片慢火煎取其半通口與之

附方

至聖散 治嬰孩小兒中風痊病昏悶不醒

全蝎尾去毒二箇 晚蠶炒 天漿子 白附子炮各錢

辰砂水飛一分 麝香一分

右為極細末用**薄荷**煎湯入**酒**二三滴調化不拘時服

附 痊病強直歌

強直及如弓 神昏似中風 涎流唇口動 瘳瘳與癰同

小兒痊痊病停中 氣滯心胸閉不通

乳食有時開口懶 情俄顛顛少舒容

睡臥多驚如搐搦 目睛半瀕似癰風

項擺骨疊剛柔痊 細辨陰陽始見功

發癰

發癰方論

癰者小兒之惡病也小兒血肺不斂氣骨不聚為風邪所傷為驚怪所觸為乳哺失節停滯結癖而得之其候神氣拂鬱瞪眼直視面目牽引口噤涎流腹肚澎緊手足搐掣似死似生或聲或嘿或項背反張或腰脊強直但四躰柔軟發而特醒者為癰若一身強硬終日不醒則為痊痊矣癰曰**癰**病關五臟面赤

發癰

小兒發癰

二十

目瞪吐舌齒心下煩燥氣短息數者曰心癰面青唇青其眼
上竄手足拳攣抽掣反折者曰肝癰面黑而晦振目視人其吐
清沫不動如尸者曰腎癰面如枯骨目白反視驚跳搖動亦吐
涎沫者曰肺癰面色痿黃眼睛直視腹滿自利四肢不收者曰
脾癰此五臟之證然也調理之法惟以**風食**三種陰陽二證
別而治之**風癰**者汗出解脫風邪乘虛其初屈指如計數有熱
生痰是也**驚癰**者震駭懷怖打墜積驚其初驚叫大啼恍惚神
魂是也**食癰**者食時得驚停宿結滯其初吐乳不哺大便酸臭
或結成乳癖先寒後熱是也別之以陰陽則始者身軀有熱由
擊啼叫是為**陽癰**陽病脈浮面色光澤病在六腑肌膚此猶易
愈始者身軀無熱手足清冷不抽掣不啼叫是為**陰癰**陰病脈
沉面色黯晦病在五臟骨髓此最難痊或以仰卧屬陽覆卧屬
陰亦可參驗蓋陽證不可用溫陰證不可用寒**風癰**則先為之
散風**驚癰**則先為之利驚**食癰**則先為之消積續以**定癰**等劑

主之若臟若腑一陰一陽是固不可無別大槩血滯心竅
在心積驚成癰通行心經調平心血順氣豁痰又其要也癰
小兒有熱有痰不欲乳哺眠睡不安常常驚悸此皆發癰之漸
即以**紫驚圓**導之時間量與**紫驚圓**減其盛氣則無驚風癰
之患癰證方萌耳後高骨間必有青紋紛紛如線見之急為瓜
破須令血出啼叫尤得氣通澣濯兒衣不可露天恐為純雖落
羽所汚濼爛其間未有不為癰也 挾邪怪者而色變易不常見
人羞怕 諸癰瘡不能言者蓋咽喉為氣之道路風傷其氣以掩
聲音道路之門抑亦血滯於心心竅不通所致耳**南星**炮為末
准宿**准宿**調和少許啖之輒効若夫**錢氏五癰圓**并**南星散**以
胃清煎湯調下**甘遂宿心湯**以和**蘇合香圓**皆治癰之要藥也
故表而出之

諸癰不治證候
目直無聲 目睛不轉 眼生白障 眼慢唇黑 瞳人瞬動

肩間色青黑 面青拍黑 口中涎沫如白膿 口禁肚脹不乳 喉如鋸聲多睡不乳 身熱下血不食 身體痿軟不醒 腹滿虛鳴 厥逆而痛 吐利不止 汗出壯熱不止 臥久不寐 癰瘰身體反張大人脊下容側手小兒脊下容三指並不治 諸癰僵仆搗掣但扶持之謹勿把捉

風癰證治

散風丹治風癰先用此

黃牛膽貳錢羌活

獨活

防風

天麻

人參

荊芥穗

川芎

細辛各壹錢

右為末煉蜜圓桐子大每服貳圓薄荷紫蘇泡湯調下

保安圓

治諸風癰久遠亦驗

川烏生去皮尖貳錢半

五靈指半兩

右為末猪心血圓如桐子大每壹圓薑汁泡湯調下

獨活湯治風癰解表通裏

獨活

麻黃去節

川芎各一錢

大黃焙

甘草炒各半錢

右剉散每服三字姜二片煎服

細辛大黃湯治風癰內熱

天麻

防風各半兩細辛

大黃焙

川芎各一分甘草炙一錢半

右剉散每服三字入犀角少許煎服

牛黃圓治風癰迷悶抽掣涎潮

牛膽汁和南星末

風乾

全蝎焙

蟬殼各二錢半

防風

白附子生

天麻

直僵蚕炒各一錢半

麝半錢

右為末以煮棗去皮核取肉和水銀半錢研極細次入藥末和圓如菉豆大每服一圓荊芥生姜湯下

驚癇證治

此金膏驚癇先用此

人參

琥珀

白茯苓

遠志肉姜製焙

朱砂

天麻

石昌蒲細節

川芎

南星姜汁浸麝一字

青黛一錢

右為末煉蜜圓桐子大每服一圓金銀煎湯泡薄荷調下

鎖驚丸治一切驚癇

紫石英燒醋研鐵粉

遠志肉姜製伏神

人參

琥珀

滑石

南星炮

蛇黃煨醋一分龍齒

熊膽半分

輕粉三字

右為細末煉蜜圓朱砂衣桐子大每一圓金銀湯調下或用

猪乳調拭入口中

虎睛丸治驚癇邪氣入心

上虎睛細研

遠志姜製焙犀角

天黃湯洗

石昌蒲

麥門冬焙

端娘去足炮三枚

右為末粟米糊圓桐子大每服一圓竹葉煎湯調下或

煎湯下

七寶鎮心圓治驚癇心熱

遠志肉姜製

雄黃

鐵粉

琥珀各二

朱砂一分

金銀箔二十麝少許

右為末棗肉圓桐子大每服一圓去心麥門冬煎湯下

清神湯治驚癇

犀角

遠志肉鹽製

白鮮皮

石昌蒲

半夏製一分伏神半兩

大黃焙

人參甘草

右為末每服三字去心麥門冬煎湯調下

寧神散治驚癇入心不語神效諸驚失音大人通用

寧神散僧為細末

右每服一字米醋湯調下大人用二錢熱酒調下

食癪證治

紫霜損治食癪先用此取積

代赭石煨醋研赤石脂末各巴豆二十粒去皮杏仁五十個去皮

右件合研細湯浸蒸飯圓麻子大每服三圓米飲下

妙聖丹食癪通利

代赭石煨醋研雄黃 蠟梢 朱砂各一分

輕粉 麝各一字 巴豆三個去心杏仁去皮尖微

右為末蒸棗肉圓桐子大每服一圓木香煎湯調下

天麻圓治食癪方見急驚重下門

定癪治法

錢氏五瀉圓

朱砂半兩 水銀一分 鉛三兩鎔開

雄黃二兩 真珠研細

右為末煉蜜圓麻子大每服二圓金銀煎湯下

南星散

方見已傳慢驚門如大便取下惡物急與和胃之劑

猪心湯

治五瀉顛瀉及心風血迷神双

甘遂末壹錢

右用帶性猪心壹箇取參管頭血參條和甘遂末如血多只

隨藥末得中和之將猪心批作兩片將所和藥入在內再合

用線縛定外以濕紙包慢火內煨熟不可過度取出去紙取

甘遂細研次入朱砂末半錢和之分作肆圓每服壹圓以所

煨猪心煎湯調下後別用猪心煎湯重者只守本方輕者加

蘇合香圓壹粒准過半日不動又進壹服如大便已下惡物

即止後劑急與醒脾散以助胃氣

本車雄黃圓

治顛瀉搗製惡聲嚼舌

雌黃 黃丹微炒 麝半錢

右為末拌和用牛乳汁參合熬成膏入藥末杵參百下圓如

麻子大每服貳圓溫熱水下

蛇黃圓治諸癩

蛇黃壹箇醋研碎

鐵粉細研青礞石

右末粳米飯圓桐子大每壹圓人參煎湯調下

斷癩圓治諸癩痰盛

皂角浸取汁慮過酸去皮髓碎水去升

南星熟壹兩蝎梢炒直僵蚕炒

朱砂壹條去頭足酒浸炙白附子略半麝香別研

烏蛇乾炒壹分

右為末用水煮半夏糊和前項皂角膏為圓桐子大每服壹

圓生薑湯調下

當歸大黃湯治諸癩壯熱利下心中惡血

大黃壹兩甘草炙當歸

半夏製川芎各壹錢

赤芍藥各壹錢

右為末每服叁字薑棗煎服

獨白散治驚癩屢效

褐色生蠅壹箇連血細研

右入朱砂末并麝香少許同研薄荷湯調作壹服數年顛癩亦

作效蓋癩疾皆心血虛滯生蠅可以官守其血繼是即以白

陳湯與之若無生蠅當取帶性生蠅代用入于代

散中亦作效

代赭石散陰陽癩通用

代赭石飛過日乾

右每服半錢以金銀煎湯和金銀箔調下連進貳服良久小

兒脚脛上自有赤班即邪氣發出其病隨瘥若無赤班則難

治也

日康丸治顛癩連年不瘥

黑錫

琉黃

水銀研

鐵粉研半兩

金銀箔 各叁拾片

右**水銀** **鐵粉** **金銀箔** 夾和壹處先將**里** 於鉢內鎔開次入

硫黃 不住手就鉢內研攪候**硫黃** 煙氣欲息次入餘藥就火

上同攪少頃時傾出在地壹宿出火毒再研細粳米飯圓麻

子大**朱砂** 衣每服叁圓食後**參** 煎湯下

地龍散 治諸癩發歇無時

乾地龍^兩 虎睛^{壹對} 炙人參^{壹分} 金銀箔^{叁拾片}

天竺黃 朱砂 代赭石^{紙醋} 鐵粉^{各壹分}

雄黃^{壹錢半} 輕粉^{半錢}

右為末每服半錢紫蘇湯調下

定癩 治小兒五癩

赤蜈蚣^{壹個} 酒浸^{去頭足} 蝟梢 白附子^生

烏蛇肉^{酒炙} 大南星^末 圓白半夏^{水用薑汁和}

能膽 白礬^{新瓦} 一煨^枯 各半^分

右為末稀麵糊圓桐子大**朱砂** 衣每服壹圓薄荷泡湯調下

全蝎 五癩圓

赤蜈蚣^足 酒浸^{去頭} 南星^九 熟^半 鹿茸^{壹寸}

全蝎 防風 朱砂^{研細} 遠志^肉 薑汁^{浸炒}

白附子^生 薑^薑 延胡索^銼 壹 金銀箔^{各叁拾片}

右為末入麝香糊圓桐子大每服壹圓**昌蒲** 煎湯調下

金朱丹 定一切癩

赤蜈蚣^頭 酒浸^{去尾} 烏蛇頭^{酒浸} 延胡索^生 各壹

白附子 遠志^{薑汁} 鐵粉 透明^{防風}

全蝎^尾 天麻^{各壹錢} 金銀箔^{拾片} 大南星^{薑浸} 壹宿

右為末以**圓白半夏** 為糊胡入**黃牛膽汁** 并**腦** 麝^{少許} 和圓

桐子大**朱砂** 衣每服貳圓金銀器煎湯泡薄荷調下

千金龍膽湯 治諸癩壯熱方見胎驚風門

星朱散 定癩利痰

癩癩

十六

十六

南星 具紙炮香熟壹兩

朱砂 貳錢

右為末用帶性猪心血為圓桐子大每服壹圓煎防風湯調

猪膽南星散 治癇後瘖不能言

大天南星濕紙煨香

肥兒圓

治小兒心竅有惡血瘖不能言

肥兒圓

方見中風門 蓋肥兒圓內有雷丸能去惡血弱筋

驚喘方

油髮燒灰存性每服壹字米湯調下

論髮際穴

小兒初誕收生者多於頭額前髮際中間灸之蓋取其可以截風路也諸風篤證藥力不及氏昏迷沉絕嘿然無聲於此灼艾每有扶危之功然亦顧其善後之劑何如耳前集所載百會一穴在頂心端正旋毛間亦洛危困者以是哉

論腦麝銀粉已硝等不可輕用

小兒急驚風古人以其內外熱熾風氣暴烈而無所泄故用麝香以通其閉竅銀粉已硝以下其痰熱蓋不得已而用之其實為風熱盛實者設也世俗無兒不權輕重每見發熱發搐輒用腦麝蟾酥鉛霜承銀輕粉已且芒硝等劑視之以為常惟其不當用而輕用或當用而過用之是以急驚轉為慢驚吐瀉胃虛在再昨月驚風之所為難療者正坐此也萬一發熱驚搐本為傷風傷寒傷食瘡巨而作誤藥至此其為害豈淺淺哉以理觀之能用細辛羌活青皮藜蘆之類以為發散勝如腦麝能用獨活柴胡山柰枳殼太極之類以為通利勝如銀粉膏硝設或當用而不可無之亦須酌量勿過可劑此切勿書所謂瀉青圓道赤散乃醫用之上藥者良以是故論此以為輕用藥者勸

論蜈蚣有毒

蜈蚣有毒惟風氣暴烈者可以當之然其風氣暴烈非蜈蚣能

發問

行是見卷三

三

截能擒亦不自止但用之貴乎藥病相當弗容固執或半字或壹字或桐子半圓或桐子壹圓尤在酌量而作劑也設或過焉當以**附方**為解

凡幼兒欲發驚風先神志不定恍惚懼人搭眼上視左顧右盼神手握拳悶鬱聲氣情態不若尋常如此者有驚即散驚有熱即退熱壅實即去壅實熱退則不生痰驚散則不生風壅滯通則氣得其平病無由作是固當以小劑治之若夫患在痰熱全未有風癇搖擗顛引之狀則只與退熱化痰如參蘇飲之類也謹勿妄投通閉利膝等劑惡或透其熱流入經絡反成風痰此又小兒無病不可服藥之戒

世俗玩習以為小兒體熱或遇澡浴即與久坐湯水之中風冷外傷水濕內滲頃刻間遽成風搐或惡叫頻吐或昏迷失音或洞泄不已勢如暴風疾雨難以支吾不可不戒

蜀油散 治小兒風癇解表通裏內熱

獨活

防風去芦

大黃紙裹五分

白芍且用 **生薑** 三片同煎食前服

化風丹 治小兒風癇

天南星煨 膽製

獨活

川芎

甘草去各

右為極細末煉

白蜜 丸如**大膏** 天用**薄荷** 煎湯研化或**蘇**

煎湯食遠服

天麻煨

防風去芦

人參去

羌活去芦

荆芥穗

麻黃去節

細辛去葉

荆芥穗乙

甘草炙

天麻煨

川芎

氣未散復于他邪得之者又有病癖寒熱脇下痛硬或首不能漸與消磨遠以稠巴峻決津液暴傷得之者此非醫家輕棄壞病之過乎痺之為候頭皮光急毛髮焦稀頭縮暈乾口晚辰白兩眼昏爛揉暈擗眉春聾體黃鬪牙咬甲焦渴自汗尿白瀉酸肚脹腸鳴癖結潮熱醋嗜瓜果鹹酸炭米泥土而飲水占飲者皆其候也痺曰五痺病關五臟以臟別之**心痺**即驚痺由乳食不調心臟受熱所致也蓋其血氣未定乳哺有傷易生痺滯內有滯熱未得疏通故心神驚悸而作驚疰之候外證身體壯熱臉赤唇紅口舌生瘡骨膈煩悶小便赤澁五心皆熱盜汗發渴齒齲虛發為夫是之謂**心痺****肝痺**即風痺由乳食不調肝臟受熱所致也若乳母寒暄不調滋味不節或外感風寒內傷喜怒和氣未散遂爾乳兒多成風痺肝者眼之候下膈伏熱痰涎壅滯以致肝風入眼赤腫翳生膠淚爛眩痛瘳揉昏暗雀目甚至經月眼合亦名痺眼外證搖頭揉目白膜遮睛眼青淚多頭焦

髮直筋青腦熱申瘳筋亦躁渴汗多下痢瘳疰夫是之謂**肝痺****腎痺**即急痺由乳食不調臟腑伏熱所致也凡其味入於脾而動虫虫動則侵蝕臟腑遂使孩提心下擾悶若上蝕齒齲則口瘳出血齒色紫黑下蝕腸胃則下痢肛爛溫瘳生瘳瘳治不蚤精髓消耗難以有瘳虫者蠶也目為溫瘳多因痺傷久痢腸胃受溫得之狀如狐惑傷寒齒蝕之證或以走馬為喻初作口氣名腎主虛熱受熱和痺氣直奔上焦故以走馬為喻初作口氣名曰臭息次弟齒黑名曰崩砂盛則斷爛名曰潰槽熱血迸出名曰宣露甚者齒皆脫落名曰腐根其根既腐縱得全活齒不復生外證腦熱肌削手足如水寒熱時來滑泄肚痛口臭乾渴齒斷生瘳瓜黑面黧身多瘳疥夫是之謂**腎痺****肺痺**即氣痺由乳食不調壅熱傷肺所致也肺主平氣鼻乃肺氣所通其氣不和則風溫乘虛客於皮毛入於血脈故暈下兩傍赤瘳瘳溫是為鼻痺其瘳不痛汁所流處隨即成瘳亦名痺瘳外證咳嗽喘逆

痺

付貴小兒卷三

二

壯抗惡寒皮膚粟生鼻痒流涕咽喉不利頤爛唾紅氣脹毛焦
泄利類併夫是之謂肺痺脾痺即食痺由乳食不節脾胃受傷
所致也或乳母恣食生冷肥膩或乳兒過傷或飯後與乳致使
吐乳多眠久則變為乳癖腹脇結塊亦名妳痺外證面黃身黃
肚大脚細吐逆中滿乏力酷啼水穀不消泄下酸臭合面困睡
減食突泥夫是之謂脾痺五臟痺傷大抵然爾析而論之曰五
痺出中曰蛔痺曰春痺曰腦痺曰乾痺曰痺渴曰痺瀉曰痺痢
曰痺腫脹曰痺勞曰無辜痺曰丁奚曰哺露證狀非一可不卒
宏撮要而條析之乎五痺出虫者痺傷之原雖起於乳舖不調
然臟腑停積已久莫不化而為虫其虫或如絲髮或如馬尾多
出於頭項腹背之間黃白或赤者可醫青黑則難療也蛔痺者
失乳飯早食肉太早或腸胃停蓄甜膩化為蛔虫皺眉多啼嘔
吐清沫腹中乍痛肚脹青筋唇口紫黑腸頭齒痒是也蛔雖食
虫虫不可動從口鼻出者難治春痺者虫蝕脊背身熱羸黃積

中生熱頰温下痢拍背如鼓鳴脊骨如鋸齒或十指皆蒼類嗜
瓜甲是也腦痺者胎中素挾風熱生下乳舖越常頭皮光急滿
頭餅瘡腦熱如火髮結如穗遍身多汗頭腫顛高是也臨產多
恣亦然易損兒眼乾痺者瘦悴少血舌乾多啼其病在心自不
轉晴乾啼少淚其病在肝身熱涼乾手足清冷其病在腎声焦
皮燥大便乾結其病在肺搭口寢眠胃腕乾渴其病在脾總為
五乾痺是也痺渴者臟中風有痺氣加之乳母恣食五辛酒麪
炙傳使小兒心肺壅熱日則頰渴引水乳食不進夜則渴止是
尔痺瀉者毛乾唇白額上青紋肚脹腸鳴泄下槽柏是尔總
藥止之痺痢者挾受風寒暑温或冷熱不調或停積宿滯水
穀不聚頓下惡物是尔痺腫脹者虛中有積其毒與氣交并故
令腹肚緊脹由是痺復受温故令頭面脚手虛浮是尔常磨
積調氣痺勞者潮熱往來五心煩熱手足心及胃前熱而奔倉
盜汗骨蒸救喘枯悴是爾或渴而復瀉飲水惡食肚硬如石面

色如銀斷不可活無辜母者腦後項邊有核如彈按之轉動軟而不疼其間有虫如米粉不速破之則虫随熱氣流散淫蝕臟腑以致肢體癱瘓便利膿血壯熱羸瘦頭露骨高是尔針刺破膏藥貼或淋濯兒衣露於簷下為唯鳥落羽所汚兒着此衣虫入皮毛亦致無辜之疾兒衣已曬須微火烘之其若手足極細項小骨高尻削軀瘦腰大脐突號哭胃陷或生殺瘰是為丁奚虛熱來往頭骨分開翻食吐虫煩渴嘔噦是為哺露丁奚哺露皆因脾胃久虛不能化水穀以榮血氣故肌肉消鑠腎氣不足復為風冷所傷使柴骨枯露亦有胎中受毒臟腑少血致之此皆無辜種類之疾病而至此不戕殆哉又有小兒久患腎痺內虛不食甚者天柱骨倒治法當用**錢氏也**加驅痺等劑仍與貼項強筋若不識證謂之**轉**也天柱骨倒凡有三重有吐瀉日久羸弱成者有肝膽伏熱面赤唇紅忽變此者有傷寒不及發表成者是皆風邪入肝以致筋絡舒弛吐瀉者當調胃

氣肝熱者隨輕重以涼肝並與強筋貼項惟傷寒天柱骨倒者難療故併及之雖然痺之為說亦畧矣調治之法將何擇焉錢氏曰治痺當辨冷熱肥瘦初病為肥熱痺久病為瘦冷熱者涼之冷者溫之冷熱者溫涼之此其要也熱痺病多在外羊下赤爛頭瘡溫瘧五心煩熱掀衣氣益渴引冷水煩躁卧地壯熱脚冷潮熱往來皆熱痺也冷痺病多在內利色無常其沫青白敗躄軟弱目腫面蠶又一證燥渴卧地似有熱狀惟飲食不進滑泄無已亦冷痺也其有瀉多膿血日加瘦弱此則謂之冷熱痺大抵痺之受病皆虛使然熱者虛中之熱冷者虛中之冷治熱不可妄表過涼治冷不可峻溫賑補故錢氏又曰小兒易為虛實脾虛不受寒溫服寒則生冷服溫則生熱當識此而勿誤是果非幼七之綱領乎上證曾觀此消積和胃滋血調氣隨順藥餌以扶之淡薄飲食以養之榮衛調和臟腑自然充實一或過焉君子未保其往也取積之法又當權衡積者痺之母由積

而虛謂之痺極諸有積者無不壯熱脚冷須的量虛實而取之
若積而虛其則先與扶胃使胃氣內充然後為之微積若積肤
乎虛則先與利道總得一世急以和胃之劑為之扶虛然取積
雖當疎利如**白豆蔻****羅漢果****檳榔**消積等輩亦不可無脇
間痺痛亦虛中之積也先寒後熱飲水不食或因飲水以致喘
嗽錢氏有痺為潮熱之說治法解散寒熱即與下癖合是而規
發作不同療治不一又可無權度於此哉若夫諸痺惡證心痺
飲水不巳食則驚悸耳邊紋多舌上黯黑者不治肝痺左脇結
硬頻數吐涎目睛青筋眼角黑氣者不治腎痺飲水好鹹小使
如乳耳焦肩聾牙黑骨枯者不治肺痺欬逆氣促頻瀉白沫身
上粟生其色斑黑者不治脾痺契泥泄痢水穀不消唇白腹高
人中平滿者不治其或滑泄不休脫肛吃逆抱起昏沉手足垂
軟觀及脚心全不知竟項筋舒展身軀變冷是則為五絕證也
者曾陷喘咳乳食直瀉腫涌下痢復腫脹皮

紫與夫痺勞渴濕色子山羅水懷珠而川經之氣以
生精血不榮心而有遺如草木萌芽之受復也實之不假
編者難矣丁奚哺露胎疝瘡爛非胎中已受之病乎不特此爾
兒方週粹母復有孕乳汁成毒飲鬱小兒神氣亦致骨立疰羸
是謂之疰病音奇凡此等類盧扁復生難施其巧余於終篇所
以為之抽閱啓鑰云

諸痺證治

集聖圓諸痺通用

- | | | | |
|-------------------------|------|------|-----|
| 芦薈 | 北五靈脂 | 好夜明砂 | 煅縮砂 |
| 橘皮 | 青皮 | 蓬莪木 | 木香 |
| 史君子 | 各二錢 | 鷹爪黃連 | 淨蝦蟇 |
| 右末雄豬膽式枚取汁和藥入糕糊圓麻子大每拾伍圓米 | | | |
| 飲下痺勞瘦弱木方加 | 當歸 | 一錢半 | 川芎 |
| | | | 叁錢 |

痘疹散

芦薈 黃連各一錢 瓜蒂 猪牙皂角

蝦蟇灰各半 麝少許

右末吹入鼻嚏則可療

黃連肥兒圓 治一切疳及疳眼赤腫痛癢昏暗雀育或經月食

瀉瓜黃連淨一兩 蕪荑焙 麥牙炒

神麴各半兩 青皮去白 史君子肉焙各式錢半

右末猪膽汁浸糕圓麻子大每半圓米湯下疳熱眼山拖

仁煎湯下

大蘆薈圓 治諸疳

蘆薈 木香 青黛乾

檳榔 川黃連淨各錢五分 蝉殼式十 胡黃連半兩

麝少許

右末猪膽汁浸糕圓麻子大每貳拾圓米飲下

脂連圓 治五疳潮熱肚脹髮焦

胡黃連半兩 香潤五靈脂一兩

右末猪膽汁圓麻子大每服十五圓米飲下五疳潮熱謹

勿用大黃 黃芩

五疳良方

川黃連去鬚蕪荑取仁 神麴炒 麥蘗炒

橘紅 木香 蝦蟇燒存性各一各 史君子三十個

肉豆蔻生 雞心檳榔仁 麝一字

右細末雄猪膽二枚取汁入好酒打清麩為圓芥子大每服

十五圓米飲下

胡黃連圓 治熱疳

胡黃連 川黃連略半 朱砂另研

右二連為末和朱砂入猪膽內繫定虛懸於銚中煮一炊久

取出研蘆薈 青黛乾 各一錢半去足蝦蟇灰 二錢麝 少許粳

米飯圓麻子大每七十圓食後米飲下

至聖圓治冷痺上瀉

丁香

丁皮各一各木香

紫厚朴製

史君子肉焙肉豆寇濕熱橘紅各二各

右末神麴糊圓麻子大每七圓食前米飲下

通神圓治冷熱痺

胡黃連

川黃連各三

木香

蕪荑各二各

丁香

肉豆寇生

史君子焙肉各一各

大蝦蟇乾一枚制碎水

右末膏和圓麻子大每十圓米飲下

伏神圓治心痺驚痺

伏神

芦薈

琥珀

川黃連淨

赤伏苓各三釣藤皮

遠志肉各二各蝦蟇灰各二各

細辛石昌蒲各一各

右末粟米糊圓麻子大每十圓薄荷湯下

天麻圓治肝痺風痺上眼

青黛乾

川黃連

天麻

北五靈脂

夜明砂微炒川芎

芦薈各二各

龍膽草

防風

蟬殼去足各半全蝎焙二枚

麝少許

乾蟾頭炙焦三各

右末猪膽汁浸糕圓麻子大每十圓薄荷湯下

生熟地黃湯治痺眼閉合不開內有膠霧

生乾地黃

熟地黃醋拌川芎

半赤伏苓

枳殼製

杏仁炒皮

川黃連淨

半夏麴

天麻

地骨皮

甘草炙各二各半

右剉每服二錢薑三片黑豆十伍粒水煎臨卧服

地黃圓治腎痺

大熟地黃淨四各半

赤伏苓

山茱萸蒸

當歸

川芎

川練子肉焙 牡丹皮

山藥焙

史君子各二錢

右末煉蜜圓桐子大每三圓空心溫湯化下

走馬疳方 治口齒出血臭氣

銅綠半錢 生蜘蛛一枚

右研細入麝少許夾和擦齒如無蜘蛛即用殼二箇

清肺飲 治肺熱疳蝕為穿孔汁臭或生息肉

桑白皮炒 紫蘇 北前胡 黃芩

當歸 天門冬去心 連翹 防風

赤茯苓 北梗 生乾地黄 甘草各一分

右剉每服二錢井水煎食後服次用**化疳圓**

化疳圓

蕪荑 蘆薈 青黛乾 川芎

白芷梢 胡黃連 川黃連 蝦蟇灰等分

右末猪膽汁浸糕糊圓麻子大每服貳拾圓食後臨卧

前湯下其鼻常用**肥**膠泡湯小筆蘸洗俟前藥各進數服却

用**青**蠶黃 赤小豆 瓜蒂 地榆 黃連 芫薺 等分 雄黃少許細

末入鼻欬瘡

靈脂圓 治脾胃食疳

北五靈脂 縮砂仁 白豆蔻仁 麥牙炒

蓬木煨 青皮去白 橘紅 史君子肉各式錢

蝦蟇炙焦

右末米糊圓麻子大每拾圓米湯下

下疳圓 治疳蝕諸虫

新白苦練根皮酒浸焙 綠色貫眾 木香

桃仁浸去 蕪荑焙 雞心棋柳各式錢

鶴虱炒 輕粉半錢 乾蝦蟇炙焦 史君子各二錢

右末飛麩糊圓麻子大每貳拾圓天明清肉汁下內加**富**

單

川黃連 各貳錢半治春痺兼痺勞方可擇用

尤膽圓 治腦痺腦熱餅瘡

龍膽草 川升麻

苦練根皮焙 防風

赤伏神 芦薈

油髮灰各二錢 青黛乾

黃連各參錢

右末猪膽汁浸糕糊圓麻子大每貳拾圓薄荷紫蘇泡湯下食後仍以黃連入鼻

黃連圓 治痺渴

黃連半兩淨猪膽汁浸一夜曬乾

瓜蒌根

烏梅肉焙乾 杏仁浸去皮焙

石蓮肉各二錢

右末牛膽汁浸糕為糊圓麻子大每拾伍圓煎烏梅薑蜜湯下又察虫後附消渴方論內貳藥可治痺渴及五乾痺

禾見寇圓 治痺瀉

黃連參錢 炒肉豆寇生

木香

訶子煨

縮砂仁 伏苓各乙半

右末粳飯圓麻子大每十五圓食前米飲下

木香圓 治痺痢

黃連三條 木香

紫厚朴製 縮砂仁

夜明砂隔紙炒各二升 訶子肉炒乙半

右末粳飯圓麻子大每十五圓乾父葉生薑煎湯食前温下

羅蔔子 治痺腫脹

羅蔔子微炒 陳皮

青皮去白 好檳榔

黑牽牛炒乙半生

北五灵脂 赤伏苓

蓬莪朮半兩 木香二升半

右末飛麩糊圓豇豆大每十五圓煎湯下又大

方見服蒲門加五虛煎湯調下少吞紫霜

治痺脹肚皮緊

治痺勞

黃耆各炙

當歸

川芎

白芍藥

生乾地黄

蝦蟇去足炙焦

鱉甲炙焦

人參

白茯苓

橘皮

半夏麴

柴胡

史君子各煨

甘草各炙

右龍末每二系薑薑煎食前服之

治痔勞

人參半兩

川芎

蕪荑

柴胡各乙兩

史君子二十胡黃連

川黃連各二兩

右用壹壹兩拌和二壹壹兩淹壹宿次早炒乾

透去壹壹并血只用二連夾餘藥杵末粟米粉糊圓麻子太

每二拾圓食前熟水下

治無辜痔諸痔壹服虛熱退二服煩渴止叁服瀉痢住

蟾蜍乙枚夏月清渠中取腹不跳不鳴者其身多癩

右取壹壹杓置桶中以尿浸之桶上要乾不與虫走却將

打殺頰在虫中恁與虫食壹日夜次以新布作袋蓋包

繫定置之急流壹宿取出瓦上焙為末入麩壹字煨飯搥圓

麻子大每二叁拾圓米飲下

治無辜疔

夜明砂炒為末入諸飲食中與之

治丁癩瘡露

青皮

陳皮各去白蓬朮

川芎

北五灵脂

白豆蔻仁

雞心檳榔

芦薈各半兩

木香

史君子肉

焙蝦蟇灰各二

右末猪膽汁浸糕糊圓麻子大每二十圓米飲下有熱則薄

荷湯下

治痔傷肚大**治痔積方**並見積類

治小兒諸痔痔執痔瀉每服二十圓

米飲下

不能發聲方前黃連肥兒圓每服十五圓用蘇合香圓一粒入朱砂五錢末各少許以石昌蒲煎湯乘熱調開送下

龍膽草微炒 鈎藤皮 柴胡 北梗

芍藥 川芎 伏苓 甘草炙

人參乙系 大黃二系半濕紙裹煨

右劉散每二系并水煎服仍以紅紗袋夜明砂與兒帶

寺証神効

白木三兩神麴炒 木香 煨榔

茯苓 三稜 使君子 厚朴姜制

李薺 甘草炙 茅山蒼朮和陳皮去

枳實煨 稜楚 人參去芦 莪木各五及砂仁炒

黃連猪膽汁製過 麥芽炒 益智炒 肉苳寇製去

藿香 白苳寇各伍

右為極細末煉蜜為圓如龍眼大每服一圓用清米飲磨化送下嘔吐姜湯下肉積加山楂一兩喘加羅蔔子一兩瀉加

猪苓澤瀉各一兩如無他證只服本方神効

布袋圓治諸疳疾面黃腹大飲食不潤肌膚

夜明砂神 蕪荑妙去 史君子肥白者甘草

白茯苓皮去 白木無油者 人參去芦 蘆薈細研各

右為細末湯浸蒸餅和圓如彈子大每用一圓以生絹袋盛

之次用精猪肉二兩同藥一處煮候肉熟爛提起藥於當風

處懸掛將所煮肉并汁令小兒食之所懸之藥第二日仍依

前發者食只待藥盡為度

五疳保童圓治小兒五種疳疾 青黛 五倍子勝 蘆薈另研 夜明砂布裹洗

黃連去鬚 龍膽草生 熊膽 苦練根皮

麝香另研 蕪荑仁 蟬殼去土各

右為細末用粟粉打糊為圓如麻子大一歲小兒服一十

圓用米飲湯送下不物時服量兒大小加減

子丑散治小兒疳證

鼠糞 黑牽牛各等

右為細末三歲兒每服一錢用橘皮湯調不物時服

疳瘡方論

凡人自孩提以至弱冠朝熱發瘡只是疳氣使然蓋疳虫耗其精髓蝕其肌膚寒虛膚空疳流注遂致遍身疥瘡發歇無已須用猪肚黃連圓主治仍以大腹皮苦參白芷煎湯浴之麝香圓肥兒圓二藥夾和佐之可也

疳瘡證治

猪肚黃連圓

雄猪肚青具洗淨 鷹爪黃連去鬚淨柴研

右剉作小截少水和濕納猪肚中用線縫密頓在伍升粳米上蒸十分爛取放白中入些蒸飯搗千餘杵粘實得所聚手捏圓如小桐子每服貳拾圓米飲下童子倍之冠者又倍之仍以川芎生地黃茯苓伏神與之調血清心熱多者間服和兩生犀散貳拾歲以上潮熱發瘡是為虛勞皆一種病也用藥同前凡兒童諸病不出於疳則出於熱熱則生痰常須識此矣

積

積滯方論

小兒有積面目黃腫肚熱脹痛覆睡多因酷啼不食或大腸閉澁小便如油或便利無禁糞白而酸此等皆積證也然有乳積有食積有氣積要當明辨吐乳瀉乳其氣酸臭此由啼叫未已

付文下之三

以乳與兒停滯不化得之是為乳積肚硬帶熱渴瀉或嘔此由飲食無度多餐過飽飽後即睡得之是為食積腹痛啼叫利如蟬勃此由觸忤其氣榮衛不和淹涎日久得之是為氣積合用**木香圓**主之雖然積有虛有實虛積渾身微熱不思飲食昏昧神緩抱起如睡實積肚熱糞閉顯腫喉塞壅盛涎鳴熱毒發瘡推此可見**木香圓**虛者少與之實者倍用之亦有傷乳傷食而身體熱者惟腹肚之執為甚人知傷積肚熱糞酸極臭而夜間有熱傷積之明驗人所未識也其或變證面黑瀉黑久瀉不止腹肚脹滿氣出麓大手心生瘡瘦弱柔軟皆不可療○小兒消積多用**青皮**然**青皮**最能發汗有汗者勿與之

積滯證治

木香圓治乳積食積氣積

- 木香
- 朱砂一細
- 蓬我木
- 代赭石研各錢
- 大丁香壹錢
- 縮砂仁
- 青皮去白
- 川巴豆肉研壹錢去油壹錢

右細末和勻飛白麪糊圓麻子大風乾每服貳叁圓乳傷乳汁下食傷米飲下後與**大異香散**方見脹滿門或和劑異香

散亦得氣積橘皮煎湯下後與**和劑流氣飲**並見脹滿門

下積圓治乳食傷積腹脹滿氣麓壯執或瀉或嘔

- 丁香
- 烏梅肉焙
- 川巴豆肉各叁箇不去油
- 右末研細和勻爛飯圓麻子大每叁圓橘皮煎湯下

五珍圓治酒食積通用

青皮炒不去白乾薑煨帶生北五靈脂 蓬我木各壹兩右為末夾和秤藥末壹兩用**肥田肉**以石壓准去半油秤壹錢研細拌和粳米飯圓麻子大每服叁伍圓米湯下不飢飽時服

疾疳圓治疳積方見癖積**辰砂膏**疎利驚積方見風禁門

青龍圓治驚積有熱方見驚積門**朱銀圓**治驚積方見胎驚門

痞結證治

痞者塞也結者實也熱氣蘊於胃膈之間留飲聚於腹脇之內於是榮衛不得流行腑臟不得宣通由脹滿而至痞結勢使然耳此執實之證也時或發為壯熱

聖惠耳遂散

聖惠耳遂散主之

甘遂

壹分煨 青皮 浸去白焙

黃芩

川大黃 剉碎微炒

右麤末每服壹錢水小盞煎去滓溫和服量大小增減用得通利則止後服利後以糜粥放冷補之

癖氣證治

癖者血膜包水僻側於脇傍時時而作痛也惟癖為能發潮熱惟癖為能生寒熱故廬家中腕多蓄黃水日久而後結癖寒熱之不已者以此小兒臟腑和平榮衛調暢則津液自然流通縱使多飲水漿不能為病惟夫乳哺失調三焦關隔以致水漿停滯腸胃不能宣行冷氣搏之於是結聚而成癖輕者用精滯類

木香圓

重者用取癖圓

甘遂

微炒

芫花 炒

牽牛

半炒半生

辣桂

蓬朮

青皮

去白

木香

桃仁 浸炒

五靈脂

各貳錢

右細末入去油巴豆壹錢研和十分細飛麩糊圓麻子大固乾每服壹貳圓薑蜜煎湯灌下泄後冷粥補仍和胃

疾癖圓

治乳癖穀積腹中塊痛

代赭石

煨醋齊全

青皮 去白

木香

蓬朮

五靈脂

北大黃 各叁錢

巴豆 壓去油

右末醋麩糊圓麻子大每服貳圓食後擦薑泡湯下

代赭圓

治小兒腹中結癖塊痛

代赭石

研細 川大黃 各半

木香

五靈脂

朱砂

蟹甲

醋炙黃

桃仁

浸去皮

辣桂 各壹分

巴豆肉 去油半分

右細末糕糊圓麻子大風乾每服伍圓薑湯下

附方

快膈消食圓 消食積

縮砂仁

橘皮

京三稜

莪木

神麩

麥芽 各半

香附子 壹兩

右為末麵糊圓如麻子大食後白湯下隨大小加減

香稜圓 治五積破痰癖消癥塊及冷熱積聚

木香 不見

丁香 各半

京三稜 壹兩

枳殼 去穢

青皮 去白

川練子 炒

茴香 炒各

蓬朮

壹兩細切去殼巴豆叁拾粒同炒黃色去巴豆不用

右為細末醋煮麵糊為圓如麻子大珠砂為衣每服二十圓

炒生薑鹽湯下溫酒亦可不拘時服

消積圓 治嬰孩小兒中脘宿食不消吞酸惡心口吐清水心腹

刺痛發泄如痢

烏梅 去核

柴箇

百草霜

巴豆 去皮

油

杏仁 去皮尖炒

半夏 去痰湯浸

縮砂 去殼

史君子 去殼

右為極細末者麵糊圓如黍米大每服三伍七十圓用生薑

煎湯食前服

三稜圓 治嬰孩小兒癖積消積進食

三稜

蓬莪木 炮

神麩 炒

麥蘖 炒

青皮 炒

陳皮 去白

右為極細末煮麵糊圓如黍米大用米飲食遠服

傳保安圓 治小兒五疳八痢吐瀉肚大青筋面黃肌瘦疳積

詳証神効 方見疳門

三稜莪木圓 治積滯痞塊乳癖

蓬朮

壹兩巴豆叁拾粒同炒黃色去巴豆

川練子

茴香

三稜

壹兩枳殼各半

木香 叁錢

丁香 各半

拜

附方小兒卷三

十五

青皮

右末醋糊圓每服三九淡姜湯下

熱

諸執方論

小兒有病惟熱居多夫熱有虛有實實則面赤濃黃氣籠口熱燥渴唇腫大小便難掀揭露衣煩啼暴叫虛則面色青白恍惚神緩口中清冷虛氣軟弱泄瀉多尿夜出虛汗其或乍清乍溫佛鬱悸惕上盛下泄水穀不分此則冷熱不調之證虛熱惺惺散方見癩疹門實熱四順清涼散加柴胡方見積熱門冷執不調則敗毒散方見寒類加六一散當歸若夫升降陰陽則來復丹圓薄荷湯研下○小兒表裏俱熱面黃頰赤唇燥口乾小便赤澀大便焦黃先以四順清涼散為之疏利其熱即去既去而復熱者裏已消而表未解也當用惺惺散少加去節麻黃以取

微汗則表熱盡除其或表裏已解而熱又時來此則表裏俱氣不歸元而陽浮於外不可再用涼藥再與解表當為和其胃氣使陽斂而歸內身體自涼參苓白朮散方見虛勞門葛葉略煎服

諸熱證治

加味清涼飲治小兒頭熱身熱口中熱氣大便黃赤清涼飲方見積熱門

人參芍歸散治兒童虛勞開熱潮熱或遍身瘡

北參 當歸 遠志侵取肉 北前胡

柴胡 地骨皮 防風 北梗

枳殼製 半夏麩錢半 川芎 伏苓

赤芍藥 麥門冬去心各錢錢 甘草參錢焙

右剉細每服貳錢水小麥壹斗此紫蘇參肆葉煎服發瘡者兼服豬肚黃連圓方見疳類別作小圓不惟治瘡治渴其發

朝熱而吐脹者米飲常服貳拾圓

猪膽圓 治小兒每日早膳後發熱夜則身凉此血熱也

胡黃連貳錢 宣黃連 赤芍藥各半兩

右末猪膽汁和成劑入膽皮中虛掛以漿水煮熟取藥研圓麻子大每貳拾圓米飲常服

龍膽草圓 治再熱

龍膽草 黃連 史君子肉 青皮等分

石末猪膽汁圓麻子木每拾圓食後熟水下

清解散 治感風發熱頭疼鼻寒涕流及温壯承主之

北參 防風 大麻 北前胡

伏苓 北梗 枳殼判 甘草各貳錢

細辛 柴胡各錢 川芎各錢

右末每壹錢水小盞薄荷乾參葉略煎温和服

附方

犀砂湯 除壯熱和胃進飲食去心驚邪熱

白芍藥 人參 甘草各錢 茯苓壹錢

硃砂伍分 石蓮肉伍錢

右為末次入硃砂研勻每服伍分薄荷湯調服

大連翹飲 治小兒諸熱

連翹 瞿麥穗 滑石 車前子

牛蒡子炒 紅芍藥各壹兩 山梔子 木通

當歸 防風各半兩 黃芩去心壹兩半 柴胡去芦

甘草各兩 荊芥穗壹兩 鐵蟬去脚

右件一十五味吹咀每服一大錢水一盞煎服湯使於後

○如風熱痰熱變蒸熱肝熱大腸熱癰疹熱者宜加麥門冬去

心同煎

○如丹熱實熱血熱三焦熱小腸熱龍帶熱宜加大黃燈心同

煎

燒

附方

三七

○瘡疹熱麻子熱溫氣熱已出未出證熱宜加紫草草川當歸
同煎

○如餘毒熱胎熱肺熱傷寒後瘡疹後餘毒發熱宜加薄荷葉
同煎

○如項上生核作熱作腮熱癰毒熱宜加大黃朴硝同煎
梨漿飲治小兒潮熱積熱疳邪寒熱

青蒿取花頭用童子小便浸柴胡去芦

人葭

黃芩去心

前胡

秦艽去上

甘草炙

右等分咬咀每服一歲兒半錢兩歲一錢七水小小盞入
藕生煎如無亦可薄荷二葉生地黄一寸同煎至半盞去滓
通口空心食前服

新刊仁齋直指小兒附遺方論卷之三終

新刊仁齋直指小兒附遺方論卷之四

傷寒

傷寒方論

或問小兒傷寒可得聞乎曰小兒傷寒與大人法度則同但分劑少異用藥少冷已略陳於前矣然而驚風瘡痘亦嘗贅布此尤不可闕請發明藥證而條析之惡風惡寒者必畏人截身引衣密隱是為表證可微取其汗也惡熱內實者必出頭露面揚手擲足煩渴燥糞掀衣氣籠是為裏證可略與疎利也至若頭額冷手足涼口中冷氣面色黯淡大便瀉青此則陰病裏虛當以溫藥救其裏也舉是三者汗下溫之法可以類推矣發汗用桂枝麻黃各半湯加黃芩解肌用香蘇散加乾葛通利四順清涼散微利人參敗毒散溫裏理中湯厥冷甘草乾薑湯尋常感冒溫散或參蘇散傷風發熱人參羌活散或天麻防風圓壯

傷寒

傷寒

熱者升麻葛根湯 潮熱者生犀散 小柴胡湯 加大黃 小便不通者道宗散 五苓散 甘露飲 表裏俱熱如表裏俱見之證 洗心散 主之咳嗽則人參潤肺散 加紫蘇 夾食則異香散 紫霜圓 輩然亦視其小便或赤或白可以知裏熱之有無或清或濁可以知裏熱之輕重幼而嬰孩則以虎口指紋之紅色驗之長而童孺則以一指按其三關據左手人迎之緊盛者斷之所謂七十二證其證其方皆無越張朱格例特不過小小分劑而中病則止也不然幼幼新書駢集小兒傷寒雖略舉集源一二而終篇以活人書為法果何意哉故附于卷末以備學者之觀覽云

傷寒證治

桂枝麻黃各半湯

桂枝 剉 芍藥 各半兩 生薑 半兩 切 甘草 炙 半兩
麻黃 半兩 去黃汁 焙 乾 枳 枳 杏仁 浸 去皮 尖 湯
大棗 貳枚

右剉如麻豆大每服伍錢水壹盞半煮至八分去滓溫服

香蘇散 治四時瘟疫傷寒

香附子 炒 去 紫蘇葉 各肆 青橘皮 焙 晒 不 甘草 壹兩

右為籠末每服參錢水壹盞煎半去滓執服不拘時日參服解肌加乾葛前若作細末只服貳錢入鹽點服

升麻葛根湯

治小兒時氣瘟疫頭痛發熱肢體煩疼 方見瀉類

小柴胡湯

方見暑門 理中湯 方見瀉類 甘露飲 四順飲 方見積

五苓散

方見水飲門 參蘇飲 方見瘡疹門 人參羌活散 方見眼

人參潤肺湯

方見咳嗽門 紫霜圓 方見食癩類

人參敗毒散

方見寒類

附方

脫甲散

治小兒傷寒熱頭目昏沉夾驚夾食寒熱煩燥口渴

無汗自汗夾積傷滯滿脹急日夜大熱及傷風傷暑驚癇客忤疳氣短熱並宜服之

柴胡法 川當歸統 龍膽草法 甘草炙
知母銹 白茯苓銹 人參 川芎銹

右件為細末每服一大錢水一盞葱白連根一寸煎服有熱加乾葛升麻荆芥

薄荷半兩 羌活 全蝎去毒 麻黃

甘草半 僵蚕炒 天竺黃 白附子

右為末薄荷湯調下一匙罌粟殼法 加法 少許

香膏散治小兒傷寒夾食夾驚四時瘧疾瘟疫

香附子炒 紫蘇葉各壹兩 陳皮白 青皮去穢炒
甘草銹 葛根炒

右吹咀用生薑三片葱白二莖同煎不物時候服

竹葉石膏湯治小兒傷寒表裏俱虛胸中煩悶或得汗以解內

無津液虛羸少氣虛煩如傷寒未解不可服

石膏貳兩 半夏肆錢 人參 甘草各貳錢

麥門冬去心

右剉散每服二錢水一盞青竹葉生薑各四片粳米六七十

粒同煎嘔加生薑竹葉

白虎加人參湯治小兒傷寒若吐若下後七八日不解熱結在

裏表裏俱熱惡寒大渴大汗出煩渴不解脉洪大者

石膏貳兩 知母兩 甘草半 粳米伍勺

人參壹

右剉散每服三錢水煎米熟為度去滓溫服

寒瘧

寒瘧證治

常山散治小兒發瘧痰壅煩悶

裝瘧

小兒發瘧

川常山 川大黃 甘草各半兩
桂心 烏梅肉各壹

右剉細每服壹錢井水小盞煎半候冷未發前與之

附方

青皮飲 治小兒瘕瘕脉來弦數但熱不寒或熱多寒少膈滿不能食口苦食乾心煩渴飲水小便黃赤大便秘不利

草葉散 治小兒瘕疾寒多熱少或遍身浮腫痲瘡上方並見

虛寒

虛寒證治

惟腎主虛亦惟腎受寒小兒骨氣未就雖虛而不容補但以**地黃圓**與之方見腎疳門厥冷者以**生乾薑**炙**甘草**煎湯調下泄者却專用木香白朮生薑各壹分**辣桂**炙**甘草**各半分到細量大小作劑入陳米煎服

虛汗

虛汗證治

團參湯 治小兒虛汗盜汗或心血液盛亦發為汗此藥收斂心氣新羅人參 川當歸 各壹錢
右剉細用雄猪心壹箇切參片每服貳錢猪心壹片井水壹盞半煎至壹盞食前兩次服

又撰汗方

黃連 母蠣粉 貝母 各半兩 米粉 壹升 末傳

附方

牡蠣散 治血虛自汗或病後暴虛津液不固自汗

牡蠣貳兩 黃芪 生地黃各壹兩

右剉散每服貳錢加**小麦**一撮水一盞煎服

又方 治睡中汗出

虛汗

附方

四

酸棗仁 人參 茯苓各等
右末每服二錢用米飲調下



痰涎

痰涎證治

痰涎方論直指講之詳矣但小兒受病多生於熱熱則生痰痰者諸病之根也故申言之用藥

研細薄荷泡湯入薑汁少許調下風痰蘇合香圓并天麻防風加朱砂同

擇焉

風痰證治

朱砂圓鎮心壓驚驅風墜痰

朱砂研十分直僵蚕洗焙大南星炮製白附子濕紙煨紙乾
全蝎半錢麝壹分

右末飛白麩糊圓麻子大每服伍圓薄荷湯溫服

查命散控下風痰全活危急

青礞石壹兩酸消壹兩和入銀窩內硬炭火煨紅硝

右末每服壹錢匕急風薄荷汁入蜜調下涎藥自大便出狀如稠涕次服退熱截驚等劑慢風木香入少蜜煎湯調下涎即墜入腹中次服

青洲家白圓

圓白大半夏湯浸柴次真川烏累炮去白附子先畧炮
圓白天南星先畧炮天麻各半兩全蝎壹分

右細末生薑汁煮飛麩糊圓麻子大每拾圓熟水下諸癰白

嗽白圓子末紫蘇烏梅煎湯入薑汁調下寒瘧白圓子金夜

丹等分為末米飲調下大抵小兒諸病非熱則痰治痰惟

夏為上上藥

痰涎

附遺小兒各

五

附方

辰砂膽星膏 治小兒痰熱驚熱痰喘氣急風痰癱盛

辰砂 壹錢 牛膽南星 兩 琥珀 青礞石 各壹錢

天竺黃 貳錢 甘草 伍分 麝香 少許

右為細末煉為丸如芡實大每服一九用姜湯不拘時化下



哮喘

咳嗽喘證治

杏仁膏 治小兒久患咳嗽

杏仁 壹兩半 伏苓 壹兩 紫苑茸 皂角 去皮弦核蜜炙各半兩

右末每半錢生蜜調入薄荷湯泡開服

紫苑湯 治小兒喘嗽

紫苑茸 貝母 真蘇子 微炒 杏仁 水浸去皮焙黃 北梗 陳皮 麻黃 去節 半夏 麩

赤伏苓 桑白皮 甘草 微炙

右剉細每服壹錢薑參片紫蘇參葉并嫩梗准水煎服

人參枳實湯 治感冒嗽喘曾滿痰滯

人參 壹分 枳實 製 桑白皮 炒 半夏 製 赤伏苓 五味子 細辛 淨 北梗 麻黃 去節 阿膠 炒酥 甘草 炙各半兩

右剉散每壹錢薑參片紫蘇參葉水煎服凡治喘嗽不論肺實肺虛可干可温可下藥中須用阿膠便得安肺潤肺其性

和平肺經要藥

附方

清肺飲 治肺受風邪客熱咳嗽氣促喘悶痰壅鼻塞声重及解

時行瘡疹痘毒咽痛煩渴

人參 半兩 柴胡 淨洗 杏仁 湯炮去尖 桔梗 剉炒 赤芍藥 荆芥 枳殼 去穢 桑白皮 炒

喘嗽

附方 人參 半兩 柴胡 淨洗 杏仁 湯炮去尖 桔梗 剉炒 赤芍藥 荆芥 枳殼 去穢 桑白皮 炒

北五味

麻黃

半夏

旋復花

甘草

湯泡

右件咬咀每服貳錢水壹盞壹兩壹片壹兩葱一根煎七分無時溫服或入薄荷同煎

補肺散

治久患咳嗽肺虛氣促有痰惡心

阿膠

白茯苓

馬兜苓

糯米

杏仁

甘草

右咬咀每服貳錢水一盞煎七分無時溫服

神應散

治小兒一切虛嗽

嬰粟殼

杏仁

白膠香

人參

阿膠

麻黃

烏梅

桑白皮

欵冬花

甘草

右咬咀每服二錢壹兩參片壹兩棗一枚煎溫服不拘時



脾胃

胃氣虛實證治

凡人以胃氣為本惟治病亦然胃氣有虛有實虛則有嘔吐不食之證實則有痞滿內熱之證虛者益之實者損之欲得其平則可矣胃虛用木香丁香厚朴肉桂等劑胃實用北梗枳殼柴胡天黃等劑若夫胃中停寒則乾薑良薑官桂丁香又不可闕貴在酌量但以小小分劑與之夫是之為平胃

驚馬惕不食證治

心者脾之母進食不止於和脾蓋火能生土當以心藥入於脾胃藥之中庶幾兩得古人進食方劑多用益智者此也

益智仁

石菖蒲

白伏苓

蓮子肉

陳皮

縮砂仁

半夏麴

木香

厚朴

甘草

炙壹錢壹字

右劉細每服壹錢薑參片棗壹枚水壹盞煎不飢飽服

附方

守胃散治陰陽不和吐瀉不止預防風証常服則調脾胃進飲食

人參去芦 白朮土炒 白茯苓去皮 山藥去黑皮

乾葛 扁豆炒 南星制 甘草炙

藿香去老梗 防風去芦 天麻各等分

右咬咀每服貳錢水一盞美三片參五片仁五十粒搗碎煎七分温服如瀉不止沉香白豆蔻同煎服

温脾湯治脾胃不和腹脇虛脹不進乳食困倦無力

訶肉煨 人參炒 木香 桔梗略炒

茯苓 藿香洗 陳皮 黃芪

甘草銹 白朮半兩

右劉散每服二錢美煎

助胃膏治小兒冷氣入胃嘔吐不已

乾山藥 藿香略 甘草銹 橘皮去白

砂仁 白茯苓略 白朮 官桂略

人參 木香 丁香 肉苳蔻

白苳蔻各伍分 右為細末煉蜜丸如大湯化下一歲一丸

四君子湯治小兒調理脾胃進乳食止泄瀉

人參 白朮 茯苓 甘草各等

石劉散每服二錢陳皮前加砂仁名六君子湯

參苓白朮散治小兒脾胃虛弱飲食不進或嘔吐泄瀉及大病

後調助脾胃此藥最好方見虛勞門

人參白朮膏治小兒脾胃虛弱肌膚羸瘦欲成疳證服之則消

積肥肌 人參去芦 白朮土炒 茯苓去皮 山藥

蓮肉酪壹 山查柒錢 甘草炙 陳皮去白

神麴炒 麥芽炒 澤瀉各伍

右為細末煉蜜為丸如龍眼大每服一九米飲化下

吐瀉

嘔吐證治

消乳散 治乳哺不化停滯中脘或作嘔惡

丁香 木香 青皮 生肉蓯

三稜 蓬木等分

右細末稀麩糊圓麻子大每服伍圓米飲下日貳服

益胃散 快膈益脾止嘔進食

不香 丁香 藿香 陳皮

縮砂 白豆蔻仁各壹分 甘草炙壹錢

石細末每服參字前薑棗湯乘熱調下或加伏苓

半夏散 治小兒胃虛嘔吐水穀不能入

圓白半夏湯浸七次 陳粳米參錢

右剉細每服壹錢水大盞薑伍片北棗三枚煎半溫服

吐瀉證治

維香散 治小兒吐瀉

良薑 香附 天台烏藥 辣桂各貳錢

甘草微炙 加陳皮 藿香各壹錢

右細剉每服壹錢水煎灌下仍別煎與乳母服

交泰散 治霍亂吐瀉

藿香葉 陳皮 肉豆蔻生 半夏製

青皮 酸木瓜 甘草微炙 石菖蒲貳錢

右細剉每壹錢薑參片紫蘇參葉水煎服暑月加香薷

又方桂心 甘草生等分麤末水煎入法醋些少服

吐瀉

付遺丸卷四

九

藿香

肉蔻生

甘草生半份

右為麤末每服壹錢新水煎服

不換金正氣散

方見寒類加

木香

伏苓

治嘔瀉

附方

保和圓

治小兒乳食所傷吐瀉積候肚腹疼痛

白木土

蒼木土

厚朴姜汁

陳皮去白各

甘草錢伍

義木醋炒

三稜醋炒

香附去白各

砂仁錢伍

益智炒陸

蘿蔔子炒壹

山藥八錢

人參去錢

肉菓去油肆

白苳蔻肆錢

檳榔叁箇

木香伍錢

神麴炒壹

麥芽炒取

山查貳兩

茯苓去皮壹兩

君子肉壹兩

乾亭齊壹兩

右為細末煉

蜜為丸如

龍眼

大每服

丸

米飲

化下吐豈

湯

二陳湯

治痰飲嘔吐惡心或頭眩心悸中脘不快發為寒熱或

因食生冷脾胃不和如傷胃宿食不化加

草菓

方見痰

霍香止氣散

治霍亂吐泄及胃嘔逆惡心腹冷痛臍虛鳴山

嵐瘴氣瘡疾遍身虛腫小兒疳傷及治傷寒頭疼壯熱止喘

咳嗽五勞七傷八般風痰並宜服之

大腹皮洗

白芷

紫蘇

茯苓各半

半夏湯泡

白木

陳皮

厚朴姜汁

桔梗略壹

藿香壹兩

甘草壹兩

右剉散每服二錢

美三片

菓一枚煎服

泄瀉證治

鍾乳震靈丹

治小兒腎泄面黑齒消脫骨力弱小腹痛泄多

白膿震靈丹

方見瀉類參圓為末入鍾乳粉半錢以炒破故紙

壹錢半

生肉豆蔻

壹錢

大菓貳枚煎取清汁

乘熱調空心灌下

木香益黃散

治胃虛腹痛泄利

陳皮

壹兩

青皮

苛子肉

微炒各半兩

丁香貳錢

木香

甘草各貳錢半

右細末每服壹錢陳米少許水煎服

肉寇散治小兒腹痛大瀉

肉豆寇壹錢 胡椒壹錢 小孔納腐壹錢 為末米飲調下

和安散治小兒冷熱不調上盛下泄

木香

當歸

川芎

北前胡

柴胡

青皮

北梗

甘草炙

半赤色伏苓等分

右州散每服壹錢薑棗煎不飢飽服

香櫛餅治積瀉冷瀉傷食泄瀉

木香

青皮炒

陳皮各錢

厚朴

神麴炒

麥蘖各半兩

右為末煉

蜜丸餅

或米湯下

錢氏白朮散治泄瀉并吐瀉止瀉

胃治小兒感暑夾食泄瀉煩渴

柴苓湯治瀉解熱並見人人瀉門

參苓白朮散治小兒脾胃虛弱泄瀉不止者加**升麻訶子肉**煎

瀉痢證治

沒石子圓治疳痢或大便瀉

白沒石子壹錢 白豆蔻仁壹錢 訶子肉壹錢 木香壹錢 黃連各壹錢

六禾粳米糊圓麻子大每服拾伍圓米飲下

赤痢壯熱方 藍青搗汁每服半盞與之

附方

豈蔻香連丸治小兒乳食不節腸胃虛弱冷熱之氣客於腸間

下赤白痢腸內疴痛日夜頻併不飲乳食

黃連半錢 肉豈蔻壹錢 丁香半錢 木香壹錢

訶肉各半兩

石為末以**粟米糊**丸如黍米大三歲兒服十九**米飲**下

養臟湯治小兒冷熱不調下痢赤白或如膿血魚腦裏急後重

臍腹疝痛如脫肛墜下並皆治之

胃風湯治小兒風冷所傷乘虛客于腸胃水穀不化泄瀉疝下
腹脇虛滿腸鳴疝痛下如豆汁或下瘀血並見大人痢門

腹痛

腹痛證治

腹痛多因邪正交爭與臟氣相擊而作也挾熱作痛者以面赤
或壯熱四肢煩手足心熱見之挾冷作痛者以面色或白或青
見之冷甚而證變則面色黯黑唇口瓜甲皆青矣熱證**四順膏**
涼飲加**青皮****枳殼**方見積熱門冷證**指迷七氣湯**方見氣門加
辣桂調蘇合香圓方見嗽門若乃邪正交爭冷熱不調則**桔梗**
枳殼湯方見氣門加**青皮****陳皮****木香****當歸**為妙

附方

保童丸治小兒內傷風冷食積肚腹疼痛吐瀉嘔惡

人參

白朮

白茯苓

甘草

蒼朮

厚朴

陳皮

猪苓

澤瀉

赤石脂

藿香

丁香

半夏

乾姜

官桂

白豆蔻

青皮

檳榔

肉豆蔻

滑石

全蝎

柯子肉

木香

右為細末**白糊**為丸如**龍眼**大每服一九**米飲**化下

腫脹

腫脹證治

葶藶散治小兒水氣腫滿

甘草

葶藶

紫牽牛

桑白皮

雞心檳榔

川大黃

劉涪等分

右為末每半錢水半盞真氣片蜜半匙煎湯調下或煎**大流**

腫脹

附遺小兒四

七

氣飲研青木香圓灌下

分氣飲治小兒腫脹作喘氣短而急

北梗

赤茯苓

陳皮

桑白皮炒

大腹皮

枳殼製

半夏麩

真蘇子微炒

紫蘇

甘草炙

草果仁壹錢

右剉每壹錢半水小盞置參片棗壹枚煎半服

陰腫證治

人有常言天生地長多與小兒近地然兒有大小壯弱起止中節可也夫苟腎經氣虛或坐石不起冷氣疑之或近地經久風邪濕氣傷之不為陰腫幾希矣間有啼叫怒氣閉擊於下結聚不散加以水竇不行亦能發為此疾治法用

桃仁

浸去皮熬微炒參入

辣桂

牽牛微炒碾

白疾梨

炒香搗去刺

牡丹皮

北大黃各貳分

右末煉蜜圓麻子大每服伍圓或柒圓青皮木通葱白入鹽

大小便諸證

遺尿證治

小便者津液之餘也腎主水膀胱為津液之腑腎與膀胱俱虛而冷氣乘之故不能約制其水出而不禁謂之遺尿睡裏自出謂之尿床此皆腎與膀胱俱虛而挾冷所致也用

雞腸散

雞腸燒

牡礪灰

白茯苓

真桑螵蛸微炒各半兩

辣桂

龍骨各壹錢半

右麤末每服壹錢薑棗煎服

又方

雞臍脰

壹具

雞腸燒存性

右為末每壹錢酒調下男用雌雞女用雄雞

尿白證治

小兒尿如白米泔狀由乳哺失節有傷於脾致硬清濁不分而

大小便

付是小兒卷四

十三

色白也久則成疳亦心膈伏熱兼而得之用**伏苓散**

京三稜

蓬莪木煨

縮砂仁

赤伏苓各半兩

青皮

陳皮

滑石

甘草微炙各貳錢半

右末每服壹錢麥門冬燈心煎湯調下

又方大甘草頭煎湯服

諸淋證治

葵子

車前子

木通

蘧麥

桑白皮炒

赤伏苓

山梔仁

甘草微炙等分

右剉每壹錢井水小盞葱白貳寸煎柒分食前温服

導赤散治小兒血淋

生乾地黄

木通各式錢

黃苓

甘草生各壹錢

右為末每服壹錢井水入燈心前服仍以米飲調**油髮灰**生

少許煎湯灌下或煎**大流氣散**研**青木香**圓灌下方見張藥水飲門

傳藥

母蠣灰式分乾地龍壹分

右細末津唾調傳外腎熱者雞子清調傳

母蠣散治小兒外腎腫大壅物通明

母蠣粉研十分細先以津唾塗腫處次以母蠣粉摻傳

又方如腫研**桃仁**唾調傳

附方

温脾散治小兒脾胃不和腹脇虛脹不欲乳食困倦無力增寒

壯熱並皆療之

訶肉煨

人參各柒錢半

甘草式錢半炙

白朮

木香

茯苓

藿香洗

陳皮

黃耆

桔梗各半兩

右剉散每服二錢姜一大片棗二枚煎服

腫脹

付遺小兒藥

十四

分氣飲治小兒腫脹作喘氣短而急四肢浮腫

桔梗炒

赤茯苓

陳皮

桑白皮炙

大腸皮洗

枳殼炒

半夏泡

甘草炙

真蘇子炒微

紫蘇各煎

草菓各錢煨

加木通

右剉散每服二錢水一盞姜三片一棗一枚煎服

南星腹皮散主小兒腫疾欲瘥未瘥之間脾胃虛慢氣促痰喘

腹脹胸滿飲食減精神困小便不利面色痿黃

南星同前製

大腹皮淨洗

生薑皮

陳皮去片

青皮去白

桑白皮炒

甘草炙

扁豆炒各半兩

右咬咀每服二錢水一盞姜二片煎七分無時溫服

青木香丸治小兒陰腫寬中快膈腹脇痛心下堅痞腸中水声

黑豆炒半兩

木香

補骨脂炒

葶澄茄

枳榔各肆錢粟米飯包再用濕紙包裹煨令焦去飯不用

右為細末滴水為丸粟米大每服十九白湯下

心灌下

承血方

生蒲黃

生地黄

赤茯苓

甘草微炙等分

右剉每壹錢水小盞煎柒分調髮灰食前服

大便不通證治

沒藥散治小兒風與滯血留蓄上焦胃膈高起大便不通

沒藥

大黃

枳殼炒

北梗各式錢

木香

甘草炙各壹錢

右剉每壹錢薑貳片水煎服

脫肛證治

龍骨散治小兒大腸虛肛門出

龍骨

訶子肉炒各式錢半

沒石子大者

嬰粟殼醋糝赤石脂各式錢

右末每服壹錢米飲調下

大小便論

寸黃小兒各論

十五

丹毒

丹毒證治

熱毒與血相擊而風乘之所以赤腫遊走而徧體也此由乳母酒麪煎炙過度與夫烘衣與兒不候冷而即着多成此候或發於手足或發於頭面曾背令兒燥悶腹脹其熱如火痛不可言纔有入腹入腎之證便不可救藥通用**敗毒散**方見寒類加紫

外用青黛土朱井水入蜜研傅

北梗 天花粉 乾葛 川升麻
川芎 赤芍藥 獨活 柴胡 甘草等分

右剉散每壹錢薑貳片井水煎服餘見丹疹門

秘方 治小兒遍身火丹諸藥不効取野苧根生杵汁擦之立効

吐衄

吐衄證治

蒲黃散 治小兒吐血咯血
生蒲黃 油髮灰 等分
右研細每壹錢煖**生地黃汁**調下或米飲亦得

地黃汁方 治小兒吐血衄血

生地黃汁取壹合調髮灰半錢分作兩服食後少頃灌下

鼻衄方 生蘿苜搗汁仰頭滴下鼻仍飲其汁

附方

龍腦雞冠 治小兒膈吐血衄血咳嗽血

龍腦鴉蘇 治小膈熱吐血衄吐咳嗽血 方見鼻門

雜證

吐血

附方小兒衄血

十一

顛陷證治

始因臟腑有熱渴引水漿致成泄利久則血氣虛弱不能上充腦髓故顛陷如坑不得平滿

顛填證治

顛填者顛門腫起也脾主肌肉乳哺不常飢飽無度或寒或熱乘於脾家致使腑臟不調其氣上衝為之填脹顛突而高如物堆聚毛髮短黃自汗是爾若寒氣上衝則牢鞞熱氣上衝則柔軟寒者溫之熱者涼之劑量重輕兼與調氣小兒肝盛風熱交攻亦然未易退瘥

解顛證治

小兒年大頭縫開解而不合也腎主髓腦為髓海腎氣有虧腦髓不足所以頭顛開而不能合凡腦髓欠少如木無根不過干日終成廢人姑與錢氏地黄圓

大熟地黄 洗焙肆錢

山茱萸

乾山藥 各貳錢

澤瀉一系 牡丹皮

白茯苓 各壹錢

右末煉蜜圓桐子大每壹貳圓溫熱水空心調服仍內

又方

華陰細辛 去苗土

棘桂 去麁皮 乾薑 生

右等分為末乳汁調傅

口舌證治

口角瘡方

髮灰細末猪脂和傅

代方

二方

治小兒口唇赤爛生瘡及治牙疳瘡

青黛 去錢 枯丸 貳錢 水片 少許

右為細末摻於患處即有蟲者加

重舌證治

重舌證治

一二

重舌者心脾俱有熱也心候於舌所主者血脾之絡脉出於舌
卜若心脾有熱則血氣俱盛附古根而重生壹物形如舌而短
小是也有著頰裏及上腭者曰重腭有著齒齦者曰重齦皆當
刺去其血也用**黃芩**傳之或**黃芩**傳之或**黃芩**傳之或**黃芩**
浸黃芩點之**黃芩**亦好

木舌證治

舌者心之候脾之脉絡於舌也臟腑壅滯心脾積熱氣上衝
故令舌腫漸漸脹大塞滿口中是為木舌若不急療必至害人
紫雪壹字研細**竹瀝**調下○又方**黃蜀葵**花研細**黃芩**半之同
研點此示次○又方**川朴**治貳分**紫雪**壹分**白鹽**半分同研每半
錢**竹瀝**井水調傳

滯頤證治

小兒滯頤涎流出而漬於頤間也涎者脾之液脾胃虛冷故涎
液自流不能收約法當溫脾

半夏

木香

丁香各半兩 川白薑生

白木

青皮

陳皮各貳錢半

右細末糕糊圓麻子大壹歲拾圓貳歲貳拾圓米湯灌下

喉痺證治

依

蛇退 燒存性為末

右每半錢乳汁調下或用**陸房**燒存性為末每半錢乳汁調下

語遲證治

言心聲也小兒受胎其母卒有驚怖邪氣乘心故兒感受母氣
心官不守舌本不通四五歲長大而不能言也**昌蒲**主之

昌蒲

人參

石昌蒲 麥門冬 去心 遠志 取肉薑製炒

川芎

當歸各貳錢 滴乳香 朱砂各壹錢 別研

右末煉蜜圓麻子大每服拾圓粳米飲下

桂

夜啼證治

夜啼小兒臟冷也陰盛於夜則冷動冷動則為陰極發燥寒盛作疼所以夜啼而不歇也

釣藤

伏神

伏苓

川芎

當歸

木香各壹錢甘草炙半錢

右末每服壹錢薑棗略煎服共或心熱而煩啼必有臉紅舌白小便赤澀之證

服蘇合香圓急以方術驅之

又方燈心燒灰存性塗薄乳上與之

眼病證治

眼睛白膜方

明白礬

鹽粉并研合研

右入

大匙以綿濾過點芥子許

耳病證治

耳者腎之候小兒腎經氣實其熱上衝於耳遂使津液雍滯為稠膿為清汁者此也亦有沐浴水入耳中水濕停留傳於血氣醞釀成熱亦令耳膿久不瘥變成聾耳

龍骨散

明礬

龍骨

各壹錢黃州

胭脂麝少許

右細末先以綿杖撚去水次以鵝毛管吹藥入耳本方加

標始末亦好

耳聾方

胡粉和東方壁土為末傳

又方

蝦蟇燒灰存性搗為末和猪膏傳

龜背證治

曾高脹滿其狀如龜此肺經受熱所致也乳母酒麪無度或夏月執煩熱乳與兒得之或乳母多食五辛亦成此候

川大黃

分

天門冬

杏仁

微炒

百合

木通

桑白皮炒

甘草蘆紙上炒

爛石膏各半兩

右末煉蜜圓綠豆大每伍圓食後臨卧熟水化下

龜背證治

嬰兒生下不能護背客風吹脊入於骨髓致之或小兒坐早亦致偃偻背高如龜背矣然此多成痼疾間有灼艾收功命俞第三椎骨下兩傍各壹寸半膈俞穴第柒椎骨下兩傍各壹寸半以小兒中指中節為壹寸文柱如小麥大但叁伍壯而止

臍病證治

安臍散治臍中汁出或赤腫

白石脂末焙出火氣傳之日叁度或**油髮灰**傳或**當歸末**傳

臍瘡當歸末傳**環玞灰**傳亦好

鶴節證治

小兒稟受不足血氣不充故肌肉瘦薄骨節呈露如鶴之膝抑亦腎虛得之腎虛則精髓內耗膚革不榮易為邪氣所襲百就

枯悴其殆鶴脚之節乎前項**錢氏地黃圓**本方加**鹿茸**酥炙川

牛膝各貳錢修合服餌壹同叁歲以下與拾圓叁歲以上與拾

伍圓

行遲證治

骨者髓之所養小兒氣血不充則髓不滿骨故軟弱而不能行抑亦肝腎俱虛得之肝主筋筋弱而不能束也

地黃圓方見腎痺門加**牛膝****五加皮**酒炙**鹿茸**

又方**虎骨圓**

虎脛骨酒炙生乾地黃 酸棗仁酒浸去皮炒香

白茯苓 辣桂 防風 當歸

川芎 牛膝等分麤

右者煉蜜圓麻子大每伍圓酒調下或煎木瓜湯下

五加皮散治小兒叁歲不能行

真五加皮體牛膝 酸木瓜乾各半分

雜証 竹葉小兒卷四

右為末每服壹錢半以粥飲調次入好酒貳點再調食前服日貳劑

癩疝證治

癩疝者陰核氣結腫大而吊痛也多因小兒啼怒不止傷動陰氣故陰氣下擊結聚不散而得之或胎婦啼泣過傷令兒生下小腸氣閉亦變此候惟是陰氣不得流行加以風冷入焉血水聚焉故水氣上乘於肺先喘急而後疝痛其狀有如李者亦有稀軟者亦有并腎腫大者亦有木硬者臍下痛楚皆不能忍用藥行心氣逐腎邪利其大小二便更無補法

五苓散 方見水飲門 木通 入少鹽煎湯調下以利小便

當歸散

辣桂

牽牛 微炒取仁 各半兩

當歸

北 大黃

桃仁 浸去皮半 各貳錢半

全蝎 壹錢半

右細剉每壹錢水入蜜煎服以利大便利後 青皮 陳皮 伏苓

木香 縮砂 甘草 和胃惡證唇青不治

川練散 治小兒疝氣小腹痛引腰脊牽曲身不能直

木香

檳榔

三稜

蓬木 炮

青皮 去白

陳皮

川練肉

芫花 米醋浸炒 各半兩

辣桂

牽牛 各三枚 杜川巴豆肉 壹斤

右細末飛麩糊圓麻子大每叁圓空心壹服午前壹服薑湯送下

送下

瘡癬證治

鯽魚方 治小兒白禿瘡

鯽魚 壹斤 重公肆兩 者去腸肚以 亂髮填滿 濕紙裹燒存性

雄黃 二錢

右同末生麻油調傳先以蠶水洗拭後用藥

又方 桑榆白皮為末 醋調傳

又方 練楔枝皮燒猪膏調傳

又方 蛇皮燒存性為末猪膏調傳

雜記

小兒疝氣

十一

漏瘡方

鍊成松脂末并髮灰生號丹填傳

諸瘡又不瘥方

白膠香半兩碾末（輕粉）貳錢研和猪脂調傳或

猪筒骨髓調（白膠）亦治大風即是（松脂）鎔煉投冷水中為末

水調空心常服

瘡方

治卒得癰瘡 赤爛牛糞燒灰研細傳

魚睛瘡方

瘡頭黑深破之黃水出四畔浮漿

蛇退皮燒存性細研雞子清調傳

雙蟻瘡方

燕窠土研細猪脂調傳

癩石

水銀壹分 胡粉貳分水研入雞冠血傳

前甲散

治小兒眉叢中生瘡名曰鍊銀癩

穿山甲前膊鱗炙焦為細末麻油輕粉調傳

附方

心散治小兒壯熱煩燥風熱上壅心經積熱口苦唇燥

眼澁多淚大小便秘澁

大黃濕紙

甘草炒

當歸酒洗

麻黃不去節

芍藥

荆芥穗各貳兩

白木各半

川大黃

右為粗末每服參錢水壹鍾（生薑）貳片（薄荷）參葉煎至五分

食後服

涼膈散

治小兒臟腑積熱口舌生瘡

連翹

甘草

黃芩

川大黃

朴硝

梔子

薄荷葉各等分

右剉碎每服伍錢（薄荷）伍葉（薄荷）少許煎至伍分食後服

大連翹飲子

治小兒上焦壅熱口舌生瘡小便赤澁

連翹

瞿麥穗

滑石

牛旁子炒研

車前子

赤芍藥各壹兩

木通

山梔子炒

川當歸

防風各半兩

黃芩

荆芥穗各壹兩

柴胡去芦

甘草各兩

蟬蛻去足

右剉散每服伍錢水壹鍾煎至伍分食後服

雜記

附方

十一

木通散 治小兒小脾蘊熱濕毒邪于留熱於膀胱故生陰瘡

木通 祛 篇蓄去毒各五子 大黃 赤茯苓去皮

并草 銘二 瞿麥去梗 滑石末 山梔仁

車前子 黃芩各二

右剉碎每服伍錢水壹鍾陰十根痛伍葉煎至伍分食

前服

臘茶散 治小兒陰囊生瘡疼痛水出久不瘥

臘茶 五倍子各五錢 膩粉少許

右為末先用葱椒湯洗然後用香油調貼

方治 陰囊生瘡疼痛

右先用山椒刺木槐皮柳枝蛇床子煎湯洗後用利硝為末

雞子清調敷

新刊仁齋直指小兒附遺方論卷之四終

新刊仁齋直指小兒附遺方論卷之五

瘡疹

瘡疹方論

小兒瘡疹大抵與傷寒相類發熱煩燥臉赤唇紅身痛頭疼乍寒乍熱噴嚏呵欠嗽喘痰涎傷寒證候類有之始發之時有因傷風傷寒而得者有因時氣傳染而得者有因傷食嘔吐而得者有因跌撲驚怒蓄血而得者或為鼠眼禁牙驚馬驚如風之證或為口舌咽喉腹肚疼痛之狀瘡從口腹中出故扁或為煩燥狂悶昏睡譫語之形或自汗或下利或發熱或不發熱證候多端卒未易辨方論所載以耳冷翕冷足冷驗之蓋謂瘡疹屬陽腎臟無證耳與翕足俱屬於腎故腎之所部獨冷然疑似之間或中或否不若視其耳後有紅脈亦縷為真於此可以稽驗矣調護之法首尾俱不可汗下但溫涼之劑兼而濟之解毒和中

瘡疹

新刊仁齋直指小兒附遺方論卷之五

附遺小兒卷五
安表而已如欲解肌葛湯或蘇可也其或小兒氣實煩燥執熾
大便秘結則與犀角地黃湯或參敗毒散葷或紫草散多服亦
能利之小便赤少者分利小便則熱氣有所滲而出凡熱不可
驟過但輕解之若無熱則瘡又不能發也已發未發並與參
飲為當虛者益之實者損之冷者溫之熱者平之是為權度借
喻而言亦如痲人籠蒸之法但欲其鬆耳如苟妄汗則榮衛既
開轉增瘡爛如苟妄下則正氣內脫變而歸腎身軀振寒耳孰
反熱眼合肚脹其瘡黑壞十無一生舌黑者尤難療何者瘡隨
五臟有證未發則五臟之證悉具已發則歸於一臟受毒多者
見之故肝臟水疱淡出如水小而色青肺臟膿疱其涕稠濁色
白而大心臟發斑血疱色赤而小脾臟發疹色黃微赤又小斑
瘡惟歸腎則變而黑焉青紫乾陷瘡疹屬陽本無腎證腎在臍
之下不受毒故無證陽取火也腎取水也以火用事為水所
制豈不殆哉然則欲救黑瘡將何如曰先瀉膀胱而後急溫脾

是尔錢氏云黑陷青紫者百毒下之不黑者謹勿下余知其
所下者瀉膀胱之邪也小兒腎主虛不可瀉但瀉膀胱以虛其
府則腎邪去矣又云下後身熱氣溫欲飲水者可治水穀不消
或寒戰者為逆余知其脾強者土可以制水也百毒太峻當
以宣風散代之瀉後溫脾則人參茯苓白朮等分厚朴木香三
草各半為妙蓋瘡發肌肉陽明主之脾土一溫胃氣隨暢獨不
可消勝已泄之腎水乎此錢氏不刊之秘旨也雖然瘡黑本為
惡證治之有方猶有幸而生者至於調衛之際乳母不能謹口
流毒於小兒或粥乳不時使之飢虛或衣被不週致傷風冷以
至閨房有觸外邪有忤則亦水硬變壞而歸於腎自我致寇又
誰咎耶能調衛者以溫散湯劑釀乳蔭之謹護風寒使之氣牀
和適其於粥餌則勿令飽而氣實飢而內虛斯得矣此尤在瘡
家垂意焉

瘡疹備論
附遺小兒卷五
二

瘡疹之論秦漢以來其詳可得聞也粵自扁鵲倉公作古以為
嬰孩湯散當先和節陰陽調治榮衛方利臟腑即熱氣漸解而
董及張漁初虞世栖真子諸醫認贅為嫡每曰瘡疹證候初愈
即疎利之以宣其毒又曰已出者不可疎利瘡出已定却用利
之余竊惑焉蓋嘗深索古書之意見其諄復持重不直曰利臟
腑而必以和陰陽調榮衛先之則知古人所謂利者暢達流行
之謂而非勇决峻下者此也如曰已患之後俗多禁餌大小便
不通不能調湯藥以和臟腑遂停敗熱於其間是古人之利大
小便不過調劑以和之而已如曰已出者可服平和湯藥療其
肝臟解其敗熱以防熱毒攻眼是其解熱又曷嘗不用和乎之
劑乎然則破諸家似是之非開後世未明之惑惟錢氏直訣朱
氏活人書其說為甚正錢氏療瘡疹證候惟用溫涼藥治之不
可妄下及妄攻發朱氏曰瘡疹已發未發但不可疎轉此為大
戒又曰瘡疹首尾皆不可下輒用利藥即毒氣入裏殺人以此

觀之瘡疹證狀雖與傷寒相似而瘡疹治法實與傷寒不同傷
寒所傳從表入裏瘡疹所發從裏出表蓋毒根於裏若下之則
內氣一虛毒不能出而返入焉由是土不勝水黑陷者有之毒
發於表若汗之則榮衛一虛重令開泄轉增瘡爛由是風邪乘
間變證者有之汗下二說古人所深戒也調解之法將何如曰
活血調氣安表和中輕清消毒溫涼之劑二者得兼而已溫如
當歸 **薄荷** **木香** **葶苈** 如 **前胡** **白芍** **升麻** 輩佐之以 **川芎** **芍藥** **枳**
殼 **桔梗** **羌活** **木通** **紫草** **甘草** 之屬則可以調適矣繼自今小兒
九覺身熱證似傷寒但未經瘡豆疑似未明且先與 **犀犀散** **參**
蘇飲 或 **人參** **羌活** **散** 輩熱甚則與 **升麻** **高麗** **湯** **人參** **敗毒** **散** **瘡**
豆 已出則少與 **化毒** **湯** 出不快者 **加味** **四聖** **散** **紫草** **飲** **子** **紫草**
木香 **湯** **紫草** **木通** **湯** 或 **快毒** **散** **紫瓜** **湯** 出太盛者 **人參** **敗毒** **散**
犀角 **地黃** **湯** 小便赤澀者 **大連** **翹** **湯** **甘露** **飲** **麥門冬** **五苓** **散** **大**
便秘 **結** **內** **煩** **外** **熱** **者** **小柴** **胡** **加** **枳** **殼** **湯** 或 **小** **少** **四** **順** **清** **涼** **飲** **咽**

瘡疹

行書小兒卷五

三

喉痛者**大聖湯** **葶子湯**喘滿氣壅者**麻黃杏仁湯**胃腹脹
滿者**枳殼枳梗湯** **二陳**加**枳殼湯**煩渴者**甘草散** **烏梅湯**下利
嘔逆者**木香理中湯** **甘草乾薑湯** 勿兒世利稠糞米泔用匙送
下未可與乳併入者 **加味四聖散**更以**胡麥酒**薄傳其身厚傳
其足噴其衣服併以厚綿蓋之若猶未也**獨聖散**入**麝香** **名酒**
調劑或不用酒則**木香**煎湯若其瘡已黑乃可用錢氏**宣風散**
加**青皮** **王**之然而瘡疹用藥固有權度大便小便不可不通其
有大便自調所下黃黑則毒氣已減不必多與湯劑但少用**化**
毒湯可也大小二腑一或閉焉則腸胃壅塞脈絡凝滯毒氣無
從而發泄眼閉聲啞肌肉黧然不旋踵而告變矣凡小兒先發
搗而後發瘡者生瘡已瘥而後發風或吐或瀉者死先發熱自
利而後瘡出者存瘡已發而後泄不止者亡瘡黑而忽瀉膿血
痂皮者順腹中有瘡也瀉血而水穀不消者逆脾胃虛也或瀉
血而瘡壞無膿者亦不可救胃爛也要之陽明主肌肉胃氣不

可一日而不強也世俗無知每見瘡疹不論男女稟受虛實藥
用**胡麥酒**以傳其身酒麪毒物以充其腹猥曰使瘡出快其間
兒氣素怯或遇天時陰寒猶可扶之而無恙設若春夏之間陽
氣發越或兒氣素強酒麪助虐則以火濟火胃中熱熾素蓄血
聚瘡出愈難亦或為之黑陷當此之時能用**化毒**煎湯入**生荷**
犀血和**腦子**少許以解之猶可措手或者更與熱毒之物遂使
咽喉結閉耳目口鼻腫滿悉平大便秘堅小便出血而死矣又
或妄施**巴粉**取積之劑則臟氣暴脫熱又不除邪氣愈甚變為
喘滿便血癰爛破裂而死矣吁自詒伊阻如是其可畏哉雖然
瘡亦有再發者特間有之瘡皮厚而色頑濁者發於臟其候重
瘡皮薄而色精明者發於腑其候輕臟熱則為豆瘡腑熱則為
細疹孰重者瘡亦重孰輕者瘡亦輕平復以還消解餘毒**甘露**
飲 **蘇飲** **人參** **活法** **葦常** **須與**之否則敗熱留滯肌肉之間
亦令凹者再發或癢黑而不變猶更飼之以毒必致發癩患瘡

瘡疹

小兒長生

可

腮腫臍疔眼翳之患瘡爛成片者**黃牛草**或傳膿多痛甚者乾
淨黃栢末傳之瘡遍口中痛不能食者**五福化毒丹**或生蜜
浸漬**黃連**取汁啖之為愈凡瘡欲成痂頰以**面油****乳酥****清蜜**潤
之可搗即搗血出無害若乾硬已久必成癩痕如茶如醋如猪
肝猪血之屬妄與食之則已脫之迹必為之黯慘然而瘡痂已
脫肌肉猶嫩不可盥洗太早亦不可以手加之也**蘭麝酒**能辟
惡氣左右所不可無或**養米****降真**用之亦可瘡曰聖瘡七日熱
而發七日泡而乾又七日則平復如舊矣大抵調順血氣溫和
脾胃均平冷熱則瘡出為甚易若實虛虛損不足而益有餘
則瘡出為甚難調解之法無以逾此故備論之以解世俗之惑
云脉證于後

瘡疹證候

瘡疹證候面色燥臉唇赤眼睛黃目胞赤四肢亦赤手足冷耳
尖令亂冷鼻冷身熱或乍凉乍熱頭痛腰脊痛咳嗽噴嚏呵欠
煩悶搖跳驚悸昏多睡小便赤少大便不通不惡寒惟惡熱
方其身熱未即發瘡迨其身凉然後發出。三部脉洪數往來
大小不應指而疾

瘡疹治法

一曰內虛泄瀉二曰外傷風冷三曰變黑歸腎蓋內虛泄瀉者
或因臟腑虛怯其證已逆初發以來自欲作瀉或未發之前誤
服涼藥以致泄下凡此者其瘡不發每形見小點淡紅而白或
白而微黃如水泡之狀治之當用**參苓白朮散****南木香**煎湯調
下先與止瀉然後以溫和之劑發之外傷風冷者或因煩燥惡
熱出頭露面點點方萌遽為風冷所折或瘡出如珠妄與解脫
以取涼快而風冷襲之凡此者輕則其狀如螿色紅而不發重
則陷如石巨脚色白而水能治之當溫血散寒邪用**不換金正**
氣散加**川芎**若惡寒畏人更加**官桂****紫蘇**然後與發瘡之劑或
內虛泄瀉或外傷風冷在并經日胃氣虧損由是而變壞焉故

令耳聾反執其瘡青紫變黑此則腎證曉然矣蓋腎屬北方水
是以其色黑其證逆治法先瀉膀胱之府而後急與溫脾若其
瘡不黑則斷非腎證謹不可下請詳審之。瀉膀胱法先用
枝方藥大散等分為末每服一錢棗湯調下次用**宣風散**一錢
加**青皮**煎服若瀉下惡物急以**溫脾湯**劑繼之。瘡且為陰邪
穢氣所傷亦令變壞可用**醋炭****蘇合香圓**解之

論升麻葛根湯

升麻葛根湯按和劑方瘡且已發未發者皆可服世俗習為常
談不問小兒虛實冷熱自首至尾率多用之甚者方發而不快
既發而復陷亦以**升麻湯**為常用之劑其為害可勝嘆哉何者
葛根解表**升麻**差寒小兒氣盛熱多服之猶可以消毒萬一內
虛胃弱則以水濟水寧不虧損胃氣水凝血脈而瘡疹轉為之
逆陷乎夫古人所謂未發者方身熱尚疑似之時也所謂已發
者既透徹欲成痂之候也嚼嘗以發而不快與發而復陷為可

用**升麻**哉若不辯明殆恐世俗相傳枉死者半矣又况人之齒
牙大執大毒或者相習變陷不透者不問虛實一藥用之其害
又有甚於妄用**升麻**之不審也蓋瘡且變陷有因外感風寒而
壓之者治法則當解散寒邪有內氣太實榮衛不得調暢而出
不快者治法則當流行氣脈安可驟曰冰冷直用**人牙**遂使小
兒服之鬱悶聲啞迨其發出稠疊異常往往治此而不救矣肩
不用**升麻****升麻****升麻**輩為愈哉

瘡疹惡證

瘡疹屬陽春夏為順秋冬為逆冬月寒盛腎水得時多歸於腎
或先如瘡後發渴其瘡色如黯血此腎證也不治。春體痘為
金尅木夏黑陷為水尅火秋斑子為火尅金冬疹子為土尅水
並逆。舌黑或鼻有黑氣並不治。瘡已出而謔語者為惡證
。操渴小便澀泄瀉不入食不治。瘡成餅搭黯慘不發其聲
焦啞不治。兩眼閉而黑睛濛昧無塊不治。面腫鼻陷目閉

頰齒者不治。頭面腫大瘡盡瓜破或臭不可近或脚冷至膝並不治。瘡小黑而焦風攻頤頰項腫硬或胷高而突並不治。

小兒諸病但見兩眼無精光黑睛無運轉目睫無峰芒如魚眼循眼之狀箇箇不治或神藏於內但外若昏困者無妨其有病篤而眼中神氣不脫者猶可以活眼者五臟六腑神氣之所養神氣已脫脈雖僅存亦未能保。

瘡疹證治 附眼藥

安胎散

前胡 去苗 人參 去苦 紫蘇葉 乾葛 洗
半夏 湯洗米次薑汁製炒 茯苓 去皮 枳殼 去穢
陳皮 去白 甘草 炙 桔梗 去芦
右以咀每服肆錢水盞半薑柴片棗壹箇煎陸分去滓微熱服不拘時

醒濕散

治小兒風熱及傷寒時氣瘡疹發熱

白茯苓 去皮 細辛 去葉 桔梗 瓜蒌根
人參 去芦 甘草 炙 白朮 川芎 各等分

右為末每服壹錢水小盞薄荷參葉同煎肆分溫服如要氣入生薑煎服不拘時

升麻膏

治大人小兒瘡疹已發及未發疑貳之間並宜服之方見瀉類

化毒湯

瘡豆已發以此消毒

紫草茸 半兩 川升麻 甘草 各貳分半
右剉散每服貳錢糯米伍拾粒同煎旋服

有風散

方見頭風門加 神效末治小兒疹豆或發透或未透忽

面青暴吼是為風邪所傷用此主之疹豆證以耳冷尻冷足下冷及耳後有紅縷驗之然須見心胃間細點如粟起則為真是

加味四聖散

治瘡豆出不快及變陷者

紫草茸 木通 南木香 甘草 等分

右麤末煎壹錢不時服大便秘加枳殼少許大便如常加糯米百粒糯米解毒能釀而發之

紫草 一兩

右剉細白沸湯大碗沃之蓋定勿令氣出逐旋溫服紫草能導大便發出亦輕

又方

紫草茸 一分 陳皮 半分

右麤末新汲水煎服

紫草不香湯治瘡出不快大便泄利

紫草 伏苓 白木 等分 甘草 炒少許

右入糯米煎蓋紫草能利大便米白米所以佐之也

紫草不通湯治瘡疹出不快

紫草 人參 木通 伏苓 糯米 等分 甘草 半分

右剉散煎貳錢溫服內虛大便利者可入南木香去紫草快藥散治瘡且出不快

紫草 木通 一錢 甘草 半分 人參 白芍藥 各一分

右剉散煎貳錢溫服

丝瓜連皮燒灰存性百沸湯調下

犀角地黃湯治瘡出得大盛以此解之方見聲音門

大連翹湯治瘡疹壯熱小便不通 連翹 瞿麥 荆芥 木通

瘡疹

車前子

赤芍藥

當歸

防風

柴胡

滑石

蟬殼

甘草各一錢

山梔仁

黃芩各半錢

右劉散每服壹錢加煎溫服

人參活散方見眼目門治小兒疹豆因服熱藥多發而不透

身體頭面兩目皆腫連日風搖奮身硬直羌活散并天麻防風

圓煎紫草調服

羊靛散方見積熱門五苓散方見水飲門

小柴胡湯方見寒類四順清氣飲方見積熱門

大如聖湯鼠尾子湯麻黃黃芩湯桔梗枳殼湯即活人書方

二陳湯方見痰飲

甘草散瘡豆略出煩渴不止

粉草微炙枯蔓根等分

右為末煎服壹錢甘草通血脉發瘡豆

烏梅湯瘡豆熱渴

小黑豆 菴豆各一合烏梅二箇

右咬咀新汲水壹椀煎取清汁旋服

木香湯即和劑理中加木香甘草煎湯方見活人書

加味四聖散方在前胡安酒或用酒煎或用熱酒澆亦得

獨聖散

穿山甲湯洗淨炒令焦黃

右末每服半錢入麝香少許薄荷煎湯調下或薄荷煎湯入

紅酒少許調下

宣風散

檳榔一箇 陳皮 甘草各一分黑牽牛二兩半生

右細末幼者半錢壯者壹錢蜜湯調食前服

宣風散方見和劑方

那末宣風散治腎證瘡豆亦多黑即宣風散加黃皮壹分氣怯者

痘疹

外加**南木香**壹錢每服壹錢蜜湯調下先下黑糞次下褐糞然後以和胃藥加**陳米**與之良久糞黃瘡自微出又以**竹園尿**煎酒傳其身即得發起

青皮

陳皮

桔梗

枳殼製

半夏製

川芎

木通

乾葛

甘草炒

紫蘇等分

人參減半

右剉散每瓶薑棗煎服

不換金正氣散

方見寒類

黃柏膏瘡疹初萌急以此防眼

黃柏去麤皮

新葇豆

紅花各一分甘草半錢

右為末麻油調為膏薄塗眼眶四圍頗用為妙或**臘脂**傳之亦可若用**指**尤先謹言

人參羌活散

治瘡且熱毒攻眼赤腫用**蠶豆皮**煎湯調下

豆皮飲

治斑瘡入眼生翳

白菊花

新葇豆皮

真穀精草各二分

右末每服壹錢乾柿一枚粟米泔壹盞同煎候米泔盡口喫柿乾日兩枚

標額散

斑瘡翳眼

真桑螵蛸壹分炙焦研

右細末入

少許每服壹錢米泔溫調臨睡服

治諸眼昏翳風痒方

真杏仁

杏仁柴水浸去皮尖

右細蠶和津液吞五更端坐常服

潤肝去塵滓也

又

生鱈魚以針刺其血磁器盛之點入翳上自愈

小兒方

一二歲發熱悉成瘡豆以此止之

附錄

付貴小兒卷五

生麻油

童子小便 各半盞

右逐旋夾和以柳枝頻攪令如蜜每服貳蜺殼許服畢令臥少時但參肆服大小便利身體熱退即不成瘡豆之證若形跡已露則不可服也

又方以手蘸麻油摩其背脊中間亦驗

灌藥服藥法

小兒前藥以銀盞約水半盞藥多又加多焉其或不能灌藥則以匙送下服藥未盡旋旋與之藥性溫熱乳食前服藥性寒涼乳食後少頃服和平之劑隨意無拘

察小兒眼中神法

凡小兒病證雖可畏而太衝有脉神氣夫能顧門未陷顏色指甲未至黧黑者猶可着力雖然五臟六腑之精氣皆上注於目望而知之當先以目中神氣為驗

附錄員論

原痘論

魏氏曰痘者豆也象其形而名之也順其形則順逆其形則逆以見前人命名之義有在矣蓋痘之為證根於精血之初而成於淫火之後男女交媾無欲不行無火不動欲因火生火因欲熾精行血就何莫而非火之所為且二五妙合精血鎔冶而成臟腑皮毛筋骨之形夫形既成而火即已中乎衆躰無象無其人可得而測耶毒中必發特俟其時耳俟時而發必假氣血有如真金雜銅須藉火之煅煉斯其銅可出故痘毒非氣弗領非血弗載使氣不盛則何能逐其毒血不榮則何能任其毒氣血運用領載之功不前又惡乎能解以此觀彼豈不明甚矣乎又若痘有稀稠乃受火有淺深之故而其吉凶生死亦皆于此焉分或遇天行時氣擊動而發者何也天地之沴氣與人身之遺毒同一毒籥相感而動如水流溫火就燥雲從龍風從虎之義而又人之真氣與客氣不容並立故也予嘗愍其刻害生靈非

痘疹

附錄員論

上

仁

天之設非火之罪誠父母之過也明者鑒之

看耳後紅筋點歌

兩耳紅筋痘必輕 紫筋次不定惶惶 急須用藥和臟腑
十可全兒三五生

戒燒香烟避穢

痘出之際有寺俗會用雜香柴燒煙避穢殊不知烟氣滿室濛
朧大人難以當之小兒焉能受乎觸傷肺氣惹兒咳嗽反為害
也戒之戒之只可以微微燒之蓋痘本屬於脾土以其屬氣
則和之脾土也

失於禁戒輕則變逆

生人往來 穢氣相觸 犯房室醉氣冲詈罵呼怒 婦人經

水 房內多燻 對梳頭 對搔癢 感冒風寒 房內太熱

乳食過節 食蜜 食紅柿 掃地

禁忌法

常和暖 節飲食 調理得宜 勿屠宰 勿飲食歌樂

勿煎炒炙燻 勿對面荒語 勿燒烟氣相觸 勿嘻笑 勿

僧道師巫入房內相見行淨蓋等罕有存心為念暈酒色慾者

多故反被厭耳戒之 勿用少年婦人入房恐苟合者恐經

水者故不淨者也新磚三塊燒熱常用清水於房門外漬可也

小兒麻痘脉訣

五指稍頭冷 驚來不可當 若逢中指熱 必定是傷寒

中指獨自冷 麻痘謔相傳 男左女右法 分明仔細看

察形

包血而成貧者氣之形也天之象也毒出血從氣交則貧必周
淨以見氣之制毒得其官矣附氣而成暈者血之形也地之象
也毒出氣從血會則暈必光明以見血之制毒得其職矣然如
氣和血就並行祛毒斯其邪正自分痘可不治而自愈苟或和
者亂而順者逆內力不王將見毒肆攻剝痒塌倒陷之患作矣
痘疹

治者當以實其肌表不使內虛崇其補益不俾毒勝度乎可也
不然員暈之形脫去雖力有接天下之溺者亦無如之何也已

驗色

五色者五行之精華也正則光而明衰則慘而暗五臟榮枯於
此可見矣故痘毒之出於臟惟利乎明不利乎暗光明者氣血
正也慘暗者氣血衰也氣位王而血得其令氣位衰而血被其
囚血非氣則毒不收氣非血則毒不化信乎痘毒必氣血而后
可以終始其功且夫色之**紅**者毒始出也**白**者毒未解也**黃**者
毒將解也**青**者毒盡解也**灰**者血衰而氣滯也**黑**者毒滯
而血乾也**焦**者氣血枯也如**紅**變**白**變**黃**者生**紅**變**紫**
變**黑**者死之兆也且毒出於五臟而毒不主一臟何前人言五
臟各主其色斯言謬矣予嘗究錢氏陳氏之論皆過於理有若
所謂變**黑**歸腎之說果何謂哉然五色固有之而又不載各臟
治法但用辛熱解毒發洩之劑若此不過攻毒動氣之術耳嗚

呼痘果可以如此一例治之哉須察形色之淺深辨邪正之善
惡治必固真氣以勝其毒斯為可也予曾試驗無失如此者豈
有顛沛之理歟

稀稠

溫火逆順毒受淺深痘之稀稠可見矣蓋稀如匝豆則毒不能
勝其氣血雖不治其邪自解間有氣血弱而為風寒所侵泄瀉
所陷毒藥所傷者亦有可死之理焉稠如**綴粟**則氣血不能勝
其毒其毒友勝火動生風鼓舞氣血氣血柔弱則無以當其邪
表裡為之不順榮衛為之不調十二經絡百脉七竅皆為壅塞
如此者可得而瘳乎間有氣血勝於毒者其形員淨不連其色
紅活不滯大加**保元湯**連進數服防其倒陷損瘳塌斯為要
法奈世之為醫者不此之悟也噫

痘疹當分輕重治之

病深藥淺不能去病病淺藥深直氣受弊。觀其外**黑裏白**者

痘疹

輕○外黑裏赤者微重○外白裏黑大重○青乾黑黑陷昏聩
 汗出不止煩燥熱渴驚啼腹脹大小便閉者困也○瘡中黑
 如針孔者劇○又有風邪搏于皮膚熱不得泄瘡變為癩疹皮
 膚瘙痒者輕○內先蘊熱外被風邪瘀血則赤斑亦深○甚者
 五內七竅皆有瘡用藥之法輕者宜勻氣全其自出半輕半重
 者宜解毒散則輕也重者利小便大重勢劇者當隨症滲泄熱
 氣衝心謔言妄語宜珠珀參苓之類○蒸于肝則搖擗狀如驚
 癩宜防風羌活天麻全蝎南星之類○蒸于脾則腹脹渴水目
 腫大便秘宜枳殼散橘蠶山支血黃之類○蒸于肺則喘急渴
 水欬嗽鼻乾宜桑白皮馬兜鈴半夏之類○毒氣歸腎黑監倒
 入者急用猪尾膏活血散○惟傷風傷寒亦為痘疹是汗下失過

治痘三法

痘者順逆險三者之象也順者吉之象也逆者凶之象也險者
 悔吝之象也吉者不必治之治之反凶凶者不勞治治亦無益

險者則可以治之治則轉色就安矣

魏氏三法圖式

初出乃陰陽交會之際不得其一故之圖式以觀其形分其氣
 血而治之九圈內白者屬氣也圈外黑者屬血也圈內之圈若
 陷也圈外散血不附也圈內黑者氣衰也圈外黑者血乾也圈
 內外黑者氣瘡血俱衰也

附痘圖式

氣學血分有佳

一二日初出之象如粟於口鼻腮耳年壽之間先發
 初出血點三兩點淡紅潤色者順之兆也順者不治自愈為

順○淡紅潤色得其正血得其行其毒不得妄行肆其虐也

始出逆形如蚕種○于天庭司空太陽印堂方廣之處先發者逆之兆
 也逆者不治為氣滯血滯致毒妄發陽位無以當其

逆○紫黑乾枯也逆者不治為氣滯血滯致毒妄發陽位無以當其

圖險圓暈成形勢也○雖稠而紅潤澤成箇者險之兆也險者毒雖犯
 乾紅少潤其氣血未固憂虞之象未可加治俟其氣血交會之

險○圓暈成形勢也○雖稠而紅潤澤成箇者險之兆也險者毒雖犯

毒發陽位者死後以保元湯加桂主之謹防氣洩血散將先速也

圓混圖

順○

氣溢血附
飽滿光紫

二三日根窠圓混氣之冲清也氣之冲滿必歸附為順者不治自愈為氣血得其道也

逆☀

氣失血散
枯死不榮

根窠無量氣離血散為逆逆者氣血交會不足致毒乘機而犯內也

險○

頂陷不滿
光紫有神

根窠雖圓而頂陷者血亦難聚為陰為氣弱不能領補其血也以保元湯加黃芩扶陽抑陰豈有不痊者哉

形圓而體天象
氣血成功而毒化

順○

氣滿血榮
鮮明光澤

四五日觀痘勢之形色則知氣血之旺弱受毒之淺深此治法之大要也其形尖員光澤六小一特氣和血就順也順者自愈為氣歸附各得其道而毒自什矣

逆☁

綿密如泡
黑紫乾紅

其形綿密如雲黑陷乾紅紫泡者逆也逆者不治為氣血相離縱毒內攻也

險○

根窠雖起
色慘不明

其形根窠雖起色不光紫生意猶在險也險而治為氣弱血盛勢雖挾毒犯上然得交會分明用保元湯如芍藥桂米助衛制榮斯為調理之妙也

色潤而現精華

形色圖

起發圖

順○

氣會血附
紅活鮮明

五六日氣盈血榮於內則發揚於外為順順者自愈為氣血豐厚毒受制也氣雖旺而血不歸附其

逆☀

氣背血離
乾枯綿密

色灰陷或紫陷或發為水泡痒塌為逆逆者不治為氣弱血衰致毒下陷而外剥也氣雖正血雖歸附不厚其色光白不榮為險險者易治為氣盈血

險○

氣陷血榮
色昏紅紫

弱不及歸附用保元湯加木香歸身助血歸附氣位以全中和之道也

盈虧變治見神功
氣血勝毒邪之毒

漿行圖

順○

氣化漿行
光紫飽滿

五六日氣盈血附其毒自化則成漿順也順者不治自愈為氣血得中其毒自解也

逆○

漿毒不行
神去色枯

○氣陷血衰其毒內伏伏則不成漿逆也逆者不治為氣血相離不能制毒而外剥也

險○

氣血少足
光潤有神

○氣交不旺血雖歸附不能成漿險也險者雖急治之為氣血少寒不能制作急投保元湯加桂米助其成漿而收濟惠之備功斯為治矣

痘疹

乾坤順造化之情

成漿而收濟惠之備功斯為治矣

痘漸收而毒益

順 ○ 氣足血微 七八日氣旺血附其毒化漿順也順則不煩治而自愈為氣旺拘血化毒之故也

逆 ○ 氣陷不滿 色枯乾紫 ○ 氣血乖離其毒不化漿逆也逆則難治為氣血不交不能振作以制其毒以發癰發疔者可生內剝外傷者必死

險 ○ 氣弱血附 光潤不枯 ○ 其氣血少緩毒雖化漿而不消險也險則可治為氣血有礙不能大振以保元陽加參發陽助漿斯可以保全生命矣

氣已滿而血賴天和而保命

漿 ○ 氣壯血化 八九日漿足氣血之功成矣氣血功成生命定矣如無他證順而也

逆 ○ 氣陷不滿 毒成外剝 ○ 漿不足者氣血盡矣氣血盡而大命臨之逆矣

險 ○ 氣平少冲 紅黃色潤 ○ 漿不冲滿血附綠紅氣弱而險也以保元陽加參以助其氣而駕其血斯漿成矣于此可見施治者之妙道也

漿足圖

順 ○ 氣足血微

逆 ○ 氣陷不滿 色枯乾紫

險 ○ 氣弱血附 光潤不枯 ○ 其氣血少緩毒雖化漿而不消險也險則可治為氣血有礙不能大振以保元陽加參發陽助漿斯可以保全生命矣

邪正明君三道

血 ○ 氣平血收 十一二日血盡毒解氣調漿足此生生自然之理也為順

盡 ○ 氣弱血凝 或血淡而漿薄或血凝而漿滯以見氣虧而毒不解為逆

險 ○ 氣必冲滿 血書薄不足溫潤不斂者內虛也為險以保元陽加參助其收斂結痂也

真元固氣血成功

結 ○ 氣血歸本 十三四日氣血歸本毒既殄滅漿老結痂順也

痂 ○ 神化功全 毒未脫形諸邪並作雖云結痂此其逆也

險 ○ 氣血不全 功成一簣 毒雖盡脫漿老結痂之際或有雜證相仍以保元陽隨證加減不可峻用寒涼大熱之劑恐致內損

痂

神化全而毒既

之患故也

血盡圖

順 ○ 氣平血收

逆 ○ 氣弱血凝 枯朽剝極

險 ○ 氣必冲滿 血書薄不足溫潤不斂者內虛也為險以保元陽加參助其收斂結痂也

痂

神化全而毒既

之患故也


此書無名感症和之六

還



氣血無恙十四五六日氣血功收痲落而無他證順之兆也
痲落痲明○痲未易落寒戰咬牙讖語狂煩疔腫作者無可生

元



氣血兩虧之路迷之兆也
天年盡矣痲落潮熱唇紅口渴不食者險之勢也以四君子湯

圖




氣血功收神化少全
加陳皮(吳)黃連(黃)湯甚加(參)苓(白)朮(散)不鮮以天連
香(散)去(黃)苓(主)之證去之後多有內損或余毒未鮮

○氣血偏勝受傷圖
此則尤為難治也

痘之初發陰陽交會不得其一則諸惡證生矣蓋氣血不能勝
毒甚至滅亡得其生者百有一焉予嘗闖其且之惡證七日前
後為陷為泡為腫為疔為痒塌為倒陷如此者有因毒勝而不
治有因毒勝而自痊難於知識療理惟其陽毒內潰媒孽於表
裡受傷之初又非氣血能勝其所勝而救其危也故另立治法
圖式開陳于後尚冀治是者當加慎密深為我而察之

頂陷圖

氣弱毒滯而成形




陽虛陰實
之象故性
好下陷也

血附救行而順道
證者生命不可保矣

七日前後五陷者氣不足也氣不足不能收血而毒
不能成漿蓋氣不勝毒故也七日前後見此宜治以
保元湯如身桂類米溫胃助氣又以水湯沃洗之
血不榮加歸至十一二日漿足或有之如血氣光澤
有起勢者亦不可過於治也深恐滿而過盛反虛百
骸或血如死灰漿不滿足其血雖附不榮而兼有內
證者生命不可保矣

倒陷圖



內外俱虛
之象氣血
勢離故前
而復陷也

兩儀通否治頓孤陽
輕視也

七日前後倒陷者氣血衰也七日後根窠發足漿行
之次因為氣陷毒即隨氣血而反陷也如血不走歸
附鮮明護衛之力猶在治必有可拯之理其血不顧
亦不挾毒內攻禍復起於蕭牆豈可救乎急以保元
湯加(參)苓(白)朮(散)渴以(參)苓(白)朮(散)又有峻用
發泄毒劑致傷元氣而氣血隨毒氣反陷伏者有之
用予保元湯者豈有是患誠謂一絲九鼎治者不可

痘疹

寸書卷之三

十一

毒聚燥厚之初

陽毒圖

外實內虛
陽之象也
故性外旺

七日以前陽毒者九瘡也或瘡未痊及初結痂內必虛毒受氣血相擊周流百脉必趨虛處而出也蓋陽瘡陰毒混雜一黨交勝諸毒而名之也其毒濕潤者為氣血俱盛而諸毒易成漿也其毒枯燥乾紅氣血俱弱毒與諸瘡相抗而俱不成漿也治法同彼頂陷如枯轉潤紅交白其漿自溢于此可見治者之功效也

功收裨補之後

毒聚於已發之未發

臃毒圖

功收於款危之未危



七日後發瘡者陽毒也疽之毒併聚一處而假其名也蓋氣血不能拘收乘載其毒使氣弱血盛陽分空虛血則載毒傳注四肢合處合者海也曲也發是也毒不成漿七日前後發者宜縱之發其毒併從此而出也若治其毒必從且而散內攻藏府必無可生之理如疽毒已解血氣豐盛宜解散其毒以解元湯如解毒湯主之為妙

疔毒圖

氣有全道之功

中實外虛
陰之象也
故性犯內

九日後發疔疔者釘也毒聚陽位聚而自成窠穴也蓋氣位弱而血分不密其毒性不能自散或聚結而成其形如氣固血盛則毒受制歸附宜有是耶結於四肢或大不近藏府雖抵穿筋骨者易治結於頭面腹背逼近於內者其勢必攻穿藏府難治如不穿者急治治不可加峻以保元湯加牛黃子當歸制不助氣逐毒待毒溢滿自釋矣

毒無立身之地
起風寒不測之端

內潰圖

腹形凶象也

七日以前內潰者胃爛也蓋因風寒所中腠理固密陰陽二分壅塞不通其毒內攻氣既不能拘血血又不能載毒藏府之間毒入泡熾則潰而成膿口舌皆白是其驗也如此尅害生靈何其慘毒識者知痘毒未出之時或有風寒阻隔氣粗熱盛身必戰動腹脹急痛謹防此患以和解毒湯逐散寒邪開泄腠理縱毒而出豈有是證者哉

絕天地有生之路

附錄小兒卷五

七

保元湯加減總要

夫痘世玄中消息醫崇心上工夫非刺繡雕刻之難豈象罔尋
獲之易彌縫造化起萬命於迷途窺竊刀圭收全功於反掌是
以**人參**益內**甘草**和中實表宜用**黃芪**助陽須憑官**桂**前三味
得三才之道體後一味扶一命之顛危**川芎**助清陽而調血
木溫中內以壯神**白朮**非泄利而莫投**木香**必積滯而可下
歸能活動其血對證方加**行**能收斂其陰合宜則用胃不實
始議**白朮****茯苓**瀉止即止心煩執急與**麥門冬****五味**渴除即除
皮解濕痰**黃連**退虛熱毒凝滯而不透**麥**當行氣鬱悶而不
通**山查**莫缺加之得當君子登堂用之不應小人入室寧可緩
治於尺寸不可縱步於毫釐毒雖繫天橫之機世可棄**保元**之
劑屢試屢驗能收百中之功原吉原凶獨攝一方之力變前人
之旨闡當世之幽坐悟行思少盤耳年小見回生起死敢當諸
氏大成匪我能之實天假也

保元湯

人參 二錢

黃芪 三錢

甘草 壹錢

右用水一鍾半**生薑**一片煎至五分不拘時服

論曰

保元湯即東垣所製**黃芪湯**見蘭室秘藏小兒方夫是湯之劑
不越**人參****黃芪****甘草**而已然此藥大抵性味甘溫專補中氣而
能瀉火故虛火非此不去也三味之劑借以治痘以**人參**為君
黃芪為臣**甘草**為佐上下相濟治雖異而道則同嗚呼製方之
義何其妙歟予嘗計其藥性之功用**黃芪**能固表**人參**能固內
甘草能解毒究其痘之宜治必須此三味之神品偶用他方而
更密察性味善惡之可否減削而成暗合前人之旨非為陋竊
東垣之製也今用以治痘令其內固外護扶陽助氣則氣于焉
而生血于焉而附氣血無恙斯一身之真元可以保合而無壞
亂矣區區痘毒藉此領載則何難出之有哉惟其是藥有起死

海參

付卷三

一七

回生之功有轉危就安之力予故借改爲保元湯也知我者諒
無罪焉或元氣血與毒本同一途何專理氣而不理血是亦一
偏之說也故惟痘之一證與他證不同痘出陰分先動其血惟
血本盛故能載毒使血一弱則何能有爲而毒不能以自出此
理雖然殊不知氣者又所以領載其血也若氣少餒則血無憑
藉彼毒又將何從而載行氣分哉故治痘當先治氣此不易之
常法也又曰血弱不能載毒奈何曰毒碎則貨也血碎則疽也
貨若無載何以能負載耶可見血虛則內虛內虛則痘不得出
血虛非倉卒可補故付之無可奈何又不觀孕婦出痘熱盛毒
壅其胎必落落則血去氣陷毒復歸內其人寧寘其生歟此證
血虛之驗或曰白木亦多益氣世多用之今不加入何也
曰否木雖益氣而性皆利燥淡泄通利水道之劑苟或用之則
津液隨水而下其濕潤生息之氣不行於上辟諸地氣不蒸天
氣不降尚何有天澤以救其物哉由是三焦爲之枯燥氣脈爲

之壅塞聚毒爲之不行毒潰皮肉間外刺之患其可復救乎或
曰辛物也痘已出熱之極矣今更用此誠恐重實之證生焉
曰是知雖辛而不知辛能發散且如毒壅於皮肉間與脈絡
之處苟非此劑推動其毒而毒能自散耶况此藥又能扶陽益
氣充達周躰翊助六經之力而成偉功也夫我所謂治痘當固
元氣者何也辟之用兵惟求主將無恙而已然後以戈甲曳兵
糧草濟其武功若主將不能勝任則其本先已搖矣雖有戈甲
糧草蟻疊如山將安施耶昔武侯未死而敵國不敢言戰武侯
已死而敵國即已據營豈非尤可信耶予故曰保元湯者治痘
之要劑用兵之要道也予愧淺識陋見但以年究理之心頗
得試驗故敢僭立是書少濟窮鄉僻壤行道不及之處也

保元湯 古方三日前後用

升麻 葛根 芍藥 甘草

右用水一鍾半 生薑三片煎至五分

和詳湯古方三日前後用

升麻

葛根

芍藥

甘草

人參

川芎

羌活

防風

右用水一鍾半生薑三片煎至伍分

四順清涼飲古方七日前用

大黃

當歸

芍藥

甘草

右用水一鍾煎至伍分

解毒湯古方十四日前後用

荊芥

甘草

粘子

右用姜一片水一鍾半煎至伍分

大連翹飲古方十四日後用

連翹

當歸

芍藥

鼠粘子

防風

荊芥

木通

滑石

瞿麥

蟬蛻

梔子

車前子

黃苓

柴胡

甘草

右用水一鍾半姜一片煎至伍分

參蘇飲

見前十四日前後服

四君子湯古方不物日例

人參

白朮

茯苓

甘草

右煎法同前

生脈散

古方不物日例

人參

五味子

麥門冬

右煎湯當茶與服止煩渴

甘桔湯古方不物日例

甘草

桔梗

右煎如前法

參苓白朮散

古方不物日例

人參

白朮

乾葛

茯苓

通麥

付貴小兒家五

二七

藿香

木香

甘草

右煎法同前

四苓湯 止水瀉

白朮

茯苓

猪苓

澤瀉

右用水一鍾煎至四分不物時服

白螺散 治痘瘡不收

白螺螄殼

不拘多少古醬上取

右用去土洗淨火煉紅取出存性為極細末瘡口濕更乾摻為妙

金華散 專治痘證後肥瘡疔瘡疥癬能收水涼肌解毒

黃丹

黃柏

黃芪

黃連

大黃

輕粉

麝香

右為極細末瘡濕乾摻燥用**臘豬油**熬化調摻

生肌散 專治疔蝕不斂并痘後膿血雜摻不收等瘡

地骨皮

黃連 炒

五倍子

甘草

黃栢

右為細末乾糝瘡上

已上諸品名方乃前人所製治各有條今刪入痘科協助**保元**以收圖治非常之効是以**升麻湯****解毒湯****四頂清涼飲**有開濟之能故用之於**保元**之前**解毒湯****大連香飲****參蘇飲**有治平之能故用之於**保元**之後**四君子湯****生肌散****白栢湯****參苓白朮散**有**保元**之能故用之於**保元**之後**四苓湯****生肌散**之間蓋諸名方雖世用功多克濟之患但不能獨用於痘科予取之不過**翊運保元**以濟陰陽虧盈之變是故治痘用藥之要始出之前宜開和鮮之門既出之後當塞走泄之路痲落已後清涼漸進毒已去盡補益宜疎如此者不得不錄以備危難其他雖有奇方異味疊見諸氏之書似不合人身氣血中和之道錄之何益

紫厚膏 治麻痘不快

痘疹

痘疹小兒卷五

十一

紫草 白附子各壹錢 麻黃去節 甘草各式
全蝎拾箇 僵蚕拾箇

右為末用蜜壹兩酒半盞入紫草煎數沸旋旋和入前藥丸如皂子大每服壹粒用紫草煎湯化下續用黃耆散調治此上等藥也紫草膏治瘡疽兼北藥治痘兼此藥治驚癇風疾又治瘡疽出不快如瘡初證似傷風傷寒驚風疑惑之間服之皆有主治不至敗事醫家常蓄為妙

猪尾膏

冰片 硃砂各壹錢 牛黃壹錢 一方加射香壹分
右為細末用活猪尾滴血為丸紫草湯送下

木香散

木香 大腹皮 人參去芦 桂心
赤茯苓去粗皮 青皮去穢 前胡去芦 半夏製
丁香 甘草各式錢

右每服水一大鍾生薑三片同煎空心溫服量大小加減服

異功散

木香 當歸各壹錢 官桂去皮 茯苓去皮
白木各壹 人參去芦 厚朴姜炒 肉苳蔻
丁香 陳皮 半夏姜製 附子炮去皮
右每服水壹大鍾半生薑伍片肥陳參枚同煎空心溫服三歲作三次服伍歲二次服一週兩歲作三五次服量大小加減

綿繭散

因痘瘡身體肢節上有疥蝕瘡膿水不絕者
用出蛾綿繭不拘多少以生白礬搥碎入綿繭內令滿以炭
火烧令白礬汁及出方取研細乾糝瘡上

麥湯散

治水痘
地骨皮 活石 甘草各半 麻黃去節
人參 大黃 知母 羌活

附錄

附錄下見卷五

十三

甜葶藶 各壹分

右為末每服水一盞入小麥七粒同十數沸服

蒼朮散 治痘瘡入眼

蒼朮

乾葛 各壹兩 槐花

藁本

蛇蛻

防風

枸杞

白蒺藜 各五錢

黃芩

川芎 各半兩

白菊花

木賊

甘草 各式兩

蟬蛻 四錢

乳香

沒藥 各半錢

硬石膏 煨半兩

右為末白水煎食後服加谷精草叁錢尤好

菊花散 治痘瘡入眼

白菊花

叁兩

菜豆殼

蜜蒙花

旋覆花

穀精草

甘草 各壹兩

右為末每二錢用乾柿一枚米泔一盞煎乾為度取乾柿食

後服之

○予觀世之治小兒痘疹方論不為不多而興喪得失難獲萬全予心嘗有不慊焉耳既而獲覩三山仁齋楊先生治痘疹之書造理甚明立方精粹超邁于辟書之右實痘科之要典也曩之所以不慊者今則豁然矣惜乎其狀痘之形色愈否未詳予則選附摘桂岩魏先生博愛心鑑順逆險三法形色圖象并保元湯劑經驗切要方論以補其不備是書誠如樂之大成綱裘綱領明白簡易便於檢閱庶幾有補于保初活人之功萬一云爾

小兒醫難於大人

夫醫之道誠為難矣故治小兒尤為難理寧醫十丈夫莫醫一婦人何也丈夫者榮衛氣壯婦人血脉相衝兼產難治千金云婦人之病比男子十倍難療寧醫十婦人莫療一老兒何也婦人者氣血尚盛老兒元陽枯竭氣血皆衰以為老兒難治寧醫十老兒莫醫一不語小兒何也老兒皆元陽皆竭氣血皆衰疼

痛即能言不語小兒者疼痛不能言精神猶未備骨氣猶未堅
形聲猶未正脈息猶未全所以難治者語不能問其得病之由
脈不能診其必然之理故黃帝云若吾不能察其幼小也寶鑑
云冠壯易明幼童難治孫真人云醫有十三科最難者無過於
小兒也

新刊仁齋直指小兒附遺方論卷之五



