



仁齋直指

八

特別
64
183
8



門 武  
編 183  
卷 8 止



醫學真經序

脈訣一書世之宗叔和者尚矣其間一

重複或有所未諭焉余於暇日采摭前古  
以叔和為經以百家為緯講明指要條析  
件畫目曰醫家真經經者理也發先哲未  
言之蘊而揆之理經者正也約諸子異同  
之說而歸之正譎視活法瞭然在目采之



有餘師茲亦叔和俟來者之意也劉元賓  
自序脉括有曰覽之者不知以我與叔和  
爲如何余則曰不知是篇與元賓之書又  
如何

景定壬戌七月既望三山楊士瀛登父序

新刊醫學真經目錄

### 察脉總括

三部九候論

臟腑部位論

診候論

脉病消息論

脉病逆順論

### 脉訣

臟腑定位

七表脉狀

八裏脉狀

七表主病

八裏主病

### 七表脉

浮脉病證

乳脉病證

滑脉病證  
弦脉病證  
洪脉病證

實脉病證  
緊脉病證

### 八裏脉

微脉病證  
緩脉病證  
遲脉病證  
濡脉病證

沉脉病證  
瀦脉病證  
伏脉病證  
弱脉病證

### 九道脉

附 雜證脉

長脉證狀  
虛脉證狀  
結脉證狀

短脉證狀  
促脉證狀  
代脉證狀

牢脉證狀

動脉證狀

心部諸脉證

肝部諸脉證

腎部諸脉證

肺部諸脉證

脾部諸脉證

五臟平脉

病脉大者順

病脉小者順

太衝尺脉

脾胃有脉

陰陽脉證順逆

温汗下脉法

有孕無孕脉

胎前脉

察病截法

五臟所主

心病虛實證

肝病虛實證

腎病虛實證

肺病虛實證

脾病虛實證

察色聽聲

面目察色

面色逆邪

口味

聲志

審慶

論崇脉

論絕脉

五臟脉候虛實冷熱引經用藥證治之圖



# 附藥象門

標本陰陽

用藥法象

藥象陰陽補瀉圖

用藥升降浮沉補瀉法

五方之正氣味

用藥報使

藥鑑

藥象氣味主治法度

藥性要旨

去臟腑之火

藥用根梢法

升降者天地之氣交

截氣法時補瀉法

用藥用方辨

藥性生熟用法

主治心法隨證治病藥品

五臟補瀉法

木火土金水此制方相生相剋之法惟老於醫者能之

五味之用

五入

五走

五走

五多五傷

天地生物有厚薄堪用不堪用

用藥九例

論用藥必本四時古人服藥活法

古人服藥有法

用圓散藥例

升合分兩

君臣佐使法

七方

十劑

新刊仁齋直指方論醫脈真經

寸六

十脈

脈圓滑

長合

脈直

脈弦

古入

脈洪

脈芤

五步

五步

新刊仁齋直指方論醫脈真經

三山名醫仁齋楊士瀛 登父撰次  
新安後學惠齋朱 崇正 宗儒附遺

# 察脈總括

三部九候論

三才天地人三部寸關尺凡人左右手分寸關尺者六脈之要  
會也寸部屬陽取法於天尺部屬陰取法於地關部陰陽相  
蓋取諸人合三部凡一寸九分寸在前尺在後而關處其中也  
從關至魚際陽得九分有奇數焉從關至尺澤陰得一十有  
數焉故關前為陽其脈常浮而速關後為陰其脈常沉而遲  
居兩境之間介乎一陰一陽上可以通天下可以通地陽出陰  
人以關為限也是以寸部脈病在頭目胃膈之上關部脈病  
病在腹脇胃脘之中尺部脈病在臍腹腰脚之下三部之內

各有浮中沉是之謂九候候者隨其浮中沉舉按而消息之浮  
為陽陽脈行之於皮膚沉為陰上脈行之於筋骨中為胃氣胃  
氣行乎肌肉之中浮者病在表沉者病在裏胃氣居中者其為  
入之本欵所謂魚際尺澤又不徙名也寸上一分掌骨後際如  
魚之頸際故曰魚際尺脈之外餘脈之不出如入深澤故曰  
尺澤有其名必有其義云九候俱為本

臟腑部位論

左心小腸肝膽美右肺大腸脾胃命此臟腑一定之位而男女  
不可易者也別而言之左手寸口心臟脈所出小腸為之府心  
與小腸合而居乎左寸一部也右手寸口肺臟脈所出大腸為  
之腑肺與大腸合而居乎右寸一部也左手中關肝脈出焉膽  
者府也肝合於膽而居左手之關右手中關脾脈出焉胃者府  
也脾合於胃而居右手之關美臟之脈出於左尺府曰膀胱各  
與膀胱合則左手尺部取之命脈之脈出於右尺府曰三焦

與三焦合即右手尺部取之腑者陽也其脈在表臟者陰也其  
脈在裏浮之為陽脈諸陽主熱沉之為陰脈諸陰主寒此臟腑  
之所以合氣而人身之所以具此陰陽也然左右手寸關尺六  
部五臟何以分定位耶曰心者君之火君取其尊火性上炎故  
居左寸肝者心之母上生心火木應東方故居左關腎者肝之  
母上生肝木水性就下故居左尺肺為五臟華蓋覆之於上金  
生養而居右焉故居右寸其所以下生腎水者順水之性而生  
之也脾為中州中央之土下稟心包絡相火之氣上生肺金故  
居右關上其所以為中也果非五臟之不可易者乎是固然爾  
胃與脾並位其應右關又何以氣行乎諸臟耶曰人以穀為生  
而受氣於穀上入胃而傳氣於臟腑五臟六腑皆取氣於胃其  
清者為榮其濁者為衛榮行脈中衛行脈外周養一身凡春夏  
秋冬俱以胃氣為本古人所謂精氣血氣皆由穀氣而生肉雖  
多不使勝食氣者是尔况失胃合土家之氣土者五行之主而

脈訣

浮中沉三候其中各有胃氣之脈存焉此其所以氣行諸臟也  
或者又曰小腸為受盛之府大腸為傳送之府膽者清淨之府  
胃者水穀之府膀胱精液之府府之名有五而謂六府何哉蓋  
三焦為右尺命脈之府自膈以上曰上焦位居膈中曰膈以上  
曰中焦位居中脘自膈以下曰下焦腎間之動氣應焉是三者  
蒸化水穀引導陰陽分別清濁宣行榮衛所以主持諸氣有其  
名而無其形者也然而右尺之命脈與右腎之命門又若同而  
實異耳右尺之命脈即心主包絡者是三焦為之府取象於相  
火相行真心君火之命宣流氣血一名膻中上朝腦戶下接元  
陽正氣與子午相為流通蓋得陰中養性之候難經有曰五臟  
六腑經十一耳其一經者心主脈也心主與三焦為表裏俱有  
名而無形復設圖而明之曰手厥陰心包絡之經者正謂此也  
右尺右腎之命門謂腎有兩物者是左為腎以藏志右為命門  
以藏精腎主納氣收血化精而運入命門長養骨髓故男則化

而為精女則盈而為月事兩者俱屬水而氣實相通難經有曰  
命門者諸神精之舍元氣之所繫男子以藏精女子以繫胞者  
此之謂也孝者但觀俗呼小便曰水大便曰火則知左尺膀胱  
停瀦腎水右尺三焦上熱穀食腎合膀胱左尺之脈純乎水命  
合三焦右尺之脈純乎火水火之義不待辯而自明矣然則右  
手尺部其經手厥陰其臟心包絡其腑三焦其名命脈決非命  
門君子於此宅見定為金匱玉函可隅反而類推矣雖然左心  
小腸肝膽腎右肺大腸脾胃命脈和挈而冠脈書之首者人不  
可以易此也復繼之曰女人反此背看之是豈五臟六腑其果  
倒裝於人乎吁是論男女尺脈沉弱浮盛之不同耳三陽從地  
長地氣上騰故男子尺脈常弱而沉三陰從天生天氣下降故  
女子尺脈常盛而浮男子陽多而陰少其脈多應於關上所以  
寸盛而尺弱女子陰多而陽少其脈多應於關下所以寸沉而  
尺盛故男子不可以久瀉女子不可以久吐男得女脈為不足

脈訣

卷之六十二



以陰主內故病在內女得男脈為太過以陽主外故病在四肢  
左得之病在右右得之病在左不足者虛太過者實二者皆不得其平夫是之  
謂反反之為義蓋男子尺脈當弱而今反盛女子尺脈當盛而今反弱故也否則如褚澄所謂婦人左手寸下之關為脾關下  
之尺為肺右手寸下之關為肝關下之尺為心自附黃說於反  
此背看之例寧不左道以惑衆耶五臟六腑對換易位況望其  
不謬於診耶世為神農李者當以尺脈第三同斷病之語為的  
大腸曰黃腸 小腸曰赤腸

診候論

凡人平旦陰氣未動陽氣未散飲食未進血脈未亂於斯時也  
清明在躬志氣如神一診之餘洞見所蘊若有緩急故不可以  
此為拘亦須扶持端坐平心定氣勿動勿言俟其定而後應之  
也下指之法三指齊按不若一指隨部之為精三指齊按可以  
定寸關尺之大略可以知浮沉遲數之大綱至於每部各有

中沉之候三部分而九候存焉若一齊率按於三指之間則心  
無兩用矣况夫心肺俱浮肝腎俱沉脾為中州自分高下而人  
之五指中指差長或伸或縮率按之次又有輕重之不齊乎蓋  
診者莫若但用一指隨部率按尤得其精凡三部之脈大約一  
寸九分人之長者僅如之而中人以下多不及此分寸也究其  
精微關之部位其肌肉隱隱而高中取其關而上下分之則人  
雖長短不侔而三部之分亦隨其長短而自定矣是必先按寸  
口次及於關又次及尺每部下指初則浮按肯息之次則中按  
消息之又次則沉按消息之浮以診其腑沉以診其臟中以診  
其胃氣於是率指而上復隱指而下又復按相進退而消息之  
心領意會十得八九然後三指齊按候其前後往來接續間斷  
何如耳肺之脈取以三菽在於皮膚心之脈取以六菽在於血  
脈候脾以九菽按至肌肉候肝以十二菽按至筋平若附骨而  
得率指來疾者其惟腎家之脈乎然而右尺之診六腑之脈又

何以權輕重耶曰尺澤之診雖當重手按之而右尺象火象之  
則洪而上也府為臟合氣其下者為臟其上者為府諸府之脈  
擊手取之可也新病之法四時四季以其當旺者為主五臟六  
腑候其盛衰之極者為病據此之脈驗彼之證灼見其腑臟受  
病之變隨其虛實而直指之立談可以決病机矣所貴先調我  
之氣然後可以取病人之息人以一呼一吸為一息一息之間  
脈四至者為平或五至而均調與四時相應者亦為損脈過則  
謂之至不及則謂之損至脈離經一息六至損脈離經一息兩  
至亡脈奪精一息八至損脈奪精一息一至離經者離其正經  
脈氣之數也奪精者精氣消神氣亂精神散脫之候也然則和  
平之脈何如哉曰不大不小不短不長不縱不橫不低不昂不  
緩不急不存不亡三部正等各得其常而且五十動而不止此  
五臟俱有氣者此其所謂和平之脈也否則尺寸參差上下乖  
錯心迷意惑動失紀綱益本重貽古人之浩歎哉雖然亦度其

脈與形氣相得乎否也有長短小大老幼強弱而脈如之性  
有剛柔緩急燥靜仁鄙而脈亦如之形氣不相得者病形氣損  
者危形氣反者斃脈乍疎乍數或離絕而不至者其斃可立待  
也何則人長脈亦長人短脈亦短肥者脈沉瘦者脈浮老者脈  
衰少者脈盛性急者脈疾性緩者脈遲性剛者脈燥性靜者脈  
和凡此皆順也則生也其或人長而脈短人短而脈長人大而  
脈小小而脈大人壯而脈弱人羸而脈強性急而脈緩性緩  
而脈燥凡此皆逆逆者幾何而不殆哉又况藜藿之腹與膏粱  
之腹不同膏粱之腹與純錦之軀亦異其於平時嗜好飲酒房  
勞與夫臨病之頃喜冷喜熱惡溫惡燥五色所形五味所欲萬  
不侔焉經所謂以所喜者誘之以所惡者攻之尤貴明辯審思  
而執劑也有能察其證之有表有裏驗其氣之有虛有實度其  
剛者之易為熱柔者之易為寒實則瀉之虛則補之不實不虛  
調而平之此則了然習次智與神融昌陽稀苓必有擇之精者

脈病消息論

脈者血也息者氣也脈不自動氣實使之然則人之脈息其氣血之先乎故氣血旺則脈盛氣血少則脈衰氣血熱則脈數氣血寒則脈遲氣血稿則脈澁氣血平則脈和消息盈虛其驗如此浮為風為虛沉為水為實遲為寒為滯數為熱為煩緊為痛為痼弦為勞為瘧洪為熱為狂隔為氣為聚滑為吐為實為下動為驚為痛為勞拘急則弦風結則緩氣聚則實氣乏則散急弦風熱洪數伏陽沉冷微寒伏積實痢澁為霧露緊為傷寒傷暑者虛微中濕者沉細衄失血而瀉血瘰濡虛損而弱筋痿風則浮虛寒則牢堅沉潛水蓄支飲急弦結甚則積甚結微則積微澁則血少而氣多滑則血多而氣少以至陽弦頭疼陰弦復痛陽微自汗陰微自下陽數即吐陰數即瀉陽微心寒陰滑食注陰陽即浮大之脈為陽勝病以晝加沉細之脈為陰勝病以夜作七表之脈屬諸陽腑病易治八裏之脈屬諸陰臟病難醫

知乎此則是脈之應是病者為可驗矣諸風掉眩皆屬於肝諸寒收引皆屬於腎諸氣奔鬱皆屬於肺諸濕腫滿皆屬於脾諸熱瞽瘵皆屬於火諸痛痒瘡皆屬於心數為病在腑遲為病在臟浮而盛者病在表沉而實者病在裏浮盛而緊者痛在外小實而緊者痛在內短而急者病在上長而緩者病在上下盛則氣高下盛則氣脹前大後小頭痛目眩前小後大胃滿氣短脈出魚際喘急逆氣呼吸不足胃中氣促上焦之病寸脈主之中焦之病關脈主之下焦之病尺脈主之某臟有證又以某臟之脈驗之積陰氣也陰沉而伏發有常處痛不離其部聚陽氣也陽浮而動發隨上下痛走注不常氣未實強謂之太過其病在外氣來虛微謂之不及其病在內內而不外心腹積也外而不內身有熱也下而不上腰足清也上而不下頭項痛也至如諸有水氣目下微腫蓋水者陰也腹者陰也目下亦陰也氣類相從有諸中必形諸外矣然而腎之與肺皆積水也其本在腎其

末在肺腎氣上逆則水氣乘於肺中故肺為喘呼而腎為水腫也知乎此則受病之更為可推矣冬傷於寒春必病溫春傷於風夏必殮泄夏傷於暑秋必殮瘡秋傷於溫冬必咳嗽喜則脈散而氣緩怒則肺激而氣上悲則脈縮而氣消恐則肺沉而氣下恐則上焦驚則脈澹而氣沉驚則脈動而氣亂寒則氣收熱則氣泄思則氣結勞則氣耗久視傷血久卧傷氣久坐傷肉久立傷骨而久行傷筋躰中有寒故筋急而攣痛躰中有熱故緩弛而不收痺者逢寒則皮中癢如虫行痺者逢熱則四肢縱而不就寒傷形而不傷氣寒則衛氣不相邑暑傷氣而不傷形熱則榮氣內消也大腸小腸有以寒作痛者有以熱為疼者有冷熱不調而踈數者五色見面黃赤者為熱白者為寒青黑則痛無疑矣大凡邪客皮毛則腠理開腠理開則邪入於絡脈絡脈滿則邪入於經脈經脈滿則邪入於腑臟履霜堅冰有其漸也其若脈來乍大乍小乍短乍長乍去乍來錯雜無尋此則

染崇致之知乎此則得病之源為可究矣諸脈實則瀉之虛則補之陰陽相搏損益治之弦遲微弱者可溫浮盛洪緊者可汗弦而小緊以至滑實與肌肉相得者可下勿汗沉弱勿下虛細勿吐脈微此為大戒所貴乎識病標本當觀其臟其脈受邪邪氣盛者直攻之病在於血當調其榮病在於氣當調其衛暑燥勝則與之消暑除煩之劑寒氣盛則與之溫中散寒之劑因濕得病為之滲其濕挾風受邪為之祛其風躰中有寒筋急攣痛則治之以溫躰中有熱萎緩不收則治之以寒用寒遠寒用熱遠熱寒者熱之熱者寒之散者收之抑者散之燥者潤之急者緩之堅者柔之脆者堅之有餘損之不足益之形不足則溫之以氣精不足則補之以味食酸以收之食甘以緩之食鹹以更之食苦以堅之泄之食辛以潤之散之酸走筋故收甘走肉故緩鹹走血故更苦走骨故堅辛走氣故散其高者因而越之以病在上而湧吐之也其下者引而竭之以病在下而利導之也

詳觀本草庶知其藥之療某病審問證狀庶知其病之用某藥  
證以脉辨藥因證尋其或上熱下冷上痞下利虛羸煩燥嘔吐  
內疼證候相反者又當精思審驗劑量增減而調護之知乎此  
則治病之方又有得其所謂活法者矣雖然浮與沉相若弦與  
緊略同緩似乎遲滑似乎數至於牢之與革伏之與沉瀯之於  
微虛之於弱大抵相類有如脉書所謂一陰二陽沉滑而長一  
陽二陰長而沉瀯一陰三陽浮滑而長時乎一沉一陽三陰沉  
瀯而短時乎一浮者是三部之脉鮮有單行學者又當於此而  
究心也叔和有曰在心易了指下難明亦在乎人熟之而已苟  
能熟之則浮沉相搏中風出血浮滑相搏中風吐逆浮實交并  
中風下痢浮弦交并中風拘急浮中之緊中風體痛浮中之洪  
中風發熱舉一為例餘以此推其義可迎刃而解矣  
素問云夫不得卧而卧則喘者水氣客之也  
水者循津液而流也腎為水臟主津液主臥

與喘也。凡肚皮痛者蓋脾虛不能制腎水  
水氣流注肌肉之間當用溫脾逐水等劑。  
虛腫用藥固當溫脾調氣逐水此不可無  
活血之劑蓋水淫肌肉之間則血化為水與  
之俱腐元虛腫者箇箇而黃身無血色黯慘  
不澤以此可知也

脉病逆順論見直指方一卷內

# 脉訣

臟腑定位

左心小腸肝膽腎

右肺大腸脾胃命

腎家之腑是膀胱

命脉外診三焦病

七表脉狀

按不足舉之強

脉中空有外傍

體如珠行有力

實形通壯而長 如平按絲弦狀 若牢繩急轉綱  
舉按之皆滿指 此為七表屬諸陽

八裏脈狀

脈微如有又如無 舉全無按有諸  
來散細軟如虛 伏須附骨其形隱  
似操刀輕刮竹 陰家八裏載醫書

七表主病

浮主中風 芤失血 滑吐實 澀分明別 弦為拘急 緊為疼  
若是來多發熱 八裏主病

七表脈

微寒 沉冷 風結 滯血須知其脈 伏則積毒 久寒  
濡弱 病家虛敗

者陽也按之不足舉之有餘滿指浮上

浮脈辨證

脈多因外中風 寸頭熱來攻 關浮腹脹胃虛  
尺見二便秘不通

主風虛風熱浮腫 鼻寒昏  
眩自汗喘嗽表熱裏虛其病在表

者陽也浮大而軟尋之中空傍實傍有中無沉按之間

芤脈病證

為血熱妄流行 吐衄源流寸口經 關上腸癰腹中瘵  
血流下部尺形

脈上為吐血衄血下為大小腸血 血熱流進風入腸胃  
婦人漏胎崩血 腸癰者腸裏生癰 肚皮光急如腫腹內

隱痛如塊 輕按則堅重按則痛 外證煩燥惡寒時吐痰沫  
酸水腸鳴水聲小便淋數大便頻併似積膿血雜之甚至  
透臍生瘡出膿或膿自臍中出

滑者陽也往來流利如盤中珠重手則伏不進不退

滑脉病證

滑脉胎胎嘔吐時

寸胃氣逆關胃裏

尺間停聚腸中痢

月信難通亦主之

滑主嘔吐血實氣壅痰逆痰聚宿食

不消小便艱澁上為吐逆下為氣結

實者陽也舉按不絕逼逼而長其動有力

實脉病證

實為痢疾毒陽居

寸實胃中熱有餘

關實疝來兼利痛

小便澁脹尺求諸

實脉主痢壅塞氣滯食積內疼伏

果冀狂語

弦者陽也按之不移卒之應手其來端直狀如絲弦

弦脉病證

弦勞瘵拘急然

寸弦寒痛搏寸前

關弦拘帶寒飲胃

尺脈沉間澁小便

弦主勞倦拘急血虛盜汗寒結氣凝冷痺疝痛

停飲寒癖瘕瘕之疾偏為飲瘕為脇痛

緊者陽也其來勁急按之則長舉之如牽繩轉索之狀

緊脉病證

緊為痰痛百骸同

寸驗於頭關腹中

尺部緊來臍下痛

執寒帶數則須痛

緊脉大抵痰痛在外則惡寒中寒實在內則伏陽在

病亦主風熱風痲有痛者可汗痲痲腹痛者可下

洪者陽也按之極大舉之亦然騰騰而上其動滿指

洪脉病證

洪之為熱屬於陽

寸主心胃及脇傍

關則胃間多熱

尺中尿澁應臍囊

痲痲表裏俱熱血熱頭痛咽燥

口乾煩滿發渴大小便不通  
八裏脉

者陰也指下依稀其來輕細若有若無

微脉病證

而為若本來寒 腹內疼分冷氣頑 寸口上焦寒冷

關於心胃尺脈間

主收血冷氣氣血俱虛寒虛汗虛驚

或衛虛膚空不能約制其血為崩中漏下之疾

者陰也輕手全無重手乃得此如綿裹砂之狀

沉脉病證

主水今冷氣攻 寸寒飲在胃中 關氣短心夜

尺數小便腰脚癢

主冷氣裏水停飲吞酸西脇氣脹手足逆冷温

冷利泄其病在裏上則胃中水結下 腎間停水

者陰也徐徐而來指下和軟尋之如楊柳舞風小於遲脉特  
一間耳

緩脉病證

乃風邪蘊結餘 寸於肩項及皮膚 關中胃弱風攻腹

尺緩脈寒足更虛

脈主風難筋弛風痺不仁風冷温氣氣乏耳鳴在上

則風牽頭項在下則脚弱不収惟脾脉緩大是為本体

者陰也輕手候之以 不 其來細而有輕刀刮竹之狀

大清似 而帶數 刮刮如也

瀋脉病證

為血滯痺之形 寸陽虛衛不行 心血氣衰關脉

尺間足冷腹雷鳴

主血少氣滯血痺作痛及風寒温合而為痺榮道澁衛

氣虛精元走女子有孕則主胎痛無孕則主敗血脉者



詳表先與溫血然後發散寒邪

者陰也重手按之隱隱且呼吸三至猶甚於緩但有力於

遲脈病證

遲脈為寒本積陰

寸遲心膈冷難禁 閉腹痛脾間冷

腰脚脘寒尺內季

主沉寒痼冷氣血俱寒腎虛陽痿其病在臟尺脈遲者

少血

者陰也沉隱不出呼吸全無重指著骨略得之矣

伏脈病證

脈根於積毒中

寸為氣逆聚於胃 當閉停癰兼溇泄

尺伏臍間疝瘕攻

伏脈宿食不消物積內滯陰毒伏氣真陽不行氣厥躄重

霍亂癰泄男女則為疝女則為瘕活人書伏脈寸得之為

熱天得之為寒關得之寒執不定

者陰也虛軟無力應指散細輕手不來重手却去

濡脈病證

脈真陽已久虛

汗多氣怯寸中 關力乏偏羸

尺部憎寒熱關膚

諸無血內損力疲血少氣虛陽微自汗勞熱外關下元

虛冷而細則傷溫

者陰也極軟而沉細怏怏不前按之似絕不絕率之則無

弱脈病證

脈如綿筋已痿

陽虛寸汗淋漓 至關客執胃虛其

尺酸疼關體肢

主痼冷虛勞陽虛自汗骨筋痿精泄氣散虛熱外關

元陽文虧

九道脈

者陽也率按如竿過於本位

長脈證狀

脈居申狀若竿 尋之太過度三關 胃間陽毒渾身熱 大抵通腸始得安

病主陽盛入裏三焦煩燥陽毒蘊蓄身軀壯熱通腸則安 者陰也狀如米粒倏去忽來中間右兩頭無尋之不及本位

短脈證狀

於筋上去來頻 中有傍無米粒形 宿食不消寒氣壅 長嘔短氣下之醒

病主氣急息短腹中停寒宿食不消三焦氣壅下之即愈 者陰也狀如柳絮散慢而遲舉按不足

虛脈證狀

軟而遲散漫耶 肉皮之上襲楊花 血虛主熱心驚悸 後汗癰腫補病家

陽衰陰盛力乏汗多恍惚易驚血虛生熱血氣俱竭小兒

虛風經云暑傷氣而不傷形脈亦虛也

者陽也貫珠而上促於寸口出於魚際尋之數急時以止而復來

促脈證狀

來頻數出於魚 急度關前若貫珠 血瘀肺心斑癍 漸加不退付長吁

病主拂鬱氣亂狂語心肺瘀血內已成斑然後發出 於外亦主面目生瘡蓋陽盛則漸退者生漸加心不能 救其不已是為孤陽絕陰

者陰也尋之狀如麻子旋引旋收聚而還散散而還聚時以 止而復來

結脈證狀

若回旋脈在皮 聚而還散往來遲 脾間積氣連心脹 腸痛肢疼略瀉之

脈其至

陰盛則結也脾間積氣脹滿攻心或氣塊癥瘕大腸必痛  
四肢為氣所妨經云甚則積甚結微則積微酌量疏利  
可也亦有思慮憂愁鬱而脉結

代者陰也動中有止不能自還因而復動由是復止尋之良久  
則起如更代之大抵形見於外

代脉證狀

代形筋肉動時浮搏起因而復止留口不能言元氣絕  
形骸枯痺病家憂

一臟氣絕餘臟代之而動也真元不守形骸枯痺口不  
能言必死之脉

牢者陰也狀如絃革而浮輕手則來動手則散此非牢  
牢脉證狀

牢似浮弦病主勞脉多居表附皮毛胃前氣促身紅腫  
水火相射命不牢

氣居於表七實裏虛氣促於胃前故不能喘息氣結於心  
屬之間故身軀紅腫此五勞七傷六極骨疼之危脉也  
疾則發熱牢而遲則發寒遲疾不常寒熱來往若而望  
是為寒結

動者陰也其狀如豆元元然動於內不往不來尋之却有舉之  
還無多在關部

動脉證狀

如豆子不流通其動常七隱肉中勞損崩中兼血崩  
內疼氣搏瘳無功

病主虛勞驚悸崩中脫血榮血又虛如是為氣所搏氣搏  
則內疼此篤證

細者陰也指下如絲如線不往乍來常有之特細耳

細脉證狀

細則如絲脉甚微往來皮下抑何稀脛痠腦冷精元泄

脉訣

識者如何不見幾

獨陰絕陽內外俱冷脛痠精泄髓冷腦疼力乏骨痠大腸

洞泄元氣備也又温家之脉細弱諸脉不專在補須以養胃之劑兼之乃所

以為用補之地

右七表八裏九道盖法象乎二十四氣

心脉形吐利紅

驚濡汗臟中空

溢関胃痛心煩燥

洪實煩疼面热風

實帶兮應舌強

痛無榮血少音容

微寒盡惕驚中热

急則溲腸痛不通

狂主虛飢單滑热

虛沉水逆刺心中

若還三部俱來數

狂燥唇瘡热極

肝部諸脉證

肝氣失血眼如遮

肢體俱癱面目斜

眼痛赤昏浮大欬

虛微氣乏眼生花

滑來血實頭風热

沉實而弦痰癖加

関溢筋疼頭目眩

緊為拘急挾寒邪

血虛脇脹其來

甚筋痿手莫拏

目翳淚疼多怒氣

三関盛肝家

腎部諸脉證

腎部如何細脉形

憂遺腸氣漏其精

急弦脐硬風攻腎

細弱精虛水道傾

滑溲腸淋乍痛

緊耳重不聞聲

散時髓冷腰間氣

沉緊腰疼跛驚行

邪急熱多應下血

小便秘並色驛七

真元虛敗皮膚搞

三部俱沉冷積成

肺部諸脉證

肺兼大便難

鼻不聞香噬轉乾

弦細骨蒸虛熱證

細來関熱又憎寒

滑而實大當疏利

咽燥毛焦療不難

有帶緊况為咳嗽

急滑咯血熱來干

溢為胃痛腸鳴氣

弦緩腸中冷結看

發熱惡寒流鼻涕

肺風三部各單

脾部諸脉證

脾兼胃上虛

消中飢渴日焦枯

中風涎出関中溢

脈快

卷一

十五

心下疼七實更籠

單(滑)痞妨兼執嘔

(微)客熱開肌胃

伏為癖積纏胃脇

肝勝而(弦)必告徂

(緊)則脾中疼欲吐

(時)食少轉清羸

三關俱(緩)脾家熱

嘔臭斷宣未得蘇

五臟平脉

(大)而散心之常

肝脉來(弦)細又(長)

肺(滑)短浮(脾)纒大

(沉)而(滑)腎家鄉

病脉大者順

傷寒發熱與狂顛

四外煩疼熱氣煎

水氣虛浮小腸氣

積成脹滿腹中堅

風寒留伏為頭痛

中毒流行聚惡涎

咳嗽暴來并執嘔

胃煩瘠渴瘴黃鮮

忤邪吐血咽喉閉

墜厥傷中痛內纏

(實)數(大)無足慮

(微)沉(細)弱恐難痊

病脉小者順

父嗽吐噦食難消

心腹虛疼上氣抽

氣怯染邪為腹脹

中風口噤或筋搜

汗之不止加身冷

厥逆煎寒重索裘

下痢泄殮并霍亂

金瘡傷重血頻流

衄尿唾吐兼腸如

產後傾紅月信留

(沉)細(虛)遲皆可治

(共)弦(數)實必難瘳

太衝尺脉

寸關無脉已沉昏

脚面猶兼尺脉存

此理恰如枝葉悴

尚餘生意在其根

脾胃有脉

尺中弱甚似無根

脾胃于今脉尚存

大腑色黃猶進食

斯人終不到泉門

陰陽脉證順逆

證屬於陽陰脉形

神丹執劑少安平

若還病候閉陰證

陽脉回時又却生

温汗下脉法

大凡温藥脉(沉)而(遲)

(浮)緊須知汗可施

脉若來長兼(沉)而(遲)

此為可下不須疑

有孕無孕脉

婦人月信不通行 尺脉求之滑動頓 斷絕其間無孕候  
來而不絕定懷身

胎婦脉

少陰動甚主懷胎 血旺諸經氣轉推 尺滑數兮中不絕  
雙關單胃難開 三部俱平等 流利相通疾往來  
下脉切繩珠轉狀 離經腰痛產相催  
察病截法

主風或風痺不仁

肝主風

大傷風草塞

傷於寒或中寒

寒痺

而主軍

胃寒

而脾寒

痼冷

乍疎乍寒熱

寒熱汗下

痲

主熱

結熱

胃執煩渴熱嘔

而心煩夜

心下熱煩亦主瘡渴

諸脉惟腎脉主瘡渴

心肝肺潮熱

虛熱

關脉胃熱

長滑胃熱

右尺洪大三焦熱

心肺吐血

肝或細而絕下血

骨血實

血崩

而堅血痺結

寸尺痺血挾熱為淋

痲痛

而痺痛

急痺氣

急疝瘕

痲痺

而駛刺痛

而脇下刺痛

而脇下痛

關脉而駛氣痛

而膏裏痛

關脉而細虫痛

主虫痛

肺急熱嗽

寸口氣逆喘息

肺滑大咳嗽

肺盛氣壅

大腹滿喘息

而滑吐逆

寸脉吐

脾滑嘔吐

而嘔吐

而宿食

而停飲

脾脉大有涎

而宿食

而宿積

而滑酒病食積

而穀不消

而積

主積

而積聚

而主中滿

而筋孳

肝筋攣急

客忤

堅發顛

狂

霍亂

不往不來卒中

二便澁 尺浮大二便澁

尺浮滑二便澁

尺數小便赤澁腎虛小便多

心脉盛腎脉虛赤濁漏精

心虛腎端而散少血漏精

諸脉弦尺脉瀾虛勞

脾脉弱手足乏力

脾瀾而瀾飲食不進

脾瀾嘔吐或飲食停滯

肺橫隔氣不升降

脾瀾而衄頭旋目暈亦主血瘀下部脉瀾男子失精婦人帶下

三部脉數形如釵股蠱毒脉瀾則生脉瀾則不保

五臟各有本體之脉但三部皆要和軟則有胃氣

五臟所主

精神聲舌掌皆心

血脉澁便汗可尋 肝主爪筋兼眼淚

藏魂生血貫衝任

腎司耳骨背腰脚 齒唾精元水實深

氣魄皮毛俱屬肺

腸喉鼻涕既蒸音 肚臍唇口并肢躄

延沃於脾好酌斟

皆以五行生慈論 要令和順莫相

心藏神肝藏魂腎藏志肺藏魄脾藏肉

心病虛實證

心虛恍惚且多驚 色少胃懷脹不停 膈膈背膺并脇痛

舌乾面赤實之形

肝病虛實證

肝實頭旋目怒紅 脇疼氣逆耳偏聾 如人將捕為虛證

筋脇拘攣兩眼濛

腎病虛實證

腎痿厥逆少寒時 腰脊骨疼數小遺 狂則腹澎而體腫

尿黃汗泄面眸驚

肺病虛實證

肺盛填膈嗽喘喘 背脊股脛尻疼多 喘乾咳血流清涕

弱狀無如氣乏何

脉訣

卷之二十七

藏神肝藏魂心虛則驚惕昏迷神不守舍而和氣得以其魂爾

論絕脉

彈石之脉狀如硬蛇觸石辟辟而急腎氣絕也解索之脉狀如繩索解脫散於兩傍後規精血竭也雀啄狀如雞雀啄豕止而復來多觀穀氣絕也屋漏狀如水滴地上久復賤起胃氣絕也蝦遊狀如蝦浮不動瞥去倏來神魂絕也尺脉連連如大蝦蟇者死魚翔狀如遊魚高泛頭定尾搖命脉絕也釜沸一脉如羹上肥涌涌而浮此陰陽之氣絕也所謂偃刀者如側刀刃其與痺石類焉若代若牢亦為危脉代者動中一止如更代之代牢似乎革經曰渾渾革至如湧泉謂出而不返也又曰牢而搏如意以累累然者死牢之與革無以異也前所論覆溢二脉自前前進上出於魚際者謂之溢自關後退下入於尺澤者謂之覆是皆陰陽不守離經無根必死之脉也凡篤病六脉濇刺按之無力若能月蒸挽得胃氣脉回三和緩謫謫而來必有生者

或一有濇刺而胃氣之脉不回是雖息數猶存終不能保其壽為證但見右尺命脉和軟而大厥疾其有瘳乎

新刊仁齋直指醫脉真經卷之一終

脉訣

十



新刊仁齋直指附遺方論藥象卷之二

# 藥象門

新增

出東垣試効方

標本陰陽

天陽無圓氣上外生浮升晝動輕燥六腑

地陰有方血下內殺沉降夜靜重濕五臟

東垣云治病者當知標本以身論之則外為標內為本陽為標陰為本故六腑屬陽為標五臟屬陰為本此藏府之標本也又五藏六府在內為本各藏府之經絡在外為標此藏府經絡之標本也更人身之藏府陰陽氣血經絡各有標本也以病論之先受病為本後傳流病為標凡治病者必先治其本後治其標若先治其標後治其本邪氣滋甚其病益畜若先治其本後治其標雖病有十數證皆去矣謂如先生輕病後滋生重病亦先治輕病後治重病如是則邪氣乃服蓋先治本故也若有中瀯

無問標本先治中滿謂其急也若中滿後有大小便不利亦無  
問標本先利大小便次治中滿謂其急也除大小便不利及中  
滿三者之外皆治其本不可不慎也從前來者為實邪從後來  
者為虛邪此子能令母實母能令子虛是也治法云虛則補其  
母實則瀉其子假令肝受心火之邪是從前來者為實邪也當  
瀉其子火也然非直瀉其火十二經中各有金木水火土當木  
之分瀉其火也故標本論云本而標之先治其本後治其標既  
肝受火邪先於肝經五穴中瀉榮心行間穴是也後治其標者  
於心經五穴內瀉榮火少府穴是也以藥論之入肝經藥為引  
用瀉心火藥為君是治實邪病也假令肝受腎邪是從後來者  
為虛邪當虛則補其母故標本論云標而本之先治其標後治  
其本既受水邪當先於腎經湧泉穴中補木是治其標後於肝  
經曲泉穴中瀉水是治其本此先治標者惟其至理亦是治其  
本也以藥論之入腎經藥為引用補肝經藥為君是也

用藥法象

天有陰陽

風寒暑濕燥火

三陰三陽上奉之

此溫涼寒熱四氣是也溫燥者天之陽也涼寒者天之陰也此乃天之陰陽也

地有陰陽

金木水火土

生長化收藏下應之

此辛甘酸苦鹹五味是也皆象於地辛甘者地之陽也酸苦者地之陰也此乃地之陰陽也

味之薄者為陰中之陽 味薄則通

酸苦寒平是也

氣之厚者為陽中之陽 氣厚則發熱

辛甘溫熱是也

氣之薄者為陽中之陰 氣薄則發泄

辛甘淡平寒涼是也

味之厚者為陰中之陰 味厚則泄

酸苦鹹氣寒是也

輕清成象

味之薄者

本乎天者親上

重濁成形

味之厚者

本乎地者親下

氣味

辛甘發散為陽

酸苦涌泄為陰

藥象

●中有陰陽中有陽

平旦至日中天之陽陽中之陽也

日中至黃昏天之陽陽中之陰也

合夜至雞鳴天之陰陰中之陰也

雞鳴至平旦天之陰陰中之陽也

故人亦應之言人之陰陽則外為陽內為陰言人身之陰陽則

背為陽腹為陰言人藏府中之陰陽則藏為陰府為陽肝心脾

腎肺五藏皆為陰膽胃大腸小腸膀胱三焦六府皆為陽所以

欲知陰中之陰陽中之陽者何也如冬病在陰夏病在陽春病

在陰秋病在陽皆實其所為施鍼石也

背為陽陽中之陽心也

腹為陰陰中之陰腎也

背為陽陽中之陰肺也

腹為陰陰中之陽肝也

此皆陰陽表裏內外雌雄相輸應故以應天之陰陽也

脾不主時於四季末各旺一十八日乃坤土也  
生化十一臟受胃之業乃能生化也

# 藥象陰陽



南方屬火  
北方屬水  
東方屬木  
西方屬金  
東南屬木  
西南屬金

苦補  
酸收  
甘和  
辛溫  
淡平  
鹹寒

苦補  
酸收  
甘和  
辛溫  
淡平  
鹹寒

# 補瀉之圖

苦藥平升微寒平亦升甘辛藥平降  
苦寒瀉濕熱苦甘寒瀉血熱



用藥升降浮沉補瀉法

肝膽味辛補瀉氣溫補瀉肝膽之經前後寒熱不

心小腸味酸補瀉氣熱補瀉心小腸之經前後寒熱不

脾胃味甘補瀉氣溫補瀉脾胃之經前後寒熱不

肺大腸味酸補瀉氣涼補瀉肺大腸之經前後寒熱不

腎膀胱味苦補瀉氣寒補瀉腎膀胱之經前後寒熱不

五藏更相平也一藏不平所勝平之此之謂也故云安穀則昌  
絕穀則亡水去則榮散穀消則衛亡榮散衛亡神無所居又仲  
景云水入於經其血乃成穀入於胃脈道乃行故血不可不養  
衛不可不溫血溫衛和榮衛將行常有天命矣

五方之正氣味

東方甲風木其氣溫其味酸在人以應之

南方丙熱火其氣熱其味辛相火包絡重之在人以小腸心

西方庚燥金其氣涼其味苦在人以應之

北方壬寒水其氣寒其味咸在人以應之

中央戊土其氣和其味甘在人以應之

素象

中方戊濕故其本氣平其兼氣溫涼寒熱在人以胃應之

土其本味鹹其兼味辛中駁吉在人以脾應之

西方庚燥辛金其氣涼其味酸在人以心應之

北方壬寒癸水其氣寒其味苦在人以腎應之

人乃萬物中一也獨陽不生獨陰不長道稟兩儀之氣而生化

也垂世立教不能渾說必當分析以至理而言則陰陽相附不

相附其實一也呼則因陽出吸則隨陰入天以陽生地以

殺陰藏此上說明補瀉用藥之一也故曰主病者為君用藥

之機會要明輕清成象重濁成形本乎天者親上本乎地者親

下則各從其類也清中清者清肺以助其天直清中濁者榮華

腠理濁中清者榮養於神濁中濁者堅強骨髓故至真要畧天

論云五味陰陽之用辛甘發散為陽酸苦湧泄為陰淡味滲泄

為陽味涌泄為陰六者或收或散或緩或急或燥或潤或而

或堅各以所利而行之謂其氣使其平也帝曰非調氣而得者

治之奈何有善無善何先何後顛倒具道曰有善無善所治為  
主適大小為制也云云君一臣二制之小也君一臣三佐五制  
之中也君一臣三佐九制之大也

寒者熱之 熱者寒之 微者逆之 甚者從之

堅者削之 客者除之 勞者溫之 結者散之

留者行之 燥者潤之 急者緩之 散者收之

積者溫之 逸者行之 驚者平之 上之下之

摩之浴之 薄者劫之 開之發之 適事為故

逆者正治 從者反治 從少從多 觀其是也

各安其氣必清必靜則病氣衰去歸其所宗此治之本財也○

帝曰反治何謂岐伯曰熱因寒用寒因熱用塞因寒用通因通

用必伏其所主而先其所因其始則同其終則異可使破積可

使潰堅可使氣和可使必已方制君臣何謂也曰主病之為君

佐君之謂臣應臣之謂使非上下三品之謂也帝曰三品何謂

藥象

岐伯曰以明善惡之殊貫也

用藥報使

太陽

羌活

下黃柏

陽明

白芷升麻

下石膏

少陽

柴胡

下青皮

太陰

白芍藥

少陰

知母

厥陰

青皮

柴胡

小腸膀胱屬太陽

藥本 是本方

三焦膽與肝包絡

少陽 柴胡強

陽明 大腸蕪足胃

高根 白芷升麻當

太陰 肺脉中焦起

白芷升麻葱白 鄉

脾經少與肺經異

升麻芍藥白者詳

少陰 心經獨活主

腎經獨活加桂良

通經用此藥為使

更有何病到膏肓

藥鑑

升生

風門

風屬陽也若行數變自外而入以鬱正氣故治風多行氣開表藥又風入久變熱也 能生痰宜用祛風化痰藥又熱極生風風能燥濃宜用清熱潤燥藥 行氣開表藥

羌活 性平 微寒 獨活 同上

防風 性平 微寒

細辛 性大 辛

升麻 性平 微寒 麻黃 性苦 辛

白芷 性平 微寒

藁本 性平 微寒

天麻 性平 微寒 秦艽 性平 微寒

威靈仙 性苦 辛

榮耳實 性苦 辛

蔓荊實 性微 溫 牡荊實 性溫

惡實 性平 苦

紫蘇 性溫 辛

薄荷 性辛 溫 荆芥 性辛 溫

祛風化痰藥

天南星 性苦 辛 何首烏 性微 溫

白附子 性辛 溫

皂莢 性平 辛

瓜蒂 性苦 寒

蠲蛇 性寒 非

蠍 性辛 辛

清潤燥藥

姜蘇微辛 白花蛇溫平 牛膝平 虎骨微

花平 密蒙花平 蒺藜子微寒 青箱子微寒

木賊微 白薇平 女萎平 巴戟天微溫

天竺黃寒 五加皮微寒 脾升麻、肺防風

主治各經風藥

肝川芎 心細辛 大腸白芷 小腸藁木

腎獨活 胃升麻

三焦 黃芪 膀胱羌活

治熱門 已上諸藥發散風寒升散鬱火兼治表濕之劑

治熱以寒之藥屬陰故治熱多陰藥又鬱火宜發散宜用風門藥火鬱則發之升陽散火也夫熱燥皆屬陽宜與治燥門通看

治上焦熱藥

黃芩平寒 梔子寒 沙參微寒 玄參微寒

前胡微寒 青黛寒 山豆根寒 百部根微寒

桑白皮溫 丹參微寒 白前微寒 桔梗微溫

治中焦熱藥

黃連寒 胡黃連平 連翹微寒 葛根平

香薷微溫 石斛平 滑石寒 石膏微寒

玄明粉寒 茵陳蒿平 大黃寒 芒硝寒

犀角寒 羚羊角寒

治下焦熱藥

蘇木寒 柴胡微寒 草龍膽大寒 防已平寒

車前子寒 地膚子寒 石菖平 通草平

地榆寒 苦參寒 秦皮寒 文蛤平

龜甲平 鱉甲平

主治各經熱藥

肝氣柴胡

心氣麥門冬

脾氣白芍藥

肺氣石膏

腎氣玄參

膽氣連翹

胃氣葛根

三焦氣連翹

膀胱氣石

大腸氣連翹

腸氣赤茯苓

包絡氣麥門冬

主治骨肉分勞發熱藥

肝氣柴胡

心氣生地黃

脾氣芍藥

肺氣石膏

腎氣知母

膽氣柴胡

胃氣石膏

大腸氣芒硝

小腸氣茯苓

三焦氣石膏

膀胱氣石膏

大腸氣芒硝

台濕閉

以上諸藥治上中下三焦內熱兼治濕熱之劑

濕因氣虛不能運化水穀而生宜用補氣除濕藥又宜調中消導藥行濕利大小便藥外濕宜汗散宜用風門藥風能勝濕也夫濕寒皆屬陰宜與治寒門通看

調中消導藥

蒼朮 性甘辛 溫性烈

半夏 性辛微苦 平性寒熱溫

橘皮 性苦辛 溫性寒

青皮 性苦辛 寒性寒

枳殼 性苦酸 寒性寒

枳實 性苦酸 寒性寒

厚朴 性苦辛 溫性寒

射干 性苦寒 寒性寒

旋覆花 性鹹甘 溫性寒

大腹皮 性微辛 溫性寒

白蘘豆 性微甘 溫性寒

大麥蘖 性鹹甘 溫性寒

神麴 性甘 溫性寒

山查子 性微辛 溫性寒

京三稜 性苦辛 平性寒

蓬莪朮 性苦辛 溫性寒

阿魏 性辛 平性熱

使君子 性甘 溫性寒

薏苡仁 性微甘 寒性寒

瞿粟殼 性甘 平性寒

行濕利大小便藥

猪苓 性甘淡 平性寒

澤瀉 性甘淡 寒性寒

瞿麥 性苦辛 寒性寒

紫草 性苦寒 寒性寒

木瓜 性酸 溫性寒

赤小豆 性酸甘 平性寒

百合 性平 寒性寒

葶藶 性辛 大寒性寒

牽牛子 性苦寒 寒性寒

大戟 性苦甘 寒性寒

芫花 性辛 溫性寒

甘遂 性苦 大寒性寒

海藻 性苦鹹 寒性寒

昆布 性鹹 寒性寒

主治各經濕藥

...



肝白木 脾白木 肺桑白皮  
 腎澤瀉 胃白木 小腸車前子 三焦陳皮  
 膀胱茵陳 大腸秦艽 心包絡茗

已上諸藥治上中下三焦內濕蒸補氣調氣之劑

**治燥劑**

燥因血虛而然蓋血虛生熱熱生燥是也宜用解熱生津藥及滋血潤燥藥夫躁熱皆屬陽宜與治熱門通看

解熱生津液  
 天門冬苦甘 麥門冬甘微苦 知母苦辛 貝母辛苦  
 稻樓根寒 枇杷葉平苦 五味子溫酸 地骨皮寒苦  
 蘭草辛甘 梅實酸平 馬兜鈴寒苦 疑冬花辛甘  
 紫菀溫苦辛 阿膠平微溫 訶梨勒溫苦酸 淡竹瀝甘辛  
 遠志溫苦 菖蒲溫苦 酸棗仁平酸 牡丹皮寒苦

**滋血潤燥藥**

生地黄大寒 熟地黄微溫 當歸辛溫 芍藥微寒 麻子平 杏核仁溫苦 桃核仁苦平  
 紅藍花苦溫 蜀葵花寒 郁李仁酸苦 蘇方木甘酸  
 梔實苦酸 栝實平辛 蒲黃平 牛膝苦酸  
 枸杞寒 肉蓯蓉酸溫 瑣陽甘酸 鹿茸溫辛

**主治各經燥藥**

肝當歸 心麥門冬 脾麻仁 肺杏仁  
 腎栝子仁 大腸硝石 小腸茴香 三焦山藥  
 膀胱茴香 心包絡桃仁

已上諸藥治上中下三焦內燥兼補血和血之劑

**治寒劑**

治寒以熱熱藥屬陽故治寒多陽藥外寒宜汗散宜用風門藥寒從汗解也夫寒濕皆屬陰宜與治濕門通看

**治上焦寒藥**

治中焦寒藥

附子辛甘大熱 烏頭辛甘溫 生薑辛甘微溫 桂枝

乾薑辛大熱 桂辛大熱 高良薑辛大溫 白豆蔻辛大溫

草豆蔻辛大溫 肉豆蔻辛大溫 莎草根辛大溫 縮砂蜜辛大溫

益智子辛大溫 藿草辛大溫 丁香辛大溫 巴豆辛大溫

蜀椒辛大溫 胡椒辛大溫 艾葉辛大溫 蕤子

白芥子辛大溫 萊菔子辛大溫 木香辛大溫 檳榔辛大溫

紫荊辛大溫 檀香辛大溫 常山辛大溫 草菓辛大溫

延胡索辛大溫 鬱金辛大溫 薑黃辛大溫 五靈脂

治下焦寒藥

菟絲子辛大溫 山茱萸辛大溫 懷香子辛大溫 吳茱萸辛大溫

補骨脂辛大溫 杜仲辛大溫 草薢辛大溫 烏藥辛大溫

主治各經寒藥

肝氣辛大溫 心氣辛大溫 脾氣辛大溫 肺氣辛大溫

腎氣辛大溫 膽氣辛大溫 大腸辛大溫 小腸辛大溫

三焦辛大溫 膀胱辛大溫 心包絡辛大溫 氣辛大溫

已上諸藥治上中下三焦內寒兼治濕寒之劑

治瘡

瘡屬熱毒故治瘡多清熱解毒藥亦因氣逆血滯又宜行

氣活血藥其內服藥已見於前五門下此惟贅其外傳藥而

已又有各門載不盡者亦附於此焉

傳諸瘡藥

白芨辛大溫 白欬辛大溫 五倍子辛大溫 商陸辛大溫

菴蔚子辛大溫 蒲公英辛大溫 狗脊辛大溫 蛇床子辛大溫

蕪荑辛大溫 雷丸辛大溫 松脂辛大溫 楓香脂辛大溫

乳香辛大溫 沒藥辛大溫 麒麟竭辛大溫 龍腦香辛大溫

麝香辛大溫 蘆薈辛大溫 樟腦辛大溫 丹砂辛大溫

雄黃辛大溫 水銀辛大溫 硃砂辛大溫 蓬砂辛大溫

瘡藥

無名異 凝水石 五石脂 石硫黃

礞石 砒霜 青礞石 伏龍肝

龍骨 牡蠣 斑蝥 蟾酥

鱖魚甲 烏賊魚骨 木蝨 水蛭

已上諸藥傳貼瘡腫及理氣血之劑

右五品藥性乃治風熱濕燥寒五氣切要之劑除治風門通  
用外治熱門宜與治燥門兼用治濕門宜與治寒門兼用熱  
燥屬陽寒濕屬陰故也蓋瘦人血虛多熱燥肥人氣虛多寒  
濕宜仔細分類治之

又按藥有寒熱溫涼平和之氣辛甘淡苦酸鹹之味升降浮  
沉之性宜通瀉補之能經曰補瀉在味隨時換氣故辛以散  
之謂散其鬱也甘以緩之謂緩其大也淡以滲之謂滲其內溫苦  
以泄之謂泄其火也酸以收之謂收其耗也鹹以軟之謂軟其燥  
也春氣溫而宜涼藥夏氣熱而宜寒藥秋氣涼而宜溫藥冬  
氣寒而宜熱藥若病與時病在上而宜升藥病在下而宜降  
藥病在外而宜浮藥病在內而宜沉藥故曰升降浮沉則順  
之謂順其藥之升降寒熱溫涼則逆之謂逆治其時之寒

藥象氣味主治法度

硫黃 酸大熱 治婦人陰蝕疽痔惡血堅筋骨除頭疣瘰癧心腹積

聚邪氣冷癰在脇效逆上氣脚冷疼弱無力及鼻衄惡瘡下  
部醫瘡止血殺疥蟲

雄黃 苦甘酸 治寒熱鼠瘻惡瘡疽痔死肌療疥蟲匿瘡目瘡鼻

中息肉及絕經破骨百般中大風積聚癰氣中惡腹痛鬼疰  
養精神安魂魄益氣明目通血服止煩渴

禹餘糧 味甘 治欬逆寒熱煩滿下痢赤白血閉癥瘕大熱

代赭石 苦甘寒 主鬼疰賊風蠱毒殺精物惡鬼腹中毒邪氣女

子赤沃漏下帶下百病產難胎衣不出墮胎養血除五臟血  
脉中熱血痺血於大人小兒驚氣入腹及陰痿不起

**鹽** 辛微寒 治吐逆反胃驚癇癩疾除熱下氣止小便利除毒

**熱筋變經** 奢溢血又云顛心安神止吐血

**結去血閉** 停痰痞滿消毒揉細生用

**痰實結轉** 通經脈及月水破五淋消腫毒療天行熱病經云

**熱淫於內** 治以鹹寒此之謂也

**赤石脂** 酸辛溫 主五臟氣明目益精療腹痛泄瀉下痢赤白小

便利及癰疽瘡痔女子崩中漏下產難胞衣不出久服補髓

好顏色益志不肌輕身延年五色**石脂**各入五臟補益經云

澁可去脫**石脂**為收斂之劑胞衣不出澁劑可以下之赤

丙白入庚 治寒熱世瀉下痢白沃陰蝕惡瘡消痰止渴除癩

**天龍肝** 辛溫 治婦人崩中吐血止欬逆止血消腫

**治虛勞** 自汗補肺氣實皮毛瀉肺中火如脉弦自汗

脾胃虛弱亦善治瘡瘍血脈不行內托陰証瘡瘍必用之

**人參** 甘溫 治脾肺陽氣不足及肺氣喘促短氣少氣補中緩

瀉脾肺胃中火和若治短氣少氣非升麻為引用不能補上

升之氣升麻一分人參三分可相得也若補下焦元氣瀉腎

中火茯苓為之使其草稍子生用為君為主善去莖中痛及

草甘平 生用大瀉熱火炙之則溫能補上中下三焦元氣調

和諸藥相協共為力而不爭性緩善解諸急故有國老之稱

**白朮** 苦甘溫 能除濕益燥和中益氣利腹脘血除胃中熱

**茯苓** 甘平 能止渴利小便除濕益燥和中益氣利腰脘間血為

主治小便不通溺黃或赤而不利如小便利或數服之則大

損人目如汗多人服之損元氣天人天年名醫云赤瀉白補  
上古無此說

澤瀉 其微鹹平 除濕之聖藥治小便淋瀝去陰間汗無此疾服  
之令人目盲

猪苓 其平 除濕比諸淡滲藥大燥亡津夜無濕証勿服

燈草 其平 通陰竅澁不利利小水除水腫癰閉與琥

珀同

滑石 其寒滑 治前陰竅澁不利性沉重能泄氣上令下行故曰

滑則利竅不可同淡滲諸藥同用

葵菜 其寒滑 能利大便小便目病人不可服諸熱病服之令人

目盲

蒼朮 其溫 主治與白朮同若除上濕發汗功最大若補中焦除

濕力小如白朮

白芍 其酸微寒 補中焦之藥得炙甘草為輔治腹中疼之聖藥

也如夏中熱腹疼少加黃芩其痛立止若病人春莖及秋三時

腹疼亦少加黃芩若惡寒腹疼只少加肉桂一錢白芍三

錢多黃芩一錢半此三味為治寒腹疼此仲景神品藥也如

深秋腹痛更加桂二錢如冬月大寒腹中冷痛加桂作二錢

半水二盞煎服

肉桂 大辛熱 補下焦熱火不足治沉寒之病及自汗春夏二時

為禁藥也

當歸 其溫 能和血補血用尾破血身和血先使溫水洗去土

酒製過或焙或燉乾方可用入藥血病須用

熟地黃 苦寒 酒酒久蒸如烏金假酒力則微溫大補血衰乏人

須用之藥善裏鬚髮大忌食蘿蔔

生地黃 苦寒 涼血補血補腎水真陰不足此藥大寒宜斟酌用

之多服恐損人胃氣

川芎 辛溫 補血治血虛頭痛之聖藥也如妊娠婦人胎不動數

藥

月加當歸二味各一錢半或二錢水煎服之神驗

膚皮微苦溫

能益氣加青皮減半去氣滯能推陳致新若補脾

胃不去白若理胃中補肺氣去白用紅

厚朴

辛溫此系色厚者佳

能除腹脹若元氣虛弱雖腹脹宜斟酌

用之如寒脹不可用多是大熱藥中兼用結者散之神藥也

服脫元氣切禁

柴胡

微苦平

除虛勞寒熱解肌熱去早晨潮熱此少陽厥陰行

經本經藥也婦人產前產後須用此藥善除本經頭疼若本

經病非他藥能止也治心下痞胃脇疼神藥也

升麻

苦平微寒

此足陽明胃足太陰脾行經藥也善補其脾非

此藥為引用行其本經不能補此二經若得蒼白香白芷之

類亦能走手陽明太陰非此四經不可用也能解肌肉間

此手足陽明經傷風之的藥也

葛根

甘平

治脾胃虛而渴除胃熱善解酒毒通行足陽明經之

藥也

枳殼 苦寒 治脾胃痞塞泄肺氣

積脚

辛溫

治後重如神性如鐵石之沈重能墜諸藥至於下極

梔實

微苦寒

利胃中氣消積上疾

半夏

辛苦熱

治寒痰及形寒飲冷傷肺而咳大和胃氣除胃寒

進食治太陰經痰厥頭疼非此藥不能除也

天南星

若平

治形寒飲冷傷肺風寒痰嗽

佛耳石 治寒嗽及痰涎除肺中寒大升肺氣少用欬多花

為之便過食損目

草豆蔻

辛熱

治風寒客於胃口善去脾寒及客寒心疼胃疼

如神

益智仁

大辛熱

治脾胃中受寒邪和中益氣治多唾當於補中

藥內兼用之不可多服

吳茱萸

辛苦大熱

治寒在咽嗑壅塞胃甘南不利經言南咽不通

藥象

本草綱目卷一

十一

食不下令人口開目眩寒邪所隔氣不得上下此病不已令人寒中腹滿腹脹下泄寒氣如神諸藥不能代也

牡丹皮 其寒治腸胃積血及衄血吐血必用之藥味也

羌活 苦甘平微温 治支節疼痛為君通利諸節如神手足太陽風藥也加川芎治足太陽少陰頭疼藥也

獨活 苦甘平微温 足少陰腎經行經藥也若與細辛同用治少陰經頭疼如神一名獨搖草得風不搖無風自搖動

防風 辛温 療風通用為肺實如神散頭目中滯氣除上焦風邪之使藥也畏服為人工焦元氣

藁本 大辛温氣力雄壯 此太陽經風藥也治寒邪結鬱於本經治頭疼腦痛大寒犯腦痛齒亦痛之藥亦治風通用氣力雄壯也

細辛 大辛温 治少陰頭疼如神當少用之獨活為使為主用藥也

葛根 辛凉大輕清 治太陽經頭疼頭昏悶除目暗散風邪之藥也若胃氣虛之人不可服恐生痰疾

石膏 大寒非辛 治足陽明經中熱發熱惡熱燥熱日晡潮熱自汗小便滑赤大渴引飲身體肌肉壯熱苦頭痛之藥白虎湯是也善治本經頭疼若無已上證勿服多有脾胃虛勞形體病證初得之時與此有餘證全醫者不識而誤與之不可勝

抹也

香白芷 大辛温 治手陽明經頭疼中風寒熱解利之藥也以四

味升麻湯加之通行手足陽明經也

黃蘗 大苦寒又辛寒 治腎水膀胱不足諸痿厥脚膝無力於黃耆湯中少加用之使兩足膝中氣力如漏出痿即去矣蜜炒

為細末治口瘡如神難瘥必用之藥也

知母 大辛寒又苦寒 為足陽明經火熱聖藥也之寒益腎水膀胱除煩熱止消渴治骨熱勞熱補中益氣止嗽潤心肺鎮驚悸

藥象

黃芩 微苦寒 治肺中濕熱療上熱目中赤腫瘕肉盛必用之藥  
泄肺受火邪上逆於葛上肺中補膀胱之寒不足乃滋其化  
源藥也

大黃 苦寒 其性走而不守瀉諸實執不通下大便瀉腸胃間熱  
專治不大便

漢防已 大苦寒 療腰已下至足濕熱腫盛脚氣補膀胱去留熱  
通行十二經

草龍膽 大苦寒 治兩目赤腫睛脹瘕肉高起疼痛不可忍以柴  
胡為主治療眼中疾必用藥也

黃連 苦寒 瀉心火除脾胃中濕熱治心煩惡心鬱執在中焦元  
元欲吐治心下痞滿必用藥也仲景治九種心下痞五苓瀉  
心湯中皆用之

炒麴為細末大熱消食治脾胃食不化須於脾胃藥中加之  
麥蘖炒黃色取麴補脾胃虛寬腸胃

五味子 酸溫 大益五藏氣孫真人云五月常服五味子以補五

藏氣遇夏月季夏之間令人困乏無力無氣以動與黃耆人  
參麥門冬五味子少加黃蘖剉煎湯服之使人精神神氣兩  
足筋力涌出

天門冬 微苦寒 保肺氣治血熱浸肺上喘氣促加人參黃耆為  
主用之如神

抵仁 辛甘潤 治大便血結血秘血燥通潤大便七宣元中用專  
治血結破血

郁李仁 甘潤 治大便氣結燥澁帶不通七聖元中用專治氣燥  
大麻子仁 辛甘潤 治風燥大便不通

皂角子仁 辛燥潤 其性得濕則滑亦治風在腸中為燥結不通  
杏仁 甘潤辛潤 除肺中燥治氣燥在胃膈

白豆蔻仁 大辛溫 瀉散肺中滯氣  
縮砂仁 辛溫 治脾胃氣結滯不散  
藥象



木香 辛苦温

除肺中滯氣若瘵中下焦氣結滯須用擯柳為使

麥門冬 微苦寒

治肺中伏火脉氣欲絕加五味子人參三味水

煎服為之主

脉散補中元氣不足須用之藥

黑附子 大辛熱

其性走而不守亦能除胃中寒甚以白朮為佐

謂之木附湯除寒濕之聖藥也温藥中少加之通行諸經引

用藥也治經閉

川烏 大辛熱

瘵風痺血痺寒痺半身不遂行經藥也

玄參 微苦寒

足少陰腎經之君藥也治本經須用

山梔子 微苦寒

治心煩懊懣欲眠而不得眠心神顛倒欲絕血

滯小便不利

葳靈仙 苦温

主諸風温冷宣通五藏內癱滯腰膝冷痛

天麻 甘平

治風痰眩暈頭痛

薄荷葉 辛苦

瘵賊風傷寒發汗主清利頭目破血利關節治中

風夫音小兒風痰新病差人不可服之令虛汗不主

酒毒

鼠粘子 辛平

主明目補中除風出癰疽瘡頭治咽膈不利

桔梗 辛苦微温

治咽喉痛利肺氣

麻黃 苦微温

若去節散太陽少陰汗不去節止太陽少陽經汗

荊芥穗 辛温

清利頭目

乾姜 大辛熱

治沉寒痼冷腎中無陽脉氣欲絕黑附子為使多

用水同煎二物

姜附湯是也亦治中焦有寒

蜀椒 辛温熱

主效逆上氣散風邪温中明目下乳汁

茴香 辛平

主諸痿霍亂治脚氣補命門不足并腎勞疝氣止勝

膀胱及陰痛開胃下食助陽道理小腸氣

丁香 辛温

温脾胃止霍亂消痰癖氣脹及胃腹內冷痛

紅花 辛温

主產後血運口噤腹內惡血

藿香 其微温

助脾胃治嘔吐瘵風水毒腫去惡氣霍亂心痛

乾生姜 辛大温 主傷寒頭痛鼻塞上氣止嘔吐治痰嗽與生者

並相同與半夏等分主治心下急痛

良薑 辛大热 主暴冷胃中冷逆霍乱腹痛解酒毒

玄胡索 辛温 主破血止少腹痛產後諸疾婦人月事不調

青皮 辛温 主胃膈氣滯下食破積

蓬莪朮 苦辛温 除積聚

當歸稍 甘辛温 主癥瘕破惡血婦人產後惡物上衝去諸瘡瘍

療金瘡惡血温中潤燥止痛

阿膠 甘平微温 主心腹内崩補虛安胎堅筋骨和血脉益氣止

痢

何黎勒 苦温 主心腹脹滿不下飲食消痰下氣通利津液破胃

結氣治久痢療腸風瀉血

生甘草 甘微寒 補脾胃不足能大瀉心火瀕用之

烏梅 酸温 主下氣除熱煩痛安心調中治痢止渴以鹽為白梅

亦入除痰藥中用

苦微寒 主傷中五勞六極羸瘦補虛益氣

苦酸微寒 除寒熱破結實消痰癖治心下痞逆氣脇痛

苦酸微寒 主傷寒温疫頭痛解大熱散風毒安心神止煩

悶鎮肝消痰明目治中風失音小兒疝豆風熱驚癇

苦平 王老瘰癧瘰癧婦人血脉不調心腹刺痛破瘀血

消氣脹

甘平 主小便不利導小腸中熱

苦平微寒 治風濕熱邪結於内

苦其酸微寒 治月經不止小兒疝痢諸瘡止膿血衍義

云性沉寒入下焦治無熱痢疾

苦寒 主傷寒頭痛寒熱脾氣煩燥滿悶

苦寒 治寒熱鼠瘻癰腫癰疽腫炊惡瘡癩結熱蟲毒去白

虫主通利五淋除心藏客熱排膿止痛

**地骨皮**

苦寒根大寒子微寒治表有風實熱邪自汗

**牡蠣**

鹹平微寒主傷寒熱溫瘧女子帶下赤白止汗心痛氣

結澁大小腸治心脇痞

**山藥**

味甘溫主補中益氣除熱強陰主頭面遊風風頭眼眩下

氣充五臟長肌肉久服耳目聰明輕身耐老延年不飢手太

陰藥潤皮毛燥涼而能補與二用之為之使惡用之○

東垣云仲景用乾山藥以其涼而能補也亦治皮膚

乾燥以此物潤之

**薏苡仁**

甘微寒治筋急拘攣不可屈伸風濕痺下氣除筋骨邪

氣不仁利腸胃消水腫令人能食久服輕身益氣其根能下

三蟲仲景治風濕燥痛月晡所劇者與用之○

**白蘞**

苦鹹寒治暴中風身熱肢滿忽忽不知人狂惑邪氣寒熱

酸疼溫瘧洗洗發作有時療傷中淋露下水氣利陰氣益精

近道處處有之狀炒用之白前而短小療驚邪風狂癎病○

液云局方中多有有用之治婦人以本經療傷中下淋露故也

**貝母**

辛苦微寒治傷寒煩熱淋瀝邪氣疝瘕喉痺乳難金瘡風

瘕癆腹中結實心下滿洗洗惡風寒日眩項直咳嗽上氣止

煩渴出汗安五臟利骨髓又云用之能散胃中鬱結之氣殊

有功

**大戟**

苦甘寒治蠱毒十二水腹滿急痛積聚中風皮膚癢痛吐

逆頸腋腫腫頭疼發汗利大小腸此用之也○液云與用之

同為泄水之藥溫勝者苦燥除之反用之與用之○

半分水糊為丸桐子大每服十丸傷風傷寒用之下傷食

下或十五丸微加至止亦可用之別有條海藏用之

**桑葉**

同用

**苦微寒**

治傷寒溫瘧下十二水破積聚大堅癥瘕蕩滌腸

胃中留癖飲食寒熱邪氣利水道療瘵飲效嗽

**固本**

辛酸平治水脹滿瘕痺除癰腫殺鬼精物治胃中邪氣

水腫痿痺腹滿共真疏五臟散水氣如人形者有神

**茵陳**

味辛溫治鬼氣溫中治積冷心腹脹痛霍亂中惡冷症

臨牀冷氣消食止泄小兒傷乳霍亂

**蒲黃**

味甘平治心腹膀胱寒熱利小便止血消瘀血又云治一切吐衄唾瀉崩漏撲瘕帶下等血並皆治之并瘡癩通月候

墮胎兒枕急痛風腫鼻洪下乳止泄精血利如破血消腫則

生用補血止血則炒用

**款冬花**

味甘溫潤心肺益五臟除煩補勞消痰止咳肺痿肺癰

**菝葜**

味鹹溫治五勞七傷補中除莖中寒熱痛養五臟強陰益

精氣多子婦人癥瘕除膀胱邪氣腰痛止痛久服輕身

**苦參**

味苦寒治心腹結氣癥瘕積聚黃疸逐水除癰腫明目止

淚除伏熱腸癖止渴醒酒去遍身風熱疹痒

**牽牛**

味苦寒主下氣療脚滿水腫除利小便

**芫花**

味苦寒治四肢遊風利血脈心煩胃膈壅悶去翳膜明目

**葶藶**

味苦寒治欬嗽定喘促除胃中痰飲去面目浮腫破堅逐

**葶藶**

邪通利水道

**王不留行**

味苦祛風毒通血脈下乳汁調月經

**瞿麥**

味苦辛寒治閉格諸癥結小便不通治癰腫排膿明目去翳

**破胎下閉血逐膀胱邪熱用穗**

**車前子**

味甘寒治氣癥閉利水道通小便除濕痺男子傷中女

**子淋瀝不欲食養肺強陰益精令人有子明目治目熱赤痛**

**輕身耐老**

**薺菜**

味苦辛寒治血積下氣生則止血破惡血血淋尿血金瘡

**柏子仁**

味甘平主安五臟除風溫痺益氣血能長生令人潤澤

**羨顏色耳目聰明用之則潤腎之藥也**

**酸棗仁**

味酸平治濕痺煩心不得眠臍上下痛血轉久世虛汗

**煩渴補中益肝氣蒸筋骨助陰氣治驚悸不得眠**

**白茯苓**

味甘平主安五臟除風溫痺益氣血能長生令人潤澤

**生薑**

味辛熱六物煎服効

**白木**

味甘平主安五臟除風溫痺益氣血能長生令人潤澤

**山茱萸**

味酸微温 主温中逐寒温痺強陰益精通九竅止小便入足少陰厥陰經云滑則氣脫澁劑所以收之山茱萸之澁以收其滑仲景八味丸固為君主如何澁劑以通九竅雷公云去以用之能消精故去之

**烏藥**

味辛温 治中惡心腹痛蠱毒疰忤鬼氣宿食不消天行疫瘴膀胱腎間冷氣攻衝背脊婦人血氣小兒腹中諸蟲

**杜仲**

辛甘平温 治腰脊痛補中益精氣堅筋骨強志除陰下温痺小便餘瀝脚中酸疼不欲踐地久服輕身耐老惡風脫皮

**女參**

味甘平 安五臟定魂魄消痰血通五淋利小便破癥積明目磨翳

**蘇木**

味甘辛平 治產後血脹月水不調血暈口噤止痛排膿消腫瘀血

**艾葉**

味苦平 破血止痛療諸惡瘕

**大麥**

味甘温 治心腹邪氣和百藥通九竅補脾胃不足補中益氣中滿者勿食

**香薷**

味辛微温 治霍亂腹痛吐下散水腫

**龍骨**

甘微寒 治喘息胸膈內疽食蝕止汗縮小便養精神定魂魄安五臟澁可去胎而固氣也

**麝香**

味辛温 治温瘧蠱毒癰疽去三尸蟲心腹暴痛脹急痞滿婦人產難墮胎祛惡氣殺鬼邪

**牛黃**

味苦平 治驚癇寒熱上盛狂瘵逐鬼除邪療小兒百病諸癰熱口噤不開大人癲狂又能墮胎

**鱉甲**

味鹹平 治心腹癥瘕堅積寒熱去臍中瘕肉陰蝕痔惡肉瘡温瘧血痕腰痛小兒脇下堅瘵勞瘦除骨熱極佳

**假蘇真**

治傷寒勞復經言吐鼠糞兩頭尖者是

**人尿**

鹹凉 止勞渴嗽潤心肺療血閉熱狂撲損瘀血及難產胞衣不下又云童男子者佳

藥錄

十一

**人中黃** 性涼 治温病日華子有方

**蛇蛻** 去翳膜用之取其意也催生亦佳

**蟬蛻** 治小兒渾身壯熱驚癇兼能止渴又云治同蛇蛻

**白僵蠶** 味鹹辛平 治小兒驚癇夜啼去三蟲滅黑點令人面色

好男子陰瘍病女子崩中赤白產後餘痛滅諸瘡癩痕

**斑蝥** 味辛寒 治寒熱鬼疰蠱毒鼠履疥癬惡瘡疽蝕

**五靈脂** 味甘温 療心腹冷氣小兒五疳辟疫治腸風通利氣脉

女子月閉出北地此是**寒號蟲糞**也

藥性要旨

**苦藥** 平升 微寒 平亦升

**甘藥** 瀉火 苦寒 瀉湿熱 苦辛 藥平降 苦辛 寒瀉血熱

去臟腑之火

**黃連** 瀉心火

**梔子** 瀉肺火

**白芍藥** 瀉脾火

**知母** 瀉腎經火 **木通** 瀉小腸火

**黃芩** 瀉大腸火

**石膏** 瀉胃經火

**柴胡** 瀉三焦火

**黃芩** 佐之

**茵陳** 瀉肝經火

**黃連** 佐之 膽經亦同

**黃芩** 瀉膀胱火

又曰龍火膀胱乃水府之火故曰龍火也

已上諸藥瀉各經之火不惟止能如此更有治病合為君臣

藥用根梢法

凡根之在上者中半已上氣脉上行以生苗者為根中半以下氣脉下行以入土者為稍當知病在中焦用身上焦用根下焦用梢經云根升稍降

升降者天地之氣交

**茯苓** 為在天之陽也陽當上行何謂利水而泄下經云氣之

薄者乃陽中之陰所以**茯苓** 利水而泄下然而泄下亦不離

乎陽之躰故入手太陽也 **麻黃** 為在地之陰也陰當下行何謂發汗而升上經云味之

薄者乃陰中之陽所以麻黃發汗而升上然而升上亦不離乎陰之躰故入手太陰也

**附一** 氣之厚者乃陽中之陽故經云發熱

**附二** 宋之厚者乃陰中之陰故經云泄下

**附三** 為陽中之陰所以利小便

**附四** 為陰中之陽所以清頭目

清陽發腠理清之清者也

濁陰歸六腑濁之濁者也

清陽實四肢清之濁者也

濁陰走五臟濁之清者也

藏氣法時補瀉法

肝苦急食甘以緩之

脾苦溫急食苦以燥之

腎苦燥急食辛以潤之

肝欲散急食辛以散之

心欲軟急食酸以軟之

心苦緩急食酸以收之

肺苦氣上逆急食苦以瀉之

肝欲散急食辛以散之

心欲軟急食酸以軟之

肝欲散急食辛以散之

**胃**

脾欲緩急食甘以緩之甘草以甘補之

肺欲收急食酸以收之白芍藥以酸補之

腎欲堅急食苦以堅之知母以苦補之

註云此五者有酸辛甘苦鹹各有其利或散或收或緩或軟

或堅四時五臟病隨五味所宜也

用藥用方辨

如仲景治表虛製桂枝湯方桂枝味辛熱發散助陽體輕本乎

天者親上故桂枝為君芍藥為臣佐之如陽脈濇陰脈弦法當

腹中急痛乃製桂枝湯方芍藥為君甘草為臣佐之一則治

其表虛一則治其裏虛是各言其主用也後人之用古方者觸

類而長之則知其本而不致差誤矣

藥性生熟用法

黃芩黃連知母黃柏治病在頭面及手梢皮膚者酒炒之藉

藥性

黃芩黃連知母黃柏

十一

酒力上升也治在咽之下臍之上者酒酒浸之治在下者生因  
凡熟升生降也(大黃)酒煨恐寒傷胃氣至於(烏頭)酒炮去  
其毒也用主焦藥酒(酒)浸曝乾(黃蘗)知母治下部之藥也久弱  
之人須合之者(酒)浸曝乾恐寒傷胃氣也(熟地黃)酒洗亦然當  
歸酒浸助發散之用也

主治心法隨證治病藥品

頭痛用(川芎)如不愈加引經藥太陽(川芎)陽明(白芷)少陽(柴胡)

大陰(蒼朮)少陰(細辛)厥陰(吳茱萸)

頂巔痛用(藁本)去(川芎)

肢節痛用(羌活)風濕亦用之

小腹痛用(青皮)

心下痞必用(枳實)黃連

腹痛用芍藥惡寒而痛加(桂)惡熱而痛加(黃芩)

腹中窄狹用(蒼朮)

肌熱及去痰用(黃芩)亦用(黃芪)

腹脹用(美製厚朴)

腹中實熱用(大黃)芒硝

虛熱用(黃芩)亦止虛汗

脇下痛往來寒熱日晡潮熱用(柴胡)

脾胃受濕沉困無力怠惰嗜臥及去痰用(白朮)

胃脘痛用(芍藥)

氣刺痛用(枳殼)看經分以導引之

破滯氣用(枳殼)高者用之然能損胸中至高之氣三二服則已

破滯血用(桃仁)歸身

補血不足用(芍藥)

和血用(當歸)凡血受病皆用

血刺痛用(當歸)詳上下用根梢

去痰用(半夏)熱痰加(黃芩)風痰加(南星)胸中寒痰痞塞用(陳皮)

藥象

本草綱目卷之二

二〇



白木然多用則瀉脾胃

調氣用木香補氣用人參

去下焦濕腫及痛并膀胱有火邪必用酒洗漢防己草龍膽黃

知母

去上焦濕及熱瀆用黃芩瀉肺火故也

去中焦濕熱與痛用黃連瀉心火故也

去滯氣用青皮多則泄元氣

渴者用乾薑茯苓半夏

嗽用五味子

喘則用阿膠

宿食不消用黃連枳實

煩躁用梔子仁

飲食多以致腸脾用白木茯苓積冷

水瀉用白木茯苓積冷

瘡痂不可忍者用苦寒藥加黃芩黃連詳上下分根梢及引經藥

眼痛不可忍者用黃連當歸根以酒浸煎

小便黃用黃柏澀者加澤瀉

室中痛用生薑厚朴

驚悸恍惚用茯苓

凡用純寒熱藥必用甘草以緩其力也寒熱相雜亦用甘草調

和其性也中滿者禁用經云中滿勿食

五臟補瀉法

肝虛以陳皮白芍之類補之經曰虛則補其母水能生木腎乃

肝之母腎水也若補其腎則黃柏黃芩是也如無他證惟不足

錢氏地黃丸主之實則白芍澤瀉之如無他證錢氏瀉青丸主

之實則瀉其子心乃肝之子以生薑瀉心

心虛則炒鹽補之虛則補其母木能生火肝乃心之母肝木也

藥集

十五

心火也以**生**姜補之如無他證**錢氏安神圓**是也實則**甘草**瀉之如無他證以**錢氏方**中重則**瀉心湯**輕則**瀉赤散**脾虛則**甘草**大麥之類補之實則以**枳實**瀉之如無他證虛則以**錢氏益黃散**實則**瀉黃散**心乃脾之母以炒**鹽**補心肺乃脾之子以**桑白皮**瀉肺

肺虛則**五味子**補之實則**桑白皮**瀉之如無他證實則用**錢氏**

**瀉白散**虛則用**阿膠散**虛則以**甘草**補脾土補其母也實則以

**瀉瀉**瀉腎水瀉其子也

腎虛則**熟地黃**黃柏補之瀉以**澤瀉**之鹹腎本無實本不可瀉

**五苓散**補肺而已

已上五臟內經藏氣法時論中備言之欲究其詳請看

木火土金水此制方相生相尅之法惟老於医者

風制法肝春木**酸**生之道也失常則病矣

風淫於內 治以**辛涼**佐以**甘辛**以**酸**緩之以**辛**散

暑制法心夏火**苦**長之也失常則病矣

熱淫於內 治以**鹹寒**佐以**甘苦**以**酸**收之以**苦**發之

濕制法脾土其中方化咸之道也失常則病矣

濕淫於內 治以**苦熱**佐以**酸熱**以**苦**燥之以**淡**泄之

燥制法肺秋金辛收之道也失常則病矣

燥淫於內 治以**辛溫**佐以**甘辛**以**辛**潤之以**苦**下之

寒制法腎冬水鹹藏之道也失常則病矣

寒淫於內 治以**甘熱**佐以**苦辛**以**辛**散之以**苦**堅之

註云**酸甘辛**即肝木心火脾土肺金腎水之本也四時

之變五行化生各順其道違則病生聖人設法以制其變謂

如風淫于內即是肝木失常火隨而熾治以**辛涼**是為辛金

尅其木凉水沃其火其下治法例皆如此下項二方非為治

病而設此乃教人比證立方之道容易通曉也

藥象

五味之用

苦直行而泄 辛橫行而散 酸束而收斂 鹹止而軟堅

五入

辛入肺 苦入心 甘入脾 酸入肝 鹹入腎

五走

辛走氣氣病無多食辛 苦走骨骨病無多食苦  
酸走筋筋病無多食酸 鹹走血血病無多食鹹  
甘走肉肉病無多食甘

五宜

肝色青宜食甘 粳米 牛肉 東 葵 皆甘  
心色赤宜食酸 小豆 犬肉 黍 韭 皆酸  
脾色黃宜食鹹 大豆 豕肉 栗 藿 皆鹹  
肺色白宜食苦 小麥 羊肉 杏 薤 皆苦

腎色黑宜食辛 黃黍 雞 皆辛

毒藥攻邪 五穀 為養 五果 為助 五畜 為益 五菜 為充 氣味合而

服之以補精益此五者有 辛 酸 苦 鹹 各有 所利 或散 或收 或

緩 或急 或堅 或啜 四時 五歲 病各 隨五 味所 宜也

大毒治病十去其六 常毒治病十去其七 小毒治病十去其八

無毒治病十去其九 五果 食養 盡之 無使 過之 傷其 正也

陰之所生本在五味 陰之 五宮 傷在 五味 是故 未過 於 肝氣

以津脾氣乃絕味過於 脾氣 勞短 心氣 抑味 過於 心氣

喘滿色黑腎氣不衡味過於 脾氣 不濡 胃氣 乃厚 味過 於 脾氣

筋脉沮弛精神乃殃是故謹和五味 骨正 筋柔 氣血 以流 琇理

以密如是則骨氣以精謹道以法長有天命

五多五傷

多食酸則脉凝泣而变色

多食苦則皮稿而毛拔

多食辛則筋急而爪枯

多食酸則肉胝膈而唇揭

藥錄

多食則骨痛而髮落此五味所傷也

天地生物有厚薄堪用不堪用

厥陰司天為風化在泉為酸化木司地氣故物化從酸

少陰司天為熱化在泉為苦化火司地氣故物化從苦

太陽司天為溫化在泉為甘化土司地氣故物化從甘

少陽司天為火化在泉為辛化火司地氣故物化從辛

陽明司天為燥化在泉為化金司地氣故物化從

大陽司天為寒化在泉為化水司地氣故物化從

故治病者必明六化分治五味五色所主五臟所宜乃可  
以言盈虛病生之緒也謹候氣宜無失病机其主病何如  
言採藥之歲也司歲備物則無遺主矣先歲氣何曰天地  
專精之氣藥物精膿又於使用當其正氣也五運主歲不  
足則物薄有餘則物精非專精即散氣散氣則物不純也  
是以質同而異等形質雖同力用則異也氣味有厚薄性

用有燥靜治保有多少力化有淺深此之謂也

用藥凡例

凡解利傷風以防風為君甘草白朮為佐經云辛辛發散為陽

風以辛散防風味辛乃治風通用故以防風為君甘草白

朮為佐

凡解利傷寒以麻黃為君防風白朮為佐是寒以辛發也或有

別證於前隨證治病藥內選用其分兩以君臣論之

凡眼暴發赤腫以黃芩為君以瀉火以黃連當歸根和血

為佐兼以各經藥引之

凡眼久病昏暗以熟地黃當歸身為君以羌活防風為臣甘草

之類為佐

凡痢疾腹痛以白芍藥甘草為君當歸白朮為佐見血先後以

三焦熱論

凡水瀉以茯苓白朮為君芍藥甘草為佐

藥象

凡諸風以**防風**為君隨證藥為佐

凡嗽以**五味子**為君有痰者以**半夏**為佐喘者以**阿膠**為佐有

熱無熱俱以**黃芩**為佐但分兩寡寡不同耳

凡小便不利以**黃芩**為君**茯苓**為佐

凡下焦有濕以**黃芩**為君**甘草**為佐

凡痔漏以**黃芩**為君**甘草**為佐詳別證加減

凡諸瘡以**黃芩**為君**甘草**為佐

凡瘡疾以**黃芩**為君隨所發之時與所屬經分用引經藥佐之

已上皆用藥之大要更詳別證於前隨證治病藥內逐旋加

減用之

### 論用藥必本四時

凡用藥若不本四時以順為逆四時者是春**升**夏**浮**秋**降**冬**沉**

乃天地之**升****降****浮****沉**化化者脾土中造化也是為四時之宜但

言補之以**辛****甘****溫****熱**之劑及味之薄者諸風藥是也此助春夏

之**升**者也此便是瀉秋收冬藏之藥也在人之身乃肝心

但言之以**酸****苦****寒****涼**之劑并淡未滲泄之藥此助秋冬之**降****沉**

者也在人之身乃肺腎也用藥者因此法度則生逆之則死縱

令不死危困必矣

### 古人服藥活法

在上不厭頻而少在下不厭頓而多少服則滋榮於上多服則

峻補於下

### 古人服藥有法

病在上者

先食而後藥

病在心下者

先藥而後食

病在四肢者

宜飢食而在旦

病在骨髓者

宜飽食而在夜

### 用圓散藥例

仲景言劉如麻豆大與咬咀同意失咬咀古之制也古者無鉄  
刃以口咬細令如麻豆為粗藥煎之使藥水清飲於腹中則易

升易散也此所謂吹咀也今人以刀器剉如麻豆大此吹咀之  
 易成也若一槩為細末不分清濁矣經云清陽發腠理濁陰走  
 五臟果何謂也又曰清陽實四肢濁陰歸六腑吹咀之藥取汁  
 易行經絡也若治至高之病加酒煎去濕以生薑補元氣以天  
 麻發散風寒以芎藭去膈上痰以蜜細末者不循經絡止去胃  
 中及臟腑之積氣味厚者曰湯調氣味薄者煎之和粗服去下  
 部之疾其丸極大而光且圓治中焦者次之治上焦者極小稠  
 麵糊取其遲化直至下焦或酒或醋取其收其散之意也犯半  
 煎又易化滴水圓又易化煩燥圓者取其遲化而氣循經絡也  
 蠟圓者取其難化而旋旋取効也大抵湯者盪也去大病用之  
 散者散也去急病用之圓者緩也不能速去之其用藥之舒緩  
 而治之意也

升合分兩

古之方劑銖銖分兩與今不同謂如吹咀者即今剉如麻豆大  
 是也云一升者即今之大白盞也云銖者六銖為一分即二錢  
 半也二十四銖為一兩也云三兩者即今之一兩云二兩即今  
 之六錢半也判例大者只合三方之一足矣

君臣佐使法

帝曰方制君臣何謂也岐伯曰王病之謂君佐君之謂臣應臣  
 之謂使非上中下三品之謂也帝曰三品何謂曰所以明善惡  
 之殊貫也  
 凡藥之所用者皆以氣味為主補瀉在味隨時換氣主病者  
 為君假令治風者以風為君治上焦熱藥為君治中焦熱  
 藥為君治濕藥為君治寒藥之子之類為君無何證以佐  
 使藥分治之此製方之要也本草說上稟藥為君各從其宜  
 也

七方

大

君一臣三佐九制之大也

遠而奇偶制大其服也大則數少少則二之

腎肝位遠服湯散不厭頻而多

小

君一臣二制之小也

近而奇偶制小其服也小則數多多則九之

心肺位近服湯散不厭頻而少

緩

補上治上制以緩緩則氣味薄

治主以緩緩則治其本

急

補下治下制以急急則氣味厚

治客以急急則治其標

奇

君一臣二奇之制也君二臣三奇之制也

陽數奇

偶

君二臣四偶之制也君二臣六偶之制也

陰數偶

宣

奇之不去則偶之是為重方也

通

十劑

補

可以去壅

瀉

可以去滯

重

可以去弱

輕

可以去閉

滑

可以去實

燥

可以去怯

濕

可以去著

燥

可以去脫

濕

可以去濕

燥

可以去枯

只如此體皆有所屬凡用藥者審而詳之則靡所失矣陶

隱居云藥有宣通補瀉輕重滑泄燥濕此十劑今詳之惟

寒熱二種何獨見遺今補二種以盡厥旨

寒 可以去熱 大黃 附子 之屬是也

熱 可以去寒 附子 官桂 之屬是也

○謹按附藥象一門者何蓋欲人按病察方按方察藥俾藥性與病情相合坦然無疑慨然藥服則藥無不效病無不瘳矣夫醫之為道曰脉理曰藥性曰經絡曰運氣曰病機曰治法此六者不可缺一焉學醫之者必先熟於藥性何以言之良醫用藥如良將之用兵良醫知藥之性則可以製方而愈疾良將知兵之法則可以破敵而取勝其理一也故錄標本陰陽升降浮沉藥象主治氣味厚薄引經報使根莖異用補瀉重輕君臣佐使大小緩急治有奇偶取其要者附於醫學真經卷末共成一帙以為仁齋先生之全書而便觀覽也矣

新刊醫學真經附遺藥白卷之二

新刊仁齋傷寒類書活人總括目錄

○卷之二

### 活人證治賦

附 司天在泉圖 五運六氣圖 傷寒脉法指掌圖

○卷之二

### 傷寒總括

調理傷寒統論 陰陽虛盛用藥寒溫辯義

表裏虛實辯義 六經用藥格法

○卷之二

### 傷寒證治

表裏汗下二證 三陽三陰脉 三陽外證

三陰外證 汗下溫正法 變汗法



變下法  
傷寒見風傷風見寒脉溢  
三陽合病三陽明附春溫夏熱  
風濕中溫  
痰證傷食類傷寒  
變溫法  
傷寒傷風脉溢  
太陽陽明併病  
風溫濕溫  
痙病溫瘧疫癘  
虛煩脚氣類傷寒

○卷之四

發熱  
寒熱似瘧  
下後有熱勞食復附  
背惡寒  
頭痛  
身痛  
腹痛  
自汗  
潮熱  
熱多寒少  
惡風  
四逆  
項強  
腹痛脹  
胃脇痛  
無汗  
寒熱  
汗後寒熱  
惡寒  
厥  
咽痛  
奔豚動氣  
脇疼  
頭汗出

○卷之五

手足汗  
不可下  
不可汗

懊懣  
氣短  
咳逆  
吐血  
發黃  
口燥咽乾  
漱水不嚥  
遺溺  
霍亂  
痞  
喘  
乾嘔  
衄血  
發斑  
煩燥  
可與水  
小便難  
失音  
結胃  
咳嗽  
嘔吐  
下膿  
舌白胎  
渴  
小便自利  
大便下利

○卷之六

佛鬱  
胃眩  
心動悸

新刊仁齋傷寒類書活人總括目錄

發狂 直視 譫語

搖頭 戰慄 瘈瘲

筋惕身瞤 不仁 不得眠

多眠 瘡後昏沉 飲酒後

尋衣摸空 百合 臟結

兩感 蛇厥狐惑 陰陽易陰陽六

陰毒陽毒 陽證似陰陰證似陽

○卷之七

小柴胡湯加減法 傷寒諸篤證

傷寒別名 傷寒戒忌 葉有寒溫相濟

據脉 警言 藥方

產科 小兒傷寒

新刊仁齋傷寒類書活人總括目錄

新刊傷寒類書活人總括卷之一

三山名醫仁齋楊士瀛登父 編撰

新安後學惠齋朱 崇正宗儒 附遺

活人證治賦 理內通徹 攻取陰陽

論風寒暑濕溫熱諸種脉證治法

風緩寒緊

太陽病自汗脉浮緩為傷風用桂枝湯無汗脉浮緊為傷寒

用麻黃湯傷風證見寒脉傷寒證見風脉則二藥兼用○張

氏云凡服麻黃湯而吐者其後必吐膿血者可汗證服麻黃

湯之後發煩目瞑刺者必衄血衄乃解○尋常感冒不換金

氣散加麻黃湯燥實內熱者麻黃散與之世俗多以五

積散為常用之劑然其用藥溫燥但可施之寒溫其他證候

服之誤人

暑虛熱洪

中暑與夏月熱病外證皆相似但中暑脈虛弱肢節不疼熱病脈洪盛肢躄痛重○中暑與香薷散小柴胡湯小便不通  
三才散○夏月熱病用藥不可太溫如表證當用桂枝湯  
黃湯之類須以黃芩佐之其有表裏俱熱經日不解而脈數者黃芩湯可量與之○中暑何以脈虛暑傷氣而不傷形熱則氣散也夏月登途十神湯亦能解暑  
春曰溫斑曰毒

春病曰溫脈浮緊其病輕夏至以前是也○春病發斑疹者曰溫毒寸脈洪數尺脈實大其病重蓋陰氣衰而陽氣盛也○春溫用敗毒散葛根湯並加紫草  
壞如癰瘡如風  
壞病曰溫瘧尺寸脈弦盛先熱後寒吐汗下積之餘證也溫

瘧先熱後寒及寒熱相等者並小柴胡湯先寒後熱  
加桂若脈緊實大便秘大柴胡湯下之○瘧如風癰脈沉遲弦細項背強急身體反張剛瘧無汗柔瘧有汗先譏語者發剛瘧先手足冷者發柔瘧並屬太陽蓋先傷風又感寒濕致之陽沉於陰之中故其脈沉細瘧最難瘧十救一二濕家發汗太過亦作瘧剛瘧麻黃湯柔瘧桂枝湯加葛根湯  
風溫濕溫自汗多發汗逆

風溫脈浮張氏云寸脈浮滑尺脈濡弱蓋素傷於風因而傷熱所致也濕溫寸脈濡弱尺脈小急素傷於濕因而傷暑所致也外證並多自汗謹勿發表表汗則逆○風溫人參羌活湯  
痛大便滑與承氣湯暑氣勝煩渴大便秘白虎加蒼朮湯  
風濕中濕有便秘與便通  
風濕脈浮虛大便秘小便利身痛微腫風氣與濕氣相搏然

也○中濕脉沉緩大便利小便秘身痛發黃風雨襲虛山澤  
蒸氣然也○風濕通用**散毒散**小便不利者**五苓散**○中濕  
通用**除濕湯****五苓散**大便利小便亦自利**木附湯**已上總名  
傷寒

論陰陽虛盛表汗裏下及表裏餘證

原夫陽虛則陰從內出而惡寒陰虛則陽自外入而結熱

經云陽虛則外寒陰虛則內熱陽虛於表故陰出而乘之所  
以惡寒而支膚怯冷也○陰虛於裏故陽入而乘之所以結  
熱而燥胃乾而大便艱秘也出入之間寒暑則變

惡寒者為表邪汗則必愈結熱者為裏病下之隨微

陽虛陰盛表病裏和汗之而愈屬**桂枝湯****麻黃湯****葛根解肌**

**湯**○陰虛陽盛裏病表和下之而愈屬**小承氣湯****大承氣湯**

**大承氣湯**隨輕重而度用之不過除邪輔正而已○原韻四  
句汗下綱領表證脉浮裏證脉實有能察脉以辨其表裏驗

證以審其汗下治法無餘蘊矣○脉微遲壞病虛煩咽乾諸  
血諸動氣並不可汗○脉浮濇小便清或少嘔吐厥逆喉塞  
諸動氣並不可下

非汗候又不可下表裏無證但解和

非汗證又非下證**小承氣湯**隨證加減為良解表加**桂枝****通裏**

加**枳實**半表半裏證亦主之**散毒散****和散**可以參用○若

經多日不大便目中不明或執不止脉雖浮數可**小承氣**

**湯****大柴胡湯**下之

有浮脉復作裏煩內外俱見惟參泄

參泄以**五苓散**利小便若久不大便而小便反清者與**桂枝**

**湯**○若心下滿大便鞭頭汗出微惡寒與**小柴胡湯**○又**桂**

**枝****湯****大柴胡湯**加**芍藥**可以解表和裏**桂枝**加**大黃湯**可

以解表攻裏皆主治表裏俱見之證

論隨變隨應不可拘以日數及榮衛府臟受病淺

意曰脉以證別證因脉尋

據脉以驗證問證而對脉證如此脉亦如此一依條例用藥證與脉畧同則加減於其間證與脉大異則消息揣量俟其形見然後以某證某藥條例主之凡治傷寒貴乎纖悉問證湯脉浮長弦而盛陰家細微緩而沉

太陽脉浮陽明脉長少陽脉弦太陰脉沉細少陰脉沉帶緊厥陰脉微緩尺寸俱如此手六經足六經經有十二傷寒只傳足六經

始證遠陽盛即下胃府

始得病便為陽盛入內之證即屬陽明陽明即胃府也用小氣湯下之不必拘以一二日在太陽

初得若臟病直溫少陰

陽受病則在腑陰受病則入臟發於陽則先屬太陽發於陰則先屬少陰此二經受病最多○若初得病便作脉沉微冷

惡寒即是少陰用乾姜白湯四逆湯溫之○少陰又發熱

證麻黃湯附子湯○少陰屬腎太陽屬膀胱合為臟腑此

二經受病最多者諺曰傷寒偏打下虛人是也

如脉浮多日有表但病在太陽而寃心

張氏云凡病至十餘日太陽證猶在而脉浮者但治太陽不可拘以日數麻黃湯主之

皮膚為衛血脉為榮榮行中衛行外

衛行脉外在皮膚榮行脉中在血脉風傷衛氣其病淺故用麻黃湯以解肌寒傷榮氣其病深故用麻黃湯以發汗合而

謂之太陽表證也

肌肉屬胃陰證屬臟胃入裏臟尤深

榮衛之下為肌肉陽明主之肌肉之下為臟三陰主之胃者

陽證之裏臟者陰證之裏入胃當下入臟當溫胃府為裏臟

則又深於裏者矣

四論一證之中有表有裏

豈不以惡寒也外熱屬陽無熱屬陰

太陽惡寒脈浮有熱用桂枝湯麻黃湯○少陰惡寒脈沉無

熱用四逆湯○太陰厥陰皆不惡寒然厥陰只有一

證大汗出熱不去中拘急肢體疼下利厥逆不惡寒者四逆

湯主之

發熱一也不渴為表見渴為裏

表有熱不渴小承氣湯加瀉○裏有熱口燥煩渴身熱四肢厥

而脈滑白虎加人參湯欲知內有熱內無熱但以飲食喜冷

喜熱試之○太陽發熱則惡寒陽明發熱則自汗少陽發熱

則嘔

有先溫乃汗之證

厥陰下利腹滿身疼先溫裏乃發表溫裏用四逆湯發表用

桂枝湯

有先解後攻之理

太陽病不解熱結膀胱其人喜忘如狂而血自下下者愈若

外不解可先與桂枝湯外已解但小腹結急乃以承氣

湯攻之

身疼作熱診之浮則腑候外應心下痛自利沉而得則臟家病起

均是身軀疼痛脈浮發熱者未未解用桂枝湯○脈沉自利

者裏不和用四逆湯○凡下利須辨陰陽三陽下利身熱太

陰下利手足溫少陰厥陰下利身冷

熱而心滿噦曰支飲涼而脇堅嘔為裏水

身熱乾嘔喘微利心下怔忡此為表有水小承氣湯汗之

○身涼乾嘔汗出短氣微喘微利心下痞滿引脇鞭痛此為

表已解而裏有水下之經云諸有水氣目下微腫

體如火反欲被寒在骨髓熱在皮膚

熱在骨髓

活人

五十二卷之三

七

表熱裏寒者脈沉而遲先與陰旦湯寒已用小柴胡湯加桂  
○裏熱表寒者狀如執厥脈沉而滑先與白朮加人參湯熱  
已用桂枝麻黃各半湯○又少陰惡寒而踈時煩不欲厚衣  
**大柴胡湯**下之

論病在三陰當溫病在胃膈可吐及合病  
併病治法誤汗誤下失汗失下諸變證

大抵無身熱無頭疼則溫以陰經之劑  
身熱頭疼多是陽證三陰證例無身熱無頭疼蓋諸陰經絡  
上至頸而不至頭故也理中湯白芍乾姜湯四逆湯溫之○  
惟厥陰嘔吐涎沫有頭疼而無身熱用吳茱萸湯○少陰有  
反發熱而無頭疼然其脈沉不可誤下以麻黃細辛附子湯  
溫而表之○但陰證終無大熱亦無汗縱有微熱亦或下利  
手足厥也世俗不識陰證者多有遇傷寒必欲發汗請以上  
須條例鑒之

有痰妨胃滿則吐其膈上之松

病在胃膈或多痰或邪氣妨滿而怔忡者可吐之用瓜蒂散  
**梔子豉湯**或**鹽湯**脈微者不可吐只用半夏茯苓枳殼此梗

陳氏之劑

三陽明俱可下惟合病惡寒者有表當汗

大陽陽明本太陽病因汗下利小便後胃中燥大便堅小便  
數屬脾約負不惡寒反惡熱大便秘或譫語屬調胃承氣湯

○少陽陽明本少陽病因發汗利小便後胃中燥大便難亦  
屬調胃承氣湯○正陽陽明即本經自病屬小承氣湯大承

氣湯三者俱可下○惟太陽陽明合病而有惡寒之證此則  
病在表却當汗之用麻黃湯桂枝湯○又喘條太陽陽明

合病喘而胃滿者不可下可與麻黃湯蓋麻黃主喘故也○  
少陽陽明合病下利脈弦者木剋土名曰負不治

併太陽在外解若歸根入胃者本條用攻

太陽陽明先合病然後併歸一經但見太陽證者可汗但見陽明證者可下

所以陽盛有**桂枝**之斃陰多戒**承氣**之衝

**承氣**下咽陽盛即斃以火濟火也**承氣**入胃陰盛以亡以水濟水也

當下而汗為無陽為厥竭為譏語當汗而下為痞氣為懊憹為結胃

當下而誤汗則外泄其正氣內之邪氣乘虛而出焉當汗而誤下則內泄其正氣外之邪氣乘虛而入焉又有伏陽證候而脈沉伏尤不可誤用熱藥溫之輕則變證重則害人常須體認○下厥上竭者由其妄汗動血口鼻耳目有血出也○懊憹者直氣內虛客氣動膈懊憹惱煩鬱之狀  
失下則血凝氣滯以執厥  
當下不下血氣不通故執深則厥深也熱厥初得病身有熱

其脈沉滑指心時溫小**承氣湯**主之

失汗則熱閉任忘而蓄膿

當汗不汗蓄熱化為毒血喜忘如在昏迷譏語心忪語短眼閉目紅漱水燥煩喘滿痛悶骨熱膚閉背冷足寒小便多大便黑小腹結急皆血證也輕者犀角**湯**重者**承氣湯**  
**湯**後政條例經云血在上則忘血在下則狂

下後脈數久便堅當解瘀紅之毒  
無表裏證已下後脈數不解消穀易飢至六七日不大便者有瘀血也屬抵當湯

少者熱壯與斷下轉加熱悶之凶  
少實人壯熱下利若用藥止之則轉加熱悶而死矣

**論審證投藥三可輕用**

嘗攷夫無汗煩燥而脈浮緊者可服青龍

活人



無汗脉緊為傷寒煩燥脉浮為傷風若無汗而煩燥具脉浮  
緊比為傷風見傷寒證候風寒俱盛小**青龍湯**汗之  
無汗喜渴而脉單浮者勿投白虎

無汗脉浮表未解而陰氣盛雖渴不可用白虎太寒可小  
**柴胡湯**若汗後脉洪大而渴則為裏有熱乃可用**白虎湯**或脉

浮滑而渴則為表裏皆熱亦可用**白虎湯**蓋滑在浮之下生  
血氣實滑脉當作裏證大抵**白虎湯**主病在太陽陽明之間

若全謂太陽則表證已解全謂陽明則大便不結若未裏之  
間有熱故用之然而當用**白虎湯**者可且與**竹葉湯**

用熱遠熱之為當用寒遠寒而後愈  
冬溫夏清用藥亦然謂如夏月**桂枝湯**加**黃芩**冬月**柴胡湯**  
加**桂**是也嗜飲酒者不可用**桂枝**熱嘔者不可用生薑。湯  
寒服藥中病即止後服不必盡劑  
陽明自汗引飲則**五苓散**非可輕進

陽明汗多以利小便為戒汗多則胃燥雖渴不可用**五苓散**  
恐利其小便胃愈燥也可**白虎湯**此渴證與其他不可

太陽自汗數尿則**桂枝湯**不容妄取  
**桂枝湯**利小便句汗數尿津液已泄故不可與**桂枝湯**誤服**桂枝**  
得之便厥但用**五苓散**置湯**芍藥甘草湯**甘辛以表之皆去

**甘草**  
發散為陽藥以甘辛湧泄為陰劑惟酸苦  
陽虛陰盛汗之則愈故用甘半發散以助陽甘辛之藥為能

復其陽氣也。陰虛陽盛下之則愈故用酸苦湧泄以助陰  
酸苦之劑為能復其陰氣也

口禁咬齒大承氣  
剛痊咬齒口禁胃滿脚攣大**承氣湯**主之  
吐取豉行

瓜蒂散梔子豉湯皆用豉

奔豚動氣用(桂)心

動氣曰奔豚(桂)利小便而泄之故動氣藥中多用(桂)大抵水結不散氣與之搏即發奔豚治法多利小便勿汗下或用(理)

中(易)去(木)加(桂)蓋腎惡燥故去(木)也

嘔由薑主

嘔家聖藥是生薑千金之說信矣然氣逆作嘔生薑散之痰與水作嘔半夏逐之嘔有熱有寒生薑於寒證最便若遇熱嘔不可無(理)也

論脉證順逆及諸惡證不治

又當知陰病陽脉與汗後而平靜者活陽病陰脉兼汗已而疾洪者亡

陰病陽脉則不成陽病陰脉則不水得汗而脉靜者生汗已而脉燥疾者死故汗後復熱其脉燥疾狂言不食曰陰陽交不治。凡汗後復熱脉浮數或洪大者為表證猶在當再汗

之若脉沉實則下之。尺寸脉俱虛而熱不止者不治七八

日已上發大熱者難治大發濕家汗則成瘧熱而瘧者不治

又厥逆胃脉無脉服藥後脉不至或脉暴出者並死

厥而煩加吐瀉腎證未易保

少陰證四肢厥冷吐利煩燥不治蓋真陽氣絕而虛陽獨川

也

厥而利反能食除中何以當

厥陰證厥逆下利當不能食反能食者曰陰中不治(張氏云)

胃中如虫齧粥入則出蓋暴多食一頓而絕也

或氣出嘔悶或肢冷臍硬

張口出氣乾嘔或目眶陷不治上氣喘齎心下痞悶不治四

肢冷臍下絞痛如石硬者逆

或口噤汗戰或肝弦土傷

汗出如油口噤肉戰伸吟喘促者死。六七日傳厥陰經脉

活人

來浮緩此為胃氣全其病欲愈榮衛將復寒熱作而大汗解  
若脉弦為厥陰肝經移氣尅土肝受賊邪不治故有耳聾舌  
卷囊縮之證。又陽明少陽合病下利脉弦本尅土不治  
兩感之與臟結臟厥

兩感乃陰陽二經雙傳最惡不治有本條。臟結者證如結  
曾舌上胎滑雖能飲食然時時下利臍腹引陰筋急痛不治  
有本條。臟厥者七八日肌膚冷下利發燥無時暫安不治  
多日而為毒陰毒陽

陽氣暴絕病為陰毒陰氣暴絕病為陽毒非得汗不能復其  
正氣然此二毒隨氣逆上結伏於胃中皆令人心腹築痛有  
自利者有用藥而不得利者並要隨其寒溫而利逐之庶幾  
毒泄則暴絕之氣復榮衛流行自然大汗而解矣蔡謚詳見  
本條凡陰陽二毒急作救療過六七日者不治  
煩燥結曾

結曾證具更加煩燥者逆蓋陰氣內絕而孤陽不生也

重暍尋衣而直視

誤發溫溫汗曰重暍不治目直視口鼻黑手尋衣縫最逆形  
體黧慘直視搖頭為心絕不治在言直視遺尿為腎絕不治  
喘滿下利妄言直視亦死。又曰脯潮熱獨語直視如怪甚  
則循衣摸床但識語者謂氣易下之下後脉弦者生脉濇者  
死弦為陽濇為陰是陽病見陰脉也

縮囊咳逆

厥陰唇青舌卷黑而腎囊縮者死傷寒腹滿而泄或咳逆不  
止者死

離經代脉以皆戕

損脉離經一呼一至為不及至脉離經一呼二至為太過惟  
陰易陽易二證有之。代脉動而中止不能自還因而復動  
元氣絕也並不治張氏曰脉乍數乍疎者死又曰傷寒脉結

代心動悸灸甘草湯主之

論變例法當通變

斷之曰陽明無汗少陰反熱取表以溫

陽明反無汗皮上如皮行此為久虛用大附湯建中湯溫之

又陽明脉浮無汗而喘可發汗用麻黃湯又陽明脉遲汗出

多微惡寒者表未解也用桂枝湯少陰反發熱脉沉

麻黃附子湯微汗之又少陰反發熱自利厥逆無脉用通

麻黃附子甘草湯少陰亦有反自汗之證見無陽咽痛條

少陰腹滿脉浮與桂枝湯

少陰口燥陽明汗多急攻其內

少陰口燥咽乾而渴恐腎汁乾大承氣湯急下之者口燥自

利心下痛則為積證亦用承氣湯少陰惡寒而踈時煩不欲

衣被為表寒裏熱大柴胡湯下之少陰多日脉腹滿不大便

可與承氣湯陽明發熱汗出多恐胃汁乾大承氣湯急下

之○又太陽結熱在裏往來寒熱太陽發熱吐利心下痞便

太陽無表裏證發熱多日大便難並用大柴胡湯下之此亦

變例

下腹滿下縮囊皆陰證之下劑

大陰腹滿時痛桂枝加大黃湯若腹滿而脉浮則表證猶在

只用桂枝湯微汗之○厥陰舌卷囊縮為毒氣入臟承氣湯

下之厥陰下利識語脉不微細與小承氣湯

溫漏虛溫瀋脉乃陽家之溫葷

太陽證發汗漏不止拘急惡風太陽風濕入九日身煩疼脉

虛浮瀋通用桂枝加大黃湯承氣湯承氣湯承氣湯

脉細惡寒為陰陽俱虛黃芩湯承氣湯承氣湯承氣湯

出短氣惡風小便不利黃芩湯承氣湯承氣湯承氣湯

建中湯太陽汗後或下後病不解而煩燥茯苓四逆湯

至若陰極發燥

脉沉遲

熱極發厥

脉沉滑

與夫陰證似陽

脉沉微

陽證似陰

脉沉滑

又當識脉之所在

物極則反寒暑則變證雖疑似脉可推尋數熱遲寒陰陽別矣。又陰盛膈陽證身冷煩燥而不飲水者是霹靂散主之。厥有二證初得病身熱煩燥大小便秘以至於厥者為熱厥其脉沉滑可下之初得病身不熱大小便利常淒清而厥者為冷厥其脉沉遲可溫之又有發寒熱而厥者面色不澤

眩冒無財急與麻黃甘草附子湯以汗之汗解則生服藥無

汗或脉不至者不治。凡當汗當下者如更有他證相妨切

須且用和餅俟其他證已退即依汗下法謂如脉來微遲虛

濇不可汗下且與建中湯葷四肢厥冷不可汗下且與通和

血脉臍間動氣不可汗下且與桂枝湯去木加芍其脉不

微遲虛濇俟其四肢已和俟其動氣不作然後詳審表裏而

汗下之至若結胸當下厥冷脉微即未可下且與承氣湯之

屬熱厥當下疑似未辨且以理中湯試之謹勿尚急急則誤

誤則不可救解戒之哉。妊娠傷寒產前安胎產後調血川

芎藭為要藥發熱以承氣湯主之汗下溫法酌量而已。

傷寒多日忽覺身癢疹發越而痒此乃用藥中病陰陽分

別榮衛流行病氣自毛竅中出也他病亦然小兒驚風發熱

將產亦如是

傷寒格法張長沙開其源朱奉議導其流前哲後賢發明秘妙

吾儒之孔孟矣世有謂傷寒論其辭艱深亦有以問答敏多增  
 蓋意度議活人書者多見其不知量也活人宗師張朱作古是  
 篇刊布不敢名稱使學者稽為驗為決以溯古人之用心皆知起敬  
 亦司天在泉五運六氣之圖

司天在泉五運六氣之圖

少陰	少陽	少陰	少陽	少陰	少陽
子	寅	申	戌	辰	未
在泉	在泉	在泉	在泉	在泉	在泉
君	相	木	土	水	火
燥	火	燥	濕	寒	燥
明	陰	少	太	陰	太
司天	在泉	司天	在泉	司天	在泉
燥	君	風	相	寒	濕
金	木	火	水	土	金

○云先立其年以明其氣是知司天在泉上見下臨為其始也如子午卯酉陰陽互換六氣在其中矣勝復之理補瀉之法可從而推之 訣曰  
 子午少陰君火天陽明燥金應在泉  
 丑未太陰溫土上太陽寒水兩連綿  
 寅申少陽相火旺厥陰風木地中懸  
 卯酉却與子午倒辰戌巳亥亦皆然

五運之圖

商不及	羽太過	角不及	徵太過
天符	天符	天符	天符
審	靜	敷	昇
金運	水運	木運	火運
平	平	平	平
應天	為天符	為歲會	為歲會
氣之	氣之	氣之	氣之
紀	紀	紀	紀
商太過	羽不及	角太過	徵不及
堅成	涸流	發生	伏明
之紀	之紀	之紀	之紀

○歲會者甲巳化土而遇辰戌丑未之歲乙庚化金而遇申酉歲之類也  
 太乙天符如乙酉歲乙庚化金而遇酉又上見燥金司天也天符者如丙戌歲丙辛化水上見寒水司天是也  
 司天符者如庚子庚午歲下臨燥金在泉同歲會者如辛丑辛未歲下臨寒水在泉是也  
 歲會者如甲子甲午歲會則為早氣陽干陽辰則為太過陰干陰辰則為不及也

# 六氣之圖



天以六氣動而不息上應乎客

六氣圖說曰太陽寒水治宜熱陽明燥金治宜苦溫少陽風木治宜辛涼太陰濕土治宜甘熱少陰君火治宜咸寒厥陰風木治宜辛涼

地以五行靜而守位下進乎主

不及病乃生焉故察其盛衰以味折之以正其氣經云必折其過還氣而取化源益其歲元使邪勝使暴過不主奇疾不起是理歲之大要也

附發寒脈天者掌圖

## 陽脈陰病見陽脈則生

### 大浮數動滑

滿指散漫虛而洪盛不重按重按不足輕按有餘去來促急一息至頻至當開如豆動極狀如轉珠而實

大為血虛 大為病進 大為氣盛

浮大晝加 中緩而大為胃上正脈

浮為任表 浮而緩為太陽中風

浮而緊為太陽傷寒

浮而數浮為風數為虛則洒淅惡寒也

數為熱 為實 浮而數可發汗

浮數而大邪氣傳也

浮數而微邪氣不傳

陰陽相傳名曰動陽動則汗出陰動則發熱形冷惡寒此三種傷也數脈見于關上七下元頭尾如豆大脈七動播名曰動七為陽虛為痛俞奄沉為滑俞合也言張而復合也故曰俞為正陽沉言忽降而下故曰况為純陰方俞合而陰降下也奄謂奄忽之間此陰陽和合也為實為吐

### 四時六經本脈

春	屬肝	夏	屬心
秋	屬肺	冬	屬腎
太陽	尺寸	陽明	尺寸
少陽	尺寸	太陰	尺寸
厥陰	尺寸	厥陰	尺寸
俱沉	俱沉	俱微	俱微

脾脈中緩分主於辰戌丑未之月各二十日共七十二日也

陰脈陽病見陰脈則死

輕按不足為在裏 為寒 為實 為水

重按有餘沉細夜加 沉則榮氣微也

按之如戰慄 榮氣不足也 為少血 為亡汗

如刀割竹 為逆冷 陰脈遲滯故知血亡

無輕軟 衛氣弱名曰瘧 榮氣弱名曰卑 瘧卑相搏名曰損

欲絕 陰脈弱則血虛 血虛則筋急也

狀如弦 脈浮緊名曰弦 為痛 為寒

不緊動 為水氣 純弦勁急死脈也

極細 衛氣衰也 為衄 為泄

若無 為亡汗 為亡陽

弦緊浮滑沉瀦

此六者名曰殘賊能

為諸脈作病也

風則脈浮寒則脈緊

中暑脈滑中濕脈瀦

傷於陰則脈沉

傷於陽則脈浮

弦為痛純弦為死

脈寸口關上尺中三

脈大小浮沉遲數同

等 雖有寒熱不辨此

脈陰陽為和平雖

劇必愈

沉 滑 弱 弦 微

結 促 濡 緩 緊

往來脈來緩時復來名曰結 陰盛則結

遲緩者陰陽氣不相雜

時止脈藹如車蓋者陽結也陽氣結於外

復來脈來如筒長竿者陰結也陰氣結於內

往來脈來數時復來名曰促 陽盛則促

急數蓋陰陽之氣緩數不相續也致為病脈非

時止若結代之脈動而中止 為飲 為痰

復來上下陽脈寸口浮大而濡陰脈浮大而濡尺

和柔中也上下同等為和

按之虛弱又為虛 為虛 為自汗

虛弱陰陽脈浮大而濡上下同等名曰緩

動先偏勝為病後陰陽得復而和緩也小快於遲

去來微遲若尋常遲緩則為虛 為風

去來陽脈緊霧露之氣中上焦陰脈緊寒

過常邪中下焦上焦為太陽主頭痛項強下焦

動如轉索為少陰青慄足膝逆冷 諸緊為寒為痛

浮 諸脈為在表 為陽

沉 諸脈為在裏 為陰

遲 諸脈為在藏 為寒

數 諸脈為在府 為熱

微 脈軟如萎上肥者陽氣微也

濡 脈索如蜘蛛絲者陽氣衰也

絕 脈綿如瀉漆之絕者亡其血

時 脈浮而洪身汗如油喘而天

立夏得洪大脈是其本位其人病

身不疼不重者須察其汗若明日

自出者明日便解一何以言立

夏得洪大脈是其時脈故便然也

四時故紀



遲 邪 散 華 代

去來極緩 一息三至 中空傍實 浮之又浮 按之解散 陰陽離也 氣血不循 常度 動而中止 不能自還

遲為在藏 遲為寒

陰脈遲澹故知亡血

榮氣不足也

為虛為失血

傷寒咳逆上氣其脈散者

死謂其形損故也

脈弦而大弦則為臧大則為託臧則為寒託則為虛寒虛相傳此名為革婦人則半產漏下男子則亡血失精

真氣衰極脈不能自動因

呼吸相引而動為死脈也

或曰雜病以弦為陽傷寒以弦為陰雜病以緩為陰弱傷寒以緩為和緩何也曰雜病以弦為陽者脈近乎浮實也傷寒以弦為陰者弦乃陽為陰所鬱如養時寒氣尚凜陽不得發越故春脈弦經云厥陰之至其脈弦是也若緩者傷寒以天為病遲緩為邪退邪退病際則氣脈和緩故為欲愈之脈雜病以緊為七表傷寒以緊急少陰蓋緊者停景多言咽痛下利虛損多汗等證然在陽經則浮而緊在陰經則沉而緊也若時疫流行經所謂天地之氣勝復之作不行於証

新刊仁齋傷寒類書活人總括卷之二

傷寒總括

調理傷寒統論

傷寒汗下溫之法最不可輕據脈以驗證問證而對脈太陽者陽證之表也陽明者陽證之裏也少陽者二陽三陰之間太陰少陰厥陰又居於裏總而謂之陰證也發於陽則太陽為之首發於陰則少陰為之先太陽惡寒而少陰亦惡寒但太陽之脈多浮少陰之脈沉細與其他證狀亦自異也發熱惡寒身軀疼痛或自汗或無汗是為表證可汗不惡寒反惡熱手掌心并腋下戢戢而汗口燥胃乾壯熱腹滿小便如常不白不少而大便秘鞭是為裏證可下厥冷拳默自利煩燥而無身熱頭疼是為陰證可溫單浮與浮洪浮數浮浮緊者此表病之脈滑實弦緊中間數盛者此裏病之脈沉而微細緩弱者此陰病之脈在表者

邪搏於榮衛之間在裏者邪入於胃府之內胃府而下少陽居焉若傳次三陰則為邪氣入臟矣胃府如府庫之府故謂之裏大抵以剛劑溫之榮與衛均為表也亦均可汗也然自汗者為傷風七傷衛氣衛行脉外其脉浮緩而病尚淺則以桂枝湯助陽而汗之輕無汗者為傷寒七傷榮氣榮行脉中其脉浮緊而病稍深則以麻黃湯助陽而汗之重榮衛固為表也胃府亦可以為表也然以府臟而分表裏則在府者謂之表在臟者謂之裏胃取諸府可以表言若合榮衛府臟而分之則表者榮衛之所行裏者胃府之所主而臟則又深於裏者矣榮衛屬太陽經陰經審脉問證辨名定經真知其為表邪則汗之真知其為裏邪則下之真知其為陰病則溫之表有邪則為陽虛陰盛而發表之藥溫裏有邪則為陰虛陽盛而攻裏之藥寒陰經受邪則為臟病而溫陰之藥熱是三者貴乎得中否則寧可不及亦不可太過得中者上也不及者次也夫苟太過則斯為下矣蓋

得中者如此而汗如彼而下又如彼而溫程校氣投之不差曹附發而必中重者用藥緊輕者用藥微不背陰陽配合法度故曰得中者上也寧可不及者證與脉大同而小異名與證似異而實同當五分取汗而三分之劑散之當五分轉下而三分之劑導之當純剛溫裏而略溫之劑扶持之未可汗下者與之和解未可遽溫者且安其中若猶未也則增減於其間細細而加消詳徐七而就條理雖未遽安亦無傳變故曰寧可不及者次也太過者粗工不知深淺輕舉妄動者為之或問證而不知脉或執脉而不對證或名實之不辨或日數之為拘遂有汗下太早之失甚者諉曰不問陰陽當汗而反下則為痞為結胃為懊懣當下而反汗則為譫語為無陽動經為下厥上竭至於陽厥似陰之類誤以剛劑投之舌黑發狂悶亂可畏性命至貴可輕試哉故曰夫苟太過則斯為下矣大抵治傷寒有法與治他病不同條例審的藥進病除七劑少差生死立異古之人

傷寒 卷二  
處方立論曰可汗曰可下曰可溫曰和解曰少與曰急下曰隨  
證參泄與夫先溫其裏乃發其表先解其表乃攻其裏謂知音  
者若網在綱有條不紊此固得中者之事也若班固所謂有病  
不服藥常得中醫許仁則以為守過七日最為得計此非寧可  
不及之意乎王叔和善脈而且以承氣為戒初虞世善方而論  
傷寒一節且謂非深於其道則莫之敢為又非所以  
為太過者之戒乎論而至此則知古人之立論甚嚴而傷寒汗  
下溫之法其不可輕也信矣雖然汗下溫之法固自有定論也  
經云傷寒六七日目中不了了無表裏證脈雖浮亦有可下者  
少陰二三日無證亦有可汗者陰證四逆法當用溫而四逆散  
輦中有四逆散此豈厚誣哉曰醫在九流之中非圓機之士  
不足與語也何者脈雖浮而亦可下者無表裏證謂六七日大  
便難也藉使大便不難其敢輕下之乎少陰病亦有發汗者謂  
陰證初病便屬少陰而反發熱少陰本無熱今反發熱者是表

猶未解故用溫藥微取其汗也藉使身不發熱其敢輕汗之乎  
四逆湯用薑附四逆散用枳柴一熱一寒並主厥逆固不伴矣  
然傳經之邪與陰經受邪初病便厥者不同故四逆散用藥寒  
主先陽而後陰也四逆湯用藥熱主陽不足而陰有餘也其敢  
例視陰逆一切溫之乎不特此爾傷寒有始得病其脈沉數外  
證腹滿口燥煩渴即為陽盛入內之證醫法以下劑攻之不可  
槩以一二日太陽而發表也前所謂陰證傷寒初病以來便見  
脈沉厥冷惡寒更無頭痛即是少陰受病之證醫法以四逆散  
四逆散輦溫之又不可槩以三陰傳次先太陽而後少陰也若張氏  
之論日數則曰日數雖多但有表證而脈浮者猶可發汗日數  
雖少若有裏證而脈沉實者即須下之是日數之不可拘也如  
此孫思邈云服承氣得利謹不中補熱氣得補復成此所以言  
實熱也王叔和有曰虛熱不可大攻熱去則寒起此所以言虛  
熱也二人之言殊途同歸是虛實之不可不辨也如此又况寒

溫熱同實而不同名暑濕風異種而有兼病異氣之相乘他邪  
之並作表證中之有不可汗裏證中之有不可下三陰可溫而  
攻積證者不同表裏俱見與半表裏無表裏者有異中暑熱病  
疑似難明傷寒傷風脉證互見陽明本多汗而有反無汗之形  
少陰本無汗而有反自汗之證或陰極發燥熱極發厥陰證似  
陽七證似陰差之毫釐繆以千里又有痰證食積虛煩脚氣證  
似傷寒不可以傷寒之法拘之自非心領意會達變知幾躰認  
之精發用之審則縱橫之應幾何而不寐哉孔子曰可與適道  
未可與立可與立未可與權是說也亦在夫人權之而已矣

陰陽虛盛用藥寒溫辨義

外有脉內無脉為外實內虛外無脉內有脉為內實外虛七實  
之義隨其脉之有無者言之人所共知也若夫傷寒一書所謂  
陰陽虛盛則精微之義不無辯析於其間四十八難曰病之虛  
實出者為虛入者為實蓋外有脉者表之真陽氣虛故陰邪必

盛出而乘陽是以脉浮於外其病在表法當汗之當其陰邪出  
表脉浮於外之時不可自惑以為陽脉盛也內有脉者裏之真  
陰氣虛故陽邪以盛入而乘陰是以脉實於內其病在裏法當  
下之當其陽熱入裏脉實於內之時不可自惑以為陰脉盛也  
是說非古人之立意也蓋使人知如此之為陰盛則抑陰而助  
陽如彼之為陽盛則抑陽而助陰七盛而邪出於外者發表之  
藥當性溫以助陽如桂枝湯之類是也陽盛而邪入於內者攻  
裏之藥當性寒以抑陽如承氣湯之類是也或曰陰出而乘於  
外是陽之不足也發汗則亡陽而汗之何哉是大不然陰邪搏  
於外不汗之則邪何由去陽之性溫七之乃所以助陽七有  
所助而長則陰邪之所由以消其辛發散為陽者此也張氏所  
謂氣入胃陰盛以亡者正恐陰盛出外而誤以氣下之外  
得寒以助邪內攻虛而損正安得而不亡或者又曰陽入而乘  
於內是陰之不足也陰受病則當有以溫養而下之何哉是又

不然陽邪入於內不下之則邪何從出承氣之性寒也之乃所以抑陽也有所抑而微則真陰之所由以長酸苦湧泄為陰者此也張氏所謂桂枝下咽陽盛即斃者正恐陽盛入內而誤以汗之內得熱以助邪外微虛而損正又安得而不斃觀古人發表之藥多溫攻裏之藥多寒則知陰陽虛盛之意微非止為汗下設正所以為用藥寒溫設也可不明辯哉桂枝湯麻黃湯之須加黃芩升麻柴胡湯葷冬月用之須加官桂

表裏虛實辨義

傷寒治法內則審脈外則審證大要辯表裏虛實為先病在表有表虛有表實病在裏有裏實有裏虛又有表裏俱虛表裏俱實毫釐之分貴乎早辯表虛者脈浮而緩自汗惡風用桂枝湯以解肌表實者脈浮而緊無汗惡寒用麻黃湯以發汗裏實者脈伏而牢心腹滿結或大便堅用承氣湯以瀉之裏虛者脈沉而弱自利厥冷用四逆湯以溫之至若表裏俱

虛則舉按脈虛如急救表裏之類下利身疼先與四逆湯自調後與桂枝湯是也表裏俱實則舉按脈實如表裏俱虛類脈浮尿赤與五苓散誤下腹痛與桂枝加大黃湯是也大便入傳變各有處所淺深輕重時刻異同精對無差立當見效

六經用藥格法

太陽屬膀胱非發汗不能愈必用桂枝麻黃以助陽却邪陽明屬胃非通泄不能痊必用大黃芒硝以疏利陽熱少陽屬膽無出入道柴胡半夏能利能汗消解血熱黃芩佐之太陰脾土性惡寒濕非乾薑白朮不能溫燥少陰腎水性惡寒燥非附子不能以溫厥厥肝木藏血榮筋非芍藥甘草不能滋養此用藥經常之道也然三陽汗下和解人皆知之至若太陰溫燥不行則亦當溫利如桂枝加大黃之類是太陰自陽明而出也少陰雖用附子亦有黃芩細辛之證是少陰自太陽而出也厥陰類例其間有用桂者是厥陰自少陽而出也其或太陽少陽二經鬱

閉則三陰皆自陽明出焉故三陰皆有下證如太陰腹滿時痛  
 為有積少陰咽乾口燥為腎汁乾厥陰煩滿耳聾舌卷囊縮為  
 毒氣入臟皆當下之知乎此則傷寒用藥之法隨變隨應而不  
 窮矣雖然傷寒七日傳遍六經此約法也或首尾只在一經或  
 間傳一二經而止又不可拘但據脈與外證驗之是為活法  
 是篇用字勝肌即太陽胃即陽明膽即少陽太陰曰脾少陰  
 曰腎厥陰曰肝蓋取其音律正耳  
 傷寒內實大熱通利之後已得輕差且量進白粥兩三日未  
 可遽與和胃之劑熱氣得之又復作也繼此旋以易簡溫膽  
 湯入竹茹與之或一陳湯加前胡亦可矣二藥傷寒後通  
 用無熱者只守本方世俗以四君子湯為貴細循習用之不  
 思內有白朮溫而閉氣往上升因此而燥開矣

新刊傷寒類書活人總括卷之二終

新刊傷寒類書活人總括卷之三

# 傷寒證治

表裏汗下二證

發熱憎寒身痛時  
不憎寒却煩憎熱

脈浮解表定無疑  
多汗咽乾裏下之

○表證脈浮身體肢節疼痛惡風惡寒○裏證脈實而不浮  
 不惡風寒反惡熱身不夜自汗譫語不大便或咽乾腹滿○  
 表裏俱見證張氏用五苓散真人用桂枝加大黃甘草湯一塊  
生薑兩箇芍藥兩箇內桂大黃甘草等甘草蒲葦水煎存七分表裏傷寒  
 只一掃岳陽樓  
降筆

三陽三陰脈

陽屬膀胱胃脾間  
浮長弦細沉微緩

陰居脾胃更連肝  
審脈仍辨外證者

三陽外證足之三陽從頭走足

腰脊頭疼熱惡寒

耳聾口苦時乾嘔

目夜汗熱暈中乾

胃脇堅夜寒熱干

○太陽證腰脊強頭項痛發熱惡寒若傷風則暈塞惡風○  
陽明證目夜身熱暈乾不惡寒反惡熱自汗出不得卧內實  
大便難○少陽證耳聾胃脇痛或口苦咽乾目眩或往來寒  
熱而嘔○陽病體輕脉輕外證壯熱煩渴大小便秘頭面有  
汗昏潰氣麓揚手擲足

三陰外證足之三陰從足走腹

腹滿肢温利不煩

舌乾燥渴或憎寒

唇青舌卷多煩滿

筋急裏間縮又攣

○太陰證腹滿或痛手足温自利不渴喉下乾○少陰證口  
燥舌乾而渴或口中和則惡寒常默欲寐不欲見光明有  
時腹痛又有因痛二證○厥陰證唇青舌卷煩滿筋急裏攣

婦人則或消渴飢不欲食食即吐蛔○陰病體重脉重外證  
厥冷反青腹滿不渴大小便自利惺惺而靜引衣自蓋足攣  
而卧三陰病無身熱無頭痛其或渴者陰極發躁也○陰證  
唇青舌黑或白胎或卷強者用生薑頭擦唇口續又易之薑  
能回陽生胃解毒温血散氣擦之後陰消陽長黑轉而紅最  
為良法

汗下温正法

○大陽傷風自汗惡風桂枝湯傷寒無汗惡寒麻黃湯風寒  
俱盛則以桂枝麻黃湯兼用自汗小便數者勿用桂枝可乾  
薑早湯芍藥甘草湯桂枝湯麻黃湯夏月用之須加黃芩  
○陽明不惡寒反惡熱自汗大便難用小承氣大柴胡汗多  
者胃汁乾急下大承氣無汗惡寒升麻湯有汗脉遲微惡寒  
為表未解桂枝湯無汗脉浮發喘麻黃湯○少陽並屬小柴  
胡湯柴胡湯輩冬月用之須加官桂○太陰自利不渴為臟

寒理中湯四逆湯陰證手足必微厥若手足温便是太陰胃  
膈脹滿枳實理中圓腹滿脉浮桂枝湯腹滿時痛桂枝加芍  
藥湯痛甚桂枝加大黃湯○少陰脉沉口不乾舌不燥及背  
惡寒者並用四逆湯小便白者亦用四逆始得病脉沉反發  
熱脉黃細辛附子湯口燥咽乾而渴急下之用大承氣○厥  
陰脉微浮為欲愈不浮未愈○不建中湯脉浮緩如瘧狀者囊  
不縮亦欲愈桂枝麻黃各半湯脉沉短者囊必縮為毒氣入  
臟可承氣湯下之利不止用四逆湯○三陰中寒微則理中  
湯稍厥或中寒下利則乾薑甘草湯大段重者用四逆湯無  
脉者用通脉四逆湯六經惟少陰難治大要以口燥而渴知  
其熱脉沉而遲別其寒然亦有表裏無熱但煩憤默默不欲  
見光明其脉沉細或時腹痛此可以四逆湯增加乾薑對之  
增損理中圓亦可矣凡陰證白通湯四逆湯通脉湯條例未  
敢據用者且以理中湯甘草乾薑湯代之雖然陰寒亦有毒

乃病氣也滯須行之長正冊金液冊半流圓皆可流利又為  
要藥

變汗法

○陽明與太陽合病有惡寒證屬表可汗用桂枝湯又太陽  
陽明合病胃痛而喘麻黃湯○陽明本多汗若脉浮無汗而  
喘可發汗亦用麻黃湯又陽明病脉遲汗出多微惡寒者表  
未解也可與桂枝湯又陽明煩熱汗出如瘧或日晡發潮熱  
而脉浮虛者並與桂枝湯若脉實者當用承氣○太陰腹滿  
脉浮桂枝湯凡太陰證有用五積散者非謂發汗蓋去積耳  
○少陰初得病脉沉反發熱者温之而微取其汗用麻黃細  
辛附子湯下利手足冷而身熱者非傷痛四逆湯又少陰  
病二三日常見少陰而無陽熱中滿之證者用麻黃附子耳  
○微汗之二藥皆陰證傷寒解表之劑陰證初病便屬少  
陰不待傳次



變下法

○太陽發熱汗出不解嘔吐下利而心中痞硬者**大柴胡**下之又太陽病十餘日熱結在裏往來寒熱亦用**大柴胡湯**無表裏證發熱七八日脈雖浮數可下**大柴胡**若大便難身微熱者**大柴胡**急下○太陰腹滿時痛甚者**桂枝加大黃湯**○少陰口燥咽乾而渴**承氣湯**急下之若口乾燥下利清水心下痛者為積證亦用**承氣湯**又少陰證六七日腹脹滿不大便用**承氣湯**又少陰惡寒而踈時煩不欲衣被為表裏裏者**大柴胡**下之○厥陰脈沉短舌卷囊縮為毒氣入臟**承氣湯**下之若厥冷耳聾囊縮而脈沉弦者為少陽厥陰兩感不治有本條又厥陰下利讖語脈不微細與**承氣湯**

變溫法

○太陽發汗漏不止惡風小便難四肢急難屈伸**桂枝加附子湯****大陽發汗後病不解而惡風者虛也****芍藥甘草附子湯**

又太陽汗後或下後病不解而煩燥者**茯苓四逆湯**又太陽心中悸而煩燥**小建中湯**又太陽七八日脈細惡寒為陰陽俱虛並不可汗下其人素無熱者**芍藥甘草附子湯**素有熱者**黃耆建中湯**又太陽病八九日風濕相搏身煩疼難轉側不嘔渴脈浮虛而澹**桂枝附子湯**若大便秘而小便自利者去**桂**加**白朮**又太陽風濕相搏骨節疼痛身軀微腫不能屈伸汗出短氣惡風而小便不利者**甘草附子湯**○陽明病反無汗皮上如虫行者為久虛可溫之用**木附湯****黃耆建中湯**非冬陽明無汗證也當加勉認

傷寒傷風脈證

傷寒無汗惡寒攻

自汗惡風浮緩脈

緊瀉浮兮慘在容

面光不慘是傷風

○傷風脈浮而緩自汗惡風頭疼面光發熱煩燥手足不寒熱勝於寒耳風傷衛氣表虛自汗法當解肌**桂枝湯****敗毒散**

獨活散人參羌活散可選用之若項背強桂枝加葛根湯裏  
 寒不飲水者桂枝去芍藥加附子湯或加乾薑臟腑滑者和  
 解散若鼻塞通關散或發汗漏不止而惡風四肢拘急桂枝  
 加附子湯壯熱煩燥人參羌活散參蘇飲或天麻防風丸薄  
 荷泡湯調下脉濡緊自汗勿用桂枝湯當用小建中湯傷  
 寒脉浮而緊無汗惡寒頭疼面慘發熱拘急手足微寒上勝  
 於熱耳寒傷榮氣表實無汗法當發汗麻黃湯麻黃湯  
 人參順氣散可選用之頭痛甚者葱白湯或熱多寒少脉弱  
 無陽只用桂枝二越婢一湯或喘急者可與麻黃湯尺脉遲  
 而血少者黃耆建中湯○淋家衄家瘡家虛家四動氣不可  
 汗可與小柴胡湯○太陽脉浮有汗為傷風脉緊無汗為傷  
 寒○陽明善飢為傷風不食為傷寒○少陽耳聾目赤胃煩  
 滿為傷風口苦咽乾目眩為傷寒○三陰傷風但四肢煩疼  
 傷風見寒傷寒見風脉證

熱盛而煩手足溫

不煩少熱肢微厥

風生寒脉緊浮全

寒證兼風浮緩然

○傷風見寒脉傷寒見風脉為榮衛俱受邪用大青龍湯然  
 大青龍不可輕用須是風寒俱盛又加煩躁一證方可與之  
 叙易簡者謂二證交攻則桂枝麻黃湯兼用尤為穩當

二陽合病

太陽合胃脉浮長

膽合胃時弦不短

若是浮弦合少陽

更將外證互推詳

○太陽上明本太陽病若汗若下若利小便無津液胃中燥  
 轉屬陽明故大便堅小便利是為脾約脾約圓麻子仁圓主  
 之若惡寒則用升麻膏根湯不惡寒反惡熱大便秘可少  
 與白虎湯不惡寒反惡熱大便秘或譫語調胃承氣湯下之  
 喘而脅痛者不可下用麻黃湯○太陽少陽頸項強急脇下  
 鞭痛目眩往來寒熱諸證並小柴胡湯○少陽上明本少陽

病因發汗利小便後胃中躁大便難屬調胃承氣湯。○正陽  
陽明本經風盛氣實也。大柴胡湯。大小承氣湯。主之。○又三  
陽合病腹滿身重面垢譫語遺尿口中不仁屬白虎湯。或舌  
乾口燥不仁背惡寒者通用。○太陽陽明少陽陽明正陽陽  
明無表證者俱可下惟惡寒中寒為太陽上明合病未過經  
却屬表可發汗用桂枝麻黃各半湯。蓋在經則汗過經則下  
也。○三陰無合病

太陽陽明併病

太陽已汗併陽明

全入陽明須下劑

不惡寒兮裏未寧

汗之猶在太陽經

○太陽上明併病本太陽初病發汗而汗出不徹轉屬陽明  
續微汗自出不惡寒是併歸陽明也。○若太陽證尚在桂枝  
麻黃各半湯。○若太陽證已退但有陽明者大承氣湯下之

春溫夏熱

春溫浮脈易輕安

夏月傷寒為熱病

發熱頭疼渴飲干

脈來洪盛療應難

溫病發於春間及夏至以前是也發熱咳嗽頭疼身疼口  
燥渴脈來浮緊特其病輕耳。○熱多者小柴胡湯熱少者  
麻湯解肌湯微熱不渴者小柴胡加桂。○渴者小柴胡去  
夏加人參芍藥根。麻實煩渴大柴胡微利之。以其實而大便  
秘也虛煩用竹葉湯。○嗽者小柴胡加五味子。○夏月傷寒  
是為熱病發熱頭疼脈躡痛重或惡寒或惡熱其脈洪盛用  
藥不可太溫如桂枝麻黃青龍湯之屬須以黃芩升麻佐之  
○熱病二日外脈仍數邪猶在經絡未入臟腑者桂枝石膏  
湯。○三月至夏謂之晚發。○桂枝升麻湯

風溫濕溫

風溫熱汗脈多浮

腹滿脚寒頭目痛

常渴寢眠躡不收

濕溫叢熱汗頻流

風濕尺寸俱浮素傷於風因而傷熱風與熱搏即發風溫惟  
其有風則四肢緩縱而不收也其證身熱自汗頭疼喘息發  
渴昏睡或體重不仁謹勿發汗汗之則譏語燥擾目亂無精  
張氏又云寸脉浮滑尺脉濡弱亦不可下下之則失溲直視  
若被火則發黃瘵瘵狀如驚癇皆變逆之証耳○病在少陰  
厥陰二經用**安胎湯****人參敗毒散**○身灼熱用**石膏湯**○  
○渴甚用**麥根湯**○脉浮身重汗出用**防己湯**汗用**防己**  
**黃耆湯**救之○龐氏用**葛根龍胆湯**證治論用**小柴胡湯****未**  
**醒湯****柴胡桂枝湯**取微汗○痰壅**金沸草散**咳嗽加**杏仁****細**  
**辛****五味子**○濕七寸濡而弱尺小而急素傷於濕因而中暑  
濕與熱搏即發濕上其狀胃腹滿頭目痛發壯熱苦妄言身  
上汗多兩脛逆冷倦怠惡寒若妄發其汗使人不能言耳聾  
不知痛處其身青面色變是重暈而醫殺之○濕上病在太  
陰經用**白虎**加**蒼朮湯**更加**官桂**○濕氣勝則一身盡痛

熱身黃小便不利大便反快用**除濕湯****五苓散**臟腑虛大便  
濕者**理中湯**加**蒼朮****白茯苓**虛滑甚者**木附湯**○暑氣勝則  
吐熱煩燥小便不利大便閉澀用**香薷散**治要**天和湯**臟腑  
閉而煩渴者**白虎**加**蒼朮湯**

風濕中濕

風濕浮兮額汗微  
身黃熱痛沉而緩

腫疼發熱喜重衣  
中濕勝踈小腑稀

風濕脉浮先傷濕而後傷風故也外證肢體腫痛不能轉側  
額上微汗怯寒而不欲去衣大便難小便利熱至日脯而劇  
治法但微解肌若發正汗則風去濕在非徒無益而又害之  
○治法微解肌用**麻黃****杏仁****薏苡****甘草**加**白朮****防己****黃耆湯**  
不嘔不渴脉虛浮滑者**桂枝****附子****湯**○濕多身痛小便不利  
**白朮****附子****湯**煩渴小便不利**五苓散**○外不熱內不渴小便  
自利**木附湯**緩弱昏迷腹滿身重自汗失音下利不禁**白通**

湯多加**白朮**少用**甘草**○身腫痛微喘惡風**杏仁湯**○通用  
**人參****敗毒散**熱而煩渴者加**石膏****梔子**若誤下之小便必不利  
可與**五苓散**○中溫脈沉而緩風雨襲虛澤潤蒸氣人多為  
溫所傷也一身盡痛重着黃關節煩疼發熱鼻塞時或脹  
滿大便利小便難其外證可溫家不可汗汗之則發瘧熱而  
瘧者死亦不可下下之則額汗胃滿微喘而噦小便不利全  
濟亦難經云治溫之法不利小便非其治也○中溫小便不  
利大便自利**甘草****附子湯****五苓散**或**除濕湯**加**茯苓**主之大  
小便皆自利則與**木附湯**身軀痛或鼻塞**黃耆建中湯**不  
**中湯**寒濕交攻疼痛重着易簡**參溫湯**甚者生料**理中湯**加  
**附子**○風寒氣溫合而為痺其何以為之治曰寒多則為  
疼痛當用**官桂****乾薑****附子**風多則為走注當用**麻黃****意文**為  
頭中氣則為堅痛**茯苓****陳皮****枳殼**所不可關中溫則為重着  
能以**茯苓****蒼朮****乾姜**主之應手而愈

溫毒中暑

溫毒春間斑發瘡

嘔而咳悶透心腸

背寒面垢虛呆昧

自汗焦煩是暑傷

溫毒者冬間感受寒毒乖氣至春而發也表證未退毒氣不  
散所以發斑肌肉疹紋心下煩悶嘔逆咳嗽後必下利寸脈  
洪數尺脈實大其為病重蓋陽氣盛耳○治法通用**白朮**  
**茯苓****黑膏**亦主之或用**敗毒散**加**紫草**咳悶而嘔清汁者當  
**根苦艾湯**證治論**黃連****檉皮湯**○中暑脈虛弱或沉伏身熱  
背寒面垢自汗煩燥大渴手聳惡寒昏倦怠而身不痛經  
云寒則腠理閉暑則腠理開上則溽熱寒閉則熱而悶熱則  
不精以傷暑為熱病誤人多矣○內外俱熱口燥煩渴四肢  
微冷而不痛**白虎湯**○痰逆惡寒**檉皮湯**熱悶不思寒竹葉  
**石膏湯**○煩衰惡心煩燥心下不快**五苓散**消暑圓○霍亂  
吐瀉**香薷散**溫服○信効方中暑用**小柴胡湯**厥孔運腹理

開酒然毛聳口前開而板齒燥用**白虎加人參湯**○傷暑發  
 大熱頭痛自汗咽疼煩燥腹中熱緩諸藥不効者**小柴胡湯**  
 最良小便不利**五苓散**○熱病中暑濕上雖皆因暑所致然  
 脈証不同當明辨之熱病者冬間感寒至暑氣盛而後發此  
 即夏月傷寒但熱多而脈洪盛是也中暑者病在太陽外證  
 與熱病相似但熱病脈盛肢節痛重中暑脈虛肢節不疼兼  
 面垢背寒而手足微冷是也濕上者濕熱相搏致之病在太  
 陰其脈寸濡而弱尺小而急外證胃脘滿頭目痛身熱汗多  
 而足脛逆冷是也以上三證夏月病多有之須別其名庶無  
 毫釐千里之謬○凡夏月傷暑雖則熱毒作恙皆因脾胃虛  
 怯而得之胃虛然後伏暑伏暑然後煩燥其有飲水過多及  
 用解暑冷藥太過傷動其中直氣內虧嘔吐不食自利不渴  
 六脈沉微按之隱下是為裏寒外熱如陰盛隔陽之類不可  
 更泥中暑伏熱之說急以**理中湯**或**甘草乾姜湯**與之

更小便不利斷不可以為熱也又有冷藥過度胃寒停水  
 熱而嘔或身熱微煩此亦陽浮外而不內可與**小柴胡湯**  
 或加**前胡**脾胃素弱者**陳湯**主之雖然抑猶有戒也夏  
 月病多傷暑家脈虛面黧冷汗手足微寒苟不揣其裏熱  
 之證妄以剛劑投之抱薪救焚不發黃則發斑甚至蓄血悶  
 亂而死矣可不溯源徂流而精審云○假如夏月泄瀉不止  
 胃脘閉隔飲食不進或心腹痛滿大抵因暑得之泄瀉中滿  
 者**香薷散**加**縮砂**下**消暑圓**心腹刺痛者**香薷散**加**縮砂**下  
**蘇合圓**俱得其便○假如夏月下痢或赤或白煩渴嘔逆腹中攪  
 痛小便不利是亦因暑致之可與**五苓散****香薷散****小柴胡湯**  
**黃龍圓**之屬若以此嘔證為脾胃虛寒則誤矣

○痲病溫瘧疫癘  
 痲甚風癘強體肢  
 後寒先熱各溫瘧  
 疫癘之邪責四時

**瘧者**先傷於風又感寒濕致之發熱腹痛口噤頭搖瘳瘳不語項強背直腰身反張或目疼或目赤或閉目或反目或足冷或足溫或妄行其脉沉弦而遲亦或帶緊此為惡候不救者多若脉如雨濺散出於指外者且暮死也傷風頭痛發熱常出微汗又自嘔逆汗之必發瘧新產血虛汗出傷風亦致發瘧大發濕家汗亦作瘧熱而瘧者死瘧初發來多有腰痛之證內經曰戴眼反折瘳瘳汗出如珠着身不流太陽絕也其謂是乎○發熱無汗惡寒譎語為剛瘧曰陽**葛根湯**發熱有汗不惡寒為柔瘧曰陰**桂枝加葛根湯**枝枝實葛根湯○二瘧通用**小續命湯**陽瘧去**附子**陰瘧去**麻黃**○剛瘧胃滿口噤咬齒脚攣卧不着席**天承氣湯**下之○柔瘧心下木湯**附子**防風散**白朮散**桂枝散○**白朮散**即壞病也尺寸俱盛先熱後寒吐汗下後重感於寒者其脉弦遲熱多者其脉弦數寒熱乃陰陽之

或有談論傷寒證藥壞病吐汗下後續生寒熱則曰死所幸分而成之不思占人一藥對一病藥進病除安有謂分為寒熱者哉噫此可為智者道也○先熱後寒及寒熱並等並**小柴胡湯**先寒後熱**小柴胡湯**加**桂枝**○多熱但熱而無少與**白虎湯**或**白虎加桂湯**○多寒但寒者**柴胡桂薑湯**○**中湯**加**桂枝**虛人寒甚**七厘湯**○熱多痰多嘔不入食**三陳湯**加**烏梅**○小便秘澀汗出煩渴素有瘳氣不伏水土而嘔**五苓散**○大便秘嘔吐寒熱無時脉小緊者**大柴胡**下之○瘳脉自弦七數多熱弦遲多寒遲弱可溫緊浮可汗緊實可下浮大而胃滿者可吐○經云夏傷於暑秋必病瘧固非傷寒之謂然壞傷寒有溫瘧一證若纏綿不已腹中必有瘳瘳用藥對治或者殊途而同歸活人書以**法邪疔**取吐久不愈者服**瘳疔散**亦諸瘳中通用之劑耳惟瘳瘳能生寒熱凡瘳皆有水惡血包裹而成也**瘳疔散**中有逐水破血之劑

為能下之痰水在上者**湯**中有**常山**為能吐之瘧家之  
蓄黃水若水不在於上焦則**常山**亦能下之也一法**常山**  
**御一倍****草果****烏梅**各半新汲水隔宿煎凌晨服又法  
**青蒿****葶藶**等為細末研**送**入**臘**圓如桐子凌晨二十粒**藥湯**  
下此皆勝藥嘔者可與**二陳湯**痰飲中節致生寒熱者亦與  
**二陳湯**餘見似瘧條例。**痰癘**傳染老幼皆相似調治一也  
寸濡弱尺弦緊或肝脈濡細是雖責邪四時然發汗吐下條  
例通行故曰明知逆順正行無間雖然陰陽表裏條例通行  
固也然其毒癘之氣蘊蓄于中亦須隨其溫涼權其輕重而  
利道之庶毒有所泄則易為力也。病源云挾毒癘之氣壯  
熱煩毒發為心腹脹滿者不治。春感清邪在肝**升麻湯**  
**湯**○秋感熱邪在肺**白虎**加**蒼朮湯**發黃瘧**茵陳**調**五苓散**  
○冬感溫邪在腎亦名冬溫**萎蕤湯**○土無正刑因火而名

當隨經取之此大槩然耳○寒證者**聖散子****發火圓****神**  
可選用**聖散子**內用**木****附****豆蔻****良薑**只可施之寒溫母感  
通用之說○溫疫通用**敗毒散**

○疫證傷食類傷寒  
有痰頭項皆和暢  
外熱憎寒寸浮上  
頭疼右數身不疼  
左手脈平傷食狀

**大醫**寸口脈浮發熱憎寒惡風自汗胃膈妨滿氣上衝咽不  
能喘息頭不疼項不強為異耳○有熱用**柴胡半夏湯****金**  
**草散****易簡****蘇**無熱**二陳湯****溫膽湯**○非次頭疼者曾  
痛發寒熱亦是疫證但脈緊而不大**瓜蒂**吐之此不可謂痰  
證例無頭疼當以他證參之也○**傷食**右手關脈盛而數  
邪伏於脾胃則食不能消經云人迎緊盛傷於寒氣口緊盛  
傷於食人迎主外風寒入之氣口主中飲食傷之是以有左

傷寒  
傷食  
傷寒  
傷食



右手之別○中脘痞悶嘔而熱者二陳湯加生薑烏梅○寒  
多不甚熱者治中湯五積散○心腹滿痛者大柴胡下之○  
胃膈實而嘔吐者食在上脘瓜蒂散吐之○夾食傷寒證候  
按病源云下後六七日不大便煩熱腹滿而痛為胃中有積  
糞挾宿食故也審如是則夾食傷寒即大陰積證腹痛時痛  
桂枝湯加大黃者是爾所以大陰受病主胃膈脹嘔噎  
泄朱氏以為飲食得之如曰大陰證飲食不節胃膈不快用  
理中湯加青皮陳皮或枳實理中圓或二陳湯皆其治也今  
推明治法有表者與治中湯去白朮多用青皮有表復有裏  
者與桂枝加大黃湯若表證已解但有裏證者小承氣湯與  
之可也張氏云傷食者坐大黃三五粒入湯劑中正此意耳  
雖夾食傷寒則脾胃已傷暴加轉下不可也妄發其汗亦  
不可也識者於此又當權衡餘見霍亂條例○夾食傷寒  
見吐利厥逆而不挾表證者依陰病及霍亂等治之若吐

厥逆而挾表證者即依先救裏後救表之法

○虛煩脚氣類傷寒

虛煩身首全無痛

眊自和平多熱壅  
脚氣酸疼而弱腫

轉筋惡食大便難

**虛煩**諸虛煩熱也不惡寒身不痛頭不疼眊不浮不緊數在

異耳傷寒亦有虛煩見○重者黃芩湯輕者小柴胡湯嘔者

**大橘皮湯**並不可汗下○陰證虛煩外熱內寒肢節疼痛

**白湯**○**御氣**初病發熱憎寒頭痛嘔噎惡聞食臭肢節酸疼

大便艱難或胃滿腹痛卒起而脚轉筋屈弱卒痛腫重痺頑

為異耳○脚氣通用三和散降氣湯大流氣飲烏藥順氣散

分氣紫蘇飲木瓜散只可二仁圓濟南圓枳殼散用木瓜煎

湯調下○毒氣入腹衝心作痛吐涎者降氣湯下養正丹或

用吳茱萸製炒煎熟入生薑汁主之○寒多者越婢湯小續

命湯加生薑汁○熱多者人參羌活散取毒散並加木瓜或

傷寒

傷寒

○風多者下續命湯加獨活或越婢湯  
○溫多者除濕湯○痰多者除濕湯下白圓子挾寒  
者養正丹○煩燥者竹瀝湯或紫雪○大便秘者脾約圓  
功圓麻仁圓或五積散加大黃○風毒腫痛排風湯攢柳散  
○筋急制痛南木香煎湯調乳香越痛散○又法香蘇散三  
錢山續子兩箇取皮肉剉新瓦上焙焙真香碎三節和之新  
汲水煎空心挾服脚氣風癩痛痒皆作效更加川芎  
脚氣證候真與傷寒無異或發熱頭痛或身冷疼或寒熱  
往來或自汗惡風或無汗惡寒或大小便秘澀腹痛下利骨  
痛氣短怔忡煩悶嘔噦涎沫惡聞食臭大類傷寒但卒起腿  
脚屈弱頑痺肢節挛急酸疼或歷節及踝脛間焮然赤腫為  
異耳傷寒傳足六經脚氣亦傳足六經在太陽則頭痛項強  
腰背酸重在陽明則口燥鼻乾惡熱譫語在少陽則耳聾口  
苦胃脇俱疼在太陰則胃腹滿痞肢體浮腫在少陰則咳喘

恐惕咽痛面翼在厥陰則癱緩筋挛陰器脹痛六經所傳又  
有合病併病外證與傷寒並同凡遇發熱煩燥大便不通嘔  
歲痰涎而惡食者須審問之脉浮而弦者起於風風則汗而  
愈濡而弱者起於溫也則滲而愈洪而數者起於熱也則下  
而愈遲而澀者起於寒也則溫而愈風寒暑溫證狀不同然  
風為走注寒為疼痛暑為熱煩溫為重着必有可驗之迹治  
法總要貴乎疎導大便但不可過劑其補湯淋洗則醫家之  
大戒也雖然脚氣漸入頓深非藥力相接不可也治之亦當  
究其源或因丹砂發動則為之解丹砂或因飲食醱成則為  
之消飲食氣觸而作者與之調氣續生他病者則以他病方  
藥理之所患氣實而死未有服藥致虛而殂甚者喘嗽上氣  
衝築心疼嘔吐無已腹脇脹滿脐下頑痺不仁最為惡候大  
槩然尔所謂寒則溫之熱則寒之在表則散在裏則下大虛  
氣乏扶養其中是為不刊之法○千金慰法食鹽并竈中灰

等和炒熱重帛盛而發

傷寒傳經之邪病至厥陰其脉微帶浮緩之狀是則脾氣將復邪無所容必裏熱作而得汗解若尺寸俱沉短此為毒氣入臟土敗木賊脾受肝邪必有囊縮舌卷耳聾不知人之證當急下之五救其一或脉來弦亦賊邪也○許學士云輕手脉浮為在表表實浮而兼有力但浮無力表中虛自汗惡風常漸漸重手脉沉為在裏上實脉沉來有力重手無力大而虛此是裏虛理端的氣口緊盛食必傷人迎緊盛寒邪熾跌陽胃脉定死生太谿腎脉為根帶○之熱入血室血熱留滯小柴胡湯加生地黃治血結胃按之痛活人書海蛤散蓋血聚臆中則小腸必壅小便通則胃次之血散矣○凡小便赤或澁皆其裏有熱也

新刊仁齋傷寒類書活人總括卷之三

新刊仁齋傷寒類書活人總括卷之四

發熱

發熱初陽冷必憎

陽明發熱汗之形

少陽脉細仍兼嘔

反熱而沉屬腎經

發熱多屬三陽太陰厥陰皆不發熱惟少陰有反熱二證然少陰發熱終是脉沉或下利手足冷也三陽發熱何以明之太陽發熱則惡寒陽明發熱則自汗少陽發熱必有乾嘔之證矣熱邪在表病屬太陽此表熱而裏不熱也熱邪在裏病屬陽明此裏熱盛而達於表也若表證未罷邪氣傳裏裏未作實病在表證裏證之間若傳經之邪至於少陽病在二陽三陰之間其熱皆輕於純在表純在裏者也然而陽明裏實熱盛固當攻之以寒太陽風寒外搏陰盛惡寒雖熱尤當溫散少陽和解雖屬柴胡微熱不渴者又當加桂是不可無以權之雖然傷寒發熱病之常也脉陰陽俱虛熱不止者什

傷寒 卷四  
下利發熱者殂汗後復熱其脈躁疾為陰陽交此皆不治之證其可例視之乎○太陽發熱惡風有汗桂枝湯惡寒無汗麻黃湯○吐利發熱惡寒是為霍亂○發熱而渴自汗不惡寒是為風溫若誤汗之必身灼熱煩渴獨語各有本條○陽明發熱汗出脈實調胃承氣湯脈浮桂枝湯汗多者胃汁乾急下之用大承氣湯○少陽發熱脈細而嘔小柴胡湯○少陰發熱有二證脈沉發熱者麻黃細辛附子湯若下利厥逆裏寒外熱脈不出者通脈四逆湯○身熱而不渴則為表熱小柴胡湯加桂身熱而燥渴則為裏熱白朮加人參湯○無表裏證發熱七八日脈雖浮數可大柴胡湯下之若下後脈數不解消穀易飢不大便則為瘀血屬抵當湯

潮熱

熱潮屬胃下之和 大結胃家本例圖  
咳逆利溇并表證 勿攻只用小柴胡

潮熱屬陽明一日一發日晡而作也若非日晡所發是謂其熱不潮蓋陽明旺於未申故爾惟屬陽明故潮熱為可下之證苟其脈或弦或浮大便或溇或利小便澀澁外證猶有惡寒則其熱未全入府並不可下但以小柴胡和解之是必表證已退大便鞅結小便如常乃可攻也  
○日晡潮熱屬陽明經脈實可下證用小承氣湯大柴胡湯脈虛不可下者與桂枝湯○大結胃潮一證却屬太陽用大柴胡湯○咳逆潮熱○大便溇利潮熱○表證潮熱並用小柴胡湯○腹滿不大便只用小承氣湯微利之勿令大泄○日晡潮熱甚者循衣摸床獨語如怪直視微喘脈弦者可治脈濇者不治脈不實不虛但用小柴胡湯  
○冬陽明潮熱有時脈浮緊者無汗脈但浮必盜汗並用黃芩湯

寒熱

往來寒熱間陰陽  
結熱心煩仍喜嘔

大小柴胡及桂薑  
渴而頭汗用之良

陽不足則先寒後熱陰不足則先熱後寒七熱往來者陰陽相勝邪正交爭而作也蓋陽不足則陰邪出於表而與之爭故陰勝而為寒陰不足則陽邪入於裏而與之爭故陽勝而為熱若邪氣在半表半裏之間則外與陽爭而為寒內與陰爭而為熱出入無拘所以乍往乍來而間作也大抵邪居表多則多寒邪居裏多則多熱邪在半表半裏則寒熱相半此又可以知其受病之處用藥固自有條然小柴胡湯最主寒熱寒多者加桂熱結者加大黃脈不甚實而大便澀者加枳實熱相半只守本方是亦活法雖然寒熱之方來如波濤之洶湧其勢有不容遏者當遲之一二日俟少定而圖之經所謂其盛者可待衰而已是又不可不知

○病至十餘日結熱在裏往來寒熱大柴胡湯下之○心煩

喜嘔胃脇滿不欲食寒熱往來小柴胡湯或血氣弱腹理閉邪正交爭痰嘔甚者二陳湯○汗下後不嘔而渴頭汗出胃脇滿小便不利寒熱往來柴胡桂薑湯

寒熱似瘧

似瘧勝脫桂可醫

清便不嘔半麻枝

陽明實下浮須汗

血室柴胡小者奇

似瘧一名瘧狀作止有時非若寒熱往來或咳或數而作止無定時也凡感冒之人忽覺毛寒股慄筋節攣挛百骸鼓撼嘔不欲食其寒不可禦未幾復轉而發熱者此即溫瘧不必謂瘧脈自弦或洪數或緊實或虛緩或刮濇皆為瘧狀但以外證別之用藥固本條然小柴胡湯如前斟酌加減亦是活法雖然血虛能生寒熱敗血亦作寒熱陰陽相勝雖一證各有一方其間當以八為佐

○太陽似瘧證脈洪浮與小柴胡湯○清便自可不嘔日一二

發桂枝原百各半湯其脉微緩微浮則欲愈也○陽明似瘧證煩熱汗出口哺發熱脉浮虛與桂枝湯脉實與承氣湯○病人熱入血室其血必結如瘧狀者小柴胡湯主之○瘧後寒熱或潮熱見瘧後昏沉條○諸瘧通用二陳湯熱多者加小柴胡寒多者加小柴胡○餘見温瘧

熱多寒少

熱多寒少治膀胱

不嘔清便各半湯

及脉若遲為血少

脉皆微弱號無陽

熱多寒少陽乘陰也其間三證並屬太陽脉浮緊者可汗或遲或弱皆和解之清便自可謂大便如常也

○不嘔清便自可桂枝湯○尺脉遲血少者先以小建中加黃耆以養血俟脉不遲即以小柴胡桂枝二越婢

一葷主之○諸脉皆微弱無陽者用桂枝二越婢一湯不可

正汗

汗後寒熱

汗餘寒熱脉中論

若見憎寒法用温

沉實當攻浮再表

風温誤汗熱而煩

汗後寒熱邪氣未解微也脉浮洪者邪在太陽法當再汗脉沉實者邪在陽明又須下之若厥陰餘熱加以下利厥逆惡寒四逆湯温之無疑矣

○憎寒者屬厥陰大汗出熱不去拘急体疼下利厥逆四逆湯温之○脉沉實者屬陽明得汗後如瘧狀日哺而發大柴

胡湯承氣湯下之若只惡寒則為虛用芍藥甘草附子湯只

發熱則為實大承氣湯○脉浮洪者屬太陽汗後寒熱桂枝

二麻黃一湯○風温不惡寒若誤發汗必身灼熱煩渴独語

萎黃湯○温家汗後火熱脉躁名陰陽交不治熱病已得汗而脉躁盛亦不治詳見陰陽交條有再汗再下之劑

下後有熱勞食復附

下於汗後致傷榮

瘥後熱名勞食復

陰氣衰兮熱又生  
心中痛者豈能平

○大汗則損氣損氣則陽微脉虛而惡寒大下則傷血傷血則陰弱脉瀆而發熱誤汗誤下亦猶是尔且陰以陽為主陽以陰為根血陰也氣陽也血非氣使不能自行令也下之亡陽是陽不主陰矣陰無所主而寒氣搏之所以脉瀆寒極血虛所以發熱方七之劑其可輕乎

○汗後陽微而惡寒可四逆湯或用芍藥甘草附子湯○下

後陰弱而發熱是為內熱可葶藶散○瘥後勞復發熱

小柴胡湯枳壳施子湯蝦鼠糞湯兩頭失糞若脉浮則汗之

用麻黃湯葱白湯脉實則下之用承氣湯大柴胡湯證治論

瘥後餘熱用柴胡桂枝湯下利腹鳴痞滿者生薑瀉心湯小

便不利麥門冬湯○交接勞復外腎腫腹中絞痛竹皮湯勞

役心力復熱用枳壳施子湯小柴胡湯餘見陰陽易條○瘥

後食復發熱枳壳施子湯加大黃粥飯傷飽或食肉或餅

硬物不消皆復熱也傷食必有痞滿噯氣吞酸腹鳴下利等

證可與生薑瀉心湯○下後身熱而心中結痛施子湯○飲

酒復熱有本條

惡風

惡風汗出怯風吹

發汗亡陽成漏石

惡風者見風則怯密室之中無所惡也風傷衛氣衛虛則腠

理不密由是而汗出焉雖屬表不可發汗但微解肌而已

衛者陽也惡風陽證也所以表怯而惡風蓋亦陽虛故陰邪

出而乘之特其病在皮虛邪氣尚淺耳

○桂枝湯桂枝湯主之壯熱者與芍藥散○發汗太

過衛虛亡陽汗漏不止而惡風者法當溫經用桂枝附子湯

或小便難四肢微急難以屈伸並用桂枝附子湯○身熱惡

風

惡風

發汗亡陽成漏石

惡風者見風則怯密室之中無所惡也風傷衛氣衛虛則腠

理不密由是而汗出焉雖屬表不可發汗但微解肌而已

衛者陽也惡風陽證也所以表怯而惡風蓋亦陽虛故陰邪

出而乘之特其病在皮虛邪氣尚淺耳

○桂枝湯桂枝湯主之壯熱者與芍藥散○發汗太

過衛虛亡陽汗漏不止而惡風者法當溫經用桂枝附子湯

身熱惡

風項強脇滿手足温而渴小柴胡湯○風温惡風不欲去衣骨節間煩疼掣痛不得屈伸汗出短氣小便不利或身微腫

**甘草附子湯**

惡寒發熱屬於陽

淨數桂枝并越婢

陰病憎寒體自涼沉而細者理中湯

惡寒者不見風而怯寒身雖灼熱亦不欲去衣被也此陰邪出而乘陽致之蓋寒傷榮氣榮行脉中居衛之下是為表邪已深法當發汗間有一二自汗則其表已虛但與解肌可也然而發熱惡寒者屬陽無熱惡寒者屬陰在陽則發汗在陰則温裏常須識之大要惡寒皆為表證或裏證悉具而微惡寒者是表猶未解當先解表俟不惡寒然後可以攻裏惡寒家不可近大氣及過覆衣被則寒熱因傳脉道沉伏愈令寒不可過但服和表時前温而散之○發於陽者脉浮數桂枝湯○發於陰者脉沉細

○太陽證發熱或未發

熱此惡寒有汗用

桂枝湯無汗用

**黃湯**○陽明證固當下之惟惡寒中寒者係與太陽合病在

經屬表可汗用麻黃湯若欲遲汗多微惡寒者表未解也雖

陽明病可桂枝湯○少陽證頭汗出微惡寒小柴胡湯加

○發熱微惡寒柴胡桂枝湯○汗後反惡寒者為虛芍藥湯

**宜附子湯**○下後復發其汗心下痞而惡寒者表未解也當

先解表用桂枝湯表解然後攻痞用三黃瀉心湯入生薑汗

○發於陰者脉沉細理中湯○少陰證脉沉細用理中湯

**四逆湯**若下利惡寒而蹇手足温者可治用小建中湯

若惡寒而蹇時上自煩不欲厚衣可大柴胡湯下之

北有惡寒

背上憎寒值少陰

口和附子本條尋

舌乾口躁三陽合

白虎湯中好酌斟

背負陽腹抱陰背寒者陽弱也然背寒有陰臥一證何以別



傷寒 卷之四 辨陰陽篇  
之少陰一證以其陰寒氣盛不能消耗津液故口中和三陽合病以其陽氣陷入津液為之乾焦故舌乾口燥陰實陽熱識者以口中潤燥推之思過半矣

○口中和而背惡寒者屬少陰附子湯○舌乾口燥內有熱證口中不仁而背惡寒者為三陽合病白虎湯經云腹滿身重面垢譫語遺尿口中不仁為三陽合病白虎加人參湯主之若自汗者亦用白虎加人參湯○又陽明證背微惡寒無大熱口中燥渴者亦用白虎加人參湯○中暑亦有背惡寒證但面垢自汗脈虛而伏自有本條○凡脾胃素虛之人過暑月間或飲冷水或多飲大茶或餐雪糕之屬易致生冷壞脾寒氣妄聚陰上乘陽故寒從背起冷如掌大此當以尋藥去之

四逆

四逆須將四逆詳

病家手足但微涼

枳柴芍藥湯

邪中陰經四逆湯

至少陰則有手足四逆之證四逆之與厥冷實相遠也或曰均是四逆耳而四逆湯散一寒一熱用藥何不類耶蓋手足自熱而至溫由溫而至四逆是傳經之邪非虛寒之候也四逆散主之若得病以來手足不溫便成厥逆此則陰經受邪陽氣之不足也可以四逆湯溫之脈診要當審此雖然吐利煩燥惡見四逆四逆下利惡寒而蹇並屬少陰又為不治之診故併及之○少陰四逆其人或欬或悸或小便不利或腹中痛滿或泄利下重並用四逆散○初病以來厥冷四逆即用四逆湯○濕溫兩足脛逆冷有本條

厥

冷厥初來厥有源

沉遲而弱冷常存

熱深發厥初身熱

沉滑時乎指爪溫

陽氣伏藏陰氣越出陰陽不相順接所以厥也其手足逆冷

之證乎蓋諸陽會於四末陽微而為陰所勝初病便厥者是為冷厥其脉沉遲按之則弱醒醒而靜惡寒引衣足多攣卧或身上粟形或下利清穀也熱伏於內先熱而後厥者是為熱厥脉必沉滑按之則數昏塞狂言發渴引飲露手揭衣或燥不得眠或大小便不利也外證皆可驗焉若先厥而後得熱是則陰邪退而陽氣復矣傷寒熱多厥少其病當愈厥多熱少其病則進下利發厥一條亦以厥者復熱為有瘳熱者復厥為已甚蓋下虛則厥陰實使之陽長陰消其可也雖然傷寒血證亦有四肢發厥以至昏迷悶絕者此又不可不知至若少陰下利惡寒而拳手足厥冷與夫臟厥一證皆為不治之診厥之為厥可無辯乎○冷厥初病便作四肢逆冷足攣惡寒引衣自蓋不渴大小便滑泄外證默默而醒**四逆湯****理中湯****通脉四逆湯****白通如猪膽湯****當歸四逆湯****烏梅丸****湯**可選用○又痰厥氣厥腎厥用**易簡****湯**○熱厥初病

身熱然後發厥其人畏熱揚手擲足煩燥飲水頭汗大便秘小便赤怫鬱昏憤蓋當下失下血氣不通故四肢逆冷所謂熱深則厥深所謂下證悉具而見厥逆者此也與**大承氣湯****大柴胡湯**或**白虎湯**○熱厥與冷厥相類似指爪時溫為異耳若疑似未明且以**四順圓**試之陽厥則有熱陰厥則無熱○寒熱而厥者一手或兩手無脉面色胃味不澤急與**四味子湯**并**麻黃細辛甘草湯****人參調血通脉**可以為佐服無汗解則生投藥無汗或脉不至者不治○水氣厥者心下怔忡**茯苓甘草湯**○邪氣結胃中而厥者脉乍緊乍結心煩滿飢不欲食**瓜蒂散**吐之○臟厥者七八日逆冷下利發躁無時暫安不治○痰飲厥逆眩運少與**三生飲**

頭痛  
頭疼惡冷太陽先  
惡熱陽明膽細弦  
濕鼻寒兮痰膈滿  
厥陰乾嘔吐清涎

頭痛屬三陽。明少陽皆有之。而太陽則專主是也。太陽專主頭痛。則頭痛之屬表證者。居多。陽明少陽。又次。而輕耳。三陰經絡上不至頭。故無頭痛。惟厥陰循候龍之後。上連目系。頂巔有頭痛。乾嘔吐涎。**吳茱萸湯**。一證。却無身熱。亦與陽證不同也。雖然大陰少陰。其經從足至胃。並無頭疼。是固然爾。然風溫病在少陰。濕溫病在太陰。而頭反痛。至於陰毒亦然。是又某病。則有其證。脈絡相通。不可拘也。若夫頭痛劇甚。入連於腦。手足俱寒。此則真痛。神丹在手。其能救乎。

○太陽頭疼發熱惡寒無汗**麻黃湯**。有汗**桂枝湯**。已汗未汗頭痛如**破連翹白湯**。服之痛不止**膏根葱白湯**。○陽明頭疼不惡寒反惡熱胃實氣實攻於頭也。少與**調胃承氣湯**。○少陽頭疼發熱脈弦細**小柴胡湯**。○濕頭疼鼻塞頭中寒濕也。瓜蒂末納鼻中黃水出則愈。○痰涎頭疼胃膈滿發寒熱。棘刺不大。瓜蒂散吐之。可以痰證。陰頭疼。散陰頭疼。

延米豆豉更湯。若脈微浮為欲愈。邪無所容。不愈用。若發熱似瘧亦欲愈。夜麻黃各七湯。諸頭疼無熱如聖餅。用生薑葱白煎湯下。

項強 項強高根主表強 表虛桂葛去麻黃 結芻項進陷芻劑 桂入枯萋屋反張

傷寒項強急太陽表證也。當發散而解之。若誤下太陽邪氣乘虛入裏。則為結芻項強。

○太陽病項背強無汗惡風為表實**葛根湯**。項背強發熱汗出惡風為表虛**桂枝湯**。加葛根不加麻黃。○誤下太陽結芻項強**大陰芻劑**。○太陽傷風復感寒濕身熱足寒頭搖口噤頸項強背反張其脈沉遲此為發瘧**桂枝加芍藥湯**。○項強脇下滿**小柴胡湯**。

咽痛

咽疼陽毒發成斑  
脉緊無陽咽亦痛

肢冷咽瘡腎證看  
脉微下利腎傷寒

咽喉不利或痛或瘡穀不入而嘔吐者毒氣上衝所致也陽毒必熱發斑少陰四肢必冷其有下利者可與

散入甘草生薑佐之其不下利或小便赤而去衣者可與

桔湯入玄參枳殼使大便順導則黑臭之毒世夫續以

生薑煎湯調之甘草生薑解其毒也腎病咽痛下利身猶熱

者未可用四順湯且與黃連龍骨湯即黃連雞子湯去雞子

加龍湯

○陽毒咽痛發斑唾膿血脉洪數用藥有本條○少陰咽痛

咽瘡脉沉遲厥冷或吐利又陰陽脉俱緊反自汗為無陽法

當咽痛而後吐利亦屬少陰並不可汗下重熨汗出以

粉傅之咽痛用

與之○咽疾通

北前胡○腎傷寒一證乃非時暴寒中人狀於少陰之

頭疼腰痛其脉微弱初咽痛似傷寒次必下利非咽閉之比

咽痛半夏桂枝湯即半夏散是也下利四逆湯或四逆湯十

之○證治論口瘡赤爛用蜜浸一宿取汁含燕熱甚并

麻六物湯咽中閉塞傷寒六七日大下之寸脉沉

遲尺脉不至咽喉不利唾膿血手足厥利不止者難治

身痛

身疼浮緊太陽臨

自利肝并腎帶沉

中濕毒陰與風濕

汗餘霍亂本條尋

○局方大柴胡證云邪結在裏大便秘澁心腹痛鞭者可服若

身體疼痛是表證未解不可與之然則身體疼痛不脉沉不

自利太陽之表證明矣其或自利脉沉此則陰證之身痛臟

家之裏病云

身痛大抵

身痛大抵

身痛大抵

○太陽身痛脉浮緊無汗麻黃湯以汗之或尺脉遲者血不足也先用小建中湯以養之俟其尺脉浮即用麻黃湯太陽病七八日脉細惡寒為陰陽俱虛吐汗下並不可至再其人素無熱可芍藥甘草附子湯素有熱可黃耆建中湯厥陰少陰身痛其脉沉必自利四逆湯真武湯附子湯○中濕一身盡痛不可汗下但利小便有本條○陰毒身痛如被杖腹中絞痛脉沉而疾有本條○風濕一身痛重但微汗不可大發汗有本條○發汗後身痛脉沉遲桂枝加芍藥湯汗後身痛為寒邪在表脉沉遲為在裏用芍藥入柴人參安和真氣或用黃耆建中湯又汗後霍亂身痛不休少與桂枝湯

腹痛脹

腹痛腎兮通脉湯

實及便結虛疼利

脾兼表證桂加黃

脹則陳皮梗夏良

陰邪在裏陽邪入裏與正氣搏則為腹痛所以痛者有異

臌實腹滿而大便秘者實痛也脉虛腸鳴而大便泄者虛痛也陰陽異證用藥不同大抵痛為邪氣實法當疏利陰受病則金液冰養正輩溫而利之○少陰腹痛四逆或欬或悸或小便不利或泄利下重四逆散下利清穀脉微欲絕通脉四逆湯腹痛小便不利用真武湯○器下太陽因而腹滿時痛是有表復有裏為大陰太陽俱病用桂枝加芍藥湯痛甚桂枝湯○實痛者關脉實煩燥腹滿大便秘結桂枝加大黃湯○虛痛者寸脉澹尺脉弦腸鳴泄利先與小建中湯不建中湯○虛痛者寸脉澹尺脉弦腸鳴泄利先與小建中湯不建中湯芍藥湯○虛痛者寸脉澹尺脉弦腸鳴泄利先與小建中湯不建中湯冷痛四肢厥逆用芍藥湯○腹痛者陰陽不和也桂枝干夏湯最良

奔豚動氣

奔豚動氣數般方

左右高低細揣量

玄木理中并用桂

不堪汗下例中詳

動氣者臟氣不調築觸跳動隨臟所主而形見於臍之左右上下也大抵真氣內虛水結不散氣與之搏即發奔豚以其走痛衝突如豚之奔雖有發表攻裏之證汗之下之並不可也然而不言當臍動氣者何耶蓋胃為中州以主津液妄施汗下必先動脾是以不言而喻也舉此動氣非問證何以知之然則調理傷寒貴乎纖悉問證可下條例中

○太陽病下之後氣上衝者桂枝湯若不上衝不可與也若從小腹上衝於心桂枝加桂湯○發汗後臍下悸者欲作奔豚茯苓桂枝甘草大黃湯○動氣通用理中湯去朮加桂蓋利

小便泄奔豚故也奔豚一名腎氣白朮燥腎閉氣是以去之○吐汗下後心下逆滿氣上衝胃起即頭眩其脉沉緊誤汗之則動經故其身振上搖動茯苓桂枝白朮湯主之此方用白朮者蓋以誤汗動經故用白朮閉其汗也○奔豚動氣脉

沉弱肢體冷可與桂枝湯○動氣証治論用柴胡桂枝湯

腹滿

腹滿脾家及胃家

三陽合病口頑麻

入邪吐汗下之後

腎証便堅承氣加

腹滿多屬太陰蓋脾為中央土所以主腹滿之候腹中常滿者裏實而可下時滿時減者裏虛不可下當以溫藥和之其有吐汗下後因成腹滿者此則邪氣乘虛而入或疎利或溫散或湧吐條例又不同焉審其邪氣之所起知其邪氣之所在斯可矣雖然太陰主腹滿固也陽熱為邪必腹滿而咽乾陰寒為邪必腹滿吐食而自利一熱一寒又不可以無別若夫腹滿而泄難以有瘳

○太陰腹滿吐食不可下桂枝理中丸主之誤下太陽因而

腹滿時痛為太陰太陽俱病桂枝大黃湯重者桂枝加大黃

湯○陽明發熱腹滿微喘口苦咽乾或不大便譫語火迫者

亦有此證並**小柴胡湯**張而小便難加**茯苓**又陽明腹大滿不大便**小承氣湯**微下之陽明脈遲腹滿時喘潮熱亦用**承氣湯**發黃證有本條○三陽合病腹滿身重難以轉側譫語口中不仁少與**白虎湯**○吐後腹脹滿常不減者胃中之邪下傳入胃擁而為實也少與**調胃承氣湯**○汗後腹脹滿者胃虛而不能敷布諸氣壅滯也**厚朴生薑半夏厚朴湯****湯**若滿而痛則**小承氣湯**微下之○妄下後腹脹滿心煩而卧起不安者表邪乘虛而入鬱於胃中也**梔子厚朴湯**○少陰病六七日腹脹滿不大便**承氣湯**急下之○腹脹通用**枳實半夏湯**○腹皮痛者脾不勝水故水與氣搏於皮肉之間觀其腸鳴漉漉可知矣**小半夏茯苓湯**加**官桂茯苓**○腹脹滿而短氣者邪在裏而為實也腹濡滿而短氣者邪在裏而為虛也見氣短條

○腹滿用藥皆去**白朮**木溫燥而閉氣也

胃腸滿

胃滿多將表証看

半居表裏腸間堅瓜蒂拈來吐冷涎

虛煩客熱須梔枝

胃滿者胃腸間氣塞滿悶非心下滿也腸滿者腸肋下氣脹填滿非腹中滿也胃滿多帶表証腸滿多在半表半裏之間○太陽病下後脈促胃滿**桂枝湯**病在衛氣**芍藥**入榮其性利故去之○陽明喘而胃滿此猶帶表証不可下可與**麻黃湯**○胃腸俱滿或脇下鞅痛此半表半裏之証並用**小柴胡湯**和解之○胃中虛煩客熱或經汗下後煩熱窒塞氣逆搶心並**梔子豉湯**吐之若氣逆則與**梔子豉湯**若嘔則與**梔子生薑湯**○胃中痰實宿寒**瓜蒂散**吐之○又陽明病心下鞅痛不可下下之遂利不止而死法當湧吐詳見結胃解題此則胃中虛而氣痞也或用**半夏瀉心湯****生薑瀉心湯**○孫用和云胃病則諸為心湯審証用○邪氣留於胃中

法當湧吐其高者因而越之是爾然有吐汗下後邪氣乘虛入而為煩是則胃中客熱以**陷下成湯**吐之此吐劑之輕者也。不經發汗吐下邪氣留聚煩滿痰實是則胃中宿寒以**辛散**吐之此吐劑之重者也。均之為吐又當權衡。

脇疼

脇疼多屬少陽家

燥糞陽明並小柴

裏水痞堅須十棗

陰脇引痛臟中乖

脇肋痛滿者邪氣在半表半裏之間也。邪方傳裏未留為實氣鬱不行法當和解。若夫裏水痛堅非下之不可也。

○少陽病脇痛耳聾寒熱乾嘔或脇下堅滿並用**柴胡湯**和解之。○陽明病不解轉入少陽脇下堅滿乾嘔**柴胡湯**又陽明燥糞不大便脇下堅滿舌上胎滑**柴胡湯**○太陽病咳嗽乾嘔微利心下痞鞭引脇下痛身涼汗出或時煩此為表解裏有水**十棗湯**下之。○病者脇下痛素有痞積

於臍傍引小腹入陰筋俱作痛此為臟結不治

自汗

自汗傷風暑不消

風溫風濕衛難調

無陽霍亂井柔痙

更與陽明共九條

衛氣所以密腠理而固津液也。衛為邪所干不能護衛於見而汗出焉。寒傷榮氣汗獨無之。惟風暑溫之邪有干於衛皆為自汗之証也。若夫寒已入裏寒極生熱上則榮衛通腠理開又為陽明自汗是其熱越而汗出矣。治法各自有條。然而汗出以至髮潤或汗出如油或汗出如珠凝而不流此皆不救他病見之亦然。

○太陽傷風自汗脉浮緩者

**桂枝湯**汗出而渴或小便難者

**五苓散**不渴者**茯苓甘草湯**

自汗小便數者勿用**桂枝湯**惟**芍藥湯**

**麻黃湯**主之自汗小便不數心煩微惡寒脚卒急**桂枝湯**

**加參**參以調榮脚必伸也。○太陽中暑汗出惡寒身

傷寒

傷寒

傷寒



熱而渴香薷散白虎湯或用小柴胡湯○風溫多眠喘息自汗若誤汗之必身灼熱譫語並用安桂湯○風溫額上自汗關節痛重但微解飢通用敗毒散○衛不和者臟無他病時發熱自汗出桂枝湯○亡陽者太陽証發汗多漏不止而惡風用桂枝加附子湯○少陰証尺寸脈緊反有汗出額上手背冷汗為亡陽主咽痛吐利四肢痠急厥逆惡寒用四逆湯汗多不止溫湯撲之若汗不止惡風煩躁不得卧先服霍亂吐利汗出發熱惡寒手足拘急厥冷四逆湯又中暑霍亂煩渴香薷散○柔痊太陽病身頃反張口噤瘈瘲發熱汗出小續命湯○陽明汗多而渴發熱譫語大便硬調胃承氣湯若小便便利而汗出者為津液少不可攻但用蜜煎承氣湯汗多者胃汗乾急下天水氣湯陽明汗多而渴勿用五苓散陽明及無汗脈浮而喘麻黃湯

無汗

無汗因寒中太陽

三陰剛症証中詳  
七例推尋各有方

冬陽明病兼陰易  
腠理為風暑溫所干皆令自汗惟寒邪中經腠理密緻則津液內滲獨無汗焉此特傷寒在表然耳若陰病若水飲與夫亡陽久虛亦皆無汗隨証各自有條惟熱病脈躁盛而不得汗此陽亢也當汗無汗與麻黃湯三數劑而汗不出者此亦不可活也知其可進則進知其不可則已之君請擇斯二者小柴胡湯証云陰病不得有汗蓋三陰証本無汗其或有汗者亡陽也○冬陽明脈浮緊者必發潮熱脈但浮者必有盜汗黃芩湯主之○盜汗者邪氣方侵於裏尚連於表睡則衛氣行裏而表陽不緻因其表陽不緻故津液得泄資則氣散而過於表腠理閉焉汗復止也是之謂盜汗此邪在半表半裏之間法當和表○餘証無汗治法各有本條

頭汗出

頭汗諸陽氣上蒸

心忪水結譫言血

身黃尿秘引漿頻  
表裏柴胡小是珍

諸陽之經循於頭三陰則至頸而還也裏虛表實腠理密緻熱不得越故陽氣上騰津液上湊而汗出於頭抑亦胞虛內涸使然耳夫裏虛則不可下內涸則不可汗頭汗之証無所謂表邪汗之斷不可也若夫陽明熱入血室燥糞譫語俟其過經利之以小承氣湯是可無以權之哉大抵寒溫相搏與夫邪在半表半裏之間則有頭汗設或小便不利內外關格頭汗則為陽脫設下溫家額上汗出而喘或小便不利大便自利亦為陽脫二者皆不可活臨診又當審斯

○發黃証頭汗及頰而止小便難引水漿此受溫也茵陳湯

五苓散主之○水結胃証心下忪滿無大熱頭汗出小半夏

加茯苓湯○譫言頭汗是為血熱病屬陽明可承氣湯主之

中懊懣而頭汗者梔子散湯○半在表半在裏及餘証並

柴胡湯寒熱往來微惡寒為表脇下滿大便堅為裏○汗下

後胃滿微結寒熱心煩嘔渴為表未解柴胡桂枝乾姜湯或

柴胡桂枝湯

手足汗

手足如何汗不休

熱家燥糞為譫語

胃中執聚液旁流  
寒証難教水穀留

手足汗者熱聚於胃而津液之旁流也亦有寒聚於胃致之

挾寒則水穀不分溫執則燥糞譫語

○陽明病手足熱上汗出譫語大便難此執証也與承氣湯

下之

○陽明中寒不能食小便不利手足戢然汗出大便初鞭後

溏水穀不分則不可下少與理中湯

不得汗

汗之不得亦須蒸  
身痒浮遲惟各半

躁盛還無未必生  
陽明虛証若虫行

傷寒欲得汗與麻黃湯數劑而汗不出者不治熱病脈躁盛而不得汗諸陽之極亦不治二者蓋真病也亦有寒熱而厥忽兩手或一手無脈是猶重陰欲雨之時必戢戢然大汗而解其成投藥無汗而脈不至者亦不可活也是可以容易談哉雖然諸虛少血津液中乾亦不能作汗病人有挾宿恙如瘵飲癥癰之類又隔汗而不能出也少血者養血以汗之瘵癖者開關散氣以汗之是為活法若夫汗出如油喘而不休未有能生者也

○服藥不得汗當用蒸法燒地令熱去其火以水洒之用  
被覆之片時周身至脚心皆汗出乃用温粉撲即移上床  
身非脉浮遲為氣虛亡陽不能作汗

○陽明反無汗皮中如虫行以久虛也

○凡發汗須令上下周遍身上衣被如常腰以下厚蓋之若蓋覆不周汗出不匝不流必致肢體挛搐可與牛蒡根散

不可汗  
不堪汗者脉微遲  
温濕虛煩壞病推  
經水忽來兼失血  
脐間動氣並如之

病在表而脉浮者可汗表證悉且若發渴若脉不浮是表猶帶裏也未可汗之傷寒不可汗條例最多其可汗者大抵脉證全在表也表固可汗然汗之太早太過或者津液泄而變生焉至於當下而誤汗則為亡陽為讖語為下厥上竭等證其害人又速耳設或誤汗則宜救之救解之羸甚者去

○脉微弱為亡陽不可汗用桂枝湯尺脉遲為血

少榮氣不足也不可發汗先與黃耆建中湯以養血俟其脈不遲即以**小柴胡湯**桂枝湯桂枝湯和解之○風溫濕溫各有本條○虛煩似傷寒却不惡寒身不疼脈不緊並不可汗下可**竹葉湯**或**小柴胡湯**○壞病者此汗下溫不解知犯何逆以法治之並不可汗可**小柴胡**加減○經水適下表裏俱虛不可汗**小柴胡湯**主之衄血下血雖脈浮緊無汗然衄者欲愈下者亦欲愈不愈則用**桂枝湯**但不可發汗○腹中左右上下動氣築觸並不可汗下證治論用**柴胡桂枝湯**動在左發汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤為逆先服**防風白朮牡蠣湯**汗止以**建中湯**與之動在右發汗則衄而渴心苦煩飲則吐先**五苓散**次**竹葉湯**動在上發汗則氣上衝心**黃根湯**動在下發汗則心中大煩骨節煩疼頭痛目運入食即吐先用**大黃史湯**止吐次**小建中湯**○下利清穀用**建中湯**或大便不通者皆不可汗○惡寒脈浮此為表證若渴則邪欲入裏不可汗○咽乾喉塞亡血淋家衄家瘡家動氣並不可汗證治論皆用**小柴胡湯**厥逆不可汗**當歸四逆湯**

不可下

不可攻浮及細虛

惡寒嘔吐與之俱有表仍兼失氣無

小便自利并清少

病在裏而脈實者可下裏証悉具若惡寒若脈不實是裏猶帶表也未可下之傷寒不可下條例最多其可下者大抵脈証全在裏也裏固可下然下之太早太過或者冰穀脫而更生焉至於當汗而誤下則為痞氣為懊憹為結胸等証其害人又速耳設或誤下則**建中湯**以救解之或裏煩則少加**烏梅**或轉損厥逆則兼與**四逆湯**輩呼此救真也謹之謹之○脈來細小固不可下其細小而牢緊又可下也○脈浮病在表不可下結背脈浮大不可下○脈細虛或遲緩或尺部渣弱此凡皆為血氣衰不可下也○惡寒者表之

虛証雖陽明惡寒則與大陽合病屬表可汗不可下若少陰  
証惡寒則溫之。嘔吐者雖有陽明證謹不可下。**小柴胡**如  
**生薑**主之。小便自利汗出者津液竭矣雖硬屬陽明但用  
**蜜導**而出也。**猪膽汁**亦可導也。脾約証大便堅小便數者  
**枳實脾約丸**。大便堅小便清者熱不在裏雖不大便不可  
下可**桂枝湯**汗之。少陰証小便白為下焦虛寒用**四逆湯**  
。大便堅小便少者津液還入胃必先鞭後溲不又自出惟  
小便如常乃可下之。有表証脈帶浮或惡寒或猶生寒熱  
並不可下。不轉失氣謂不下泄也不下泄則先鞭後溲不  
可下大抵陽明躁糞欲下之先與**小柴胡湯**若轉失氣則必  
先溲後鞭更進一劑不轉失氣則止又陽明譫語潮熱脈疾  
與**小柴胡湯**不轉失氣則與**小柴胡湯**若次日又不大便而  
脈濇則為裏虛**黃芩湯**主之凡陽証而脈濇謹不可下  
。頭汗出為津液少胞中虛不可下惟陽明譫語血熱頭汗

則可下。諸虛少血厥逆喉閉嘔吐亡陽陰實動氣皆不可  
下虛家**附子湯**厥逆**當歸四逆湯**咽喉閉塞**烏扇湯**嘔吐  
**半夏加吉皮湯**無陽陰實而大便鞭者下之必清穀腹滿但  
用**蜜導**。左動氣下之則腹滿拘急氣愈動身雖執反欲拳  
先**甘草乾薑湯**次**小柴胡湯**。右動氣下之則津液竭咽鼻  
乾頭眩心悸**竹葉湯**。上動氣下之則握掌執煩汗出欲灌  
水**竹葉湯**。下動氣下之則腹滿清穀心痞頭眩**甘草瀉心**  
**湯**

新刊仁齋傷寒類書活人總括卷之四終

傷寒  
卷之五  
水瀉  
○下瀉脈寸之脈微而數者難治以瀉之  
○下瀉脈寸之脈微而數者難治以瀉之  
○下瀉脈寸之脈微而數者難治以瀉之  
○下瀉脈寸之脈微而數者難治以瀉之  
○下瀉脈寸之脈微而數者難治以瀉之  
○下瀉脈寸之脈微而數者難治以瀉之  
○下瀉脈寸之脈微而數者難治以瀉之  
○下瀉脈寸之脈微而數者難治以瀉之  
○下瀉脈寸之脈微而數者難治以瀉之  
○下瀉脈寸之脈微而數者難治以瀉之

新刊仁齋傷寒類書活人總括卷之五

懊憹 平仄兩音

懊憹心堅用陷胃 占間胎曰肢梘供

發黃須與茵陳草 燥糞陽明承氣攻

懊憹者懊惱鬱悶之狀蓋由表証誤下正氣內虛於是客氣乘虛入而動膈煩鬱微夜特未至結胃之甚也由懊憹而結胃亦不難矣

○短氣煩燥胃中懊憹心下因鞭則為結胃用陷胃湯○舌上白胎虛煩不得眠心下懊憹或飢不能食頭汗出此邪熱鬱於胃中也並陷胃湯吐之○陽明病下之後懊憹而煩胃中有燥糞此熱結於胃也承氣湯攻之○陽明無汗小便不利心中懊憹者必發黃用茵陳湯是則胃中邪熱前後二部俱泄之也

痞

痞滿閉沉痛不侵

惡寒勿下先投桂 開浮肝熱用連苓 痞利餘糧及瀉心

當汗誤下或病屬陰而反下之輕則為痞其狀心下滿而不痛按之則濡是其虛邪留滯故但滿而不痛也通用枳殼桃

梗最良若欲攻之亦須表証已解則可矣

○痞滿閉脈多沉實理中丸半夏瀉心湯主之桔梗枳殼

湯尤妙○閉脈浮而痞此為肝熱用三黃湯瀉其肝若或惡

寒汗出三黃湯加附子名附子瀉心湯服湯後痞不去煩渴

小便不利五苓散主之○下後復汗心下痞而惡寒者表未

解解不可攻痞當先與桂枝湯表解乃可攻痞用三黃湯表

未解而心下妨悶曰支結用柴胡桂枝湯胃脇滿而微結小

柴胡如乾薑牡蠣湯表証在數下之協熱而利心下痞鞭表

裏俱病桂枝人參湯○下利心下痞鞭乾噦食臭腹鳴甘草

瀉心湯生薑瀉心湯証治論用桂枝人參湯若利不止則治

下焦用赤石脂禹餘糧湯又不止即利小便利五苓散○後

熱汗出不解嘔吐下利心中痞鞭用大柴胡湯下之此太陽

証○吐汗下後受氣痞鞭瀉心湯若咳逆氣虛則先用

四逆湯胃寒則先用理中丸後用茯苓桂枝湯若虛煩心下

痞薄氣上衝胃頭眩經脈動身振搖伏苓桂枝白朮甘草湯

○十棗湯証須是身涼表解脇疼而痞則可用

結胃 結胃 結胃 結胃 結胃 結胃 結胃 結胃 結胃 結胃

結胃痛硬滿其中 大小隨名用陷胃

熱實多煩寒不熱 水兼浮脈豈容攻

○病發於陽而下之早或當汗而誤下外証項強心下滿硬而

痛者結胃也結胃痛硬是為實邪在裏法當下之若脈浮大

若表証若水氣戒不可下亦有不經下劑而心下鞭滿者此

又有可吐可下不同焉經曰病人手足厥脈乍緊邪結胃中

心滿而煩飢不入食當吐之是則病在胃中故也經曰陽明

病心下鞭滿不可下下之遂利不止而死是則邪氣自表傳  
重留於心下未全為實法當吐之故有此戒也審如是則經  
所謂高者因而越之是尔吐下界限判然天壤安可以結胃  
裏實例論之乎要之結胃治法大要審其邪氣所在而已矣  
或曰結胃証具加煩燥而不治者何此胃氣絕也胃氣既絕  
安能布藥力以勝邪也哉○凡病在胃膈者上腕彭拜痰壅  
氣促喘藥不能下咽

○結胃寸脈浮開尺皆沉或沉緊俱當下若脈浮大或有表  
証則先用小柴胡湯表已解即下之○大結胃不按而痛胃  
連脘腹痛硬不可近大陷胃湯陷胃湯太峻合用者只與陷  
胃丸○小結胃按之而痛只心下硬用小陷胃湯○熱實結  
胃與腹煩渴心下痛少與大陷胃湯○寒實結胃無熱証  
物曰散大陷胃湯○水結胃心下怔忡頭汗出無大熱  
○夏加茯苓湯○水結胃心下怔忡頭汗出無大熱  
○夏加茯苓湯○水結胃心下怔忡頭汗出無大熱

一種但舌上胎滑時時下利陰筋引痛有本條○病人血結  
胃此熱入血室見譏語條下膿血條○結胃先理其氣用  
○凡結胃理氣已平旋腹大便澀者須利導之否  
則熱邪結為塊血○誤下後未成結胃急與中湯救解○  
陰毒陽毒隨氣逆上伏於胃中亦有結胃痛硬之證治法詳  
見本條

氣短

氣短裏實熱來潮  
傷水心間并裏水

風濕漫難汗自流  
太陽誤下結胃不

氣短者呼吸短促而不能相續是也其間呼吸多吸少皆不救  
焉千金曰少氣不足以息者危金匱曰短氣不足以息者實  
大抵短氣為實亦有表裏虛實之差心腹脹滿而短氣者邪  
在裏而為實也心腹濡滿而短氣者邪在表而為虛也其或



怔忡氣短此則心下停水致之體認不精其差千里信矣哉  
○氣短潮熱腹滿而喘此為外欲解而裏實小承氣湯大柴胡湯  
○風濕相搏汗出短氣小便不利惡風不欲去衣其邪在表甘草附子湯  
○食少飲多水停心下亦令氣短小半夏湯  
○身涼乾嘔短氣汗出不惡寒此表解而裏有水十棗湯  
○誤下太陽短氣煩燥心中懊憹因鞭便為結胃大陷胃湯  
更發黃一證

喘

喘不繫熱解表家

汗多潮熱裏攻邪

滿胃合病尤須汗

水嗽青龍杏去麻

○經云肺氣實則喘逆上氣所以氣逆者邪氣為實耳傷寒發喘邪氣在表者心腹濡而不堅外證無汗法當汗之邪氣在裏者心腹脹而為滿外證有汗法當下之又有水氣作喘心下怔忡即水為邪是以有小青龍之證若經汗下逐水不效

痊愈喘促上攻壅塞而不得自舒可以瓜蒂散從權吐之吁哉

特病之常也其或直視譫語而喘汗出髮潤而喘身汗如油而喘皆不可救此邪氣內盛而正氣欲絕也臨機對境盍治

息焉○麻黃寧主喘喘家湯刺多用麻黃

○太陽證無汗而喘麻黃湯或誤下之利不止脈促有汗而喘葛根黃芩湯下之微喘者桂枝加厚朴杏子湯發汗

後不可更行桂枝湯若汗出而喘無大熱者麻黃杏仁甘草

石膏湯○陽明證汗出不惡寒氣短腹滿潮熱而喘小承氣

湯若脈浮無汗而喘即汗之用麻黃湯○太陽陽明合病喘而胃滿勿下可麻黃湯○水氣嗽喘乃太陽汗後飲水多而

水停心下小青龍去麻黃加杏仁主之小腹痛者小青龍去

麻黃加茯苓○陰證喘則必促脈伏而厥返陰丹五苓子湯

○鼻息鳴喘而氣逆上衝孫用和用麻黃湯加杏仁久喘

咳嗽感冒鼻涕易簡丸寶湯

咳嗽

嗽家嘔喘屬膀胱

寒熱皆虛值少陽

若是少陰頻下利

四肢沉重更清涼

○肺主氣氣逆而不下則嗽熱邪乘之氣則燥鬱寒邪乘之氣則冷滯水飲乘之又與氣搏熱寒水飲皆生痰壅嗽之所從始乎陰陽治法固自有條其間水咳三證不可無辨小青龍湯大陽之表水也十棗湯大陽之裏水也真武湯陰證之水氣也常須識之雖然古人一藥對一病所主安在哉曰水與表寒相合而咳則小青龍湯法之水與裏寒相合而咳則真武湯溫之裏癖合水動肺而嗽焉十棗湯所以下之也

○太陽病身熱嗽喘心下怔忡乾嘔微利此水氣在表小青龍湯小便不利小腹滿者去麻黃加茯苓發熱惡寒身軀痛者只依本方若身涼咳嗽乾嘔微利心下痞滿引脇疼痛為裏有水十棗湯○少陽病寒熱往來胃脇脹滿而痛咳嗽小

或微利去芍藥加黃芩○少陰病

氣咳嗽四肢痛重腹痛下利或嘔真武湯加五味子

○少陰咳而四逆或腹中痛或泄利或悸四逆散加五味子

○少陰咳而嘔渴不得飲下利黃芩湯○熱咳金沸膏

或唾膿血小柴胡湯加黃芩或桂枝湯入白蜜前湯○咳嗽而

痛不惡寒身大熱若臍腹亦有熱而內作痛者須下之大承氣湯

○張氏曰發汗不解腹滿痛者急下之可大承氣湯

○腹中滿痛此為實大承氣湯下之○咳嗽中滿而嘔用大承氣湯

○解利以後胃寒不食則理中湯加橘皮○夏秋發冷細辛

○痰多陳湯加細辛○五味子治嗽通用大橘皮湯

咳逆

咳逆垂危苦胃寒

不痊乳下應須急

橘姜苓夏勝靈丹

腹滿之時療已難

咳逆俗謂之噫古人謂之噫音日氣本虛吐下太過或復手

之水以發其汗胃虛氣逆逆出於胃塞固也其有不發氣擊搏而成者則成者則逐水主意加生薑自有條倒惟是噦而腹滿不得小便或後部不通此為直病雖有神醫未如之何

○備皮乾姜湯羌活附子散半夏生薑湯退陰散主之以意

擇用不瘥即炙乳下其法婦人屈乳頭向下尺處骨間三壯

丈夫乳小以一指為率亦三壯男左女右文負如小豆許大

抵乳直下陷中有動脈處是詳見下膿血條○證治論嘔瀉

手足逆冷小續命湯若加胃滿虛煩不安大續命湯○陽證

咳逆潮熱小續命湯加生薑吉皮竹如湯仍視其大小便何

部不調即通利之○噦而腹滿大便不利小承氣湯噦而腹

滿小便不利猪苓湯○臥明傷風脈弦浮小便難潮熱而噦

然以照製生薑湯主之又方下百病前湯調蘇合香丸大抵咳逆不止者不可救藥○水氣乘肺亦主意逆微咳當以表水裏水法治之見咳嗽條

乾嘔

乾嘔身熱小青龙

涎沫菜羹汗桂供

下利白通并四逆

脇疼十棗裏之攻

乾嘔者嘔而無物出也大抵執在胃脘直穀氣并執氣上熏心下痞結則嘔而無所出焉少陰下利黃芩湯主下利也厥陰吐沫菜羹主涎沫也汗出乾嘔桂枝湯主自汗也邪去則嘔者定矣若夫水氣一證又當以表裏分之發執不惡寒脇痛咳利而乾嘔者此則水氣在表與黃芩湯不發執不惡寒脇痛咳利而乾嘔者此則水氣在裏與黃芩湯是又不可無別然而表水裏水皆有效救何耶曰水氣乘肺也

○表不解心下水氣身熱乾嘔微喘或利小青龙汗之○乾

傷寒

傷寒論卷之五

嘔吐涎沫頭痛一云少陰一云厥陰並胃寒更湯得湯反劇者則與小柴胡湯○汗出頭痛乾嘔桂枝湯○少陰下利乾嘔脈微白朮湯利不止乾嘔而煩厥逆無脈白朮加瀉脾湯裏寒外熱脈微欲絕或乾嘔通脈四逆湯○身涼汗出腸疼乾嘔心下痞硬短氣欬而微利不惡寒無表證此裏有水十棗湯下之○膈上有寒飲乾嘔亦屬少陰用四逆湯○證治論乾嘔而利黃芩芍藥湯○身中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦黃芩湯然無柰者生姜半夏湯

嘔吐陽明氣逆行

數為胃執緩寒生

大陽合病利不利

腎證三條各有評

表邪傳裏上氣上逆則為嘔吐水穀不下是也傷寒嘔吐有胃熱有胃寒有水氣有膿血辨是四者而已胃熱者脈數或緊必有口渴舌乾煩渴之證胃寒者脈弦而遲必有逆冷下

食大小便自利之證水氣者先渴後嘔膈滿任公若胃院膿血則腥氣燥氣奔逆上衝經所謂嘔家有雜膿不須治膿不自愈又謂服桂枝湯吐者其後必吐膿血是矣大抵嘔吐皆有所出已下咽而出者嘔也未下咽而出者吐也吐特甚於嘔耳若繁以嘔無所出則其間所謂乾嘔者獨何耶嘔吐身屬陽明氣逆而上行戒不可下汗後水藥不入口者啗嘔而脈弱小便自利微熱而厥者虛極難調也生薑嘔家聖藥熱燥者烏梅代之

○陽明嘔吐小柴胡湯加生薑主之陽證通用嘔而發熱柴胡湯嘔而渴猪苓湯先嘔後渴此為欲解急與水解先渴後嘔為心下停水赤苓湯汗後或瘥後胃院餘熱虛煩嘔吐黃芩湯加生薑汁吐汗下後虛煩不得眠而嘔黃芩湯○寸脈數煩熱而吐為胃熱五苓散○寸脈微而吐為胃寒理中湯○汗下後閉脈遲緩而吐為胃寒理中湯○

不飲水而吐經中湯去不加生薑○太陽少陽合病自利而

嘔黃芩加半夏生薑湯○太陽陽明合病當自利若不利但

嘔葛根加半夏湯胃中有熱胃中有邪氣腹痛氣逆欲嘔黃

連湯○太陽發熱汗出心下煩鬱痞鞭下利嘔吐大柴胡湯

○少陰嘔證四逆湯加生薑水氣或欬或悸身痛自利真武

湯去附子加生薑膈上寒飲乾嘔吐涎沫四逆湯若更吐利

手足逆冷煩躁甚者吳茱萸湯又手足寒心中溫溫欲吐不

得吐脈弦遲為胃中實可吐之或用半夏湯入生薑汁並屬

少陰○溫毒發斑心悶而嘔身熱足冷有本條○水逆五苓

欲飲水水入即吐小腸不利故也五苓散小半夏伏苓湯

金匱云諸嘔吐穀不下小半夏湯似嘔似噦似喘心中澆澆

生薑汁半夏湯大小瀉皮湯○傷寒屢經吐下寒氣隔塞食

入口即吐乾薑黃芩黃連人參湯○汗後水藥不入口者逆

半夏六苓湯○嘔吐膿血見吐血條

吐血

吐血諸陽受熱邪

表之不發各證家

因而熱毒流於臟

地血三黃數劑嘉

諸陽受熱其邪在表當汗不汗致使熱毒入臟積於方內遂

成吐血羞傷寒失汗則邪熱化為惡血或瀉毒不亦亦能毒

腐其血凡眼閉目紅神昏語短心忪痛悶眩胃迷忘漱水與

煩嘔吐喘促驚狂讖語鼻衄唾紅背冷足寒骨熱膚潤四肢

厥逆多汗頑痰曾脇小腹痛急大便黑而微利小便多而不

禁此等皆瘀血證也男女均有此血脈婦人傷寒尤多見之

以其得病於經水來去之期或受病中間經水適至耳血之

為痛大抵夜重日輕或晝明了而暮讖語血屬陰從其類也

前證不必悉具但見其一二分曉便作血證主張犀角也黃

湯小柴胡湯杏仁承氣湯三黃湯酌量輕重用瘀血結其

五當湯主之諸湯皆以川芎為佐取盡大便黑物則佳雖

然傷寒咯血循難救療况吐血乎凡吐血皆非美恙初病猶可用工有陸續而來或經數時而復吐者斷不可救藥也

○方藥詳見解題通用**羅胃汁**一小盞入新汲水煎茅花土

之血熱者**黃連阿膠湯**證治論用**地血散****犀皮湯****三黃瀉心湯**

**升麻湯**○大下後寸脈沉遲尺脈不至咽喉不利唾膿血者**麻黃湯**

**易**在少陰則或用**甘梗湯**加**半夏生薑汁**○服**桂枝湯**吐者

其後必吐膿血**犀角地黃湯**○非傷寒證而吐血者與**蛤粉散**若虛勞咳嗽吐血口苦咽乾真**黃芩湯**主之

衄血

衄血勝脫病欲瘳

脈微發表病家愁

緊而無汗麻黃進 浮緩發表以桂投

直視而不得卧古人戒之所以無汗用**麻黃**有汗用**桂枝**

非治衄也散其經中邪氣耳若邪氣不得發散擁迫於血而

衄復不止也太陽衄血固為欲解或有衄血不止但頭面汗

出其身無汗及發汗不至者又為惡證當明辨之

○太陽證衄血及服**桂枝湯**後致衄者皆陽氣盛長病欲解

也屬**犀角地黃湯**○衄而脈微不可發汗與**犀角地黃湯**

**芍藥湯**○衄而煩渴欲

飲水水入即吐者先服**苓散**次服**芍藥湯**○陰證本無衄

若少陰厥而無汗強發汗必動血血從耳目口鼻而出是為

下厥上竭不可治治要方用**梔湯**○千金云凡時行衄血

不可斷之如或過多即可斷以**龍骨末**吹入鼻九竅出血通

用○陽明發熱口燥漱水者必衄見漱水條謹不可汗

膿血

下膿血室必讞言

濕毒無如腸垢鮮

消穀莫堅臍下蓄

膀胱熱結六條全

○衝脉為血之海即血室也男女均有此血氣亦均有此衝脉衝之得熱血必妄行在男子則為下血讞語在婦人則於經水適來適去之時經氣尚虛邪乘虛入或熱退而胃浦譏語或蓄血而寒熱似瘧皆謂之熱入血室私竊怪夫世俗常談凡病皆先調氣而血之一字念不到焉其間一二亦知理血則曰婦人有之不思血氣即陰陽也負陰抱陽中兩間而為人誰獨無此血氣哉否則張朱之書所謂**桃仁承氣湯****下血****湯**之類是特為婦人設耳然而血證之味仁如曰**按血**若脉來乍盛乍數明灼明滅或沉細而隱伏也若夫血熱交攻則寸關洪盛大抵多於左手見之左手主血固如是兩經云血上逆則忘血下蓄則在下焦蓄血小便必自利血結之處又當以此推之證具于吐血汗解

○陽明病下血讞語或胃脇滿如結胃暮夜如見怪狀此為熱入血室頭汗出者刺期門以瀉肝若不刺合用**小柴胡湯**加**生薑黃根枳殼梔子仁**○腹痛身熱下膿血如魚腦如爛肉汁曰濕毒**承氣湯**也論云**黃連阿膠湯**治要方用**冒風湯**加**未香**或**除濕湯**○熱氣乘虛入於腸胃臍下有熱泄汗赤黃白腸垢**黃連湯****白頭翁湯****寒反湯**○無表裏證已下後脉數不解消穀易飢多日不大便此有瘀血**桃仁承氣湯****抵當湯**或**承氣**加**桃仁大黃**又脾約證胃熱消穀有本條○下焦蓄血其人如狂小腹結急小便必自利與**抵當丸**或**小柴胡**加**桃仁大黃****抵當湯**大峻合用者只與**抵當丸**○太陽病不解熱結膀胱其人如狂而血自下下者愈不愈用**桂枝湯**○瘀血**大黃半錢****四倍**又倍之新汲水煎入醋下○失血少血或尺脉遲或諸脉不出湯劑中須以人為佐

即三焦之府取穴以病人中指中節為寸令仰卧從  
心正中向上五寸以墨點定從墨點兩邊橫量各二寸半大  
約直兩乳是期門穴也針入四分此證治論穴法可與咳逆  
條乳下穴參用

發黃

發黃尿秘引清漿

便黑尿多血證黃

身熱晝夜為中濕

鼻乾腹滿胃風傷

發黃者濕氣在裏復於熱於脾胃蒸濕米散而得之或病  
陽而用溫內熱而被火亦發黃也濕氣勝則如熏黃而晦  
氣勝則如橘黃而明傷寒至於發黃單陽無陰病勢已極不  
可以尋常目之如所謂寸口無脈鼻出冷氣如所謂形如蠶  
熏搖頭直視如所謂環口蠶黑柔汗發黃不治者亦多矣然  
而發黃之與瘀血大抵相類又何以辨之曰小便不利者為  
黃小便便利則瘀血也○千金云酒疸下之終為黑疸

連根搗取汁效

○黃痺證脈浮滑而緊數尿秘頭面汗出及頤而止渴引水

漿黃連湯○大陽中濕發黃身熱晝痛頭汗目黃蓋寒濕在裏致

血證發黃如在小便多大便黑黃連湯○

之可五苓散○若欲解散則用麻黃連翹赤小豆

湯餘見中濕條中濕與發黃不利小便非其治也○陽明傷

風發黃易飢氣短腹滿暈咽乾心脇痛小便難潮熱咳喘咽

痛息短頭眩嗜卧脉弦浮大小柴胡湯○初發黃急用

瓜蒂末口含水搗一字許入鼻中出黃水次服茵陳五苓散

發黃

發黃

如溫毒黑膏只

熱病重陽別有方

裏實表虛因發出

若還發汗愈增瘡

病證屬陽誤投溫藥或當汗不汗或當下不下或汗下未解



陽熱內然蒸薄外迫熱毒入胃皆致發斑蓋熱必傷血血熱不散裏實表虛由是熱氣乘虛出於皮膚輕則如疹子重則如錦紋是爾斑家謹勿發汗之重令開泄瘡爛又加多也凡斑畧見一二須早圖之日子稍延獨陽絕陰不可救藥其發黑斑者熱劇胃爛無及矣然而斑之方萌與蚊迹類焉又不可誤用藥也發斑多見於胃腹蚊迹多在手足之間關前陽脉洪大病人昏潰先紅後赤者斑也陽脉不洪病人自靜先紅後黃者蚊也發斑屬陽陽毒具而陰脉形或大便自利或佛鬱氣短而燥糞久不得通虛扁復生莫能施其巧

○溫毒發斑冬月胃寒至春間陽氣盛則發病經吐汗下而表未解毒未消也**黑膏**主之肌肉斑爛咳而心悶下利嘔吐清汁下部瘡或口瘡**黃連****檳榔皮湯****高根****橘皮湯**○熱病發斑時氣發斑**大青****四物湯****清血****桂枝湯**○陽毒白重陽發斑有本條○咽痛者**玄參****升麻湯**○發斑通用**木犀****昌陽湯**敗毒

發斑用**黃湯**熱多者**玄參****升麻湯**加**生****黃****烏梅**又**黃連****湯****青****赤****香****物湯**可擇用有下證者少**血**調胃**承氣湯**孫兆用**紫雲**一劑證治論用**白朮**加入**參湯**○發斑湯劑須以**紫草**為佐血熱內結者與**紫雲****湯**○發斑小點稀疏色常鮮紅者易治或如錦紋隱起餅烙者難治若初發色紅漸次微黯良久黯又轉甚面色肌肉**蠶**晦者斷不可救初發便如黑誌者亦然赤斑五死一生黑斑十死凡內外熱熾汗下不解煩悶咳喘足冷耳聾便是發斑之證

舌白胎

舌胎大熱發應難 利腹疼今嘔惡寒

懊膿脇堅井中濕 更兼臟結六條看

病家邪氣在表舌上無胎目傳入裏津液結搏則舌生白膜如胎之狀是亦丹田有熱也熱初傳裏其舌胎滑熱氣漸深其舌胎澁熱聚於胃舌為之黃若舌間黑色則病已深而熱

已極矣經云執病口乾舌黑者不治蓋舌屬心心屬火黑者腎家賊執所勝五臟反尅其能生乎

○尺寸脈緊口中執氣而乾燥足冷踈卧鼻中涕出舌上胎滑勿妄治也到七八日以來微執手足溫為欲解或七八日以上反大執者難治若腹痛者必欲利與（柴胡湯）若惡寒者必欲嘔與（小柴胡湯）加（人參）活潑（根）○大陽誤下胃中空虛客執動膈懊農舌胎（梔子散湯）或陽明蓋且其脈浮緊下之而懊農舌胎用藥同○陽明胎下鞭滿不大便而嘔舌上白胎（小柴胡湯）○陽明中濕舌上生胎以丹田有執胃中有寒濕也（白朮散）主之○臟結亦屬陽明舌上白胎有本條○舌黃者法當下之舌黑者不治

口燥咽乾

口燥陽明背乍寒

少陽專以柴胡治

人參白虎療咽乾

腎證應須急下安

脾胃有熱津液涸少所以口燥舌乾然而口中乾燥汗之將何如曰汗之重無津液其咽乾者尤不可汗也治法固自有條或依條用藥而口中尚更不和則當以瘀血推之蓋焦煩漱水口燥唇乾也證有之矣○陽明口燥咽乾無大熱背微惡寒煩渴（白朮散）渴欲飲水者用藥同○少陽口燥咽乾（小柴胡湯）○少陰口燥咽乾而渴者急下之用（承氣湯）○血證口燥唇乾見漱水條○狐惑咽乾唇瘡聲啞有本條

煩燥

煩燥來時執氣升

陽明燥熱連臍痛

陰為陽勝太陽經

腎候陽虛陰燥乘

心主火腎主水心熱則煩腎熱則燥此通論也傷寒煩燥則有陰陽虛盛之別焉陰虛而陽勝則為煩陽虛而陰勝則為燥有先煩而漸加躁者有先躁而後復煩者煩其熱之輕燥其熱之甚也或邪在表或邪在裏或陽勝或陰勝或火邪條

例不一當詳審而調理之設若結胃蓋具而煩燥吐利四逆而煩燥下利發熱厥逆而燥不得眠惡寒踈躄脉不出而燥此皆不治之證或者見幾而作聲之可乎

○太陽證煩燥寸關脉浮數身熱是也風寒俱盛其脉浮緊無汗而煩燥當汗不汗其人煩燥並用**大青龍湯**心中悸而煩燥**小建中湯**熱六七日渴欲飲水**五苓散**無熱但在言煩燥**五苓散**水調服刺吐之自汗心煩小便數不可與**桂枝湯**只用**芍藥甘草湯**服**桂枝**後汗出煩渴甚脉洪大**白虎加入參湯**○陽明證煩燥以多日不大便有燥糞故遠臍痛而煩燥也以**承氣湯**隨輕重用○少陰證煩燥尺寸俱沉厥冷自利是也心煩不得卧**黃連雞子湯****黃連阿膠湯**吐利厥逆煩躁欲死**梹菜更湯****茯苓四逆湯**下利咽痛心中煩滿**猪膽湯**下利嗽嘔煩渴不得眠**猪苓湯**惡寒而踈時時自煩欲去衣被**大柴胡湯**○太陽病以火熏之而不得汗亦致煩燥或火

射其背令人汗出大熱入胃而煩燥並**胃中不和**○下後若後煩不得眠欲水者少與之小便不利與**五苓散**○下後若煩夜靜不嘔不渴無表證脉沉微**白芍湯**若兼燥熨動與**白芍湯**發汗若下之病仍不解而煩燥**白芍湯**吐汗下後虛煩心下痞滿氣上衝胃頭眩經動身熱振振**桂枝白朮甘草湯**虛煩附入胃滿條○瘥後胃弱不能勝穀亦致微煩減穀則愈仍與**桂枝湯**○陰極發燥或陰毒用火熨灸及投熱藥以致發燥者並不可誤用涼藥燥甚仍用熱劑用**四逆湯****陰煎**○陰盛隔陽身冷大燥欲飲水不入口不得腫脉細沉緊有本條

渴

渴為浮脉太陽臨

陽毒熱多井中暑

汗是陽明利少陰

其人引飲喜盃深

熱氣薰蒸津液耗少所以發渴熱邪深淺條例不同然是渴

者大抵裏有熱也或曰六經外證獨少陰曰渴厥陰曰煩何  
 耶少陰屬腎主水熱氣既深腎水易竭安得而不渴厥陰屬  
 肝心之母也病主消渴飲水多而小便少是其裏熱也極子  
 氣乘母於是挾心火以為煩惟煩則消矣凡渴證用藥並去  
 半夏以其性燥而逐水也若先嘔後渴則為欲解當與之水  
 先渴後嘔則為水停心下屬赤伏苓湯故併述之

○太陽發渴則脈浮表不解心下水氣小青龍湯去半夏加

桂枝湯服桂枝湯汗出後煩渴甚者白虎加人參湯小便不

利而渴五苓散身熱惡風手足溫脇滿而渴白朮湯去半夏

加人參桂枝湯太陽病無汗而渴勿用白虎湯可小柴胡若

得汗後脈洪大而渴可少與白虎湯○風溫灼熱而渴白朮

根湯○陽明發渴則有汗脇下鞭不大便而嘔舌上白胎小

柴胡去半夏加人參桂枝湯陽明病汗多而渴勿用五苓散

可白朮湯若汗少小便不利脈浮而渴與五苓散一云桂枝

**湯**然本方內有阿膠滑石其性尤利又當審之發黃證頭汗

出小便不利渴引水漿茵陳湯茵陳五苓散○少陰發渴則

自利咳而嘔引水飲猪苓湯下利而渴欲飲白頭翁湯脈微

細欲吐不吐心煩但寐小便白下利而渴四逆湯○陽毒大

熱大渴黑奴圓主之○中暑渴者白虎加人參湯若渴不已

與酒蒸黃連圓○渴欲飲水水入則吐曰水逆五苓散

漱水不嚥

漱水陽明衄血時

發狂瘀血無寒熱

頭疼口燥熱生肌

犀角桃仁類例推

唇燥口乾血證類有之必欲取水而灌漱也然漱水而不飲

水何哉蓋渴者易為飲陽熱入裏胃中液乾患不與水耳惟

夫上焦瘀血下焦蓄血乘肺發燥渴證獨無是以漱水而不

欲下咽也漱水條例惟血證有焉

○陽明身熱頭疼口躁漱水不欲入咽必衄血脈微者犀角

湯

**地黄湯** **棠花湯** ○無表證不寒熱胃腹滿唇燥口乾漱水不  
嚥小便多此為瘀血必發狂輕者 **犀角地黄湯** **桃仁承氣湯**  
甚者 **抵當丸** 取盡黑物為度

可與水

可水除煩使胃和

常須少與勿令多

若還不與無由汗

強與還因水致病

病非大渴不可與水渴不與水無由作汗則喘而殂也傷寒  
飲水是為欲愈之候若渴者與之過多或小渴而強與之飲  
腹中熱少一不能消停飲作害者多矣曰水結曰喘悸曰咳  
噎曰嘔噦曰腫滿曰下利曰小便不利安有不自水氣得之  
診視又當識此

○太陽病發汗後大汗出胃中燥不得眠其人欲飲水當少  
與之胃和則愈○厥陰病渴欲飲水者與水則愈○霍亂發  
熱頭痛身疼熱多飲水者與 **五苓散** ○嘔吐病在膈上後必

**思水者與** **五苓散** ○水逆證見嘔吐條○水結證見頭汗虛  
條○飲水多水停心下氣上乘心則為悸水氣結於胃脇則  
為水結胃中虛冷則為嘔噦冷氣相搏為噎上迫於肺則  
為咳喘漬入腸中則為下利邪熱所搏畜於下焦則為小便  
不利小腹滿而裏急溢於皮膚則為腫重○飲水過多者 **五**  
**苓散** 導之

小便自利

蜜導陽明腎證寒

小便自利血相干

太陽汗下大便難

脾約識言脚攣厥

小便自利非血證則腎虛也惟血證則小腹結而如狂惟腎  
與膀胱俱虛則不能約制水液是二者小便皆自利也若腎  
虛而挾熱焉故乍瀝乍旋謂之小便數

○傷寒下焦有熱小腹必滿應小便不利今反自利者此血  
證也法當下之又有病在太陽遍身發黃其脈沉結小腹雖

傷寒  
堅而小便不利此則非血若或小便自利其人如狂血證諦  
矣下之**抵當湯**。陽明自汗應小便少而反自利者津液  
竭也**黃連**雖硬但以**蜜煎**亦可導。少陰四逆小便  
自利為虛寒用**四逆湯**或**真武湯**去**茯苓**若小便白亦是下  
焦寒與**四逆湯**。小便數大便鞭此為脾約**脾約丸**。  
主之張氏云跌陽脈浮而濇浮則胃氣強濇則小便數是為  
脾約跌陽胃脈也此證消穀引飲蓋胃壯而熱矣。傷寒脈  
浮自汗小便數若胃不和而譫語少與調**胃氣湯**。太陽  
自汗四肢拘急心煩微惡寒脚攣急小便數誤服**桂枝湯**得之  
便厥可與其草**乾薑湯**。芍藥甘草湯。太陽吐汗下後小便  
數大便因鞭**小承氣**和之。小便尿血證治論用**犀角散**

遺溺

遺溺風溫戒利腸 腹身重合二陽  
下焦不攝兼停血 腎絕狂言五證詳

水液之餘者入胞而為小便胞中虛寒不能約制水液加以  
邪氣乘之故旋溺自遺而不禁也

○風溫肺浮自汗體重多眠暈軒喘息恬不欲言誤下則小  
便不利直視失溲○三陽合病腹滿身重口中不仁面垢譫  
語遺尿並不可汗下少與**白朮湯**○膀胱瀦水下焦不攝則  
亦遺溺經云邪中下焦陰氣為慄足膝逆冷便溺妄出合用  
**四逆湯**○下焦蓄血小腹結急小便自利不禁輕者**桃仁承  
氣湯**重則**抵當湯**○狂言直視遺尿腎絕不治

小便難

小便汗竭胃乾空 多汗陽明並戒通  
引飲溫黃須要利 澁難虛熱客胞中  
汗自外泄津液中乾此小便所以不通也或陰虛而陽虛之  
小腸伏熱亦令旋溺赤黃數且難矣素問曰陽入陰分則勝  
脫熱而小便難其謂是乎多汗者以利小便為戒伏熱者以

涼劑行之若夫中濕發黃不利小便非其治也

○發汗多亡津液胃中乾小便不利及陽明汗多小便不利者並不得利之小便自利則愈○引飲過多下焦有熱小便不利

不利脉浮者**五苓散**脉沉者**猪苓湯**○中濕發黃家並與不利小便○小便難者陰虛而陽湊之故小便黃為下焦熱以**五**

**苓**散**滑石**輩利之**大黃**亦可太陽汗後漏不止而惡風四肢急小便難**桂枝湯**陽明中風脉浮弦大身黃烏乾氣

短腹滿潮熱時噦心脇痛嗜卧小便難**小柴胡**加**茯苓**○表有水氣身熱而咳表不解心下停水小腹滿小便不利

**龍湯**去**麻黃**加**茯苓**汗下後發熱頭項強痛無汗心下泄瀉泄小便不利**桂枝湯**去**芍藥**加**茯苓****白朮**嘔而發熱胃脇滿心

下怔忡小便不利**小柴胡**去**黃芩**加**茯苓**少陰病小便不利**四逆散**加**茯苓**

○塵後腰下有水氣**澤瀉**散主之

大便下利

利惟膽胃負時殂

腸垢鴨溇并濕毒

不渴脾寒瀉腎虛

識言備載古人書

下利須別陰陽三陽下利身熱太陰下利手足溫少陰瀉

下利身涼無熱此大槩也自利不渴小便色白脉微清穀

冷惡寒凡此皆寒渴欲飲水尿色如常泄下赤黃發熱後

凡此皆熱要之風邪入胃木來勝土故大腸暴下其裏虛

熱者下利尤多或解散或和解或攻泄或溫中或固下焦

利小便隨證有條但不容發汗蓋邪氣內攻若外復泄其

液則胃氣轉虛必脹滿矣然則下利之脉何如曰身涼脉

者順身熱脉大者逆大則為虛微弱則自止滑而數者是

有宿食也若夫下利讖語而目直視下利厥燥而不得眠

利發熱汗不止或厥不止下利厥冷無脉灸之身不溫而

不回下利日十餘行其脉反實皆邪擁正氣而下脫五奪之

最急者也雖有工巧將焉用哉

○太陽陽明合病下利頭疼目疼鼻乾脉浮長葛根湯○太

陽少陽合病下利頭疼胃痛乾嘔脉浮弦黃芩湯嘔者加

要生書○少陽陽明合病下利身熱胃脇滿乾嘔往來寒熱

脉長大而弦為負負者死但長大而不弦為順又脉滑而

則有宿食小承氣湯下之遲而滑者亦少下之○太陰自

不渴四逆湯理中湯不附湯○少陰自利必渴腎虛引水

救脉微者白通湯厥逆無脉白通湯下湯通脉四逆湯若

渴而嘔嗽心煩不得眠猪苓湯自利清水色青心下必痛

中乾燥此不可溫須下之用大承氣湯三陰下利法當用溫

若自利清水心下痛口乾燥須下之下利發渴屬少陰固也

然三陽亦有飲水者乃有熱也○協熱利者曰腸垢臍下必

熱便中垢膩亦黃或飲水乃熱也黃芩湯白頭翁湯薛命湯

此證惟黃芩湯最妙凡協熱下利通用之○胃寒利者曰鴨溇

必寒腹脹滿便中黃白青黑或清穀

白朮湯寒毒下利面戴陽者下虛也○濕毒利者

滿下膿血如魚腦如爛肉汁桃花湯赤石脂湯黃連湯

用除濕湯胃風湯加木香○下利讖語有燥屎也脉不微細

可下之用小承氣湯○三部脉平心下硬而下利者腸胃有

積結也急下之○下利心下痞者詳見痞條○陰毒陽毒亦

有下利有本條○下利身痛腹滿清穀急救裏用四逆湯服

藥後清穀止但身痛者急解表用桂枝湯○固下焦利小便

方論見痞條風邪入胃下利熱則散冷則不換金

散或加乾姜木香○假如他病腸風失血崩中漏血之人繼

而下利大腸裏急痛不可忍雖與芍藥湯取積已行疎導其痛

獨存者此非積也榮血虧少陽剛勝陰故爾後藥當以芍藥

為佐榮氣一調其痛立止設或小便不通五苓散不能作效

當以分心氣飲加芍藥湯與之自然快利或蘊熱血

當以分心氣飲加芍藥湯與之自然快利或蘊熱血

當以分心氣飲加芍藥湯與之自然快利或蘊熱血

當以分心氣飲加芍藥湯與之自然快利或蘊熱血

當以分心氣飲加芍藥湯與之自然快利或蘊熱血



腹中痛甚踈通滌熱痛未得平亦當為之調血

霍亂

霍亂渴來用五苓

寒多不水理中尋

憎寒厥熱姜甘附

中暑焦煩腹痛侵

張氏但稱吐利者非霍亂也霍亂邪在中焦以飲食無節居  
處不常得之夾食傷寒陰陽乖隔上吐下利而燥擾痛悶是  
其候爾偏陽則多熱偏陰則多寒卒然而來危甚風燭許仁  
則謂濕霍亂死者少乾霍亂死者多蓋以所傷之物或因吐  
利而出泄泄盡則止其死少也未上不得吐下不得利所傷  
之物擁閉正氣閼隔陰陽煩燥喘脹其死多也夫飲食起居  
當以此為戒○霍亂吐利熱多而渴五苓散○寒多而不飲  
水理中湯○或有寒腹痛而痛四肢拘急轉筋下利者對  
中湯加附子○吐利汗出發熱憎寒手足厥冷拘急  
其脈沉細四逆湯○中暑霍亂煩燥大渴心腹撮痛四肢

冷汗出脚轉筋香薷散千金云轉筋者用

○汗後霍亂雖吐利已止而身痛不休少助桂枝湯吐利已

止汗出四肢厥而拘急脈微欲絕通脈四逆湯加附子○霍

亂通用霍香正氣散腹痛加桂枝湯痛甚去芍藥加黃連小便不

利加茯苓瀉而不吐除濕湯加桂枝吐而不瀉除濕湯去芍藥

加桂枝○乾霍亂心腹作痛欲吐不吐欲下不下先以鹽

湯一盞頓服候吐出令透即止理中湯倍加桂枝與之凡

氣痞于中不吐不瀉害人甚急可蘇合香丸用濕散下或

用霍香正氣散加白朮倍加芍藥大抵風雨寒濕邪自

外入霍香正氣散為要飲食起居邪由內發治中

主之其或吐瀉不止面青厥冷者震靈丹研開木香乾姜煎

湯調下○大柴胡湯一證云發熱汗出不解嘔吐下利而心

中痞者大柴胡主之此則非霍亂也

失音

失音發瘧反張弓

風濕血迷并舌卷

狐惑唇瘡啞似龍  
更兼中暑語難通

言心聲也而聲音道路出於喉蓋肺亦主之若風若痰若血若熱與夫邪毒之氣伏於心竅或滯於喉間皆令人失音或語短而聲蹇澁也活人書惟有發瘧狐惑條例風濕而下注家之正說附焉○瘧證口噤頭搖掣瘳不語項強背直腰身反張有本條○狐惑即濕蠱也虫食下部為狐下唇有瘡其咽乾虫食其臟為惑上唇有瘡其聲啞有本條○風濕內有一證緩弱昏迷腹滿身重自汗失音下利不禁○**白草湯**加**白****末**○**白草**○血證心忪語短眩冒迷忘詳見吐血下膿血條○厥陰舌卷囊縮毒氣入臟或有不語此用**小柴胡湯**○伏暑發熱汗渴暑入心胸絡亦或不語此用**小柴胡湯**熱渴甚者用**竹葉湯**○風纏喉啞不語**細辛****皂角末**入鼻通閉次用**犀****略**加**生薑****味蘇**熱煎與之

失音亦須調導大小便

新刊仁齋傷寒活人摠括附遺卷之五終

新刊仁齋傷寒類書活人總括卷之六

佛鬱

佛鬱者陽氣蒸聚體膚

便堅為實癢為虛

二陽併病朗容赤

火迫身黃惕惕如

佛鬱者陽氣蒸越形見於頭面體膚之間聚赤而不散也其證則有異焉大便鞭而氣短者實也汗下後而得熾者虛也若虛若實當詳審之

○小便不利時有微熱大便乍難佛鬱而不得吐此燥壅裏實也  
○吐下後極虛而汗之其人佛鬱復與之  
○水以發其汗因而得熾此胃中寒也  
○桂枝人參湯加茯苓  
○太陽初得病發汗不撤并歸陽明續自微汗面色赤者陽氣佛鬱也  
○解肌湯主之或汗又不撤其脉緊濇與  
○麻黃湯  
○陽脉浮陰脉濡弱安以火熏熨欲令汗出客熱得火內則發為揚外則佛鬱蒸肌身自發黃  
○小柴胡湯加黑豆與之

胃眩

胃因虛極有寒傷

吐汗下餘苓桂木

頭痛胃堅屬二陽

脈沉自利理中湯

胃者家胃之謂眩者眩運之謂上虛則眩諸虛極而乘寒則胃二者皆似眩其輕而胃其重也婦人新產血虛挾寒必胃胃家虛則愈若少陰病下利止而頭眩時時自胃者此虛極而也其與諸逆發汗劇者言亂目眩設遇歧扁其能起之也

○太陽少陽併病頭項強痛或眩胃胃中痞鞭刺太頭戒不得發汗少陽本證亦有目眩見本條○陽明傷風頭眩見發黃條○吐汗下後虛煩脈微或沉緊心下痞滿下痛氣衝胃疾眩胃身搖筋脈動惕久而成萎○太陰桂枝白朮湯○脈沉遲面微赤身微熱下利清穀若必鬱胃汗出證屬少陰理中湯○中氣虛弱湯○四逆湯○隨經重用○太陽病若下之不

愈因發汗以此表裏俱虛其人必胃胃家汗自出而愈○又痰飲眩胃厥逆少與○陽明病重眩暈○胃本除

○金匱曰產婦亡血復汗寒多故胃又曰產婦厥胃脈微弱不能食大便堅蓋血虛則厥厥而必胃皆是虛寒

心動悸

心悸三陽證自詳

養聖叢書胃調湯

胃旋甘桂曬真武

小建中兼炙草方

動悸多生於停水或喘氣尚弱心下虛空正氣內動致之或汗下以後正氣內虛邪氣與之擊搏而然也此蓋心悸而氣動其與驚湯不同焉

○太陽病小便利者以飲水多故心下悸小便少者必膀胱裏急也並用○

來心下悸小便利心煩善嘔○傷風往來寒熱或

心下悸○少陽病脈弦細頭痛發熱誤汗之必譫

語轉屬胃胃和則愈胃不和則煩悸而大便鞭屬傷寒論  
陽然煩燥者可入黃芩湯太峻證治論只用柴胡湯查鞭者可加  
大黃煩燥者可入黃芩湯些少比調胃承氣證以此法代之尤  
為穩當○太陽發汗過多其人叉手自旋胃心下悸欲得按  
者桂枝湯○太陽病發汗不解仍發熱心下悸頭眩肌  
體瞤動振振欲擗地者真武湯主之或理中湯加茯苓傷  
寒二三日心中悸而煩與小建中湯經云先煩而後悸者為  
執先悸而後煩者為虛惟虛則小建中湯主之○少陽病耳聾  
目赤脅滿而煩妄加吐下則悸而驚可與小建中湯如有執  
證即以小柴胡湯繼之○傷寒脈結代心動悸炙甘草湯○小  
陰四逆證其人或悸以四逆散加桂枝主之○心下水氣厥而  
悸當先治水茯苓甘草湯然後治厥有本條不熱水入胃必  
下利也○傷寒多因吐下或火熏或溫針以致驚惕○太陽  
病若下之胃而煩驚小便不利身重難以轉側用桂枝湯

**防龍骨湯**不可發汗○風濕妄用火熏以致發狂劇則如  
故為癩時時溼從此為逆也金匱要略

發狂

發狂面赤屬重陽  
血證身黃仍救水

葶歷升麻及大黃  
尿多承氣地黃湯

陰邪併於陰則顛陽邪併於陽則狂傷寒熱毒在胃併入於  
心遂使神志昏亂言動急速而狂也狂之發作少卧不飢  
妄語妄笑妄俗妄辯妄起妄行奔衣而走登高而歌甚則踰  
垣上屋皆獨陽亢之非吐下不能止亦有當汗不汗瘀  
熱在裏下焦蓄血而如狂者小便必利特如狂而未至於狂  
耳其或熏熨迫汗灼艾燒針令人煩燥卧起不安則謂之火  
邪驚狂凡是數者各有條例若夫狂言直視旋溺自遺其與  
汗後熱多脈躁狂言不食智者寒心焉  
○重陽即陽毒脈實數狂走錯語煩燥乾嘔面赤咽痛潮熱

發班亭麻苦酒湯 陽毒升麻湯 施子仁湯 三黃湯 天黃散 井  
 麻葛根湯 加大黃 狂走者水調 瓜蒂末吐痰 瓜蒂散亦可吐  
 ○血證如狂脈微而沉身黃唇燥漱水不欲下咽無寒執小  
 腹鞭滿小便利大便微利而黑輕者犀角地黄湯重者桃  
 承氣湯或抵當丸 取盡黑物為效張云大陽病不解執結勝  
 脫其人如狂而血自下下者愈若外不解可與桂枝湯外已  
 解但小腹結急乃以桃仁承氣湯攻之六抵傷寒當汗不汗  
 執畜在裏執化為血故言忘如狂○陽狂寒水在黃連末各  
 一錢冷水調下皆效癸斑妄語未可下者訖龍草煎物湯  
 ○火邪驚狂者醫家以火熏熨迫汗及燒針灼文而然也其  
 人亡陽煩燥卧起不安金匱氣煎湯煎黑胡加龍骨性研湯  
 枝甘草訖骨牡丹湯與胡加龍骨煎湯  
 又火劫腹滿微喘口乾咽爛或不六便譎語用小柴胡湯  
 豆解火煎湯

直視

直視無神不轉睛 遺尿帶泄搖頭證

叨兼少血汗猶輕 脈瀉循衣並卒傾

水之精為志火之精為神五臟六腑之精皆上注於目病人  
 邪氣極盛胃其正氣遂使神志不慧目不轉睛而為之直視  
 傷寒至於直視證候最逆不救者多可有反目倒窺眼睛上  
 騰此則腎絕雖昌陽引年亦不及新矣

○衄血不可汗汗之則額上陷脈緊急直視不能眴不得眠  
 ○少血者肝氣虛目力弱若又發汗亡陽則陰陽俱虛必至  
 直視二者雖逆猶未甚也○狂言遺尿反目直視腎絕不治  
 ○直視譎語喘滿者不治下利者亦不治○搖頭直視形如  
 煙熏心絕不治○循衣摸床惕惕不安微喘直視日晡潮熱  
 下之後脈弦者生脈滑者不治弦為陽瀉為陰是陽病見陰  
 脈邪盛而正脫也○無表裏證目中不了了睛不和大便難

身微熱此非直視蓋內實也 **白虎湯** **大柴胡湯**

誠語

誠言脈數聲虛 胃實身和熱有無  
下利濕溫并血證 三陽合病各殊途

實則譎語虛則鄭聲經曰邪氣盛則實精氣奪則虛傷寒胃中熱盛上乘於心心為執胃則神識昏迷呢喃譎妄此邪氣盛而語言差也若汗後若病久本音失而正氣虧則却重語散不知高下此精氣奪而聲不正也譎語為執獨語亦執若狂語則其熱加多至於言亂惡罵又劇甚而難制矣大抵入執入胃水涸糞燥必發譎語當下誤汗當汗過多亦發譎語譎語屬陽見陰證者逆譎語喘滿氣逆而上奔也譎語下利氣脫而下奪也真氣離絕謂之何哉

○譎語為實脈洪數大便秘小便赤手足溫少與 **調胃承氣湯** **陽實譎語脈短促者不治若逆冷而脈沉細者即死**

**白通湯** ○胃實譎語

身執汗多胃中燥大便硬頭朝熱少與 **調胃承氣湯** **大小承**

**氣湯** 酌量用 ○身和譎語以發汗多亡陽津液不和致之不

可下只與 **承氣湯** ○下利譎語為有躁屎脈不微細即

酒下之用 **承氣湯** 譎語而利不止則不治又汗出譎語者

風也須俟其過經乃下之 ○濕溫苦妄言證有本條 ○瘀血

譎語狂言漱水大便黑小便多遍身黃小腹滿緣當汗不汗

若留熱在裏熱化為血故爾輕者 **犀角散** 重者 **承氣湯**

**湯** 稍遲則熱入胃津液燥中焦上焦不榮必為血結胃當

**針** 或脈遲身涼無熱胃滿如言胃狀亦刺 **刺** 若血熱

犯於胃氣小腹急滿小便自利喜忘如狂晝夜譎語 **承氣湯**

主之 ○三陽合病譎語脈滑實身重難以轉側口中不仁而

垢遺尿不可汗下少與 **白虎湯** ○發少陽汗則譎語經云汗

身微熱此非直視蓋內實也

之則讖語甚謂有少陽也下之則額上汗手足逆冷謂下之  
早也○太陽病八九日下之胃痛煩驚小便不利讖語身重  
不可轉側柴胡湯○發汗多亡陽讖語不可下柴胡湯  
主之○火劫讖語口乾煩燥喘滿小柴胡加黑豆

搖頭直視似煙熏

真病心家已絕根

痊證反張并口噤

頭中痛者戰而言

頭者諸陽之會陽脈有垂則頭為之搖動然有心絕而搖頭  
者有風盛而搖頭者有裏痛而搖頭者形證皆不類焉蓋陰  
根於陽陽根於陰陰陽互根氣血所以周流而無間若心絕  
則神去而陰竭陽獨無根不能自主是以頭搖經法謂陽女  
獨留形体如煙熏直視搖頭者此也至於太陽發痊則風盛  
於上風主乎動是以頭搖經所謂獨搖頭卒口噤項背反張  
者此也言而搖頭者頭中有痛言則痛甚痛則必搖經所謂

搖頭言者裏痛也又謂言者為虛不言者為實是也合是言  
之均是搖頭耳行而分之曰實邪曰虛邪曰真病又曰用吐  
臧否云○搖頭直視形如煙熏心家絕也真病不治○太  
發座搖頭噤口頷背反張身熱足冷有木條○搖頭言者甘  
裏有痛言者虛也可與如聖湯  
易簡方

戰慄

戰動於身慄動心

正邪勝負兩般尋

振振汗出將痊愈

鼓額虛寒病已深

戰慄皆陰陽之爭戰者身為之搖也慄者心戰而揚也邪氣  
外與正氣爭則為戰邪氣內與正氣爭則為慄戰者正氣勝  
慄者邪氣勝戰則欲愈慄其已甚乎○振振汗解者蓋邪氣  
欲出其人不虛故邪與正爭發為振戰正氣勝則得汗而解  
矣○傷寒六七日欲愈必振振汗出而解其有身不戰而但  
鼓額心慄者遂成寒逆此陰氣內盛正氣內虛不能勝邪反



傷寒 卷之六  
為邪所勝當以**四逆湯****茵陳湯**併**白朮**禦之理至明矣經云  
陰中於邪心內慄也又云邪中下焦陰氣為慄足脛逆冷便  
溺妄出此合用**四逆湯****茵陳湯**仍與養正冊

瘈瘲

瘈為引縮痲為伸

扶極風生併在經

條祛祛風猶可望

火熏發表定歸冥

瘈則急而縮痲則緩而伸病軀痲痲熱氣極矣熱極生風七  
主平動故筋脉相引而伸縮不寧傷寒至於痲痲疾勢過甚  
診視調理誰乎否乎內經曰太陽終者戴眼反折痲痲汗出  
不流痲痲之為絕證也如此○痲痲最難療理能用條祛祛  
風之劑以折其熱聞有可活之者條祛如**白朮****黃芩****黃法****風**  
如**防風****羌活**輩是也○風温妄以火熏必然發黃劇則狀如  
蠶癩時痲痲經云一逆尚引日再逆促命期設或為鑿所誤  
只得與**金匱風引湯**火邪用**黑豆**詳

筋惕身瞤

筋惕身瞤發汗多

此證難鑿本亦何

發汗過多津液涸少陽氣偏虛筋肉失其所養故惕七瞤七

而眇動也張氏特設**真武湯**以救之然本方不特温經助陽

而已其間**木****芍****芩**皆於胃氣有闕焉素問云脾中風則肌  
肉瞤蓋脾主肌肉胃為津液之海是雖過汗法當温經助陽  
又不可不以胃氣為本也雖然已經立下而復汗汗下而復  
燒針得之尤甚逆也經曰傷寒吐下後發汗脉微心脇痞痛  
虛煩眩胃氣上衝咽筋脉動惕者久而成痲又曰太陽汗後  
復下表裏俱虛更加燒針因胃煩面黃膚瞤者難治以至汗  
出如油口禁肉戰伸吟喘促者不治然則吐汗下可輕乎  
○陽氣之柔者養筋發汗過多病軀無陽筋必戰動或虛人  
微取汗或傷風自汗妄用**黃芩湯**便有厥逆筋惕肉瞤之

證俱屬**宜或湯**。瀰甚者去**芍藥**。有熱證者去**附子**。尤在酌量用之。○應發汗溢而腹中左右上下有動氣者並不可汗。若汗之即筋惕身羸。其左邊動氣者尤不可汗。發汗則頭眩汗不止筋惕肉羸。其候最逆且先服**芍藥湯**。次服**桂枝湯**。十救一二。○太陽病發汗不解發熱心悸頭眩身羸欲擗地**宜或湯**。○吐下後心下逆滿氣上衝胃起則頭眩脈沉緊身振搖者**茯苓桂枝白朮甘草湯**。又而成痙者通用若心下備痞兼與**枳實湯**。加**茯苓**。

不仁

不仁口瘡及膚皮

痛癢寒溫總不知

正氣重為邪氣伏

榮虛衛弱厥如尸

經曰諸乘寒則為厥。胃不仁蓋其血氣虧少不能周流於一身於是正氣為邪氣所伏故肢體頑痺不知痛癢寒溫厥如尸而齶且胃也苟其不仁脈或浮洪發喘無已水漿不下

汗出如油是氣絕於命叫束手待盡而已

○**桂枝湯**加**芍藥**或**桂枝湯**加**芍藥**及**枳實湯**以

意度用。○少陰脈不至腎氣微精血少寒氣上奔血結心下陽氣退下熱歸陰股與陰相動令其身不仁是為尸厥

不得眠

不眠腎證利而順

大汗膀胱胃裏乾

吐汗下餘煩懊憹

熱多熱少數般看

○素問云胃不和則卧不安所以不和者津液乾焦熱邪煩燥陽獨盛而陰偏虛故爾蓋夜以陰為主陰氣盛則目閉而卧安惟夫陰為陽所勝故終夜煩擾而不得寧所謂陰虛則夜爭者此也若陽虛而陰勝焉又有夜靜晝煩之證耳

○少陰下利而渴不得眠**宜或湯**此停水也若二三日以上

心煩不得眠**宜或湯**主之。○太陽發汗多或大汗出胃

中乾躁煩不得眠欲飲水者少與之胃和即愈若脈浮小便

不利而渴 **五苓散** ○吐汗下後心中懊懣虛煩頭倒不得眠

**梅子散湯** 或 **酸漿湯** ○大熱乾嘔呻吟錯語不得眠 **黃連湯**

**毒湯** 凡陽毒熱病皆不得眠 ○下後發汗無大熱脉沉微不

嘔渴無表證夜靜晝煩而不得眠 **芍藥湯** ○陽勝陰則

狂眠亂夢用 **芍藥湯** 陰勝陽則驚悸昏沉用 **酸漿湯** ○產

後不得眠者執氣與諸陽相并陰氣未復故也 **梅子散湯**

或 **湯簡溫膽湯** 加 **竹茹** 此可通州

多眠

多眠神思苦沉昏

自汗風溫熱上然

狐惑唇蒼沉細腎

太陽浮細亦癡眠

陰邪勝陽人多昏默昏土閉目者陰司闔也默上不言者  
主靜也多眠四證二者病在經若太陽惡寒其脉浮細是  
氣未盡復也若狐惑淹沉素得之下利則其亡陽可知矣此  
所以為陰勝欵

○風溫證尺寸俱浮自汗喘息體重不収黑黑欲眠不可發

汗可 **五苓散** 病在少陰厥陰二經 ○狐惑證四肢沉或因乾

聲啞上下唇唇害人甚急有本條 ○少陰證尺寸俱沉細但

欲寐急與 **四逆湯** 復其陽氣又少陰欲吐不吐煩而多寐五

六日自利而渴張氏無治法若小便白者可用 **四逆湯** 張氏

又云少陰病脉微細沉多寐汗出不煩欲吐若變證五六日

自利煩燥反不得寐者死少陰證變難辨難治貴在審詳 ○

太陽證頭項痛惡寒皆卧脉浮細或胃脇滿者 **小柴胡湯** 脉

但浮 **麻黃湯** ○胃傷風發黃嗜引有本條

瘥後昏沉

瘥後昏沉似怪妖

或時寒熱或時潮

語言錯謬精神少

毒在心胞汗未消

傷寒瘥後半月以來終不惺惺錯語少神或無寒熱或寒熱

以塵或潮熱煩赤盤以風魅治之非也是由發汗不盡餘毒

在心胞絡間致之

○瘧後昏沉不醒知母麻黃湯再取微汗○瘧後勞復食復見下後有熱條○瘧後胃脘餘熱虛煩而嘔黃連湯加生薑○瘧後喜垂不已膈上有寒白朮湯○瘧後從腰以下有水氣芍藥散○瘧後日暮微煩以其病方瘧強與穀食而不消也節飲食則愈

飲酒復

飲酒還教病復來

妄言不寐仍乾嘔

悶煩口燥舌生胎  
解毒黃連湯妙哉

極陰受陽寒盛生熱古人以傷寒為大病大病之後可與酒乎有勞復而發熱者有食復而發熱者飲酒致劇其熱尤甚於勞食復也

○傷寒已得汗解因飲酒而復劇煩悶口燥乾嘔伸吟妄語不得睡黃連解毒湯龍膽草煎湯或白皮為佐

尋衣摸空

尋衣妄語熱晡潮

脈瀯為陰終不救

下後陽弦病有瘳  
發黃須要小便流

華陀云病人手循衣縫不治間有一二活者幸也  
○吐下後不解多日不大便日晡潮熱不惡寒獨語如見怪劇者不識人循衣撮空脉湯不安微喘直視微者但發熱識語並用承氣湯下之若得大便後脉弦者生脉瀯者死弦為陽瀯為陰是陽病見陰脉也○太陽病用火熏之以致發黃陽盛則欲衄陰虛小便難陰陽俱虛身體枯燥頭汗及頰口乾咽爛腹滿微喘或不大便識語甚者嘔噦循衣摸床此證小便利則可治

百合

百合昏如崇物厭

似寒不冷熱無熱

或時喜食或時嫌

欲步難行卧不恬

百合者百脉一宗舉皆受病無所謂經絡傳次也皆因傷寒  
虛勞大病之後臟腑不平變而成此其狀似寒無寒似熱無  
熱意中欲食復不能食默默欲卧復不得卧強欲出行復不  
能行宗朝口若小便赤黃菜入即吐利也病源所載證狀一  
同其脉微數每尿則頭痛者六七日愈若尿不頭痛但漸漸  
如寒者四十日愈若尿則快然而但眩者二十日愈

○百合知母湯 百合地黃湯 滑石代赭湯 蓮子湯 百合洗方  
選用之

臟結

臟結無陽舌白胎  
雖然飲食全如故

陰筋急痛引臍來  
下利頻頻不可回

臟結者臟氣閉結而不復流布也一息不運機緘窮一毫不  
續空壤判臟其可結乎外證有如結胃但飲食如故時時下  
利為異耳其脉寸浮關沉細而緊無陽舌胎陰筋引臍腹俱

痛是也病人脇下宿有痞氣連於臍傍痛引小腹而入陰  
者亦名臟結於此而圖其痊濟豈不難哉

○臟結無陽證不往來寒熱或寒而不熱其人反靜舌白胎  
者皆不可下也蓋其邪未全成熱猶帶表寒可刺

與小柴胡湯加生薑

兩感

兩感膀胱對少陰

頭疼口燥大而沉

胃脾肝膽二三日

脉證雙傳准例尋

傷寒惟兩感不治兩感者半屬於陰半屬於陽臟腑俱受病  
也一日太陽少陰俱病則頭疼口乾煩滿而渴脉大而沉二  
日陽明太陰俱病則身熱臍乾譫語腹滿不食脉長而沉三  
日少陽厥陰俱病則耳聾囊縮厥令水漿不入脉弦而沉或  
三日而僵或六日而仆張氏無治法但曰兩感病俱作治有  
先後發表攻裏本自不同雙鍾以意消息謂如下利不止身

傷寒 身疼痛急先救其裏與**四逆湯**如下利但身體疼痛急先救其表與**桂枝湯**此為治有先後其達權識變之論也謝復古釋張氏治有先後之說亦以為陽先受病在乎表則先解表陰先受病在乎裏則先救裏是亦一意然先表者裏不可緩先裏者表亦不可緩也欤

蚘厥狐惑

蛔厥烏梅及理中

咽乾聲啞名狐惑

藏寒胃冷吐長虫

濕蠶唇瘡限數終

蚘厥證屬厥陰病家有寒妄發其汗或汗後身熱又復汗之以致胃中虛冷故長虫逆上飢不欲食也即吐虫其乍靜乍煩者虫或上而或止也虫聞食臭必出所以食則吐虫也張氏有言厥陰為病消渴氣上衝心飢不欲食也則吐蛔也既出於胃令設有消渴之證何哉蓋熱在上焦而中焦下焦虛寒無熱耳設或大便鞭結是亦蘊毒使然又不可指為燥

糞但用**生梓**理中湯加**人參**入**蜜**以利之**白木**散量所以輔

**大黃**也○治法先**脉**理中湯加**人參**若誤下之利不止

則用**四逆湯**又法**理中湯**加**人參**和**蜜**渴者加**黃連**

○狐惑與溫蠶皆虫證也狀如傷寒多因傷寒下利變壞成之蓋腹中有熱入食無多腸胃空虛故三虫求食而食人之五臟也其候四肢沉重並惡飲食默也欲眠目不能閉舌白齒胸面目間赤白黑色變易不當虫食下部為狐下唇有瘡其咽乾虫食其臟為惑上唇有瘡其舌啞溫蠶條例是雖調理有方此越人所以望而驚也○**治蠶桃仁湯****黃連軍角湯****理中湯**備用而已**金液丹**方狀治溫蠶蓋**硫黃**能殺腹中諸虫無陽者與之

陰陽易陰陽交

陽易陰根腫痛深

溫家林躁重生熱

腹連腰膝痛為陰

陰與陽交汗莫禁

傷寒 男子陽易婦人陰易病新瘥而動淫慾也一名女勞復感於情者亦然其候身重氣乏上腹絞痛頭不能卒足下能立四肢拘急百節解散眼中生花熱上衝胃在男子則陰腫入裏腹內攻刺在婦人則裏急腰腫引腹俱疼若手足拳攣其脉離經皆不可活或榮衛虛精竭翁七少氣著席不能動搖者引歲月死吁內傷六氣外傷七情其為害若是欬

○折脉離經一呼一至是為不足至脉離經一呼三至是為有餘○**桂枝湯**復胃養氣○**芍藥湯**○**當歸白**

**木湯**以意擇用○陰陽交者濕病不得發汗若汗之復大大熱狂言不食其脉躁疾是也大抵不治若脉浮數則表證猶在可再汗之若脉沉實或狂語則為胃實陽盛又當下之發汗後復熱者通用此例○再汗用**桂枝湯**○再下用**承氣湯**

陰毒身如擊撲然

疾沉汗渴痛躄咽

身斑面赤多煩燥

陽毒三三言共數六

陰氣獨盛陽氣暴絕則為陰毒身冷有汗其脉九細而疾是也厥額枯有初病遽然而成者有服藥數日變而成者蓋以腎氣極損生冷傷脾內已伏陰外又感寒致之或先感外寒而後伏陰於內內外皆陰陽氣不守故爾陽氣獨盛陰氣暴絕則為陽毒身熱無汗其脉弦洪促數是也有初病遽然而成者有已經吐下變而成者蓋以酒麪過度用砂礬燥腸胃燥熱致之或病證屬陽誤投溫藥助熱為邪內外皆陽陰氣不守故爾陰陽二毒皆有頭疼微利之證抑陰用熱抑陽用寒固有條例然此一毒既氣逆上結伏於胃中皆令人心下痛硬非常法所能通也當急作規摹以泄之陰毒泄則陽氣復陽毒泄則陰氣復陰陽升降榮衛流行自然大汗而解矣若心下已結延至六七日間斷不可活外證治法詳于後篇○陰毒外證面目唇爪青黑口開氣短咽疾不利乎足厥冷

身不甚熱痛重如打撲或數慄而寒頭目俱疼腰重背強毒  
氣攻心心下堅悶腹中絞痛外腎並臍下冷硬額上及乎背  
間冷汗不止嘔吐下利燥渴陰極發燥精神恍惚言語醒醒  
聲音鄭重舌上黑色陰病回陽服藥未透亦須外借火氣但  
勿迫燿也**生薑****良薑**能解散寒邪發越陽氣亦要藥也○陰  
毒沉細而疾身冷有汗**陰毒****甘遂****白朮****附子****五陽散**  
**肉桂散****回陽丹****返陰丹****天雄散****五元散****退陰散****金液丹**可選  
用之令陽氣復而大汗解矣○陰毒已深則灸**氣海****關元**  
穴以乎足和為効仍以前項藥濟之若六脉附骨疾勢門甚  
者臍中用先**艾**後**葱**法方訣詳具于後凡治陰毒得陽氣但  
復者皆生煩燥切勿誤投涼藥躁甚與**返陰丹**輩○陽毒外  
證身量大熱面目俱赤無汗頭疼腰背四肢疼痛發斑如錦  
紋心下結悶煩燥咽痛喘腫吐膿血下利赤黃小便赤  
苦錯語驚狂或走甚者舌卷而焦黑鼻如煙煤○陽毒發時

從數身執無汗陽毒

**白朮****馬兜鈴****天雄****黃芩****用****生薑****調下**或研**生薑****龍****大**  
**者**二條入**生薑****煎****可****三****各**少許新汲水調灌下  
可選用之令陰氣復與汗解矣陽毒大執煩渴識語赤班衄  
血不止**白朮**一服効○陽毒已深脉洪大內外結執舌卷  
黑鼻中如煙煤用新汲水浸濕布數重搭於骨上續又換新  
水浸布清冷執執繞減即已之詳法于後○太師陳北山方  
訣治陰毒心下結伏按之極痛大小便秘澀累日用藥不下  
但出氣稍暖亦可療治急取**白朮**十粒研爛入**艾**一錢許  
捻作一餅堅實安頓臍心立小**艾**柱灸五七壯竟腹中鳴良  
久自通利其次用**葱**一束緊扎切作數餅灸令溫熱貼於  
臍下以熨斗火熨其上續又易之漸寬解溫即以**五積散****二**  
**錢****脩****子****末**一錢**薑**七片**艾**二枚**鹽**少許水大匙煎七分溫服  
連併二三劑即汗出而瘥又法以**大蒜**一枚搗研捏作餅子



灸執蓋於臍心灸十壯大小便即通○治陽毒累經藥下不通結骨堅硬按之極痛或稍通而後再結喘促極熱大燥狂亂即取大活他龍四條洗淨砂盆內研如泥入生薑自然汁少許家一匙粟有什少許新汲水小盞調和徐徐灌盡漸次涼快若執熾者加附子少許如未效再作一劑自然汗出而解或用竹葉湯調大心竹葉圓灌下二毒灌藥少項以手揉其心膈即得藥下○本事方灸結胃巴豆肉七粒黃車七寸搗細津唾調膏安於臍心灸多其上不拘壯數以腹中有聲為効多畢即以湯篩軟帛拭之恐成瘡爛此方與集驗同散一同陰陽二毒但有微氣者皆可灸臍間有聲即得汗解○尚藥孫用和破顏丹治陰陽伏逆變為結胃五六日大便結攻之不及達之不可以此主之用錦辰砂銀青礞石比厚脂肉豆蔻木香官桂桑寄生黑附炮巴豆肉不去油各半兩輕粉半分麝半錢余五消可半將法譜半升八末少時

牛三末熬成膏次入徐藥打和得所圍如皂子大輕粉衣每二圓蜜湯調下

陽證似陰陰證似陽

陽證如陰冷四肢  
滑沉尿亦大便秘  
陰證如陽沉更微

陰極發燥熱極發厥物極則反也重陽必陰重陰必陽寒暑之變也四肢冷小便赤大便秘或糞色黑眼開言動脈沉而滑謂之陽證似陰面赤煩燥身有微熱眼閉穀熱脈沉而微謂之陰證似陽欲知的定當推原反本察色听声辨以六經參以外證徐上焉據脈驗之數熱遲寒陰陽別矣○陽之體輕陰之躰重陰家脈重陽家脈輕○陽盛且靜陰盛夜寧陽虛暮亂陰虛夜爭○陽證似陰白虎湯熱極生寒則四肢逆冷水或用承氣湯○陰證似陽四逆湯加葱白主之陰盛則燥下虛則面赤衰寒則身微熱也

陰盛隔陽

○陰盛隔陽脉細沉疾身冷大煩燥者卧泥水之中欲飲水而不欲入口者是飲水者非可服霍亂散火熯散丹砂圓亦效孫用和以半兩黑附子一枚燒存性候冷為末入真臘茶一大錢匕和為二服每服水一盞蜜半匙前六分冷服躁止得塵汗出皆藥之驗也

面赤身熱

刺諸咳引令四部

刺諸引引引引引

二圓蜜

三末蜜刺諸引引引引引

新刊仁齋傷寒類書活人總括卷之七

小柴胡湯加減法

傷寒者方惟小柴胡為用最而諸家屢稱述之蓋以柴胡能利能汗凡半表半裏之間以之和解皆可用也抑不知柴胡非特為表裏和解設其於解血熱消惡血誠有功焉蓋傷寒發熱一二月間解撤不去其熱必至於傷血不問男女皆然小柴胡湯內有黃芩最行血熱所以屢獲奇功但藥性差寒用之貴能加減今推明活法凡表發熱裏又有燥渴糞鞭熱證者是為內外俱熱小柴胡加大黃裏無熱證但發熱在表者小柴胡加桂枝解表可以溫血所謂陰盛惡寒其辛發散者此也小柴胡主攻裏可以蕩滌血熱所謂陽盛內熱酸苦湧泄者此也是又別其解表以溫攻裏以寒之義若遇少陽本證及無表裏證或表裏不分之證但依本方用之並不須加減此為正訣虛者少與尤在酌量予每見後季數輩療治傷寒輒用當歸

其意蓋為調血計不思一滯中脘二動痰涎三壞胃氣而血熱  
又非**當歸**之所能除惑之甚矣否則熱入血室張氏特以**柴胡**  
**胡**主之何哉雖然均是和解耳局方以**和**解散平穩之劑為和  
解張氏以**小柴胡**差寒之劑為和解意安在哉蓋局方**和**解散  
為尋常感冒和平解散設也若夫熱在半表半裏既不可汗又  
不可下非**小柴胡**一劑孰能內和而外解之乎然而幸者亦不  
可以輕心而用**小柴胡**也脉之不審證之不詳縱橫泛應執**小**  
**柴胡**以為公據脫遇浮熱似陽其不誤人性命幾希矣甚者僅  
以**小柴胡**收效一二而乃不遵格法輕用**大柴胡**立意一差禍  
不旋踵吁可畏哉

傷寒諸篤證

搖頭直視形如煙熏**絕**。唇陷反青四肢多汗**絕**。反目  
直視狂言遺尿**絕**。汗出髮潤喘而不休**絕**。環口烏黑  
身汗發黃**絕**。汗出如油喘促無已水漿不下形體不仁命

絕。大發濕家汗則成瘧熱而瘧不治。發濕溫汗身青面變  
耳聾不語曰重暈不治。發風溫汗必譫語並不治。發風溫  
中濕汗並逆。發動氣汗不治。發少陰汗九竅出血曰下厥  
上竭不治。發少陽汗則謔語。發汗只在頭而不至遍身鼻  
衄不止者逆。發汗不至足者逆。諸逆發汗劇者言亂目眩  
並不治。當汗無汗服**麻黃湯**數劑汗不出者不治。汗出如珠  
不流不治。汗出如油口噤肉戰聲吟喘促不治。汗後嘔吐  
水藥不入口者逆。熱病脉躁盛而不得汗不治。汗後不為  
汗衰復大熱脉躁疾狂言不食曰陰陽交不治。忽冒脉無脉  
服藥後汗解則生若無汗脉不至者不治。少陰厥逆無脉服  
藥通脉其脉漸續則生暴出則不治。下利厥逆無脉灸之脉  
不回身不温不治。少陰四逆下利惡寒而拳發躁無脉不治  
。下利日十餘行其脉反穴者逆。少陽陽明合病下利脉長  
大而弦曰負不治。陽病見陰脉不治。發斑屬陽見陰脉不

治。代脉不治吐血衄血脉反浮大而牢不治。陰易陽易脉離經外腎腫腹中絞痛手足拳攣不治。欬逆上氣脉散者不治。謔語脉反沉微四肢厥冷不治。脉陰陽俱虛熱不止者不治。七八日以上發大熱難治。舌木爛熱不止者逆。下利發熱或汗不止厥不止並不治。下利發熱厥逆燥不得眠不治。譫語直視或喘滿或下利並不治。譫語屬陽見陰證者逆。傷寒脉乍踈乍數不治。發斑先赤後黯面色黧晦不治。發斑大便自利不治。發黃而變黑不治。口乾舌黑不治。口張目陷不治。張口出氣乾嘔骨骸熱痛者逆咳逆不止者不治。心下痞悶上氣喘麤者逆。霍亂喘脹煩燥不治。誤下濕家額汗喘促或小便不利大便自利不治。頭汗內外開格小便不利此為陽脫不治。腹滿咳逆不得小便不治。腹大滿而下泄不治若脉洪緊而滑尤可慮。臟結如結胃舌白胎陰筋引臍腹痛時時下利不治。結胃證具加煩燥不

治。臟厥七八日發厥膚冷煩燥下利無時暫安不治。少陰吐利厥逆煩燥不治。厥而下利反能食者曰除中不治。四肢厥逆臍下絞痛石硬眼定者逆。厥陰唇青舌卷黑而耳聾囊縮不治。頭連腦痛甚手足俱寒不治。陰毒陽毒過六七日不治。兩感不治。狐感咽乾聲啞唇瘡不治。赤斑五救其一。黑斑十救其一。尋衣摸空者逆。

傷寒別名

清便自調自可謂大小便如常也。大便秘而堅則曰鞭。小便不利小便少下利清穀皆謂水穀不分。得大便曰更衣。夫便堅小便利曰脾約。下利曰瘕洩。腸僻謂痔也。寒而利曰鴨溼熱而利曰腸垢。轉失氣謂氣轉而響時時失下即後分泄氣蓋腹中有積。大汗傷氣火下傷血或火邪逼迫驚狂或尺寸脉緊而反有汗或發汗後汗不止而漏風或陰病本無汗而反有汗或其脉浮遲微弱不能作汗皆曰亡陽。吐汗

下温針以後其病不解曰壞病曰何逆。瘧後更發熱曰遺熱。○脉相尅賊曰負。○两手無脉曰雙伏。一手無脉曰單伏。○左関脉曰人迎。右関脉曰氣口。足跌上動脉曰衝陽。足後根上陷中動脉曰太谿。○婦人乳頭直下近腹處曰期門。○脐下一寸曰氣海。二寸曰丹田。三寸曰関元。○玄府即汗空也。○脐間動氣曰奔豚。○筋惕肉動曰瘧。○中暑曰中暈。○妄發濕温汗曰重暈。○渴欲飲水水入即吐曰水逆。○心下停水怔忡身無天熱頭額微汗曰水結胃。○乾嘔曰哕。咳逆曰噦。○目中不了了謂不明了也。晴不和謂不和平如常也。○三月至夏方發病曰晚發。

傷寒戒忌

傷寒新瘧後但少喫糜粥常令稍飢不得飽食反此則復。○又不得早起不得梳頭洗面不得多言不得勞心費力反此則復。○瘧後百日內氣脉未得平復犯房室者死。○忌食猪羊雞犬

狗肉肥魚油膩諸骨汁及鹹藏鮮脯餅麪果物

藥有寒温相濟

黃連湯用乾薑黃連柴胡桂薑湯用黃芩薑桂麻黃升麻湯用桂枝石膏返陰丹用附子膩粉陰旦湯用乾薑黃芩與夫桂枝石膏湯桂枝大黃湯乾薑黃連黃芩人參湯其藥性寒其藥性温温以調陰寒以調陽蓋使陰陽調而得其正其有陽證當下而表怯者陰證當温而帶熱者皆可以前例推之亦當權其冷熱重輕為之增減斯可矣。雖然古之分劑與今之分劑多寡又不同焉。藥則秤三四錢為一服水則用一大盞取七分為一劑。此亦通今之論也。所謂利藥不嫌生温湯須要孰又當權衡於此云。

據脉

傷寒治法據脉為要問證次之證如此脉亦如此條例徑行若證熱而脉遲證寒而脉數切不可自惑於倉卒須是畧去外證

專以脉為主領斟酌而調理之庶無差誤雖然偏陽之脉又何耶曰人稟陰陽二氣陰根於陽陽根於陰往來流通而無間斷者也一或偏勝百病生焉蓋偏陽則多熱偏陰則多寒偏陰則六脉虛濡按之無力頗有細澹輕澹之狀病主沉寒法當溫散人所易知若夫病軀內外有執其脉不數不洪但指下急澹而小緊如枝條刮刮之狀此則為陽勝陰當用寒涼之劑以解陽執愆伏之邪以行血執凝結之毒不可錯認以為脉小脾虛誤以溫藥益其疾也縱或嘔逆亦是熱邪乘虛執氣閉隔斷不可以溫執之劑投之否則墮厝火積薪之轍矣凡病皆當審斯

敬言首

傷寒證候頃刻傳變傷寒治法繩尺謹嚴非可以輕心視之也其間種類不一條例浩繁是固難矣至於陰極發燥熱極發厥陰證如陽陽證如陰脚氣似乎傷寒中暑似乎熱病與夫蓄血一證上執下冷乍開乍寒甚至四肢發厥昏迷悶絕凡此等類

尤當審思而明辯之若疑似非辨明姑且試探切不可妄投決病之劑方七雖微死生之係也謹之哉

藥方

本祖南陽活人書其詳見於傷寒百問凡下證不得用圓子藥謂水瀉瀉之類作圓以為轉下藥性有毒只取積滯傷動臟腑不能瀉滌邪熱以去病也○小兒傷寒節度如大人法但分劑少異其間用藥小冷耳

產婦傷寒

或問婦人傷寒可得問乎曰傷寒三百九十七條一百一十三方此張氏截然之筆削也於其證則有其藥曷嘗以男女為別哉要之月事去來產前產後男子所無請發明其蘊以解世俗之惑蓋婦人以血為主發熱惡寒經水適來經日熱除而胃瀉瀉語者是則邪氣結於胃脇當刺隨其寒而取之傷風經日續生寒熱發作似瘧而經水適斷者是則血結而不行當以



胃(桂枝散)或(參蘇飲)傷風發熱(八寶湯)或(天麻湯)風圓壯  
熱者(升麻湯)潮熱者(三寶湯)水煎胡湯加(太黃)小便不通  
者(通赤散)或(五苓散)表裏俱熱如表裏俱見之證(赤心散)  
主之咳嗽則(人參湯)或(紫羅圓)葷然  
亦視其小便或赤或白可以知裏熱之有無或清或濁可以知  
裏熱之輕重勿而嬰孩則以虎口指紋之紅色驗之長而童孺  
則以一指按其三關據左手人迎之緊盛者斷之所謂七十二  
證其證某方皆無越張朱格例特不過小小分劑而中病則止  
也不然匆匆新書駢集小兒傷寒雖略牽集源一二而終篇以  
活人書為法果何意哉故附于卷末以備孺者之觀覽云

新刊仁齋傷寒類書活人總括卷之七終

書中不庫



