





門 中武  
 籍 185  
 卷 2止

秘下

乳白

大正前抄



サキライ

ヨクイニ

瓶大正前抄

ミロウシロケニゴシホ

秘下

...

...

...

十九方對證通覽

磁石丸	十四丁	禹餘糧丸	十五丁
青龍散	十三丁	順氣丸	十三丁
容平丸	十二丁	直行丸	十二丁
芍藥散	九丁	解毒丸	十丁
清濟子	七丁	當飯散	八丁
救疝飲	四丁	理中散	五丁
發陳湯	二丁	榮陽湯	三丁

大正前抄





疝虫丸 十六丁

浮心圓 十七丁

排膿散 十九丁

玉丹 十六丁

治瘡丸 十八丁

十九方對證通覽凡例

一十九方原本國字簡約之文。今譯以纂輯于各方之下。不敢加私意。然原文間有語之顛倒。句之錯置者。則改正以順語脈。非敢僭也。宜與本書照讀。

一原本每方。僅有藥味之衡數。而無水煎之升量。今依仲景之例。更考取本邦常用之量法。以立煎水之法。亦非敢妄用私意也。其如曰丸散服若干錢。則隨方之峻與平。以定其梗槩。以示初學。雖然凡作劑之大小。服藥之多少。至於對之病之緩急。



剽易而得其宜適要在其人已矣。

一德本翁之立十九方也莫不本于仲景之玄旨者矣。如其取捨加減之法及立方之意乃所發於翁之神智且其對病鑒證隨證處方明猶觀火吾儕何議然其辭俚而其文簡恐讀者之失之於易是以略辨其方意以示初學豈足盡其蘊乎學者須反覆熟味而得其旨焉。

一凡本文用藥之例有本劑合方互用並用兼用時用及前後之別不可不審也本劑者處正之劑而

對證

日用之者對兼用言之合方者治所謂表裡合病或陰陽交見者之法也互用者病有兩證者其治之也或先或後更互用之以觀其偏解之有先後之法也假如朝用湯夕用丸若散者是也並用者其證兩見而其方不可合者二方並用之謂也假如湯與丸若丸與散其方不可合者之類是也乃亦治合病之法也兼用者或本劑之力不足者或傍有他證者兼於本劑而用之之謂也時用者攻擊峻劑不可數用者或間一二日或間四五日而



時一用之之謂也。其他有治法之前後，亦隨病之緩急劇易，症之輕重純雜，而極之機變者，猶八卦之變而為六十四卦也。變之又變，要復其本而已。又本文間有二方並書，而不論其別者，是涉兩證之疑途者。欲使學者思而得之，假如曰：凡裡證自汗多者，容平丸順氣丸是。乃仲景白虎承氣之證，所岐而鑿之臨病鑒証，所不可不致思而審辨也。嗚乎翁之於此書，其旨遠矣哉。讀者勿以辭之俚冊之小而侮視焉。斯豈多讓仲景乎哉。實我

東方之珍也。

藥製及一二藥品之辨，載于上頃者，或考之於他書，或得之所聞，皆余之所試驗者矣。讀者須併取焉。

和久田寅 識

德大身一乙方

三



十九方對證通覽

遠江

和久田寅叔虎

撰

德本翁十九方。假分病門。以論其治法。猶傷寒論分三陽三陰。以辨其脈證治法也。凡仲景之所論三陽三陰。皆取之於脈證。以命其名者矣。是以其所論亦不斷之於其因而決之於其證。故曰隨證治之。若夫翁之十九方。首但曰表證。裡證。而不曰病名。其他雖假分病門。不拘名與因而隨證治之。可謂深得仲景之旨矣。其立方





也。僅三湯六散十九合十有九方而臨機應變則千證萬病無所不可治焉。是乃約千百於十一得要而簡。細大不洩。微意不可言。易傳曰：易簡而天下之理得其是之謂歟。先賢有言曰：善鑿者執一方以治百病，不善鑿者不能以百方治一病。若德本翁可謂善鑿者矣。已。抑有說近時古鑿方之盛行，務走捷徑，爭極高遠，反失仲景之微意，以誤治術者，亦不鮮矣。於是乎亡命無賴之徒，朝喪產而夕為鑿，就師肄業之不遑。

對證

直之肆買書以為糊口之資者，大率欲得國字諺解一讀易解之書，以代講學之勞。偶讀此書，卒然以為簡約易施之術，不復審思明辨，妄意投藥而戕賊人命，是懼故今對方之證散在諸門者，纂輯于各方之下，以便覽者欲使思而得之。逢其原焉，其加愚按者，略欲示與仲景之旨，胸合之意也。如其微意固所不可言也。學者其致思焉。



發陳湯

茯苓 半夏各八分 莖胡 桂枝 芍藥 生姜

黃芩各六分 木 甘艸各四分

右九味以水二合四勺煮取一合二勺去滓再煎取六勺頓服

表証發熱惡寒氣上衝頭痛汗出或胸已上如有汗或腹拘痛或下利或如瘧狀發熱而嘔者○寒熱往來者為半表半裡○發熱而嘔者加生姜一錢○天行痢初起發熱惡寒下利洪者兼用順氣

九○五癰當發其邪○霍亂發熱惡寒吐瀉腹痛者理中散並用○病眩暈者○眼耳口舌病皆上衝也解毒丸並用○黃疸病汗染衣者磁石丸並用○疝家氣上衝頭痛惡寒身體骨節痛者救疝飲合方○半身不遂口眼歪牽者救疝飲合方○小兒驚風發熱手足動搖肉瞤筋惕者○諸瘡腫熱甚者○痘瘡麻疹初發○腹拘攣痛者外邪也芍藥散並用

寅按即仲景莖胡桂枝湯方內去人蔘大棗而



加茯苓木者也。故主治頭痛發熱惡風汗出氣上衝若眩悸小便不利若寒熱往來胸脇苦滿或嘔或腹拘痛或下利者。又按德本翁約仲景之方意以此三方通用桂枝湯。苓桂朮甘湯。小薤胡湯。三方之證其與救病飲合方則桂枝附子湯之意也。與芍藥散兼用則桂枝加芍藥湯之意也。下皆倣之。

榮陽湯

葛根 八分

芍藥

麻黃

桂枝

生姜

各六分

杏仁

附子

甘草

各四分

右八味以水二合煮取一合頓服

寒熱往來振々惡寒無汗頭痛項背強急或迫息身體骨節疼痛或咳而喉鳴者。○惡寒身體骨節疼痛者救病飲合方。○大熱惡寒痰咳者。○喘息胸中迫逼或咳滿久久不愈者兼用直行丸長服而斷根。○水腫當發汗利小便發汗榮陽湯利小便清濟子。○風濕病身骨悉痛者救病飲合方。○瘡毒入裡骨節疼痛或惡寒振々者救病飲合方。



時下以泻心圓

寅按此方仲景葛根湯方內去大棗加杏仁附子者也故主治項背強急發熱惡寒無汗若胸滿喘咳身體骨節疼痛煩者而通用麻黃湯青龍湯之兩證

救疝飲

茯苓八分 朮 芍藥各六分 鬼縛四分 附子二分  
右五味以水一合六勺煮取六勺頓服

下斐州方言詳其形如甚大至夏俗又稱夏菜刺皮用熱似大戟逐寒疝水出楚驛州

及甲斐

惡寒身體骨節疼痛煩者柴陽湯合方○痔之為病多因濕熱瘡氣者與順氣丸並用逐濕除瘀血○淋病久不瘥腰痛振寒者清濟子並用○寒疝証振々惡寒腰痛便閉或下利或腹滿痛按之不痛者救疝飲若上衝頭痛惡寒身體骨節痛者柴陳湯合方○半身不遂口眼歪斜者柴陳湯合方○風濕身骨悉痛者柴陳湯合方○瘡家惡寒身體冷甚者○瘡毒入裡骨節疼痛或振々惡寒者柴陽湯合方○腹鳴痛惡寒若手足冷者為伏寒○



寅按此方仲景玄武湯方內去生姜加鬼縛者也。乃為陰証之主劑。故主治腹滿痛。按之不痛。惡寒厥冷。若身體疼痛。四肢沈重。若心下悸。身潤動。或下利。或小便不利。者。而通用附子湯。四逆湯之証。其與發陳湯。柴陽湯合方。則所謂陰陽相雜者。而與桂枝附子湯。朮附湯。甘艸附子湯等之所之同。

理中散

茯苓 一匙

人蔘

朮

各六分

桂枝

干姜

甘艸

各四分

右六味為末。服若作湯。以水一合六勺。煮取六勺。頓服。

胸中寒。有結痰。宿飲而痛者。為胸痺。○心痛徹背。乍冷。自汗出。脈結。而少氣者。以甘艸湯送下。為妙。○食停滯。而噫氣臭者。○諸病嘔吐。証心下痞。鞭或小便不利者。若嘔吐不止者。以生姜汁送下。○飲食宿滯。乎心下。或痛。朝食夕吐者。先下。以瀉心丸。後以理中散。調和中焦。○嘔吐。諸証。心煩。心下



痞大便秘者解毒理中並用○腹中寒而噦者理中散熱湯調和服別清濟子糊和貼足心或灸神關亦可○下利瀉泄心下痞腹中雷鳴者若不瘥者兼用禹餘糧丸○腰脚冷小便頻數寐而遺尿者○霍亂病發熱惡寒吐瀉咽乾或好飲冷水水入即吐手足逆冷小便不利或發熱手足痿腹痛者理中散發陳湯並用○飲水多而小便少者為消渴理中散容平丸並用○眩暈者○積聚心下痞痛吐涎沫小便不利惡聞食臭或覺食味變而

不美者○癩癩大率水毒變病也與疝虫丸並服久而全差  
寅按即仲景桂枝人蔘湯加茯苓者也而通用理中丸之証如其主治本文却詳於傷寒論其餘所汎用心下痞鞭諸証半夏瀉心湯吳茱萸旋覆花代赭石湯大小半夏湯茯苓飲等之所乏也其於小便頻數則乾姜甘草湯及苓姜朮甘湯之意也其與容平丸發陳湯並用則五苓散之意亦有焉



清濟子

防已 朮 商陸 滑石 甘艸各二

右五味為末白湯送下二錢匕若作湯以水一合

五勺煮取六勺頓服

腹中寒噦者理中散熱湯調和服清濟子糊和貼

足心○諸淋膿血痛甚或小便不利者以清濟子

為本劑若久淋瘀血小腹澀痛小便頻數或尿血

者當歸散並用若淋病久不愈腰痛振寒者救

疝飲兼用○小便通後痛者○身黃黑腹脹大便

黑時下利者磁石丸順氣丸互用不治者可與清

濟子○水腫當發汗利小便榮陽湯利小便

清濟子

寅按即仲景防已黃耆湯方內去黃耆太棗生

姜加商陸滑石者而專利水之力故凡水氣病

渴而小便不利若淋瀝者此方主之其膿淋及

水血相結者與血証之劑並用則猪苓湯太黃

甘遂湯之意有焉

當歸散



當歸 芍藥 各三  
芎藭 牡丹皮 甘艸 各二

茯苓 四錢

右六味為末酒若白飲送下二錢匕

久淋瘀血小腹澀痛小便頻數或尿血者清濟子

兼用○產前當常服○產後血暈若胞衣不下者

順氣丸兼用○經水不利或血塊或白物下者順

氣丸兼用○小產若漏下不止者以溫酒送下○

男女諸血証鮮毒丸兼用  
寅按即仲景當飯芍藥散方內去沢泻朮加牡

丹皮甘艸者而為治諸血證之主藥故與順氣  
丸並用則近乎太黃牡丹湯下瘀血湯桃仁承  
氣湯等之意其溫酒服者乃芍飯膠艾湯之意  
也而其藥劑則近乎桂枝茯苓丸當飯芍藥  
散之兩方可謂悉矣

芍藥散

芍藥 香附子 各三  
厚朴 朮 甘艸 各二

右五味為末以白湯送下二錢匕若作湯以水一

合五勺煮取六勺頓服



腹拘挛痛者外邪也。發陳湯合方。○但腹拘挛滿痛者若好甘者以甘艸膠飴煎湯送下為妙。○痢病便澁腹拘急無餘証者順氣丸並用。○積聚胸腹強痛者。

寅按仲景芍藥甘艸湯加香附子厚朴朮者也。故與發陳湯合方則近乎桂枝加芍藥湯之方。意以甘草膠飴煎湯送下則近乎小建中湯之方。意與順氣丸兼用則近乎大承氣湯之方。意。而其主治則以腹滿拘挛而痛者為標的正與。

仲景之意合

解毒丸

大黃 三錢 黃連 黃芩 各二錢 梔子 一錢

右四味為末糊丸每服一二錢若作湯以麻沸湯一合浸須臾絞去滓溫服

表証大便鞭心煩者凡兼用此方裡証無寒時熱或腹滿按之痛大便秘結或下利臭穢或面色如醉譫語劇者發狂或舌黃黑者順氣丸合方後溼熱以溼心圓○食滯大便鞭者○酒毒最妙○嘔



吐諸証心煩心下痞大便鞭者理中散並用。嘔者若飲食不下咽者以生姜汁送下。痢病輕証者。霍亂吐瀉後心煩者容平丸互用。虛煩煩躁熱在腹内心悸難眠或胸痛舌上黃黑色短氣肩息者容平丸並用。眼耳口舌病皆上衝也。陳湯並用。黃疸病心煩者若欲飲水小便不利者容平丸兼用。凡黃病不別其証者磁石丸合方。積聚心煩心下痞或噫氣者或大便鞭而煩者。中風半身不遂大便秘者兼用風濕痛風亦

同。產前大便鞭者臨產不易兼用此方。男女諸血証當飯散本劑解毒丸兼用。諸血腫或無名惡瘡皆兼用。癆狂口舌乾燥者容平丸並用。○疔瘡麻疹已發出者兼用。寅按仲景三黃浮心湯加梔子者乃後世黃連解毒湯去黃蘗加大黃者是也。故主治心煩心氣不定心下痞按之濡大便鞭者而兼用諸方之証多端或之重或之輕本文詳矣。

容平丸



石膏 五匙

天花粉 三匙

甘艸

黃連 各二

右四味為末。丸。或散服。以白飲送下。二錢匕。  
表証若口舌乾者。兼用。○裡証熱在胸腹內。而舌  
乾欲飲水者。解毒丸兼用。○凡裡証自汗多出者。  
容平丸順氣丸。○心腹痛舌乾欲飲水者。是熱痛  
也。○瘧病大渴者。兼用。○霍亂吐瀉後。心煩者。解  
毒丸兼用。○飲水多而小便少者。為消渴。理中散  
並用。○虛煩煩躁。熱在腹內。心悸難眠。或胸痛舌  
上黃黑者。解毒丸並用。○黃疸渴欲飲水。小便不

利者。解毒丸兼用。○水腫咽乾渴者。兼用。○風濕  
病身骨悉痛。而咽乾渴者。兼用。○癰狂口舌乾燥  
者。解毒丸兼用。若刺者。以甘艸湯送下。○痘疹若  
渴者。

寅按此方。後世石膏黃連甘艸湯。加天花粉者。  
已故主治渴欲飲水。胸腹有熱煩躁急迫者。即  
仲景用白虎湯之意。而兼涉諸伍石膏之証。

直行丸

大戟 大黃 各一

芫花

甘遂

牽牛子

各五



右五味為末糊丸白湯送下半錢若一錢以下利為度面浮腫如蒸疼喘劇者○喉中如鋸邑咳而自胸背引小腹痛或四肢挛痛者○喘息胸中短促或咳滿久々不愈者柴陽湯為本劑兼服直行丸長服而瘳○胸高而鞭痛不可近手者是為結胸○凡心腹痛不愈者兼用○瘧病咳若胸中引痛者兼用○水腫咳者

寅按此方主治痰飲結實咳喘挛痛及結胸乃仲景大陷胸湯及十棗湯之意而方即後世三

花神祐丸者分量少異耳

青龍散

茯苓四錢

大黃

五味子

青礞石

各三錢

甘遂

甘艸

各二錢

右六味為末丸白飲送下或散服或煉蜜為丹自半錢匕至一二錢匕

表証若咽腫痛咳者兼用○痰証發熱無汗痰咳或心悸目眩者○咳逆吐食或咽痛甚吐痰血者寅按此方主治痰咳咽痛或心悸目眩者乃仲

礞石內主豔  
和芒硝安水  
上煨以見登  
白為度



身氣也

氣

順氣

散

正

氣

散

散

散

散

散

散

散

散

景小青龍湯及苓桂五味甘艸湯其他伍五味

子諸方之意而方即依後世滾痰丸而立之者

矣

順氣丸

大黃 芒硝 各等分

右二味為末丸白飲服方寸匕若二方寸也

病在裡者無寒時熱或腹滿按之痛大便秘結或下利臭穢或面色如醉譫語劇者發狂或舌黃黑者鮮毒順氣合方後除熱以泻心圓稍々下之愈

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

○凡禪証汗出多者此方容平丸○熱利腹痛下重下赤白惡濁者泻心圓兼用○天行痢初起頭痛發熱惡寒下利澁者發陳湯本劑順氣丸兼用○大便澁腹拘急無餘証者芍藥散順氣丸並用○痔之為病多因濕熱瘡氣者救疝飲並用逐濕除瘀血○諸淋大便色黑而秘者為有瘀血時々兼用順氣丸○身黃黑腹脹大便黑時下利者磁石丸本劑順氣丸兼用○積塊若血積大便色赤黑者○經水不順或下白物者當歸散互用○癸



狂大便色黑者

寅按此方仲景大承氣湯之意而所謂陽明寒熱及瘀血証各與本劑兼用而三承氣湯之意具焉

磁石丸

磁石 二錢

浮石

滑石

各三錢

大黃

四錢

右四味為末丸白湯送下一錢半若二錢

黃疸病汗染衣者發陳湯本劑磁石丸兼用○身

黃黑腹脹大便黑時下利者順氣丸兼用○凡黃

磁石醃浸  
煨七次為  
末水飛用

按黃腫後  
世所謂黃  
脾病

病不別其証無奈何者順氣丸合方○鼓脹身體瘦腹滿甚者常用磁石丸時下以浮心圓及玉丹○黃腫○積聚身浮腫色青黃其証轉變久々不差者

寅按此方仲景大黃硝石湯及硝礬散之意而治黃疸黃胖病瘀熱在裡或水血相結小便不利者後世皂礬丸鉄砂散及浮石丸等與此方意相似

禹餘糧丸



禹餘糧 赤石脂 代諸石 各二 大黃 四錢

右四味為末丸白湯送下二錢若三錢

凡痢病以浮心圓浮熱毒腹痛下重解而後以禹餘糧丸止之洩瀉驚澆用理中散不止者○痢

病下血者○脫肛下血者

寅按此方仲景赤石脂禹餘糧湯方內加赭石

大黃者也故主治毒在下焦而下利若下血不

止者其腹候臍下按之濡而痛者若後世所謂

刮腸腐肉痢等此方主之

疳蟲丸

蘇恭漢列  
種按此方當  
用條乃年書  
者乃殺虫之  
主藥

番木鱉 大黃 各三 藜蘆 一分

右三味為末丸梧子大小兒隨年齒數或倍用木

人服一錢七若二錢七白湯飲下

瘡病不愈者用此方多下虫瘡○所謂疳積心氣

不定狀如驚風者為有蛇虫○小兒病難分別大

率疳証居多常用疳虫丸則治百病過半○驚風

兼用此方○癩癩理中散並服久而全治

寅按此方治蛔虫之主藥仲景甘艸粉蜜湯高



鉛內上器安下來  
上鐵化下硫黃  
寒鐵著下燒下  
火冷過研末後  
和水銀或鉛鎔  
化後下水銀合  
和亦可

梅丸之代用而本邦菜山藜蘆丸之類方木  
人小兒虫証尤効或獐犬傷鼠咬毒亦可服

玉丹

巴豆 水銀各五分 大黃 三錢 黑鉛 生薑各二

右五味為末丸隨病輕重自一二分至一錢小兒  
隨年數或倍用

諸食毒在胸腹痛甚身動搖欲死者用玉丹以吐  
浮為度○諸嘔吐証結實者○凡微毒痔疾下血

脫肛不愈者皆用治瘡丸一劑後下以玉丹則差

不再發○淋久々不愈者為有瘡毒時下以玉丹

○鼓脹時以玉丹下之○小兒驚風若角弓反張

欲死者○凡小兒有胎毒加以飲食而增其毒常

々時下以玉丹○瘡家用諸菜不治者用治瘡丸

一劑後下以玉丹○癩狂當用玉丹浮心圓

寅按此方仲景備急圓加水銀黑鉛者也故諸

暴卒病中惡客忤心腹脹滿角弓反張欲死者

若癰毒之結實若飲食之停滯及小兒胎毒等

胸腹結實之証此方主之又按備急圓巴豆乾



姜之辛熱僅驅逐水毒之結實此方加水銀黑鉛兼以鮮實熱方意可味

泻心圓

大黃 四匙 礬石 二匙 輕粉 巴豆 各五分

右四味為末丸服法當準玉丹裡証用順氣解毒合方後除熱以泻心圓稍々下之○熱在腹內痛者○魚毒菌毒停滯心下者○飲食宿滯乎心下或痛朝食夕吐者以泻心圓下之後理中散調和中焦○熱利腹痛下重下赤白

惡濁者順氣丸本劑泻心圓兼用稍々下之○凡痢病以泻心圓泻熱毒腹痛下重鮮而後以禹餘糧丸止其利○瘧大熱譫語者○熱實而苦腦煩躁動隣者○黃病腹滿心悸大便鞭者鮮毒丸本劑泻心圓兼用○黃病自汗出者稍々下之○疝經日發熱舌上黃黑痛甚按之痛者為實○鼓脹時下之以玉丹泻心圓○積聚心煩大便鞭者鮮毒丸並用○瘡毒入裡骨節疼痛或振々惡寒者救疝榮陽合方時下以泻心圓○癰狂○痘疹毒

德本第廿九方



热甚難救者

寅按此方主治热在胸腹内而苦惱煩躁者兼用之於仲景承氣瀉心諸實熱難解之証以瀉其胸腹之熱故方名瀉心而其才力出于仲景瀉心湯之上一等矣其用之之法稍々下之無取暴瀉是翁之意也

治瘡丸

龜板醋浸  
瓶為末

龜板 辰砂 大黃 各一兩  
輕粉 五分  
右四味為末丸每服五分日再以白湯飲下

按本州醫錄  
主治積年惡瘡痔破血下  
惡血天瘡鼻  
陷亦惡血瘰  
熱之所致故  
用瘡家之治  
法

凡癰瘡毒痔疾下血脫肛不愈者皆服一劑後下以玉丹則差不再發○瘡家用諸菜不治者服一劑下以玉丹○惡瘡下疳結毒諸菜無効者○瘡瘡黑陷者以繁縷艸自然汁送下

排膿散

反鼻 鹿茸 各二  
鼯鼠霜 二  
土茯苓 五  
右四味為末丸或散服方寸匕若兩方寸匕白飲若溫酒送下



諸腫毒無名惡瘡皆當服

寅按此方仲景排膿湯散之意而諸腫諸瘡痛而欲成膿者及膿已成者或腐爛久々不愈者或頑腫久不成膿者及癰毒惡瘡皆此方主之而能內托排膿去瘀致新

德本翁十九方對證通覽終

跋

德本翁十九方曩予遊歷中得之富岳之下其事既詳于青陵子紀中爾來已十有二年予及諸州之門人經驗不少就中遠妙樂只齋及其門人數輩經驗尤多日月覺其妙於是年予有欲上之梓而傳於天下後世之志而未果今茲癸亥予抱病僑居浪華之堂洲樂只齋偶來



訪談隆事。且示以其所撰之十九方  
 對證通覽者。及德本翁之事實。予  
 取而讀之。大有發明翁之微意。物  
 合於仲景之玄旨者。可謂鴻益于  
 學者矣。遂相共挾訂。合為二卷。授  
 之劑劑氏。若夫經驗之事實。更  
 俟續篇云。 享和三年 秋日

湖南 稻葉克文禮題

發行

江戶日本橋南壹丁目  
 同 淺草茅町二丁目  
 同 日本橋通二丁目  
 同 芝 神明 前  
 同 同  
 同 下谷池端仲町  
 同 本銀町三丁目  
 同 卜 軒 店  
 京都三條通御幸町角  
 尾州名古屋本町通  
 同 同  
 大阪心齋橋通北久太郎町

須原屋茂兵衛  
 同 伊 八  
 山城屋佐兵衛  
 岡田屋嘉七  
 和泉屋吉兵衛  
 岡 村庄 助  
 永樂屋丈助  
 英 屋大 助  
 吉野屋仁兵衛  
 永樂屋東四郎  
 菱 屋藤兵衛  
 河内屋喜兵衛

書林



武島崎三郎

ゆまの村 ゆまの 水谷

依子玄奥

舞子

長生の家科

陳末

女二天

ケニハク

*[Faint background text and bleed-through from the reverse side of the page]*



香堂之天行

疎

若中如歌

知地可若存

起出通天



