



門
武
186
卷 12



辨證錄卷之十二

清 山陰 陳士鐸敬之甫著

大日本 長崎 淺井俊元民甫校

安胎門

婦人小腹作痛、胎動不安、如下墜之狀、人以爲帶脉之無力也、誰知脾腎兩虧乎、夫胞胎雖係於帶脈、而帶脈實關於脾腎、二經虧損、則帶脈力微、胞胎何能勝任乎、然人致脾腎之虧者、非因於飲食之過多、卽由於色慾之太甚、不補脾補腎、而帶脈迫急、胞胎所以下墜也、第胞胎通於心腎、不通於脾、補腎可也、何必補脾、不知脾胃爲後天、腎爲先天、脾非先天之氣、不能化腎、非後天之氣、不能生補腎、不補脾則腎之精、正不能遽生也、補後天之脾、正所以補先天之腎、補先後天之脾腎、正所以固胞胎。



松井家藏

之氣、蓋胞胎原備先後天之氣、安可不兼補先後天脾腎哉。方用安奠二天湯、人參一兩、白朮一兩、熟地一兩、山茱萸五錢、山藥五錢、炙甘草一錢、杜仲三錢、枸杞子二錢、扁豆二錢、水煎服。一劑痛定、一劑胎安、不必三劑。夫胎動乃脾腎雙虧之症、必須大用參朮、熟地、補陰補陽之味、始能挽回於頃刻。世人往往畏用參朮或少用、以冀建功、反致寡效、此方正妙在多用也。

用娛親湯

亦效

熟地一兩、白朮一兩、甘草一錢、人參
五錢、杜仲五錢、山藥五錢、水煎服

婦人懷姪至三四月、自覺口乾舌燥、咽喉微痛、無津以潤、以致胎動不安、甚則血流如經水、人以爲火動之故也。誰知水虛之故乎。夫胎非男精不結、亦非女精不成、逐月養胎、古人每分經絡、其實不能離腎水以養之也。故腎水足而胎安、腎水缺而胎動、

又必腎火動、而胎始不寧、蓋火之有餘、仍是水之不足、火旺動胎、補腎水則足以安之矣。惟是腎水不能遽生、必須上補肺金、則金能生水、而水有化源、無根之火、何難制乎。方中少加清熱之品、則胎氣易安。方用潤燥安胎湯、熟地一兩、山茱萸五錢、益母草二錢、黃芩一錢、麥冬五錢、生地三錢、阿膠一錢、五味子二分、水煎服。二劑燥減、又二劑胎安、連服十劑、胎不再動矣。此方專添腎中之精、雖兼於治肺、然補肺無非補腎、故腎經不燥火不燶胎、安得而不寧靜乎。

用遏炎散

亦效

熟地一兩、玄參一錢、地骨皮一錢、麥冬各五錢、北五味子
甘草各一錢、貝母五分、炒棗仁五錢、水煎服

婦人有上吐下瀉、以致胎動下墜、痛疼難忍、急不可緩、人以爲脾胃之寒極也、誰知脾胃之虛極乎。夫脾胃氣虛、則胞胎無力、必

有崩墜之虞、况加之上吐下瀉、則脾胃愈虛、欲胞胎無恙得乎、然而胞胎雖疼痛、而猶不下者、蓋脾胃雖損、而腎氣尚固也、胞胎系於腎、而連於心、腎未損、則腎氣交於心、心氣通於胞胎、所以未至於胎墜也、且腎氣能固、則腎之氣必來生脾、心氣能通、則心之氣必來援胃、脾胃雖虛、而未絕、則胞胎雖動、而未落耳、治法可不急救其脾胃乎、然而脾胃將絕、止救脾胃、而土氣難生、更補助其心腎之火、則火能生土、尤易接續也、方用援土固胎湯、人參一兩、白朮二兩、肉桂二錢、山藥一兩、附子五分、炙甘草一錢、杜仲三錢、續斷三錢、枸杞子三錢、山茱萸一兩、菟絲子三錢、砂仁三粒、水煎服、一劑瀉止、二劑吐止、腹中疼痛、急迫無不盡止也、此方救脾胃之土十之八、救心腎之火十之二、救火輕於救土者、豈土欲絕、而火未絕乎、不知土崩、非重劑不能援、

火息雖小劑亦可助、熱藥多用、必有大燥之虞、不比溫補之品可以多用、况懷姪胎動、原係土衰、非係火衰也、何必用大熱之劑、過於助土、以傷胎氣哉、

用脾胃兩安

湯亦效

白朮五錢、白茯苓人參各三錢、陳皮五分、

砂仁一粒、山藥一兩、薏仁五錢、水煎服

婦人有懷抱憂鬱、以致胎動不安、兩脅悶痛、如子上懸、人以為子懸之病、誰知是肝氣之不通乎、夫養胎半係腎水、然非肝血相助、則腎水亦必有獨力難支之勢、使肝經不鬱、則肝氣不閉、而肝血亦舒、自然灌注於胞胎、以助腎水之不足、今肝因憂鬱、則肝且閉塞不通、子無血蔭、安得不上升、以覓食乎、此子懸之所必至、乃氣使之升、非子之欲自懸也、治法不必治子懸以瀉子、但閑肝氣之鬱結、補肝血之燥乾、則子懸自定、方用解懸湯、白

芍一兩、當歸一兩、炒梔子三錢、枳壳五分、砂仁三粒、白朮五錢、人參一錢、茯苓三錢、薄荷二錢、水煎服。一劑悶痛除，二劑子懸定，三劑全安。去梔子，多服數劑尤妙。此方乃平肝解鬱之聖藥，鬱開而肝不去，尅土，肝平而水不去，生火。況方中又有健脾生胃之藥，自然水穀生精，四布各藏。肝腎有潤澤之機，胞胎自無乾澀之患。何至嬰兒之上懸哉。

用通肝散

亦佳

白芍一兩、歸身川芎、茯苓各三錢、鬱金、薄荷各一錢、香附神曲各二錢、陳皮三分、蘇葉五分、白朮五錢、水

煎

服

婦人有跌閃，失足以致傷損。胎元因而疼痛，人以爲外傷之故也。誰知仍是內傷之故乎？凡人跌撲閃挫，亦能動胎。若作跌閃，外治未能奏功，且有因治反墮者。必須大補氣血，少加行動之味。

則瘀血自散，胎又得安然。補血宜多，補氣宜少。方用救損湯治之。歸身五錢、白芍三錢、白朮五錢、人參一錢、生地一兩、甘草一錢、蘇木三錢、乳香末一錢、沒藥末一錢、水酒煎服。一劑疼痛止，二劑胎不墮矣。不必三劑。此方既能夠去瘀，又不傷胎。蓋補血補氣，復無停滯之憂。更少通滑之害。治無胎之跌閃，可建奇功。治有胎之跌閃，尤有殊績者也。

亦可用救傷

散治之

歸身熟地各一兩、白朮白芍生地杜仲各五錢、甘草一錢、丹皮二錢、水煎服

婦人有胎雖不動，腹亦不疼，然時常有血流出，人以爲血虛胎漏也。誰知氣虛不能攝血乎？夫血能蔭胎，胎中之血必藉氣以包之。氣虛下陷，血乃隨氣亦陷矣。夫氣虛則血必旺，血旺則血必熱，血寒則靜，血熱則動，動則必有躍躍欲出之兆。况加氣虛，安

得不漏泄乎、猶幸其氣之虛也、倘氣旺血熱則血必大崩、不止
些些之漏出矣、治法補氣之不足、瀉火之有餘、則血不必止而
自止、方用助氣補漏湯、人參一兩、甘草一錢、白芍五錢、黃芩三
錢、生地三錢、益母草一錢、續斷一錢、水煎服、一劑血止、再劑不
再漏也、此方用人參以補陽氣、用黃芩以漏陰火、火瀉則血不
熱、無欲動之機、氣補則血能包、無可漏之竅、自然氣攝血、而血
歸經、寧有漏洩之患哉、

用攝血丹
亦效

黃芪白朮各五錢、人參二錢、甘草荆芥破
故紙各一錢、續斷二錢、白果一枚、水煎服

婦人有懷姪、至七八月、忽然見啼腹中、腹亦隱隱作痛、人以爲胎
熱之故也、誰知氣虛之故乎、夫兒在胎中、母呼亦呼、母吸亦吸、
未嘗有一刻之間斷也、然嬰兒至七八月、母之氣必虛、兒不能

隨母之氣以呼吸、則子失母氣而作啼矣、腹中聲啼、似乎可異、
其實不必異也、治法大補其氣、使母之氣能哺於子、則子之氣
既安、而子之啼亦息、方用止啼湯、人參一兩、黃芪二兩、當歸五
錢、麥冬一兩、橘紅五分、甘草一錢、天花粉一錢、水煎服、一服即
止啼、一服斷不再啼也、此方用參芪歸冬、以補肺氣、以肺主氣
也、肺氣旺、而胞胎之氣不弱、胞中之子自安矣、所以三劑而
奏功耳、

用接氣飲
亦效

人參白朮黃芪麥冬各五錢、茯苓三錢、當歸三錢、貝
母神曲各一錢、炮薑五分、水煎服、一劑卽止啼、四劑

不發

婦人有口渴出汗、大飲涼水、煩燥發狂、腹痛腰疼、以致胎動欲墮、
此乃胃火熾炎、熬乾胞胎之水故耳、夫胃爲水穀之海、多氣多

血以養各藏府者也。萬物皆生於土、土氣厚而物生、因土中有火也、然則火在胃中、宜乎生土、何以火盛、反致太乾以害土乎、不知無火難以生土、而火又能燶水也、土中有火、則土不死、土中無水、則爲焦土、使胃火過旺、必致先燶腎水、而土中燥裂、何以分潤於胞胎哉、土燶之極、火勢炎蒸、犯心而神越、以致嬰兒逼迫、安得不下墮乎、治法必須急瀉其火、濟之以水、水旺而火自衰、火衰而胎自定也、方用止楚定胎飲、玄參三錢、甘菊三錢、青蒿五錢、茯苓二錢、生地二兩、知母二錢、白朮五錢、人參三錢、天花粉二錢、水煎服、一劑狂少平、二劑狂大定、三劑火盡解胎亦安也、不必四劑、此方藥料頗大、恐有不勝之憂、第懷妊而火盛若此、非用大劑之藥、火不肯息、狂不肯止、而胎不肯寧也、然而藥料雖多、均是補水之味、亦正有益無損、不必顧忌耳、

用滋胎飲

亦效

麥冬二兩、黃芩三錢、生地一兩、天花

粉二錢、甘草一錢、水煎服、一劑狂定、四劑愈

婦人懷子在身、痰多吐涎、偶遇鬼祟、忽然腹痛、胎向上頂、人以爲子懸之病也、誰知亦有中惡、而胎不寧乎、凡不止之氣、最能傷胎、蓋陰邪陽祟、多在神宇、潛踪幽陰岩洞、實其往來之所、觸之最易相犯、故孕婦不可不戒也、治法似宜治痰爲主、然而治痰必至耗氣之虛、則痰雖消化、胎必動搖、必須補氣以生血、補血以活痰、少加消痰之味、則氣血不虧、痰又易化、方用消惡安胎湯、白朮五錢、甘草一錢、白芍一兩、陳皮五分、蘇葉一錢、沈香末一錢、乳香末一錢、天花粉三錢、當歸一兩、人參三錢、茯苓五錢、水煎調服、一劑腹痛定、鬼神亦遠矣、此方大補氣血、惟圖顧本正足而邪自消、痰清而胎自定也、

用散惡護胎丹亦效

人參三錢、茯苓五錢、白术五錢、半夏一錢、貝母一錢、甘草一錢、白薇一錢、管仲三錢、木煎服一服、胎安。

婦人懷姪之後、未至成形、或已成形、其胎必墮、而性又甚急、時多怒氣、人以爲氣血之衰、不能固胎、誰知肝火之盛、常動而不靜乎、蓋木中實有相火也、相火宜靜、不宜動、靜則安、動則熾、然而木中之火、又最易動而難靜、况加大怒、則火更動、而不可止遏、火勢飛揚、不能生氣化胎、反致食氣傷精、自然難蔭而易墮、治法必須平其肝中之火、大利其腰臍之氣、使氣生血、而血清其火也、方用利氣瀉火湯、白术十兩、當歸二錢、甘草一錢、黃芩二錢、人參三錢、白芍五錢、熟地五錢、芡實三錢、水煎服、服一月、胎不墮矣、此方名爲利氣、其實乃補氣也、補氣而不加之瀉火之藥、則氣旺而火不能平、轉害夫氣矣、加黃芩於補氣之中、益以

熟地歸芍之滋肝、則血不燥、而氣益和、氣血既和、不必利氣、而無不利矣、况白术最利腃臍者哉、

用息怒養姪

湯亦佳

白芍二兩、茯苓五錢、人參三錢、陳皮五分、甘草一錢、熟地一兩、生地五錢、白术五錢、神曲一錢、木煎服

小產門

婦人因行房顛狂遂至小產、血崩不止、人以爲火動之極也、誰知是氣脫之故乎、凡懷孕婦人、惟藉腎水蔭胎、水原不足、水不足而火易沸、加之久戰不已、則火必大動、若至顛狂、則精必大泄、腎水益乾、腎火愈熾、水火兩病、胎何能固、胎墮而火猶未息、故血隨火崩、有不可止之勢、治法自當以止血爲主、然而火動、由於水虧、血崩本於氣脫、不急固其氣、則氣散不能速回、血將何生、不大補其精、則精涸不能遠長、火且益熾、方用固氣填精湯治之人、參一兩、熟地一兩、白朮五錢、當歸五錢、黃芪一兩、炒黑荆芥二錢、三七根末三錢、水煎調服、一劑血止、再劑身安、四劑全愈、此方全不清火、惟補氣補精、救其匱乏、奏功獨神者、以諸藥甘溫、能除大熱也、蓋此熱乃虛熱、非實熱耳、實熱可以寒折

虛熱必須溫補、故補氣自能攝血補精、自能止血也。

用固氣止脫

湯亦效

人參熟地山茱萸各一兩、白朮麥冬各五錢、甘草一錢、丹皮三錢、水煎服

婦人因跌撲閃損、遂至小產、血流紫塊、昏暈欲絕、人以爲瘀血之作祟也、誰知是血室傷損乎、夫婦人血室、與胞胎相連、胞胎損而血室亦損、然傷胞胎而流血者、其傷淺、傷血室而流血者、其傷深矣、傷淺者、漏在腹、傷深者、暈在心、同一跌閃之傷也、未小產與已小產治各不同、未小產而胎不安者、宜顧其胎、不可輕去其血、已小產而血大崩者、宜散其血、不可重傷其氣、蓋胎已墮矣、血既盡脫、則血室空虛、惟氣存耳、倘又傷其氣、保無氣脫之憂乎、故必須補氣以生血、新血生而瘀血可止也、方用理氣止瘀湯、人參一兩、黃芪一兩、當歸五錢、紅花一錢、丹皮三錢、炒

黑乾姜五分、茯苓三錢、水煎服、一劑瘀血止、二劑昏暈除、三劑全安、此方用人參黃芪以補氣、氣旺而血可攝也、用當歸丹皮以補血、血生而瘀難留也、用紅花黑姜以活血、血活而暈可除也、用茯苓以利水、水流而血易歸經也、

用加味補血

湯亦神

黃芪二兩、當歸人參各一兩、丹皮三錢、荆芥三錢、益母草三錢、水煎服

婦人懷娠、口渴煩躁、舌上生瘡、兩脣腫裂、大便乾結至數日不通、以致腹痛小產、人以爲大腸之火也、誰知是血熱爍胎乎、夫血所以養胎者也、然血溫則胎受其利、血熱則胎受其損、兒在胞中、不啻如探湯之苦、如何存活、自然外越下奔、以避炎氛之逼耳、夫血乃陰水所化、血日蔭胎、則取給甚急、陰水不能速生、以變血、則陰虛火動、陰中無非火氣、則血中亦無非火氣矣、兩火

相合、焚逼兒胎、此胎之所以下墮也、治法清胞中之火、補腎中之精始可矣、蓋胎中純是火氣、此火乃虛火、非實火也、實火可瀉、虛火宜於補中清之、倘一味用寒涼之藥、以降其火、全不顧胎之虛實、勢必寒氣逼入胃中、生氣蕭索、何以化精微、以生陰水乎、不變爲癆瘍者幾希矣、方用四物湯、加減治之、熟地五錢、白芍三錢、川芎一錢、當歸一兩、山茱萸二錢、山藥三錢、梔子一錢、丹皮二錢、水煎服、連服四劑、餘血淨、而腹痛全消。

用生地飲
亦神

生地二兩、於未小產前救之、若已小產、此方亦可用、或減半用之、尤爲萬安也。

○ 娠婦有畏寒腹痛、因而落胎者、人以爲下部太寒也、誰知氣虛而又加寒犯、遂至不能攝胎而下墮乎、夫人生於火、亦養於火、然火非氣不充、氣旺而後火旺、氣衰則火不能旺矣、人之坐胎者、

受父母先天之火也、先天之火、卽先天之氣成之、故胎成於氣、亦攝於氣、氣旺則胎牢、氣衰則胎弱、胎日加長、氣日加衰、安得不墮哉、況遇寒氣之外侵、則內之火氣更微、當其腹痛時、卽用人參乾姜之藥、則痛止胎安、無如人之不敢用也、因致墮胎、僅存幾微之氣、不急救其氣、用何法以救之乎、方用黃芪補血湯、黃芪二兩、當歸一兩、肉桂五分、水煎服、一劑而血止、三劑而氣旺、庶不致有垂絕之憂也、倘認定是寒、大用辛熱之品、全不補其氣血、則過於燥熱、必至亡陽、又爲可危耳、

用加味參木

人參一兩、白朮五錢、甘草一錢、

肉桂一錢、白僵豆三錢、水煎服

○ 妊婦有大怒之後、忽然腹痛、因而墮胎、及胎墮之後、仍然腹痛者、人以爲肝經之餘火未退也、誰知血不歸經而痛乎、夫肝藏血、

大怒則血不能藏、宜失血而不宜墮胎、胡爲血失而胎亦墮乎、不知肝性最急、血門不閉、其血直搘於胞胎、而胞胎之系、通於心腎之間、肝血來衝、心腎路斷、而胎氣一時遂絕、此胎之所以墮也、胎既墮、而血猶未盡、故餘痛無已也、治法引其肝血、仍入於肝中、而腹痛自止、然而徒引肝血、不平其肝木之氣、則氣逆不易轉、卽血逆不易歸也、方用引氣歸血湯、白芍五錢、當歸五錢、炒黑荆芥三錢、白朮三錢、丹皮三錢、炒黑乾姜五分、香附五分、鬱金一錢、甘草一錢、麥冬三錢、水煎服、此方名爲引氣、其實仍皆引血也、氣血兩歸、腹猶作痛、余不信也。

用歸經佛手

當歸一兩、川芎、白朮各五錢、荆芥三錢、炒黑乾姜一錢、甘草一錢、人參三錢、熟地一兩、水煎服

鬼胎門

婦人有懷姪、終年不產、面色黃瘦、腹如斗大、肌膚消削、常至二三年未生者、此鬼胎也、或入神廟山林、起交感之念、皆能召祟成胎、幸其人不至淫蕩、見祟驚惶、遇合愧恧、則鬼祟不能久戀、一交構而去、然而淫氣妖氛、已結於腹、遂成鬼胎、其先人尙未覺、迨後漸漸腹大、蓋人身之氣血不行、內外相包、一如懷胎之兆、有似血臌之形、其實非胎非臌也、治法必用逐穢之藥爲主、但人至懷胎數年、卽非鬼胎、其氣血必衰、况非真姪、則邪氣甚旺、正不敵邪、虛弱可知、烏可以迅利之藥、竟用祛蕩乎、自必從補、中逐之爲得、方用蕩鬼湯、雷丸三錢、大黃二兩、紅花三錢、枳壳一錢、厚朴一錢、桃仁二十粒、當歸一兩、人參一兩、牛膝三錢、丹皮三錢、水煎服、一劑腹必大鳴、瀉出惡物半桶、再服一煎、又瀉

惡物而愈、斷不可用三劑也。此方用雷丸以祛穢、又得大黃之掃除、佐之紅花厚朴等藥、皆善行善攻之品、亦何邪能留於腹中、自然盡情逐下、然用參歸以補氣血、則邪去而正又不傷、否則單用雷丸大黃、以迅下之、必有血崩氣脫之害矣。倘或自知鬼胎、如室女寡婦之人、一旦成形、雖邪氣甚盛、而真氣未漓、可用岐天師新傳紅黃霹靂散、紅花半斤、大黃五錢、雷丸二錢、水煎服、亦能下胎、然未免過傷血氣、不若蕩鬼湯有益無損之更佳也、亦在人斟酌、而善用之耳。

用追祟丹
亦神效

大黃五錢枳實三錢、丹皮一兩、紅花半斤附子二錢、當歸尾一兩、人參五錢、牛膝五錢、麝香一錢、鱉甲一兩、半夏三錢、南星三錢、桃仁十四粒、水煎服二劑而胎破矣、不須二劑、瀉出惡物之後、單用當歸三兩、紅花一兩、水煎服、自然敗血淨而新血生也、連用四劑、自慶安然。

難產門

婦人腹痛數日、不能生產、人以爲氣虛力弱、不能送子出產門也。誰知血虛膠滯、胎中無血、兒不易轉身乎。夫胎之成、由於腎之精、而胎之養、半資於五臟六腑之血、故血旺者子易生、血衰者子難產、所以臨產之前、必須補血、雖血難驟生、補氣正所以生血也、然徒補其氣、不兼補其血、則陽過於旺、而陰反不足、偏勝之害、恐有升而不降之虞、故又宜氣血之兼補、氣能推送、而血又足以濟之、則汪洋易於轉頭、何至有膠滯之憂哉。方用送子丹、治之、黃芪一兩、當歸一兩、川芎三錢、熟地五錢、麥冬一兩、水煎服、二劑子生、且無橫生倒養之病。此方補氣補血之藥也、二者相較、補血重於補氣、補氣止有黃芪、其餘無非補血之品、無論氣血兩平、陰陽交泰、易於生產、而血旺於氣、則胞胎之內、無

非血也、譬如舟遇水淺之區、雖用盡人功、終難推動、忽得春水行又遇順風之送、有不揚帆而迅走者乎、血猶泛濫、則舟能自水也、氣猶風也、無水則風雖順、何益哉、故補氣必須補血耳、

用麥冬升麻

湯亦效

麥冬四兩升麻二錢水煎服、
而兒身卽轉易於速下也、

婦人有兒已到門、竟不能產此危急存亡之時、人以爲胞胎先破水不能推送之、故誰知交骨不開乎、蓋產門之上原有骨一塊、兩相鬪合、未產之前、其骨自合、將產之際、其骨自開、故交骨爲兒門之關、亦爲婦人陰門之鍵、然其能開能合者、氣血主之也、無血而兒門自閉、無氣而兒門不開、欲兒門之開闔、必須交骨順滑、自非大補氣血不可、然而閉之甚易、開之甚難、其不開者、因產前之貪色也、過於泄精、則氣血大虧、交骨粘滯、而不易開、

○故開交骨、必須於補氣補血之中、用開交骨之藥、兩相合治、不必推、生子自迅下、方用降子散、當歸一兩、人參五錢、川芎五錢、紅花一錢、牛膝三錢、柞木枝一兩、水煎服、一劑兒門一聲响亮、骨如解散、子乃直降矣、此方用人參補氣、用歸芎補血、用紅花活血、用牛膝下降、用柞木開闔、君臣佐使、同心協力、所以取效甚神、用開於補之內也、雖單服柞木、亦能骨開、但無補氣補血之藥、則開不易合、兒門不關、不無風入之憂、不若用此方、而能開能閉之爲妙也、至於兒未到門、萬不可先用柞木以開其門、然用降子散、亦正無礙、以其補氣補血耳、若單用柞木、必須俟兒頭到門、而後用之也、

用突門散

亦效

黃芪二兩、敗龜板一箇搗碎、牛膝川芎各五錢、附子三分、水煎服、一劑而兒門開、兒卽生矣、加當歸亦可、

加人參

更神

婦人生產、有脚先下者、有手先出者、人以爲橫生倒產、至危之病、誰知氣血甚衰之病乎、凡兒在胎中、兒身正坐、惟男向內坐、女向外坐、及至生時、則頭必旋轉而後生、此天地造化之奇、實非人力所能勉強、雖然先天與後天、未常不並行而不悖、天機之動、必得人力以濟之、人力者非產母用力之謂也、謂產母之氣血耳、氣血足而胎必順、氣血虧而胎多逆、蓋氣血既虧、則母身自弱、子在胎中、何能獨強、勢必子身怯弱、雖轉頭而往往無力、故破胞而出、此手足之所以先見、當是時急以針刺兒手足、則兒必驚縮而入、急用轉天湯救之、人參一兩、當歸二兩、川芎五錢、升麻四分、牛膝三錢、附子一分、水煎服、一劑而兒轉身矣、急服二劑、自然順生、此方用人參歸芎、以補氣血之虧、人盡知其

義、乃用升麻、又用牛膝附子、恐人未識其妙、蓋兒已身斜、非用提挈、則頭不易轉、然旣轉其頭、非用下行、則身不速降、二者並用非加附子、則不能無經不達、使氣血之迅達推生也、

用轉氣催生

人參二兩、川芎五錢、當歸黃芪龜膏各一兩、升麻
旋覆花各一錢、水煎服一劑、兒卽轉身而生矣

婦人有生產、三四日、子已到門、交骨不開、子死而母未亡者、服開交骨之藥不驗、必有死亡之危、今幸不死者、正因其子之死、則胎胞已墮、子母離開、子死而母氣已收、未至同子氣之俱絕也、治法但救其母、不必顧其子矣、然死子在門、塞住其口、亦危道也、仍宜用補血補氣、使氣血兩旺、死子可出矣、倘徒用祛除降墮之劑、以下其子、則子未必下、母先脫矣、方用救母丹、當歸二兩、川芎一兩、人參一兩、荆芥三錢、益母草一兩、赤石脂末一錢、

水煎服、一劑子下此方用芎歸以補血、用人參以補氣、氣血既旺、上能升、而下能降、氣能推、而血能送、安得有阻滯之憂乎、况益母草善下死胎、赤石脂復易化瘀血、自然一湧而齊出耳。

用牛膝益母

湯亦效

牛膝三兩、益母草一兩、水煎服、一劑而死子立下矣。
後用人參當歸各一兩、川芎五錢、肉桂一錢、服之保

無變
生也

婦人生產六七日、胞水已破、子不見下、人以爲難產之故也、誰知其子已死於腹中乎、兒在門邊、未死者、兒頭必能伸能縮、已死者必安然不動也、若係未死、少拔其髮、兒必退入矣、若只子死腹中者、產母之面必無黑氣、母不死也、若產母有黑氣現面、兼脣黑舌黑者、子母兩死、旣知兒死於腹中、而母不死、不能用藥以降之、亦危道也、雖然生產至七日、若用霸道之藥、其氣血困

乏、子下而母且立亡、必須仍補其母、補母而子可自出矣、方用療兒散、人參一兩、當歸二兩、川芎一兩、牛膝五錢、鬼臼三錢、乳香末二錢、水煎服、一劑而死兒下矣、凡兒生必轉其頭、原因氣血之虛、致兒頭之難轉、世人往往用催生之藥、耗兒氣血、則兒不能通達、反致閉悶而死、此等之死、實醫殺之也、所以難產之病、斷不可輕用催生之藥、一味補氣補血、全活嬰兒之命、正無窮也、此方救兒死之母、仍用大補氣血、所以救其本也、誰知救本、正所以催生哉、

用參芪救母

湯亦神效

人參黃芪各一兩、當歸二兩、升麻五分、龜板一
箇、母丁香三枚、水煎服、一劑而死子下生矣、

婦人產數日、而胎不下、服催生藥、皆不效、前條曾言、交骨難開、不知又有氣結、而不行者、夫交骨不開、固是難產、然兒頭到門、不

能下者、乃交骨之不開也、自宜用開骨之劑、若兒未到門、而不能產者、非交骨不開之故也、若開其交骨、則兒門大開、兒頭不轉、必且變出非常、萬萬不可輕開兒門也、大約生產之時、切忌坐草太早、兒未轉頭、原難驟生、乃早於坐草、產婦見兒不下、未免心懷懼恐、恐則神怯、神怯則氣下而不升、氣既不升、則上焦閉塞、而氣乃逆矣、上氣既逆、上焦脹滿、氣益難行、氣阻於上下之間、不利氣而催生、則氣愈逆、而胎愈閉矣、治法但利其氣、不必催生、胎自下也、方用舒氣飲、人參一兩、紫蘇三錢、川芎五錢、當歸一兩、陳皮一錢、白芍五錢、牛膝三錢、柴胡八分、水煎服、葱白七寸、同煎一劑、逆轉兒卽下矣、此方利氣而實補氣也、氣逆由於氣虛、氣虛則易於恐懼、補其氣、恐懼自定、恐懼定、而氣逆者、不知其何以順也、况方中紫蘇、柴胡、白芍、牛膝之類、無非平肝

疏肺之品、佐人參芎歸、實有補利之益也、何必開交骨之多事哉、

亦可用歸朮降

胞湯治之

當歸二兩、白朮二兩、柴胡一錢、牛膝三錢、丹皮三錢、

紅花五錢、荆芥三錢、益母草五錢、水煎服、一劑卽產、

又不
傷胎、

血暈門

婦人甫產後、忽眼目昏暈、惡心欲吐、額上鼻尖有微汗、鼻出冷氣、神魂外越、人以爲惡血衝心之患也、誰知氣虛欲脫、而血暈乎、蓋新產之後、血已盡傾、血舍空虛、止存微氣、倘其人陽氣素虛、則氣怯原不能生血、及胎破、而心血隨胎而墮、則心無血養、所望者氣以固之也、今氣又虛脫、心君無護、所剩殘血、非正血、不可歸經、內庭變亂、反成血暈之症矣、治法必須大補氣血、不宜單治血暈也、補血以生新血、正活血以逐舊血也、然血乃有形之物、難以速生、氣乃無形之物、易於迅長、補氣以生血、不更易於補血、以生血乎、方用解暈湯、荆芥三錢、人參一兩、當歸一兩、炮薑一錢、黃芩一兩、水煎服、一劑暈止、二劑心定、三劑氣旺、四劑血生、不再暈也、此方實解血暈之聖方、凡產後能服此方、斷

無退母之症、或人參力不能用、減去大半、或少用一二錢、餘如分兩、多服數劑、無不奏功也。

用參歸荆芥

湯亦效甚

人參一兩、荆芥三錢、當歸一兩、水煎服

婦人子方下地、卽昏暈不語、此氣血雙脫也、本在不救、我受岐天師祕傳、以救萬世產亡之婦、當急用縫衣鍼、刺其眉心之穴、得血出卽出語矣、然後以獨參湯、人參一兩、急煎灌之、無不生者、倘貧家之婦、無力買參、用當歸補血湯、黃芪二兩、當歸一兩、煎湯一碗灌之、亦生、萬不可於二方之中、輕加附子、蓋附子無經不達、反引氣血之藥、走而不守、不能專注於胞胎、不若人參歸芪、直救其氣血之絕聚而不散也、蓋產婦昏暈、全是血舍空虛、無血養心、以致血暈、舌爲心之苗、心旣無主、舌又安能出聲、眉而刺急緩、則難以救絕、急則易於回生耳、

心者上通於腦、而下通舌、系則連於心、刺眉心、則腦與舌俱通、心中清氣上升、則瘀血自然下降、然後以參芪當歸補之、則氣血接續、何能死亡乎、雖單用參芪當歸、亦能生者、然終是刺眉心、則萬無一失、瘀血冲心、所以昏暈不語、解其瘀血之冲、真所謂扼要爭奇也、世人但知炙眉之法、誰知刺勝於炙乎、蓋炙緩、而刺急緩、則難以救絕、急則易於回生耳、

亦可用參附益

母湯治之

人參一兩、附子一錢、益母草二錢、水煎服、此等症、急用一人抱住產母、頭頂心解開、以艾火灸之必然

出聲然後以參附益

母湯救之、多有生者、

婦人有產後三日、發熱惡露不行、敗血攻心、狂言呼叫、甚欲奔走、擎捉不定、人以爲邪熱之在胃也、誰知血虛而心無以養乎、產後之血、盡隨胎胞外越、則血室空虛、五臟皆無血養、當是之時、

止心中之血尙存、些微以護心也、而各臟腑皆欲取給於心、心包爲心君之相、攔絕各臟腑之氣、不許入心、故心安神定、是護心者全藉心包也、然心包亦虛、倘不能障心、各臟腑之氣遂直入心中、以分取心血、而心包情極、既不能顧心、又不能禦衆、於是大聲疾呼、本欲召臟腑以救心、而迹反近於狂悖、有無可如何之象、故病似熱而非實熱也、治法大補其心中之血、使各臟腑分取之、以自養、不必再求於心君、則心安而心包亦安、方用安心湯、乾荷葉一片、生地黃五錢、丹皮五錢、當歸二兩、川芎一兩、生蒲黃二錢、水煎調服、一劑卽定、而惡露亦下矣、此方用歸芎以補血、何又用生地丹皮之涼血、似非產後所宜、不知惡血奔心、未免因虛熱而相犯、吾於補中涼之、則涼不爲害、況益之乾荷葉、則七竅相通、能引邪外出、不內害於心、轉生蒲黃以分

解惡露也、但此方止可暫用、一劑以定狂、不可多用數劑以取勝、不可不慎也、

用參歸荆棗益

母湯亦效

人參當歸炒棗仁各一兩、荆芥益母草各三錢、水煎服

胞衣不下

○婦人兒已生地、而胞衣尚留於腹、三日不下、心煩意躁、時欲暈去、人以爲胞胎之蒂未斷也、誰知血少乾枯、黏連於腹乎、世見胞衣不下、心懷疑懼、恐其上衝於心、有死凶之兆、然胎衣何能沖於心也、但胞衣未下、則瘀血未免難行、有血暈之虞耳、治法仍大補氣血、使生血以送胎衣、則胎衣自然潤滑、生氣以助生血、則血生迅速、尤易推墮也、方用送胎湯、當歸二兩、川芎五錢、乳香末一錢、益母草一兩、沒藥末一錢、麝香半分、研荆芥三錢、水煎調服、立下、此方以當歸川芎、補其氣血、以荆芥引氣血歸經、用益母草乳香等藥、逐瘀下胎、新血既長、舊血難存、氣旺上升、瘀濁自然迅降、無留滯之苦也、蓋胞衣留腹、有回顧其母胎之心、往往有六七日、不下胞衣、竟不腐爛、正以其有生氣也、可見

胎衣在腹不能殺人、補之自降也。或謂胞衣旣有生氣、補氣補血、則胞衣宜益堅牢、何補之反降、不知子未下、補則益於子、子已下、補則益於母、益子而胞衣之氣連、益母而胞衣之氣脫、實有不同、故此補氣補血、乃補各經之氣血、以推送之、非補胞膽之氣血、是以補氣補血、而胎衣反降也。

用加味佛手

散殊效

當歸二兩川芎一兩益母草五錢乳香末
一錢敗龜板一具水煎服一劑卽下也

婦人子生五六日、胞衣留於腹中、百計治之、竟不肯下、然又絕無煩躁昏暈之狀、人以爲瘀血之黏連也、誰知氣虛不能推送乎、夫瘀血在腹、斷無不作祟之理、有則必然發暈、今安然無恙、是血已淨矣、血淨宜清氣升、而濁氣降、今胞胎不下、是清氣下陷難升、遂至濁氣上浮難降、然濁氣上升、必有煩躁之病、今反安

然者、是清濁之氣兩不能升也、然則補其氣不無濁氣之上升乎、不知清升而濁降者、一定之理也、苟能於補氣之中、仍分其清濁之氣、則升清正所以降濁矣、方用補中益氣湯、人參三錢、黃芪一兩、當歸五錢、升麻三分、柴胡三分、陳皮一分、甘草一分、白朮五錢、加蘿蔔子五分、水煎服、一劑胎衣自下、夫補中益氣湯、補氣之藥、卽提氣之藥也、並非推送之劑、何能下胎衣、如此之速、不知濁氣之下陷者、由於清氣之不升也、提其氣則清氣升、而濁氣自降、腹中所存之物、無不盡降、正不必又去推送之也、况方中又加蘿蔔子數分、能分理清濁、不致兩相扞格、此奏功之所以神耳、

用加味補血

湯亦神效

黃芪二兩、當歸一兩、升麻五分、
益母草三錢、水煎服、一劑卽下

○ 產後諸病門

婦人產後、小腹疼痛甚、則結成一塊、手按之益痛、此名兒枕痛也。夫兒枕者、前人謂兒枕頭之物也、兒枕之不痛、豈兒生不枕而反痛乎、是非兒枕可知、既非兒枕何故作痛、乃瘀血成團、未散之故也、此等之痛、多是健旺之婦、血之有餘、非血之不足、似可用破血之藥、然血活則瘀血自除、血結則瘀血作祟、不補血而敗血、雖瘀血可消、畢竟耗損血氣、不若於補血中、行其逐穢之法、則瘀血既去、氣血又復不傷、方用散結安枕湯、當歸一兩、川芎五錢、山楂十粒、丹皮二錢、荆芥二錢、益母草三錢、桃仁七箇、乳香一錢、水煎調服、一劑痛即止、不必再劑、此方逐瘀於補血之中、消塊於生血之內、不專攻痛、而其痛自止、人一見兒枕之痛、動以延胡蘇木蒲黃五靈脂之類、以化塊、何足論哉。

用歸荆安枕

湯亦神

當歸五錢、丹皮一錢、荆芥三錢、
山楂十粒、水煎服、一劑即止痛。

○產後小腹痛、按之即止、人亦以爲兒枕之痛也、誰知血虛之故乎、產後亡血過多、則血舍空虛、原能腹痛、但痛實不同、如燥糠觸體光景、此乃虛痛、非實痛也、凡虛痛宜補、而產後之虛痛、尤宜補、惟是血虛之病、必須用補血之劑、而補血之味、大約潤滑居多、恐與大腸不無相礙、然而產後則腸中乾燥、潤滑正相宜也、故補血不特腹中甚安、腸中亦甚便耳、方用腹寧湯、當歸一兩、續斷二錢、阿膠三錢、人參三錢、麥冬三錢、炙甘草一錢、山藥三錢、熟地一兩、肉桂二分、水煎服、一劑痛輕、二劑痛止、多服更美、此方補氣補血之藥也、然補氣無太甚之憂、補血無太滯之害、氣血既生、不必止痛而痛自止矣。

用術歸桂草

湯亦神

白术當歸各五錢、肉桂五分、
炙甘草一錢、水煎服、二劑愈

產後氣喘、最是危症、苟不急治、立刻死亡、人以爲氣血之兩虛也、誰知氣血之兩脫乎、夫氣血既脫、人將立死、何故又能作喘、此血已脫而氣猶未脫也、血脫欲留、而氣又不能留血之脫、故氣反上喘、但其症雖危、而可救處、正在於作喘、肺主氣也、喘則肺氣若盛、而不知是肺氣之衰、當是時血雖驟生、止存些微之氣、望肺之相救甚急、肺因血失、氣實無力、難以提挈、則氣安保不遽脫乎、是救氣必須提氣、而提氣必須補氣、方用救脫活母丹、人參二兩、肉桂一錢、當歸一兩、麥冬一兩、山茱萸五錢、熟地一兩、枸杞子五錢、阿膠三錢、荆芥炒黑三錢、水煎服、一劑喘輕、二劑喘又輕、三劑喘平、四劑全愈、此方用人參以接續元陽、然徒

補其氣不補其血、則血燥而陽旺、雖回陽於一時、而不能制陽、則水實不固、陽將安續乎、所以又用熟地茱萸枸杞以補其肝腎之精、後益其肺氣、則肺氣健旺、升提有力也、又慮新產之後、用補陰之藥、膩滯不行、加入肉桂、以補其命門之火、非惟火氣有根、易助人參以生氣、且能運化地黃之類、以化精微也、然過於助陽、萬一血隨陽動、瘀血上行、亦非萬全之計、更加荆芥、引血歸經、則肺氣更安、喘尤速定也、

用蛤蚧救喘

丹亦佳

人參二兩、熟地二兩、麥冬三錢、肉桂一錢、煎子一錢、

蛤蚧二錢、半夏三分、水煎服、三劑、喘定、十劑全

婦產後惡寒惡心、身顫發熱、作渴、人以為產後傷寒也、誰知氣血兩虛、正不敵邪之故乎、凡人正氣不虛、則邪斷難入、若正氣已

○
虛原不必戶外之風襲體、卽一舉一動風、卽乘虛而入矣、雖然產婦風入易、而風出亦易、凡有外邪、俱不必祛風、况產婦惡寒者、寒由內生、非由外進也、發熱者、熱因內虛、非由外實也、治其內寒、而外寒自散、治其內熱、而外熱自解矣、方用十全大補湯、人參三錢、黃芪一兩、白朮五錢、茯苓三錢、甘草一錢、熟地五錢、白芍二錢、川芎一錢、當歸三錢、肉桂一錢、水煎服、二劑、寒熱解、身涼矣、此方但補其氣血之虛、絕不去散風邪之實、正以正氣既足、邪氣自除、况原無邪氣乎、所以治之奏功也、

用正氣湯

人參當歸各一兩、肉桂炮姜各一錢、

白朮五錢、甘草五分、水煎服、二劑愈

一產後惡心欲嘔、時而作吐、人以為胃氣之寒也、誰知腎氣之冷乎、夫胃爲腎之關、胃氣寒、則胃不能行於腎中、腎氣寒、則胃亦

不能行於腎內、是胃與腎原不可分爲兩治也、惟是產後失血、腎水自涸、宜腎火之炎上、不宜胃有寒冷之虞、何腎寒而胃亦寒乎、蓋新產之餘、其水遽然涸去、其火尙不能生、而寒象自現、治法當補其腎中之火矣、然腎火無水以相濟、則火過於熱、未必不致陰虛火動之虞、必須於火中補火、腎中溫胃、而後腎無太熱之病、胃有旣濟之歡也、方用溫胃止嘔湯、人參三錢、橘紅五分、白豆蔻一粒、巴戟天一兩、白朮一兩、茯苓二錢、炮薑一錢、熟地五錢、山茱萸五錢、水煎服、一劑吐止、二劑不再吐也、四劑全愈、此方治胃之藥多於治腎、然治腎仍是治胃、所以胃氣升騰、寒氣盡散、不必用大熱之味、以溫胃而祛寒也、

用全母湯

亦神

白朮人參熟地各一兩、肉桂二錢、炮薑五分、

丁香五分、山茱萸五錢、水煎服、一劑即止嘔吐

○
產後腸下者、亦危症也、人以爲兒門不關之故、誰知氣虛下陷、而不收乎、夫氣虛下陷、宜用升提之藥、以提氣矣、然而新產之婦、恐有瘀血在腹、若提氣併瘀血亦隨之而上升、則衝心之症、又恐變出非常、是不可竟提其氣、補其氣則氣旺、而腸自升、惟是補氣之藥少、則氣衰力薄、難以上升、必須多用、則陽旺力大、而豈能終降耶、方用升腸飲、人參一兩、黃芪一兩、白朮五錢、當歸一兩、川芎三錢、升麻一分、水煎服、一劑而腸升矣、此方純乎補氣、絕不去升腸、卽加升麻之一分、但引氣而不引血、蓋升麻少用、則氣升、多用則血升也、

產後半月、血崩昏暈、目見鬼神、人以爲惡血冲心也、誰知不慎於房幃乎、夫產後半月、其氣血雖不比初產之一二日、然氣血新生、未能全復、卽血路已淨、而胞胎之傷損如故、斷不可輕易交

合以重傷其門戶、今血崩而至昏暈、且目見鬼神、是心腎兩傷、
不止、損壞胞胎門戶已也、明是既犯色戒、又加酣戰、以致大泄
其精、精泄而神亦脫矣、此等之症、多不可救、然於不可救之中、
思一急救之法、舍大補其氣、無別法也、方用救敗求生湯、人參
三兩、熟地一兩、當歸二兩、川芎五錢、白朮二兩、附子一錢、山茱
萸五錢、山藥五錢、棗仁五錢、水煎服、一劑神定、再劑必暈止、而
血亦止、否則不可救矣、倘一服見效、連服三劑減半、再服十劑、
可慶更生、此方補氣、回元陽於無何有之鄉、陽回而氣回矣、氣
回可以攝血以歸神、可以生精以續命、不必治暈、而暈除、不必
止崩、而崩斷也。

用救死丹治

之亦可

黃芪二兩、巴戟天一兩、附子一錢、白朮一兩、菟絲子

一兩、北五味一錢、水煎服、一劑神定、便有生機可再

服也否
則不救

婦人生產之時、因收生之婆手入產門、損傷尿胞、因致淋漓不止、
欲少忍、須臾而不能、人以爲胞破、不能再補也、夫破傷在皮膚
者、尚可完補、豈破傷在腹、獨不可治療乎、試思瘡瘍之毒、大有
缺陷、尙可服藥以長肉、况收生不謹、少有傷損、並無惡毒、何難
補其缺陷耶、方用完胞飲、人參一兩、白朮一兩、當歸一兩、川芎
五錢、桃仁十粒、黃芪五錢、茯苓三錢、紅花一錢、白芨末一錢、益
母草三錢、以猪羊胞先煎湯、後熬藥、饑服二十日、全愈、蓋生產
致收生之婆、以手探胞、其難產必矣、難產者、因氣血之虛也、因
虛而損、復因損而虛、不補其氣血、而脬破、何以重完乎、今大補
氣血、則精神驟長、氣血再造、少有損傷、何難完補、故旬日之內、
卽便成功耳。

用補胞散
亦神效

人參二兩、黃芪一兩、麥冬一兩、白朮四兩、穿山甲三片、陳土炒鬆研細末、象皮三錢、人身懷之研細末、龍骨醋淬煅研末、木煎藥汁一碗、空腹將三味調服、卽熟睡之愈久、愈效、不須三服、全愈真神方也。

婦有產子之後、四肢浮腫、寒熱往來、氣喘咳嗽、脅膈不利、口吐酸水、兩脇疼痛、人以爲敗血流入經絡、滲入四肢、以致氣逆也。誰知腎肝兩虛、陰不能入於陽乎。夫婦當產後、氣血大虧、自然腎火發於木、而腎火有黨、子母兩焚、將火燔直冲而上、金受火刑、力難制肝、而咳嗽喘滿之病生、肝火旣旺、必尅脾土、土衰不能制水、而浮腫之病出、然而肝火之旺、乃假旺非真旺也。假旺者氣若盛、而實衰、故時熱時寒、往來無定、非真熱真寒、是以氣逆於脅膈而不舒、兩脅者、尤肝之部位也、酸乃肝木之味、吐酸脅

痛、皆肝虛而腎不能榮之故也、治法補血養肝、更宜補其精、以生血、精足而血亦足、血足而氣自順矣、方用人參三錢、熟地一兩、山茱萸三錢、白芍五錢、當歸五錢、破故紙茯苓、芡實各三錢、山藥五錢、柴胡五分、白朮三錢、水煎服、方名轉氣湯、方中多是補精補血之品、何名爲轉氣耶、不知氣逆、由於氣虛、氣虛者腎肝之氣虛也、今補其賢肝之精血、卽所以補其腎肝之氣也、氣虛則逆氣旺、有不順者乎、是補氣卽轉氣也、氣轉而各症盡愈、陰入於陽、而陽無杆格之虞矣、

用歸氣救產
湯亦效

人參三錢、熟地五錢、白芍二錢、茯苓一錢、山藥五錢、白朮五錢、柴胡三分、砂仁一粒、水煎服

婦人產後、水道中出肉線一條、長三四尺、動之則痛欲絕、此帶脉之虛脫也、夫帶脈束於任督之脈、任前、而督後、兩脉有力、則帶

脉堅牢、兩脉無力、則帶脈崩墮、產後亡血過多、無血以養任督、而帶脈崩墮力難升舉、故隨溺而隨下也。帶脈下垂、每作痛於腰臍、況下墮而出於產門、其失於關楗也、更甚。安得不疼痛欲絕哉。治法大補其任督之氣、則帶脈自升矣。方用兩收丹、白朮二兩、人參一兩、川芎三錢、杜仲五錢、熟地二兩、山茱萸四錢、水煎服、一果十枚、篇豆五錢、杜仲五錢、巴戟天三錢、山藥一兩、芡實一兩、白朮收半、再劑全收。此方補任督、而仍補腰臍者、以任督之脉聯於腰臍、補任督而不補腰臍、則任督無力、而帶脈何以升舉哉。惟兼補之、任督得腰臍之助、則兩脉氣旺、何難收帶於頃刻乎。

用收帶湯

亦效

白朮杜仲人參各一兩、荆芥二錢、水煎

服一劑、卽收大半、二劑全收、亦不痛也

婦人產後、陰戶內一物垂下、其形如帕、或有角、或二岐、入以爲產

頽也、誰知肝癥之病乎、夫產後何以成肝癥也、蓋因產前勞役傷氣、又觸動惱怒、產後肝不藏血、血亡過多、故肝之脂膜隨血崩墮、其實非子宮也、若子宮下墮、狀如茹子、止到產門、不越出產門之外、肝之脂膜往往出產門者、至六七寸許、且有黏席乾落者、一片如掌大、使子宮墮落、人且立死矣、安得重生乎、治法大補其氣血、而少用升提之法、則脾氣旺而易升、肝血旺而易養、脂膜不收、而自收矣、方用收脂湯、黃芪一兩、人參五錢、白朮五錢、升麻一錢、當歸三錢、白芍五錢、水煎服、一劑卽收、或疑產婦禁用白芍、何以頻用奏功、嗟乎白芍原不可頻用也、然而病在肝者、不可不用、况用之於大補氣血之中、在芍藥亦忘其酸收矣、何能作祟乎、且脂膜下墮、正藉酸收之味、助升麻以提氣血、所以無過、而反能奏功效耳。

用歲蕤收陰

湯亦效

歲蕤二兩人參一兩白芍三錢當歸一
兩柴胡五分水煎服四劑愈十劑全愈

下乳門

婦人產後數日、絕無點滴之乳、人以爲乳管之閉也、誰知氣血之涸乎、夫無血不能生乳、而無氣亦不能生乳、乳者氣血所化也、然二者之中、血之化乳、又不若氣之化乳爲速、新產之後、血已大虧、生血不遑、何能生乳、全藉氣以行血、而成乳也、今數日乳不下、血誠少而氣尤微、世人不知補氣之妙、一味通乳、無氣則血從何生、無血則乳從何化、不幾向乞人而求食、問貧兒而索金耶、治法補其氣以生血、不可利其竅、而通乳也、方用通乳丹、人參一兩、當歸二兩、麥冬五錢、黃芪一兩、豬蹄二箇、木通三分、桔梗三分、水煎服、二劑而乳如泉流矣、此方但補氣血以生乳、正以乳生於氣血也、

用化乳丹

亦佳

當歸熟地黃各一兩麥冬三錢山茱萸四錢川甲一片免絲子五錢枸杞子三錢水煎服連用四劑卽多

卽多
乳矣

有壯婦生產後數日、或聞丈夫之嫌、或聽公姑之啐、遂至兩乳脹滿作痛、乳汁不通、人以爲陽明之火也、誰知肝氣之鬱結哉、夫陽明多氣多血之腑、乳汁之化原屬陽明、然而陽明屬土必得肝木之氣相通、則稼穡作甘、始成乳汁、未可全責之陽明也、壯婦產後、雖亡血過多、而氣實未衰、乳汁之化全在氣、而不盡在血也、今產數日、而兩乳脹滿、作痛、是欲化乳而不可得、明是有鬱而肝氣不揚、陽明之上氣亦因之同鬱、木土不相合、而相鬱、安得而化乳哉、治法大抒其肝木之氣、則陽明之氣血自通、不必通乳而乳自通也、方用通肝生乳湯、白芍五錢、當歸五錢、麥冬五錢、通草一錢、柴胡二錢、白朮五錢、甘草三分、熟地一兩、遠

志一錢、水煎服、一劑卽通、此方藥味太重、治產婦似乎不宜、不知健婦抱鬱、不妨權宜用之、若非少壯之女、雖因鬱少乳、不可全用、減半治之、亦不全失、又在臨症時裁酌之也、

用生汁湯
亦然

當歸二兩、川芎四錢、通草一錢、柴胡五分、麥冬四錢、白朮五錢、甘草三分、熟地一兩、水煎服、四劑必大通

