



門中印
第 202
卷 2 止



古方條理卷之下

熊壑愷玄碩 著

九折堂山田氏圖書之記

肥前之內藤有道正齋

門人 出雲 渡邊文教子敬 同校

豐後 市原謙 公光

上衝悸

下之後其氣上衝者可與桂枝湯

桂枝湯所之

燒鍼令其汗鍼處被寒核起而赤者必發奔豚氣從少腹上衝心者與桂枝加桂湯

桂枝加桂湯所之

若吐若下後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩脈沉緊發汗則動經身為振振搖者茯苓桂枝白朮甘草湯主之

茯苓桂枝白朮甘草湯所之

以上三方條理同

病如桂枝證頭不痛項不强脈微浮胸中痞鞅氣上衝咽喉不得息者當吐之宜瓜蒂散

瓜蒂散所之

二三日心中悸而煩者小建中湯主之

小建中湯所之

發汗過多其人叉手自冒心心下悸欲得按者桂枝

甘草湯主之

桂枝甘草湯所之

厥而心下悸者宜先治水當服茯苓甘草湯卻治其厥

茯苓甘草湯所之

發汗後其人臍下悸者欲作奔豚茯苓桂枝甘草大棗湯主之

茯苓桂枝甘草大棗湯所之

小建中湯以下四方條理同

發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞶動振振欲擗地者真武湯主之

真武湯所之

少氣短氣

發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊懣梔子豉湯主之若少氣者梔子甘艸豉湯主之

梔子甘艸豉湯所之

虛羸少氣氣逆欲吐者竹葉石膏湯主之

竹葉石膏湯所之

下利嘔逆表解者乃可攻之其人漦漦汗出發作有時頭痛心下痞鞭滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裏未和也十棗湯主之

十棗湯所之

脉浮而動數頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也醫反下之動數變遲膈內拒痛胃中空虛客氣動膈短氣躁煩心中懊懣陽氣內陷心下因鞭則為結胸大陷胸湯主之

大陷胸湯所之

脉遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有

潮熱者此外欲解可攻裏也手足澀然而汗出者此大便已鞅也大承氣湯主之

大承氣湯所之

骨節煩疼掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘艸附子湯主之

甘艸附子湯所之

不得眠起卧不安

下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯主之

猪苓湯所之

發汗後大汗出胃中乾煩燥不得眠欲得飲水者少少與飲之令胃氣和則愈

水所之

下之後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表證脉沉微身無大熱者乾薑附子湯主之

乾薑附子湯所之

發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊憹梔子豉湯主之

梔子豉湯所之

發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中
懊懣梔子豉湯主之若少氣者梔子甘艸豉湯主
之

梔子甘艸豉湯所之

發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中
懊懣梔子豉湯主之若少氣者梔子甘艸豉湯主
之若嘔者梔子生薑豉湯主之

梔子生薑豉湯所之

梔子豉湯以下三條條理同

脉浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂起卧不安者桂枝

去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯所之

下後心煩腹滿卧起不安者梔子厚朴湯主之

梔子厚朴湯所之

小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能卧者
有燥屎也宜大承氣湯

大承氣湯所之

驚狂

脉浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂起卧不安者桂枝

去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯所之

八九日下之胸滿煩驚小便不利譫語一身盡重不可轉側者柴胡加龍骨牡蠣湯主之

柴胡加龍骨牡蠣湯所之

以上二方條理同

熱結膀胱其人如狂血自下下者愈其外不解者尚未可攻當先解外外解已但小腹急結者乃可攻之宜桃核承氣湯

桃核承氣湯所之

六七日表證仍在脉微而沉反不結胸其人發狂者以熱在下焦少腹當鞭滿小便自利者下血乃愈抵當湯主之

身黃脉沉結少腹鞭小便不利者為無血也小便自利其人如狂者血證諦也抵當湯主之

抵當湯所之

以上三條條理同

身重

脉浮緩身不疼但重乍有輕時者大青龍湯發之

大青龍湯所之

八九日下之胸滿煩驚小便不利譫語一身盡重不可轉側者柴胡加龍骨牡蠣湯主之

柴胡加龍骨牡蠣湯所之

脉遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濇然而汗出者此大便已鞮也大承氣湯主之

大承氣湯所之

二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者此為有水氣真武湯主之

真武湯所之

小便自利不利

服桂枝湯或下之仍頭項強痛翁翁發熱無汗心下滿微痛小便不利者桂枝去桂加茯苓白朮湯主之

桂枝去桂加茯苓白朮湯所之

發汗遂漏不止其人惡風小便難四支微急難以屈伸者桂枝加附子湯主之

桂枝加附子湯所之

身體疼煩不能自轉側不嘔不渴脉浮虛而瀋者桂枝附子湯主之若其人大便鞭小便自利者去桂枝加白朮湯主之

桂枝附子去桂枝加白朮湯所之

骨節煩疼掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘艸附子湯主之

甘艸附子湯所之

二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者此為有水氣真武湯主之

水真武湯所之

嘔而脉弱小便復利身有微熱見厥者難治四逆湯主之

既吐且利小便復利而大汗出下利清穀內寒外熱脉微欲絕者四逆湯主之

四逆湯所之

以上六條條理同

二三日至四五日腹痛小便不利下利不止便膿血者桃花湯主之

桃花湯所之

五六日已發汗而復下之胸脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此爲未解也
柴胡桂枝乾薑湯主之

柴胡桂枝乾薑湯所之

八九日下之胸滿煩驚小便不利譫語一身盡重不可轉側者柴胡加龍骨牡蠣湯主之

柴胡加龍骨牡蠣湯所之

柴胡桂枝乾薑湯以下二條條理同

小便數者大便必鞫不更衣十日無所苦也渴欲飲水少少與之但以法救之

水所之

發汗後大汗出胃中乾煩燥不得眠欲得飲水者少少與飲之令胃氣和則愈若脉浮小便不利微熱消渴者與五苓散主之

本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴而口燥煩小便不利者五苓散主之

五苓散所之

脉浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若發汗則燥心憤憤反譫語若加燒鍼必怵惕煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣動

膈心中懊懣舌上胎者梔子豉湯主之若渴欲飲水口乾舌燥者白虎加人參湯主之若脉浮發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之

猪苓湯所之

五苓散以下三條條理同

若吐若下若發汗微煩小便數大便因鞭者與小承氣湯和之愈

小承氣湯所之

小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能卧者有燥屎也宜大承氣湯

大承氣湯所之

發熱汗出此為熱越不能發黃也但頭汗出身無汗劑頸而還小便不利渴引水漿者此為瘀熱在裏身必發黃茵陳湯主之

七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿者茵陳蒿湯主之

茵陳蒿湯所之

以上四條條理同

六七日表證仍在脉微而沉反不結胸其人發狂者以熱在下焦少腹當鞭滿小便自利者下血乃愈

抵當湯主之

身黃脉沉結少腹鞭小便不利者為無血也小便自利其人如狂者血證諦也抵當湯主之

抵當湯所之

有熱少腹滿應小便不利今反利者為有血也當下之不可餘藥宜抵當丸

抵當丸所之

以上三條條理同

大黃

瘀熱在裏身必發黃麻黃連軹赤小豆湯主之

麻黃連軹赤小豆湯所之

身黃發熱者梔子蘘皮湯主之

梔子蘘皮湯所之

發熱汗出此為熱越不能發黃也但頭汗出身無汗劑頸而還小便不利渴引水漿者此為瘀熱在裏身必發黃茵陳湯主之

七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿者茵陳蒿

湯主之

茵陳蒿湯所之

古方條理 卷之四 三

梔子蘗皮湯以下二方條理同

身黃脉沉結少腹鞭小便不利者為無血也小便自利其人如狂者血證諦也抵當湯主之

抵當湯所之

血

不大便六七日頭痛有熱者未可與承氣湯其小便清者知不在裏仍在表也當須發汗若頭痛者必

衄宜桂枝湯

桂枝湯所之

脉浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表證仍在此

當發其汗服藥已微除其人發煩目瞑劇者必衄

衄乃解麻黃湯主之

脉浮緊不發汗因致衄者麻黃湯主之

麻黃湯所之

熱結膀胱其人如狂血自下下者愈其外不解者尚

未可攻當先解外外解已但少腹急結者乃可攻

之宜桃核承氣湯

桃核承氣湯所之

下利膿血者桃花湯主之

古方條理 卷之四 三

二三日至四五日腹痛小便不利下利不止便膿血者桃花湯主之

桃花湯所之

煩

發汗解半日許復煩脉浮數者可更發汗宜桂枝湯主之

煩熱汗出則解又如瘧狀日晡所發熱脉實者宜下之脉浮虛者宜發汗下之與大承氣湯發汗宜桂枝湯

桂枝湯所之

二三日心中悸而煩者小建中湯主之

小建中湯所之

以上二方條理同

往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔者與

小柴胡湯主之

小柴胡湯所之

五六日已發汗而復下之胸脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此為未解也柴胡桂枝乾薑湯主之

柴胡桂枝乾薑湯所之

以上二條條理同

八九日下之胸滿煩驚小便不利譫語一身盡重不可轉側者柴胡加龍骨牡蠣湯主之

柴胡加龍骨牡蠣湯所之

火逆下之因燒鍼煩躁者桂枝甘艸龍骨牡蠣湯主之

桂枝甘艸龍骨牡蠣湯所之

以上二方條理同

十餘日反二三下之後四五日柴胡證仍在者先與

大小柴胡湯嘔不止心下急鬱鬱微煩者爲未解也

與大柴胡下之則愈

大柴胡湯所之

不吐不下心煩者可與調胃承氣湯

十餘日心下溫溫欲吐而胸中痛大便反溇腹微滿鬱鬱微煩先此時自極吐下者與調胃承氣湯

調胃承氣湯所之

若吐若下若發汗微煩小便數大便因鞭者與小承氣湯和之愈

二三日脉弱無柴胡證煩燥大便鞭至四五日雖能

食以小承氣湯少少與微和之令小安

小承氣湯所之

調胃承氣湯以下二方條理同

下之心中懊懣而煩胃中有燥屎者可攻腹微滿初頭鞭後必澹不可攻之若有燥屎者宜大承氣湯不大便五六日繞臍痛煩躁發作有時者此有燥屎故使不大便也宜大承氣湯

煩熱汗出則解又如瘧狀日晡所發熱脉實者宜下之脉浮虛者宜發汗下之與大承氣湯

大下後六七日不大便煩不解腹滿痛者此有燥屎

也宜大承氣湯

二三日脉弱無柴胡證煩燥大便鞭至四五日雖能食以小承氣湯少少與微和之令小安至六日與承氣湯一升若不大便六七日小便少者雖不能食但初頭鞭後必澹未定成鞭攻之必澹須小便利尿定鞭乃可攻之宜大承氣湯

大承氣湯所之

脉浮而動數頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也醫反下之動數變遲膈內拒痛胃中空虛客氣動膈短氣躁煩心中懊懣陽氣內陷心下因鞭

則爲結胸大陷胸湯主之

大陷胸湯所之

手足厥冷脉乍緊者邪結在胸中心中滿而煩饑不能食者病在胸中當須吐之宜瓜蒂散

瓜蒂散所之

發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中

懊懣梔子豉湯主之

發汗若下之而煩熱胸中窒者梔子豉湯主之

下利後更煩按之心下濡者爲虛煩也宜梔子豉湯

梔子豉湯所之

發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中

懊懣梔子豉湯主之若少氣者梔子甘艸豉湯主之

梔子甘艸豉湯所之

發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中
懊懣梔子豉湯主之若少氣者梔子甘艸豉湯主
之若嘔者梔子生薑豉湯主之

梔子生薑豉湯所之

醫以丸藥大下之身熱不去微煩者梔子乾薑湯主
之

梔子乾薑湯所之

下後心煩腹滿卧起不安者梔子厚朴湯主之

梔子厚朴湯所之

梔子豉湯以下七條條理同

脉浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表證仍在此

當發其汗服藥已微除其人發煩目瞑劇者必衄

衄乃解麻黃湯主之

麻黃湯所之

脉浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁者大青龍

湯主之

大青龍湯所之

以上二方條理同

下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯主之

猪苓湯所之

發汗後大汗出胃中乾煩燥不得眠欲得飲水者少

少與飲之令胃氣和則愈

水所之

發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水水入則

吐者名曰水逆五苓散主之

本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴而口

燥煩小便不利者五苓散主之

五苓散所之

病在陽應以汗解之反以冷水瀝之若灌之其熱被劫不得去彌更益煩肉上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散若不差者與五苓散寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯白散亦可服

文蛤散五苓散小陷胸湯白散所之

五苓散以下四方條理同

無大熱口燥渴心煩背微惡寒者白虎加人參湯主之
大青散散風文

白虎加人參湯所之

醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞭也甘艸瀉心湯主之

甘艸瀉心湯所之

脉浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝湯欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘艸乾薑湯與之以復其陽

甘艸乾薑湯所之

下之後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表證脉沉微身無大熱者乾薑附子湯主之

乾薑附子湯所之
發汗若下之病仍不解煩躁者茯苓四逆湯主之

茯苓四逆湯所之
下利脉微者與白通湯利不止厥逆無脉乾嘔煩者

白通加猪膽汁湯主之

白通加猪膽汁湯所之
甘艸乾薑湯以下四方條理同

吐利手足厥冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之

吳茱萸湯所之

脉微而厥至七八日層冷其人躁無暫安時者此為藏厥非為虵厥也虵厥者其人當吐虵令病者靜而復時煩此為藏寒虵上入膈故煩須臾復止得食而嘔又煩者虵聞食臭出其人當自吐虵虵厥者烏梅圓主之

烏梅圓所之

渴

心下有水氣欬而微喘發熱不渴服湯已渴者此寒

去欲解也小青龍湯主之

小青龍湯所之

四五日身熱惡風頸項強脇下滿手足温而渴者小

柴胡湯主之

小柴胡湯所之

五六日已發汗而復下之胸脇滿微結小便不利渴

而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此為未解也

柴胡桂枝乾薑湯主之

柴胡桂枝乾薑湯所之

小柴胡湯以下二條條理同

發汗後大汗出胃中乾煩燥不得眠欲得飲水者少

少與飲之令胃氣和則愈

小便數者大便必鞭不更衣十日無所苦也渴欲飲

水少少與之但以法救之

水所之

發汗後大汗出胃中乾煩燥不得眠欲得飲水者少

少與飲之令胃氣和則愈若脉浮小便不利微熱

消渴者與五苓散主之

發汗已脉浮數煩渴者五苓散主之

汗出而渴者五苓散主之

發汗六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水水入則吐者名曰水逆五苓散主之

本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴而口燥煩小便不利者五苓散主之

霍亂頭痛發熱身疼痛熱多欲飲水者五苓散主之

五苓散所之

病在陽應以汗解之反以冷水濕之若灌之其熱被劫不得去彌更益煩肉上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散若不差者與五苓散寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯白散亦可服

文蛤散五苓散小陷胸湯白散所之

脉浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若發汗則燥心憤憤反譟語若加燒鍼必怵惕煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊懣舌上胎者梔子豉湯主之若渴欲飲水口乾舌燥者白虎加人參湯主之若脉浮發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之

下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯主之猪苓湯所之

五苓散以下六條條理同

服桂枝湯大汗出後大煩渴不解脉洪大者白虎加人參湯主之

若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者白虎加人參湯主之

無大熱口渴渴心煩背微惡寒者白虎加人參湯主之

脉浮發熱無汗其表不解者不可與白虎湯渴欲飲水無表證者白虎加人參湯主之

脉浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反

惡熱身重若發汗則燥心憤憤反譫語若加燒鍼心忪惕煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊懣舌上胎者梔子豉湯主之若渴欲飲水口乾舌燥者白虎加人參湯主之

白虎加人參湯所之

重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡所小有潮熱從心下至少腹鞭滿而痛不可近者大陷胸湯主之

大陷胸湯所之

發熱汗出此爲熱越不能發黃也但頭汗出身無汗

劑頸而還小便不利渴引水漿者此為瘵熱在裏
身必發黃茵陳湯主之

茵陳蒿湯所之

下利欲飲水者以有熱故也白頭翁湯主之

白頭翁湯所之

咽口舌乾燥胎

脇下鞭滿不大便而嘔舌上白胎者可與小柴胡湯
上焦得通津液得下胃氣因和身澌然而汗出解
也

小柴胡湯所之

脉浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反
惡熱身重若發汗則燥心憤憤反譏語若加燒鍼
必怵惕煩燥不得眠若下之則胃中空虛客氣動
膈心中懊懣舌上胎者梔子豉湯主之

梔子豉湯所之

重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡
所小有潮熱從心下至少腹鞭滿而痛不可近者
大陷胸湯主之

大陷胸湯所之

二三日口燥咽乾者急下之宜大承氣湯

自利清水色純青心下必痛口乾燥者急下之宜大承氣湯

大承氣湯所之

若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者白虎加人參湯主之

無大熱口燥渴心煩背微惡寒者白虎加人參湯主之

脉浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反

惡熱身重若發汗則燥心憤憤反譫語若加燒鍼必怵惕煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊懣舌上胎者梔子豉湯主之若渴欲飲水口乾舌燥者白虎加人參湯主之

白虎加人參湯所之

本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴而口燥煩小便不利者五苓散主之

五苓散所之

脉浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝湯欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆

者作甘艸乾薑湯與之以復其陽中
甘艸乾薑湯所之

譫語

八九日下之胸滿煩驚小便不利譫語一身盡重不可轉側者柴胡加龍骨牡蠣湯主之

柴胡加龍骨牡蠣湯所之

脉浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝湯欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘艸乾薑湯與之以復其陽若厥愈足温者

更作芍藥甘艸湯與之其脚卽伸若胃氣不和譫

語者少與調胃承氣湯

譫語者以有熱也調胃承氣湯主之

調胃承氣湯所之

多汗以津液外出胃中燥大便必鞕鞕則譫語小承氣湯主之

譫語發潮熱脉滑而疾者小承氣湯主之

下利譫語者有燥屎也宜小承氣湯

小承氣湯所之

調胃承氣湯以下二方條理同

若吐若下後不解不大便五六日上至十餘日日晡
所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則不
識人循衣摸牀惕而不安微喘直視譫語者大承
氣湯主之

譫語有潮熱反不能食者胃中必有燥屎五六枚也
若能食者但鞭爾宜大承氣湯主之

汗出譫語者以有燥屎在胃中下之則愈宜大承氣
湯

發潮熱手足熱熱汗出大便難而譫語者下之則愈
宜大承氣湯

大承氣湯所之

不大便鞭燥屎

不大便六七日頭痛有熱者未可與承氣湯其小便
清者知不在裏仍在表也當須發汗若頭痛者必

衄宜桂枝湯

桂枝湯所之

身體疼煩不能自轉側不嘔不渴脉浮虛而濇者桂
枝附子湯主之若其人大便鞭小便自利者去桂
枝加白朮湯主之

古方條理 卷之十一 禁如華堂
桂枝附子去桂枝加白朮湯所之

小便數者大便必鞭不更衣十日無所苦也渴欲飲水少少與之但以法救之

水所之

自汗出若發汗小便自利者此為津液內竭雖鞭不可攻之當須自欲大便宜蜜煎導而通之若土瓜根及與大猪膽汁皆可為導

蜜煎土瓜根大猪膽汁所之

小便數大便則難其脾為約麻仁丸主之

麻仁丸所之

桂枝附子去桂枝加白朮湯以下四條條理同
脉遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濇然而汗出者此大便已鞭也大承氣湯主之若汗多微發熱惡寒者外未解也其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不通者可與小承氣湯微和胃氣勿令大泄下潮熱大便微鞭者可與大承氣湯不鞭者不與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯湯入腹中轉矢氣者此有燥屎乃可攻之若不轉矢氣者此但初頭鞭後必澹不可攻之攻之必

脹滿不能食也欲飲水者與水則噦其後發熱者必大便復鞭而少也以小承氣湯和之不轉矢氣者慎不可攻也

多汗以津液外出胃中燥大便必鞭鞭則譫語小承氣湯主之

若吐若下若發汗微煩小便數大便因鞭者與小承氣湯和之愈

二三日脉弱無柴胡證煩燥大便鞭至四五日雖能食以小承氣湯少少與微和之令小安

下利譫語者有燥屎也宜小承氣湯

大承氣湯所之

脉遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濇然而汗出者此大便已鞭也大承氣湯主之

潮熱大便微鞭者可與大承氣湯

若吐若下後不解不大便五六日上至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸牀惕而不安微喘直視譫語者大承氣湯主之

譫語有潮熱及不能食者胃中必有燥屎五六枚也

若能食者但鞭爾宜大承氣湯主之

汗出譫語者以有燥屎在胃中下之則愈宜大承氣湯

發潮熱手足熱汗出大便鞭而譫語者下之則愈宜大承氣湯

下之心中懊懣而煩胃中有燥屎者可攻腹微滿初頭鞭後必澹不可攻之若有燥屎者宜大承氣湯

不大便五六日繞臍痛煩躁發作有時者此有燥屎故使不大便也宜大承氣湯

大下後六七日不大便煩不解腹滿痛者此有燥屎

也宜大承氣湯

小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能卧者有燥屎也宜大承氣湯

二三日脉弱無柴胡證煩燥大便鞭至四五日雖能食以小承氣湯少少與微和之令小安至六日與

承氣湯一升若不大便六七日小便少者雖不能食但初頭鞭後必澹未定成鞭攻之必澹須小便

利尿定鞭乃可攻之宜大承氣湯
六七日目中不了了睛不和無表裏證大便鞭身微

熱者此為實也急下宜大承氣湯

六七日腹脹不大便者急下之宜大承氣湯

大承氣湯所之

小承氣湯以下二方條理同

重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡所小有潮熱從心下至少腹鞭滿而痛不可近者大陷胸湯主之

大陷胸湯所之

五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便鞭脉細者此為陽微結可與小柴胡湯設不了了者得屎而解

腸下鞭滿不大便而嘔舌上白胎者可與小柴胡湯
上焦得通津液得下胃氣因和身濺然而汗出解也

小柴湯所之

喜忘者必有畜血屎雖鞭大便反易其色必黑宜抵當湯下之

抵當湯所之

噫

汗出解之後胃中不和心下痞鞭乾噫食臭腸下有

古今醫理 卷之十

水氣腹中雷鳴下利者生薑瀉心湯主之

生薑瀉心湯所之

發汗若吐若下解後心下痞鞭噫氣不除者旋復代

赭石湯主之

旋復代赭石湯所之

以上二方條理同

嘔吐

汗自出畜畜惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔者

桂枝湯主之

桂枝湯所之

往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔者與

小柴胡湯主之

往來寒熱休作有時默默不欲飲食臟腑相連其痛

必下小柴胡湯主之

胸脇滿而嘔日晡所發潮熱已而微利此本柴胡證

下之而不得利今反利者知醫以丸藥下之非其

治也潮熱者實也先宜小柴胡湯以解外

五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以他藥下之柴

胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不為逆必

古今醫理 卷之十

蒸蒸而振卻發熱汗出而解

腸下鞭滿不大便而嘔舌上白胎者可與小柴胡湯
上焦得通津液得下胃氣因和身濺然而汗出解
也

腸下鞭滿乾嘔不能食往來寒熱尚未吐下脉沉緊
者與小柴胡湯

嘔而發熱者小柴胡湯主之

小柴胡湯所之

六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證
未去者柴胡加桂枝湯主之

惡柴胡加桂枝湯所之

小柴胡湯以下八條條理同

胸脇滿而嘔日晡所發潮熱已而微利此本柴胡證

下之而不得利今反利者知醫以丸藥下之非其

治也潮熱者實也先宜小柴胡湯以解外後以柴

胡加芒消湯主之

柴胡加芒消湯所之

十餘日反二三下之後四五日柴胡證仍在者先與
小柴胡湯嘔不止心下急鬱鬱微煩者為未解也
與大柴胡下之則愈

發熱汗出不解心下痞鞭嘔吐而不利者大柴胡湯主之

大柴胡湯所之

以上二方條理同

十餘日心下温温欲吐而胸中痛大便反澹腹微滿鬱鬱微煩先此時自極吐下者與調胃承氣湯

調胃承氣湯所之

下利嘔逆表解者乃可攻之其人鞅鞅汗出發作有時頭痛心下痞鞭滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裏未和也十棗湯主之

十棗湯所之

自下利葛根湯主之不下利但嘔者葛根加半夏湯主之

葛根加半夏湯所之

表不解心下有水氣乾嘔發熱而咳者小青龍湯主之

小青龍湯所之

葛根加半夏湯以下二方條理同

自下利者與黃芩湯若嘔者黃芩加半夏生薑湯主之

黃芩加半夏生薑湯所之

腹中痛欲嘔吐者黃連湯主之

黃連湯所之

本自寒下醫復吐下之寒格更逆吐下若食入口即

吐乾薑黃連黃芩人參湯主之

乾薑黃連黃芩人參湯所之

醫反下之其人下利日數十行穀不和腹中雷鳴心

下痞鞭而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病

不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客

氣上逆故使鞭也甘艸瀉心湯主之

甘艸瀉心湯所之

黃連湯以下三方條理同

發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水水入則

吐者名曰水逆五苓散主之

五苓散所之

下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯主之

猪苓湯所之

五苓散以下二方條理同

發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中

懊懣梔子豉湯主之若少氣者梔子甘艸豉湯主

之若嘔者梔子生薑豉湯主之

梔子生薑豉湯所之

脉浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝湯欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘艸乾薑湯與之以復其陽

甘艸乾薑湯所之

飲食入口則吐心中温温欲吐復不能吐始得之手足寒脉弦遲者此胸中實不可下也當吐之若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也急温之宜四逆湯嘔而脉弱小便復利身有微熱見厥者難治四逆湯

主之

吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者四逆湯主之

既吐且利小便復利而大汗出下利清穀內寒外熱脉微欲絕者四逆湯主之

四逆湯所之

下利脉微者與白通湯利不止厥逆無脉乾嘔煩者白通加猪膽汁湯主之

白通加猪膽汁湯所之

甘艸乾薑湯以下三方條理同

食穀欲嘔者吳茱萸湯主之得湯反劇者屬上焦也
吐利手足厥冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之
乾嘔吐涎沫頭痛者吳茱萸湯主之

吳茱萸湯所之

脉微而厥至七八日膚冷其人躁無暫安時者此爲
藏厥非爲虵厥也虵厥者其人當吐虵令病者靜
而復時煩此爲藏寒虵上入膈故煩須臾復止得
食而嘔又煩者虵聞食臭出其人當自吐虵虵厥
者烏梅圓主之

烏梅圓所之

虛羸少氣氣逆欲吐者竹葉石膏湯主之

竹葉石膏湯所之

下利

自下利葛根湯主之

葛根湯所之

桂枝證醫反下之利遂不止脉促者表未解也喘而
汗出者葛根黃連黃芩湯所之

葛根黃連黃芩湯所之

自下利者與黃芩湯

黃芩湯所之

自下利者與黃芩湯若嘔者黃芩加半夏生薑湯主之

黃芩加半夏生薑湯所之

黃芩湯以下二條條理同

本自寒下醫復吐下之寒格更逆吐下若食入口即吐乾薑黃連黃芩人參湯主之

乾薑黃連黃芩人參湯所之

汗出解之後胃中不和心下痞鞭乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者生薑瀉心湯主之

生薑瀉心湯所之

醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞭也甘艸瀉心湯主之

甘艸瀉心湯所之

以上三方條理同

胸脇滿而嘔日晡所發潮熱已而微利此本柴胡證下之而不得利今反利者知醫以丸藥下之非其治也潮熱者實也先宜小柴胡湯以解外

發潮熱大便溏小便自可胸脇滿不去者小柴胡湯主之

小柴胡湯所之

胸脇滿而嘔日晡所發潮熱已而微利此本柴胡證下之而不得利今反利者知醫以丸藥下之非其治也潮熱者實也先宜小柴胡湯以解外後以柴胡加芒消湯主之

柴胡加芒消湯所之

發熱汗出不解心下痞鞭嘔吐而下利者大柴胡湯主之

大柴胡湯所之

柴胡加芒消湯以下二方條理同
十餘日心下溫溫欲吐而胸中痛大便反溏腹微滿鬱鬱微煩先此時自極吐下與調胃承氣湯

調胃承氣湯所之

下利譏語者有燥屎也宜小承氣湯

小承氣湯所之

調胃承氣湯以下二方條理同

自利清水色純青心下必痛口乾燥者急下之宜大承氣湯

大承氣湯所之

下利嘔逆表解者乃可攻之其人熱熱汗出發作有時頭痛心下痞鞕滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裏未和也十棗湯主之

十棗湯所之

熱利下重者白頭翁湯主之

下利欲飲水者以有熱故也白頭翁湯主之

白頭翁湯所之

下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯主之猪苓湯所之

服湯藥下利不止心下痞鞕服瀉心湯已復以他藥

下之利不止醫以理中與之利益甚理中者理中

焦此利在下焦赤石脂禹餘糧湯主之

赤石脂禹餘糧湯所之

下利便膿血者桃花湯主之

二三日至四五日腹痛小便不利下利不止便膿血者桃花湯主之

桃花湯所之

赤石脂禹餘糧湯以下二方條理同

外證未除而數下之遂恟熱而利利下不止心下痞

韃表裏不解者桂枝人參湯主之

桂枝人參湯所之

二三日不已至四五日腰痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者此爲有水氣真武湯主之

真武湯所之

醫下之續得下利清穀不止身疼痛者急當救裏後身疼痛清便自調者急當救表救裏宜四逆湯

脈浮而遲表熱裏寒下利清穀者四逆湯主之

大汗出熱不去內拘急四肢疼又下利厥逆而惡寒者四逆湯主之

大汗若大下利而厥冷者四逆湯主之

下利腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其表溫裏

四逆湯

吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者四逆湯主之

既吐且利小便復利而大汗出下利清穀內寒外熱脈微欲絕者四逆湯主之

四逆湯所之

惡寒脈微而復利四逆加人參湯主之

四逆加人參湯所之

下利清穀裏寒外熱手足厥逆脉微欲絕身反不惡寒者通脉四逆湯主之

下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通脉四逆湯主之
通脉四逆湯所之

下利白通湯主之

下利脉微者與白通湯

白通湯所之

下利脉微者與白通湯利不止厥逆無脉乾嘔煩者

白通加猪膽汁湯主之

白通加猪膽汁湯所之

桂枝人參湯以下七方條理同

吐利手足厥冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之

吳茱萸湯所之

厥冷

五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便鞭脉細者可與小柴胡湯設不了了者得屎而解

小柴胡湯所之

脉浮滑此表有寒裏有熱白虎湯主之

脈滑而厥者裏有熱也白虎湯主之

白虎湯所之

厥而心下悸者宜先治水當服茯苓甘草湯卻治其厥

茯苓甘草湯所之

身體痛手足寒骨節痛脈沉者附子湯主之

附子湯所之

脈浮自汗出小便數心煩微惡寒腳攣急反與桂枝湯欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之以復其陽

甘草乾薑湯所之

飲食入口則吐心中溫溫欲吐復不能吐始得之手足寒脈弦遲者此胸中實不可下也當吐之若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也急溫之宜四逆湯
大汗出熱不去內拘急四肢疼又下利厥逆而惡寒者四逆湯主之

大汗若大下利而厥冷者四逆湯主之

嘔而脈弱小便復利身有微熱見厥者難治四逆湯主之

吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者四逆湯

主之

四逆湯所之

下利清穀裏寒外熱手足厥逆脉微欲絕身反不惡寒者通脉四逆湯主之

下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通脉四逆湯主之
通脉四逆湯所之

吐已下斷汗出而厥四肢拘急不解脉微欲絕者通脉四逆加猪膽汁湯主之

通脉四逆加猪膽汁湯所之
下利脉微者與白通湯利不止厥逆無脉乾嘔煩者

白通加猪膽汁湯主之

白通加猪膽汁湯所之

甘艸乾薑湯以下五方條理同

吐利手足厥冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之

吳茱萸湯所之

脉微而厥至七八日膚冷其人躁無暫安時者此為藏厥非為虵厥也虵厥者其人當吐虵令病者靜而復時煩此為藏寒虵上入膈故煩須臾復止得食而嘔又煩者虵聞食臭出其人當自吐虵虵厥者烏梅圓主之

鳥梅圓所之

手足厥冷脉乍緊者邪結在胸中心中滿而煩饑不能食者病在胸中當吐之宜瓜蒂散

瓜蒂散所之

四肢拘急

發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸者桂枝加附子湯主之

桂枝加附子湯所之

吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者四逆湯

主之

四逆湯所之

吐已下斷汗出而厥四肢拘急不解脉微欲絕者通脉四逆加猪膽汁湯主之

通脉四逆加猪膽汁湯所之

以上三方條理同

脉浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝湯欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘艸乾薑湯與之以復其陽若厥愈足温者更作芍藥甘艸湯與之其脚即伸

芍藥甘艸湯所之

古方條理

卷之五

品三

古方條理卷之下大尾

享和二年壬戌初夏發兌

製本所

東都山下御門外山下町
書肆大和屋久兵衛

