

徽癘新書

上

武
216
1



武庫
216
1

天 明 丙 午 冬 開 鐫

相州片倉元周著

懲癘新書

東都書賈

玉巖堂幾弘



序

疾。疾之至惡而最難理者。莫癘若
焉。宜乎其有惡瘡之稱。而夫子自
矜。執其手而歎也。迨至近代。設之
坊。捕之院。置之園。不敢得與良民
齒伍。雖是出于不忍之政。抑亦可
哀哉。相州片倉深甫。蚤受業於家。



君與余少長。鉢心剝精。殆二十年矣。以其涵養之久。決生於分寸。起死乎刀圭者。日月陸續矣。而窳巧乎胎產之科。望婆銜以不媿者。深甫至而拊摩一每。得乳於蹲。循揮霍之間者。不暇倭指。而深甫不自多。居恒特屢癘。雖瘡。適有一老


醫。妙瘡此疾。蓋其為法。毒索以下。蝟蝟。燔鍼以去。疔。內外攻之。必至為完人而止。真絕世之神方也。深甫乃重齎懇請。漸得授之。洎西游城攝勢紀之間。試諸其病。無不響應。回謂病之窳。雖理者。莫癘若焉。藥之奏。奇効。六莫此方。若焉。夫

有至惡之疾。而有至當之方。與獨
秘以濟人。不若廣傳之濟眾也。遂
筆而聯編。繫而布世。昔者錢子飛。有
治大風方。極驗。常以施人。一日夢
人自云天使。已以此病人。君違天
怒。若施不已。天將得此病。索不能
愈。子飛恨遂不施。內翰蘇公志元

事曰。若余身不然。苟病者得愈。能
代受其苦。此可以為仁人之言也。
今深甫可謂不惧。子飛之所惧。能
心蘇公之心乎。醫此書盛行。與伯
牛同患。而免斯疾之歎者。必多有
焉。如徵瘡諸方。悉出其日常。以應
試經驗。世之同技者。若能高位於

心而用之。以療乎減。擴中之記也。
天明七年歲在戊申夏五之初

東都醫官 丹波元簡謨



松檜芳文書



理癘新書序

甚矣哉。癘風之難醫也。自岐黃論因。元方叙證。思邈立
方。至宋元明名賢。其方愈出愈繁。未嘗見奏萬全效者
矣。余家業醫者三世。每觀家君療此病。不過十瘳其一
二而已。余自少小。究心於方術。博取而精研。深思而透
悟。歷二十年之久。而渙然水解。然後至治傷寒雜病。滯
下小兒。自以為似有得焉。然而竊憂此病之叡難治。是
以更檢尋先哲之方法。傍需俗間流傳之妙方者。又數
年。既得百有餘方。每得一方。即取自試之。或傳同志者。

以試之。斷乎有功驗者幾希。徒束手待盡。竟歸之於命而已。然私心常悲之。思之不輟。偶聞一醫生某。獲治之之竒方於羽之隱醫。彼此諸連城。不敢許傳人。於是余屢贈金帛。卒購得其方。其術甚神竒。使膏肓廢疾。收効于數旬之間。蓋雖華扁之術。不過此也。余復取家君所經驗者。參伍相昭。殫精竭慮。盡辨輕重淺深。可治不可治。與假而真者。真而假者。以發其蘊奧矣。於是乎天下治此病之法。莫有出此書之右者。豈與薛氏機要之類。可同日而語哉。管子有言。思之思之。神將通之。諒非虛

語也。天明丙午春。余家罹災。繼又得時病。瀕于死。至稍知人事。自謂吾若爲泉下人。則此法亦俱湮晦。於是探篋。衍取嚮者所輯錄。更加校讐。又併所聞見之治驗法。方及余所親療醫案若干。以附于後。不揣鄙陋。鏤梓傳遠。題曰理癩新書。天下之業醫者。苟能反覆是書。得其術。則縱令治一患者。其功德豈爲尠矣哉。故不敢自秘。開示韞匱。以與世共之云。天明六年歲次丙午。冬十有一月。南至相州鶴陵片倉元周。題於靜儉堂。

人之禮。然則先王之制。不宜則廢。
末世之事。善則著之。未始有常
也。故聖人制禮樂。而不制於禮樂。
冬夫醫者。經經方。古管賢聖。定之規。
矩。立之準繩。使末世之人。百病一見。
而瞭然。辨析。故醫之理。疾疾棄古。
之法。立方劑於今。學者弗取也。然至


於軒岐。不諱。仲景不言。元方不叙之。
病。則又將何以稽攷乎。若夫論因
之。詳叙證之。審而其立方。處劑。古
昔之法。不宜于用。而後世之方。善于
理。則釋古而行。今又何為拂焉。夫
黷瘡之為病。靈素靡載。金匱。農
經。病源。等。陰蝕。陰瘡。雖稍近似焉。

今之稱謂。肇起元初。而盛於後世。於是乎前輩建之法。編載之理。方然而或過。諸鑿或失。諸麗其畏。劇藥者。則惟平易是務。視稍黃膩粉。猶地竭。排補劑。惟攻伐是用。視參耆鹿角。猶鈍刀。互相倚頗矣。不亦過乎。是以予博集各家秘蘊。取以親歷。

試殆且二十年。其形雖壯實。脉候涉虛。則純補不厭。至體雖勞羸。診候得實。則駛藥何懼。然後其功效出人意外。表因鳩撮此等之法。方乃成一表。名曰理微新書。有廢古之法。而創立規則者。又有賴古之法。而增新意者。予豈敢不信古哉。法方

未始有常也。夫聖人制法方而不制于法方。是。新書之意。蓋有似焉。

天明七年丁未歲臘月鶴陵片倉元周書於靜儉堂



懲癘新書

相州醫士 片倉元周 深甫 著

懲瘡論

懲瘡之病。攷華人所論。昉自嶺南卑濕地。而蔓延四方。如本邦亦起。從肥前州。而播布通國。云蓋此病稀於古時。而盛于後世。故其治法亦麓於前。而審于後。然而稱呼百出。濫名頗多。或隨形狀之近似者。而名焉。或取始所起地。而命焉。或因其所發之處。而稱焉。或依字音。

假借會意以擴其名呼矣如其曰黴瘡曰梅瘡曰賣瘡
 曰痞子曰楊梅瘡曰楊黴瘡曰楊梅毒瘡曰楊梅風曰
 楊梅疔曰綿花瘡曰砂仁瘡曰茱萸瘡曰果子瘡曰天
 泡瘡曰天疱瘡曰濕陰瘡曰妬精瘡曰陰蝕瘡曰廣瘡
 曰廣東瘡曰廣痘曰廣豆曰耻瘡曰臊疔曰濕毒曰濕
 氣曰陰疔曰陰頭癰曰陰頭瘡曰蠟燭發曰下疔曰便
 毒曰魚口曰魚口瘡曰橫疔曰橫眼曰疔疔曰疔梗曰
 疔疔瘡曰疔疔瘡曰卷心疔瘡曰獨脚楊梅瘡曰
 時瘡曰血疔曰血疔曰外疔曰結毒曰氣毒曰疔瘡曰

下疔瘡曰路岐曰魯氣曰瘡癩曰露癩曰騁馬癰曰騎
 馬癰曰騙馬墜之類不暇枚舉殆誣惑後人之耳目也
 以余觀之唯黴瘡下疔便毒結毒之四名以蔽之矣而
 此病近世尤盛而貴賤男女罹之者十居其半是誠和
 華一轍蓋承平二百年之久人人樂安佚內則膏粱膩
 味常充口腹遂生濕熱瘀血外則沈匿柳巷花街以動
 蕩淫火一釀成此病遂傳之娼妓男娼則娼妓男娼之
 傳諸人也不知其幾千百或傳之妻妾或遺之孫甥而
 其病之將發也始則或起自誤擦破若被陰毛纏傷或

自膿淋或自痔疾或久曠房室思動色慾敗精濁血流
滯莖內或又疥瘡發周身遂波及前陰漸致淫浸當此
之時若隱羞不示于人或忽藥餌而用速愈摻藥等則
遂成便毒下疳之證或瘡發周身形如楊梅或如砂仁
若夫至其毒之尤深則為筋骨疼痛或頭痛如破或潰
蝕前陰腐爛後竅或穿咽喉或鑿頭面或墊崩鼻梁若
一誤治法侵禁忌則至使父母遺體永為不具器可不
懼哉若至其證之變態則齒齦膿潰幾類牙疳或舌心
痛或破裂或舌傍潰缺常涎液漏脫或耳內如鍾聲或

如風雨聲或如鳥雀之啾啾又如川流之湍湍或胸腹
肋脇膈脘腎腿及前後二竅常為痛或為發癩作窩穴
或為瘰癧為偏枯為痿躄或欬嗽吐痰如肺癰之狀或
口鼻惡臭穢氣撲人鼻或鼻中出穢汁濃涕如鼻淵腦
漏又出黃赤乾涕或頭面生磊塊數個日夜疼痛經久
不破或又發潰出膿汁積年累月不收口或眼內疼痛
生紅縷或目如注朱或唇吻生紫黑贅瘤久而潰穿黃
汁出而不止遂至缺蝕或為腹痛為水腫為勞瘵為囊
癰為痔漏或手脚拳攣不能伸舒或眉髮頽落幾如癩

疾證狀百端。雖不可窮盡。其爲結毒也一也。宜辨認病人之強弱。菴毒之淺深。及表裏上下。虛實寒熱。以施治法矣。又有襯昵。黴瘡腐爛之人。受自穢臭氣於口鼻。直浸透裏面。遂作之根基者。此證多不發梅瘡便毒。而卒然爲咽喉腐爛。爲潰鑿。或眼目見紅花。或羞明。以漸昏蒙。或爲筋骨疼痛。其始以無患。疔瘡便毒等。必不可謂非黴瘡。譬諸傷寒。猶患直中少陰病。亦宜直隨結毒之治法。施藥也。若夫耳聾目暗。或形體柴瘠。而手脚拳曲。或羸瘦骨立。而關節疼痛。或漸漸飲食廢。或大便下利。

者。及因受父母遺毒。有幼少發瘡瘍。或臍中常濕潤。時出穢臭膿涕。或患膿淋痔疾者。若以尋常胎毒食癖治之。則積年之後。多成漏瘡。喜發於項腋及陰僻肛門之間。後來必變見喉穿鼻崩。或寒熱欬嗽等之諸證。多藥餌不驗。連綿涉年。而終致不起也。

治法

初起小便澀痛。或淋瀝。或陰中瘙痒。或流敗精濁膿。或小便爲一道。爲亂散。或馬口糜爛。或龜頭後包裹之皮。腫如水泡者。並龍膽瀉肝湯。加土茯苓五錢。或加味解。

毒劑若生於兩膊合縫間者。謂之便毒。其始鼠鼷核起。如瘡建而漸漸大。結腫焮痛。為寒熱者。紅花散。瘀湯清。榮湯。或六味解毒湯。俱加。鯨甲。午芩。子之類。若服之不。起。脹。色。不。變。尚。堅。硬。不。潰。者。宜。令。患。者。強。屢。步。履。兼。以。家。方。麪。粉。散。頻。頻。熨。腫。上。或。又。行。後。頃。用。元。青。法。亦。可。其。既。潰。者。猶。守。用。前。方。倍。鯨。甲。或。加。黃。耆。二。三。錢。外。宜。以。白。璧。蒼。玉。照。育。三。膏。各。等。分。和。勻。攤。軟。棉。上。以。貼。患。處。後疔瘡亦用此法若身體發揚。梅毒及砂仁瘡者。加味消疔散。毒散。荆防排毒劑。消風敗毒散等。俱加土茯苓。二。三。錢。

而此證間有兼見筋骨疼痛者。此是與結毒疼痛自異。發表則愈。若皮膚糜爛者。柞皮湯兼用家方熨藥。若連年積月。不痊者。亦宜從結毒治法。以施藥。凡微瘡愈後。若癩痕紅黑不滅者。用大黃白礬等分。同研。擦患處。其痕即去。若龜頭生瘡。或馬口潰蝕。或龜頭後凹處生瘡。潰爛。或成窠臼者。謂之疔瘡。虛者。大劑雙和湯。十全散。二。中。湯。之。類。俱。加。酒。炒。鹿。角。銀。花。土。茯。苓。各。二。三。錢。若。陽。氣。大。虛。血。液。枯。涸。者。去。銀。花。土。茯。苓。倍。參。芪。鹿。角。更。加。蝮。蛇。一。二。錢。或。取。雄。鷄。一。隻。不。滿。三。年。者。去。毛。腸。切。

肉炙啖日八九片。正氣旺焉。而後兼擇用。加減五寶散。集良丸。實者。奇驗湯。加味解毒劑。搜風解毒湯。或龍膽瀉肝湯。兼用飛龍丸。鍊槌丸。若荏苒侵蝕。不可遏止者。以乳香湯。薰洗。甚者。鍛石湯。大妙。神驗。若筋骨疼痛。或鼻柱隱隱痛。或時出乾癬瘡。痂黃膿。或但鼻腫。而其色紫赤。或身體發瘡癩。或爲發潰等證。必不可緩治。宜遽令斷鹽味。以大劑。奇良甘草湯。送下。集良丸。一錢。或白瑩水。或搜風解毒湯。加川芎。大黃。若虛者。用六度煎。下。加減五寶散。若咽喉潰爛。或成窠白。常出稠痰。臭涎。

或妨礙食飲者。後世名之喉癰。薔薇遺糧湯。喉癰湯之類。兼用獨味。牛黃研細者。每服送下。一二分。或結毒紫金丹。若頭痛如破。積久不差者。宜用醫方筆記頭風一方。兼以集良丸。或以三稜針刺懸顱懸鬚。竹空瞳子。膠等。而出血。或用角法。以吮瘀血。爲良。或又隨證取風池風府。若頭面發疔瘡。時痛時止。歷載經月。不差者。亦以三稜針刺其腫上。或以粗布裹手指。浸醋。擦破腫上。乃以元青。二三個。研末。醋和勻。浸綿。以傅之。經一宿。則必爲水泡。泡潰。水出。而後愈。是尤神驗。若眼目疼痛。或

生血絲或生翳膜者防風通聖散加土伏苓或四物湯
 照黃連解毒湯王之兼以家方明目膏頻頻塗眼胞內
 極妙若夫結毒欬嗽如肺癰之狀者菹藹湯若手足不
 遂筋骨疼痛或毒結于手腕臂肘肩背腋下膝膈髻腿
 足趺等之處而朝朝暮暮痛楚殊甚或形如痛風歷節
 之狀或頭上顏額生磊塊後來發潰者或山根腫痛或
 鼻梁陷墊及積年發漏其他結毒之證一二三並見前項
 諸藥不應者宜用七寶散虛甚者宜以參芪鹿茸熟附
 子濃煮汁送下實者加味化毒丹白瑩水白蛇丸及湯

王之凡用配輕粉諸方病愈之後若飲食不進或步履
 無力不了了者宜用兩輪散應効如桴鼓若夫血液耗
 亡肌膚不悅澤者六味地黃丸十補圓七寶美髯丹等
 久服可以培其根本也
 龍膽瀉肝湯正宗治肝經濕熱玉莖患瘡或便毒懸癰小
 便赤澀或久潰爛不愈

- | | | | | | |
|----|----|----|----|----|-----|
| 龍膽 | 連翹 | 地黃 | 澤瀉 | 木通 | 車前子 |
| 歸尾 | 山梔 | 甘草 | 黃連 | 黃芩 | 大黃 |
| 加 | | | | | |
- 錢各一
分各五
便秘

水二鍾煎八分前按此方本方去柴胡加苓連大黃

本方去柴胡加黃芩

加味解毒湯 家方

土茯苓 薔薇根各五錢 金銀花 芎藭 木通

大黃各二錢 木瓜 五加皮 甘草各一錢

右九味以水一升煮取五合去滓溫服不拘時候

紅花散瘀湯 正宗 治入房忍精強因不泄以致瘀精濁血

凝結兩胯或小腹之傍結成腫痛小便澀滯者

當歸 紅花 蘇木 薑朮 連翹 貝母 乳香

皂角針 石決明 穿山甲各一錢 大黃三錢 牽牛子

二錢

水酒各一碗煎八分空心服行五六次方吃稀粥補

之

清榮湯 家方 治楊梅疔瘡

當歸 川芎 芍藥 地黃 何首烏 蒺藜子

黃蘗各一錢 土茯苓五錢

右八味以水七合煮取三合溫服

六味解毒湯

忍冬 土伏苓 木通上 川芎 大黃中 甘草下

右以水五合煮取二合半分溫三服。

麪粉散 家方 治便毒不起脹及不發潰者

麪粉 白芥子 研各八錢

右二味絹袋盛浸滾湯頻頻熨患處神効。

白壁膏 紅毛稱干膚刺 此膏非但治下疳便毒又能傳一切潰

瘍解熱止痛痔疾痛甚者尤神驗。

白蠟 牛脂 野猪脂 家猪脂 椰子油 各二錢

粉錫 三十錢 麻油 合

右先以麻油入潔淨鍋內慢火熬至八分下黃蠟將

柳木篦攪片時更挑少許滴入水中試軟硬得中乃

住火頃之用細舊絹濾淨却上火看似溶化之象而

入四種油脂攪和乃下鍋來猶攪候溫冷交以白堊

徐徐投入膏內不枉手攪之看漸漸膏凝其色如白

壁而後納貯瓷器聽用一方去椰子油加片腦十錢

蒼玉膏 紅毛稱過僕斯 治諸腫瘍能吮膿去毒乾濕潤

黃蠟 牛脂 野猪脂 椰子油 銅綠 各二錢 麻油 十錢

合

右修煉之法。同前法。而以銅絲。最後下。

煦膏膏 紅毛稱 跋日栗 治癰疽發背。諸般惡瘡潰爛者。貼之則

腐肉易脫。新肉即生。

瀝青 五十目細研 宜用紅毛產 黃蠟 二十錢 牛脂 十錢 麻油 五十錢 即準一合

二勺 五撮

右先煮麻油片時許。更下黃蠟牛脂。令溶化。乃入瀝

青末。攪轉離火。用細舊絹濾淨。納瓷器。○右三種膏

藥。并休達方。天明甲辰冬。予講產科術於靜儉堂。彼

感予精密于產蓐之技。日夜研究。數往還。語次偶洎

瘡瘍之事。彼遂發其秘蘊。傳之。其後予屢試有效驗。

并云。此方吾家所秘。勿妄傳人。予隘之。今刊刻。普傳

凡醫家。雖非外科專門者。常製。可以施于人。○以上

三膏。并攤紙花中。外緣以萬應膏貼之。患處乃不脫

落。

萬應膏 治諸瘡

鉛丹 九十錢 黃蠟 十六錢 麻油 百六十目 即準四合

右先煮麻油。次下黃蠟。更入鉛丹。攪轉一晷時。鉛丹

變黑色。軟硬得中。為度。

加味消疳敗毒散

防風 獨活 連翹 荆芥 蒼朮 下知母 黃蘗

茯苓 木通 上澤瀉 車前子 牽牛子 大黃 中

右十三味水煎溫服

荆防排毒劑

荆芥 防風 茯苓 獨活 上桔梗 川芎 中甘草

下枳實 生姜 中

右以水四合煮取二合分溫三服

消風敗毒散

當歸 川芎 赤芍 地黃 升麻 乾葛 黃芩

各一黃連 連翹 防風 各八分銀花 甘草

各五分蟬退 二

右十四味水煎服

柞皮湯

柞木皮 俗稱狐奴及訥葛窠 土茯苓 各三錢 銀花 荆芥 地黃

芍藥 防風 各七錢 牛膝 木瓜 黃蘗 各一錢

右十味咬咀以水五合煮取二合半去滓溫服

先考苔翁先生秘方治楊梅疔瘡糜爛薰洗方

食鹽五 荆芥各二 忍冬各二 敗荷葉五 青木葉廿片華名未詳

俗稱邊屋吉訥髮

右麤剉以水一升煮至八分屢薰洗患處

雙和湯補血益氣治虛勞少力

芍藥七兩 黃芪蜜炙 當歸 熟地 芍藥各三 甘草炙

肉桂各二兩

右為細末每二錢水一錢半姜三片棗一枚煎六分

食前服

十全散 治諸虛不足久病虛損面色痿黃脚膝無力

人參 白朮 茯苓 甘草炙 黃芪 當歸 芍藥

熟地 芍藥 肉桂各等分

右每二大錢水一錢姜三片棗二箇煎七分溫服此

藥補虛損大有神効

二中湯醫方會解 即理中湯小建中湯兩合方

加減五寶散 治結毒筋骨疼痛腐爛口鼻諸藥不效

者

滴乳石如乳頭下垂敲破易碎亮似蜻蜒翅者方真四錢 琥珀 硃砂各二錢

龍腦一錢 珍珠四錢 勢州所產為上品水府產次之然直殊貴非有力者難得之故今倍加

分兩。而換用俗稱。過薩
栗辰珠者。亦有效驗。

右各研極細。共為一處。再研數轉。磁罐密收。病在上
部者。用藥末一錢。加飛羅麩五分。病在下部者。加八
分。再研和勻。每用土茯苓五十錢。水一升。煎至五合。
濾清。作五次。分加五寶散。一日服盡。完十二日。自愈。
若不愈者。更作一劑。如鼻子腐爛者。上茯苓內加辛
荑三錢。煎服。忌海腥煎炒。鹵鹽房事等件。○此余家
所秘。加減法。應効如桴鼓。

集良丸 治結毒不問年深日近。筋骨疼痛。或頭痛如

破。或鼻柱崩塌。陽物潰蝕等證。平遺民方

天靈蓋 八錢 輕粉 二錢 牛膝 二錢 孩兒茶 二錢 五分

鷓鴣菜 拈獲根 各一錢 天南星 二錢 大黃 四錢

鼯鼠 燒存性 四分

右九味為細末。打糊丸。梧桐子大。每晨一錢。加味解
毒湯。煮汁送下。○凡用此藥。先用解毒湯。三日。次與
此丸。尋於解毒方中。倍大黃。應効如神。

奇驗煎 治一切微瘡神効

熟地 杜仲 炒 人參 黃芩 黃連 炒 大黃 酒炒

檳榔 黃芪 酒炒 木香 各二分 甘草 生三分 土伏苓 十錢

右十一味。以水五合。煮取二合半。再以滓入水二合。

煮取一合半。和前煎汗。一日服。盡忌茶葱菜葡萄海腥。

搜風解毒湯 治微瘡結毒。筋骨疼痛。不能步履。或壞

肌傷骨。及下疳瘡。

土茯苓 十錢 防風 木瓜 木通 薏苡 白蘚皮

金銀花 各五分 皂子 四分

右水煎空心日三服

飛龍丸 治微瘡下疳。玉莖腐爛。筋骨疼痛。諸藥不能

治者。

牙茶 上好者三錢五分 大黃 一錢八分 輕粉 八分

右上一味極細末。先取粳米飯鴨蛋大。摻輕粉攪和。

作搏飯。炙於炭火上。反復候焦黃離火。更捏令相得。

再炙如此。大都三四遍。乘熱研如餅。入餘藥和勻。若

稠不得所。更加粳米飯。丸麻子大。每服二十五丸。晨旦臨卧。白

湯送下。用之三日。次與

鐵槌丸

丁子 大黃 巴豆 霜各等分。○李東璧云。稱研爛。以紙包壓去油者。謂之巴豆霜。

周按今人以燒存性者為霜非也蓋以百草霜誤爾

燈右三味細末米糊丸麻子大每服十二丸間三日且

暮白湯送下若病重者漸加至二十九丸又宜間四五

日用之○以上三方並先考蒼翁先生所秘

乳香湯治下疳瘡漸漸侵蝕不可止遏者

乳香一錢沒藥六分樟腦二錢蘆薈一錢

右四味以燒酒二合煮取一合半頻頻湔患處

鍛石湯治用前方不効者此方諸潰癰用膏反侵蝕

者神驗

石灰三十錢以滾湯一升煇硝四錢膽礬二分

右二味投入石灰汁中溫頻湔患處若為水泡者去

膽礬加礬石一錢

奇良甘草湯

土茯苓錢三十甘草一錢

右以水一升煮取五合再入水一升二合煮取三合

半煎汁和勻一日服盡不可別用湯水茶酒又切

忌海腥炙博鹵鹽房事等件

六度煎治徽瘡筋骨疼痛諸藥不効形體虛憊者

當歸 芍藥 附子 黃芪 虎脛骨 各一錢

土茯苓 八錢

右六味以水一升煮取六合去滓再以水六合煮取四合又以水四合煮取二合去滓以三煮汁合和溫服不拘時候

喉癰湯 治咽喉漸漸腐去飲食用粉麪之爛者必仰

口而咽每咽泣數行下

甘草 桔梗 各一錢 山豆根 龍膽 射干 各一錢

土茯苓 五錢

右六味以水五合煮取二合分溫三服每服送下牛黃二分

薔薇遺糧湯 治結毒咽喉破鑿者

土茯苓 七錢 薔薇根 五錢 桔梗 二錢 五加皮 一錢

右以水六合煮取二合溫服不拘時候

結毒紫金丹 治遠年近日楊梅結毒筋骨疼痛日久

腐爛臭敗不堪聞者或咽喉唇鼻破壞諸藥不效者

妙

龜板 放炭火上炙焦用新安酒漿濃筆蘸塗

石決明

用九孔大者煨紅
童便內漬之次辰砂明亮者各
未六錢

共再碾極細爛米飯為丸麻子大每服一錢量病上

下食前後筋骨疼痛酒下腐爛者土茯苓湯下至重

者四十日而愈此功勝於五寶散○元周嘗屢試

此方所患在咽喉者殊覺有驗

醫方筆記一方

土茯苓

四十錢忍冬三錢防風天麻玄參辛夷

芎藭

各六分黑大豆四十粒芽茶一撮

右以水五椀煎取三椀分溫服

防風通聖散

宣明論

川芎 防風 當歸 白芍 連翹 薄荷 麻黃

各四分石膏 桔梗 黃芩各八分 白朮 梔子

荆芥各五分 滑石二分 芒硝四分 大黃四分 甘草

一錢

右生姜水煎溫服

四物湯

局方

當歸酒炒 芍藥 芎藭 地黃各等分

右每三錢水一盞半煎八分熱服食前

黃連解毒湯 肘后

黃連 三兩 黃芩 黃蘗 各二兩 梔子 十四枚

水六升煎取二升分再服

家方明目膏 見于青囊瑣探

菝葜湯 治結毒欬嗽似虛勞者

菝葜根 牡蠣 甘草 各一錢 連翹 羌活 各二錢

反鼻 八分

右以水五合煮取二合半分溫三服

七寶散 微瘡結毒一切難名狀之病或累月積年潰

爛不收口或筋骨疼痛手足不遂或周身發疔瘡或

咽喉糜爛或穿孔或山根腫痛或鼻梁陷墊及久年

痔漏其他頑瘡惡毒瘡皆治之其効如神不可悉述

土茯苓 炒二錢 人參 炒四錢 用俗稱鹿角 截段於土器

浸一日夜再燒過四錢 黃雌雞 一隻去毛腸及肉取翅骨燒存

藥時先喫一片

右為細末分作四十二貼每服一貼奇良甘草湯送

下日宜服六貼完七日見自愈兆若不瘥再作一劑

若方春夏溫熱時雞肉難收則去毛腸完燒存性用亦可

加味化毒丹

牛黃四分 琥珀五分 血竭自製 大黃 雄黃 朱砂

乳香 木香 白蘇皮 川山甲各一錢五分 蟬退二錢

生生乳一錢七分 沒藥一錢七分 貝母三錢 丁香 牙皂各五分

鬱金一錢 儻蠶四錢

右各製為末。用神麩末六錢打稠糊入藥搗勻。丸梧桐子大。別研朱砂為衣。每卓空心服十五丸。每晚空腹服十丸。砂糖湯送下。炒米湯亦可。病去藥減如餘毒未盡藥不可徹。百日內勿使大勞大怒。茶酒止可。

用十分之三。凡服此丸。先用滾湯汨嚥。清胸中濁氣。嗣服丸藥。藥後啖糕果之類。厭丸藥下胃。日宜尊法毋忽。

是牛黃化毒乙字化毒兩合之方。雖藥繁雜取効尤捷。余屢用屢驗者也。嘗按陳司成立牛黃化毒其化十干諸丸之方。意是本必一方。蓋為奇其術。一增損以廣之者而已。何必別六經見證可以配十方乎。

白蛇丸 治楊梅結毒痼疾廢病

烏梅一錢 竹蠹蛀末三錢無則以淡竹末代之 牙茶華產物一錢五分 白蛇

酒浸少錢五分為質及訥過未葛

灸二錢一錢紙包入搏飯

輕粉內煨熟取出用

右六味極細末米糊丸綠豆大每旦食前以一錢六

分赤小豆煎汁送下凡用之七日內須忌禽獸魚鱉

鹵鹽茶酒唯以白粥將養之過五六日則當齒齲黑

血自出完七日而後宜以淡味噌汁煮瓢蓄蘿蔔冬

瓜鯉脯鰈魚鱈魚之類食啖之嗣以後方若口中麩

白蛇湯

爛者宜一味柞木皮煎煮以頻含漱口中

當歸 川芎 芍藥 甘草 大黃 白蛇酒浸少灸

黃芩 肉桂 桂枝 檳榔 山椒 丁子 茯苓

人參用俗稱薩摩小人參者 青木香各等分

右生姜二片水煎服一方加葳靈仙葶蓬根乳香沒藥 用此湯七日

後又用後方

加味四物湯

當歸 川芎 芍藥 地黃 甘草 葳靈仙

葶藶 椒目各等分

右生姜二片水煎溫服

祛毒煎去輕粉毒

車前子各 牙茶各

黃芩 梔子 連翹 木通各

黃連 黃蘗各

右八味水煎溫服

凡用有輕粉諸藥。疾患盡愈之後。若飲食不進。或步履無力。淹然不復舊者。宜用後方。應効如神。

兩輪散

櫻木皮

華名未詳本邦稱葛跋薩孤刺訥葛窩

蜀椒各六錢

右二味細末每服一錢白湯送下日三服

白瑩水

見理瀉新書

六味地黃丸

見小兒直訣

嚴氏十補圓

見濟生方

七寶美髯丹

見本草綱目何首烏附方

以上諸方予嘗所親經驗有得師授者有得友人者又有深秘帳中而不妄傳人者予得數方甚難今不吝惜刊刻普傳大方雖然古人有言病之變狀不可一槩言之所以醫方千卷猶未盡其理故又增附諸家驗方於後臨證之工宜擇焉

地黃湯 治楊梅瘡

地黃^上 牙皂 木瓜 獨活 當歸 川芎

大黃^中 黃芩 黃連 甘草 土茯苓^{自十錢至十五錢}

右十一味以水八合煮取四合服^{若渴者以水一升煮取七合服}

凡楊梅結毒毒在上部而着咽喉牙齦頭面者宜用嗅

藥法若毒着下部而手足筋骨疼痛或前後二竅疔蝕

者加味芎黃散主之

嗅藥方

硃砂^{光明者} 金箔 一片 沈香 一錢 百草霜

一錢

金箔

一片

沈香

一錢

百草霜

右以前三味極細末次入百草霜和勻其色濃紫色為度分為七貼再以一貼藥末作三紙撚條子令患者口裏含冷水^{煖則更之}點火於紙撚以嗅之日宜用二條子完七日用盡

加味芎黃散

川芎 大黃 黃蘗 良姜^{不可陳久} 輕粉^{二分}

右以前四味極細末分作七貼臨用入輕粉和勻日

用一貼以土茯苓^{二十}煮汁送下七日服盡若病重

者用輕粉二錢稍輕者用一錢隨證不用亦得

代五寶散 治結毒筋骨疼痛 田安亭方

人參 輕粉燒各五分 巴豆霜一錢 龍腦五厘 辰砂一錢

右五味極細末。糊丸麻子大。每服五丸。土茯苓湯送下。日三服。

三玄湯 治瘡其毒淺者

防風 當歸 木瓜 檳榔 羌活 白蘚皮

大黃 黃連各等分 三玄即野薔薇苗 土茯苓各倍用 甘草少

右水以五椀。煮取三椀。分溫服。

紫根牡蠣湯 治楊梅瘡毒。痼疾沈痼。無名頑瘡。及羞

瘡。險惡證。神驗。

當歸 芍藥 川芎 大黃 升麻 牡蠣

黃芪 紫草 甘草 忍冬 大黃 升麻 土茯苓 六

右以水五合。煮取二合半。去滓。三服。虛者去大黃。實者去黃芪。

牛蒡子湯 治瘡毒攻咽喉腐爛疼痛。飲食不下。遠年

日近。並効。

惡實二錢 玄參 烏犀角 升麻 黃芩 木通

桔梗 甘草各一錢 土茯苓四錢

右九味以水七合。煮取三合。分溫服。

治微瘡骨節疼痛神效方

大鼠一具 阿仙藥 紅花各一錢 黃丹四錢 糯米一合

右五味俱燒存性。研細。每服一錢。白湯送下。日一。

又方

赤小豆 鼯鼠燒存性 各五錢 大黃 輕粉 土茯苓各三錢

右五味為細末。米糊丸。梧桐子大。每服二十粒。以六

味解毒湯送下。

二葛四黃散 治結毒筋骨疼痛諸藥不能治者。如神。

大黃三錢 黃連 黃芩 當歸 芍藥 葛粉各二錢

葛根 黃蘗各一錢半 輕粉煨 甘草各五分

右細末。以土茯苓湯之類。日服三四錢。○一方用二

葛四黃歸芍各四錢。輕粉一錢。更加龍腦五分。特神

效。煨輕粉法。用上器盛輕粉。不以多少。生紙封口。傳

糊於紙錄黏着於土器口外。使粉不飛。乃上火。別

設水一器。浸指于水中。彈濺。蓋紙上。候水痕燥。覆紙

微瘡神效方

鷓鴣菜四錢 巴豆二錢 甘草五分

微瘡新書

靜儉堂藏

右細末稀糊丸。菴豆大赤石脂為衣。分作七貼。以溫酒日服一貼。若羸人宜十四日服盡。或以菘蕪煎汁送下亦得。若用菘蕪則宜用巴豆四錢。

又嗅藥方

麝香 一分 沈香 四分 龍腦 一分 光明朱 四錢

鈎丹 四錢 百草霜 五分 金箔 銀箔 各四片

右八味為末。每四分入紙撚條中。長作五六寸。令患者坐紙屋子中。口裏含水。點火于紙撚。以嗅之。七日而止。病人必下利。若吐是其驗也。○若用此藥。口中

糜爛者宜平胃散加蜀椒皮大黃煎服。若不勝藥氣者。以白梅黑豆煎服。凡用此藥者。唯宜食大麥甘蕨之類。忌其他一切物。

治楊梅結毒筋骨疼痛奇方

四物湯 黃連解毒湯 各四錢 大黃 牡丹皮

牛膝 各一錢 白丹 七分

右為細末。分為九貼。日服三貼。每服以後。方煎汁送下。

下○作白丹法。以鈎丹一介。樟腦三十錢。和勻。以酒煉作餅子。置瓦上。上火一炊時。更點火於餅子。煨之。烟盡則又再煉。煨之。如前法。凡如是三遍。次不用樟腦。唯酒煉。又更煨。如前法。鈎丹變白色為度。

各等倍奇湯

大黃 杜仲 當歸 牛膝 地黃 白芷 黃連

檳榔 芍藥 川芎 忍冬 甘草 木瓜 沈香

桑寄生 各等分 土茯苓 倍用

右十六味以水七合煮取三合半去滓溫服

如神湯 治一切瘡毒侵眼目生翳膜者神效

黃芩 黃連 木通 白芷 丁子 木香 升麻

茯苓 防風 連翹 大黃 枳殼 沈香 乳香

薰陸 地黃 土茯苓 白蘚皮 各等分 甘草 少

右水煎服若膿出者加獨活毛髮脫者加皂角子牙
齒痛者加木瓜薏苡仁舌痛者加蟬脫人參白姜蠶
梅肉丸 諸惡瘡毒疔瘡其他無名頑瘡悉療之

梅肉 燒存性一棗半 梔子 同上 巴豆 七分
一方用一棗八分 用四分五厘 一方

方用一輕粉 同上 右細末蜜和擣千下收磁確先服三分二日後又服
五分又三日後服七分取下惡物諸瘡乃愈

蠲痺消毒散 治時瘡肢節拘攣

姜黃 土茯苓 獨活 各五分 白朮 當歸 各一分

赤芍藥 一錢 白芷 五分

右水煎服

解毒劑 治便毒下疳疥癬

穿山甲 大黃 黃芩 反鼻燒存性 忍冬 甘草各

土茯苓大

右八味水煎。溫服。有水氣小便不利者加茯苓。

反鼻散 治楊梅瘡

獨活 連翹 大黃 土茯苓各四錢 反鼻三錢 川芎三錢

右細末酒服一錢匕

伯州散 治一切頑瘡結毒漏瘡

蟹取生淡水中甲大三四寸者可用生海潮中者不可用 反鼻酒浸一宿各燒存性

鹿角男子乳浸日曝乾 沈香五錢

右四味細末每服五分無灰溫酒送下日三

按此方本出于伯耆州民間舊名黑龍散主治癰疽

疔腫瘰癧乳癰下疳潰爛難愈及痔漏脫疽等證人

人屢試有效驗故世稱之云伯耆妙藥而不呼其方

名黑龍之名遂湮晦矣今人只呼曰伯州散蓋是其

真方云而諸家所傳品味有增加者今駢附于後

又方 蝮蛇燒存性 蟹燒存性 鹿角燒存性 皂角子燒存性 大黃

蛇床子俱忌火以上六味各二十錢 沈香四錢半燒半生

右七味細末每服一二錢溫酒送下○一方有銀花

又方 蝮蛇一錢去頭尾燒 蟹七錢燒 鹿茸三錢燒 牙皂三錢燒

沈香三錢 甘草二錢

右五味為末以一劑分二服溫酒送下取微醉為度

禁生蔬茶酒酢麪海腥冷水等件

治微瘡一方

大黃 犀角 黃連 黃芩 牽牛子各二錢 巴豆一錢

右六味為細末米糊丸彈丸大每服三丸至五七丸
疔瘡薰洗方

忍冬上 黃蘗中 礬石小 甘草小

右四味水煎頻淋湔患處

膩粉元治結毒骨節疼痛

牛膝焦黑 輕粉各二錢 土茯苓一錢半 丁子五分 將軍八分

右細末糊丸麻子大以二劑六日服盡至七日宜服

後方一名前七寶丸用土伏苓一錢每服四分旦暮服之三日後服後方一錢云

三物巴豆丸一名後七寶丸

巴豆 七枚 丁子 二分 大黃 四分 ○一

右為細末糊丸麻子大每服十丸空心白湯送下。

治楊梅下疳結毒妙方 竹下某方

朱 光明 輕粉 竹皮 各十 牙茶 五厘 ○一

右四味煉蜜丸麻子大每服五分旦暮服服十五日。

後宜用後方

石榴皮湯

石榴皮 香附子 各十 甘草 二分

右三味以水一升煮取五合去滓溫服

六物解毒湯 治徽瘡骨節疼痛

土茯苓 四錢 金銀花 二錢 川芎 薏苡 各一

木瓜 一錢 大黃 一錢

右六味水煎溫服

化毒丸 治徽瘡結毒 佐非定策方

白麪 八錢 大黃 四錢 雄黃 二錢 反鼻 蜈蚣

血竭 各六分 乳香 沒藥 各

右八味為末煉蜜丸赤小豆大日服三四錢隨證加

輕粉五分

疔瘡敷藥方

虎皮

西洋參

各一錢俱燒存性
本邦稱廣東人參物

輕粉

少許

右為極細末敷患處

治楊梅毒瘡方

醫學統旨

輕粉

一錢

雄黃

丹砂

各二錢

槐花

炒

龜版

各一兩

右為末糊丸梧子大每服一錢冷茶下日二服七日

愈

治楊梅毒年久筋骨痛

本草百病玉治

薔薇根

木瓜

五加皮

伏苓

當歸

右水酒各半煎

百効飲

治楊梅下疳便毒神驗

土伏苓

百二

玄參

銀花

防風

荆芥

連翹

黃蘗

大黃

芒硝

山蟬脫

天花粉

龍膽

猪苓

澤瀉

各二

甘草

一泉

右分作十二貼每一貼頭煎以水六盞煮取五盞第

二次煎以水五盞煮取三盞第三次煎以水三盞煮

取二盞俱相和一日服盡完十二日而後宜用後方

蠲痰煎

茯苓 芎藭 黃蘗 桔梗 忍冬 木通

山枝子 土伏苓 大黃各等分

右水煎溫服

治楊梅瘡久不愈或浸淫者神效方

銅綠 膽礬各二錢

右以蜂蜜一盞煎熬而後以苦蕒花一撮裹於木棉

布紮定其頭團藥如擘殼酸漿實狀乃以頭傳前藥

百灸火上乘熱熨於瘡上

黃鼎元 治楊梅結毒筋骨疼痛

黃芩 黃柏 大黃 當歸 蝮蛇 乳香

沒藥 犀角 芍藥各等分

右細末米糊如梧桐子大辰砂為衣每服二十九丸白

湯送下日二夜一

改定化毒丹 治結毒

牛黃真者四分 琥珀五分 血竭 雄黃 朱砂 虎脛骨

鱧甲各一錢 鍾乳二錢 犀角 烏虵各一錢半 龍腦三分

麝香一分

右十二味神麪糊丸梧子大每服十五丸砂糖湯送

下虛者人參湯送下。○本方加熟大黃錢輕粉五分

名加味化毒丹橘尚賢方

元周按牛黃化毒丹去乳香沒藥木香蟬退白蘚皮

貝母生乳加腦麝鍾乳烏虵犀角輕粉方

再造散治大風及徽毒不擇新痼服之可也

鬱金五錢皂角刺一錢大黃十錢白丑反鼻各六錢

右為末溫酒送下醫官山東洋方

元周按即三因方通天再造散加反鼻方

百中飲治下疳梅毒其他一切濕毒積年不愈或頭

面腐潰或鼻柱陷塌已成廢痼者神效津田玄仙方

土茯苓上好物一百七十泉杜仲二錢甘草一錢黃連一錢

檳榔人參本邦稱直根者牛膝堅實者肉桂黃芩

沈香上好品川芎各一錢

右一劑分作七貼七日用盡煎法以水三合半煮

取二合再以水三合煮取二合又以水四合煮取二

合俱合和空心溫服

治廣瘡爛壞鼻梁及淫蝕陽物出于本草彙言

鍾乳石無問厚薄但明淨光澤者即堪入藥惟黃赤者不用

蚌竹屑八錢

數萬新書

靜儉堂藏

乳香 沒藥 瓦上焙 象牙 各五 枯礬 三

右為細末。用白蠟四錢。總和勻。每早晚各服二錢。土

茯苓煎湯調下。元周按此方平和之劑。虛人宜用。

楊梅瘡無論新久。不_二甘劑收功。不_二獨永除後患。更且無

碍生育。當歸 五 銀花 防風 荆芥 各三 何首烏 肥皂

子 九個 猪胰 一副 土伏苓 四兩 用水六碗。煎三碗。空

心溫服。忌鹽醬醋茶雞魚鵝鴨蝦蛋鮮物。出于願體

黴癩新書



