傷寒活人書

三

十

武9
236
2

曾注類證活人書卷第四

此一卷論陰陽治傷寒須識陰陽二證手足各有三陰三陽合爲十二經在手背者爲陽屬表爲腑在手掌裏者爲陰屬裏爲臟足經倣此傷寒只傳足經不傳手經素問熱論亦只說足三陰三陽受病巢氏言一日太陽屬小腸誤矣足之陽者陰中之少陽足之陰者陰中之太陰足之三陽從頭走足足之三陰從足走腹陽務於上陰務於下陽行也速陰行也緩陽之體輕陰之體重陰家脉重陽家脉輕陽候多語陰證無聲陽病則旦靜陰病則

夜寧陽虛則暮亂陰虛則夜爭陰陽消息證狀名異然而物極則反寒暑之變重陽必陰重陰必陽陰證似陽陽證似陰陰盛隔陽似是而非若同而異明當消息以法治之

十八 問陰證

太陰少陰厥陰皆屬陰證也太陰者脾也少陰者腎也厥陰者肝也○何謂太陰證太陰脾之經主胸膈旗脹里乙經云邪生於陽者得之風雨寒暑邪中於陰者得之飲食居處陰陽喜怒又曰賊風虛邪者陽受之飲食不節起居不時者陰受之陽受之則入腑

相字訛

陰受之則入臟入六腑則身熱不時上相喘呼入五臟則旗滿閉塞下爲飧泄久爲腸澼○何謂少陰證少陰腎之經主脉微細心煩但欲寐或自利而渴又問經云一二日少陰病者何也謂初中病時膲理寒便入陰經不經三陽也（傷於寒雖是三陰三陽太陰發陰也此二經爲表裏其受病最多陽明太陰受病頗稀至於少陽厥陰肝膽之經又加少焉凡病一日至十二三日太陽證不罷者但治太陽有元得病便見去聲少陰證者直攻少陰亦不必先自太陽次傳而至蓋寒氣入太陽即發熱而不發熱也三陰中寒微則理中湯（正七十四）稍厥或中寒下利即乾薑甘草湯（正五十五）手足指頭微寒冷謂之清音去聲此未消喫四逆湯疾

而字疏

輕故也只可服理中乾姜之類大段重者用四逆湯（正七十五）無脈者用通脈四逆湯也（正八十一）○何謂厥陰證厥陰肝之經主消渴氣上衝心中疾熱饑不欲食食則吐蚘下之利不止也若陰氣獨盛陽氣暴絕則爲陰毒其證四肢逆冷臍腹築痛身如被杖脉沉疾或吐或利當急灸臍下服以辛熱之藥令陽氣復而大汗解矣古人云辛甘發散爲陽謂桂枝甘草乾薑附子之類能復陽氣也微用辛甘甚則用辛苦陰極發躁陰證似陽

學者當以脉別之

問陽證

太陽陽明少陽皆屬陽陽證也太陽者膀胱也發熱頭疼腰痛而脉浮也陽明者胃也不惡寒反惡熱濈濈汗出大便秘潮熱而脉長也少陽者膽也口苦咽乾脅下滿發熱而嘔或往來寒熱而脉弦也麻黄湯（正二十）大青龍湯（正三十五）桂枝湯治太陽經傷風寒也大柴胡湯（正三十）調胃承氣湯（正四十三）小承氣湯（正四十二）大承氣湯（正四十一）治陽明傷寒也小柴胡湯（正二十九）治少陽傷寒也其他藥皆發汗吐下後證也○若陽氣獨盛陰氣暴絕即爲陽毒必發躁狂走妄言面赤咽痛身斑斑如錦紋或下利赤黄脉洪實或滑促當以酸苦

之藥令陰氣復而大汗解矣古人云酸苦湧泄爲陰謂苦參大青葶藶苦酒之類（雜十六）能復其陰氣也微用苦甚則無用酸苦折熱復陰若熱極發厥陽證似陰學者當以脉別之

（雜十七）問手足逆冷臍腹窒痛咽嗌痰嘔吐下利身體如被杖或冷汗煩渴脉細欲絕

此名陰毒也陰毒之爲病初得病手足冷背強咽痛糜粥不下毒氣攻心心腹痛短氣四肢厥逆嘔吐下利體如被杖宜服陰毒甘草湯（雜七）白术散（雜八）附子散（雜九）正陽散（雜十）肉桂散（雜十一）回陽丹（雜十二）返陰丹（雜十三）天樞散正元散退陰散（並雜十四）之類可選用之○大抵陰毒本因腎氣虛寒或因冷物傷脾外傷風寒內鬱伏陰外又感寒或先感外寒而內伏陰內外皆陰則陽氣不守遂發頭疼腰重腹痛眼睛疼身體倦怠四肢逆冷額上手背冷汗不止或多煩渴精神恍惚如有所失三二日間或可起行不甚覺重詐之則六脉俱沉細而疾尺部短小寸口脉或大（六脉俱浮大或沉取之大而不甚疾者并陰證也大抵陽毒傷寒其別多端而共數陰毒傷寒其脉沉細而弦疾不可知也若誤服凉藥則渴轉甚躁轉急有此病證者便須急服辛熱之藥一日或二日便安○若陰毒漸深

其候沉重四肢逆冷腹痛轉甚或咽喉不利心下脹滿結硬躁渴虛汗不止（陽盛則身熱而無汗陰盛則身熱理開喘靡爲之候仰汗不出而熱陰脉則身寒汗出身常清數慓而寒寒則厥）或時鄭重指甲面色青黑六脉沉細而疾一息七至已來有此證者速於氣海或關元二穴灸三二百壯以手足和煖爲効仍兼服正陽散回陽丹返陰丹天雄散白朮散內外通逐令陽氣復而大汗解矣（陰獨盛而陽氣暴絕則爲陰毒若陽獨盛而陰氣暴絕則爲陽毒力加陰陽離絕非大汗不能復其正氣也）○若陰毒已深疾勢困重六脉附骨取之方有按之即無一息八至已上或不可數至此則藥餌難爲攻矣

但於臍中用葱熨法（雜十五）或灼艾三五百以來手足不温者不可治也如得手足温更服前熱藥以助之若陰氣散陽氣來即漸減熱藥而調治之（陽氣下復往往却煩躁懊憹不可投涼藥煩躁甚者再與返陰丹即定常須識此勿令誤也）

問發躁狂走妄言面赤咽痛身斑斑若錦文或下利赤黃而脉洪實

此名陽毒也傷寒病若陽氣獨盛陰氣暴絕必發躁狂走妄言面赤咽痛身斑斑若錦文或下利赤黃脉洪實或滑促宜用酸苦之藥令陰氣復而大汗解矣

甘草苦酒湯（雜十六）　陽毒升麻湯（雜十七）　大黃散（雜十八）　梔

子仁湯（雜十九）黑奴圓（雜二十）可選而用之○近人治傷寒脉洪大內外結熱舌卷焦黑鼻中如煙煤則宜以水漬布薄之疊布數重新水漬之稍捩去水搭於胸上須臾蒸熱又漬令冷如前薄之仍數換新水日數十易熱甚者置病人於水中熱勢纔退則已亦良法也

（二十三）問病人潮熱獨語如見鬼狀發則不識人尋衣撮空直視微喘

仲景云傷寒若吐若下後不解不大便五六日上至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸牀惕而不安微喘直視但發熱讝語者大承氣湯主之（四）若一服利則止後服脉弦者生濇者死（弦者陽也濇者陰也陽證見陰脉者死病人有陽證而脉濇者慎不可下）

（二十三）問胸膈不快滿開塞唇青手足冷脉沉細少情緒或腹痛

此名太陰也近人多不識陰證纔見胸膈不快便投食藥非其治也大抵陰證者由冷物傷脾胃陰經受之也主胸膈膜滿面色及唇皆無色澤手足冷脉沉細少情緒亦不因嗜慾但內傷冷物或損動胃氣遂成陰證證復投巴豆之類胸膈愈不快或吐而利經一二日遂致不救蓋不知寒中太陰也太陰者脾之經

也○又問萬一飲食不節胸膈不快寒中陰經何法以治之荅云急作理中湯加青橘陳橘剉如麻豆大服一二劑胸膈即快枳實理中圓(雜八二)五積散(雜九一)尤良

二十四 問脉微細欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴此名少陰也少陰之爲病欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴者虛故引水自救若小便色白者少陰病形悉具小便白者以下焦虛有寒不能制水故令色白也四逆湯主之(四七五)○少陰病若口燥舌乾而渴者須急下之不可緩也大承氣湯主之(四二)若脉沉而遲者須温之四逆湯主之蓋以口燥而渴者知其熱脉沉而遲者別其寒也少陰屬腎古人謂之腎傷寒也腎傷寒口燥舌乾而渴者當急下大抵腎傷寒亦多表裏無熱但若煩憒默默而極不欲見光明有時腹痛其脉沉細舊用四順湯古人恨其熱不甚用云腎病而體猶有熱者可服仲景四逆散(正七六)若已十餘日下利不止手足徹冷乃無熱候可增損四順湯(雜百十九)○少陰病若惡寒而蜷時時自煩不欲厚衣者用去大黄大柴胡湯(正三七)○少陰病始得之反發熱脉沉者麻黄細辛附子湯(正三三)微汗之○少陰病得之二三日常見少陰無陽證者亦須微發汗宜麻黄附子甘草湯(正三二)此學者不可不知也

二十五 問身微熱煩躁面赤脉沉而微
此名陰證似陽也陰發躁熱發厥物極則反也大率以脉爲主諸數爲熱諸遲爲寒無如此最驗也假令身體微熱煩躁面赤其脉沉而微者皆陰證也身微熱者裏寒故也煩躁者陰盛故也面戴陽者下虛故也若醫者不看脉以虛陽上膈躁誤以爲實熱反與涼藥則氣消成大病矣外臺秘要云陰盛發躁名曰陰躁欲坐井中宜以熱藥治之仲景少陰證面赤者四逆加葱白主之

二十六 問手足逆冷而大便秘小便赤或大便黑

色脉沉而滑
此名陽證似陰也重陽必陰重陰必陽寒暑之變也假令手足逆冷而大便秘小便赤或大便黑色其脉沉而滑者皆陽證也輕者白虎湯〔正六四〕甚者承氣湯

〔正四二〕傷寒失下血氣不通令四肢逆冷此是伏熱深故厥亦深遠用大承氣〔正四一〕加分劑下之汗出立差
仲景所謂厥應下之者此也 ○兼熱厥與陰厥自不同熱厥者微厥即發熱若陰厥即不發熱四肢逆冷惡寒脉沉而細大小便滑泄矣

二十七 問身冷脉細沉疾煩躁而不飲水

此名陰盛隔陽也傷寒陰盛隔陽者病人身冷脉細沉疾煩躁而不飲水者是也若欲引飲者非也不欲飲水者宜服霹靂散（繩九二）須臾躁止得睡汗出卽差此藥通散寒氣然後熱氣上行汗出乃愈火熁散（第三）丹砂丸（雜二）並主之

（二十八）問手足逆冷

此名厥也厥者逆也陰陽不相順接手足逆冷也陽氣衰陰氣盛陰勝於陽故陽脉爲之逆不通於手足所以逆冷也傷寒熱多厥少者其病當愈厥多熱少者其病爲進○然有冷厥有熱厥當子細辯認○冷厥者初得病日便四肢逆冷脉沉微而不數足多攣卧而惡寒或自引衣蓋覆不飲水或下利清穀或清便自調（清便自調卽是大便如常）或小便數外證多惺惺而靜脉雖沉實按之遲而弱者知其冷厥也（四逆湯（正七五）理中湯（正七四）通脉四逆湯（正七九）當歸四逆加茱萸生薑湯（正八十）白通加豬膽汁湯（正九八）皆可選用也○）

熱厥者初中病必身熱乃至四五日方發厥兼熱頭痛外別有陽證至二三日熱氣深則方能發厥須在二三日後也若微厥卽發熱者熱微故也其脉雖沉伏按之而滑爲裏有熱其人或畏熱或飲水或揚手擲足煩躁不得眠大便秘

小便赤外證多昏憒者知其熱厥也（白虎湯正六四承用之仲景云傷寒一二日至四五日厥者必發熱前熱者後必厥厥深者熱亦深厥微者熱亦微厥應下之而反發汗者必口傷爛赤（熱厥當下故云厥應下之者若反發汗必口傷爛赤也）又有下證悉具而見四逆者是失下後血氣不通四肢便厥醫人不識却疑是陰厥復進熱藥禍如反掌大抵熱厥須脉沉伏而滑頭上有汗其手雖冷時復指爪温須便用承氣湯下之不可拘忌也（諸手足逆冷皆無厥陰不可下不可汗然有須下有須汗證者謂手足雖逆冷時有温時手足掌心必煖非正厥逆也當消息之）○若病人寒熱而厥面色不澤冒昧而兩手忽

無脉或一手無脉者必是有正汗也多用綿衣包手足令温暖急服五味子湯（雜九五）或兼與麻黄細辛甘草湯之類服之暫時必大汗而解矣○或傷寒厥逆而心下怔忡者宜先治水當服茯苓甘草湯（正五三）却治厥不爾水漬入胃必下利也○又有病人手足厥冷脉乍結者邪氣結在胸也心下滿而煩饑不能食者病在胸中當吐之宜瓜蒂散（正百十二）蓋病在胸中亦能令人手足厥但認脉乍結者是也（陰虛則結脉來緩時一止復來曰結主胸滿煩躁）○若傷寒發厥至七八日膚冷而躁無時暫安者爲藏厥此爲難治○又問仲景少陰四逆湯

又有四逆散何也荅曰大抵少陰病不可便用熱藥且如少陰病亦有表熱者仲景謂之腕發熱用麻黃細辛之類以發汗終不成少陰證便不得發汗耶今少陰病四肢冷亦有內熱者仲景用四逆散（正七七）是也四逆湯用附子乾薑而四逆散主四逆而其人或欬或悸或小便不利或腹中痛或泄利下重已上病皆熱證耳

（二十九）問吐長蟲此名蚘厥也蚘厥者藏寒蚘上入膈其人吐蚘也此是厥陰證或病人有寒復發其汗胃中冷及因發汗後身熱重發其汗胃中虛冷故長蟲蚘逆上先服理中圓（正七四）次用烏梅圓（正七六）

（三十）問身體重少氣陰腫入裏腹內絞痛熱上衝胸頭重不欲舉眼中生花婦人則裏急腰胯連腹內痛此名陰陽易也傷寒病新差陰陽氣未和因合房室則令人陰腫入腹絞痛婦人則裏急腰胯連腹內痛名爲陰陽易也其男子病新差未平復而婦人與之交接得病名曰陽易其婦人病新差未平復男子與之交接得病名曰陰易所以呼爲易者陰陽相感動

其毒疲著於人如換易然其病狀身體重熱上衝胷頭重不能舉眼中生花四肢拘急小腹絞痛手足拳則皆死其亦有不即死者病苦小腹裏急熱上衝胷頭重不欲舉百節解離經脉緩弱血氣虛骨髓枯竭便恍恍兪兪氣力轉小著牀而不能搖動起止仰人或引歲月方死燒褪散（正百十三）猴音加鼠糞湯（雜九六）竹皮湯乾薑湯青竹茹湯當歸白朮湯（並雜廿七）可選用之

增注類證活人書卷第四

增注類證活人書卷第五

此一卷論治法古人治傷寒有法非雜病之比五種不同六經各異陰陽傳受日數淺深藥劑温凉用有先後差之毫釐輕者危殆況不識法者乎傷寒唯兩感不治其餘證候雖感異氣能消息之無不愈者其有差失仲景所謂醫殺之耳知其法者若網在綱如此而汗如此而吐如此而下桂枝承氣瓜蒂四逆用之無不差唯其應汗而下爲痞爲結胷爲懊憹應下而汗爲亡陽爲譫語爲下厥上竭又有當温反吐療熱以温變證百出無復紀律

優擾萬緒起矣大抵傷於寒爲病熱孫真人云服
承氣湯得利差慎不中補也熱氣得補復成王叔
和云虛熱不可大攻之熱去則寒起二人之論疑
若相戾然熱氣有實有虛非深得仲景之意豈能
至此耶

問曰冬謂之傷寒春謂之温病夏謂之熱病
素問云冬三月是謂閉藏水冰地坼無擾乎陽又云
彼春之暖爲夏之暑彼秋之忿爲冬之怒是以嚴寒
冬令爲殺厲之氣君子善攝生當嚴寒之時行住坐
卧護身周密故不犯寒毒彼奔馳荷重勞房之人皆

辛苦之徒也當陽閉藏而反擾動之則鬱發厥理津
液強潰爲寒所薄膚腠緻密寒毒與榮衛相渾當是
之時壯者氣行則已炊者則着而成病矣其即時而
病者頭痛身疼肌膚熱而惡寒名曰傷寒其不即時
而病者寒毒藏於肌膚之間至春夏陽氣發生則寒
毒與陽氣相薄於榮衛之間其病與冬時即病無異
但因春温氣而變名曰温病因夏熱氣而變名曰熱
病温熱二名直以熱之多少爲義陽熱未盛爲寒所
制病名爲温陽熱已盛寒不能制病名爲熱故大醫
均謂之傷寒也

（三十二）問三日已前當汗三日已後當下古人云未滿三日者可汗而已其滿三日者可泄而已此大略之言耳病人有虛有實邪氣傳受遲速不等豈可拘以日數仲景云日數雖多但有表證而脉浮者由宜發汗日數雖少若有裏證而脉沉者即宜下之正應隨脉以汗下之（傷寒固有始得病便變陽盛之證須便下之又有朕理寒一二日便成少陰病者須急温之）又況六氣之邪乘虛入經自背得之則入太陽或入少陰（緣少陰有伏脉在背）自面感之則入陽明之類不必皆始於太陽兼寒邪有首尾止在一經或間傳一二經不可以一理推但據脉與外證治之此活法也假令有人脉浮頭項強痛發熱而惡寒每日如此不以日數多少止是太陽經受之其餘經絡皆倣此大抵傷寒憑脉與外證以汗下之若過日多脉尚大浮數按之不足者尚責太陽也可發汗而愈若按之實者汗之必死須下之而愈也若始得病脉細沉數外證或腹滿咽乾或口燥舌乾而渴爲正責屬裏可下之而愈若無此證但發熱脉沉者誤下必死須行麻黄附子甘草湯（正共二）小發汗此皆仲景之確論也

（三十三）問陽虛陰盛汗之則愈下之則死陽盛陰

外欬
內欬

虛汗之則死下之則愈

素問云陽虛則外寒陰虛則內熱陽盛則內熱陰盛則外寒故治傷寒者陽虛陰盛汗之則愈下之則死陽盛陰虛汗之則死下之則愈也陰陽虛盛非謂分脉尺寸也表陽也裏陰也外臺云表病裏和汗之則愈裏和表病下之則愈亦只是論表裏陰陽以汗下之

難經云陰陽虛實者說脉也素問云陰陽虛盛者說表裏也仲景論傷寒汗下故引素問去裏之義與外臺所論合矣○大抵榮衛爲表屬陽胃腑爲裏屬陰寒毒爭於榮衛之中必發熱而惡寒尺寸俱浮大內必不躁設有微煩其人飲食欲温而惡冷爲陽虛陰盛也汗之則愈誤下則死○若寒毒相薄於榮衛之內而陽勝陰衰極陰變陽寒盛生熱而陽熱之氣盛而入裏熱毒居胃水液乾涸燥糞結聚其人外不惡寒必蒸蒸發熱而躁甚則讝語其脉浮滑而數或洪實爲陽盛陰虛也下之則愈誤汗則死

謹按黃帝素問調經論云陽虛則外寒陰虛則內熱陽盛則外熱陰盛則內寒蓋陽主外而陰主內又曰陽虛陰盛汗出而愈下之則死陽盛陰虛汗出而死下之則愈今三十二問誤寫作陽盛則內熱陰盛則外寒竊詳內外寒熱不同則汗下差誤

便分死生又按將作監簿王宗正難經疏義有陰陽盛虛汗下圖與素問合以理考之此是三十三問誤寫合行刊正勿誤後人

三十四　問仲景有發汗者有和解之者

傷寒表證須看榮衛淺深故仲景有正發汗湯劑如麻黃湯〔正二十〕桂枝湯〔正十七〕大青龍湯〔正三五〕是也有和解其表如小青龍湯〔正三六〕桂枝麻黃各半湯〔正二一〕白虎湯〔正六四〕桂枝二越婢一湯〔正四一〕柴胡桂枝湯〔正二七〕小柴胡湯〔正九九〕之類是也後人不能深究寒熱淺深藥性緊慢一槩用藥因茲夭殤其間縱獲生全往往汗後虛之遂致勞復或變生百病淹引歲月卒至不救此皆由汗下過度陽並竭血氣竭損以致此禍如遇病輕但當和解之所謂和其榮衛以通津液令其自解也

三十五　問仲景有宜下之有微和其胃氣者

傷寒裏證須看熱氣淺深故仲景有宜下之如大承氣湯〔正四二〕小承氣湯〔正四三〕十棗湯〔正八九〕大柴胡湯〔正卅〕是也有微和其胃氣如調胃承氣湯〔正四三〕脾約圓〔闕〕少與小承氣〔正四三〕微和之之類是也金匱玉函云虛者十補勿一瀉強實者瀉之虛實等者瀉勿大洩之

故王叔和序傷寒有承氣之戒○又問轉藥孰緊荅曰大承氣最緊小承氣次之調胃承氣又次之大柴胡又次之仲景治法蕩蘇熱積皆用湯液不得用圓子藥不可不知也

十六 問傷寒一日頭疼口乾煩滿而渴二日腹滿身熱不欲食譫語三日耳聾囊縮而厥水漿不入三日知人

此名兩感傷寒也兩感病也太陽與少陰表裏俱病者表裏俱傷為表裏陽明與太陰表裏少陰與厥陰為表裏陽雙傳臟腑俱病此

十七 問傷寒已經發汗吐下仍不解古人調之壞病

陽與少陰俱病則頭痛口乾煩滿而渴二日陽明與太陰俱病則腹滿身熱不欲食譫語三日少陽與厥陰俱病則耳聾囊縮而厥仲景無治法但云兩感病俱作治有先後發表攻裏本自不同尋至第三卷中言傷寒下之後復下利不止身疼痛者當急救裏宜四逆湯〔正七五〕復身體疼痛清便自調者急當救表宜桂枝湯〔正一〕遂以意尋此倣倣治兩感有先後宜先救裏若陽氣內正即可醫也內才正急當救表蓋內尤為急才温內則急救表亦不可緩也

十七

仲景云太陽病三日已發汗若吐若下若温鍼仍不解者爲壞病桂枝不中與也當知何逆隨證治之又云太陽病不解轉入少陽者脇下鞕滿乾嘔不能食往來寒熱尚未吐下其脉沉緊者可與小柴胡湯[甄]若已吐下發汗小柴胡證罷此爲壞病知犯何逆以法治之蓋爲病中又感異氣變爲壞病以時令寒暑燥濕風氣不節脉息與少陽相異（小柴胡證候與傷寒不同麻黄桂枝不中與也明當消息其由以法治之若脉尺寸俱盛重感於寒變爲温瘧）（先熱後寒名曰温瘧在第六卷四十四問）陽脉濡弱陰脉弦緊更遇温氣變爲温疫（一歲之中長幼疾狀多相似感四時不正之氣在第六卷四十六問）脉證之變不同仲景謂温病之脉行在諸經不知何經之動隨其經而取之也又有傷寒過經再受熱邪留畜腑病候多變久而不差陰陽無復綱紀及傷寒解後虛羸少氣皆名壞傷寒也（如母麻黄湯[雜七]鰲甲散[雜七]黑奴圓[雜二十]檢方與病證相參選用之若傷寒解後虛羸少氣逆吐者竹葉石膏湯[雜七]之）

汗出在第六卷四十五問）陽脉數陰脉實大更遇温熱變爲温毒爲病最重（春月毒在肉發斑名曰温毒在第五十一問）陽脉濡弱陰脉弦緊更遇温氣變爲温疫（一歲之中長幼疾狀多相似感四時不正之氣在第六卷四十六問）脉證之變不同仲景謂温病之脉行在諸經不知何經之動隨其經而取之也又有傷寒過經再受熱邪留畜腑病候多變久而不差陰陽無復綱紀及傷寒解後虛羸少氣皆名壞傷寒也（如母麻黄湯[雜七]鰲甲散[雜七]黑奴圓[雜二十]檢方與病證相參選用之若傷寒解後虛羸少氣逆吐者竹葉石膏湯[雜七]之）

增注類證活人書卷第六

此一卷論傷寒傷風熱病中暑濕病濕瘧風濕濕疫中濕濕溫痙病溫毒之名天下之事名定而實辨言順則事成又況傷寒之名種種不同若識其名縱有差失功有淺深效有遲速耳不得其名妄加治療往往中暑乃作熱病治之反用濕藥濕濕乃作風濕治之復加發汗名實混淆是非紛亂性命之寄危於風燭今於逐問下詳載疾狀而名之曰某病庶幾因名識病因病識證如暗得明胷中曉然而處病不差矣

[二十八] 問脉浮而緊濇頭疼身體拘急惡寒無汗寒多熱少面色慘而不舒腰脊疼痛手足指末微厥不煩躁此名傷寒也傷寒之候發熱惡寒頭疼腰脊痛脉緊無汗宜發汗而解麻黃湯[正二]（又入參朮散[雜三七]麻黃菊根湯[雜廿二]可選而用之）○然太陽病亦有熱多寒少者須子細看脉與證也熱多寒少不嘔清便自可宜桂枝麻黃各半湯[正三]脉浮者雖熱多寒少自可發汗若脉弱者無陽也桂枝二越婢一湯主之[正四]熱多寒少而大脉遲者桑

氣不足血少故也先以小建中湯[正三七]加黃耆最良尺脉尚遲再作一劑○或太陽證宜汗而其人適失血及下利則頻頻與少桂枝湯[正乙]使體潤漐漐連日當自解○假如淋家衄血家法不可汗亦可以小柴胡[正十九]之類和解之

[二十九] 問脉浮而緩寸大而尺弱自汗體熱頭疼惡風熱多寒少其面光而不慘煩躁手足不冷此名傷風也傷風之候頭疼發熱脉緩汗出惡風當須解肌宜桂枝湯主之[正乙]輕者只與柴胡桂枝湯

此論本於傷寒總病論卷之三頁背

(正卅二)敗毒散(雜卅三)獨活散(雜卅四)可選用之治太陽中風有汗用桂枝湯(九脉緊必無汗唯濡而緩者方可用桂枝也)項背強(正卅七)須是脉浮而緩(正十八)本草葛根主傷風有濕開腠解肌蓋桂枝加葛根者謂中湯也(正卅八)亦宜飲水者是也凡發汗後汗不止爲漏風桂枝加附子湯也(正十六)裏寒者桂枝去芍藥加附子湯主之(正十七)腹滿者太陰證脉浮者可服桂枝湯微發汗腹痛者桂枝加芍藥湯(正十三)痛甚者桂枝加大黃湯也(正十一)雖然桂枝湯自西北二方居人四時行之無不應驗自江淮間唯冬及春初可行自春末及夏至已前桂枝證可加黃芩半兩(陽旦湯是也雜百十六)夏至後有桂枝證可加知母一兩石膏二兩或加升麻半兩若病人素虛寒者正用古方不在加減也(岐伯所謂同病異治者此也大抵用溫藥當避春用熱藥當避夏用溫涼間別溫涼間別熱遠熱者也)○又問傷寒與傷風何以別之傷寒者脉緊而澁傷風者脉浮而緩(傷寒脉澁故也)傷風者有汗傷寒者無汗傷寒者畏寒不畏風傷風者畏風不畏寒大抵太陽病者必脉浮發熱惡風惡寒也惡寒者不當風而自增寒惡風者當風而增寒也六經皆有傷寒傷風其證各異太陽脉浮有汗爲中風脉緊無汗爲傷寒陽明善饑爲中風不食爲傷寒少陽兩耳聾目赤胸滿而煩爲中

風口苦咽乾目眩爲傷寒若三陰傷風無變異形證但四肢煩疼餘證同三陽

(四十) 問有發熱惡寒煩躁手足温而脉反浮緊者有寒多熱少不煩躁手足微冷而脉反浮緩者

此名傷風見寒脉傷寒見風脉也蓋發熱惡風煩躁手足温爲中風候脉浮緊爲傷寒脉是中風見寒脉也寒多熱少不煩躁手足微厥爲傷寒候脉浮緩爲中風脉是傷寒見風脉也中風見寒脉傷寒見風脉宜服大青龍湯(正卅五)蓋大青龍證脉似桂枝反無汗

病似麻黄反煩躁是也脉緊不煩躁爲麻黄證 大青龍湯治病與麻黄湯證相似但病尤重而又加煩躁者用大青龍湯也以其中風并傷寒俱盛故青龍湯添麻黄作六兩又似合桂枝湯藥味在内添石膏所以爲異此治榮衛俱病若證不審誤用大青龍湯則發汗多傷人(以其有煩躁一證故可用大青龍湯)大抵感外風者爲傷風感寒冷者爲傷寒故風則傷衛寒則傷榮桂枝主傷衛麻黄主傷榮衛俱傷故也(風傷衛者病在皮膚之間也以衛行脉外爲陽主外皮膚之間衛氣之道路故也其病淺寒傷榮者寒氣中於肌肉也以榮行脉中爲陰主内肌肉之間榮氣之道路故也其病深所以桂枝與麻黄所施各異戒勿誤用以有淺

深之別風寒之殊大醫當宜審諦大青龍亦宜慎用風者不可服青龍服之則厥逆筋惕肉瞤此爲逆也類篡云凡發汗過多筋惕肉瞤振搖動人或虛羸之人微汗出便有此證俱宜服真武湯（正旨五）以救之羸甚者芍藥或量多少與之愈熱藥者去附子餘依加減法仲景製真武湯乃爲合用桂枝卽用麻黃之類發汗多亡陽有此證故用真武湯若調理順者無此證也

（問十一）問夏月發熱惡寒頭疼身體支節痛重其脈洪盛者

此名熱病也冬傷於寒因暑氣而發爲熱病治熱病與傷寒同有汗宜桂枝湯（正旨七）無汗宜麻黃湯（正旨十）加煩躁者宜大青龍湯（正旨五）然夏月藥性須帶涼不可太温桂枝麻黃大青龍須用加減法夏至前桂枝加黃芩半兩夏至後桂枝麻黃大青龍加知母一兩石膏二兩或加升麻半兩也蓋桂枝麻黃湯性熱地暖之處非西北之比夏月服之必有發黃斑出之失入臟腑者桂枝石膏湯主之（雜病五）此方夏至後代桂枝證用若加麻黃半兩可代麻黃青龍湯用也古方三月至夏爲晚發傷寒梔子升麻湯（雜病六）亦可選用之（又問夏至後皆可行白虎湯耶白虎湯治中暑與汗後一解表藥耳（今之醫者見六月中病多云中暑不敢用藥大凡病在內最難調治白虎湯尤宜戒之

按此說本于總病論卷一之三頁面

(四十二) 問夏月自汗惡寒身熱而渴其脉微弱者此名中暑也大抵中暑與熱病外證相似但熱病者脉盛中暑者脉虛以此別之甲乙經云脉盛身寒得之傷寒脉虛身熱得之傷暑蓋寒傷形而不傷氣所以脉盛熱傷氣而不傷形所以脉虛傷寒即身體支節痛重其脉洪盛按之有力此是冬月感寒深至夏發耳中暑即背寒面垢(其面如塗油膩氣不揚證也一名面塵若塵埃之著面)手足微冷煩渴口燥但覺倦怠四肢却不痛重其脉微弱按之無力白虎湯主之(正六四)痰逆惡寒者橘皮湯主之(雜四一)不惡寒者竹葉湯主之(正九五)頭疼惡心煩躁心下不快者五苓散(正六六)最妙○又問中暑何故洒然毛聳惡寒苔曰經云四時八風之中人也因有寒暑寒則皮膚急腠理閉暑則皮膚緩腠理開開則洒然寒閉則熱而悶近人多不明中暑或作熱病法治之復用溫熱藥必致發黃斑出更爲畜血尤宜戒之

(四十三) 問夏至已前發熱惡寒頭疼身體痛其脉浮緊此名溫病也春月傷寒謂之溫病冬傷於寒輕者夏至已前發爲溫病蓋因春溫暖之氣而發也(又非溫疫也)

治温病與冬月傷寒夏月熱病不同蓋熱輕故也（春初秋末陽氣在裏其病稍輕縱不用藥治之五六日亦自安）升麻湯（雜一）解肌湯（正三九）柴胡桂枝湯（正三一）最良熱多者小柴胡加桂枝也嘿者小柴胡加不渴外有微熱者小柴胡加五味子也或煩渴發熱不惡寒與虛煩者並竹葉石膏湯（正九五）次第服之麻黄桂枝大青龍唯西北二方四時行之無有不驗若江淮間地偏暖處唯冬月及正初乃可用正方自春未至夏至已前桂枝麻黄大青龍内宜加減也（加減法在熱病門）

（四十四）問病人先熱後寒尺寸脉俱盛此名温瘧也先熱後寒名曰温瘧病人尺寸俱盛重感於寒變成温瘧小柴胡湯主之（正二九）瘧疾寒熱期等及先熱後寒者但宜與小柴胡湯先寒後熱者小柴胡加桂湯（雜三九）有多寒但熱者白虎加桂湯（雜四十）有多熱但熱者白虎加桂薑湯（雜四二）有汗多煩渴小便赤澁素有瘴氣及不伏水土嘔吐甚者可服五苓散（正六六）脉小緊寒熱嘔吐間日頻日發作無時大便秘者可服大柴胡湯下之（正三十）脉浮大寒熱往來者可服祛邪丸吐之（雜四三）久不愈者服瘧毋煎圓（雜四二）當自愈治瘧之法無以過也○大抵瘧脉自弦弦數者

多熱弦遲者多寒弦小緊者可下之弦遲者可温之弦緊者可發汗浮者可吐之夏傷於暑秋必病瘧此非傷寒之謂以其壞傷寒有温瘧一證故因而及之

(四十五) 問脉尺寸俱浮頭疼身熱常自汗出體重其息必喘四支不收嘿嘿但欲眠

此名風温也其人素傷於風因復傷於熱風熱相薄即發風温主四支不收(左傳曰風淫末疾)頭疼身熱常自汗出不解治在少陰厥陰(少陰火厥陰風)不可發汗發汗即譫言獨語內煩躁擾不得眠若驚癎目亂無精療之者復發其汗如此死者醫殺之也風温不可發汗宜麥

雞湯(雜四五) 風温身灼熱者知母乾葛湯(雜四六) 風温加渴甚者栝蔞根湯(雜四七) 風温脉浮身重汗出漢防己湯(雜四八)

(四十六) 問一歲之中長幼疾狀多相似此名温疫也四時皆有不正之氣春夏亦有寒清時秋冬或有暄暑時人感疫厲之氣故一歲之中病無長少率相似者此則時行之氣俗謂之天行是也老君神明散(雜四九) 務成子螢火圓聖散子(並雜五〇) 收毒散

(雜四九之冬氣温春氣寒夏氣冷秋氣熱爲時氣時氣與傷寒同而治有異者蓋因四時不正之氣而變更不拘以日數淺深汗吐下隨證施行所以聖散子不問表裏陰陽者此也雖聖散子性差熱用者宜詳之)

若春應暖而清氣折之則青邪在肝（三四月或有暴寒其時陽氣尚弱爲寒所折病熱猶輕升麻葛根湯（雜五八）解肌散（雜五二）解肌湯主之（雜五三）半夏桂枝甘草湯（雜五二）可選而用之）夏應暑而寒氣折之則青邪在心（五月六月陽氣已盛爲寒所折病熱則重調中湯（雜五二）朮干湯（雜五三）半夏桂枝甘草湯（雜五二）可選而用之）秋應涼而反大熱抑之則青邪在肺（濕熱相薄民多病癉癉者黃也宜白虎加蒼木湯（雜百十七）煎茵蔯汁調五苓散（雜五六）冬應寒而反大溫抑之則青邪在腎（其冬有非節之暖者名爲冬溫此爲春時陽氣發於冬時則伏寒變爲溫病宜萎蕤湯（雜四五）仲景云冬溫之毒與傷寒大異蓋傷寒者傷寒氣而作冬溫者感溫氣而作寒疫者暴寒折人非觸冒之過其治法不同所施寒熱溫涼之劑亦異不可拘以日數發汗吐下隨證施行要之治熱以寒溫而行之治寒以熱涼而行之治溫以清冷而行之治清以溫熱而行之以平爲期不可以過此爲大法

問一（四十七）身盡痛發熱身黃小便不利大便反快者

此名中濕也風雨襲虛山澤蒸氣人多中濕濕流關節須身體煩痛其脉沉緩爲中濕（脉細者非也）主一身盡痛發熱身黃小便自利者不附湯（正七十）若小便不利大便反快當利其小便宜甘草附子湯（正七二）五苓散（正六六）主之（真要論云治濕之法不利小便非其治也金匱要畧云濕家身煩痛可與麻黃湯

加白朮四分發其汗慎不可以火攻之濕家雖身體痛不可太發汗汗出則作痙大抵中濕者水濕之蒸氣及汗出當風取冷過度或中霧露與風寒氣合者日痺皆由中於濕而後挾以異氣其寒多者爲痛爲浮腫非附子桂朮不能去也其風多者爲煩熱爲流走爲拘急非麻黃薏苡烏頭輩不能散也其中氣者亭歷朮不能泄也

(四十八) 問支體痛重不可轉側額上微汗不欲去被或身微腫

此名風濕也脉浮爲風濕是風氣與濕氣相薄肢體痛重不可轉側額上微汗不欲去被或身微腫欲發汗但鬱鬱身潤則風濕俱去若大發其汗則風氣去濕氣在矣麻黃杏子薏苡甘草湯(雜五四)防已黃蓍

(四十五) 桂枝附子湯(正六九) 桂枝加白朮湯甘草附子湯(正七二) 朮附湯(正七三) 杏仁湯(雜五六) 敗毒散(雜廿三) 可選而用之身腫者甘草附子湯加防風

(四十九) 問兩脛逆冷臍腹滿多汗頭目痛苦妄言

此名濕溫也其人嘗傷於濕因而中暑濕熱相薄則發濕溫病苦兩脛逆冷腹滿又臍多汗頭目痛苦妄言其脉陽濡而弱陰小而急治在太陰脾屬土主濕不可發汗汗出必不能言耳聾不知痛所在身青面色變名曰重腸如此死者醫殺之耳白虎加蒼朮湯(雜百七) 主之 少方出傷寒微指亦依金匱白虎加桂湯雜四十

五十 問發熱惡寒頸項強急腰身體反張屬太陽經先因
狀或痙癎口噤

此名痓也傷風頸項強急身體反張屬太陽經先因傷風又感寒濕而致然也古人謂之痓病痓音幾又作痙（反痓者強直也古人以強直爲痓金匱要略太陽病其身體几几便爲痓也）外證發熱惡寒與傷寒相似但其脈沉遲弦細而項背反張強硬如發癎之狀此爲異耳（新産血虛多汗出喜中風亦有此證）當察其有汗無汗以分剛痓柔痓（無汗惡寒名剛痓有汗不惡寒名柔痓）無汗葛根湯（正十八）主之（本草葛根）有汗桂枝加葛根湯（正十八）主傷風有汗開竅解肌（桂枝湯見前）几剛柔二痓小續命湯（雜五七）並可與之有汗者小續命湯去麻黃加葛根也若審知剛痓胃滿口噤其人卧不着席脇下急急咬齒當行大承氣湯（正四七）（外臺云熱而痓者死熱病痓者反折瘈瘲函縈齡也）又問剛柔二痓與陰陽二痓是如何痓亦作痙陽痓屬剛痓陰痓屬柔痓附术散（雜五八）桂心白术湯（雜五九）竹子防風散（雜六十）八物白术散（雜六七）桂枝煮散可選而用之（活人續集解惑論云合面而卧因濕家發汗多則發痓也）

五十一 問初春病人肌肉發斑癮疹如錦紋或咳心悶但嘔清汁

此名温毒也温毒發斑者冬時觸冒疹毒至春始發

病初在表或已發汗吐下而表證未罷毒氣不散故發斑黑高主之又有冬月温煖人感垂戾之氣冬未即病至春或被積寒所折毒氣不得泄至天氣暄熱温毒始發則肌肉斑爛癮疹如錦紋而咳心悶但嘔清汁葛根橘皮湯主之（雜九四）黄連橘皮湯（雜百廿五）九佳

增注類證活人書第七

此一卷論痰證食積虛煩腳氣斑傷寒相似實非傷寒也所謂朱紫相陵玉石不分醫者處病滅裂見其發熱惡寒往往作傷寒治之發汗吐下固茲天横者多矣今特立一門別而論之庶幾覽者知其非傷寒也

（附）問曰增寒發熱惡風自汗寸口脉浮胷膈痞滿氣上衝咽喉不得息而頭不疼項不強此爲有痰也中脘有痰亦令人憎寒發熱胷膈痞滿有類傷寒但頭不疼項不強爲異宜服柴胡半夏湯

(雜六二)金沸草散(雜六三)大半夏湯(雜六四)若氣上衝咽狹不得息者用瓜蒂散吐之古法服瓜蒂散(正百十二)凡服壹錢匕藥下便即欲吐且忍之良久不吐取參錢匕湯二合和服以手指摘之便吐矣不吐復稍增之以吐爲度若吐少病不除明日如前法再服之可至再三不可令人虛也藥力過時不吐者啜熱湯一升以助藥力吐訖便可食無復餘毒若服藥過多者飲水解之

(五十二)問頭痛脉數發熱惡寒而身不痛左手脉平和

此名食積也傷食亦令人頭痛脉數發熱但驗左手人迎脉平和身不疼痛者是也甲乙經云人迎盛緊傷於寒氣口盛緊傷於食(左手關前一分者人迎之位也右手關前一分者氣口之位也)蓋人迎主外氣口主中以此別之傷食之證田脾胃伏熱因食不消發熱似傷寒却身不疼痛此爲異耳若膈實嘔吐者食在上脘宜吐之若心腹滿痛者宜下之治中湯(雜百五)五積散(雜九二)黑神圓(雜六七)可選而用也

(五十三)問不惡寒身不痛頭不疼脉不緊但煩熱者此名虛煩也諸虛煩熱與傷寒相似然不惡寒身不

疼痛故知非傷寒也不可發汗頭不痛脉不緊數故知非裏實也不可下如此者內外皆不可攻攻之必遂損竭多死也此虛煩但當與竹葉湯(正九五)若嘔者宜橘皮湯(脚氣七)一劑不愈再與之孫真人云此法數用甚有効傷寒虛煩亦宜服之王叔和云有熱不可大攻之熱去則寒起正宜服竹葉湯

(三十四)問傷寒頭疼身熱支節痛大便秘或嘔逆而脚屈弱者

此名脚氣也傷寒只傳足經不傳手經地之寒暑風濕皆作蒸氣足常履之遂成脚氣所以病證與傷寒相近其脉浮而弱有起於風濕而弱者起於濕洪而數者起於熱弦而遲而澁者起於寒風者汗而愈濕者温而愈熱者下而愈寒者裏而愈脚氣之病始得不覺因他病乃知毒氣入心則小腹頑痺不仁令人嘔吐死在朝夕矣然終是與傷寒不同者孫真人云卒起脚屈弱不能轉動有此爲異耳要之有脚氣之人先從脚起或先緩弱疼痺(寒氣勝者爲痛痺有寒故痛也)或行起忽倒或兩脛腫痛亦有不腫者或脚膝枯細或心中忪悸或小腹不仁(病久入深)榮衛之行濇皮膚不禁故爲不仁不仁者皮頑不知有無也或舉體轉筋或見食嘔逆惡聞食氣或胷滿氣急或遍體酸痛皆脚氣候也黃帝所謂緩風濕痺是也頑弱名緩風疼痛爲濕

痺痺者閉也閉而不仁故曰痺也寒中三陽所患必冷（越婢湯雞六五）主之小續命煎湯成旋入生薑自然汁最快（小續命湯雞七二）暑中三陰所患必熱（小續命湯去附子減桂一半大煩躁者紫雪最良）大便秘者（脾約丸雞六十六神功丸雞六十八五柔丸雞六九大三脫散雞七十）主之脚氣之疾皆由氣實而始終無一人以服藥致虛而殂者頭痛身熱支節痛而脚屈發者是其人素有脚氣此時發動也脚腫者（烏頭湯雞七十一）主之脚氣方論千金外臺最詳此不復敘大抵越婢湯小續命湯薏苡仁酒法（雞七三）脾約神功圓皆要藥也仍鍼灸爲佳服補藥與用湯淋洗者皆醫之大禁也

增注類證活人書卷第七

增注類證活人書卷第八

此一卷論發熱大抵傷寒寒多易治熱多難愈傷寒發熱者以其寒極則生熱治法多用冷藥故令熱不去仲景熱多寒少用桂枝二越婢一湯不渴外有微熱者用小柴胡加桂湯皆温表之義也近時多行小柴胡湯不問陰陽表裏凡傷寒家皆令服之此藥差寒不可輕用雖不若大柴胡湯小承氣湯之緊然藥病不相主其爲害一也往往因服小柴胡湯而成陰證者甚多仲景雖云傷寒中風有柴胡證但見一證便是不必悉具此爲是少陽

證當服小柴胡不必少陽證悉具耳況本方又有加減隨證增損古人方治審諦如此後人妄投良可怪也

問發熱

發熱而惡寒者屬太陽病必發熱而惡寒蓋寒氣留於外皮膚緻密則太陽主氣以温皮膚分內滿湯(正方三五)主之若發熱微惡寒者桂枝二越婢一湯(正方四)主之若叶利而發熱惡寒者宜桂枝二越婢一湯(正方四)主之若叶利太陽病發熱而渴不惡寒為温病若發汗已身體灼熱者為風温也

發熱汗出濈然者屬陽明也陽明病脉浮者宜桂枝(正方一)微汗之脉實者調胃承氣湯下之(正方四十七)蓋汗多發熱者胃汁乾故也仲景云太陽證汗後不惡寒但熱者實也當和其胃氣宜調胃承氣湯(正四三)太陽病三日發汗不解蒸蒸發熱者屬於胃也宜下之

○脉細頭疼嘔而發熱者屬少陽也少陽發熱小柴胡湯主之(正五)不可發汗發汗發熱小柴胡湯主之(正五九)不可發汗發汗即讝語

○病人不渴外有微熱者小柴胡加桂也(雜二九)小柴胡加桂主表熱最良此法不特傷寒也仲景表有熱者小柴胡加桂也裏有熱者白虎加人參也(正五五)大抵身熱不渴者為表熱也口燥煩渴者為裏熱也二藥均治發熱然分表裏才可不知

○發汗已身均熱者名風温素問云汗出而身熱者風熱也其人素傷於風因復傷於熱風熱相薄自汗出此名風温在第六卷第七問也

○病人無表裏證發熱七八日脉雖浮數宜大柴胡湯下之(正方三大便秘者加大黄)

○假令已下脉數不解今熱則消穀善饑至六七日不大便者有瘀血也抵當湯主之(正九二)

○若

傷寒差後更發熱者小柴胡湯（正二十九）主之（脉浮者以汗解脉實者可下之）○又問陰證有發熱者乎太陰厥陰皆不發熱只少陰發熱有二證仲景謂之反發熱也少陰病初得之發熱脉沉者麻黄細辛附子湯（正廿三）主之（少陰病脉沉發汗則動經此大略之言耳脉應裏而發熱在表者當以小青之藥泄汗而温散也仲景云傷寒之病從風寒得之表中風寒入裏而不消須用温藥少汗而解）少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脉不出者通脉四逆湯主之（正八十二）大抵陰證發熱終是不同脉須沉或下利手足厥也

（四十四）問熱多寒少有三證有熱多寒少而不嘔清便自

尺

可者有熱多寒少而脉微弱者有熱多寒少而大脉遲者其用藥皆不同也○太陽病八九日如瘧狀熱多寒少不嘔清便自可宜桂枝麻黄各半湯（正方二）○熱多寒少而不嘔清便自可宜桂枝二越婢一湯（正方四）主之（若脉浮雖熱多寒少亦自可發汗也）○熱多寒少而尺中遲者血少也先以小建中加黄者（正卅七）以養其血尺尚遲再作一劑然後睟時用小柴胡湯（正二十九）桂枝二越婢一湯（正方四）葦小劑隨證治之

（五十三）問潮熱

潮熱者大率當下仲景云潮熱者實也大承氣湯證

云其熱不潮未可與也則知潮熱當下無疑矣雖然更看脉與外證脉若弦若浮及外證惡寒猶有表證且與小柴胡湯以解之（正二十九）若腹大滿不通者可與小承氣（正二十三）微和其胃氣勿令大泄也（仲景云日晡發熱者屬陽明也脉實者大承氣（正四二）胡也（正三）脉虛者桂枝也（正方二）縱使潮熱當行大承氣亦須先少與小承氣若不轉失氣不可攻之後發熱復硬者大柴胡下之（正二十）○若胷脇滿而嘔日晡發潮熱者小柴胡加芒硝（正二十四）主之○又有日晡發潮熱已而微利者又有微發潮熱而咳逆者皆當用小柴胡也（仲景云日晡發熱屬陽明也（正十九）傷寒十三日不解胷脇滿而嘔日晡

發潮熱已而微利（朝熱者實也先服小柴胡以解外後以柴胡加芒硝湯下之陽明潮熱大便溏胷滿不去者小柴胡湯主之○冬陽明潮熱當行黃芩湯（冬陽明病脉浮而緊必發胡湯主之潮熱發作有時但脉浮者必盜汗黃芩湯主之（正二十五）已上潮熱並屬陽明也○太陽有潮熱乎仲景大陷胷湯一證（正二十六）結胷有潮熱者為大結胷屬太陽也

（五十八）問往來寒熱者陰陽相勝也陽不足則先寒後熱陰不足則先熱後寒

往來寒熱有三證小柴胡湯大柴胡湯柴胡桂枝散薑湯○有表證而往來寒熱者用小柴胡也（正二十九）○有裏證而往來寒熱者大柴胡也（正二十）○已表或已

下而往來寒熱者皆可用柴胡桂枝乾薑湯也〔正三〕

○仲景云血弱氣盡腠理開邪氣因入與正氣分爭往來寒熱休作有時小柴胡主之又云傷寒五六日中風往來寒熱胷脇苦滿默默不欲食心煩喜嘔或胷煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞鞕或心下悸小便不利或不渴身有微熱或欬者小柴胡主之傷寒十餘日熱結在裏往來寒熱者大柴胡主之傷寒五六日已發汗復下之胷脇滿小便不利渴而不嘔頭汗出往來寒熱心煩柴胡桂枝乾薑湯也

形證似瘧有太陽證有陽明證有婦人熱入血室證

○太陽證服桂枝湯〔正方二〕大汗出脉洪大者與桂枝湯如前法若形似瘧一日再發者汗出必解宜桂枝二麻黃一湯〔正三〕傷寒八九日如瘧狀熱多寒少其人不嘔清便欲自可日一二發者麻黃桂枝各半湯

太陽證形似瘧寒熱等者與桂枝二麻黃一湯熱多寒少者麻黃桂枝各半湯〔正方三〕○有陽明證病人煩熱汗出如瘧狀日晡發熱而脉浮虛者與桂枝湯脉實者宜承氣湯〔正四二〕○婦人熱入血室其血必結故使如瘧狀小柴胡湯主之〔正二十九〕

問汗之而寒熱者

太陰證發汗後依前寒熱者須看脉如何若脉浮數或洪大則表證猶在當再表也如桂枝湯〔正方一〕或桂枝二麻黃一〔正方三〕之類醫人爲見已汗或已下而發寒熱不除再表誤矣蓋脉浮爲在表表之必愈也○或得汗而解復如瘧狀日晡而發者此屬陽明也若脉實者可下之宜大柴胡〔正三十〕大承氣〔正方四二〕也○若發汗後只惡寒者虛也發汗後只發熱者實也只惡寒屬芍藥甘草附子湯〔正方四三〕○若厥陰證太汗出熱不去內拘急四肢疼又下利厥逆而惡寒者四逆湯主之〔正十五〕只發熱屬胃承氣湯〔正七二〕

問汗之而仍發熱者

素問云溫病汗出輒復熱而脉躁疾不爲汗衰狂言不能食謂之陰陽交交者死今不與汗相應是不勝其病也其死明矣大抵病人得汗而脉靜者生今汗之而仍發熱者若脉浮數則表證猶在汗之必愈也〔仲景云發汗解半日許復熱煩脉浮數者可更發汗宜桂枝湯一正一〕發汗後不敢再表者爲脉沉實耳脉若浮者須再汗也發汗後不惡寒只發熱脉沉實或狂語此爲胃實陽盛卽不可再汗也須當下之設令下後又不解表裏邪亦衰矣〔仲景云太陽病三日發汗不解蒸蒸發熱

者宜調胃承氣湯(正四十三)和其胃氣也太醫云若傷寒得汗後熱不退發昏及狂言者便可用承氣湯(正四十三)下之立愈未差再服若汗後熱不解但心下痞嘔逆又自利大柴胡去大黃主之(正方三七)○又有太陽證合行桂枝却用麻黃之類發汗多亡陽仍發熱者真武湯(正方一百五)主之○更有風温一證初得病發熱而渴不惡寒雖發汗已身灼熱者爲風温屬萎蕤湯(雜四十五)岐伯所謂風熱也○若傷寒得汗後病解虛羸微熱不去可行竹葉石膏湯(正方九五)隨其虛實而治之

(附十二) 問下之而熱不退者勞復食復附

仲景云病人脉微而濇爲醫所病大發其汗使陽氣微又大下之使陰氣弱其人亡血病當惡寒後乃發熱無休止時蓋陽微則惡寒陰弱則發熱陽微惡寒四逆湯主之(正七十五)陰弱發熱爲內熱葶藶苦酒湯主之(雜方十六)大抵傷寒八日已上大發熱者此爲難治(仲景云脉陰陽俱虛熱不止者死)又有醫人多用圓子藥下之身熱不去微煩者梔子乾薑湯主之(正方四九)傷寒五六日太下之後身熱不去心中結痛者未欲解也梔子豉湯主之(正方四五)○又問傷寒差後發熱者何也此名勞復也病新差血氣尚虛津液未復因勞動生熱熱氣既還復入經絡名曰勞復仲景云傷寒差已後更發熱

小柴胡湯主之（正二十九）脉浮者以汗解宜柴胡桂枝湯（正方三十一）脉實者宜大柴胡湯（正方三十）又大病差後勞復者枳實梔子湯主之（正方九十六）麥門冬湯（雜二百三）雄鼠屎湯（雜七十七）七味葱白湯（雜二百十八）皆可選用○又食復者大病新差脾胃尚弱穀氣未復強食過多停積不化因爾發熱名曰食復（大抵新病差多因傷食便作病乾噫食臭腹中雷鳴下利等證可與生薑瀉心湯（正方六十三）仲景於枳實梔子湯證云若有宿食內大黃如薄基子五六枚服之愈（黃帝曰熱病已愈時有所遺者何也岐伯曰諸遺者熱甚而強食故有所遺也帝曰善治遺奈何岐伯曰視其虛實調其逆從可使必已食而復多食則遺此其禁也）

增注類證活人書卷第九

此一卷首論惡寒太抵太陽病必發熱而惡寒若寒家慎不可過當覆衣被及近火氣寒熱相薄脉道沉伏愈令病人寒不可過但去被徹火兼飲以和表之藥自然不惡寒矣婦人惡寒尤不可近火寒氣入腹血室結聚鍼藥所不能治矣

（附十二）

問惡寒

惡寒有二證發熱而惡寒者發於陽也無熱而惡寒者發於陰也發於陽者宜解表陰必浮數屬桂枝湯（正方一）桂枝二越婢一湯（正四）麻黃湯（正方二十）青龍湯（正方二十七）

證也發於陰者宜温裏脉必沉細屬理中湯（正方七十四）
逆湯（正方七十三）證也少陰病下利已惡寒而蹉手足温者
可治宜速與四逆湯下之（正方三十七）若少陰病惡寒
用大柴胡湯下之（正方三十八）若發熱微惡寒者屬柴胡
桂枝湯也（正方一）發汗後反惡寒者虚故也屬芍藥甘
草附子湯（正方七十二）脉微而惡寒者此陰陽俱虚也不可
更吐下也發汗面色赤有熱者為欲解宜桂枝麻黄
各半湯（正方二）傷寒大下後復發其汗心下痞惡寒者
表未解也不可攻其痞當先解表表解乃可攻痞解
表宜桂枝湯（正方一）攻痞太黄黄連瀉心湯（正方五十九）雖然
太陽陽明少陰皆有惡寒要之太陽病或已發熱或

未發熱必惡寒也陽明證俱宜下唯惡寒中寒為病
在經與太陽合病屬表發其汗耳若吐若下後七八
日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡寒者白虎證也
（正方七十四）○又問有汗出惡寒者有汗出多而微惡寒者
有頭汗出而微惡寒者何也仲景云太陽病其人發
熱汗出復惡寒不嘔但心下痞者此以醫下之也當
下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之（正方六十）陽明
病脉遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜桂枝
湯也（正方一）頭汗出而微惡寒者屬少陽宜小柴胡湯
也（正方二十九）○又問背惡寒者何也背惡寒有兩證三陽

合病背惡寒者口中燥舌乾也少陰病背惡寒者口中和也以此別之口中不仁口燥舌乾而背惡寒者附子湯主之（正方六）仍灸之（仲景云少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之附子湯主之）

問惡風

惡風者衛中四時之虛風所以惡風也其人當汗出而脉緩也數與桂枝湯（正方一）桂枝加葛根湯（正方十六）使遍體微潤連日當自解矣○又有太陽病發汗多亡陽遂漏不止衛虛而惡風惡風者當温其經也其人惡風小便難四肢微急難以屈伸者桂枝加附子也（正方二）

○若傷寒四五日身熱惡風頸項強脇下滿手足温而渴者小柴胡湯也（正方七）○風濕相薄骨節疼煩掣痛不得屈伸汗出短氣小便不利惡風不欲去衣成身微腫者甘草附子湯主之（正方十二）

問傷寒不得汗

甲乙經云熱病脉常躁盛而不得汗者此陽脉之極也死脉盛躁而得汗者生大抵傷寒榮衛俱病則無汗麻黄湯（正方三）大青龍湯（正方三四）葱豉湯（正方七四）葛根湯（正方七十）可選而用之○若傷寒連服湯劑而汗不出者

原出總病論卷二方外於猶在也

或如中風法蒸之温熱之氣於外迎之無不得汗也薪火燒地良久掃除去火可以水洒之取麤沙拍葉桃葉糠麩皆可用相和鋪燒地上可臥手厚上鋪席令病人當上臥温覆之夏月熱只布單覆之汗移時並至候周身至胸心皆汗蒸蒸乃用温粉撲止汗移上牀最得力者垂沙桃柏葉也無垂沙亦得單桃葉葉亦得荊藩亦可用麩糠乃助添令多尔不用亦得

○傷寒亦有氣虛不能作汗其身必痒宜桂枝麻黄各半湯主之（正方二）陽明病法多汗反無汗如蟲行皮中狀者此久虛故也（宜未有附房先生者建中湯（正方三十七）

問曰傷寒無汗者七證自汗者九證太陽傷寒剛痙病無汗類麻黄湯之證然類麻黄湯者只證脈微細為異也又汗出為陽微發熱汗出為陽盛脈浮緊為陰陽俱緊而反汗出為出為陰陽屬少陰經也汗藏無從病時發熱自汗出時發汗則愈屬桂枝也正方一太陽病發熱汗出者此為榮弱衛強故汗出欲救風邪者宜桂枝湯又云病常自汗出此為榮氣和者外不諧也以衛氣不共榮氣諧故尔以榮行脈中衛行脈外復發其汗榮衛和則愈傷風自汗太陽病出惡風脈緩為中風屬桂枝湯（正方二）又云太陽病項背強几几反汗出惡風桂枝加葛根湯（正方十二）主之汗出而渴者五苓散（正方二十）不渴者茯苓甘草湯（正五十三）雖然仲景云傷風自汗用桂枝然桂枝湯難用須是孑細消息之假令傷風自汗桂枝湯服後無桂枝脉息證候而煩者即不可再服也若傷風自汗出而小便數者切下可與桂枝也仲景云太陽病自汗四肢難以屈伸若小便難者可桂

温字祇

枝湯內加附子服之(正方云)若小便數者慎不可與桂
枝附子湯宜服芍藥甘草湯(正方云)若悞行桂枝附子
汝表便咽乾煩燥欲嘔吐作甘草乾薑湯(正五十五)與
之以復其陽若厥愈足温與作芍藥甘草湯與之其
腳即伸若胃氣不和讝語者與調胃承氣湯(正四十三)微
溏則止其讝語緣芍藥甘草湯主脉浮自汗小便數
者十口脉浮爲風大爲温風則生微熱寔則兩脛攣
小便數仍汗出爲津液少不可悞用桂枝宜服芍藥
甘草補虛退風熱通治誤服桂枝湯後病證仍存者
温病若發汗已身灼熱者名風温風温爲病脉陰陽
俱浮自汗出身重多睡鼻息必鼾語言難属蓋緣
湯(難五)中濕自汗 難經云何以知傷濕得之然當寺
知賢入心爲汗出不可止也 汗出不可止何以言之腎主濕故
虎湯(正六十四)陽明病自汗 太陽中熱者喝是也其人
者不可與五苓散以汗出惡寒反惡熱濕濕然汗自出者
故也故仲景云陽明病發熱汗多者急下之腎主濕故
其人汗多以津液外出胃中燥大便必硬讝語者爲
調胃承氣湯(正四十三)雖然陽明汗多急下若小便自利
者此爲津液内竭雖尔不可攻之須自大便導之宜
用蜜煎導法(正五十三)陽明病汗出而脉遲微惡寒者表
未解也宜桂枝湯(正方)陽明法多汗則脉浮無汗而喘者發汗則愈宜麻黄湯(正方二七)亡陽自汗
太陽病發汗多遂漏不止其人惡風當温其經宜桂
枝加附子湯(正方六)傷寒尺寸脉俱緊而汗出者亡陽
也此屬少陰法當咽痛而復吐利其人熱不去内拘
急四肢疼惡寒者四逆湯(正七十五)主之汗多不止必惡風煩躁不得
止者可用温粉撲之若汗多不止者四逆湯(正七十五)主之汗多亡
卧者先服防風白朮牡蠣湯(正六十七)次服小建中湯(正三十七)
柔痓自汗 太陽病發熱脉沉細揣頭口噤背反張汗
出而不惡寒者名柔痓小續命湯主之也
雜五十七 霍亂自汗 吐利汗出發熱惡寒四肢拘急
手足厥冷者四逆湯主之(正七十五)雖然
少陰不得有汗而少陰亦有反自汗出之證(陰證四
額上及手背冷汗濕藏者亡陽也 陽明病法多汗而陽明亦有反無

汗之證不可不察也

問頭汗出

病人表實裏虛玄府不開則陽氣上出汗見於頭凡頭汗出者五內乾枯胞中空虛津液少也慎不可下之者謂之重虛然頭汗出者有數證傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便鞕脉細者此為陽微結必有表復有裏也脉沉亦有裏汗出為陽微假令純陰結不得復有外證悉入在裏此為半在裏半在外也脉雖沉緊不得為少陰病所以然者陰不得有汗今頭汗出故知非少陰也（小柴胡）

注文非頭汗恐誤且虛實字未錯

主之（正方九十二）○傷寒五六日已汗下胷脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此表未解也柴胡桂枝乾薑湯主之（正方三十二）病人但頭汗出身無汗劑頸而還小便不利渴引水漿者此為瘀熱在裏身必發黃（五苓散茵蔯湯正方九十三）○陽明病下之其外有熱手足温不結胸心中懊憹饑不能食但頭汗出者（梔子豉湯主之正方五十四）○心下緊滿無大熱頭汗出者（茯苓湯主之正方八十四）仲景云傷寒此名為水結在胸脇以頭汗出故知非少陰也心下緊滿無大熱但頭汗出者水結證小半夏加茯苓湯主之（雜方八十二）○陽明病下血讝語者為熱入血室但頭汗出者刺期門隨其實而瀉之汗出則愈（汗出讝語者有燥屎也過經乃可下也下之早語言必亂以表實裏虛故也）

問頭疼

頭疼者陽證也太陽證頭疼必發熱惡寒無汗者麻黃湯（正方三十）有汗者桂枝湯若已發汗或未發汗頭痛如破者連鬚葱白湯（雜方五十五）服湯不止者葛根葱白湯主之（毫廿六）脉弦細頭痛發熱者屬少陽也少陽不可發汗小柴胡主之（正方九）陽明證頭疼不惡寒反惡熱胃實故也陽明氣實故攻頭也調胃承氣湯（正四十二）主之仲景云傷寒不大便六七日頭疼有熱者與承氣湯其小便清者知不在裏猶在表也當須發汗若頭疼者必劇屬柱枝湯（正方二）太陰少陰經從足至胸俱不至頭唯厥陰經挾胃屬肝絡循喉嚨上頏顙連目出額

太陰少陰並無頭疼之證仲景只有厥陰一證吳茱萸湯（正方五）治乾嘔吐涎沫頭疼而已大抵屬三陽者頭疼爲多也（孫真人云陽傷寒者謂熱頭疼是也陰傷寒者不壯熱不頭痛是也）若非次頭疼會中滿及發寒熱脉緊而不大者即是膈上有涎宜用瓜蒂末一錢暖水調下吐涎立愈○又問病人頭疼鼻塞而煩者何證也此屬濕家頭中寒濕故鼻塞而頭疼也（瓜蒂末鼻中則愈法在發黃門中并附）

問身體痛

太陽少陰厥陰皆有身體痛當以外證與脉別之太陽證表未解脉浮緊法當身體痛宜麻黃湯（正方三）以

汗之脈浮緊當身體疼痛宜以汗解假令尺脈遲者不可發汗何以知其然榮氣不足血少故也尺脈遲者先以小建中湯以養之（正三十七）脈浮者脈黃湯主之太陽中濕一身盡痛發熱身黃小便不利病人中濕因而傷風風濕相薄一身痛重是名風濕當於風濕中求之（麻黃加朮湯主之雜方百二十三）若脈沉自利而身體痛者陰證也急當救裏宜四逆湯（正三十五）附子湯（正三十八）真武湯（百一五）之類以温之（大抵大便利而身體疼者當救裏大便如常而身體痛者急當救表此不可不知也）或身重背強腹中絞痛咽喉不利身如被杖者當作陰毒治之○又問發汗後身疼脈沉遲當用何藥仲景有桂枝加芍藥生薑人參新加湯（正方十二）蓋爲此證也小建中湯

（正三十六）無治汗後身疼脈沉而遲者若霍亂吐瀉止而身疼痛不休者少與桂枝湯（正方二）即愈金匱要略云瘡家雖身體痛不可發汗汗出則痙○又問身痒者何也脈浮而遲遲爲無陽不能作汗其身必痒太陽病七八日脈微而惡寒以陰陽俱虛不可更發汗更下更吐也（小柴胡湯主之正二十五若重發汗則氣虛必兩耳聾無聞柴胡湯主之正二十三若重發汗則氣虛聾無聞柴胡湯主之正二十三若有熱人可苗著建中湯（正三十七）面赤有熱者未欲解也以其不能得小汗出身必當痒宜桂枝麻黃各半湯（正方二）

（七十）問筋惕肉瞤頭眩身搖太陽病發汗不解發熱心悸頭眩身瞤動欲擗地者

屬真武湯〔正百五〕大凡發汗過多卽身瞤動振搖虛羸之人微發汗便有此證俱宜服真武湯羸甚者去芍藥或少用之有熱證惡熱藥者去附子餘依本方如減法詳之○傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝奮起則頭眩脈沉緊發汗則動經身爲振搖者茯苓桂枝白朮甘草湯主之〔正方五十二〕○傷寒應發汗而動氣在左不可發汗發汗則頭眩汗出筋惕肉瞤此爲逆難治且先服防風白朮牡蠣散〔新方三〕次服建中湯〔正三十七〕

問喘

傷寒喘只有太陽陽明二證○太陽病頭疼發熱身

疼惡風無汗而喘者宜汗止脉促者表未解也喘而汗出者葛根黃芩黃連湯主之〔正二十六〕太陽病下之微喘者表未解故也桂枝加厚朴杏子湯也〔正方九〕發汗後喘無大熱者可與麻黃杏子甘草石膏湯也〔正方二十二〕○陽明病汗出不惡寒腹滿而喘有潮熱者宜下屬承氣湯〔正四十三〕然陽明病脉浮無汗而喘發汗則愈宜麻黃湯〔正方三〕○太陽與陽明合病喘而胸滿者不可下宜麻黃湯○又發汗後飲水多欬而微喘者水停心下腎氣乘心故也小青龍去麻黃加杏仁〔正三十六〕○小腹滿者去麻黃加茯苓也〔正三十六〕又問麻黃主喘何故去之此治心下有水而喘不留汗也小便不利小腹滿故去麻黃加茯苓也

問渴

脉浮而渴屬太陽傷寒表不解心下有水氣而渴者
陽病服桂枝大汗出後大煩渴者白虎加人參〔正三十六〕太
脉浮小便不利微熱消渴者五苓散〔正六十五〕陽寒四五
日身熱惡風脅下滿手足温而渴者小柴胡去半夏
加人參括樓根〔正三十九〕太陽證身体灼熱而渴者
爲風温括樓根湯〔正九十五〕陽明病但頭汗出小便
不利渴引水漿身必發黃宜茵蔯湯〔正九十三〕小柴胡去
半夏加人參括樓根〔正三十九〕傷風寒熱或發熱惡風而渴屬少陽
陰傷寒熱入於臟流於腑故渴而引飲少陰下
下利欲飲水者以有熱故也白頭翁湯主之〔正三十五〕
○切戒太陽證無汗而渴者不可與白虎耶太陽證得汗後脉洪大
而渴者方可與之也陽明病渴終不可與五苓耶陽
明證小便不利汗少脉浮而渴者方可與之此皆仲
景之妙法也仲景猪苓湯證亦云脉浮發熱渴欲
飲水小便不利者猪苓湯與之〔正六十七〕○
凡病非大渴不可與水若小渴咽乾者只小呷滋潤
之令胃中和若大渴煩躁甚能飲一斗者與五升飲
之若全不與則乾燥無由作汗發喘而死常人見因

文出傷寒例
引金匱誤

渴飲水得汗小渴遂劇飲之致停飲心下滿結喘死者甚衆當以五苓散（正六十六）或陌胷丸（正三十九）與之（金匱要略）

云得時氣至五六日而飲欲飲水不得多不當與也何者以腹中熱尚少不能消之便更爲人作病矣至七八日大渴欲飲水猶當依證與之常令不足勿極意也凡人但見仲景云得病反能飲水此爲欲愈漸漸小渴者乃強飲之因成其禍不可勝數大抵傷寒水氣皆因飲水過多所致水停心下氣上乘心則爲悸氣喘結於胷胃中虛冷則爲嘔漬上迫於肺則爲咳清入腸中則爲利邪熱所薄畜於下焦則爲小便不利小便滿或裏急蓋於皮膚則爲腫（○若陽毒倍當躁盛大渴者黑奴老主之（雜方二十）

不差其人發渴不已酒蒸黃連丸主之（雜方十九）

（七十三）

問鼻衄

傷寒太陽證衄血者乃解蓋陽氣重故也仲景所謂陽盛則衄若脉浮緊無汗服麻黃湯也衄後脉已微者不可行麻黃湯也若脉浮人發煩目瞑劇者必衄小衄而脉尚浮緊者宜再與麻黃湯（正七）不中病桂枝湯（正七）不中病其自汗服桂枝湯也衄後脉已微致衄小衄而脉尚浮者宜再與桂枝也衄後脉已微者不可行桂枝湯也大抵傷寒衄血不可發汗者爲脉微故也（治法衄家不可發汗汗出額上陷脉緊急直視不能瞬不得眠然而無汗而衄脉尚浮緩者須再與桂枝湯脉已微者黃芩芍藥湯（雜七十八）犀角地黃湯（雜八十五）衄血不止者芧花湯（雜方八十）

若劒而渴心煩飲則吐水先服五苓散（正方六二）次服竹葉湯（正九十五）○又問陰證有劒血者乎陰證自無熱何緣有劒若少陰病但厥無汗強發之必動血未知從何道出或從口鼻或從耳目是謂下厥上竭爲難治

（正九十四）問腹滿身重難以轉側口中不仁面垢讝語遺尿

此三陽經公病也白虎湯主之（正六十四）不可發汗汗之則讝語下則額上生汗手足厥冷若自汗出者白虎加人參（正又第二問論合此）

增注類證活人書卷第十

此一卷首論結胸與痞蓋病發於陽下之早即爲結胸發於陰下之早即爲痞然結胸與痞相似但按以痛不痛爲異耳心下滿而硬痛者爲結胸但按之滿不痛者爲痞醫家不審一有差互立致危殆結胸屬陽胸胃證痞屬瀉心證其詳各於逐問備論之矣

（正九十五）問心下緊滿按之石硬而痛此名結胸也傷寒本無結胸應身熱下之早熱氣乘虛而入痞結不散便成結胸（若已誤轉了初未成結胸者急頻與理中湯服

正七十四自然解了更不作結胸蓋理中治中焦故也此古人亦說不到後因人消息得之若大段轉損有厥證者兼與四逆湯正七十五便安胃中雖和傷寒未退者即候日數足可下却以承氣再下之正四十二蓋前來下得未是故也其證心下緊滿按之石硬而痛頂強如柔痓狀發熱汗出不惡寒名曰柔痓其脉寸口浮關尺皆沉或沉緊名曰結胸也治結胸大率當下仲景云下之則和然脉浮與大小陷胸湯正方四十大抵脉浮是尚有表證無以小柴胡湯等正三十九先發表證罷方用下結胸藥便安○然脉浮與大皆不可下下之則厥尚宜發汗也仲景云結胸脉浮者不可下只可用西晉崔行功云傷寒結胸欲絶心膈高起手不得近用大陷胸湯正三十八皆不差者此是下後虛逆氣已不理而毒復上攻氣毒相薄結於胸中當用枳實理中

圓機活人書　卷十一

先理其氣次療諸疾古今用之如神應手而愈○然結胸有三種有大結胸按之心下痛為小結胸正三十九有小結胸按之心下痛為小結胸正四十有水結在胸脇問亦名結胸頭微汗出但結胸無大熱此水結在小柴胡去柔加牡蠣主之正三十九○又有寒熱二證有熱實結胸胸中煩躁心內懊憹舌上燥渴脉沉滑者皆熱證也大陷胸湯主之正三十八有寒實結胸寒實結胸無熱證者三物白散正八十心枳實理中丸主之雜方八十二近世治結胸多行金鍼先用硫黃陽起石者若寒實結胸行之或有差者若熱實結胸行之必死也○又問大陷胸湯與大陷胸丸如何大陷胸用甘遂太峻不可輕用須量虛實輕重不

得已即大陷胸丸最穩○又問聖餅子炙臍中如何此尤不可用也○又云臓結無陽證不往來寒熱其人反靜舌上胎滑者不可攻也二者病人脇下舊有痞連在臍傍痛引小腹入陰筋者亦名臓結死不治○又問臓結者何也臓結者死仲景無治法大抵臓結其證如結胸狀飲食如故時時下利陽脉浮關脉小細沉緊名曰臓結舌上白胎滑者難治也

問心下滿而不痛

此名痞也傷寒本無痞應身冷醫反下之遂成痞枳實理中丸（雜八十二）最良（仲景治痞氣諸湯中有生薑瀉心湯（正六十三）半夏瀉心湯（正六十二）此二方平和宜常用之）仲景云滿而不痛者爲痞柴胡不中與也半夏瀉心湯主之（此湯藥味與本理中人參甘草湯方也）審知是痞先用桔梗枳殼湯尤妙（雜八十三）緣桔梗枳殼行氣下膈先用之無不驗也結胸與痞關脉須皆沉○若關脉浮者大黃黃連黃芩瀉心湯（三方五九）主之（關浮則結熱三黃以瀉肝）若復惡寒汗出者附子瀉心湯（三方六十）主之○病人心下痞與瀉心湯痞不解發渴口燥煩小便不利者五苓散（正六十五）主之○汗出表解而胃中不和心下痞鞕乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者生薑瀉心湯主之（正六十三）○下利日數十行穀不化腹中雷鳴心

下痞鞕而滿此以醫下之也若復下之其痞益甚甘草瀉心湯主之（正六十三）蓋此非結熱以胃中虛客氣上逆故使鞕也○下利而心下痞服生薑瀉心湯利不止者當治其下焦赤石脂禹餘粮湯主之（正二百九）蓋生薑瀉心甘草瀉心皆治中焦此利在下焦若只治中焦則利益甚耳服赤石脂禹餘粮湯利復不止當利其小便五苓散主之○凡痞服瀉心湯不愈然後可用陷胸丸（正三十九）下之（不可用陷胸湯蓋太猛只用陷胸丸）○大抵結胸與痞皆應下然表未解者不可攻也仲景云當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯（正方）攻痞宜大黃黃連瀉心湯（正五九外證未解心下妨悶者非痞也謂之支結柴胡桂枝湯主之（正三十二）胸脇滿微結小柴胡湯加乾薑牡礪湯主之（正三九）○若太陽證未除而數下之遂協熱而利利不止心下痞鞕表裏不解者桂枝人參湯主之（正方十六）十棗湯（正八十九）大柴胡湯（正三十

皆治心下痞此方尤難用須是表證罷不惡寒身涼其人漐漐汗出發作有時頭疼心下痞鞕滿引脇下疼乾嘔短氣者乃可行十棗湯表未解者愼不可用也大柴胡湯治傷寒發熱汗出不解心下痞鞕嘔吐而下利者非大柴胡湯不可也（正方三十）○若發汗吐下後心下痞鞕噫氣不除者旋復代赭湯主之（正方）○

有旋復代赭湯證其人或欬逆氣虛者先服四逆湯
[正七十五] 胃寒者先服理中丸 [正七十四] 次服旋復代赭湯爲
良 旋復花代赭湯是
醉後心下痞鞕證
[正七十七] 問嘔者 乾嘔附
無陽則厥無陰則嘔嘔者足陽明胃之經足陽明之
氣下行今厥而上行故爲氣逆逆則嘔仲景云嘔
多雖不大便不可下可與小柴胡湯 [正二十九] 上焦得通
津液得下胃氣因和汗出而解大抵嘔證不一
各有治法要之小柴胡湯尤相主當耳與小柴胡湯
胸脇滿而嘔日晡發潮執者可小柴胡湯加芒硝也

七卷無桔梗湯百二十有官局桔梗湯知十七卷當作十八卷

若嘔不止心下急鬱鬱微煩者與大柴胡湯也
[正二十] 大便秘老方加大黃仲景治嘔最妙爲內有
氣須是去大黃仲景云嘔多雖有陽明慎不可下
官局桔梗湯最良亦用枳實故也枳實去痞壓虛
人治嘔多用半夏生薑孫真人云生薑是嘔家聖藥
仲景治嘔皆用之 太陽與陽明合病必下利若不利
[正二十七] 胸中有熱胃中有邪氣但嘔者葛根加半夏生薑湯主之
[正八十三] 太陽與少陽合病而自利若嘔者黃連湯主
[正八十六] 金匱諸嘔吐穀不得下者小半夏湯小半
夏加茯苓湯 [雜八十三] 小半夏加橘皮湯皆可選用也嘔
而發熱者小柴胡湯主之 [正六十七] 嘔而發渴者猪苓湯
主之 [正七十九] 先嘔却渴者此爲欲解急與之先渴却嘔

者爲水停心下此屬飲家仲景云本渴飲水而嘔者
柴胡不中與也宜治膈間有水赤茯苓湯主之〔雜十四〕
若少陰證而嘔者真武湯去附子加生薑也〔正二百一五〕
若汗若吐若下後虛煩不得眠若嘔者梔子生薑湯
〔正四十七〕主之傷寒差後嘔者有餘熱在胃脘竹葉湯加
生薑主之〔正九十五〕○又問有乾嘔者何也大凡嘔者飲
食不下乾嘔者今人所謂啞也或因汗出或因有水
或因下利脾胃有熱故使乾嘔官舍中桔梗湯最佳
〔雜方一百十二〕伸景治法汗自出乾嘔者桂枝證也〔正九十二〕未
不解心下有水氣乾嘔發熱者小青龍也〔正三十六〕身京

汗出兩脇痛或乾嘔者十棗湯也〔正八十九〕少陰下利脈
微與白通湯〔正方九十〕利不止厥逆無脈乾嘔煩者白通
加猪膽汁湯也〔正九十八〕少陰下利裏寒外熱脈乾欲絶
或乾嘔者通脈四逆湯也〔正八十一〕乾嘔吐涎味頭痛者
吳茱萸湯也〔正方百二十陽寒詩云食欲嘔屬陽明也吳茱萸湯主之得湯又劇者屬上焦也仲景無治法入胃而嘔屬陽明官與小柴胡湯〔正三十九〕○若病人直
患嘔吐而復脚弱或疼乃是脚氣當作脚氣治之法在

〔七十八〕問吐

吐有冷熱二證寸口脈數手心熱煩渴而吐以有熱

在胃脘五苓散主之〔正六十六〕傷寒有表證渴欲飲水也水入口即吐者名曰水逆由心經受熱而小腸不利故也宜服五苓散發汗後水藥不得入口爲逆若更發汗必吐下不止小半夏加茯苓湯大半夏加橘皮湯主之曾經汗下關脉遲胃中虛冷而吐乾薑黃芩黃連人參湯主之〔正方二百〕寒多不飲水而吐者理中湯去朮加生薑主之〔正七十四〕少陰病飲食入口則吐心中温温欲吐復不能吐始得之手足寒脉弦遲者此胸中實不可下也當吐之若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也當温之宜四逆湯〔正方七五〕吐利手足逆冷煩躁甚者吳茱萸湯主之〔正方二百〕若傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐竹葉石膏湯主之〔正方九十五〕

問嘔吐而利

嘔吐而下利有兩證仲景云傷寒發熱汗出不解心中痞硬嘔吐而下利者大柴胡湯下之〔正方三十〕又有霍亂證霍亂嘔吐而利熱多而渴者五苓散〔正方六十六〕寒多不飲水者理中丸〔正七十四一或有下利脚轉筋理中湯加附子一枚生用細末作湯服之正方七十四〕吐利汗出發熱惡寒四支拘急手足厥冷者四逆湯主之〔正七十五〕少陰病吐利手足逆冷煩躁欲死吳茱萸湯主之〔正方二百〕吐利止而身體痛不休者當消息和解其外宜桂枝湯〔正方二十一景云傷寒大柴胡一湯云傷寒發熱汗出不解心中痞嘔吐而下利者大柴胡主之即非霍亂也〕吐利已汗出而厥四支

拘急不解脉微欲絕者通脉四逆加猪膽湯(厥十二)若
夏月中暑霍亂上吐下利心腹撮痛大渴煩躁四支
逆冷冷汗自出兩脚轉筋宜服香薷散(雜十五)須井中
沉冷極冷頓服之乃効(香薷散夏月預宜合下以備
冷併服之 此證其他藥不能救仍須極

(六十一) 問咳嗽

傷寒咳嗽有兩證有太陽證咳嗽真武湯(正二百五)四逆散(正七十六)
胡也(正一十九)有少陰證咳嗽小青龍(正三十六)小柴
猪苓湯也(厥十七)大抵熱在上焦其人必飲水水停心
下則肺爲之浮肺主於咳水氣乘之故咳而微喘○
仲景云傷寒表不解心下有水乾嘔發熱而咳小
龍湯主之(小便不利小腹滿者去麻黃加茯苓)往來寒熱胸脇滿痛或
咳者小柴胡湯主之(小柴胡去人參大棗加五味子乾薑)若少陰證咳
嗽四支沉重疼痛小便不利自下利而咳真武湯主
之(真武湯加五味子乾薑大抵傷寒水氣皆因飲水過多古人治水氣而咳者病在陰則小青龍湯主之病在陽則小柴胡湯主之)四支厥逆腹中痛或泄利而咳四逆散
主之(四逆散加五味子乾薑)下利六七日欬而嘔渴心煩不得
眠猪苓湯主之○古今錄驗橘皮湯治嗽佳(雜方一百二十四)

(六十一) 問咽喉痛

咽喉痛有陰陽二證脉浮數面赤斑斑如錦文咽喉

痛噦膿血者此陽毒也（在第四卷中第四問）脉沉遲手足厥冷或吐利而咽中痛此少陰證也病源云此爲下部脉都不至陰陽隔絶邪客於足少陰之絡毒氣上衝故咽喉不利或痛而生瘡也傷寒脉陰陽俱緊及汗出者亡陽也此屬少陰法當咽痛而復吐利此候汗下熏熨俱不可汗出者蔾本粉傳之咽喉痛者甘草湯（正五十四）桔梗湯（正方五百二）猪膚湯（正方五百三）半夏散（正方五百四）通脉四逆去芍藥加桔梗湯（正方五百五）可選而用之○又有伏氣之病謂非時有暴寒中人伏氣於少陰經始不覺病旬月乃發脉微弱法先咽痛似傷寒非喉痺之病次必下利始用半夏桂甘湯（補五十三）次四逆散主之（正七十六）此病只一二日便差古方謂之腎傷寒也

（八十二）問曰燥咽乾脾臟有熱則津液枯少故令口燥而舌乾仲景云傷寒無大熱口燥渴而煩背微寒者白虎湯加人參也（正六十五）又云陽明病渴欲飲水口乾舌燥者白虎加人參湯主之○若咽乾者慎不可發汗發汗則重亡津液少陽證口苦咽乾者小柴胡主之（正二十九）少陰證口燥咽乾者急下之病人默默欲睡目不能開起居不

安其聲嗄或咽乾者當作狐惑治之（狐惑證在第十一卷第十三問）

（八十三）問病人但漱水不欲入咽者必衄也陽明證頭疼身熱口燥但漱水不欲嚥若病人無表證不發寒熱胸腹滿唇燥但欲漱水不欲嚥者此爲有瘀血必發狂也輕者犀角地黃湯（醫）甚者抵當湯（正九十一）

（八十四）問不欲眠

太陽證發汗大汗出胃中乾煩躁不得眠欲飲水者當少少與之胃中和即愈若脉浮小便不利發渴者五苓散（正六十六）主之下後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表證脉沉微身無大熱者乾薑附子湯主之（正七十三）若發汗若吐若下後虛煩不得眠劇則反覆顛倒心中懊憹者宜梔子豉湯（正四十五）吐之梔子豉湯一盞半爲一劑分再服一服得吐止後服（傷寒）傷寒大熱乾嘔呻吟錯語不得眠黃連解毒湯主之（雜八十七）傷寒吐下後心煩乏氣晝夜不得眠酸棗湯主之（雜八十八）少陰病得之二三日已上心中煩不得眠黃連阿膠湯主之（雜百四）若少陰病下利而渴不得眠猪苓湯主之（正六十七）○又問傷寒差後不得眠何也蓋熱氣與諸陽相并陰氣未復所以病後仍不得睡也梔子烏梅湯主之（雜八十九）

(八十五) 問多眠

多眠有四證有風溫證有小柴胡證有少陰證有狐惑證○病人尺寸脉俱浮頭疼身熱常自汗出體重其息必喘四支不收默默但欲眠者風溫證也風溫不可發汗宜葵子湯(雜四十五 在第六卷中第四十五問)○病人脉浮頭項強痛而惡寒者太陽證也十日已去脉浮細而嗜卧者外已解也設胷滿脇痛者與小柴胡湯(正二十九)脉但浮者麻黄湯主之(正二十)病人尺寸脉俱沉細但欲寐者少陰證也急作四逆湯(正七十五)復其陽不可緩也○若狀如傷寒四支沉重忽忽喜眠須看上下脣上脣有瘡虫蝕五臟下脣有瘡虫蝕下部當作狐惑治之(在第十一卷中第十三問)

(八十六) 問身凉汗出兩脇疼痛或乾嘔

此十棗湯證也仲景云太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人槩槩汗出發作有時頭痛心中痞鞕滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裏未和也十棗湯主之(正八十九)○大抵脇下痛者此爲有飲須分表裏乾嘔微利發熱而咳爲表有水小青龍湯加薤花主之(正三十六)身體凉表證罷乾嘔而脇下痛爲裏有水十棗湯主之十棗湯非小青龍湯之比須量

人虛實不可妄投