



傷寒活人書

十一
十五



武
236
3



冊七
236
卷 9

增注類證活人書卷第十

杏林
杏林
杏林

增注類證活人書卷第十

杏林

杏林

杏林

此一卷首論咳逆傷寒咳逆此證極惡仲景經中
不載孫真人云咳逆遍尋方論無此名稱深窮其
狀咳逆者噦逆之名蓋古人以咳逆為噦耳大抵
咳逆者古人所謂噦是也哕者今人所謂乾嘔是也

〔二十七〕 問咳逆

咳逆者仲景所謂噦者是也

乙芮切
逆氣

噦胃寒所生傷

寒本虛攻其熱必噦又云傷寒大吐下之極虛復發
汗者其人外拂鬱復與之水以發其汗因得噦所以
然者胃中寒故也橘皮乾薑湯解方在羌活附子散隱

半夏生薑湯

雜方十三

退陰散主之

雜方十四

若服藥不差者

灸之必愈

其法婦人屈乳頭向下盡處骨間灸三壯丈夫及乳小者以一指為率正以男左女

右艾炷如小豆許與乳相直間隔中動脈處是然亦有陽證咳逆者小柴胡

湯

正十九 橘皮竹茹湯

雜方五

仲景又云傷寒噦而腹滿

視其前後知何部不利利之即愈

仲景無方前部宜猪苓湯

宜調四月承氣湯

正十三

扁鵲中藏經治傷寒咳逆丁香散丁香

稀蒂各一分甘草良薑各半錢沸湯點作一服乘熱

猛喫極効○三因第十一卷又有竹茹湯等方亦丁

香散方竹茹湯治陽證也○本事方第八卷治傷寒

候咳逆豆蔻湯治陰證咳逆丁香茴香肉豆蔻等藥

若陽證不可用○凡咳逆多有先熱而喫生冷或涼

藥多相激而成蓋陰陽二氣相搏林人之僕本發大

熱以涼藥下之想大甚咳逆四五日竟至於服丁香

稀蒂而后却再以小柴胡之屬解其餘熱遂愈下后

蓋有身熱不解○治傷寒咳逆後二方出撫州華蓋

山周先生惟一備急方救急方香附子橘核各半兩

細剉用酒半盞先將藥在石銀器內炒漸漸滴酒炒

藥焦黃色研細末每二錢水一小盞煎至八分細細

旋呷服○一方單用香附子末○又方大蒜頭二箇

煨動研爆入白薑末

左得為度

研和如梧桐子大搗薤菜

自然汁吞下二十圓病退再服一十五圓

問發黃

病寒濕在裏不散熱畜於脾胃腠理不開瘀熱與宿穀相薄鬱蒸不消化故發黃

漢贊南方暑濕近夏人以黃為癰濕熱相薄然發黃與瘀血外證及脉俱

相似但小便不利為黃小便自利為瘀血要之發黃

之人心脾蘊積發熱引飲脉必浮滑而緊數若瘀血

證即如狂大便必黑此為異耳凡病人身體發熱頭

面汗出身無汗劑頸而止渴引水漿小便不利如此

必發黃茵陳蒿湯五七加五苓散五十六也茵陳蒿湯十分五苓

散五分三件拌和每服一錢溫水調下日三服病人服湯得小便利如皂莢

汁赤一宿腹減則黃從小便中出也古人云治濕不

利小便非其治也大抵發黃者瘀熱在裏由小便不利而致之也梔子蘗皮

湯五方麻黃連翹赤小豆湯五十四可選而用之又方

傷寒欲發黃者急用瓜蒂末口含水搐一字許入鼻

中出黃水甚驗即用茵陳蒿湯調五苓散服之最良

○又問白虎證亦身熱煩渴引飲小便不利何以不

發黃答曰白虎與發黃證相近遍身汗出此為熱越

白虎證也頭面汗出頸以下都無汗發黃證也○又

問太陽病一身盡痛發熱身如熏黃者何太陽中濕

也仲景云傷寒發汗已身目為黃所以然者以寒濕在裏不解故也以為不可下也於寒濕中求之第八卷第

又問病人脉弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗嗜卧一身及目悉黃

小便難有潮熱時時咳嗽者何也少陽中風也小柴胡湯主之五十九方

問發狂

發狂有二證陽毒發狂畜血如狂其外證與脉皆不同病人煩躁狂走妄言面赤咽痛脉實潮熱獨語如見鬼狀此陽毒也治藥方在

便反利大便必黑身黃發狂此血證諦也病人如熱燥其脉反無熱此為陰伏其血證審矣仲景云太陽病不解熱結膀胱其人如狂其血自下者愈若外不解者尚未可攻當先解其表且桂枝湯五方外已解但小腹急結者乃可攻之屬桃仁承氣湯主之五十四

唇燥但欲漱水不欲入咽其脉微而沉小腹鞭滿小便反利大便必黑身黃發狂此血證諦也病人如熱燥其脉反無熱此為陰伏其血證審矣仲景云太陽病不解熱結膀胱其人如狂其血自下者愈若外不解者尚未可攻當先解其表且桂枝湯五方外已解但小腹急結者乃可攻之屬桃仁承氣湯主之五十四

而如狂血上逆則喜忘血下畜則內爭甚者抵當湯

抵當圓五十九方輕者桃仁承氣湯五十四方犀角地黄

湯雜十六須取盡黑物為効夫血熱畜在膀胱經若用抵當湯更須仔細審其有無表證若有畜血證而外不解亦未可便用抵當湯先用桂枝湯以解其外緣熱在膀胱太陽經故也

○又有火邪發驚狂者醫以火於卧牀下或周身用

○又有火邪發驚狂者醫以火於卧牀下或周身用

○又有火邪發驚狂者醫以火於卧牀下或周身用

○又有火邪發驚狂者醫以火於卧牀下或周身用

○又有火邪發驚狂者醫以火於卧牀下或周身用

○又有火邪發驚狂者醫以火於卧牀下或周身用

火迫劫汗出或熨而成火邪其人亡陽煩躁驚狂卧起不安桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯正方十四

桂枝甘草龍骨牡蠣湯正方十四主之凡灸及燒鍼後證似火劫者並用切

法治之金匱風引湯尤良柴胡加龍骨牡蠣湯更捷正三十三

問發班

發班有兩證溫病發班熱病發班溫毒發班者冬月觸冒寒毒

至春始發或已汗下表證未除毒氣未解故發班黑膏主之或冬月溫暖人感垂戾之氣至春初為

積寒所折毒氣未得泄迨天氣暄暖溫毒始發肌肉班爛癰疔如錦紋而咳心悶嘔清汁葛根橘皮湯正十四

屢用之驗黃連橘皮湯亦佳雜百二十五廣州諸倅

發班者與時氣發班同或未汗下或已汗下熱毒不散表虛裏實熱毒乘虛出於皮膚遂發班瘡癰疹如

錦紋俗呼瘡疔素問謂之胎發班者下之太早熱氣乘虛故也下之太遲熱

不可用表藥表虛裏實若發汗開泄更增班爛也皆留胃中亦發班服熱藥過多亦發班微者亦班出五死一主刺者黑班出十死一生

當用化班湯雜百二十一玄參升麻湯雜九十五阿膠大青湯雜九十五

猪膽梔子湯雜百十四或與紫雪大妙可下者與調胃承氣湯正三十三暑月陽氣重者常宜體候

班見十九問二十一問宜參酌之○又有陽毒發

問讞語

病人有讞語有鄭聲二證鄭聲為虛當用溫藥白通湯主之正九十七讞語為實當須調胃承氣湯主之正四十三

服調胃承氣而讞語止或更衣者停後服不爾再與之仲景云實則讞語虛則鄭聲鄭重也重語也世多

不別然讞語鄭聲亦相似難辨須更用外證與脉別之若大小便利手足冷脉微細者必鄭聲也大便秘

小便赤手足溫脉洪數者必讞語也以此相參然後用藥萬全矣大抵傷寒不應發汗即讞語仲景云傷寒四九日

脉沈而喘滿沉為在裏反發其汗津液越出大便為難表虛裏實實則讞語

中則愈不和則煩而躁宜調胃承氣湯然亦有三陽合病讞語者三陽合病腹滿身重難以轉側口中不

下宜白虎下宜白虎有胃實讞語者病人身熱汗出大便硬為或發汗多亡陽讞語者仲景云

大承氣湯正四十二外臺承氣湯正四十三或發汗多亡陽讞語者發汗多

亡陽讞語者不可下此為津液不和與柴胡桂枝湯正三十二和其榮衛以通津液後自愈恐人作燥屎攻之

慎不可有下利讞語者下利讞語有燥屎也調胃承有下後讞語者傷寒八九日下之胸滿煩驚小

柴胡加龍骨正三十三有婦人熱入血室讞語者婦人傷寒發晝日明了暮則讞語如見鬼狀者此為熱入血室無

犯胃氣及上二焦速用小柴胡湯主之正三十九若行湯遲熱入胃令津燥中焦上焦不榮成血結胸狀須當

針期門也婦人中風發熱惡寒經水適來入血室也

當刺期門隨其實而取之已上二焦熱結在期門也
若犯胃氣晝夜譫語喜忘小腹滿小便利屬抵當湯
證中○又問仲景云無犯胃氣何也答曰熱因經水

適來乘虛入室故血室有熱遂令譫語當以小柴胡
解之正二十九即與胃實譫語不同胃實有燥糞故宜調

胃承氣湯下之正四十三若血實有熱譫語非胃家實仲

景恐人作胃實攻之故曰無犯胃氣也大抵譫語是
熱屬陽而反見陰證者逆

問吐血

傷寒吐血由諸陽受邪熱初在表應發汗而不發汗
熱毒入不結於五臟內有瘀積故吐血也正四十四甚者

抵當圓正方九十一輕者桃仁承氣湯正四十四兼服犀角地黄

湯類六十六三黃圓雜八十八

問腹痛腹脹滿附

本太陽病醫反下之因爾腹滿時痛是有表復有裏
仲景所以用桂枝加芍藥湯主之正方十三痛甚者加大

黃正方十三桂枝加芍藥即是小建中也太陰脈弱自利

故也下利者先難經云痛為實大抵痛宜下仲景云

解腹滿痛者急下之宜大承氣湯正四十二又曰腹中滿痛此為實當下之屬大柴胡湯正方十三腹痛有

二證有熱痛有冷痛尺脈弦腸鳴泄利而痛者冷痛
也小建中湯主之正三十七仲景云陽脈濇陰脈弦法當

腹中急痛先與小建中湯不差者與小柴胡湯柴胡去

黃芩加芍藥 陰證腹痛即四逆散正七十六 通脉四逆加芍

藥湯正八十一 腹痛小便不利者真武湯正百五 關脉實腹

滿大便秘按之而痛者實痛也桂枝加大黃湯正百十三

黃連湯正六十三 大承氣湯主之正四十一 又問腹脹滿者

何也陰陽不和也桔梗半夏湯最良雜九十九 仲景論太

陽證發汗後腹脹滿也厚朴生薑半夏甘草人參湯

正五十八 下後心煩腹滿卧起不安者梔子厚朴湯正四十二

吐後腹脹滿者與調胃承氣湯正四十三 少陰病六七日

腹脹不大便者急下之宜承氣湯正四十三

問煩躁

傷寒煩躁太陽與少陰經為多蓋太陽與少陰 陽明經

或因不大便中有燥屎故煩躁耳仲景云病人不大

煩躁發作有時者此有燥屎也宜承氣湯大抵得病

二三日脉弱無太陽柴胡證煩躁心下鞭小便利屎

定鞭以小承氣湯正三十三 少少與微利之然有病已差

尚微煩必大便鞭當問其小便日幾行若小便少津

液當還入胃大抵陰氣少陽氣勝則熱而煩故太陽

經傷風多煩而躁也仲景云太陽傷風服桂枝湯

枝湯又云太陽傷風脉浮緊發熱惡寒身疼痛無汗

而煩躁者大青龍湯主之正三十五 又云傷寒二三日心

中悸而煩者小建中湯主之正三十七 又云傷風發熱六

七日不解而煩有表裏證渴欲飲水水入則吐五苓

散主之正六十六 又云傷寒得病無熱但狂言煩躁不安

精氣不與人相當但與五苓散二大錢服之當與新

汲井水飲一升許即以指刺喉去之隨手愈然而太陽

陽虛陰盛亦發煩躁陽氣弱為陰所乘而躁故少陰

病亦煩躁少陰病二三日已上心煩不得卧黃連阿膠湯主之

共十四少陰病吐利手足逆冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之

正方百一少陰下利六七日欬而喘滿心煩不得眠猪苓湯主之

正方百一少陰下利六七日欬而喘滿心煩不得眠猪苓湯主之

當以外證與脉別之也寸關浮數身熱而煩者屬大陽

煩者屬然有汗之而煩者仲景云太陽病發汗後大

少陰也汗出胃中乾煩躁不得眠

欲得飲水者少少與之令胃中和則愈若脉有下之

而煩者仲景云下之後發汗晝日煩躁不得眠夜而

湯主之正七十三又云發汗吐下後虛煩不得眠心中懊

懣者梔子豉湯主之正四十五發汗若下之病仍未解煩

燥者茯苓四逆又有病已解而反微類者此由病新

差不勝穀損穀則愈先用小柴胡湯

中然後以調胃承氣湯正方四十三

問下利者

傷寒下利多種須辨識陰陽勿令差互

三陽下利則身熱太陰下利手足溫少陰厥陰下利身不熱以此別之大抵下

利挾太陽殊證便不得用溫藥俗醫但見下利便作陰證用溫熱藥鮮不

發黃生斑而死也太陽陽明合病必下利葛根湯

正三十六主之下利而頭疼腰痛肌熱目赤鼻乾其脉浮大而長者是其證也太陽少陽

合病自下利黃芩湯主之正八十五若嘔者黃芩湯加半

夏生薑也正六下利而頭疼胸滿或口苦咽乾或往

來寒熱而嘔其脉浮大而弦者是其證也

陽明少陽合病必下利其脈不負者順也負者失也

互相尅賊名為負也

下利而身熱胸脇病滿乾嘔或往來寒熱其脈長大而弦者是

其證也蓋陽明者土其脈長大少陽者木其脈弦若合病土被木賊更下利為胃已困若脈不弦者順也

為土不負

自利不渴屬太陰

四逆湯

自利而

渴屬少陰

白通湯 加猪膽湯 通脈四逆湯 白通加猪膽湯 通脈四逆加人參湯 其餘下利皆因汗下後證也大抵傷

寒下利須看脈與外證下利而脈大者虛也脈微弱

者為自止下利日十餘行脈反實者逆下利脈數而

滑者有宿食也下之愈脈遲而滑者實也其利未得

便止更宜下之下利三部脈皆平按其心下硬者急

下之協熱利者臍下必熱大便赤黃色及腸間津汁

垢膩

謂之腸垢

寒毒入胃則臍下必寒腹脹滿大便或黃

白或青黑或下利清穀濕毒氣盛則下利腹痛大便

如膿血或如爛肉汁也下利欲飲水者以有熱也下

利譏語者有燥屎也寒毒入胃者四逆湯

湯

白通湯加附子

四逆散加薤白 理中

湯

白通湯

四逆散

加薤白 主

之協熱利者黃芩湯

白頭翁湯

三黃熟艾

湯

薤白湯

赤石脂圓

濕毒下膿血者

濕毒下膿血者

桃花湯

地榆散

黃連阿膠散

雖然自

利而渴屬少陰然三陽下利亦有飲水者乃有熱也

利而渴屬少陰然三陽下利亦有飲水者乃有熱也

三陰下利宜溫之然少陰自利清水心下痛口乾燥者却宜下之此又不可不知也

少陰泄利下重不可投熱藥先濃煎薤白湯

湯薤白內四逆散緣四逆散用枳實芍藥之類又尋常胃中不和腹中腸鳴下利生薑瀉心湯最妙

此二法不特傷寒證也

九十六

問小便不利小便難

出字記

傷寒發汗後小出多亡津液胃中極乾故小便不利醫見小便不利往往利之誤矣類纂云胃中乾則無小便慎不可利故仲景云下之後復發汗小便不利者亡津液耳若傷寒引飲下焦有熱小便不通脈浮者五苓散

正六十六

脈沉者猪苓湯也

正六十七

表不解

咳腹

有水發熱而咳小腹痛小便不利者小青龍湯去麻

黃加茯苓也

正五十五

傷寒無汗翕翕發熱頭項強痛小便不利者桂枝湯去桂加茯苓白朮也

正方九

嘔而發

熱胸脇滿心下怔忡小便不利者小柴胡湯去黃芩

加茯苓

正五十九

少陰病小便不利者四逆散加茯苓也

正六傷寒有所不利者行之取其滲泄也有渴而飲停者有躁而煩渴者有病氣去而水氣不得行者其表裏得見煩躁口燥欲飲水水入即吐病名水逆及霍亂頭痛發熱身疼痛欲飲水者有發熱汗出復惡寒不嘔但心下痞者宜五苓散其脈浮發熱渴欲飲水小便不利少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者宜與猪苓湯其大病差後從腰已下有水氣者牡蠣澤瀉散

抵中濕與發黃以利小便為先陽明汗多以利小便

為戒○又問小便難何也陰虛故也陰虛者陽必湊之為陽所湊也故小便黃者中有熱也宜瞿麥滑石之類瀉之太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四支微急難以屈伸者桂枝加附子湯主之正方六陽明中風脉弦浮大短氣腹滿脇下及心痛鼻乾不得汗嗜卧身黃小便難潮熱而噦者小柴胡加茯苓主之正二十九

正百十三 問小便自利小便數

太陽證下焦有熱小腹必滿應小便不利而小便反利者下血證也抵當湯主之正九十二陽明證自汗出應

小便少而小便自利者津液內竭也屎雖硬不可攻也當用蜜煎導之正百十三少陰證四逆而小便自利者

虛寒證也四逆湯正七十五真武湯去茯苓主之正百五○

又問小便數者何也腎與膀胱俱虛而有客熱乘之

也二經既虛致受於客熱虛則不能制水故令數小便熱則水行澁澁則小便不快故令數起也詎其跌

陽脉數胃中熱即消穀引飲大便必硬小便即數也太陽病自汗四支拘急難以屈伸心煩微惡寒脚攣

急若小便數者慎不可行桂枝也宜與甘草乾薑湯正五十五芍藥甘草湯也正五十三大抵澁數則大便難仲景

云跌陽脉浮而濇浮則胃氣強濇即小便數浮濇相薄大便則鞭其脾為約麻子仁圓主之正九十三太陽病

若汗若吐若下後微煩小便數大便因鞭者與小承氣湯正四十二和之愈○又云傷寒脉浮自汗小便數若

胃中不和譫語者少與調胃承氣湯正四十三

正四十二問有數日不大便有**大便難**有**大便鞭**有

燥屎有**大便澹**

傷寒數日不大便大便鞭及有燥屎皆知用**大柴胡**

正方三**大承氣**正四十一**小承氣**正四十二攻之然仲景論大便

不通亦有數種不可攻者在第三卷第三○仲景又

第三問當作第十四問

有陽結陰結之論不可不別也其脉浮而數能食不

大便此為實名曰陽結宜用**小柴胡湯**正十五所謂和

其榮衛以通津液縱不了了得屎而解也其脉沉而

遲不能食身體重大便反硬名曰陰結宜用**金液丹**

所謂陽盛則促陰盛則結促結同也○又問大便澹

者何也古人云歲火不及寒乃大行民病驚澹大率

病人腸中有寒即大便鴨澹蓋澹者胃中冷水穀不

別故也華佗云寒即澹熱即垢仲景說初鞭後澹有

二證小便不利小便少皆水穀不分耳

四十九問病人默默欲眠目不能閉起居不安其

聲嘔或咽乾嘔所誣切
聲破也

此名狐惑傷寒也狐惑與濕匿皆虫證初得狀如傷寒或因傷寒變成其疾其候默默欲眠目睛不能閉起居不安虫蝕其喉為惑其聲嘔虫食下咽令狐其咽乾狐惑之病並惡飲食面目乍赤乍白麻黃是其證也大抵傷寒病腹內熱入食小腸胃也又虫行作求食蝕人五臟及下部為蠱病其候齒宜因舌上盡白甚者唇黑有瘡四支沈重忽忽喜眠虫食其肛爛見五臟則死當數看其上下唇上唇有瘡虫食其臟也下唇有瘡虫食其肛也殺人甚急多因下利而得

治匿桃仁湯雜百五

黃連犀角湯雜百六

雄黃銳散主之

同

問病人欲食復不能食常默默欲卧復不能卧欲出行復不能行飲食或有美時或有不快飯時如強健人而卧不能行如有寒如無寒如有熱復無熱口苦小便赤藥

入即吐利

此名百合傷寒也百脉一宗悉致其病無復經絡也其狀欲食復不能食常默默欲得卧復不能卧欲出行復不能行飲食或有美時或有不快飯時如強健

人而卧不能行如有寒如無寒如有熱復無熱口苦
 小便赤百合之病諸藥不治藥入即吐利如有神靈
 此多因傷寒虛勞大病之後不平復變成斯疾也百
 合知母湯雜百八滑石代赭湯雜百九雞子湯雜百十百合
 地黄湯雜百十一百合洗方雜百十二栝樓牡礪散雜百十三滑石
 散雜百十四主之

增注類證活人書卷第十一

增注類證活人書卷第十一

此一卷說藥證并藥方加減法所謂藥證者藥方
 前有證也如某方治某病是也傷寒有證異而病
 同一經藥同而或治兩證類而分之參而伍之審
 知某證者某經之病某湯者某證之藥然後用之
 萬全矣又况百問中一證下有數種藥方主之者
 須是將病對藥將藥合病乃可服之假如下利而
 心下痞稱十棗湯大柴胡生薑瀉心湯甘草瀉心
 湯赤石脂禹餘糧湯桂枝人參湯之類雖均是治
 下利而心下痞其方有冷有熱子細詳藥證以對

治之則無不中矣所謂藥方并加減法者仲景傷寒方一百十三道病與方相應乃用正方科有差別即隨證加減昔人云學方三年無病可醫療病三年無方可治往往世傳為名論竟不知執方療病或中或否不知加減移咎於方古人用藥如斗運轉故攻病的而取効速一服知二服愈假如理中圓證腎氣動者去白朮小柴胡湯證小便不利者加茯苓蓋脾惡濕腎惡燥白朮治濕茯苓利水故腎氣動者去白朮小便不利者加茯苓以此推之然後知不可執方療病須是隨證加減今於逐

方下說病證用藥加減庶幾修合之際便見治法兼古方凡稱咬咀者直云剉如麻豆大云一升者只用一大白盞以古准今易曉而通用也尋常疾勢輕者只抄麤末五錢匕水一盞半入薑棗煮七八分去滓服之未知再作病勢重者當依古劑法古之三兩即今之一兩也二兩即今之六錢半也古之三勝即今之一勝也料例大者只合三分之一是也

桂枝湯 〔太陽中風陽浮陰弱發熱汗出惡寒鼻鳴乾嘔者宜服之〕○太陽病頭痛發熱汗出惡風者宜服之○太陽病下之後其氣上衝者宜服之○桂枝

本爲解肌若脉浮緊發熱汗不出者不可與之○太陽病服桂枝湯煩不解先刺風池風府却與桂枝湯○服桂枝湯大汗出脉洪大者與桂枝湯若形似瘧一日再發者宜桂枝二麻黃一湯○服桂枝湯大汗出大煩渴不解脉洪大者白虎加人參湯主之○服桂枝湯或下之仍嘔項強痛翁翁發熱無汗心下滿微痛小便不利者桂枝去桂加茯苓白朮湯主之○傷寒脉浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急與桂枝湯得之便厥咽乾煩躁吐逆作甘草乾薑湯與之厥愈更作芍藥甘草湯與之其脚伸若胃氣不和與調胃承氣湯若重發汗如燒鍼者四逆湯主之○太陽病外證未解未解脉浮弱者當以汗解宜服○太陽病外證未解不可下也下之爲逆解外宜服○太陽病先發汗不解復下之脉浮者不愈浮爲在外而反下之故今不愈今脉浮故知在外當須解外則愈宜服○病常自汗出者此爲榮氣和榮氣和者外不諧也以衛氣不共榮氣諧和故爾以榮行脉中衛行脉外復發其汗榮衛和則愈宜服○病人藏無他病時發熱自汗出而不愈者衛氣不和也先其時發汗則愈宜服○傷寒不大便六七日頭痛有熱與承氣湯小

便清者知不在裏當發汗宜服○傷寒發汗解半日許復熱煩浮數者可更發汗宜服○傷寒醫下之清穀不止身疼痛急當救裏後身疼痛清便自調急當救表救裏宜四逆湯救表宜桂枝湯○太陽病發熱汗出榮弱衛強故使汗出欲救邪風宜服○傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者不可攻痞先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜大黃黃連瀉心湯○太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈其外不解者尚未可攻當先解其外外解已但小腹急結者乃可攻之宜桃核承氣湯其解外宜服已上屬太陽

陽○陽明病脉遲汗出多微惡寒表未解宜服○病人煩熱汗出解如瘧狀日晡發熱脉實者宜大承氣湯脉浮虛者宜服已上屬陽明○太陰病脉浮可發汗宜服屬太陰○下利腹脹滿身疼痛者先溫裏乃攻表溫裏宜四逆湯攻表宜服屬厥陰○吐利止身痛不休宜桂枝湯小和之屬陽明

桂枝 芍藥各三錢 甘草貳兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水壹盞半入生薑五片棗子貳枚煎至壹盞去滓溫服須臾飲熱稀粥壹盞以助藥力溫覆令一時許遍身漉漉微似

有汗者佳。○法加減桂枝湯自西北二方居人四時行之無不應驗。江淮間唯冬及春可行之。自春末及夏至已前桂枝證可加黃芩一分。謂之陽旦湯。夏至後有桂枝證可加知母半兩石膏一兩或加升麻一分。若病人素虛寒者正用古方不在加減也。○戒曰桂枝最難用。雖云表不解脈浮可發汗。宜桂枝湯。須是病人常自汗出小便不數手足溫。和或手足指稍作微冷少頃却溫身雖微似煩而又增寒始可行之。若病人身無汗小便數或手足冷不惡寒或飲酒家不喜甘者慎不可行桂枝也。

仍有桂枝證服湯已無桂枝證者尤不可再與。桂枝麻黃各半湯。太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少其人不可嘔清便欲自可一日三二度發脈微緩者為欲愈也。脈微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗更下更吐也。面色反有熱色者未欲解也。以其不能得小汗出身必痒宜服。屬太陽

桂枝

芍藥

甘草

炙各捌錢

麻黃

半兩湯泡焙秤

杏仁

壹拾貳箇湯浸去皮尖兩仁者

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一枚水一盞半煮至八分去滓溫服。又見辯誤

桂枝二麻黃一湯目服桂枝湯大汗出脉洪大者與桂枝湯如前法若形似瘧一日再發者汗出必解宜

服屬太陽

桂枝八錢半

芍藥五錢半

杏仁八箇沸湯浸去皮尖

甘草二分半炙

麻黃三錢一字湯泡去黃汁焙乾秤

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分溫服以微汗為度又見辭誤

桂枝二越婢一湯四太陽病發熱惡寒熱多寒少脉

微弱者此無陽也屬太陽不可發汗宜服之

桂枝

芍藥

甘草各半兩

石膏陸錢

麻黃半兩湯泡去黃汁焙乾秤

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓溫服又見辭誤

桂枝加桂湯五燒鍼令其汗鍼處被寒核起而赤者

必發奔豚氣從小腹上衝心者灸其核上各一壯與

此藥屬太陽

桂枝五兩

芍藥三兩

甘草炙二兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓溫服桂枝湯加桂以桂能世奔豚之氣也

桂枝加附子湯六太陽病發汗遂漏不止其人惡風

小便難四支微急難以屈伸者宜服之

屬太陽

桂枝 去皮

芍藥 各一兩半

甘草 一兩

附子 炮去皮用半箇

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓溫服

桂枝去芍藥湯 七 太陽病下之後脉促胸滿者宜服

之屬太陽

桂枝 一兩半 去皮

甘草 一兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一

枚水一盞半者至八分去滓溫服 芍藥味酸脉促胸滿恐成結胸

故去芍藥佐則單用 辛甘發散毒氣也

桂枝去芍藥加附子湯 八 太陽病下之後脉促胸滿

者桂枝去芍藥湯主之若微寒者宜服之 屬太陽

桂枝 一兩半 去皮

甘草 一兩

附子 去皮尖半箇炮

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓溫服小便利即愈

桂枝去桂加茯苓白朮湯 九 服桂枝湯或下之仍頭

項強痛翕翕發熱無汗心下滿微疼小便不利者此

主之 屬太陽

芍藥

茯苓

白朮 各一兩半

甘草 一兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一枚水一盞半煮至八分去滓溫服小便利即愈

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯 傷寒脉浮醫火劫之亡陽必驚狂卧起不安者此主之

桂枝

蜀漆

各一兩半

甘草

一兩

牡蠣 二兩

龍骨

二兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一枚水一盞半煮至八分去滓溫服

桂枝加芍藥生薑人參新加湯 發汗後身疼痛

脉沉遲者此主之 屬太陽

桂枝

人參

各壹兩半

芍藥

貳兩

甘草 壹兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一枚水一盞半煮至八分去滓溫服

桂枝加芍藥湯 太陽病下之因腹滿痛屬太陰此主之

桂枝

參兩

甘草

貳兩

芍藥

陸兩下利者先煎芍藥三四沸

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一枚水一盞半煮至八分去滓溫服

桂枝加大黃湯 十三 太陽病及下之因腹滿痛屬大陰桂枝加芍藥湯主之入實痛者此主之

桂枝 六分 去皮 芍藥 三兩 甘草 壹兩 炙

大黃 二兩 痛甚者加大黃 大實痛者加壹兩半 羸者減之

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一枚水一盞半煮至八分去滓溫服 又見辯誤

桂枝甘草龍骨牡蠣湯 十四 火逆下之因燒鍼煩躁者此主之 屬太陽

桂枝 半兩 去皮 甘草 炙 牡蠣 炙

龍骨 各壹兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煮至八分去滓溫服

桂枝甘草湯 十五 發汗過多其人叉手自冒心心下悸欲得按者此主之 屬太陽

桂枝 二兩 去皮 甘草 炙 一兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煮至八分去滓溫服

桂枝人參湯 十六 太陽病外證未除而數下之遂協熱而利利下不止心下痞鞭表裏不解者此主之

桂枝 一兩 三錢 甘草 一兩 三錢 炙 乾薑 炮

人參 白朮 各一兩

右剉如麻豆大每服五錢七水一盞半煎至八分去滓温服日再夜一服

桂附湯 十七 傷寒八九日風濕相薄身體疼煩不能

自轉側不嘔不渴脉浮虛而濇者此主之若其人大

便鞭小便自利者去桂加白朮湯主之 屬太陽

桂枝 一兩三錢若大便鞭小便自利者去桂加白朮一兩三錢

附子 一箇炮 甘草 三分

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子一枚水一盞半煮至八分去滓温服日再服

桂枝加葛根湯 十八 太陽病項強几几反汗出惡風

者此主之 伊尹湯液論桂枝湯中加葛根今監本用麻黃誤矣

桂枝 甘草 各六錢

葛根 一兩 麻黃 一兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子一枚水一盞半煮至八分去滓服覆取微汗

桂枝加厚朴杏子湯 十九 太陽病下之微喘者表未

解故也此主之 屬太陽

桂枝 去皮 芍藥 各一兩 甘草 六錢

杏仁 去皮尖 厚朴 去皮薑汁炙

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子二枚煎至八分去滓溫服覆取微汗

麻黃湯二十太陽病頭痛發熱身疼惡風無汗而喘者宜服○太陽陽明合病喘而胸滿不可下宜服○太陽病十日以去脉浮細而嗜卧者外已解也設胸滿者與小柴胡湯脉但浮無餘證者與服之○太陽病脉浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表證仍在此當發其汗服藥已微除其人發煩目瞑劇者必衄衄乃解所以然者陽氣重故也此主之○傷寒脉浮緊不發汗因衄此主之已上屬太陽○陽明病脉浮無汗

而喘發汗則愈宜服○脉但浮無餘證者與服若不

溺腹滿加噦者不治已上屬陽明

甘草半兩炙

桂枝壹兩

杏仁叁拾伍箇去皮尖

麻黃

壹兩半去節百沸湯泡去黃汁焙乾秤

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煮至八

分去滓溫服覆取微汗不須歎粥加減法傷寒熱病

藥性須涼不可太溫夏至後麻黃湯須加知母半

兩石膏一兩黃芩一分蓋麻黃湯性熱夏月服之

有發黃斑出之失唯冬及春與病人素虛寒者乃

用正方不在加減

麻黃杏子甘草石膏湯 二十一 發汗後不可更行桂枝

湯汗出而喘無大熱者可與此服之 屬太陽

甘草 壹兩 石膏 肆兩碎 杏仁 貳拾伍箇

麻黃 貳兩去節 附子 壹枚炮去

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煮至八

分去滓溫服

麻黃附子甘草湯 二十二 少陰病得之二三日可與此

藥微發汗 以二三日無證故

麻黃 貳兩去節湯泡 甘草 貳兩

附子 壹枚炮去

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煮至八

分去滓溫服相次二兩服以身微汗為度

麻黃細辛附子湯 二十三 少陰病始得之反發熱脈沉

者此主之 屬少陰

麻黃 二兩去節湯炮 細辛 二兩

附子 壹枚炮去

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煮至八

分去滓溫服

麻黃連翹赤小豆湯 二十四 傷寒瘀熱在裏身必黃此

主之 屬陽明

類證

卷十二

麻黃

一兩去節湯泡
去黃汁焙乾秤

甘草

一兩

赤小豆

半升

杏仁

貳拾枚
去皮尖

生梓白皮

兩切

連翹

一兩或作半
兩連翹根是

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓溫服

麻黃升麻湯

傷寒六七日大下後寸脉沉而遲

手足厥逆下部脉不至咽喉不利唾膿血泄利不止者為難治此主之

屬厥除

麻黃

二兩半去節湯泡
去黃汁焙乾秤

升麻

當歸

各一兩

知母

黃芩

萎蕤

各三分

芍藥

麥門冬

去心

桂枝

去皮

茯苓

甘草

炙

乾薑

炮

石膏

碎綿裹

白朮

各一分

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煮至八分去滓溫服相次一炊久進一服汗出愈

葛根湯

三升

太陽病項背強几几無汗惡風又太陽

與陽明合病者必自利此並主之

屬太陽

葛根

二兩

桂枝

去皮

甘草

炙

芍藥

各一兩

麻黃

一兩半去節湯泡
去黃汁焙乾秤

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓溫服覆取汗為度
葛根加半夏湯三十七 太陽與陽明合病不下利但嘔
者此主之屬太陽

葛根四兩或一兩 半夏六錢一字

麻黃三分去節湯泡去黃汁焙乾

甘草炙 桂枝去皮

芍藥各半兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子一枚水一盞半煮至八分去滓溫服覆取微汗

葛根黃芩黃連湯三十八 太陽病桂枝證醫反下之利遂不止脉促者表未解也喘而汗出者此主之

葛根四兩

黃芩一兩半

黃連六兩或八兩半

甘草二兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服日進二三服

小柴胡湯二十九

大陽病十日以去脉浮細而嗜卧者

外已解設胸滿痛與服脉但浮者與麻黃湯○傷寒五六日中風往來寒熱胸脇苦痛默默不欲食心煩喜嘔或胸煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞鞭或心下悸小便不利或不渴身有微熱或欬者此主之○血弱氣盡腠理開邪氣因入與正氣相薄結於脇下邪正分爭往來寒熱休作有時默默不欲飲食藏

冷

府相連其痛必下邪高痛下故使嘔也此主之○服柴胡湯已渴者屬陽明以法治之○傷寒四五日身熱惡風頸項強脇下滿手足溫而渴者此主之○傷寒陽脉瀋陰脉弦法當腹中急痛先與小建中湯不差者此主之○太陽病過經十餘日發汗吐下之後四五日柴胡湯證仍在者先與小柴胡嘔不止心下急鬱鬱微煩者為未解也與大柴胡湯下之即愈○婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此為熱入血室其血必結故使如瘧狀此主之○傷寒五六日頭汗出微惡寒手足人心下滿不欲食大便鞭脉細者為陽微結必有表復有裏也脉沉亦在裏也汗出為陽微假令純陰結不得復有外證悉入在裏此為半在裏半在表也脉雖沉緊不得為少陰病所以然者陰不得有汗今頭汗出故知非少陰也

可與服此設不了了者得屎而解○傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不為逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而腹痛者此為結胸也太陷胸湯主之但滿而不痛者此為痞柴胡不中與之宜半夏瀉心湯

已上屬太陽

○陽明病發潮熱大便溼小

便自可胸脇滿不去者與服之○陽明病脇下鞅滿不大便而嘔舌上白胎者可與服之上焦得通津液得下胃氣因和身濺然汗出而解○陽明中風脈弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗嗜卧一身及目悉黃小便難有潮熱時時噦身前後腫刺之小差外不解病過十日脈續浮者與此藥主之已上屬陽明○太陽病不解轉入少陽脇下鞅滿乾嘔不能食往來寒熱尚未吐下脈沉緊者此主之若已吐下發汗溫鍼譏語小柴胡湯證罷此為壞證知犯何逆以法治之已上屬少陽○嘔而發熱者

服○傷寒差已後更發熱此主之脈浮者以汗解之

脈沉實者以下解

屬辨陰陽易差後勞復病脈證

黃芩

一兩半若腹中痛者去黃芩加芍藥一兩半芍藥或作三分若心下悸小便不利者去黃芩加茯苓二兩

人參

一兩半若不渴外有微熱者去人參加桂枝一兩半溫覆微汗愈若欬嗽者去人參并棗子加五味子一兩一分乾薑一兩

棗子

六枚若脇下痞鞅去棗子加牡蠣二兩熬牡蠣或作一兩

半夏

一兩一分湯洗若胸中煩不嘔者去半夏人參加栝樓實一枚用四分之一若渴者去半夏更加人參三分栝樓根二兩

柴胡

四兩去蘆

甘草

一兩半炙

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子三枚水一盞半煮至八分去滓温服日三服

半夏

入參湯計對實一文用四分之一昔散昔一兩一分長去其苦

棗子

六枚昔謂不苦去棗子

人參

一兩一分昔謂不苦去人參

黃芩

半兩一分昔謂不苦去黃芩

枳實

一兩一分昔謂不苦去枳實

枳實

一兩一分昔謂不苦去枳實

枳實

一兩一分昔謂不苦去枳實

枳實

一兩一分昔謂不苦去枳實

增注類證活人書卷第十三

天柴胡湯

太陽病過十餘日發汗吐下之後四五日柴胡證仍在者先與小柴胡嘔不止一云嘔心止小安

下急鬱鬱微煩者為未解也與大柴胡湯下之則愈

○傷寒十餘日熱結在裏往來寒熱者與服○傷寒

發熱汗出不解心中痞鞭嘔吐而下利者此主之上已

屬太湯 ○陽明病汗多者急下之宜服○少陰病下利

清水心下痛口乾者可下之宜大柴胡大承氣湯○

病腹中滿痛此為實當下之宜大承氣大柴胡湯○

腹滿不減減不足言當下之宜大柴胡大承氣湯○

類証活人書

傷寒後脉沉者內實也下之解宜服○傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大便難身微熱者實也急下之宜大承氣大柴胡湯○太陽病未解脉陰陽俱停必先振慄汗出而解但陰脉微者下之而解宜服○病人無表裏證發熱七八日雖脉浮數者可下之大柴胡湯主之○病人煩熱汗出則解又如瘧狀日晡所發熱者屬陽明脉實者可下之大柴胡大承氣湯主之屬可下病脉證

柴胡

肆兩

黃芩

芍藥

各壹兩半

半夏

壹兩壹分洗

枳實

貳枚去穢炒千金云枳實去穢壹分準貳枚

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓温服以利為度未利

再服

本方無大黃欲下者加大黃一兩

柴胡桂枝湯

三十一

傷寒六七日發熱微惡寒支節煩

頭疼微嘔心下支結外證未去者此主之屬太陽○發

汗多亡陽譫語者不可下與此藥和其榮衛以通津

液後自愈屬發汗後病脉證

柴胡

壹兩

桂枝

去皮

黃芩

人參

芍藥

各半兩

半夏

肆錢壹分洗

甘草

叁錢壹分炙

右劉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一枚水一盞半煮至八分去滓溫服

柴胡桂枝乾薑湯 傷寒五六日已發汗而復下之胃脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此為未解也宜服之 屬太陽

柴胡 肆兩

桂枝 去皮

黃芩 各壹兩半

牡蠣 熬

甘草 炙

乾薑 各壹兩

栝樓根 貳兩

右劉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煮至八分去滓溫服食頃再服

柴胡加龍骨牡蠣湯 傷寒八九日下之胃滿煩

驚小便不利讖語一身盡重不可轉側者此主之 屬太陽

柴胡

黃芩

龍骨 各壹兩

鈎丹

人參

桂枝

汗多恐亡陽故也若汗多不止用溫粉撲之

溫粉方

白朮

藁本

川芎

白芷 各等分

右搗羅為細末每末壹兩入米粉參兩和之粉撲周身止汗無藁本亦得若汗已出後盡劑服汗多

柴胡加龍骨牡蠣湯方錄及卷末目誤則此周脫柴加芒青龍三方蓋脫簡也

亡陽遂逆惡風煩躁不得眠也

小青龍湯

三十六

傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不

渴服湯已渴者此寒去欲解也此主之。傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或噎或小便利小腹痛滿或喘者此主之

芍藥

桂枝

去皮

乾薑

炮

甘草

炙

細辛

各壹兩半

五味子

壹兩別本或加壹分

半夏

壹兩半湯洗若渴者去半夏加枯樓根壹兩半

麻黃

壹兩半微利者去麻黃加羌活如壹兩半若赤色若噎者去麻黃加附子半箇炮

若小便不利小腹痛滿者去麻黃加茯苓或兩若喘者去麻黃加杏仁壹兩半去皮尖

麻黃湯泡

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煮至八

分去滓溫服 杏仁半夏二味或各作壹兩壹分

小建中湯

三十七

傷寒陽脉濇陰脉弦法當腹中急痛

先與小建中湯不差者小柴胡湯主之。傷寒二三

日心中悸而煩者宜服

芍藥

叁兩

甘草

壹兩

桂枝

壹兩半去皮

膠飴

半升舊有微溼或嘔者去膠飴局方加黃耆壹兩半為黃耆建中湯

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半生薑四

片大棗子一枚煮至八分去滓下膠飴兩匙許再

煎化溫服日三服夜二服尺脈尚遲再作一劑加黃耆末一錢

煎造膠飴法

糯米

壹升揀
淘淨

大麥蘖末

陸兩

右米一如炊飯甑上至氣溜取下傾入一盆子入藥末一合并湯一盞來許拌和再上甑至飯熟却入盆子內都以蘖末拌和入一甕罐子可容五升許冬月罐子熱春秋夏溫冬月用湯二升許入罐子內約內面飯上湯三指許即得布并紙三五重蓋定更以綿或絮抱定近火春秋夏即溫和至一

宿見米浮在水面上即以布絞裂取清汁銀石甕內煎至面上有膜即以木篦不住手攪至稀糊以篦罷收夏月置井中庶不酸

大陷胃湯

三十八

太陽病脈浮而動數浮則為風數則

為熱動則為痛數則為虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒表未解也醫反下之動數變遲膈內拒痛胃中空虛客氣動膈短氣躁煩心中懊懣陽氣內陷心下因鞭則為結胃大陷胃湯主之若不結胃但頭汗出餘處無汗劑頸而還小便不利身必發黃○傷寒六七日結胸熱實脈沉而緊心下痛按之石鞭者宜服

傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯但結胸無大熱者此為小結在胸脇也但頭微汗出者此主之○太陽病重發汗而下之不大便五六日舌上燥而渴日晡所小有潮熱從心下至小腹鞭滿而痛不可近者此主之○傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不為逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而鞭痛者此為結胸也此主之已

屬太陽

大黃

一兩半去皮
錫文者為末

甘遂

一字赤連珠
者紐羅為末

芒硝

五分

右以水二盞先煮大黃至二盞去滓下消一沸下甘遂末溫服得快利止後服

又大陷胃湯方

桂枝

一兩

甘遂

一兩或作半兩

大棗

一兩或作參枚

人參

一兩

栝樓實

一枚去皮只用四分之一

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞或作二盞煮至八分去滓溫服胃中無堅物勿服之

大陷胸圓

三十九又見辨誤

病發於陽而反下之熱入因作結

胃病發於陰而反下之

一作汗出

因作痞也所以成結胸

者以下之太早故也結胸者項亦強如柔痙狀下之則和宜此藥主之屬太陽

大黃貳兩或作四兩 芒硝 三分 杏仁 三分去皮尖紫黑

苦葶藶子 三錢熬

右搗羅二味內杏仁芒硝合研如脂丸如彈子大每服一丸抄甘遂末半錢匕白蜜一合水三盞煮取一盞頓服一宿乃下如不下再服甘遂性猛宜斟酌量虛實服之

小陷胃湯四十一又見辯誤 小結胸病正在心按之則痛脉浮滑者此主之屬太陽

半夏 湯洗秤一兩半 黃連 一兩 桔樓 一枚去皮或作半枚

右剉如麻豆大水二盞先煮桔樓至一盞半下諸藥煎至八分去滓溫服未知再服微利黃涎便安

大承氣湯四十二 陽明病脉遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也

手足濇然汗出者此大便已鞅也此藥主之若汗多微發熱惡寒者外未解也桂枝湯其熱不潮未可與

承氣湯若腹大滿不通者可與小承氣湯微和胃氣勿令大泄下○陽明病潮熱大便微鞅者可與此藥

不鞅者不可與之○傷寒若吐若下後不解不大便五六日上至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如

見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸牀惕而不安微喘直視脉弦者生瀉者以微者但發熱讞語者此主之若一服利則止後服○陽明病讞語有潮熱反不食者胃中必有燥屎五六枚也若能食者但鞭耳宜服○陽明病下血讞語者此爲熱入血室但頭汗出者刺期門隨其實而瀉之漉然汗出則愈汗出讞語者以爲有燥屎在胃中此爲風也須下者過經乃可下之下之若早語言必亂以表虛裏實故也下之愈宜服○二陽併病太陽證罷但發潮熱手足絳絳汗出大便難而讞語者下之則愈宜服○陽明

之心下懊憹而煩胃中有燥屎者可攻腹微滿初頭鞭後必溏不可攻之若有燥屎者宜服○病人煩熱汗出則解又如瘧狀日晡所發熱者屬陽明也脉實者宜下之脉浮虛者宜發汗下之與大承氣發汗宜桂枝湯○大下後六七日不大便煩不解腹滿痛者此有燥屎也所以然者本有宿食故也宜服○傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大便難身微熱者此爲實也急下之宜服○陽明病發熱汗多者急下之宜服○得病二三日脉弱無太陽柴胡證煩燥心下鞭至四五日雖能食以小承氣湯少少與微

和之令小安至六日與承氣一升若不大便更六七
日小便少者雖不大便但初頭鞭後必溏未定成鞭
攻之必溏須小便利屎定鞭此主之○發汗不解腹
滿痛者急下之宜服○腹滿不減減不足言當下之
宜服○病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘
冒不能卧者有燥屎也宜服○陽明少陽合病必下
利其脉不負者為順也負者失也互相尅賊名為負
也脉滑而數者有宿食也當下之宜服已上屬陽明○少
陰病二三日口燥咽乾者急下之宜服○少陰病自
利清水色純青心下必痛口乾燥者可下之宜服○

少陰病六七日腹脹不大便者急下之宜服已上屬少陰

○下利三部脉皆平按之心下鞭者急下之宜服○
下利脉遲而滑者內實也利未欲止當下之宜服○
寸口脉浮而大按之反濡尺中微而濡故知有宿食
當下之宜服○下利不欲食者以有宿食故也當下
之宜服○下利差至其年月日時復發者以病不盡
故也當下之此主之○下利脉反滑當下所去下乃
愈此主之○脉雙弦而遲者必心下鞭脉大而緊者
陽中有陰也可下之宜服○病腹中滿痛者此為實
也當下之宜服此主之已上屬可下病脉證

大黃

貳兩錫文者去皮生用酒洗過

枳實

肆枚或作叁枚去穢炒淨秤用半兩

厚朴

肆兩去皮薑汁炙

芫硝

貳兩或作壹合半非消有薑頭者亦得

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水二盞先煮厚朴枳實至一盞餘下大黃煮取六分去滓入芫硝煎一二沸放溫服以利為度未利再與一服

小承氣湯

四十三

陽明病潮熱大便微鞕者可與大承

氣湯不鞕者不可與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯湯入腹中轉失氣者此有燥屎也乃可攻之若不轉失氣者此但初頭鞕後必溏不可攻之攻之必脹滿不能食也欲飲水者與之

則噦其後發熱者必大便復鞕而少也以小承氣湯和之不轉夫氣者不可攻也○陽明病脉遲雖汗出不惡寒其氣必重短氣腹滿而喘有潮熱者此為外欲解可攻裏也手足濇然汗出者此大便鞕大承氣湯主之若腹大滿不通者與小承氣湯微和胃氣勿令大泄下○陽明病其人多汗以津液外出胃中燥大便必鞕鞕則譫語此藥主之若一服譫語止者更莫後服○陽明病譫語潮熱脉滑而疾者此藥主之因與承氣湯一升腹中轉氣者更服一升若不轉氣者勿更與之明日又不大便脉反微瀯者裏虛也為

難治不可更與承氣湯○太陽病若吐若下若發汗後微煩小便數大便鞭者與小承氣湯和之愈○得病二三日脉弱無太陽柴胡證煩躁心下鞭至四五日雖能食以小承氣湯少少與微和之令小安下利讞語者有燥屎也此主之

大黃肆兩 去皮

厚朴貳兩 去皮 薑汁炙

枳實肆枚 或作叁枚 去穢炒淨 秤半兩也

右剉如麻豆大每服抄五錢匕以水一大盞半煎至八分去滓溫服以利為度初服湯更衣者止後服不爾者再服之

愈

調胃承氣湯四十三發汗後惡寒虛故也不惡寒但熱者實也當和胃氣此主之○太陽病未解脉陰陽俱停必先振慄汗出而解但陽脉微者先汗之而解但陰脉微者下之而解若欲下之宜服○傷寒脉浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急與桂枝湯欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆作甘草乾薑湯與之以復其陽若厥命足溫者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯○傷寒十三日過經讞語者以有熱也當以湯下之若小便利者大便當鞭而反下利脉調和者知醫

以圓藥下之非其治也若自下利者脉當微厥今反和者此為內實也此主之○太陽病過經十餘日心下溫溫欲吐而胸中痛大便反溏腹微滿鬱鬱微煩先此時自極吐下者與服之若不爾者不可與但欲嘔胸中痛微溏者此非柴胡證以嘔故知極吐下也○陽明病不吐不下心煩者可與服○太陽病三日發汗不解蒸蒸熱者屬胃也此主之○傷寒吐後腹脹滿者與服已上屬陽明

甘草 壹兩

大黃 貳兩

芒硝 壹兩參分或作壹兩壹分

右剉如麻豆大每服五錢以水一大盞煎至七八

去滓下硝更上火二三沸溫頓服之

桃核承氣湯

四十四

太陽病不解熱結膀胱其人如狂

血自下下者愈其外不解者尚未可攻當先解其外外解已但少腹結者乃可攻之宜用此藥

大黃 肆兩

桂枝 貳兩

甘草 貳兩

芒硝 貳兩

桃仁

去皮尖雙仁者五十箇搗碎

右剉如麻豆大每服五錢匕以水二大盞煎至八

分去滓下硝煎化溫服以微利為度未利移時再服

梔子豉湯 四十五 發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必

反覆顛倒心中懊憹此主之○發汗若下之而煩熱

憤憤

胃中空者此主之。○仲景云凡用梔子湯病人舊微溘者不可與服之。○傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛者未欲解也此主之。已上屬太陽○陽明病脉浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若發汗則燥心憤憤反讞語若加溫鍼必怵惕煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊懣舌上胎者此主之。○陽明病下之外有熱手足溫不結胸心中懊懣饑不能食但頭汗出者此主之。○下利後更煩按之心下濡者為虛煩也此主之。屬厥陰

香鼓 二兩

肥梔子 十六箇擘碎 或作十四箇

右剉如麻豆大每服五錢水二盞先煮梔子至一盞入鼓煎至七分去滓溫服得快吐止後服

梔子甘草鼓湯 四十六 發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊懣梔子鼓湯主之若少氣者此主之。屬大陽

梔子 七枚

甘草

鼓 各一兩

右分二服以水二盞先煎梔子甘草至一盞內鼓同煎取七分去滓溫服得快吐止後服

梔子生薑鼓蕩 四十七 發汗吐下後虛煩不得眠若劇

者必反覆顛倒心中懊懣梔子豉蕩主之若嘔者當主之屬大陽

梔子 七枚

生薑 二兩

豉 一兩

右分二服以水二盞先煮梔子生薑至一盞內豉同煎至七分去滓溫服得快吐止後服

增注類證活人書卷第十三

增注類證活人書卷第十四

梔子厚朴湯 四十八

治傷寒下後心煩腹滿卧起不安者屬太陽

梔子

大者柴枚擘碎

厚朴

去皮薑汁炙貳兩

枳實

貳枚取去穰楚炒秤壹分

右剉如麻豆大分二服以水二盞半煎至八分去滓溫服得吐止後服

梔子乾薑湯 四十九

治傷寒醫以丸藥下之身熱不去微煩者屬太陽

梔子 柴枚

乾薑 壹兩

右剉如麻豆大分二服以水二大盞煎至七分去

滓温服得吐止後服

凡用梔子湯病人舊微溏者不可與之

梔子蘘皮湯

五十一

治傷寒身黃發熱

屬太陽

梔子 剝枚

黃蘘 壹兩

甘草 半兩

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至七分

去滓温服

茯苓桂枝甘草大棗湯

五十二

治發汗後其人臍下悸

者欲作奔豚

屬太陽

桂枝 貳兩

甘草 壹兩

茯苓 去皮陸兩

右剉如麻豆大每服五錢棗二箇用甘爛水一盞

半煎至八分去滓温服

作甘爛水法用水二升大盆中以物揚之上有

子五六千顆有珠相逐取用

茯苓桂枝白朮甘草湯

五十三

治傷寒若吐若下後心

下逆滿氣上衝曾起則頭眩脉沉緊發汗則動經身

為振振搖者

屬太陽

茯苓 貳兩

桂枝 壹兩

甘草 炙

白朮 壹兩

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八分

去滓温服

茯苓甘草湯

五十四

傷寒汗出而渴者五苓散主之不

渴者此主之

屬太陽

桂枝 去皮

茯苓 各貳兩

白朮 壹兩

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半生薑五片煎至八分去滓溫服

甘草湯五十四少陰病二三日咽痛者可與服不差者與桔梗湯

甘草貳兩

右剉如麻豆大每服四錢匕水一盞煎至六分去滓溫服日二服

甘草乾薑湯五十五傷寒脉浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩躁吐逆者宜此藥屬太陽

甘草肆兩

乾薑貳兩

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服

炙甘草湯五十六治傷寒脉結代心動悸屬太陽

甘草貳兩

人參壹兩

生地黃捌兩

桂枝壹兩半

麻仁壹兩

麥門冬壹兩壹分

右剉如麻豆大每服五錢匕入薑五片棗一枚水一盞半入酒半盞煎至八分去滓內阿膠一片膠

烱盡溫服日三服

芍藥甘草湯五十七傷寒脉浮自汗出小便數心煩微

惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥
咽乾煩躁逆者作甘草乾薑湯與之以復其陽若厥
愈足溫者更與此藥屬太陽

甘草

白芍藥

各二兩

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煮至八分

去滓溫服

厚朴生薑半夏人參湯

五十八

治發汗後腹脹滿者

屬太陽

厚朴

肆兩去皮

半夏

壹兩壹分

甘草

壹兩

人參

半兩

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半生薑五片

煮至八分去滓溫服

大黃黃連瀉心湯

五十九

治心下痞按之濡其脈關上

浮者若傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者表未解

也不可攻痞當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝

湯攻痞宜服此藥

屬太陽

大黃

貳兩

黃連

壹兩

黃芩

各壹兩

右剉如麻豆大每服五錢匕以百沸湯二大盞煎

漬之一時又絞去滓煖動分二服

附子瀉心湯

六十

治心下痞而復惡寒汗出者

屬太陽

大黃

貳兩

黃連

黃芩

各壹兩

附子 壹枚炮去皮 破別煮取汁

右三味剉如麻豆大每服五錢以百沸湯二大盞熱漬之一時久絞去滓內附子汁分溫再服

半夏瀉心湯 傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯

證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此

雖已下之不為逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解若

心下滿而鞭痛者此為結胃也大陷胸湯主之但滿

而不痛者此為痞柴胡不中與之宜服此 屬大陽

黃連 半兩 黃芩 乾薑 炮

人參 炙各壹兩半 半夏 壹兩壹分 湯洗七遍

右剉如麻豆大每服五錢匕大棗二枚水一盞半煎至八分去滓溫服

甘草瀉心湯 傷寒中風醫反下之其人下利日

數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩

不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此

非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞭也宜服此

甘草 貳兩 乾薑 炮 黃芩 各壹兩半

人參 各半 大棗 六枚

半夏 壹兩壹分 洗

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八分

去滓温服

生薑瀉心湯

六十三

治傷寒汗出解之後胃中不和心

下痞鞭乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者陽

黃芩

甘草

人參

各一兩半

乾薑

炮

黃連

各半兩

半夏

壹兩一分泡

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半生薑七片

棗子二枚煎至一盞去滓温服

白虎湯

六十四

治傷寒脉浮滑者表裏有熱○又三陽

合病腹滿身重難以轉側口中不仁面垢譫語遺尿

發汗則譫語下之則額上生汗手足逆冷若自汗出

者○傷寒脉滑而厥者裏有熱並主之

知母

壹兩

甘草

壹兩

石膏

捌兩碎綿裹

粳米

叁合

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八分

取米熟爲度去滓温服

白虎加人參湯

六十五

服桂枝湯大汗出大煩渴不解

脉洪大者○傷寒若吐若下後七八日不解熱結在

裏表裏俱熱時時惡寒大渴舌上乾燥而煩欲飲水

數升者○傷寒無大熱口燥渴心煩背微惡寒者並

主之

粳

人參 貳分

知母 壹兩

甘草 炙二兩或作半兩

粳米 壹合

石膏 四兩碎綿裹

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八分取米熟為度去滓溫服

五苓散 六十六 太陽病發汗後大汗出胃中乾煩燥不

得眠欲得飲水者少少與飲之令胃氣和則愈若脉

浮小便不利微熱消渴者○發汗已脉浮數煩渴者

○傷寒汗出而渴者 不渴者與茯苓甘草湯 ○中風發熱六七

日不解而煩有表裏證渴欲飲水水入則吐名曰水

逆者○本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人

渴而口燥煩小便不利者○太陽病寸緩關浮尺弱

其人發熱汗出復惡寒不嘔但心下痞者此以醫下

之也如其不下者病人不惡寒而渴者此轉屬陽明

也小便數者大便必鞭不更衣十日無所苦也欲飲

水少少與之但以法救之或渴者○霍亂頭痛發熱

身疼熱多飲水者並主之

澤瀉 壹兩

猪苓 去黑皮

茯苓 去皮

白朮 各叁分

桂枝 去皮半兩不見火

右搗篩為散拌和每服抄三錢白湯調下此藥須各自事持秤見分兩然後合

類證活人書 卷十四 六

猪苓湯 六十七 陽明病脉浮發熱渴欲飲水小便不利者○少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者並主之

猪苓 去皮

茯苓

阿膠 炙

澤瀉

滑石 各壹兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至七分去滓温服

附子湯 六十八 少陰病得之一二日口中和背惡寒者當灸之○少陰病身體痛手足寒骨節痛脉沉者並宜服之

茯苓

芍藥 各壹兩半

人參 壹兩

白朮 貳兩

附子 壹枚炮

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓温服日三服

桂枝附子湯 六十九

治傷寒八九日風濕相薄身體疼

煩不能自轉側不嘔不渴脉浮虛而濡者 屬大陽

桂枝 貳兩

甘草 壹兩

附子 壹枚半炮

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半生薑四片棗子一枚煎至八分去滓温服

木附湯 七十

傷寒八九日風濕相薄身體疼煩不能

自轉側不嘔不渴脉浮虛而濇者桂枝附子湯主之
若其人大便堅小便自利者此主之屬大陽

白朮

貳兩

甘草

壹兩

附子

壹箇半
炮去皮

右剉如麻豆大每服五錢匕生薑五片大棗一枚
水一盞半煎至七分去滓溫服日三服一服覺身
痺半日許再服三服都盡其人如冒狀勿怪也卽
是附子與朮並走皮中逐水氣未得除故使之耳
法當加桂一兩其大便堅小便自利故不加桂也
甘草附子湯四十二治風濕相薄骨節疼煩掣骨痛不
得屈伸近則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去

衣或身微腫者

屬大陽

甘草

炙

白朮

各一兩

附子

一枚炮
去皮

桂枝

三兩

或作二兩身腫者加防風二兩
悸氣小便不利者加茯苓一兩半

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至七分
去滓溫服汗出卽解

芍藥甘草附子湯

汗病不解反惡寒者虛故

也此主之

芍藥

參兩

甘草

參兩

附子

一枚炮
去皮

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至七分
去滓溫服

乾薑附子湯 七十三 下之後復發汗晝日煩躁不得眠

夜而安靜不嘔不渴無表證脉沉微身無大熱者此

主之 屬太陽

乾薑 一兩

附子 一枚生用去皮

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至七分

去滓温服未知再服

五苓散

七十四

霍亂頭痛發熱身疼痛熱多欲飲水者

五苓散主之寒多不用水者此主之 ○ 大病差後喜

唾久不了了胃中有寒當以丸藥温之宜服此 屬陰陽

後勞復

乾薑 炮

甘草 炙

人參 腹痛者倍之

白木 各壹兩

右搗篩煉蜜和丸如雞子黃許大以湯數合和一

圓研碎温服之日三夜二服腹中未熱益至三四

圓熱粥飲之微自温覆勿揭衣然不及湯又方

人參

乾薑 炮

甘草 炙

白木 各三兩

腹痛者加人參一兩半寒者加乾薑一兩半渴欲

得水者加白木一兩半臍上築者腎氣動也去木

加桂四兩吐多者去木加生薑三兩下多者還用

木悸者加茯苓二兩或四肢拘急腹滿下利或轉

筋者去白朮加附子一枚生用

右劉如麻豆大每服五錢老水一盞半煎至八分去滓溫服日三服

四逆湯

七十五

傷寒醫下之續後下利清穀不止身疼

痛急當救裏後身疼痛清便自調者急當救表救裏

宜四逆湯救表宜桂枝湯

屬太陽

○自利不渴者以其

藏有寒故也當溫之宜服

屬太陰

○傷寒脈浮自汗出

小便數心煩微惡寒脚攣急與桂枝湯得之便厥咽

乾煩躁吐逆作甘草乾薑湯與之厥愈更作芍藥甘

苣湯與之其脚伸若胃氣不和與調胃承氣湯若重

發汗加燒鍼者或脈浮而遲表熱裏寒下利清穀者

此並主之○少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐

復不能吐始得之手足寒脈弦遲者此胃中實不可

下也當吐之若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也當溫

之或脈沉者急溫之並宜服

屬少陰

○大汗若大下利

而厥冷者或大汗出熱不去內拘急四肢疼又下利

厥逆而惡寒者或下利腹滿身疼痛者先溫裏乃攻

表

溫裏宜四逆湯
攻表宜桂枝湯

或嘔而脈弱小便復利身有微熱

見厥難治此並主之

並屬厥陰

○吐利汗出發熱惡寒四

肢拘急手足厥冷者吐利小便復利而大汗出下利

清穀內寒外熱脈微欲絕者此主之

甘草 二兩

附子 一箇 生用

乾薑 一兩 半炮

右剉如麻豆大每服四錢水一盞半煎至七分去滓溫服○強人加附子半箇乾薑加一兩半

四逆散 七十大 少陰病四逆其人或欬或悸或小便不利或腹中痛或泄利下重者此主之 屬少陰

甘草 炙

柴胡

枳實 去白穰 炒黃

芍藥 一兩 上各

右搗篩為細散米飲調下二錢日三服欬者加五味子乾薑各半兩下利悸者加桂半兩小便不利

者加茯苓半兩腹中痛者加附子半枚炮裂泄利下重先濃煎薤白湯內藥末三錢匕再煮一二沸溫服

四逆加人參湯 七十七 惡寒脈微而利利止者亡血也

此主之 屬霍亂

甘草 二兩 炙

人參 一兩

附子 一枚 生 去皮

乾薑 一兩 半炮

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服日三服

茯苓四逆湯 七十八 治發汗若下之病仍不解煩躁者

茯苓 二兩 人參 半兩 甘草 一兩

乾薑 七錢 附子 半箇生

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去

滓温服

當歸四逆湯 七十九 治手足厥寒脉細欲絕者 屬厥陰

當歸 洗 桂枝 芍藥

細辛 各一兩半 通草 甘草 各一兩炙

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半棗子一枚煎至八分去滓温服

當歸四逆加茱萸生薑湯 八十 有當歸四逆湯證若

其人內有久寒者宜服 屬厥陰

通脉當歸 洗 桂枝 去皮 芍藥

麻黃 各一兩半 甘草 炙 木通 各一兩

右剉如麻豆大每服五錢七生薑四片太棗一枚

水一盞半煎至八分去滓温服日進三服

增注類證活人書卷第十四

活人書 卷第十四

本一蓋... 豆大... 正益... 薑四... 棗一... 外

辛... 甘草... 木... 各... 一... 枚

當... 芍藥

其人內... 寒... 宜... 藥

增注類證活人書卷第十五

通脉四逆湯 八十一 少陰病下利清穀裏寒外熱手足

厥逆脉微欲絕身反不惡寒其人面色赤或腹痛或

乾嘔或咽痛或利止脉不出者通脉四逆湯主之 屬

陰 ○下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通脉四逆湯

屬厥陰

甘草 貳兩 乾姜 參兩 附子 大者一枚去皮

面赤者加連鬚葱九莖腹中痛者去葱加芍藥二

兩嘔者加生薑二兩咽痛去芍藥加桔梗一兩利

止脉不出者去桔梗加人參二兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煎至八

分去滓温服未差急更作一劑其脉續續出者愈

通脉四逆加猪膽湯八十三吐已下斷汗出而厥四肢

拘急不解脉微欲絕者通脉四逆加猪膽湯主之屬霍亂

甘草 貳兩炙

乾姜 參兩

附子 大者壹枚生去皮

猪膽汁 半合

右三味剉如麻豆大每服抄五錢匕以水一盞半

煎至八分去滓内猪膽汁温服其脉即來

黃連湯八十三傷寒胃中有熱胃中有邪氣腹中痛欲

嘔者黃連湯主之屬太陽

甘草 參兩炙

黃連 參兩

乾姜 參兩炮

人參 貳兩

半夏 貳兩半

桂枝 參兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕棗二枚以水三盞

煎取一盞半去滓分二服

黃連阿膠湯八十四少陰病得之二三日已上心中煩

不得卧黃連阿膠湯主之

黃連 壹兩

阿膠 參分

黃芩 壹分

芍藥 半兩

雞子黃 半箇

右剉如麻豆大每半劑以水二盞煎取一盞去滓

内膠消盡内雞子黃攪令勻温服日二服

黃芩湯 八十五 太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯
若嘔者黃芩加半夏生姜湯主之○傷寒脈遲六七
日而反與黃芩湯徹其熱脈遲為寒今與黃芩湯復
除其熱腹中應冷當不能食今反能食此名除中必
死 屬厥陰

黃芩 壹兩

芍藥 壹兩

甘草 壹兩炙

右判如麻豆大每服五錢棗子一枚以水一盞半
煎至八分去滓溫服

黃芩加半夏生姜湯 八十六 太陽與少陽合病自下利
者與黃芩湯若嘔者黃芩加半夏生姜湯主之 屬太

黃芩 叁分

半夏 貳分半

芍藥 貳分

甘草 貳分

右判如麻豆大每服五錢生姜四片大棗子一枚
以水二盞煎至八分去滓溫服

文蛤散 八十七 病在陽應以汗解之反以冷水噴之若
灌之其熱被却不得去彌更益煩肉上粟起意欲飲
水反不渴者服文蛤散若不差者與五苓散寒實結
胃無熱症者與三物白散 龐安常云小陷胃湯非也

文蛤 壹兩

右一味為散沸湯和服方寸匕

三物白散

六十八

寒實結胃無熱症者與三物白散

屬太陽

貝母

參分

桔梗

參分 去蘆

巴豆

去心皮熬黑 研如脂壹分

右為散內巴豆研勻以白飲和服彊人半錢匕羸人可減之病在膈上必吐在膈下必利不利進熱粥一盃利過不止進冷粥一椀身熱皮粟不解欲引衣自覆若以水噀之洗之益令熱却不得出當汗而不汗則煩假令汗出已腹中痛與芍藥三兩如上法

十棗湯

六十九

太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之

其人鞅鞅汗出發作有時頭痛心下痞鞭滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裏未和也以十棗湯主之

芫花

炒赤熬

甘遂

大戟

各等分

右各等分異篩秤末合和之入臼中再杵治三百下先以水一升半煎肥棗子一十枚煎取八合去滓內藥末強人一錢匕羸人可半錢再單飲棗湯送下平日服若下少病不除者明日更服加半錢利後糜粥自養合下不下令人脹滿通身浮腫而死
抵當丸 九十 傷寒有熱小腹滿應小便不利今反利者為有血也當下之不可餘藥宜抵當丸 屬太陽

水蛭 伍箇熬去子杵碎水蛭再生化為害尤甚須剉斷用石灰炒過再熬

桃仁 肆箇去皮尖 大黃 叁分去皮淨

蠱蟲 伍箇去翅足熬

右搗篩只為一丸以水一大白盞煎至七分頓服
啐時當下血不下更作之

抵當湯 九十一 太陽病六七日表症仍在脉微而沉及

不結胃其人發狂者以熱在下焦少腹鞭滿小便自利者下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀熱在裏故也抵當湯主之○太陽病身黃脉沉結小腹鞭小便不利者為無血也小便自利其人如狂者血證

抵當湯主之○傷寒有熱小腹滿應小便不利今反利者為有血也當下之不可餘藥宜抵當湯 已上屬太陽

○陽明症其人喜忘者必有畜血所以然者本有久瘀血故令喜忘屎雖鞭大便反易其色必黑者宜抵當湯下之○病人無表裏證發熱七八日雖脉浮數者可下之假令已下脉數不解今熱則消穀喜饑至六七日不大便者有瘀血宜抵當湯主之 已上屬陽明

水蛭 拾枚熬去子杵碎水蛭入腹再生化為害尤甚須剉斷用石灰炒過再熬

大黃 壹兩去皮酒洗 蠱蟲 拾枚去翅足熬

桃仁 柒枚去皮尖搗碎用

右剉如麻豆出作一服以水二盞煎至七分去滓
温服之

麻仁丸

九十二

跌陽脉浮而濇浮則胃氣強濇則小便

數浮濇相搏大便則鞭其脾為約麻子仁丸主之

屬陽明

麻仁 伍兩

芍藥 肆兩

厚朴

伍寸半去皮姜汁炙

枳實

肆兩炙

杏仁

貳兩半去皮尖

大黃

捌兩去皮淨

右為散蜜和為丸如桐子大飲下十九丸未知益之

日進三服

茵陳蒿湯

九十三

陽明病發熱汗出者此為熱越不能

發黃也但頭汗出身無汗刺頸而還小便不利渴引

水漿者此為瘧熱在裏身必發黃茵陳蒿湯主之

傷寒七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿者以

茵陳蒿湯主之 屬陽明

茵陳蒿 嫩者壹兩

大黃

參錢半去皮

梔子

大者叁枚

右剉如麻豆大以水二大盞先煎茵陳減半盞

次內二味煎八分去滓温服日三服小便當利尿

如皂莢汁狀色正赤一宿腹減黃從小便中去也

牡蠣澤瀉散

九十四

大病差後從腰以下有水氣者牡

蠣澤瀉散主之

陰陽易差後勞復病脉證

牡蠣煨

澤瀉

蜀漆

洗去腥

商陸熬

葶藶熬

海藻

洗去鹹

括蕒根各等分

右為散飲服方寸匕小便利止後服

竹葉石膏湯九十五

傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐竹

葉石膏湯主之

陰陽易差後勞復病脉症

淡竹葉半把

半夏陸錢一字湯泡洗

石膏

肆兩碎

人參半兩

甘草半兩炙

麥門冬

壹兩壹分去心

嘔者加生姜一兩半

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半入生姜

四片粳米百餘粒煎取八分米熟湯成去滓温服

枳實梔子湯九十六

大病差後勞復者枳實梔子湯主之

枳實

壹枚去穢麩炒

梔子

叁枚半肥者

豉壹兩五錢綿裹

右以清漿水二盞半空煮退八分內枳實梔子煎

取九分下豉再煎五六沸去滓温服覆令汗出若

有宿食內大黃如博棋子五六枚同煎

白通湯九十七

少陰病下利脉微白通湯主之

屬少陰

附子

壹枚生用

乾姜

壹兩炮

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半入葱白

四寸煮至七分去滓温服

白通加猪膽汁湯九十八少陰病下利脉微者與白通湯利不止厥逆無脉乾嘔煩者白通加猪膽汁湯主之服湯脉暴出者死微續者生

猪膽半合

乾姜半兩

葱白肆莖

溺貳合半

附子半箇生去皮

右以水一盞煎五分去滓內尿膽汁和相得分温再服

桃花湯九十九

九十九

少陰病下利便膿血者桃花湯主之○

少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下利不止便膿血者桃花湯主之屬少陰

赤石脂四兩一半碎

一半篩末用

乾姜壹分炮

右剉如麻豆大每服四錢入糯米一撮水一盞半

煎至一盞去滓再入赤石脂末一方寸匕服日進

三服若一服愈勿再服

吳茱萸湯一百

一百

食穀欲嘔屬陽明也吳茱萸湯主之

得湯反劇者屬上焦也屬陽

明

○少陰病吐利手足逆

冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之乾嘔吐涎沫頭痛者

吳茱萸湯主之屬少陰

人參壹兩去蘆

壹兩去蘆

吳茱萸

壹兩陸錢伍分湯洗三遍

右剉如麻豆大每服四錢生姜四片棗子一枚以水二盞半煎至八分去滓分二服

猪膚湯 二百 少陰下利咽痛胃滿心煩猪膚湯 屬少陰

猪膚 貳兩陸錢半

右一味以水二大白盞半煮取一盞許去滓加白蜜一合半白粉一合相和温服

桔梗湯 二百三 少陰病二三日咽痛與甘草湯不差與

桔梗湯 屬少陰

桔梗 壹兩

甘草 貳兩炙

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煎至八分去滓温分再服

半夏散及湯 二百四 少陰病咽中痛半夏散及湯 屬少陰

半夏 湯洗

桂枝 去皮

甘草 炙

右等分各別搗篩已令和治之每服三錢水一大盞煎至八分令冷少少嚥之

苦酒湯 二百四 少陰病咽中傷生瘡不能語言聲不出者苦酒湯主之

半夏 洗碎如棗核拾肆枚

雞子 壹枚去黃內苦酒著雞子殼中

右二味內半夏著苦酒中以雞子殼置刀環中安火上令二三沸去滓少少含嚥之不差再服

真武湯 二百五 太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心

下悸頭眩身瞤動振振欲擗地者真武湯主之 屬太陽

○少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者此為有水氣其人或咳或小便便利或下利或嘔者真武湯主之 屬少陰

茯苓

參分小便利者去茯苓

白朮

貳分

芍藥

參分下利者去芍藥加乾姜二分

附子

壹枚炮去皮破掬片別貳片嘔者去附子加入生姜參兩

若咳者加五味子三分細辛一分乾姜一分
右剉如麻豆大每服抄五錢匕生姜四片水一盞半煎至八分去滓溫服日進三服

烏梅丸

傷寒脈微而厥至七八日膚冷其人

無暫安時者此為臟厥非蛻厥也蛻厥者其人當此蛻令病者靜而復時煩者此為臟寒蛻上入其膈故煩須臾復止得食而嘔又煩者蛻聞食臭出其人當自吐蛻蛻厥者以烏梅丸主之 屬厥陰

烏梅

柒拾伍枚

細辛

壹兩半

乾姜

貳兩半

黃連

肆兩

當歸

壹兩

附子

壹兩半炮去皮

蜀椒

出汗壹兩

人參

壹兩半

桂枝

壹兩半去皮

黃蘗

壹兩半

右十味異搗篩合治之以苦酒漬烏梅一宿去核

蒸之五升米下飯熟杵成泥和藥令相得內臼中與蜜杵二千下桐子大先食飲服十九日進三服稍加至二十九禁生冷滑物等

乾姜黃芩黃連人參湯二百七傷寒本自寒下醫復吐

下之寒格更逆吐下若食入口即吐乾姜黃芩黃連

人參湯主之屬厥陰

乾姜參分炮

黃芩參分

黃連參分

人參參分

右剉如麻豆大每服抄五錢水一盞半煎至八分去滓溫服

白頭翁湯二百八熱利下重者白頭翁湯主之○下利

欲飲水者以有熱也白頭翁湯屬陰

白頭翁壹兩

黃蘗壹兩半

秦皮壹兩半

黃連壹兩半

右剉如麻豆大分五服以水二大盞煎至八分去滓溫服不差再服

赤石脂禹餘糧湯二百九傷寒服湯藥下利不止心下

痞鞭服瀉心湯已復以他藥下之利不止醫以理中

與之利益甚理中治中焦此利在下焦赤石脂禹餘

糧湯主之復不止者當利其小便屬太陽

赤石脂 肆兩

禹餘糧 肆兩

右剉碎每服抄五錢匕水一盞半煎至八分去滓
溫服

旋復代赭湯 百十一 傷寒發熱若吐若下解後心下痞
鞭噫氣不除者旋復代赭湯主之 屬太陽

旋覆花 參分 人參 半兩 代赭石 壹分

甘草 參分炙 半夏 參分湯洗

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生姜四片棗子一
枚煎至八分去滓溫服

瓜蒂散 百十二 病如桂枝症頭不痛項不強寸脈微

胃中痞鞭氣上衝喉咽不得息者此為胃有寒也

吐之宜瓜蒂散主之 屬太陽

瓜蒂 熬黃 赤小豆 各干兩

右各搗篩已合治之取一錢匕豉一合湯七合先
漬之須臾煮作稀糜去滓取汁和散溫頓服不吐
少少加得快吐乃止諸亡血虛家不可與之

蜜煎導湯 百十三 陽明病自汗出若發汗小便自利者

此為津液內竭雖鞭不可攻之當須自欲大便宜蜜
煎導而通之若土瓜根及大猪膽汁皆可為導

蜜 肆兩

右一味內銅器中微火煎之稍凝如飴狀攪之勿
令焦着欲可丸捻作挺如指許長二寸當熱時急
作令頭銳內穀道中以手急抱欲大便時乃去之

猪膽汁方

用大猪膽一枚瀉汁和法醋少許以灌穀道中如
有一食頃當大便

燒棍散

百十一

傷寒陰易之為病其人身體重少氣小

腹裏急或引陰中拘攣熱上衝胃頭重不欲舉眼中
生花膝脛拘急者燒棍散主婦人棍襠燒灰 右一味

以水和服方寸匕小便利陰頭腫即愈 活人書第十五卷

