

遠西方彙

二

○卷之二

神經熱

○敏性神經熱

○鈍性神經熱

○鈍性神經熱係腦症

○鈍性神經熱係肺症

○鈍性神經熱係腹內症

十武九

237

2



門 武
號 237
卷 2



遠西方彙卷之二

獨乙

加幾安頓

和蘭

婁婆都

譯

侍醫法眼貫齋伊東貞文仲 重譯

南洋伊東亨健夫 參校

神經熱 セブリス、子ルホサ 羅

世人通知セルガ如ク此症二種ノ別アリ○一ハ敏性神經

熱 セブリス、子ルホサ ○一ハ鈍性神經熱 セブリス、子ルホ

羅 セブリス 是ナリニ症共ニ腦及ヒ神經系ニ係ルト雖然レ氏敏

遠西方彙 卷之二



性神經熱ハ生カ虚衰シ覺機亢進スルノ症ヲ謂ヒ鈍性神
經熱ハ生カ虚衰シ覺機遲鈍ナルノ症ヲ謂ヒ右ノ二症ハ
唯病ノ輕重ニ由テ異ナル乎或ハ其本性ヲ殊ニスル乎未
之ヲ確定セズト雖輒近解體病理論家顯微鏡ヲ以テ發明
セシ說ニ據レハ鈍性神經熱ノ本性ハ血液ノ調和變常ニ
係ルトス是恐ハ單純神經熱ニアラサル所以歟
第一敏性神經熱リスブリス子ルホサスルサチ
此症輕易ノ者ハ格魯林水百十方以テ適當ノ劑トス稀鹽
酸百十方モ亦同性ナル者ニ列ビ屈氏ハ殊ニ之ヲ稱賛シ
テ格魯林水ニ代用セリ病腦ヲ侵ス一甚キ者ハ耳後ニ蟬

鍼ヲ施シ項窩ニ芫菁膏ヲ貼シ頭上寒菴法兩脚温湯ニ浸
シ遍體諸部ニ芥子泥ヲ貼シ殊ニ下肢ニ於テ交替シ貼ス
スベシ往昔多ク稱用セシ所ノ纈草白芷攝爾扁太里亞亞
兒尼加亞的兒等ノ如キ衝動藥百十五方大ニ神經系
ヲ衝動セシメ且麻痺ヲ遺シ易キガ故ニ用ニ臨テ最謹慎
ヲ加フベシ爾噤屈斯名ハ大ニ實實芫荽利斯名ハ大ニ實ヲ贊羨ノ
ハ唯神經熱單純ナル者ニ用フルノミナラズ猩紅熱癩麻
質斯熱ヲ合併セル症ニモ亦稱用セリ理篤阜名モ亦同ク
之ヲ賞シ或ハ實芫荽利斯ヲ鹽酸ト配伍シ舌上稍苔ヲ帶
ブル症ニ與ヒ患者甚安靜ナラズ不寐ナル症ハ菲阿斯

加後藥

民埤列里精錢六 忽弗滿液一 砂糖舍利別半

右調和每一時服一食匙

主治 格魯林水方百十ヲ用ヒテ効ヲ收ムルニ足ラザル氏ハ此浸劑ニ轉ズベシ且微温浴ヲ施シテ發汗ヲ促スニ宜シ皮表ヨリ分利セシムルヲ最簡要トス然レ氏合併ノ症殊ニ腸胃汚物ノ有無ニ着眼シ若之アル者ハ吐劑或ハ適宜ノ下劑ヲ與ヘテ之ヲ驅除スベシ

○第百十三方 春痘降

纈草錢三 雜腹蘭錢半 熱湯適宜浸放冷加後藥

過設印亞的兒錢半 橙花舍利別半

右調和每一時服一食匙

○第百十四方 別連杜

亞兒尼加花錢二 熱湯適宜浸漬瀝取六ヲ加後藥

亞刺昆亞護謨錢二 橙皮舍利別一

右調和每一時服一食匙

○第百十五方 職歌蘭度

亞兒尼加根末半 水十勺煮至八ヲ加攝爾扁太里亞

根末二錢上文火瀝過加後味

忽弗滿液錢一 橙皮舍利別一

右調和每一時服二食匙

主治第百十三方ヨリ百十五方至敏性神經熱ニ謹慎シ
ラ與フベシ

○第百十六方 春煙隣

醇醋二錢至 覆盆子水五 過設印亞的兒半錢至

覆盆子舍利別二

右調和每一時服一食匙

主治敏性神經熱ニ甚之ヲ稱用ス

○第百十七方 別連杜

安沒尼亞加 枸椽密幾私去爾
硃砂揮發華水附 或 鹿琥精半 枸椽汁三

右調和乘沸騰服之

主治揮發衝動ノ方ニノ敏性神經熱ニ用ヒテ超絶ノ發
汗劑トス

○第百十八方 爾噤屈斯

實芟荅利斯四 熱湯適宜浸瀝取四加後味

過兒托舍利別半

右調和每一時服一食匙

主治敏性神經熱ニ宜シ ○刷屈斯氏累年實驗ノ確定セ

シ説ニ云ク敏性神經熱ニ實芟荅利斯ヲ用フルハ其

効他藥ニ卓越セリ初起之ヲ十分ニ用フレバ其危險ニ

陷ルヲ預防シ已ニ危篤ニ及ブ者モ亦之ニ由テ佳候ニ
 轉スト約メテ之ヲ言ヘバ實^キ麥^タ荅^リ斯ハ是此症ニ一種ノ
 奇藥タリト刷^ハ屈^ス氏病初直ニ之ヲ多量施用セリ即四
 マヨリ増加メニ錢ニ至リ瀝液四弓ヲ取りテ十二時間
 ニ全量ヲ服盡セシム但毎服時刻ヲ遠隔セシム○然レ
 氏余之ヲ考フルニ所謂服量ニ錢ニ至ルハ危險ナリ余
 若之ヲ用フルコトアラバ理^ト篤^ト阜^ト名^トニ倣ヒ半錢乃至一錢
 ラ以テ瀝液六弓ヲ取り毎一時一食匙ヲ服セシムベシ
 然レ氏吾ガ此論モ亦實驗ニ出ヅルニアラズ何トナレ
 バ鈍性神經熱係腹内症既往流行セシ以來余未單純ノ

敏性神經熱ヲ療セザレバナリ

○第一百九方

菲阿斯越幾斯^ハ白糖^四

右調和為散等分八包每服一包日四次

○第一百二十方^{過^ハ佛^ト栗^ト屈^ト的^ト兒^ト}

菲阿斯越幾斯 雜腹^蘭 雜腹^蘭 東方^產者 白糖^一

右調和為散分六包每一時服一包

主治 右二方ハ敏性神經熱興奮機亢ブル者及ヒ不寐譫
 語ニ宜シ○余以為ラク方中菲阿斯越幾斯ノ服量稍過
 多ナリトス更ニ小量ヨリ始メテ唯日ニ三次或ハ四次

之ヲ與フベシ 一時毎ニ用フルコト勿レ

○第百二十一方

麝香八分至十二分 白糖四分

右調和為散等分八包 每一時服一包

○第百二十二方別連杜

麝香六分 揮發鹿角鹽半錢 纈草油糖或桂油糖一分

右調和為散等分為六服 蠟紙包裹 每一時一服

主治 敏性神經熱及ヒ神經性ノ皮疹ニ宜シ

○第百二十三方

麝香八分至十二分 甘汞六分至八分 白糖四分

右調和為散等分八包 每一時服一包

主治 敏性神經熱 神經証ヲ見ハス一甚シク且興奮力亢盛スル者ニ宜シ

○第百二十四方

麝香八分至十二分 龍腦細碎者二分至四分 白糖四分

右調和為散等分八包 每一時乃至一時半服一包

主治 神經熱 皮膚弛緩シテ粘汗ヲ發スル者之ニ宜シ

○第百二十五方秘傳 欣獨薄

吐根粗末六分至半錢 熱湯適宜浸漬八分時 濾取六分

右每一時服二食匙強

遠西方藥 卷二 廣勝堂

主治 聖京^{セントギン} 偃熱^{エンネツ} 神經症ニ轉移スル者此方奇特ノ劑トス
 ○或ハ^ア亞刺昆^{アクリン} 亞蘆^{アロ} 護漿^{ゴジュウ} 半^ハ 或ハ^ア 橙皮^{テイヒ} 舍利別^{セリベツ} 二錢^{ニゼン} 或ハ^ア
 沙糖^{シャドウ} 少許^{シャウコ} ヲ配伍スルモ可ナリ 或ハ^ア 症ニ從ヒ^{シヨウニ} 吐根^{トクン} 飽熟^{ボジュク}
 スル片^{ハタ} 過兒^{カウ} 拖煎^{トウケン} ヲ加ヘ^{カヘ} 或ハ^ア 纈草^{セツソウ} 或ハ^ア 龍腦^{リウノウ} 三^{サン} ヲ和シ
 用フ

○第百二十六方 曾別倫^{ソウベツリン} 母^ボ

葡萄^{ブドウ} 草^{ソウ} 葉^{エフ} 浸^ニ 五^ゴ 葉^{エフ} 半^ハ 製^{セイ} 之^ノ 葡萄^{ブドウ} 草^{ソウ}
 民^{ミン} 埜^ノ 列^{レツ} 里^リ 精^{セイ} 一^{イチ} 加^カ 密^{ミツ} 列^{レツ}
 舍利^{セリ} 別^{ベツ} 六^{ロク} 錢^{ゼン}

右調和每一時服一食匙

主治 神經熱輕症殊ニ聖京^{セントギン} 偃^{エン} 及ヒ^キ 偃^{エン} 質^{シツ} 斯^ス 症^シ ヲ合併セ

ル者之ニ宜シ

○第百二十七方 同主

纈草^{セツソウ} 三^{サン} 錢^{ゼン} 熱湯^{ネツトウ} 適^{テイ} 宜^イ 浸^ニ 瀝^シ 取^ク 四^シ 加^カ 後^{コト} 藥^{ヤク}
 民^{ミン} 埜^ノ 列^{レツ} 里^リ 精^{セイ} 半^ハ 過^カ 設^{セツ} 印^{イン} 亞^ア 的^{テキ} 兒^エ 錢^{ゼン} 雜^ザ 腹^{ブク} 蘭^{ラン} 舍^セ 利^リ 別^{ベツ} 一^{イチ} 錢^{ゼン}
 附

右調和每一時服一食匙

主治 神經熱輕症^{ネンキョウネツケイシヨウ} 偃^{エン} 質^{シツ} 斯^ス ヲ合併セル者及ヒ^キ 神經性^{ネンキョウシヨウ} 疹^シ
 ニ用ヒテ皮膚^{ヒバウ} ノ運機^{ウンキ} ヲ挑起スルニ宜シ

第二 鈍性^{ドンシヨウ} 神經熱^{ネンキョウネツ} 一名^{イツナヒ} 重証^{ジュウシヨウ} 神經熱^{ネンキョウネツ} 五^ゴ 子^シ

此症^{コノシヨウ} 興奮^{キョウフン} 機^キ ノ強弱^{キョウジュク} ト外來^{ガイライ} ノ諸件^{シヨウケン} トニ由テ種々^{シュウシュウ} 其景況^{キョウキョウ} ヲ

殊ニス或ハ病邪觸動機及ヒ補給機ヲ侵ス一專ニシテ知
 覺機ニ係ル一却テ少ク諸見証遍ク全體ニ關係スル症ア
 リ或ハ專ラ頭腦純性神經熱肺臟純性神經熱若クハ腹内純性神經熱
 腹内ニ係在スル症アリ蓋此病ハ世間困窮ノ時殊ニ戰場
 及ヒ凶年ニ一般流行ス又都會軍陣ノ圍ヲ受クル時大ニ
 此症ヲ患フル一アリ或ハ病院及ヒ獄中ニ行ハル者ア
 リ其症最傳染シ易シ傳染神經熱或ハ往々一種ノ疹ヲ發シ發疹
 熱神經熱或ハ斑ヲ發スル者發熱斑神經熱アリ或ハ最モ恐怖スベキ
 證状ヲ見ハシテ腐敗性ヲ帶ビ加之東方疫發黃熱ニ類似
 セル者モ亦間之アリ○此症品類繁冗ナル此ノ如シト雖

疾醫ノ要ハ之ヲ分テ係腦症係肺症係腹内症ト為スヲ最
 適當ナリトス

甲 純性神經熱係腦症チピウス、ケレブラリス
 羅ヘルセン、ナピウス、蘭

此症一千八百十五年ノ役和講以來之アル一稀ナリト雖
 其以前一千八百六年及ヒ七年殊ニ一千八百十二年ヨリ
 十五年至大ニ流行シ弱齡壯實ノ徒此症ニ罹リシ者最多
 シ其熱始七日間焮衝性ヲ帶ヒテ多血頭腦ニ蓄積シ或ハ
 真腦焮衝ヲ發シ之ガ為ニ神經性諸証ヲ見ハスニ至レリ
 此ノ如キ症ハ初起身體及ヒ室内病床俱ニ清涼ニ保護シ
 被衾ヲ輕クシ飲料ニ冷水ヲ與フルヲ須要ナリトス頭ヲ

寒暑シ全身ヲ冷洗シ桶中ニ坐シテ灌水シ水節ヲ以テ冷水ヲ射注スル等皆即効ヲ奏セリ蓋此諸法ハ皮膚乾燥ノ熱シ面色赤クシテ頭熱灼クガ如ク昏昏々眠ヲ嗜ミ或ハ狂妄ヲ發シ且血管ノ熱熾盛ナル症ニ佳ナリトス頭腦ノ疾患順良ニシテ肌膚微熱ヲ帯ビ滋潤セル者ハ微温湯中ニ浸坐シ即時冷水ヲ灌注シテ更ニ効アリ○又此症刺絡ヲ必要トセリ之ヲ施セバ焮衝將ニ發セントスルヲ預防シ已ニ發スル者ハ之ニ由テ除クヲ得其瀉血焮衝皮ヲ生セシ者之アリ此ノ如キ者ハ真焮衝ノ為ニ死セリ但此ノ如キ症ハ當時モ亦之アル一甚鮮シ方今間之アル所ノ鈍

性神經熱係腦症ハ今時ノ流行性ニシテ昔年ノ病性ニ異ナリ容易ニ刺絡スベカラズ故ニ真ニ刺絡ノ定証ヲ具ヘズ麻痺甚シク謔言狂妄スル症面色赤クノ熱シ焮衝状ヲ見ハシ弱齡強實ナル者ハ顛顛或ハ耳後ニ放蟻八頭ヨリ十二頭若ハ十五頭至其飽落後モ亦少間出血セシムベシ數次蟻吮ヲ要スル者モ亦間之アリ若蟻ナキハ吸角法モ亦可ナリ兼テ項窩光膏膏腓腸芥子泥足躡温暖布ヲ貼スル等適當ナリトス大便通利ニ注意スル一最簡要ナリ腸胃ノ汚物或ハ膽液ヲ帶ブル症ハ殊ニ然リ但緩ナル梅那浸ニ酒酸加里曹達ヲ加フル者百廿或ハ梅那煉膏ニ

百四十諸種ノ亜的兒劑百十六方百安沒尼亞劑百四十八方燐百五十五方是ナリ然レト重症ニ在テハ衝動劑却テ害アリ之ガ為ニ病加重スル者數之アリ唯龍腦ハ之ニ異ナリ皮膚粘滑ニシテ脈小疾弦ナル者眠瘡或ハ手足指頭寒壞疽ノ症ニ十二時間ニ十ハ乃至十二ハ用ヒテ偉効アリ加之病毒分利ヲ催進ス或ハ之ヲ單用シ百五十方或ハ之ヲ醋ニ加ハ百七十五方或ハ症ニ應ジ麝香ニ配伍ス百五十方○病本復スルノ時ニ方テハ苦味ノ越幾斯劑百九十五方菖蒲根百六十五方ヲ用フ但大ニ衰弱セル者ハ幾那浸劑百六十五方或ハ煎劑百六十五方ヲ用フルヲ稱譽ス其他飲食ヲ節スルヲ簡要ナリ

ナリ

○第百二十八方

旃那錢一熱湯適宜浸濾取三加後味

酒酸加里曹達二錢至三錢滿那舍利別半

右調和每一時服一食匙以至得下

主治 鈍性神經熱係腦症腸胃汚物ヲ合併シ及ヒ便秘スル者之ニ宜シ

○第百二十九方飛歌蘭變

甘汞八分至十六分白糖四

右調和為散等分八包每一時乃至一時半服一包

廣野堂

〔主治〕頭腦ノ焮衝性疾患及ヒ神經熱ニ適應ノ消焮法ヲ施スノ右腦ノ關係連綿トノ退カサル者之ニ宜シ

○第三百三十方〔同上〕

甘汞^ハ 精製阿芙蓉^ハ 白糖^四

右調和為散等分ハ包毎一時服一包

〔主治〕頭腦焮衝性ノ疾患アリシ症變シテ敏性神經熱或ハ鈍性神經熱ト為ル者頭面ノ赤色及ヒ肌熱減退シ脈小且軟トナル者ハ少量ノ阿芙蓉ニ甘汞ヲ配伍スル者ヲ主藥トス此方無比ノ偉効ヲ奏スルヲ屢之アリ兼テ項上ニ先菁膏ヲ貼スベシ

○第三百三十一方〔補腦秘〕

精製磷酸^{錢ニ} 覆盆子舍利別^{弓ニ}

右調和毎一時取一茶匙冷水和服

○第三百三十二方〔同上〕

精製磷酸^{錢ニ} 覆盆子舍利別^{弓ニ} 過兒把煎^{五弓者過}

之取

右調和毎一時服一食匙

〔主治〕右二方^{百世ニ方} 敏性神經熱及ヒ鈍性神經熱ニ

宜シ磷酸ハ十二時間ニ一錢乃至三錢ヲ用フベシ

酸ハ甚佳味且爽快ノ藥ニシテ肌熱アル者多血一部ニ

畜積セル者。身心不安。ニ宜シク且煩渴ヲ消シ胃モ亦能之ヲ受クルニ堪フ

○第百三十三方

酒石酸錢一 覆盆子水五勺溶和加後藥

覆盆子舍利別勺一

右調和每一時服一食匙強

○第百三十四方

精製荅麻林度勺一 純精酒石錢二 覆盆子舍利別宜適

右作軟煉膏朝夕服一茶匙乃至二茶匙

○第百三十五方 荅麻林度製乳清

牛乳二 入壺煮沸後加荅麻林度髓四勺更上火攪和

至凝聚瀘過

右每一時服半盞子

主治右三方百廿三方至百廿五方 焮衝熱。膽液熱。神經熱。焮衝

ニ傾ク者。慢性肝臟病。及ヒ其他ノ症ニ於テ清涼且瀘ヲ

要スル者之ヲ用フ

○第百三十六方

精製阿芙蓉ハ一 白糖勺二

右調和為散等分四包朝夕服一包

○第百三十七方

醋酸模爾比捏一 白糖四

右調和為散等分八包應症朝夕服一包

○第三百三十八方

葛私篤四 白糖半

右調和為散分八包每一時乃至二時服一包

主治右三方百世六方至 疼痛癱瘓單二神經ノ刺衝ニ

由ル者ヲ鎮靜スルニ宜シ○麝香百世一方至 亦佳ナ

○第三百二十九方機駁蘭度

頰草粗末 白芷粗末 亞兒尼加花各一 注熱湯蓋

閉上文火煮四分時濾取四勺加後藥

硃砂加過泥子精 忽弗滿液各半 砂糖舍利別半

右調和每一時服一食匙

○第三百四十方福個篤

頰草 白芷各半 注熱湯適宜浸漬濾取六勺加後藥

鹿琥精 忽弗滿液各二 麗春花舍利別六

右調和每一時服一食匙

○第三百四十一方別連杜

頰草半 熱湯適宜浸漬濾過取五勺加後藥

醇醋二 過設印亞的兒一 橙花舍利別一

右調和每一時服一食匙臨服宜振蕩

主治右三方百廿九方至百四十一方 敏性症ト鈍性症トヲ論セズ

總テ順症神經熱ニ用フベシ然レ氏其症此モ熾衝ノ候

ナク純粹神經性ノ者ニ用フベキノミ ○臧歇蘭度名ハ

之ニ兼テ洗滌法心窩香竈藥罨法芥子泥十時毎ニ之

症ハ六時 強壯藥灌腸法且微温湯浴ハ二十度等ヲ殊ニ稱用

セリ並ニ滋養衝動ノ食餌雞卵水ニ酒ヲ加フル者肉羹

汁等ヲ與フ○然レ氏予が見ヲ以テスレバ總テ是等ノ

衝動藥ハ敏性神經熱鈍性神經熱俱ニ容易ニ用フヘカ

ラズトス蓋此ニ右ノ三方及ヒ左ノ一二方ヲ列擧スル

○所以ノ者ハ一ハ此書ヲ全備セシノニハ治法ノ來歴ヲ

示スナリ且予ガ徒豈臧歇蘭度福倭篤別連杜陽栗屈的

爾氏等ノ如キ大家ノ意ニ及ノ他方ヲ擧クルヲ得シ

ヤ况ヤ復既往流行セシ神經熱ニ於テハ衝動強壯ノ療

法偉効ヲ奏セシト明確ナルヲヤ後來復神經熱ヲ療ス

ルニ衝動強壯ノ療法ヲ須ツナキト能ハジ

○第四百十二方弗陽

白芷半 熱湯四勺浸漬瀝加後藥

櫻實舍利別半

右調和每半時服二食匙強

硫酸亞的兒二 橙皮舍利別半

右調和每半時服二食匙

○第四百五十五方同上

攝爾扁太里亞六 熱湯八寸浸漬暫時煮沸濾加後藥

忽弗滿液二

右調和每半時服一食匙

○第四百四十六方評倫

亞兒尼加花半 熱湯適宜浸濾過取六寸冷定加後藥

鹿琥精二 硫酸亞的兒一

右調和每半時服一食匙

主治第四百四十四方ヨリ第四百四十六方至神經熱鈍性衰

弱ヲ帶ブル者之ニ宜シ

○第四百四十七方穢駭蘭度

桂油十 龍涎香越 仙扶亞或麝香越 仙扶亞半 忽弗

滿拔爾撒謨非 荅一 錢一 硫酸亞的兒半 舍電阿芙蓉

液一

右調和每一時乃至一時半服三十滴

主治神經熱麻痺ノ候極度ニ至リ生力虚脱ノ死ニ瀕シ

意識並ニ知覺運動ヲ喪失シ且肚腹膨脹ノニ便失禁セ

ル症右ノ藥液ヲ以テ左法ト兼子施ス片ハ回生ノ効ヲ

収ムル一聞之アリ即古列印酒ヲ匙抄シテ與へ發苑膏
 四枚一齊ニ貼シ。ハハ心窩其他香竇藥湯ニ葡萄酒若ハ
 燒酒ヲ加ヘテ猛烈ノ浴法湯温ニ行ヒ葡萄酒二三ヲ
 灌腸トシ。肚腹及ヒ頭上ニ冰冷罨法ヲ用ヒ加之頭上
 ニ烙鉄ヲ施スベシ

○第四百十八方過。傑。栗。屈。的。爾。

揮發鹿角鹽錢半 亞刺昆亞錢二 藪謨漿錢二 桂水四 雜腹
 蘭舍利別一

右調和每半時服一食匙強

○第四百十九方列墨爾

揮發鹿角鹽四 麝香二 纈草油糖半

右調和為散等分八服蠟紙包裹每半時一服

主治右二方百四十八方ハ鈍性神經熱著シク神經証ヲ

見ハシ且皮膚鈍性衰弱ノ症ニ宜シ

○第四百五十方過。傑。栗。屈。的。爾。

東方產麝香二刀加白糖 揮發鹿角鹽半刀至 默栗

薩水四 桂丁藥 阿芙蓉舍利別各半

右調和每半時服一食匙臨眠振蕩

主治鈍性神經熱大ニ神經証ヲ發スル者脈小弱ニシテ

結代シ四肢冷小便灰白呼吸痙攣ヲ帶ヒ昏々嗜眠スル

者之ニ宜シ

○第百五十一方速別倫四母

龍腦細碎

揮發鹿角鹽五

纈草油糖半

右調和為散等分六服蠟紙包裹每一時一服

主治鈍性神經熱熱性疹ヲ發スル者之ニ宜シ

○第百五十二方同上

龍腦

亞刺昆亞蘘謨末錢二

合和加接骨木花水六

弓作乳劑再加後藥

鹿琥精錢二

雜腹蘄舍利別弓

右調和每一時服一食匙臨服宜振蕩

主治神經熱麻痺証ヲ帶ブル者之ニ宜シ

○第百五十三方福僞篤

攝爾扁太里亞錢六

法尼利錢二

古依斯巴尼亞酒適

上文火浸漬二時屢振蕩之爾後絞搾取十二弓加後

味

龍腦

半錢以再齧燒酒適宜溶解

遏設印亞的兒錢一

桂舍利別半

右調和每四分時之三服二食匙

主治鈍性神經熱患者年老已ニ衝動藥ニ習慣セル者之

ニ宜シ

○第百五十四方朴麗私

遠西藥方 卷三 廣辨堂

攝爾扁太里亞錢六 燒酒五 水宜適 上文火飽熟八分

時之三濾過取六勺和後藥

龍腦錢半 拔爾撒謨露一錢半 亞刺毘亞蘆末一錢

右合作乳劑更加過設印亞的兒一錢每四分時之三服一食匙

主治前方ニ同シ前方ハ法尼利及ヒ依斯巴尼亞酒ノ為

ニ其價貴シ但法尼利ハ拔爾撒謨露ヲ以テ代用スベ

シト雖桂舍利別ニ至テハ缺クベカラザルガ故ニ貧家

ニ處スル片ハ此方ヲ以テ福促篤氏ノ製方ニ優レリト

ス

○第百五十五方曾別倫回母

燐一ル至 白罌粟子油錢三 微温溶解投亞刺毘亞蘆

謨末徐々搗和加後藥

雜腹蘭舍利別一 白芷浸六勺以白芷半勺取之

右為乳劑更配伍鹿角精二錢每一時服一食匙臨服宜振蕩

主治鈍性神經熱及ヒ同種ノ熱症神經系ノ衰弱ヲ兼子

或ハ麻痺ニ類似セル者之ニ宜シ

○第百五十六方

龍腦六ル至 白糖錢一

遠西藥方 卷三 廣辨堂

右調和為散等分六包每一時服一包

主治鈍性神經熱ニ用コテ病邪ノ分利ヲ進メ殊ニ皮膚粘賦脈小疾弦ナル症ニ宜シ又寒壞疽ヲ治ス

○第百五十七方 孤刺律私^リ里布私^ス氏龍腦醋密^キ幾斯去爾^ス

龍腦^六 亞刺毘亞^六護^一 常水 蒸餾水^{各三} 砂

糖舍利^{別半}

右調和作乳劑每一時服一食匙

主治鈍性神經熱發斑症上方主治ノ諸証ヲ具フル者之ニ宜シ

○第百五十八方

龍腦^六 麝香^{十二} 白糖^{錢一}

右調和為散等分六服每一時一服

主治鈍性神經熱皮膚粘賦シ痙攣証ヲ見ハシ生力大ニ虚脱スル者ニ宜シ

○第百五十九方 犀^見

葛兒儒別^越幾斯^六 加薄荷水四^弓溶解加後藥

民埜列里精^二

右調和每一時服一食匙強

主治鈍性神經熱快復ノ期ニ方リテ強壯ノ効ヲ奏シ且皮膚ノ機能ヲ助クルニ宜シ

○第百六十方曾別倫回母

菖蒲根錢 以熱湯適宜煮將熟加菖蒲根黃橙皮各一

錢濾取六勺冷定更加後藥

復方幾那丁錢 甘硝石精半 橙皮舍利別勺一

右調和每一時服一食匙臨服宜振蕩

主治粘液熱神經熱ノ重症及ヒ他ノ虛衰病後之ノ用フ

ルニ宜シ○然レ氏先麻爾羅歇及ヒ睡萊越幾斯等ノ如

キ衝動セザル者七十五方。七十六方。九十九方。ヲ與ヘ後漸ク香竈

苦味ニシテ更ニ衝動スル劑ヲ與フルヲ最佳ナリトス

○第百六十一方

赭色幾那粗末四錢 至六錢 注熱湯適宜蓋閉安暖所浸漬八

分時濾過取六勺加後件

桂舍利別勺半

右調和每一時服一食匙

○第百六十二方

赭色幾那粗末 勺半 常水適宜煮八分時濾過取四勺加後

藥

忽弗滿液半 桂舍利別勺半

右調和每一時半服一食匙

主治右二方百六十一方。百六十二方。 純性神經熱快復ノ期ニ方リ

遠西方彙 卷二 純性神經熱 三 一廣附

テ生カ虚衰スルヲ治ス○但煎劑ハ服シ難キガ故ニ浸劑ヲ優レリトス

○第百六十三方過傑乘屈的爾

硝砂揮發華水 芫菁丁幾各半

捲垣兒精三

右調和塗擦脊椎及兩股

主治神經熱鈍性衰弱ニ傾ク者之ヲ用ヒテ效アリ

○第百六十四方爾噤刷屈斯

硝砂加石灰精一弓至一弓半

阿芙蓉丁幾一錢至一錢半

燒酒四

右調和洗顏面及顛顛

主治惡性神經熱及ヒ腐敗熱輓近ノ傳染神經熱惡性猩

紅疹其他皮膚ヲ衝動ノ其運機ヲ挑起スベキ症ニ宜シ

○刷屈斯氏ハ其宜ニ應ノ燒酒ニ代フルニ白芷精ヲ以

テシ尚且此ニ忽弗滿拔爾撒謨非答ヲ加フ

○第百六十五方福倭篤

複方白芷精四 酒製硝砂精一弓附

右調和洗前額及兩掌

主治鈍性神經熱及ヒ虚性神經症ニ宜シ

○第百六十六方春姪隣

龍腦一 加後藥溶化

再餾燒酒二 醋八

右調和溫洗兩掌胸部肚腹等日一次

主治鈍性神經熱皮膚機能ヲ失ヒ且弛緩セル症ニ宜シ

○第百六十七方過勞栗屈的兒

龍腦錢半 精製阿魏錢一 加雞子黃適宜捏和更加黃幾

那煎四弓 以錢那半

右調和微溫灌腸

主治神經熱ニ宜シ

○第百六十八方福倔篤

上好麝香十 纈草細剉半弓 漿粉錢半

右調和為芳香劑入硝子壘貯每二時乃至三時取三分一

以熱湯浸出灌腸

主治神經熱痙攣ヲ帶ビ嚔下困難ナル者之ニ宜シ

乙 鈍性神經熱係肺症チロソ、ロソ、ゲルモナリス

鈍性神經熱流行スル時多血頭腦ニ畜積スル症多ク之ア

ルガ如ク血液肺ニ逼迫シテ焮衝ヲ起シ所謂鈍性神經熱

兼肺焮衝症ヲ發スル者亦之アリ按スルニ此症ハ即求弗

健蒲律篤名ノ 所謂過兒扁私扶骨病ト 同症タリ此症ヲ療

スルニ放血セザル者罕ナリト雖之ヲ施スハ概子 謹慎ヲ

加フヘシ蟻鍼ノ如キハ諸症通用シテ可ナリ之ヲ行フテ

後大量ノ甘汞百九 稱用シ又小量甘汞ニ阿芙蓉ヲ伍用

スルヲ佳トス百三 涅優滿氏百五十六方ハ此方及ヒ龍腦百五十八方ヲ稱用スルノ他阿魏九方ノ偉効ヲ賞ス聖拍吐私 僣地ノ醫室兒滿名ハ垂兒尼加花浸ニ吐酒石ヲ加ヘ用ヒ百七 肺臟已ニ肝積ニ變セル者ハ垂兒尼加花浸ニ安息香十方花ヲ加フルヲ好トス祛痰ヲ促スハ金硫黃百七十方 遠志七百方十二等ヲ用フヘシ衝動強壯ノ療法ハ不可ナリ

又喉頭及ヒ食道頭ニ係ル症間之アリ純性神經熱係喉頭及食道頭症 圍ニ蟻鍼ヲ施シ甘汞ヲ與ヘ緩和蒸劑含漱劑等ヲ用フベシ然レ氏此療法通例効ヲ収ムルナシ頭圍ニ疾患見ルルノ后十二時或ハ二十四時ニシテ死ニ歸スルヲ常トス

理篤卓氏ハ此症ノ初起頭圍ニ猛烈ノ光膏硬膏ヲ貼シ大量甘汞ヲ服セシムルヲ稱賛ス此法モ亦必然ノ効ヲ期スベカラズト雖理篤卓氏嘗テ純性神經熱係喉頭症ノ初起之ニ由テ患者ヲ救フヲ得タリト云フ

○第百六十九方

阿魏半錢至一錢 垂刺毘垂 護漿半 加水四寸 丁寧研

和加白糖半寸

右調和為乳劑每一時服一食匙

主治 涅優滿氏阿魏ヲ以テ純性神經熱係肺症ノ良藥トシ十二時間ニ阿魏四刃至ヲ與ヘ且皮膚ヲ摩擦シテ誘

導ノ効ヲ奏セシム

○第七十方 對兒滿

亞兒尼加花 二錢至三錢

熱湯適宜浸瀘取六勺溶化吐酒

石六勺後加後藥

桂水 二錢

右調和每一時服一食匙

主治鈍性神經熱ニ屢合併スル所ノ真肺焮衝ヲ治ス○

窒兒滿氏吐酒石ニ堪ヘザル者ハ亞兒尼加單味ヲ用ヒ

或ハ礪砂加過泥子精ヲ伍用セリ

○第七十一方

金硫黃 四勺至八勺

菲阿斯越幾斯 三勺至六勺

白糖 四勺

右為散等分八包每一時半乃至二時服一包

主治鈍性神經熱係肺症及ヒ他ノ胸病ニ於テ祛痰ヲ促

スニ宜シ

○第七十二方 曾別倫歌

遠志 三錢 以水八勺煮瀘過取六勺放冷後加後藥

龍腦 細末一勺 亞刺昆亞蘆謨末 二錢

右作乳劑更加鹿琥精二錢雜腹蘭舍利別一勺調和每一

時服一食匙臨服宜振盪

主治鈍性神經熱虛性ノ胸患ヲ兼ヌル者ニ宜シ

丙 鈍性神經熱係腹内症チビス、アブドミナルチリス、癩

方今此症最多シ或ハ專此症流行スル地アリ往昔此症ニ
醫療ヲ專要トセシ時ハ衆醫ノ說病初衝動劑ヲ以テ之ニ
處スルヲ佳トセリ○然レ其効驗ナキヲ確定セシヨリ
漸他ノ諸般ノ療法ニ轉移ス其中良効ヲ得ル者間之アリ
ト雖又竟ニ之ヲ自然ノ良能ニ委スルヲ本法トシ其功用
ヲ確徵スルニ至レリ甚シキニ至テハ鈍性神經熱係腹症
ヲ療スルノ最勝法ハ一事モ施為セザルニ在リト公然夸
言スル者亦之アリ吾輩モ亦多般ノ伎倆ニ勞センヨリハ
寧一事モ為ス一ナカラシ假令之ヲ為スモ獨衝動セザル

ノ法方其害少シト謂フベシ又按ズルニ其兩間ニ於テ中
庸ヲ取ル者鈍性神經熱係腹内症ヲ療スルニ於テ最良エ
タルベシ漢都氏小冊子ヲ著ハシ此症ヲ治スルノ簡易法
ヲ載セリ○理篤阜氏ノ療法モ亦簡易適度ニメ賞スベシ
其法初起病勢甚興奮ノ稽留熱ノ証狀ヲ見ハス片ハ小心
ニ刺絡ヲ行フテ放血シ頭痛劇シキ者ハ兩耳後ニ放蟻三
頭ヨリ四頭至譚語甚シキ症ハ頭上ニ寒罨法ヲ施スナリ
○咳嗽甚シキ者ハ胸上ニ蟻鍼ヲ施シ心窩ニ莞菁膏ヲ貼
シ乳劑ニ硝石ヲ伍シテ方十一飲服セシムベシ○腸ニ著大
ノ關係アル者ハ甘汞一ハ至一時乃至一時半毎ニ之ヲ與

へ肚腹ノ痛所ニ芫菁膏ヲ貼シ或ハ吐酒石膏ヲ塗擦シテ
 發疹スルニ至ルベシ爾後舌苔厚キ症ハ格魯林水ニ亞刺
 毘亞護漿ヲ和スル者百八十方精製食鹽百七方或ハ粘滑
 ノ煎汁ニ鹽酸ヲ加フル者百八十方ヲ用フベシ劇シキ下利
 ラ止ムルニハ漿粉ノ灌腸百九十方ヲ行フベシ但阿芙蓉ヲ
 加フルコト勿レ皮膚燥熱灼クカ如キ症ハ灌水ヲ施シテ速
 ニ之ヲ拭ヒ弗刺涅爾毛布ヲ以テ身體ヲ纏ヒ病床ニ就カ
 レムルニ宜シ然レ患患者惡寒ヲ訴ル者或ハ皮表潤ヘル
 症ハ灌水スルコト勿レ五時乃至六時ヲ過テ后再灌水セシ
 ムベキ症モ間亦之アリ若故アリテ灌水ヲ忌ムルハ冷水

ニ醋ヲ加フル者格魯林水海塩精葡萄酒燒酒等ノ清冷洗
 滌法ヲ行ヒ粘汗出ル者ハ微温洗法ヲ施スベシ病毒分利
 ノ期ニ方リテハ微温ノ灌法或ハ洗法ヲ施シ民埜列里精
五方。三十方。卅一方。及ヒ龍腦百八十方ヲ服セシムベシ但龍
四十方。四十一方。腦ハ持ニ覺機甚沈衰セル症ニ與フベシ病本復ノ期ニハ
 嚴ニ食餐ヲ節シ衰弱甚シキ者ハ幾那百六十一方。ヲ用フ
 ベシ○或毎服時刻ヲ遠隔シテ大量甘汞百九十方ヲ施スヲ稱
 譽ス甘汞ハ大ニ肝ノ運營ヲ振起セシムルガ故ニ膽液ヲ
 合併セル症ニ殊ニ簡要トス或ハ小量ノ甘汞八分。一分。四分。
一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。ヨリ一時毎ニ與ヘテ効ヲ得ル者アリ○暴鯨爾田氏

ハ硫酸規尼捏百九十方ヲ稱用シ其他ノ醫ハ硝酸銀百九十方
 鉛糖百九十方明礬百九十方外鉄鹽百九十方及ヒ青酸鉄百九十方
 ヲ賞賛セリ殊ニ腸瘍ヲ治シ下利ヲ制スルニ之ヲ用之然
 レ此ノ如キ人體ヲ害スルノ藥劑ハ吾輩ノ容易ニ處セ
 サル所ナリ且鈍性神經熱ノ下利ヲ停ムル功用亦甚微ナ
 リトス○別徠爾氏及ヒ歌倚涅氏ハ植物炭百九十方ノ効ア
 リ症ヲ經驗セリ○高名ノ醫病初ニ吐劑ヲ稱用スル者
 アリト雖却テ害ヲ為シ易シ○婪忽兒突氏ハ肌熱熾盛腸
 胃ニ汚物鬱滯ノ候確然タル症ニ孕鹼酒石ノ偉効ヲ自驗
 シ一弓迄水ニ溶化シ水六甘汞ヲ用フルノ后少頃アリテ

頻々食匙ヲ以テ之ヲ服用セシム又婪忽兒突氏醋酸加里。
 醋酸曹達ヲ用フ此劑ハ下利ノ効甚微ナリト雖大ニ蒸發
 氣ヲ催進ス而シテ身温中度ニシテ假令之ヲ衝動セザルモ
 動輒衰弱ニ陥ラントフル者之ヲ用フレハ其効力他藥ニ
 超絶ス病虛性ニ遷ルルハ婪忽兒突氏醋酸加里ニ代ヘテ
 民埜列里精ヲ用ヒ或ハ其症ニ隨ヒ纈草亞的兒劑葡萄酒
 其他強壯ノ諸藥ヲ並用シ胸内ニ較著ノ關係アルルハ民
 埜列里精ト共ニ碯砂遠志安息香等ヲ用フ按スルニ婪忽兒突氏下利ス
 ル症ヲ療スルルハ恐ラク○梟軌爾氏ノ說ニ據レハ敵度
 ハ中和塩ヲ除クナルビシク○梟軌爾氏ノ說ニ據レハ敵度
 利阿達私剝篤亞斯ハ鈍性神經熱ノ奇藥ト云フト雖此劑

下利及ニ衰弱ヲ來スガ故ニ害アリトス○未_マ鯊_サ埜_ノ氏_ノ祿_ノ温_ノ顯_ノ爾_ノ毒_ノ土_ノ氏_ノハ水銀膏一錢乃至二錢ヲ以テ一時毎ニ之ヲ塗擦シ急ニ流涎ヲ起サシメ專之ヲ施シテ其効ヲ竝ツト雖然モ此療法ハ決メ歴驗ニ出ルニアラス寧口軟膏ニ外汞ヲ和シ_九百_九十_九方_九塗擦スルヲ優レリトセ_レ羌_ノ菁_ノ膏_ノ芥_ノ子_ノ泥_ノ吐酒石膏等ヲ以テ盲腸ノ部ニ擦スルモ亦同効アルベシ

○第一百七十三方_{漢都} 過爾托_{一錢} 常水適宜煮將熟加吐根六分飽熟四分

時瀘過取_{六分}加後藥 蘆根流動越幾斯_{三錢} 醋

蒲公英流動越幾斯_{半錢} 附_半 蘆根流動越幾斯_{三錢} 附_半 醋

酸加里液_{六錢} 過爾托舍利別_半

右調和每一時服一食匙

主治 鈍性神經熱係腹内症ニ聖京_ノ屈_ノ及_ニ腸胃汚物ヲ合

併セル症初起之ニ宜シ

○第一百七十四方_{同上} 菲阿斯越幾斯_二 安質沒尼酒_一 苦扁桃水_{半錢} 至

過兒托舍利別 菩提樹花水_{各半}

右調和每半時乃至四分時之三服一茶匙

主治 鈍性神經熱聖京_ノ屈_ノヲ帶_ノブル症呼吸器ノ刺衝連綿

トメ止マザル片之ヲ鎮靜スルニ宜シ

○第一百七十五方同上

實^キ芟^タ荅^リ利^ス葉^ハ 四ハ至

熱湯適宜浸瀝取六弓加後藥

刺^ト寫^ア垂^ス斯^ニ與^ニ新^ニ製^ス枸^キ櫟^ノ汁^ヲ飽^ト和^ス者^ヲ 半弓至

苦扁桃水 二

至四 過^ル兒^ト抱^シ舍^リ利^ト別^ト 一

右調和每一時服一食匙

主治鈍性神經熱帶聖^キ京^キ僵^グ症^ヲ及^ヒ係^レ腹^ノ內^ノ症^ヲ呼^シ吸^ス器^ニ血

液^ヲ畜^シ積^スル^一頑^ト固^{ナル}者^ニ宜^シ

○第一百七十六方同上

新^ニ絞^リ枸^キ櫟^ノ汁^ヲ與^ニ刺^ト寫^ア垂^ス斯^ニ飽^ト和^ス者^ヲ 一 蒸^シ餹^ス水^ヲ 四 苦^ク扁^{ヘン}

桃^ト水^ヲ 四 過^ル兒^ト抱^シ舍^リ利^ト別^ト 一

右調和每一時服一食匙

主治鈍性神經熱帶聖^キ京^キ僵^グ症^ヲ胸^ノ膜^ノ肺^ノ臟^ノ肺^ノ管^或ハ氣^ノ管^ニ

輕^ク易^クノ^ノ焮^シ衝^シ性^ノ關^係アル^者之^ニ宜^シ其^ノ症^ニ隨^テ局^ノ處^或

ハ全^ク身^ノノ^ノ放^ス血^ヲ亦^チ施^スベ^シ

○第一百七十七方同上

沙^リ列^レ布^ヲ末^ト 半 常^ニ水^ヲ適^宜煮^キ將^テ熟^ク加^シ吐^根六^ハ加^シ密^列一

錢^半飽^ト熟^ク四^分時^瀝取^六弓^更加^後藥

蒲^公英^流動^越幾^斯 半錢 蘆^根流^動越^幾斯 醋酸加

里^液 各一錢半

右調和每一時服一食匙

主治 聖京^ニ 鈍性^ノ 帶日^{タル} 鈍性^ノ 神經熱^ノ 初起^ノ 腸胃汚物^ヲ
徴アリテ兼テ下利ニ傾キ且肚腹ニ惡ムベキ關係ヲ
覺ユル者之ニ宜シ症ニ應シテ醋酸加里液ヲ去ルベシ

○第七十八方 同上甲

甘扁桃^{去皮}

白嬰粟子^{錢三}

石臼搗爛加蒸餾水六勺

作乳劑加後件

菲阿斯越幾斯^ニ

白糖^{錢三}

右調和每一時服一食匙

主治 鈍性^ノ 神經熱^ノ 係腹內^ノ 症發生^ノ 期ニ用ヒテ之ヲ防止
スルニ宜シ且左法ニ後ヒ小量ノ吐根ヲ兼用スベシ

○第七十八方 同上乙

吐根末

^{一匁至一匁半}

白糖^{錢一}

右調和為散等分六包每服一包日三次乃至四次

備考之ヲ用ヒテ其証仍頑滯セル片ハ上ノ乳劑ヲ連服
セシメ兼テ此散各包中龍腦四分匁ノ一乃至半匁ヲ加
用シテ効ヲ得ル一問之アリ

○第七十九方 同上

精製阿芙蓉

吐根末

^{各六分至一分四}

白糖^半

右調和為散分六包每服一包日二次乃至三次

主治 鈍性^ノ 神經熱^ノ 係腹內^ノ 症下利太過ノ者ニ宜シ但此方

ヲ用フルト下利適宜ニ減スルヲ度トス全ク之ヲ過ス
 ルニ至ルヲ勿レ○發熱ヨリ第五日至ニ下利ヲ發シ之
 ヲ診スルニ腸ノ粘液膜未死壞ノ証ヲ見ハサズ且溶渙
 ノ性ヲ帶ヒス腹痛劇甚ナル者ハ始此散各包中ニ甘汞
 六分ハ一乃至四分ハ一ヲ加フルヲ佳トス

○第百八十方 同上

甘汞 六分ハ一。四分ハ一。半分ハ一。 白糖 一

右調和為散分六包每服一包日一二次乃至三次
 備考鈍性神經熱ニ甘汞ヲ用ヒテ或ハ大便ヲ促シ或ハ
 胸腹諸器ニ燄衝ノ候アル者ヲ主治ス蓋大便ヲ促スキ

ハ小量ニ與ヘ灌腸法ヲ兼用シテ之ヲ扶ケ燄衝性疾患
 ニ用フルキハ稍其服量ヲ加増スベシ

○第百八十一方 同上

甘扁桃 去皮 白罌粟子 錢三 蒸餾水 六 作乳劑加後

龍腦 一分半加亞刺昆亞 苦扁桃水 二乃至四 過兒抱

舍利別

右調和每半時乃至一時服一食匙

主治鈍性神經熱係腹内症生カ脱衰甚シキ者或ハ將ニ
 脱衰セントスル者ニ宜シ之ニ兼テ芥子泥ヲ貼スベシ

○第百八十二方

龍腦六分。一分。四分。一分。至半。一分。 麝香四分。一分。一分。一分。至一分。 白糖半

右調和為散分六包每服一包日二次乃至三次

主治鈍性神經熱係腹內症生力沈衰シ且昏睡状ヲ見ハス者ニ宜シ

○第百八十三方漢都

格魯林水半。至。六錢。 蒸餾水六 過兒托舍利別一

右調和每半時若四分時之三服一食匙

主治鈍性神經熱係腹內症抗抵力沈衰シ溶渙失血ヲ發シ或ハ凡テ血液溶崩ノ候確著ナル者ヲ治ス

○第百八十四方同上

沙列布末半 水適宜者將熟投纈草二錢黃幾那半三

乃至六錢瀝過取六寸冷定加後藥

忽弗滿液半錢至錢半 過兒托舍利別一

右調和每一時半服一食匙

主治鈍性神經熱係肺或腹內症生力全ク虚脱シ咽喉及ヒ口中鵝口瘡ヲ生スル者ニ宜シ之ト共ニ龍腦半一分

乃至一分半ヲ與フル一日ニ數次

○第百八十五方同上

硼砂二錢 撒爾非亞水二 溶解加後藥

沒藥丁幾錢二 玫瑰蜜一

右調和為塗液

主治鈍性神經熱ニ併發セル驚口瘡ニ宜シ

○第百八十六方

格魯林水一 亞刺毘亞護謨漿 過兒托舍利別

各一 蒸餾水三

右調和每一時服一食匙

主治鈍性神經熱係腹内症ニ宜シ十二時間ニ一弓乃至

一弓半ヲ服盡スベシ之ニ兼テ格魯林ヲ洗法トシ用フ

ヘシ○第百十方モ亦用ヒテ可ナリ

○第百八十七方

未爾脣突兒名地的兒梗優

精製食鹽錢一

蒸餾水五弓溶化加後藥

過兒托舍利別一

右調和每一時服一食匙

主治鈍性神經熱ノ第二期ニ方テ此方奇効アリ但之ヲ

用フル一ニ日ニ過グベカラズリトサウ理篤阜氏モ亦之ヲ稱

用セリ

○第百八十八方

稀鹽酸錢一

過兒托煎六

覆盆子舍利別一

右調和每一時服一食匙

主治 純性神經熱係腹裏症ニ宜シ○第九十七方若ハ第百十一方モ亦用ヒテ可ナリ

○第百八十九方

龍腦四八至 白糖四

右調和為散等分八包每一時乃至一時半服一包

主治 純性神經熱係腹内症今利ノ期ニ方リテ覺機甚沈衰セル者ニ宜シ

○第百九十方列設爾

甘汞一 白糖半

右調和為散分四包早且服一包隨其症晡時又與一包

主治 純性神經熱係腹内症ニ宜シ○先刺絡シテ后再施

ト亦可 甘汞一刃ヲ取り早旦ニ與フベシ更ニ劇甚ノ症

ニ至テハ半錢ヲ與フルモ亦可ナリ其症ニ隨ヒ晡時又

一刃ヲ與ヘ下利スル者ハ阿芙蓉一ハ乃至二ハヲ配伍

スヘシ大便增多セザルハ三時乃至四時ヲ經テ后扁

桃油密幾私去爾 附若ハ複方梅那浸ヲ與フベシ○列設

爾氏上法ノ如ク之ヲ施シテ劇熱鎮降スルニ至ルニ日

乃至三日之ヲ持重スル症アリ又更ニ久ク連用スル症

アリ但流涎ヲ發スレバ後服ヲ停止列設爾氏此療法ヲ

用ヒテ四十九人ヲ治セリト云フ○屋兒弗氏ハ此法ヲ

改革シテ朝五半時ヨリ四半時至四分時間ニ甘汞半刃
ヲ與フルト二次重症ニ至テハ又晩ニ及ンテ再服セシ
凶生カ沈衰スル片ハ毎服龍腦一瓜乃至三瓜ヲ伍シ或
ハ龍腦乳ヲ兼服セシ凶甘汞ヲ用ヒテ吐逆スル者ハ之
ニ薄荷油糖ヲ配伍凶蓋此時ニ當テ通常水銀劑ヲ用フ
ルト一般攝生調護ヲ善クセシム即暖室ニ居リ。飲液ヲ
温服セシメ。温浴法ヲ施シ。口内ヲ洗淨スル等はナリ上
法ノ如クニシテ汞劑ヲ連用スルト五日ヨリ七日ニ至
ル若生カ沈衰スル者ハ更ニ時刻ヲ遠隔シテ日ニ一次
或ハ二次
之ヲ與フ或ハ甘汞ヲ屏ケテ用ヒサルトモ亦之アリ病

者本復之期大率此症本復スル日容易ナラズニ方リテ
假令復スルモ多日ヲ延クベシニ方リテ
ハ龍腦攝爾扁太里亞ヲ用ヒ次テ強壯藥ヲ施シ謹テ攝
生ヲ善クセシム○好弗人名呂私同失設列爾同私葛爾老
同等モ亦大量ノ甘汞ヲ稱用凶苦列人名婪忽兒突同等
ハ甘汞ノ効ヲ見ズ護魯思婪倚名謨名噎別爾萊倚爾同ハ
却テ其害アルトヲ試驗マト云フ

○第一百九十一方 暴驚爾田

硫酸規尼捏ハハ至 扁桃油密幾私去爾附ハ

右調和每一時服一食匙

主治 神經熱係腹内症ニ甚之ヲ稱用セリ○病ノ極期ニ

至テ或ハ硫酸規尼捏必要ノ症アリ或ハ然ラザル者ア
大率硫酸規尼捏ヲ用フル適當ノ證候今世未一定セ
サルナリ

○第百九十二方

結晶消酸銀ニハ 沙列布煎六弓溶化

右調和每一時服一食匙

主治葛兒篤氏神經熱係腹内症ニ之ヲ用ヒテ佳効ヲ得
シ者二十人ニ過タリト云フ或ハ間硝酸銀ノ量四ハヨ
リ六ハ至ヲ施用セリ○上法ニ兼テ硝酸銀ヲ灌腸トナ
シ之ヲ五ハ至沙列布煎六弓ニ和シ用フ蓋之ヲ施ス片

ハ長管ノ水銃ヲ用ヒ極メテ深ク腸中ニ送ルベシ○噎
別爾私名謁爾私訶兒斯同昏撫謨同モ俱ニ之ヲ賞譽セ
上腸ノ知覺過敏ノ者ハ最初ノ灌腸液ニ阿芙蓉少許ヲ
加フベシ

○第百九十三方帶那私設私那私設

精製鉛糖四分ハ一 上好吐根末九

右調和為散分八包每服一包日三次乃至六次

主治鈍性神經熱係腹内症第二期ニ至リ下利スル者ニ
宜シ下利ヲ治スルハ通例服量ニハニシテ足レリ○呵
兒設爾名ハ鉛糖一ハ日ニ三服スルヲ常法トセリ而シ

急卒ニ下利ヲ遏止セザルガ為ニ更ニ蓖麻油ヲ兼用セ
リ

○第百九十四方獨浦列爾〔思歌達〕

明礬五 乳糖半

右調和為散分十二包乃至十四包每半時服一包

主治鈍性神經熱係腹内症ノ初期殊ニ之ヲ用テ極メテ

危険ノ症ニ至テハ明礬一錢水一匕ニ溶化シ每一時灌

腸シテ五回ニ及ブベシ醇礬爾名ハ別ニ預療法ヲ行フ

トナク鈍性神經熱ノ患者ニ概シテ明礬ヲ與ヘ特之ニ

由テ數人ヲ治セリ其効驚クベシト云フ

○第百九十五方列設爾

升鍍鹽二 蒸餾水三勺溶解

右調和每服半食匙或一食匙日三次乃至四次臨服宜振

蕩

主治鈍性神經熱係腹内症ノ下利及ヒ腸瘍ヲ治ス○知

覺過敏虚弱ノ人及ヒ小兒モ亦能ク此方ヲ服スルニ堪

フ

○第百九十六方同上

青酸鍍五 白糖半

右調和為散分八包每服一包日三次乃至四次

主治 鈍性神經熱係腹内症腸瘍ヲ發シ下利ナル者之ニ
宜シ

○第百九十七方 別撰爾 西母

精製木炭 二錢至五錢 甘草 半

右調和為散分十二服蠟紙包裹每一時一服

主治 鈍性神經熱係腹内症ノ第二期生カ著シク脱耗シ
舌上乾燥下利惡臭アリ之ニ兼テ肚腹腐敗様ニ膨脹シ
下腹ノ感覺過敏ナル者之ニ宜シ

○第百九十八方

漿粉 一錢至二錢 水 三勺至四勺

右上火溶化分為二劑供灌腸

主治 鈍性神經熱係腹内症下利太過ノ者ニ用フ○此灌
腸劑藥局ニ於テ製スルナク病家ニ之ヲ作ルヲ佳ト
ス何トナレハ長路咎ヲ移セバ變メ糊トナレハナリ漿
粉ヲ熱湯ニ溶シ微温ニ至ルヲ俟テ直ニ注射スルヲ更
ニ妙トス

○第百九十九方 別撰爾

升汞 錢半 家猪脂 半

右調勻每一時取少許塗擦肚腹

主治 鈍性神經熱係腹内症ニ反對刺戟法トナシ用フ塗

遠方彙卷之二

擦スル部焮熱赤色ヲ見ハス六時ヲ過グレハ即チ疹ヲ
發シ水搽液之ニ充ツ

○第二百方別路突篤

龍腦錢半 的列並油 硃砂加石灰精各半

右調和作軟膏塗擦肚腹

主治誓留神經熱係腹内症第二期ニシテ發スル所ノ腸
瘍ヲ治ス

遠方彙卷之二

