

遠西方彙

又

○卷之五

腦焮衝

○酒狂

○急性腦水腫

脊髓焮衝

胃焮衝

腸焮衝

○痢

十五九

237

分

門 城
號 237
卷 5



遠西方彙卷之五

獨乙 加幾安頓 著

和蘭 傑婆婆都 譯

侍醫法眼貫齋伊東貞文仲 重譯

南洋伊東專健夫 參校

腦焮衝 エンセハリチス
オンセントステキ
ングヘルセ

刺絡及ヒ顛顛耳後或ハ項窩蟻鍼頭上寒卷四百六灌水及

ヒ瀉水浴蓋瀉水浴ハ衝動シ易キカ故ニ之ヲ施スハ最小

心ヲ要スベシ其水高キヨリ瀉スル片ハ殊ニ然リヲ行ヒ



或ハ之ニ兼テ脚湯ヲ施ス等皆腦燄衝第一等療法トス然
レ凡消石硝砂芒硝瀉利鹽及ヒ其他ノ瀉下鹽類四百六十
九方四百
一十方大量ニ與ヘテ毎日大便二三行ヲ得ン_一亦怠ルベ
カラス而後甘永四百七
十二方一二匁ヨリ三匁至一時毎ニ服セ
シムベシ甘永ハ飲クヘカラザル症多シ兼テ又両足ニ温
煖毳布ヲ貼スベシ安度刺兒氏ノ説ニ據レハ腦燄衝生カ
亢進セル症ニ皮膚刺戟法ヲ以テ誘導ノ効ヲ要スト云フ
其説甚信シ難シ何トナレバ皮膚ニ彌蔓セル神經末端ヲ
刺戟スレハ腦モ亦同ク之ヲ感受スルニ由テナリ○生カ
沈伏セル者ハ全ク上法ト異ニシテ瀉水浴ヲ行ヒ頭髮ヲ



剃リテ大發疱膏ヲ貼シ或ハ之ヲ項窩若クハ肩胛間ニ貼
シ又腓腸ニ蒸餅母ヲ貼スル等皆相當ノ治法トス此ノ如
キ症ニ於テハ亜兒尼四百七
十七方加花四百七
十七方ヲ内服セシムル者屢之
アリ

○第四百六十八方 宿繆結爾名寒卷法

粗製消石三 硝砂半 冷水四北溶化加醋一北

右調和四折若六折麻布醮為頭上寒卷法每五密扭篤乃
至十密扭篤換之

主治腦燄衝頭腦激動頭創等ニ宜シ

○第四百六十九方

瀉利鹽一

右過爾拖根煎入多溶化每半時服一食匙乃至二食匙以至得下

主治腦燉衝刺絡后之ヲ用フルニ宜シ○腦燉衝ハ頭上ニ蟻鍼及ヒ寒罨法ヲ施シテ後腸ニ誘導スルヲ最簡要ナルガ故ニ鹽性瀉藥ヲ用フルヲ妙トス其効實ニ精製消石精製礞砂等ニ優レリ

第四百七十方附兒

瀉利鹽一

麥芽飲附三北以麥芽二ヲ製者

吐酒石三

阿芙蓉

丁幾三滴

右溶和每一時服一小盞以至得下
主治腦或ハ眼ノ燉衝ヲ治シ又腹内ノ痙攣性閉塞症ニ宜シ

第四百七十一方

精製消石二錢

芒硝半

井水六ヲ溶化加覆盆子舍利

別六錢

右和勻每半時服一食匙

主治腦燉衝及ヒ其他燉衝諸病ニ宜シ

第四百七十二方

甘永一八至

白糖半

右調和為散等分六裏每一時服一裏

主治之ヲ與ヘテ多量ノ大便數行ヲ得ルニ至ルベシ或ハ瀉下ノ効ヲ扶ケンカ為ニ各裏ニ葯刺巴根二瓜ヲ加ヘ若クハ旃那葉ヲ兼服センムヘシ

○第四百七十三方〔依魯毘私醫弗〕

蘆根 答麻林度各一 井水適宜煮濾過取八勺和芒硝二錢再加後藥

覆盆子舍利別半

右合勻每半時服二食匙

主治腦脈衝ノ下利止ム丁早キニ過グル者之ニ宜シ

○第四百七十四方〔同上〕

亞兒尼加根三錢 纈草根二錢 熱湯適宜浸漬濾取八勺

加後藥

亞刺毘亞護漿 地亞格實温各半

右調和每一時服二食匙強

主治腦脈衝下利ヲ兼併セル者及ヒ將ニ神經症ニ移ラントスル者之ニ宜シ

○第四百七十五方〔同上〕

格綸僕根三錢 井水適宜煮投纈艸根三錢濾取八勺再

加後件

本草綱目 卷五 腦脈衝 三 廣勝堂

單方桂水

亞刺昆亞蘆護漿各

右和勻每半時服二食匙強

主治同上

○第四百七十六方同上

亞兒尼加根錢三

熱湯宜適

浸漬漚過取八勺加後味溶

化

精製礪砂一

白糖錢二

右調勻每半時服一食匙

主治腦脈衝神經性ヲ兼子且下利シ生カ將ニ脫衰セン

トスル者之ニ宜シ

○第四百七十七方同上

亞兒尼加花錢二

熱湯適宜浸漬漚過取六勺加後味

吐酒石一

孕礬酒石錢三

右調勻每二時服一食匙

主治腦脈衝生カ抑壓セル者之ニ宜シ

甲酒狂

エンセネソリチス。パタトリム。ステリウム。テレグメ
シス。ソイブルス。ウァリンシム。マト。ベリヒンク。蘭

此症固ヨリ真腦脈衝ト看做スベカラスト雖蓋腦脈衝ノ

一種變化セル者ナリ故ニ大率腦脈衝ノ治ニ準ノ療スベ

シ但刺絡ヲ要スル者ハ鮮シトス顛顛若クハ耳後蟻鉞頭

上寒暑法等切須ノ症多シ腸胃汚物ヲ兼併セル者ハ孕礬

酒石醋酸加里等ノ如キ解釋劑ヲ用フベシ但老利兒水ト配伍スル者最適當トス吐藥四百八方ヲ與フル醫アリト雖然モ些ノ吐酒石四百八方ヲ用ヒテ微々嘔氣ヲ促スヲ更ニ好トス衰弱甚シキ者ハ纈艸浸ニ鹿琥精ヲ和スル者更ニ尼加花浸四百七十七方等ノ如キ衝動劑ヲ用ヒ加之慎テ時々些ノ燒酒ヲ飲ムヲ許スベシ又鑛酸類四百八方ハ確實ノ益アリ輓近實荳答利斯四百八方及ヒ羌活四百八方ヲ稱譽スル者屢之アリ私倒偃頓名忽布丁幾ヲ賞用シ拂來法乙爾及ヒ佛祿繆兒列爾並ニ名ハ非阿斯越幾斯弗血兒仙ハ碓砂華遠突土名ハ阿魏ヲ賞贊セリ此他不眠ヲ治スルヲ

專ニ不ヘシ但先清涼劑下劑等ヲ用ヒテ後阿芙蓉四百八方至四百八方九方ヲ與ヘテ尤佳オ○私珍鎮偃氏一種ノ療法ヲ作為セリ其法瀉下アラザル者ハ炭酸剝篤亞斯六瓜乃至七瓜ヲ取リ煨製麻偃涅失亞十瓜ト配合シ一時毎ニ粘滑飲液ヲ以テ送下セシメ毎服後冷水ヲ飲マシム六時乃至十二時ヲ經テ后水瀉スレレ患者意識本復セズ或ハ戰慄休マザル片ハ復前ノ方法ヲ施シ項窩ニ羌菁膏ヲ貼ス諸証緩解スル片ハ前方ヲ與フル一一時半毎ニシテ而モ羌菁膏ヲ去ラシム但尚瀉セザル片ハ四分三時毎ニ又前方ヲ與フ固ヨリ瀉スルノ症ハ煨製麻偃涅失亞二代ヘテ牡

廣脾堂

蠣末十匁ヲ以テ炭酸剝篤亞斯ニ和用ス之ヲ施シテ大抵
 第二日第三日ニ至リ食欲ヲ生ス此時ニ至リ蒸餅菜蔬肉
 類ノ如キ食餌ヲ喫セシムルニ宜シ亞兒篤麻名地ノ病院ニ
 於テ此法ヲ用ヒテ二十三人ヲ療ス其二十二人ハ二日乃
 至六日ニシテ治シ他ノ一人ハ六時ニシテ全愈セリ

○第四百七十八方依拂詔屈

炭酸剝篤亞斯錢半 新鮮枸橀汁適宜飽和更加後件

井水九 覆盆子舍利別一

右調勻每一時服二食匙

主治酒狂症全身熱シ頭上及ヒ肝臟ニ畜血アル者之ニ

宜シ依拂詔屈

○第四百七十九方同上

純精酒石一 消石一 朱砂二十

右調勻為散等分十二裹每一時乃至一時半服一裹

主治酒狂症ニ用ヒテ神經系ノ刺衝ヲ減殺スルニ宜シ

○刺胃私名此方ノ效驗ヲ確定セリ

○第四百八十方依魯思秘骨弗

蘆根 蒲公英根各一 水適宜煮濾過取八匁溶後藥

瀉利鹽六錢

右調和每一時服一食匙乃至二食匙

廣勝堂

〔主治〕酒狂症ノ初期便秘スル者ニ宜シ

○第四百八十一方

吐酒石六分至八分

右蒸餾水四勺溶化毎半時服一食匙

〔主治〕酒狂症之ヲ連進シテ吐ヲ得後患者安靜シ或ハ安

眠スルニ至ルベシ○過兒栗屈的兒名ハ患者ヲ温湯中

ニ坐シテ灌水セシムルヲ称用ス

○第四百八十二方〔偏刺歇松〕

吐酒石四分 阿芙蓉丁幾錢ニ 龍腦密幾私去爾三

右調勻毎一時服一食匙

〔主治〕酒狂病ニ宜シ○頭腦ニ實性ノ畜血アル者ニ用フ

ル片ハ偏刺歇松名ハ吐酒石ノ量ヲ加増シテ阿芙蓉ヲ減

殺ス之ニ反スル者ハ神經証ノ過盛セル所ヲ制ス○通

例吐酒石五分乃至六分ヲ取り水五勺乃至六勺ニ溶解

シ半時毎ニ一食匙宛與フ○求兒度別爾屈名ハ毎服吐

酒石半分ヨリ二分至半時若クハ一時毎ニ用フ拔爾屈

蒿仙名ハ更ニ吐酒石ノ量ヲ加ヘ時期ヲ遠隔シテ之ヲ

用ヒ患者ノ意識本復ノ后モ猶暫ク連服セシム○吐酒

石ニ代ヘテ皓礬ヲ賞用スル者モ亦多シ

○第四百八十三方〔依魯昆秘骨煎〕

依魯昆秘骨煎

亞兒尼加花二錢 熱湯適宜浸漬濾取八勺溶後味

瀉利鹽三錢 吐酒石一錢 蘆根流動越幾斯半勺

右調和每一時服一食匙

主治熱性酒狂病先頭上ニ蟬鍼及ヒ寒罨法ヲ施シ以テ畜血ヲ制スルノ后之ヲ與フ

○第四百八十四方

硫酸密幾私去爾一錢至一錢半附 櫻實水五 覆盆子舍利

別二

右調和每一時服一食匙

主治酒狂症頭腦ニ神經性畜血アル者之ニ宜シ

○第四百八十五方苦列私

實芟答利斯半錢至一錢 熱湯適宜浸漬濾取六勺加櫻實

舍利別一

右調和每一時服二食匙

主治熱性酒狂症ニ宜シ○之ヲ連服ノ瞑眩ノ候ヲ見ハ

スニ至ル○苦列私名此法ヲ以テ十二人ヲ治セリ噦エ亞

私名頓名栲思同祿斯同等モ亦實芟答利斯ヲ稱用セリ○

噦蒲私名的爾名實芟答利斯ヲ大量丁幾去爾ニ製スル者六十滴以テ一時半中

用二次ニ與ヘテ患者ヲ睡眠セシム吾輩此法ニ倣フニ

堪ヘズ

○第四百八十六方思西荅

羌活一弓 熱湯適宜浸漬濾過取八弓放冷加菖蒲根

丁幾一錢

右調和每一時服一食匙

主治酒狂症ニ宜シ

○第四百八十七方拔爾屈蒿仙

精製阿芙蓉半 白糖半

右調勻為散分十二裹每一時服一裹

主治酒狂症ニ宜シ○若效アラザル片ハ阿芙蓉ヲ加増

ノ每服一瓜ニ至リ危急ニ臨ム片ハ更ニ加ヘテ二瓜ニ

至ル此ノ如キ大量ノ阿芙蓉ヲ服スルヲ四次ニノ猶眠
 ヲ得ザル片ハ再減ノ一瓜若クハ半瓜トナシ之ヲ持重
 ノ分利ノ期ニ至ルベシ此療法ヲ行テ効驗アラザル片
 ハ晚ニ方テ又大量ノ阿芙蓉ヲ與ヘ功ヲ收ムルヲ間之
 アリ但晚ニ大量ヲ與レハ翌日ヨリ服量ヲ減メ大率半
 瓜ヲ與フルヲ日ニ三次ヨリ四次ニ至ル舌上厚苔ヲ帶
 ヒ其他腸胃汚物ノ候アル者ハ先吐藥ヲ與ヘ後阿芙蓉
 ヲ用フベシ○捉縵名ハ阿芙蓉丁幾ト續草加亞的兒丁
 幾附ヲ等分和シ用フ

○第四百八十八方榕幾北度蒲

精製阿芙蓉六 吐根十二 白糖一

右調勻為散等分六裹每一時服一裹

主治酒狂症先燉衝証或ハ腸胃汚物証ヲ治メ后神經系ノ興奮機ヲ鎮降スルニ宜シ此方ヲ連進メ患者熟睡ヲ得ルニ至リ或ハ病愈増進スルニ由テ阿芙蓉ヲ忌ムベキ時期ニ至ルベシ

○第四百八十九方福僂鷲

精製阿芙蓉一至六 消石六至十 白椒四 甘草半

右調和為散分十二裹每一時半取一裹稀淡哥喜和服

主治酒狂症ニ宜シ

○第四百九十方繆爾那訶

噶剌扶阿剌越幾斯三 孕鹼酒石一

右調勻為散分八裹每半時取一裹冷水溶和服

主治虛性酒狂症阿芙蓉ヲ用フベカラザル者之ニ宜シ

○第四百九十一方依拂朗屈

硫酸亞的兒 鹿角精各 薄荷水六 舍電阿芙蓉一

液一

右調和每半時服一食匙

主治酒狂症後補劑トシ用フ

乙急性腦水腫エシヤフハリチス。インフアンチユム。エキ

スシダトリアリビドラス。イントリキヨロリ

ム。セレブリ羅下テ。ヘルセ
シクアリトルシユクト蘭

腦水腫

此症主治蝟鍼一二頭ヨリ三頭至病兒ノ年齢ニ準ノ兩耳
後ニ貼シ後甘汞ヲ實芙蓉利斯四百九十三方若クハ藥
刺巴四百九十五方配用シ終ニ頭上ニ寒罨法ヲ施スヘシ但昏
睡ノ状アル者ハ一線ノ冷水ヲ差高所ヨリ注下シ小兒ノ
前頭及ヒ顱心ニ灌クベシ此法歇惰人福爾墨乙上兩大醫
試驗セシ所ニシテ他ノ衆醫モ亦之ニ倣フテ施療セシガ
故ニ余茲ニ書載セザルヲ得サルナリ然レモ余理ヲ以テ
之ヲ推スニ寒罨法及ヒ水線浴ハ其效ヲ奏スルヨリハ害
ヲ為スヲ多シ何トナレハ幼兒ハ寒冷ニ堪ヘザレバナリ

是故ニ里篤曹名ハ之ヲ戒シテ謾ニ試用セザラシム宜ナ

ル哉昏聩症ニ衝動藥殊ニ亞兒尼加花内外称用スル

者亦之アリト雖吾ハ信ゼス○弗弗陽人沃沃曹護

ト甘汞ヲ配伍シ五百其吸收機ヲ催進ス弗弗祿設爾及ヒ

他ノ衆醫ハ敝度里阿達斯五百剽篤亞斯五百方ヲ用フ僕結

爾名稱贊セシ所ノ格魯林水ハ他醫ノ試驗ニ在テモ良效

アリシヤ否ヤ吾輩未之ヲ詳ニセズ○洵乙洵乙滲出ノ時期ニ

方テハ項上或ハ顱心ヲ刺テ芫菁膏ヲ貼シ腓腸ニ蒸餅母

ヲ貼シ又吐酒石膏ヲ塗擦スベシ五百

○第四百九十二方遠突土

一時每服セシムベシ

○第四百九十五方同上

葯刺巴末半 甘永半 白糖五

右調和為散分四服每一時服一服

○第四百九十六方遠西方

醋酸加里液 滿那舍利別各一 煎餉水二

右溶和每一時服一兒匙

主治小兒急性頭水ニ甘永ト交換シ用フ

○第四百九十七方護利秘

實芟荅利斯二 甘永四 乳糖四

右調和為散等分八服每一時服一服

○第四百九十八方同上

過兒托葉三 實芟荅利斯四 熱湯適宜浸漬濾過取

三弓半加阿訥尼私舍利別半弓

右調勻每半時服一兒匙乃至二兒匙

○第四百九十九方同上

亞兒尼加花半 熱湯適宜浸漬濾取三弓加後味

橙皮舍利別半 甘消石精六

右調勻每一時服一兒匙

主治小兒急性腦水腫末期ニ宜シ

○第五百方設係溫優湯

亞兒尼加花半 熱醋三 熱湯五

右浸漬後煮沸暫時濾過放冷供頭上寒罨方須數次換之

主治 小兒急性頭水二宜シ兼テ亞兒尼加花浸劑ヲ內服
セシムヘシ

○第五百一方弗陽

沃曹謨十六分 甘朮 實各半 荅利斯各半 白糖半

右調勻為散分八裹每一時半服一裹

主治 小兒急性腦水腫洩乙滲出ノ時期ニ用フヘシ

○第五百二方弗呂設爾

敞度里阿達斯剝篤亞斯 一錢至二錢

右蒸餾水一弓溶和每一時服三十滴乃至四十滴

主治 三歲乃至七歲ノ兒急性腦水腫洩乙滲出ノ時期ニ

用フベシ ○屑矣歌爾土人 秩篤里屈同 遏別兒同 沈茂爾

滿同 弗劉埤爾同 屋尼傑爾同 等モ亦敞度里阿達斯剝篤

亞斯ヲ稱用セリ

○第五百三方遏茂綸偈

敞度里阿達斯剝篤亞斯 半錢 蒸餾水三弓溶解加砂糖

舍利別一弓

右調和每一時服一兒匙

主治三歲乃至四歲ノ兒ニ用フベシ

○第五百四方

秘傳 福爾母湯 兒度地 僕結爾

格魯林水

煎餚水

砂糖舍利別

各一 各半

右調和收磁器每半時服一兒匙強

主治急性頭水ニ宜シ殊ニ七月乃至一歲ノ兒ニ供用ス

ベシ更ニ年長ノ兒ニ與フルキハ格魯林水ヲ加増メ一

弓ニ至リ又大食匙ヲ以テ服セシムベシ○僕結爾

病ノ初起ニ之ヲ用ヒテ脈管ノ壓迫ヲ退ケ又湧乙滲出

ノ期ニ用ヒテ其吸收ヲ催進セシム之ニ兼テ蟻鉞寒菴

法ヲ怠ルナカラシム瀉ヲ促スハ複方梅那浸附ニ宜

シ

○第五百五方

密振 苦麻倚爾

吐酒石膏

右每一時塗擦額頭及項窩

主治甘永ト内外兼用ス○室兒失篤地ノ首 歇爾土人

密振苦麻倚爾名ノ人教示ニ據リ十四箇月ノ兒急性ノ内

部頭水症ニ此方ヲ試用シ第四日ニ方テ始テ疹ヲ發シ

昏睡及ヒ其他頭水諸証悉ク消散セリ之ヲ塗擦スル

六日ニ至リテ其疹潰膿シ痛最甚シク五週ニシテ平治

セリ

○第五百六方

阿訥尼私根錢 水適宜煮濾取四勺加後件

大黃水製丁幾 苗香舍利別各半

右調勻每一時服一兒匙

主治四歲乃至六歲ノ兒急性腦水腫本復ノ期ニ及テ利尿及ヒ飲食ノ消化ヲ扶クルニ用フ

脊髓燉衝ノイリチス羅オントステイキ

此症亦消燉法ニ從事スヘシ刺絡ヲ施シ水蛭十五頭ヨリ二十頭至脊椎ニ浴フテ貼スベシ或ハ吸角法ヲ施シテ更ニ適當トリトス而ノ後脊椎ニ寒罨法ヲ行ヒ内服ハ精製

消石三方至十五方 及ヒ清涼下劑十五方

至五十六方 後甘汞一瓜ヨリ二瓜至一時每ニ與ヘ依拂朗屈

名ノ法ニ從テ亞兒尼加花浸モ亦用フヘシ脊椎ノ兩側ニ

水銀膏ヲ塗擦シ每一時一錢 瀉藥ヲ灌腸シ又發疱膏ヲ貼メ

久シク癒ザラシムベシ若生カ虚弱ニシテ分利機ヲ起スニ

足ラザル者ハ依拂朗屈龍腦硃鉄華ヲ配用シ並ニ的列

並油ヲ加ヘタル灌腸方ヲ彌贊セリ

○第五百七方依拂朗屈

的列並油錢半 蜜一 加密列浸六

右調和供灌腸

胃疾衝

カストリチス 羅マ一グ
オントスチキ ینگ蘭

胃疾衝ニ數次多量放血スルハ適當ナラズトス何トナレ
 ハ此症血實ニ因ル者僅少ニモ患部知覺過敏ニ因ル者多
 ケレハナリ大抵少量刺絡ヲ行フ一廻後蟻鍼ヲ施メ足
 リリ但蟻鍼ハ數多ヲ厭ハス且數次之ヲ施スニ宜シ蟻鍼
 ハ胃ノ上部ヲ撰テ施スベシ然レモ痔疾内陷或ハ月經閉
 止ニ因スル者ハ肛門内股或ハ陰部ノ近圍ヲ好トス内服
 ハ假令極メテ緩和ノ藥品ト雖モ大抵胃之ヲ受クルニ堪
 ヘズ唯氷ヲ碎キテ胡桃子大ト作シ服スレバ良效ヲ奏シ
 且煩渴ヲ消ス但之ヲ喫スルニ暫時之ヲ口中ニ含ミ尖角

ノ融消スルヲ待テ嚥下スベシ而後鎮靜ノ乳劑五百方甘永
九方硝酸曹達五百方ヲ摺用シ肚腹ニ緩和蘇劑ヲ行フ患者
 若五百方罨法一方ニ堪フ可クバ之ヲ施スヲ佳ナリトス○胃
 疾衝ハ儘麻質斯ノ外部ヨリ内部ニ轉徙スルニ因ル者多
 シ此ノ如キハ直ニ胃ノ上部ニ大發疱膏及ヒ肛門ニ蟻鍼
 ヲ施スヲ要トス

○第五百八方歌蘭度

甘扁桃油一方 水八方 亞刺昆亞護護漿適宜 作乳劑更

加後味

菲阿斯越幾斯六方 扁桃乳舍利別半方

右調勻每半時服一食匙

〔主治〕刺絡及ヒ局處ノ瀉血殊ニ吸角法ヲ行フテ后ハ之ヲ無比ノ良法トス患者能ク之ヲ受ルニ堪フ兼テ胃部ニ鎮痛ノ罨劑及ヒ擦劑ヲ施シ蒸餅母及ヒ芫菁膏ヲ貼シ又緩和灌腸微温全身浴ヲ行フベシ飲料ハ乳汁ニ水ヲ和シ用フ蓋酪餘ヲ最佳トス

○第五百九方〔列設爾〕

甘汞 白糖 各一刃 至半錢

右調和為散分二晝朝服一晝又隨其症晚服一晝

〔主治〕胃ノ粘液膜燉衝ニ宜シ安温私戾名過爾謨私德名怒

偃同上等モ亦之ヲ稱用セリ若瀉劇シキ時ハ阿芙蓉一ハ

乃至二ハヲ與フベシ〔列設爾〕名ノ經驗書中ニ詳ニスル

カ如ク此方ヲ以テ此症ヲ療スル片ハ二三日ニノ復治

シ殆他藥ヲ要スル丁ナシ又之カ為ニ惡証ヲ挑起スル

丁ナシト云フ然レモ實性胃燉衝ニ此ノ如キノ大量甘

汞ヲ與フレハ恐ラクハ危險証ヲ發セシ小量ニ用フル

片ハ下利スルモノハ阿芙蓉ヲ配伍ス其效誤ル丁ナシ三百九十四方殊

ニ慢性胃燉衝ニ宜シ

○第五百十方〔同上〕

硝酸曹達 二錢至三錢 過爾托煎六亨溶和

右每半時若一時服一食匙

主治腸胃ノ粘液膜燠衝ニ先瀉血ノ后之ヲ用フ又甘汞連服ヲ忌ム者之ニ宜シ

○第五百十一方

亜麻仁 過爾托根 常用加密列 錦葵葉 草零陵

香葉 各半 黑菲阿斯葉

右細剉調和取其一分水或乳汁煮為罨劑

腸燠衝

エンテリチス羅ダム
オントステーキング蘭

此症腸中諸膜燠衝ト粘液膜燠衝トノ別アリ

○諸膜燠衝エンテリチスハ胃燠衝ト同ク瀉血多量ナル

勿レ大抵刺絡一次ニメ足レリ刺絡ノ後痛所或ハ症ニ隨

テ直腸若クハ内股蟻鍼ヲ貼ス但蟻ノ多少ハ適宜ニ消息

スベシ蓋患部琶布罨劑五百十一方ニ堪ヘザル者多シ弗

刺涅爾毛布ヲ湯ニ醮シ絞リテ腹上ニ安シ數次之ヲ換フ

ルニ宜シ内服ハ甘汞四百七方ヲ第一トス之ヲ阿芙蓉ニ配

スルモ三百九十四方亦佳ナリ然レモ二品ヲ分テ各別ニ用フレ

ハ更ニ適當ス何トナレバ甘汞ハ通例一時毎ニ一匁乃至

二匁ヲ用ヒ阿芙蓉ハ疼痛ノ劇易及ヒ其他ノ証狀ニ準シ

テ一日ニ唯二三回多キモ四回ニ過キス其量モ亦半匁乃

至一匁ニ止マレバナリ之ニ兼テ緩和藥油質粘滑藥乳劑

至一匁ニ止マレバナリ之ニ兼テ緩和藥油質粘滑藥乳劑

ニ老利兒水ヲ加フル者等ヲ服セシム五百十或ハ菲阿斯二百越幾斯五百十或ハ舍電阿芙蓉液五百十モ亦配伍スベシ
 大便ヲ促スハ亞麻子油五百十ヲ用フベシ蓖麻油五百十
九百十更ニ佳ナリ鹽類ハ通例害アリ設令之ヲ與フルモ
 必油質藥ニ和スルヲ好トス五百十又緩和灌腸ヲ施スベ
五百十冷水灌腸モ亦良效ヲ奏スルヲ屢之アリ
 又水銀膏半錢ヨリ一錢至或ハ之ニ菲阿斯油ヲ和シ一時
 乃至一時半毎ニ徐々下腹ニ塗擦スルニ宜シ
 粘液膜ノ急性焮衝症アキユタエンテハ刺絡ヲ要スル者
 罕ナリ大抵下腹ノ痛所ニ蟬鍼ヲ施メ足レリ内服ハ油乳

ニ老利兒水五百十 菲阿斯五百十 或ハ阿芙蓉五百
 方ヲ加フ甘汞ニ阿芙蓉ヲ伍スル者三百九亦良效ヲ奏ス
 ルヲ屢之アリ外用ハ水銀膏及ヒ緩和灌腸ヲ佳トス○慢
 性粘液膜焮衝症ニコロニセエンテモ亦上ノ治法ニ同シ經
 久過度ニ瀉スル者ハ硝酸銀溶液ヲ加ヘタル灌腸ヲ稱譽
 セリ五百三

○第五百十二方

白罌粟子三錢至 加黑櫻實水四勺乃至六勺搗爛作

乳劑後加左藥

老利兒水一錢 白糖二錢至

右調和每一時服一食匙

○第五百十三方

甘扁桃油半 亞刺毘亞護護漿適 加黑櫻實水四

作乳劑後加左藥

菲阿斯越幾斯 過兒托舍利別

右調勻每一時服一食匙

○第五百十四方

甘扁桃去皮 加黑櫻實水六 研碎作乳劑後加左藥

舍電阿芙蓉 白糖六錢

右調勻每半時乃至一時服一食匙

主治第五百十二方ヨリ五百十四方至腸煥衝ニ用ヒテ

刺衝。痙攣。疼痛。ヲ緩和鎮静スルニ宜シ。○高醫松傑福傑

爾名數回經驗セシ說ニ據ルニ純粹腸煥衝ニ瀉血シテ

后ハ阿芙蓉ニ勝リテ效ヲ奏スルモノナシ患者體質虛

弱ニノ病因倭麻質斯ニ在ル者ノ如キハ殊ニ然リトス

阿芙蓉ニ含畜セル華爾斯質ヲ惡ム片ハ福傑爾氏水製

越幾斯ヲ與レ若之ヲ吐スル片ハ灌腸藥ニ和メ用フベ

シ。○甘汞阿芙蓉ノ合劑三百九十四方モ亦能ク適當ス

○第五百十五方護松篤

精製阿芙蓉半 亞刺毘亞護未 白糖六

右調勻為散分六裹每服一裹日二三次乃至四次

主治腸焮衝瀉血シテ后疼痛ヲ減シ神經系ヲ鎮靜スルニ宜シ

○第五百十六方

龍腦二八至 精製阿芙蓉八 白糖二

右調和為散等分四服每日三四服

主治腸焮衝症焮衝ノ勢已ニ退テ后之ヲ用フ其症僂麻質斯ニ因スルハ殊ニ佳ナリ

○第五百十七方〔破歌蘭度〕

新製亞麻子油二

右每一時與一食匙

○第五百十八方〔同上〕

蓖麻油二

右每一時與一食匙

主治右二方ハ刺絡及ヒ局處瀉血ヲ施シテ后用フベシ之ニ兼テ緩和鎮痙罨法ヲ施シ水銀膏或ハ菲阿斯油ト阿芙蓉丁幾ヲ合和シテ肚腹ニ塗擦シ三時毎ニ油質粘滑藥ヲ灌腸シ又微温浴ヲ施スヲ尤佳トス後肚腹ニ大發疱膏ヲ貼スベシ

○第五百十九方

蓖麻油一 亞刺毘亞護謨漿宜適 加黑櫻實水四 為

乳劑再加後味

滿那舍利別半

右調勻每一時服一食匙

主治 腸焮衝症瀉ヲ促スニ用フ

○第五百二十方 過儼栗屈的爾

瀉利鹽半 水三 半溶化加後藥

亞麻子油半 阿芙蓉丁幾九滴 罌粟舍利別半

右調和每四分時服一食匙強

主治 腸焮衝症焮衝減シテ后瀉スル者之ニ宜シ○予按

スルニ此方用フルニ堪ヘザル者多カラシ

○第五百二十一方 弗陽

白罌粟子半 菲阿斯子二錢 加菩提樹花水四 搗爛

為乳劑加後味

硝砂錢 亞刺毘亞護謨半錢 扁桃乳舍利別半

右調和每半時服一食匙

主治 腸焮衝刺絡及ヒ局處瀉血ヲ施ノ焮衝已ニ去リ衰

弱弛緩復ヒス血及ヒ粘液畜積セル症ニ宜シ即腸ノ感

覺過敏ニノ尋常ノ刺戟物モ飲食感動銳敏ニノ鈍痛壓迫

スルカ如ク脈疾ニノ緊ヲ帶ブル者是ナリ良醫福傑爾

氏ノ論言ニ云ク腸痲衝ニ碯砂消石ヲ用ヒテ總テ鹽類
ヲ與フルト勿レ灌腸モ亦復然リト善哉言也

○第五百二十二方〔誤私篤〕

甘汞一 失鳩六 荻蓉葉二 金硫黃半

白糖一

右調和為散分十二裹每服半裹乃至一裹日三次

主治 腸痲衝末期下腹ノ一處疼痛ノ發シ腸將ニ硬固質
ニ變セントスル乎或ハ生着ノ懼レアル者之ニ宜シ○
之ニ兼テ水銀膏ヲ塗擦スベシ

○第五百二十三方

蘆根流動越幾斯 蒲公英流動越幾斯各一錢 精製
孕鹼酒石半 蒸餾水四

右調勻每一時服一食匙

主治 慢性腸痲衝ニ宜シ○痛處ニ先蟻鍼若クハ吸角法
ヲ施シテ後緩和劑ヲ與フ但甘汞ヲ内服シ水銀膏或
ハ碯砂揮發加龍腦膏等ヲ交換シ用フベシ

○第五百二十四方〔誤私篤〕

甘汞 金硫黃各半 菲阿斯越幾斯二 白糖一

右調和為散分十二裹每服一裹日三次

主治 慢性腸痲衝ニ宜シ

○第五百二十五方

錦葵葉 草零陵香葉 失鳩苔葉 菲阿斯葉 白罌粟球各半

右細剉取其一分水若乳汁煮為罨劑

主治腸焮衝下腹貼之但罨法ノ如キハ焮衝減ズルノ后ニアラスハ之ニ堪ヘザル者多シ五百十一方ヲ參照スベシ

○第五百二十六方

亞麻子半 水十弓煮耗至五弓濾過加後藥
亞麻子油一

右調和供灌腸

○第五百二十七方

蓖麻油一弓至一弓半 雞子黃二箇 加密列浸六

○第五百二十八方

過兒托葉 歇爾拔斯屈謨葉各一錢 罌粟球剉者三錢
雨水煮濾過取八弓加後藥

亞麻子油半

右調和供灌腸

主治第五百二十五方ヨリ五百二十八方至腸ノ痙攣焮衝。或ハ大便閉腸ノ感覺過敏ヲ兼ヌル者等ニ宜シ

○第五百二十九方別連杜

蒲公英根煎

麥糠煎各四

阿魏一錢至二錢 子黃溶和者

蓖麻油二三茶匙

右調和供灌腸

主治腸炎衝大便閉止ニ因スル者ニ宜シ

○第五百三十方

結晶硝酸銀一

過爾托煎四溶化

右供灌腸

主治腸ノ粘液膜慢性炎衝經久下利スル者ニ宜シ○内服ハ侃私惛篤人托歇爾散及ヒ沙列布煎ニ阿芙蓉液ニ

三滴ヲ和スル者ヲ稱用シ又鹽酸鉄丁幾二十滴ヨリ三十滴至砂糖水ニ和シ與フルト三四次又鉛糖格倫僕ボヲ用フ以上ノ諸方效アラザルハ硝酸銀ヲ日服スルト八分ハノ一ヨリ四分ハノ一ニ至ル但侃私惛篤氏ハ之ヲ用フルヲ速ニセズ

痢疾チセンテリア

病學家通例此症ヲ以テ慢性病中排泄異常症ノ屬類ニ充ツルト雖此症原血中一種ノ病毒ヲ生シ之カ為ニ大腸炎衝ヲ起スニ因スルヲ必然ナルガ故ニ之ヲ急性病中ニ算入シ腸炎衝ノ後ニ論列スルヲ當然ナリトス○單純聖京

倔痢ハ油質粘滑ノ乳劑ニ阿芙蓉丁幾ヲ加フル者五百三十一方
至五百三十四方 阿芙蓉ヲ吐根ト配伍シ五百三十五方 或ハ甘朮ト合和
七ル者 五百三十六方 吐根浸劑五百三十七方 若クハ吐根乳劑五百三十八方 等
 方ヲ稱用セリト雖方今廢棄シテ用フルナシ德秩列名
 ハ雞子白ヲ稱質セリ五百四十五方 之ニ兼テ下腹ニ燕麥粉若ク
 ハ緩和藥ノ温暖琶布ヲ施シ疼痛劇甚ナレハ菲阿斯葉或
 ハ矢鳩苔葉ヲ之ニ加フ五百四十五方 ○煖衝性痢ハ刺絡
 質粘滑ノ乳劑ヲ用フベシ但瀉血ヲ以テ煖衝ヲ制セシ后

ハ阿芙蓉ヲ加フルニ宜シ又輓近ニ至リテ屢々硝酸曹達
五百四十六方 至五百四十八方 ヲ稱譽ス○膽液性痢ハ初ノニ吐劑吐根ヲ
 用フルヲ最適當トス而後油性粘滑劑五百四十九方ニ阿芙蓉ヲ
 配用スルニ宜シ甘朮ハ茲ニ偉效アリ但症ニ應ノ之ニ阿
 芙蓉ヲ加減スベシ五百三十六方 瀉藥ヲ要スル片ハ苔麻林度五百
五十方 阿沒勒酒酸加里曹達等ノ如キ緩和清涼酸性ノ者ニ
 宜シ○粘液性痢ハ大抵阿芙蓉ヲ用ヒテ的效アリ番木鱉
五百五十二方 及ヒ菲阿斯越幾斯モ亦偉效アリ○神經性症ハ顯
 草接爾扁太里亞 白芷龍腦 麝香及ヒ他ノ衝動藥ヲ稱質ス
 卜雖モ吾輩ハ之ヲ信セス粘滑油質劑吐根小量阿芙蓉等

ヲ以テ更ニ緩裕ノ治ヲ處スルヲ妥帖トス○腐敗痢ハ亞
 兒尼ルカ加根五百五十三方龍腦緘百設木五百五苜蒲根格給
 僕カ幾那等尤適當藥トス昔者賞用セシ所ノ明礬ノ如キハ
 須要ノ症稀ナリ五百五十八方弗陽名入明礬ノ試驗說アリ
 宜ク參考スベシ五百五十八方輓近撒里矢担十五方並ニ鉛糖百
六十ヲ用ヒテ效ヲ得タリ○此他諸種ノ外用方ヲ施ノ腹
 痛裏急後重等ヲ除クベシ五百六十九方至五百七十三方

○第五百三十一方萊爾鳩

甘扁桃油錢 鷄子黃筒 亞刺毘亞護護錢 丁寧
 捏和加黑櫻實水四勺作乳劑再加砂糖舍利別半勺

右調和每半時服一食匙

○第五百三十二方同上

甘扁桃油錢 亞刺毘亞護護錢 丁寧捏和加黑櫻實
 水六勺作乳劑再加後件錢
 砂糖舍利別或過爾托舍利別半勺

右調勻每四分時服一食匙強

主治

右乳劑五百三十一方ハ萊爾鳩私入范別爾低地ノ
 病院ニ於テ流行痢疾ニ稱用セシ所ニ他病ニ於テモ
 亦偉效アリ之ヲ他ノ有カノ藥ト兼用スレハ更ニ佳ナ
 リ

○第五百三十三方秘傳。福傳。

甘扁桃油半 亞刺昆亞護謨一錢 雞子黃半錢 茴香
水半 阿芙蓉丁幾十五滴 扁桃乳舍利別六錢
右調和作乳劑每四分時若半時服一茶匙強乃至二茶匙
強

○第五百三十四方同上

亞刺昆亞護謨二錢至半 白糖一錢至二錢 茴香水三 溶
化加後藥
民埤列里精一 阿芙蓉丁幾一
右調和每一時乃至一時半服一食匙強

主治第五百五十一方五 第五百三十四方至 單純聖京偃

痢宜

○第五百三十五方

精製阿芙蓉 吐根末各二錢至六錢 白糖四
右調和為散等分八裹每一時乃至一時半服一裹

主治單純聖京偃痢宜

○第五百三十六方設。優。

甘永八至十二 精製阿芙蓉二至三 牡蠣末二 白糖
右調和為散等分八服每一時一服

主治痢疾ノ初無熱ノ時期患者腹痛裏急ニ苦ミ粘液血ヲ帶ビテ泄瀉シ一種臭氣アリ食欲ヲ失フ者之ニ宜シ其功ヲ收ムルハ大抵上方八服多キモ十二服ニシテ足レリ裏急後重甚シキ症ハ兼テ會陰ニ蟻鍼ヲ施スルハ頭ヨリ十二頭ニ至ル○求^ヤ嫪^カ地ノ^名邏^カ的^カ氏^カ屢^カ此^カ療^カ法^カヲ自^カ驗^カノ良^カ效^カアルヲ證^カセリ○倪^カ私^カ怛^カ篤^カ等^カ衆^カ醫^カ甘^カ承^カ半^カ刃^カヨリ一刃至日服セシムル一唯一次多キモ二次ニ過ギス通例此一服ニ膽液様若クハ綠色ノ大便^{所謂甘ヲ瀉}シ患者大ニ緩釋ニ腹痛裏急共ニ減セリ奏効此ノ如キハ復後服ヲ要セス大抵^下抱^下歇^下爾^下散^下ヲ油性乳劑或ハ緩和

下劑ニ和用シテ全功ヲ收ムルニ足レリ或ハ甘承一服ニシテ效ヲ得ス裏急後重等愈加重スル者アリ然ルハ第二服若クハ第三服ヲ服セシム甘承ハ此種ノ症泄瀉ヲ要スル者ニ殊ニ的効アリ是故ニ總テ流行痢ニ之ヲ試用スト雖更ニ腸胃汚物膽液及ヒ蛭虫ヲ夾雜スル者ハ最宜シトス

○第五百三十七方

吐根^{粗末一刃} 水四勺浸漬濾過加左藥

橙花舍利^{別半}

右調勻每八分時服一食匙

主治痢疾ニ用ヒテ痙攣及ヒ疼痛ヲ鎮定スルノ奇藥トス

○第五百三十八方〔弗陽〕

吐根錢十 大黃半一錢 注熱湯三勺更煮沸濾過加後味

亞刺毘亞護謨錢末一 遏爾拖舍利別錢三

右調勻每半時服一食匙強

〔主治〕痢疾痙攣ヲ帶ヒテ唯微痛ニ止マリ下腹却テ緊脹スル者之ニ宜シ又脈緩徐ニシテ泄出物ニ血及ヒ粘液ヲ帶ヒサル症ニ施シテ佳ナリ若之ヲ用ヒテ大便秘止シ腹痛愈增長スレハ須ラク大黃ヲ去ルベシ

○第五百三十九方〔松傑福傑爾〕

安質沒尼酒錢三 阿芙蓉丁幾錢一

右調勻每一時半服二十滴乃至三十滴

〔主治〕單純聖京痙攣ニ宜シ

○第五百四十方〔傑遏爾的爾〕

加密列越幾斯 上好亞刺毘亞護謨錢多 加密列水

五勺溶化加白罌粟舍利別半勺

右調勻每一時服一食匙臨服宜振盪

〔主治〕泄瀉及ヒ痢疾ニ宜シ

○第五百四十一方

黃蠟半 牛乳熟者半化溶化

右每一時服一食匙

主治秩茂爾蒲魯屈人及ヒ爾過福傑兒同上ハ蠟ヲ熟乳ニ

和用セリ然レハ私傑福傑兒ノ言ノ如ク蠟ハ能ク乳

汁ニ溶化セズ且痢疾ニ用ヒテ每症適當スル者ニアラ

ズ○一千六百三十五年蒲拉伴突地名ニ於テ痢疾流行セ

シ時伊答里亞國名ノ醫蠟一錢ヨリ三錢至熱乳ニ溶化シ

與ヘテ甚偉效ヲ得第一服若クハ第二服ニ之ヲ治セ

リト云フ

○第五百四十二方松樹福傑兒

○黃蠟半 入白中加微火烱解和雞子黃六箇及綿苔幾

主里私布水六多為乳劑更加後呆

本雜腹蘭舍利別子

右調和每服一食匙臨用宜振盪

○第五百四十三方越垣堡度

亞刺昆亞護護末ニ 入石臼注熱湯適宜溶解加黃蠟

三多能搗和再加後呆

麗春花舍利別子 壹百兒越列幾秩兒 附適宜味

右調勻每一時服一食匙強

主治右二方五百四十二方包攝劑トノ痢疾ニ用フ設兒

忽弗滿名人名余拂同等ハ大ニ蠟製乳劑ヲ稱用セリ越埵僅度氏ハ上方ノ鴻益アルヲ自驗セリ今時ニ至テ此方全ク棄レテ用フル者ナシ

○第五百四十四方福儷篤

黃蠟 阿列襪油各二錢 熱白烱解加鷄子黃一箇又徐々加微温湯四勺為乳劑加後藥

鹿琥精一錢半 舍電阿芙蓉液一 過爾抱舍利別三錢

右調勻每一時服一食匙強

主治慢性下利及ヒ痢疾ニ宜シ

○第五百四十五方憲樹列

鷄子白六筒 水北二 攪和濾過加後藥

砂糖舍利別三 橙花水適宜

右調和應症用之

主治憲樹列名人雞子白ヲ以テ痢疾ノ奇藥トシ當ニ之ヲ

包攝劑トスルノミナラス病中大ニ泄出スル所ノ蛋清

質ヲ補給スル者トシテ稱賛シ大人ハ十二時間上方ヲ

飲服セシムルヲ三壘乃至四壘小兒ハ二壘之ニ兼テ鷄

子三箇ノ蛋清ヲ取テ水ニ和シ毎日小量ニ灌腸セシム

○整倫篤人及ヒ其他伊荅里亞國ノ醫モ亦上方ヲ用ヒ

テ良效ヲ得タリ然レ氏悅別兒名ハ獨之ヲ取ラス却テ

之ガ為ニ腹痛ヲ倍シ又惡心嘔吐ヲ起スト云フ

○第五百四十六方〔暴訥爾田〕

硝酸曹達六錢至 過爾拖煎六ヲ乃至八ヲ溶化

右調和每一時服一食匙

〔主治〕〔シカ〕 焮衝熱性痢疾ノ初起直ニ之ヲ用フ大抵奇藥トシ

テ之ヲ稱譽セリ

○第五百四十七方〔迷訶爾〕

硝酸曹達一ヲ至 過爾拖煎八ヲ溶化加後味

達刺侃篤護謨八分至

右調和每半時服一食匙

〔主治〕痢疾差焮衝熱性ヲ帶ブル者ニ宜シ

○第五百四十八方

精製曹達 硝酸曹達各半 蒸餾水八ヲ溶化

右調和每半時服一食匙

〔主治〕焮衝性膽液痢ニ宜シ

○第五百四十九方〔穢歌蘭度〕

亞刺昆亞護謨漿 過爾拖舍利別各一 水七 舍電

阿芙蓉液十六滴

右調和每一時服一食匙臨急則每半時服一食匙

〔主治〕〔シカ〕 痺麻質斯性膽液性痢ニ宜シ但先吐根ノ吐劑ヲ與

へ而後之ヲ用フヘシ

○第五百五十方弗陽

加密列越幾斯 亞刺毘亞護護各二 加密列水五弓

溶化加後件

荅麻林度 加密列舍利別各一

右調和每一時服一食匙

主治膽液性痢疾先吐劑ヲ與へ後之ヲ用フルニ宜シ之

ニ兼テ加密列甘草亞麻子等ノ泡劑ヲ與へ且下腹ヲ加

密列浸劑ニ浸ヌヲ佳トス

○第五百五十一方穢歌蘭度

水製大黃丁幾六 精製礪砂二 櫻實水七 舍電阿

芙蓉液二十 過爾托舍利別一

右調和每一時服二食匙

主治腸胃性或ハ膽液性痢疾尿中塗渣ヲ見サル者ニ宜

○第五百五十二方同上

水製番木鱉越幾斯カ半 接骨木花水六弓溶化加後味

亞刺毘亞護護漿 過爾托舍利別各半

右調和每一時服一食匙臨服宜振盪

主治痢疾ニ宜シ○穢歌蘭度ハ之ニ兼テ粘滑藥ニ阿

芙蓉或八番木鼈越幾斯三瓜乃至四瓜ヲ加へ少許宛灌腸セシム小兒ハ十二時間ニ番木鼈ヲ用フル一ニ瓜ニ至ル○顯屈私篤呂母名人阿垓劉私同阿別爾兜歇爾同阿私過兒度同忽倫同屈刺歇私同等モ亦番木鼈ヲ賞譽シテ阿芙蓉ト配用ス兒拂郎屈名人ノ如キハ番木鼈ニ一種ノ奇效アリト稱ス

○第五百五十三方同上

亞兒尼加根末ハ白糖四

右調勻為散等分八服每一時一服

主治腐敗性痢疾ニ宜シ

○第五百五十四方列墨爾

亞兒尼加根半熱湯適浸漬八分時濾取八弓加沙

列布根末半錢冷水少許搗爛者煮沸令溶解放冷加

後藥

舍電阿芙蓉液一橙皮舍利別一

右調和每半時服一食匙乃至二食匙

主治神經性或ハ腐敗性痢疾ニ宜シ

○第五百五十五方備設

緋百設水一水一匕煮耗至八弓濾過放冷加後藥

龍腦一加亞刺昆亞護

右調勻每一時服二食匙

主治腐敗性痢疾ニ宜シ又鈍性神經熱腐敗熱等ノ后泄瀉腹痛アラザル症ニ用フベシ

○第五百五十六方弗傑醞秘

水楊皮弓 水適宜浸漬一宿翌日煮半時濾過取二十弓

或十六弓乘温加後藥

達刺ラ侃ク篤ト護ゴ護ゴ刃 過爾レ抱レ舍利リ別リ弓 橙皮舍利別弓

右調勻每半時温服半盞強

主治腐敗性或鈍性神經熱性痢疾ニ宜シ大便ニ臨テ腹痛裏急後重甚シキ者ハ此劑一弓中阿芙蓉液二滴乃

至三滴ヲ加ヘ十二時間ニ二十滴乃至六十滴ヲ用フベシ

○楊皮ハ二年乃至三年ノ枝ヲ撰ビテ春日之ヲ採收スヘシ弗傑醞秘名人此方ニ幾那モ亦用フト雖楊皮收斂ノ效差幾那ニ優レリトス

○第五百五十七方微兒粟暗斯

撒里矢捏五人至 白糖半

右調和為散分六裹每服一裹日三次乃至六次

主治痢疾ニ施シテ後重ヲ除クニ宜シ○順症ニ於テハ

撒里矢捏ヲ用ヒテ全功ヲ收ムルニ足レリ他ノ鎮痛收斂藥效アラザル者モ亦之ヲ用ヒテ癒ユ

○第五百五十八方噶拉收假秘

明礬末一錢 阿仙藥半錢 達刺侃篤護護 橙皮水八

過爾托舍利別

右調和每服二食匙日二次乃至四次

主治痢疾ニ宜シ○此ニ弗陽名人ノ說ヲ揭ク云ク

痢疾ニ明礬ヲ用フルハ之ヲ泄瀉ニ施スニ比スレハ

更ニ謹慎ヲ加フヘシ明礬ノ如キ收瀉藥ヲ與フベキ

者十中一ニ過キザルベシ但明礬ハ腐敗痢ニ尤適當

トス括隣君ハ之ヲ忌ト雖余ハ明礬ヲ以テ腐敗痢ヲ

治セシフ屢之アリ腸胃清淨ノ症或ハ患者危篤ニ臨

ミ諸液著シク溶渙シ。肌熱熾ニ渴甚シク。脈小ニノ震

慄シ。舌苔乾燥黑色ニメ紋裂ヲ見ハシ且震慄スル者

ハ明礬ノ效更ニ硫酸ニ優レルヲ證セリ余ハ明礬ニ

配スルニ安偃斯點刺西瑪劉拔皮龍腦等ヲ以テセリ

○第五百五十九方同上

亞刺昆亞護護 生明礬 葛私加栗刺越幾斯

加密列水四 橙皮舍利別半錢

右調勻每一時服一食匙強

○第五百六十方嬰別兒

精制阿芙蓉半 明礬半 亞刺昆亞護護

右調和為散分八覆每一時半乃至二時服一覆

主治右二方五百五十九方ハ鈍性神經熱性及ヒ腐敗性

ノ痢疾ニ宜シ

○第五百六十一方弗。隄。做。設。兒。列。

吐根四分 精製阿芙蓉半 龍腦一 白糖半

右調和為散分八服每一時乃至一時半一服

主治痢疾ノ末期本來ノ熱性已ニ減退シ唯腸ノ衰弱弛

緩ノ為下利未已マザル者之ニ宜シ

○第五百六十二方弗。陽。

葛私加栗刺皮二 水適宜煮耗至四三濾過加後藥

甘硝石精四 橙皮舍利別半

右調勻每一時服一食匙強

主治下利及ヒ痢疾後腸ノ煥衝證已ニ退キ唯腸ノ衰弱

シテ屢泄瀉スル者之ニ宜シ

○第五百六十三方烏。里。儼。士。

新製枸櫞汁三 食鹽適宜但飽 已上合勻加左味

加密列水北 白糖適宜甘

右每二時乃至三時服一盞

主治慢性痢疾腐敗ニ傾ク症ニ宜シ○獨老私人ハ枸櫞

汁ト油ヲ配用シテ痢疾ヲ治セシ一百人ニ過タリト云

○第五百六十四方忽百

硝酸錢二 精製阿芙蓉錢二 水三

右調和每服一食匙粘滑藥液和服日四次

主治緩慢虛性ノ痢疾ニ宜シ○欲熅名人モ亦酸類ヲ稱

贊ス

○第五百六十五方沒忍

銘糖四 水製阿芙蓉越幾斯二至四

右蒸餾水二匁乃至四匁溶化

主治過里名滯爾結同沒忍同等慢性痢ニ銘糖ヲ稱用

セリ名沒忍名ハ實症ニモ亦之ヲ用ヒテ良效ヲ得タリト云フ

○第五百六十六方福偃列爾

桂皮末二 阿仙藥錢一 精製阿芙蓉錢一 吐根末半

右調勻為散日服三次乃至四次八匁乃至十五匁

主治痢後ノ泄瀉ニ宜シ○此方藥局ニ命ノ各服ノ量ヲ

分クシムルヲ最好トス

○第五百六十七方桂癆地選的

番木鱉水製越幾斯六至四 桂水三匁乃至四匁溶化

右調和每日服一食匙

主治痢疾後腸衰弱ノ泄瀉過多食欲虧損等ノ症ニ宜シ

○第五百六十八方福倨列爾治痢灌腸方

阿芙蓉一 阿仙藥一 漿粉煎四

右調和供灌腸

○第五百六十九方影布

外水六分 煎餾水一 亞刺昆一 亞護一 護漿一

精製阿芙蓉末一

右調和取一盞強微温供灌腸

主治痢疾及ヒ慢性下利阿芙蓉及ヒ其他尋常藥效ナキ

者ニ宜シ

○第五百七十方福倨列爾氏鎮瘧軟膏

新鮮鹿脂或 牛脂半 新鮮無鹽酪三 漿粉一 阿芙蓉末半

右微温熔和取榛子大挿肛門

主治痢疾ニ用ヒテ裏急後重ヲ減スルニ宜シ○又海綿

ヲ以テ微温乳汁阿芙蓉丁幾或ハ緩和温暖ノ油ニ醃シ

テ久ク肛門ニ挿置スルモ亦好シ又諸藥ノ蒸氣ヲ用フ

ルモ可ナリ

○第五百七十一方壽忽倫

顯草一 熱湯適宜浸漬濾過取八弓每一時半取半盞

...

...

微温射注肛門

主治痢疾裏急後重ヲ除クニ宜シ

○第五百七十二方過儼栗屈紛兒

阿列襪油ヲ 硃砂加石灰精錢 單方阿芙蓉丁幾錢半

龍腦ヲ

右調和塗擦肚腹

主治腹痛ヲ治スルニ宜シ

○第五百七十三方

龍腦一錢燒酒適宜溶化者 香竈膏一錢附

右調勻塗擦下腹

遠西方彙卷之五

