

遠西方彙

六

○卷之十一

第二 癱瘓病

癲癩

舞蹈病

聖反偃

世 9
237
11



門武
部 237
卷 11



遠西方彙卷之十一

獨乙 加幾安頓 著

和蘭 傑婆婆都 譯

侍醫法眼貫齋伊東 貞文 仲重 譯

南洋伊東 亨 健夫 參校

第二 癩學病 モルビウスハスモヂキテシキテ 羅カ

癩癩 ルエブレデシキテ 蘭

治法其原因ヲ除クヲ以テ第一義トス内臟刺衝物及ヒ腹
内壅塞ハ解釋劑並ニ下劑ニ宜シ胃中酸敗液ハ麻屈涅失



遠西
卷之十一
廣
伴
堂

亞牡蠣石鹼等蟲症ハ殺蟲劑ヲ用フベシ房勞或ハ獨淫過
 度ニ由テ衰憊シ即病因トナル者ハ先龍腦ニ硝石ヲ伍用
 シ後冷水浴幾那及ヒ鍍劑ヲ與フベシ皮疹或ハ脚汗ノ抑
 遏若クハ潰瘍ノ誤治ニ因テ來ル者ハ勉メテ之ヲ再發セ
 シムルヲ要ス痔疾壓閉ニ係ル者モ亦之ヲ復起スルヲ專
 一トス病因防止スベカラザル者或ハ之ヲ治シテ其効ア
 ラザル者ハ癩癩直達治法ヲ適當トス癩癩ヲ主治スル鑛
 性藥中碓銅礬千六百六十四方至及ヒ硝酸銀千七百七十二方
 方ヲ最稱用ス歌蘭度名ハ亞鉛華千八百八十六方ヲ以テ
 他ノ諸藥ニ優レリトシテ稱用セリ輓近ニ至テハ皓礬百千

八十七方千ヲ殊稱セリ毘私繆萬朱砂千九百八方鉛糖砒石殊
 二福烏列爾名ノ溶液六方鹽酸錫十方精製洋靛九十
 方等モ亦共ニ賞賛ス○植物藥ノ中ニ就テハ艾根千九
 至千九百九方纈草千九百九十六方綠橙葉千二百一方攝實過屈
 里斯葉未詳至千二百五方榭寄生千二百九方青黛千二百
 至千二百方奇藥トス芍藥千三百實屈耽尼根至千二百三十方
 二菲阿斯蔓陀羅華至千二百方葭苈千二百十五方木鼈子千
 至千二百方番木鼈千九百方等ハ上ノ諸藥ニ比スレハ効力更
 二鮮シトス實百兒油千二百廿方ハ屢經驗ヲ得タリ燐
 千二百廿三方ハ每ニ極メテ危險ヲ致スヲ懼ルト雖亦之

ヲ稱賛セリ其他數品ヲ合和シテ製スル所ノ癩癩藥數方
アリ是疇昔ハ秘方トスル所ニシテ或ハ大ニ稱譽セシ者
アリ千二百廿七方至 ○小兒ノ癩癩モ亦其原因ヲ除クヲ
先ニシテ本症ヲ後ニスベシ生齒ノ時期腦ニ畜血アル者
ハ頭上蟻鐵兩足蒸漏法ヲ行ヒ内服ハ甘汞或ハ之ニ亞鉛
華ヲ配用ス千二百廿六方 腸胃汚物アル者ハ吐藥或ハ緩下劑胃
中酸敗液ヲ生ズル者ハ制酸劑千二百廿七方ニ宜シ且癩
癩奇藥ノ中ニ就テ最緩性ノ品ヲ撰用スベシ即亞鉛華千二百廿八方菲
阿斯越幾斯艾根千二百廿九方等是ナリ更ニ峻性ノ者
殊ニ猛烈ノ麻醉藥ハ決メ用フベカラズ

○第一千百六十四方

硃銅礬三六至 府利油糖一錢

右調勻為散等分六裏每服一裏日二三

○第一千百六十五方弗肝爾田蒲蘭突

硃銅礬二六至 白糖一錢

右和勻為散等分六裏每一時服一裏

附考 硃銅礬ヲ散トナスハ速ニ風化シ易キ力故ニ之

ヲ不可ナリトス

○第一千百六十六方過儻栗屈的兒

硃銅礬四 蒸餾水適宜溶化加後味

白蒸餅心 白糖各十八

右和勻二公為一九衣石松粉玻璃壘密貯初晨夕服一九
漸徐加增

○第一千百六十七方標私

硃銅礬錢半 蒸餾水適宜溶化加後藥

精製甘草膏錢一 甘草未適宜

右為百二十九衣桂末玻璃壘收貯每服一九乃至八九
以至二日二三次

主治一千百六十四方ヨリ一千百六十七方至皆癩癩及
ビ他ノ重證癩癩病ニ宜シ ○硃銅礬ハ癩癩ノ一奇藥ナ

以感覺遲鈍ノ病者最能ク之ヲ服スルニ堪ク其他之ヲ
用フルハ腸胃强健ヲ要スルガ故ニ預之ヲ補益スベシ

○第一千百六十八方遠突土

硃銅礬十六 白蒸餅心四 硃砂加石灰精適宜

右為九十六衣石松粉玻璃壘收貯日服二九乃至四九
漸加增

主治癩癩並ニ面痛ニ宜シ

○第一千百六十九方掘纒

硃銅礬錢半 蒸餾水一弓溶化

右每服五滴日三次宜漸加滴數

○第一千百七十方福御篤

硝銅礬錢四 蒸餾水半勺及鹿琥精二錢溶化

右和勻每一時半服二十五滴

○第一千百七十一方咄多

硝銅礬錢一 加後味溶化

桂水 鹿琥精各二錢

右調勻每服六滴乃至八滴日三次

主治以上三方千百六十九方至千百七十一方 癩癩並ニ舞踏病ニ宜シ

○第一千百七十二方

結晶硝酸銀錢十二 蒸餾水一

右溶和黑玻璃壺收貯晨夕服二十滴

主治癩癩ニ宜シ○葛刺墨兒名ノ說ニ據レバ硝酸銀ハ

專其人體格强健ニシテ頭上畜血ヲ夾ミ及ヒ興奮機充

盛ニ因ル癩癩ニ効アリト云フ九トナシ毎服少量持久

連進スルヲ尤稱譽セリ○之ヲ用ヒテ胃中灼熱嘔氣飲

食不化等ノ証ヲ見ハス者ハ速ニ後服ヲ停ムベシ

○第一千百七十三方設魯孤羅骨

結晶硝酸銀錢四 纈草水十五錢溶化

右調勻早晚服十滴每六日加二滴

主治癩癩ニ宜シ○ニ患者極メテ虛弱壯年ニ及テ癩癩

ヲ發シ尔来連綿治セサル_一此ニ數年普孤羅_名眉_人上方
 ヲ用ヒテ全癒シ再發スル_一ナシ但漸々加へ服シテ七
 八十滴ニ至リ且之ニ兼テ脊椎ニ神經軟膏_{複方迷迭}
 香油軟膏ヲ
 塗擦セリト云フ

○第一千百七十四方 〔依拂失門〕

結晶硝酸銀_半 内石白加蒸餾水少許搗碎後投後味

過爾托末 白糖_{各半} 蒸餾水_適

右為九十九衣過爾托末玻璃壺密貯早晚服二粒漸加增

主治此方當ニ癩癩ノミナラス他ノ神經病硝酸銀的當
 スル症ハ皆稱用スベシ

○第一千百七十五方 〔弗陽〕

硝酸銀_半 健質安那越幾斯 甘草_{末各一錢}

右和勻一匁為一九衣石松粉晨夕服三九

○第一千百七十六方

結晶硝酸銀_三 纈草越幾斯_{半一錢} 艾根_{末適}

右調和二匁為一九衣桂末早晚服三九每三日加一九

○第一千百七十七方 〔羅速私的印祿別耳〕

結晶硝酸銀_半 蒸餾水適宜溶化加後味

菲阿斯越幾斯_一 纈草越幾斯_{一錢} 纈草_{末適}

右為九十九衣過爾托末玻璃壺密貯早晚服三九

主治癩癩ニ宜シ○硝酸銀ノ量漸々加へテ一錢ニ至ル
 ベシ○薩微亞羅燻名地ノ疾醫葛弗獨戾噎爾名人一軍卒二
 十一歳ニシテ癩癩日發スル者此丸ヲ用ヒテ治セリ最
 初朝二粒晚三粒ヲ與へ八日毎ニ毎日二粒ヲ加増シ竟
 ニ日服十粒ニ至レリ第十四日後發作減シテ二三日間
 歇スルニ至リ其勢モ亦隨テ減退セリ此ニ於テ方中硝
 酸銀ヲ増シテ十五ハニ至リ尔後二十ハニ至リ又始メ
 ニ回リテ少量ヨリ始メ漸徐ニ加増セリ六七週ニシテ
 發作間歇スルヲ六日乃至十二日ニ及ビ大約四個月ヲ
 經テ全功ヲ收ム然レ氏爾後尚姑毎朝三丸每晚四丸ヲ

連進セリ九十九中含硝酸銀十五ハ其他施治ノ際脊推ニ吐酒石膏
 ヲ頻々塗擦ス初ハ吐酒石二錢半ヲ以テ家猪脂一匁ニ
 和シ後ニ味等分ニスト云フ

○第一千百七十八方歌懺

結晶硝酸銀半 蒸餾水適宜溶解加左味

阿芙蓉末六 矢鳩シ 荅越幾斯 精製甘草膏錢

右和勻二ハ為一丸衣石松粉早晚服二丸漸加至五丸

主治癩癩頑固症ニ宜シ○穢歇蘭度モ亦之ヲ稱用セリ

○第一千百七十九方優列

硝酸錢 大麥煎北

右毎日飲服

主治硝酸銀ヲ服メ皮膚黒色ニ變スル者之ニ宜シ兼テ
 此藥液ヲ以テ皮表ヲ洗フ毎日常ニ三次スベシ葛刺墨
 兒名ノノ説ニ據レバ硝酸銀ヲ服スル一七錢ニ至ラザレ
 バ皮膚黒色ニ變スル一ナシト云フ雄遜名ノ硝酸銀ヲ連
 用スル一三月ニ及テ皮色變スル一ナシ是其確徴ナリ
 葛刺墨兒名ノニ據レハ尚且断然持重シテ六月ニ至リテ
 可ナリ然レ六月中ニ服スル所ノ硝酸銀ノ量半弓ニ過
 ベカラズ其他葛刺墨兒名ノハ肌膚ノ黒色ヲ消スルニ格
 魯林及ヒ沃胃謨劑ヲ試用スレレ効ヲ得ズト云フ

○第一千百八十方〔癩癧〕

亞鉛華半 甘草膏適

右為六十九衣石松粉早晚服二九

主治〔癩癧〕試驗ニ據ルニ亞鉛華ハ癩癧ノ一奇藥
 タリ大量ニ久服スレバ尤妙トス即隔日半弓ヲ加増シ
 病者輕快ヲ覺ユルニ至リテ再服量ヲ減スベシ漸ク加
 ヘテ十弓ヨリ二十弓ニ至ルモ害アル一ナシ此ノ如ク
 之ヲ連用スル一重症ハ半年乃至一年輕症ハ毎月十四
 日ニ下ルベカラズ

○第一千百八十一方〔同上〕

亞鉛華ハ 菲阿斯越幾斯ハ 各一 纈草油ハ 纈草ハ 錢半

右調勻為散分八服晨夕一服

主治癩癩ニ甚効アリ頑固症ハ硝銅礬半ハヲ加フ

○第一千百八十二方福俣篤

亞鉛華ハ 纈草ハ 新根末ハ 牡蠣ハ 白糖ハ 加耶普ハ

的油ハ

右和勻為散分十五裏每服一裏橙葉浸送下日三次

○第一千百八十三方遠突土

亞鉛華ハ 蝟蝟石ハ 芍藥ハ 白糖ハ 錢各一

右調勻為散等分十二服每一時一服

○第一千百八十四方西突列爾

亞鉛華ハ 菲阿斯越幾斯ハ 橙葉ハ 纈草ハ 各八

右調勻為散分十裏早晚服一裏

主治頑固癩癩ニ宜シ○五日毎ニ亞鉛華二ハヲ加増シ

テ一刃ニ至リ後復同法ニ從テ減殺スベシ此方ヲ用ヒ

テ治セシ者許多ナリ

○第一千百八十五方別連杜

亞鉛華ハ 苘荈根ハ 吐根ハ 纈草油ハ 糖ハ 錢

右調勻為散等分六服蠟紙包裹每一時一服

主治神經性癩癩ニ宜シ

○第一千百八十六方際爾肘面兒

亞鉛華ハ 艾根 乳糖各半

右和勻為散分十二裹每服一裹日二次

主治小兒癩癩蟲症ニ係ル者オルムエ之ニ宜シ

○第一千百八十七方蒲蘭堊

皓礬ハ 纈草越幾斯ハ 纈草油糖ハ

右調和為散分六服蠟紙包裹早晚服ニ裹

主治癩癩ニ宜シ○佛里偃篤ハ及ヒ拔貧偃頭ハ皓礬

ノ量漸々加ヘテ一刃或ハ半錢ニ至リ毎日三次之ヲ與

フト云フ然ハ氏予ハ信セス

○第一千百八十八方栗屈的兒秦垣隣

皓礬ハ 阿魏錢 纈草越幾斯宜適

右為三十九衣桂末玻璃壘收貯每服二九乃至三九日二

三次

主治癩癩舞蹈病百日效等ノ如キ瘰癧病ニ宜シ

○第一千百八十九方西篤失昔弗士榕嚙

亞硝酸昆私繆篤 朱砂 煙草葉各一 蘆薈水製越

幾斯ハ 白糖ハ

右調勻為散等分二十裹朝餐後半時一服臨卧一服

主治癩癩ニ宜シ

○第一千百九十方〔秘〕列神傑爾

鹽酸錫一 甘海鹽精一錢溶解

右和勻每服五滴日三四次

〔主治〕癩癩卒瘕及ヒ蟲症ニ宜シ○隔日二滴加増スヘシ

感覺過敏ノ者ハ阿芙蓉下幾二三滴ヲ加ヘテ佳ナリ

○第一千百九十一方〔弗〕肝爾姪蒲蘭度

精製洋靛一八六八 白糖一

右調勻為散等分十二服每一時一服

〔主治〕癩癩ニ宜シ

○第一千百九十二方〔魁〕耳達屈

艾根末去細根
半可

右如法服用

〔主治〕同上○患者少壯ニシテ感覺機適度ノ者ハ癩癩發

作前ニ切近ノ此散半錢ヲ取り温麥酒ヲ以テ送下シ感

覺遲鈍ノ者ハ三十五分乃至二刀ヲ用コ之ヲ用ヒテ后

蓐中ニ就テ時々温麥酒少許ヲ服シ以テ發汗ヲ俟ツベ

シ但隔日ニ之ヲ用フヘシ發汗足ラサルキハ後服ヲ加

増スルコ十八分或ハ十五分ニ至ル尚發汗多キヲ加ヘザ

ル者ハ第五日第三ニ一錢半ヲ與フベシ○若發作前兆

ヲ見ハサズ故ニ之ヲ迎テ艾根ヲ與フルコ能ハザル者

ハ發作後直下ニ用フヘシ

○第一千百九十三方佛烈和列耶

艾根半 白糖一

右調和為散每服一茶匙日四次

○第一千百九十四方弗斯爾經蒲蘭度

艾根一 細剉井水適宜煮四分時濾取一此

右每一時半服半盞

主治右二分癩癩ニ宜シ

○第一千百九十五方護和篤

艾葉 橙葉各六錢 旃那一錢

右細剉為泡劑日服

主治婦人癩癩月經閉止セル者ニ宜シ

○第一千百九十六方穢歌蘭度

纈草野生者半錢 纈草油二滴

右調勻為散分十二服日三服

○第一千百九十七方遏傑栗尿的兒

纈草半 橙葉一錢 加耶普的油廿四滴

右調和為散等分六服蠟紙包裹每服一裹日三次

○第一千百九十八方 落蓮祿名 癩癩奇効散スベシヒキエ

ラビレプロキエム
ラゴロイ羅

續草_半 橙葉_{綠色者} 精製礪砂_{二錢} 麻俛涅失亞_二
加耶普的油_{各二}

右調和為散玻璃壘收貯每服二茶匙日二次

○第一千九十九方別連杜

續草_半 麻俛涅失亞 精製礪砂_{各廿八} 加耶普的油_{廿二滴}

右調和為散玻璃壘收貯每服一茶匙日三次

主治一千百九十六方ヨリ一千百九十九方至皆癩癩ニ宜シ

○第一千二百方 癩癩散

續草_半 菖蒲根 健質安那 柵寄生_{各細末} 精製

礪砂_半 加耶普的油_{四十滴}

右調勻為散每服大茶匙日三四次

○第一千二百一方戒歇爾度

橙葉_{細末}

右分十二裹每服一裹以橙葉泡劑一盞送下日三次

主治癩癩獨滯ニ因テ發スル症ハ唯此方ヲ用ヒテ功ヲ収ムルニ足ル者往々之アリ

○第一千二百二方邏設耶

綠橙葉_{六錢} 續草_{二錢} 井水適宜煮瀝取六弓加橙皮舍

利別一弓

右和勻每一時服一食匙

主治癩癩舞蹈病其他諸種ノ痙攣病有形ノ起因アルノ
十クノ單ニ神經系ノ觸動亢盛ニ因ル者之ニ宜シ

○第一千二百三方 甲 [速母茂兒]

攝實遏屈里斯葉 赤詳附六
ハ至半刃 薄荷油糖 ハ

右調和為散分六服早晚一服

主治癩癩ニ宜シ

○第一千二百三方 乙 [同上]

亞兒尼加花 吐根 各半
ハ 揮發鹿角鹽 白糖 各半
刃

右調和為散分六服每服一裹日二次

主治速母茂兒 名ハ 甚頑固ノ癩癩ニ攝實亞屈里斯散ト

共ニ此散ヲ互用ス但其第一服ハ千前攝實亞屈里斯散
ヲ服スルノ後二時ニ方テ之ヲ用ヒ其第二服ハ晚ニ至

テ與ヘ之ニ兼テ右膊或ハ項上ニ打膿法ヲ施セリ

○第一千二百四方 督的爾松

攝實亞屈里斯葉 ハハ至
十ハ 白糖 半
刃

右為散分八服早晚一服

主治本發癩癩 他病ノ傍發ニ
アラザルヲ 二宜シ○白糖ニ代ヘテ亞

刺毘亞薙謨ヲ用フル氏ハ更ニ適當ナリトハ第一服後

大ニ吐瀉ヲ發スト雖亦復鎮靜ス○他ノ癩癩奇藥効テ
ラザル症此方利アル者往々鮮シトセズ

○第一千二百五方

攝實亞屈里斯葉一錢至錢半 滾湯適宜浸漬濾取四勺加

過爾托舍利別一勺

右調勻每一時服一食匙

主治 上ニ同シ

○第一千二百六方福保篤

白寄生各二錢 纈草 橙葉各二錢 茴香一

右細剉為泡劑料の毎日取其一分注滾湯三盞半少頃濾

過日服盡

○第一千二百七方弗胎爾姪蒲蘭度

榭寄生半剉者 井水適宜煮四分時濾取一比

右每一時服一盞強

○第一千二百八方弗弗祿矣

榭寄生一 芍藥一 常水三比煮耗至二比投後味

纈草 鈴蘭 菩提樹花 噶里留的葉附未詳

右飽熟五密紐篤濾過加芍藥舍利別三勺和勻温服日三

四盞

主治 一千二百六方ヨリ一千二百八方至癩癩ニ宜シ

○第一千二百九方弗陽

橙葉 榭寄生各半 纈草一 亞鉛華三 礪銅五

右調和為散分八包每服一包日二三次

主治瘰癧病殊ニ癩癩。舞蹈病ニ宜シ

○第一千二百十方

青黛細末 暴爾芳香散五

右調和分十包每服一包日二次乃至四次

○第一千二百十一方

青黛極末 暴爾芳香散半

右和勻每服一茶匙日三四次

○第一千二百十二方

青黛末 暴爾芳香散半 砂糖舍利別一

右調和作煉膏分四服乃至六服日服

主治一千二百十方ヨリ一千二百十二方至別兒列印

ノ病院ニ於テ癩癩及ヒ他ノ瘰癧病ニ多ク試用スル所
リ○青黛ハ原腹内神經ノ運營轉變セルヨリ發スル所
ノ癩癩ニ尤的當ニ之ヲ用フルノ初ハ却テ其前ヨリ更
ニ數發作シ且劇甚ナルカ如シト雖發作ハ短ナリ少頃
ニノ發作ノ數ト勢ト漸々減退シ竟ニ全ク歇ム者多シ

○青黛禁忌ノ症ハ即焮衝症。腹内畜血。胃腸ノ感覺過敏
並ニ月經是ナリ

○第一千二百十三方 西突列爾

芍藥 未半刀 至一刃 亞鉛華 八ハ至 十二ハ 菲阿斯越幾斯 一ハ至 二ハ

右調勻為散分十二裹每服一裹日三次

主治疇昔芍藥ヲ以テ癩癩ノ奇藥トスレバ唯輕症ニ良
効アルノミ

○第一千二百十四方 穢歌蘭度

蔓陀羅華丁幾 一錢

右每服六滴日二次

主治癩癩ニ宜シ○癩癩獨淫ニ因テ發スル者ニ遠突土
名殊ニ蔓陀羅華ヲ稱譽セリ

○第一千二百十五方

阿魏 二錢 纈草 未各 亞鉛華 一 莨菪 未五 葛私篤儂

謨 半錢 加耶普的油 適宜

右二ハ為一丸衣桂末每服五粒日三次

主治癩癩。舞蹈病。歇乙私的里ニ宜シ

○第一千二百十六方

莨菪 未四 白糖 四

右調和為散等分八服早晚一服

主治單純神經性癩癩ニ宜シ○莨菪ノ量漸ク増進シテ
日ニ二分三分或ハ四分ニ至ルベシニ患者アリ一人十
六歳一人十九歳皆數年間劇甚ノ癩癩ニ罹リシ者余此
方ヲ用ヒテ全治セリ莨菪ノ量始毎服四分ハノ一漸ク
加増スト雖四分ハノ三乃至一分ニ過ザリシ○他ノ鎮
癩藥ヒト菲阿斯ヒト蔓陀羅華ヒト番木鱉實ヒト艾荅利斯ヒト保茸ヒト葛爾達密ヒト
布刺典私ヒト碎米薺ヒト等ハ唯癩癩知覺機ノ亢盛ヨリ發スル
者ニ的當ス然レ之ヲ服スルト多キニ過キ或ハ久キニ
過クベカラズ人或ハ阿芙蓉ヲ稱用スレト卒中ヲ起シ
易キガ故ニ廢シテ用ヒス

○第一千二百十七方職過僧設

木鱉子屑刀半 滾湯適宜浸安暖所飽熟半時瀝過取六

勺加桂舍利別六錢

右調勻每一時服一食匙

主治癩癩ニ宜シ

○第一千二百十八方同上

木鱉子刀半 滾湯適宜浸瀝取六勺加後味

橙皮越幾斯 健質亞那越幾斯錢各一 幾那丁幾錢三

桂舍利別刀半

右調勻每一時服一食匙

主治癩癩頑滯間歇熱。蟲症ニ宜シ。○木鼈子ハ强健ノ人ニ在テモ亦神經系ヲ侵ス。其シクシテ或ハ之カ為ニ癡呆ヲ致ス。アリ

○第一千二百十九方 弗那爾田蒲蘭度

番木鱉越幾斯亞兒箇爾製者ニ 默栗薩水ヲ 亞刺

昆亞護漿ヲ

右調和每一時服ニ食匙

主治癩癩及ヒ下肢麻痺症ニ宜シ

○第一千二百二十方 思爹傑滿

實百兒油ヲ 硫酸亞的兒ニ錢溶化加後味

舍電阿芙蓉液錢半

右調和每服十滴日四次

主治癩癩ニ宜シ

○第一千二百二十一方 弗可喧

實百兒油ヲ 硫酸亞的兒錢

右調和每服二十滴乃至三十滴日四次

主治癩癩。舞踏病。聖及偃。其他諸般ノ瘰癧病ニ用フ殊ニ其

症依偃篤。偃麻質斯。慢性皮疹等ノ抑遏ニ係ル者ニ宜シ

○第一千二百二十二方 祿佛思氏尼名 憐亞的兒

憐ハ 加後味溶解

硫酸亞的兒_ヲ半 薄荷丁幾_ヲ一

右調勻每一時半或二時取二十滴六十滴乃至八十滴砂糖和服

主治癩癩麻痺病黑障眼或ハ皮膚疹ニ宜シ

○第一千二百二十三方〔羅達私的印祿別耳〕

燐_ハ一 實百兒油一錢溶化加後味

纈草油_ヲ一

右調勻每服二滴或三滴日三次

主治癩癩ニ宜シ○血脈系及ヒ神經系ノ興奮機亢盛セル者ハ決ノ燐ヲ與ル_ヲ勿レ感觸遲鈍ニノ脈小緩ナル

者ニ用_フベシ若一部既ニ麻痺セル者ハ尤妙トス

○第一千二百二十四方〔邏設耳〕

龍腦_{錢半} 白糖 亞刺毘亞趨謨漿_{各一錢} 研和加後味

醋_ヲ半 接骨木花水_ヲ六 麗春花舍利別_ヲ一

右調勻每一時服一食匙強

主治癩癩精神錯亂殊ニ其症陰具ハ刺衝過度ニ係ル者

ニ佳トス

○第一千二百二十五方〔弟心隣〕

沒藥 鵝栗拔奴謨 篤尔綿黹刺越幾斯_{各一錢半} 錢粉

錢_三 纈草_ヲ一

右調和三八為一九衣石松粉每服五粒乃至十粒日二次
主治癩癩獨淫起因セル症ニ宜シ

○第一千二百二十六方蒲耳霸歌

麻篤里私百爾刺兒未詳 刺蝟石一錢 勿搗祭亞石

蝮錢二 薄荷水 苗香水各三 過兒把舍利別半

右調勻每半時服一食匙

主治癩癩及ヒ他ノ瘰癧病ニ宜シ ○弁拂名モ亦蒲耳霸

歌名ニ倣テ之ヲ用フ

○第一千二百二十七方 茱兒幾阿尼名癩癩散

芍藥三 榭寄生 象牙霜屑 野犬爪屑 鹿角屑

赤苔未詳

白苔同

麻爾瓦利苔里植物ノ名未詳各六錢

橙葉

二十枚

右調勻為散每服十公至半錢

○第一千二百二十八方拔魯腎傑兒 茱兒幾阿尼格爾列

屈篤名癩癩散

煨製麻僣涅失亞二錢半 大黃 榭寄生 橙葉各細末一錢

右調和每服一刀尖日三次

○第一千二百二十九方 毘私薛篤名舐劑

硫黃華 芍藥未 纈草未各三錢 朱砂二錢 麝香 葛私

篤倭謨各二 砂糖舍利別宜適

右為舐劑用茶匙頻々抄服

主治 繆爾施留斯名人癩癩ニ之ヲ稱賛セリ

○第一千二百三十方 阿魯突祿名暴爾名倨名癩癩散

實屈耽尼根皮采詳 山奈一可

右調勻為散每服二刀菩提樹葉泡劑和服

主治 二百年前阿魯突祿名暴爾名倨名ノ家族此方ヲ以

テ秘藥トシ癩癩ニ用ヒテ奇驗ヲ得タリ其服量ヲ増シ

テ一日四次ニ至レリ然レ此ノ如ク多服セシムルハ

方中山奈ノ量ヲ半減ニス○小兒搗搗ニ實屈耽尼ヲ稱

用セリ但之ヲ用フルハ兼テ蟻鉞灌腸瀉劑ヲ與フル

ヲ須要トセリ○孤列答地名產ノ實屈耽尼昔醫藥ニ供

ヲクタクニクレキス一名オリガニムヲ以テ伊太里亞產

ノ物ニ優レリトス撰用スヘシ

○第一千二百三十一方 沸奴年私名實屈耽尼舐劑

實屈耽尼根末半 薄荷昆設兒弗名 薄荷舍利別適

右為舐劑每一時半服一茶匙

主治 繆爾設留斯名癩癩藥トシテ之ヲ稱賛セリ私篤魯

屈名ハ單方實屈耽尼丁幾ヲ癩癩ニ賞用セリ

○第一千二百三十二方 實屈耽尼根 芍藥 榭寄生各二 蘆薈木 蜩蛄石

實屈耽尼根 芍藥 榭寄生各二 蘆薈木 蜩蛄石

末各 琥珀白色者 木炭末二

右細末調和大人服半刀乃至一刃小兒五分乃至十分日
二三次

○第一千二百三十三方 穢爾列兒名癩癩煉膏

幾那末六 攝爾扁太里亞根末二 芍藥舍利別宜

右作煉膏早晚服一錢持重三月乃至四月後當滿月及弦
月服前量三日

〔附考〕扑尔答兒名搗掣病及七癩癩二幾那ノ効アルヲ確

定セリ即癩癩回發スル者或ハ房勞過度等ノ如キ生力
衰耗ヨリ發スル者ニ好トス越耳録弗ハ之ヲ加耶普

的油ト配用シ默實鳩斯名其他古ノ大學醫皆大ニ之ヲ
稱贊セリ

○第一千二百三十四方 咩突名癩癩煉膏

幾那末一 纈草末二 橙皮舍利別宜

右作煉膏朝夕服持重三月後每月當滿月取前量連服三
日至四日

○第一千二百三十五方

〔甲方〕 謨私篤名癩癩散第一号

健質亞那 菖蒲根各半 艾根一弓 半夏各三 姜各三
蘇格爾需謨葉一 橙皮 加耶普的油糖 曹達各六

右調勻為散

主治癩癩輕症ニ宜シ大人服量一錢半ヨリ二錢至但唯月ノ變ズル時故ニ毎七日乃至八日ニ用テ用法早且葦中空心ニ服シ尋テ橙葉甘草ノ泡劑ヲ温服シテ發汗ヲ俟ツベシ

乙方 謨私篤癩癩散第二号

玫瑰花 甘草 白糖各五錢 桂皮三錢 丁子 姜 良姜 攝綿施那 益智 蘇合香 洋芹子各一錢

右調勻為散

主治癩癩劇症ニ宜シ

丙方 謨私篤癩癩散第三号

精製洋靛半 艾根半 葛カ私ム篤ト癩ム 第二号癩癩

散

右調勻為散分十二包

主治癩癩劇症ニ宜シ每常弦月及ヒ滿月ノ日朝卯牌及ヒ晚酉牌ニ方テ一包ヲ取り黑櫻實水ヲ以テ送下ス之ヲ用フルハ患者病室ヲ出ス總テ風氣ヲ釀スノ食餌甘乳汁酒精類ヲ忌ムベシ此散ヲ服スルノ前二日間必緩瀉セシムルニ宜シ○謨私篤氏ハ越列幾的兒及ヒ瓦爾華尼ヲ以テ癩癩ノ奇方ト為シ而シテ此散ヲ用ヒテ佐藥トス且此ヲ施ス左法ノ如シ患者ノ性感覺敏捷ニシ

テ且頭腦畜血アルキハ先頭上ニ放蟻シ清凉食餌緩瀉
 藥ヲ投シ次ニ越列幾的ルヲ施ス毎四分時半時乃
 至一時而ノ項窩及ヒ四肢ヨリ其火氣ヲ導引シ爾後圓
 版四十枚乃至八十枚ヲ重起セル福兒答柱瓦爾華尼ヲ
裝置ノ名ヲ
 以テ適宜ニ瓦爾華尼ヲ施シ又二三日ノ後再越列幾的
 兒ヲ行フ但漸次ニ其衝動カヲ加増シ以テ猛烈ナラシ
 込此ヲ施メ患者觸動機亢進スレバ曼陀羅子丁幾五滴
 乃至十五滴ヲ與ル一日ニ二三次頭上畜血ヲ見ハス者
 ハ再蟻鍼ヲ施シ芥子脚湯ヲ命ス此ノ如ク之ヲ持重ス
 ル七八週ヨリ十週ニ至ル○癲癇觸動機亢盛セル者ハ

謹慎ヲ加ヘテ衝動度ニ過ルヲ勿レ

○第一千二百三十六方

甘永 亞鉛華各二ハ
至三ハ 麻偃涅失亞ハ十八 白糖一錢

右調勻為散等分六晷每服一晷日二次三次乃至四次

主治小兒生齒ノ期ニ發スル癲癇様ノ症ニ宜シ

○第一千二百三十七方聯歌蘭度

麻偃涅失亞 蝟蝟石 鹿角屑 榭寄生 續草各一錢

右調和為散日服一二刀尖

主治癲癇症發作ノ時神經系ヲ鎮靜スルニ宜シ又小兒

癲癇ニ良トス

○第一千二百三十八方 福倭列爾

菲阿斯越幾斯 亞鉛華各一 麻倭涅失亞三 乳糖

刃半

右調勻為散分六服每一時半一服

主治 小兒癩癩及他ノ癩癩諸症ニ宜シ 第一千二百三十八方ヲ照スベシ

○第一千二百三十九方 遠突也

芍藥 蝟蝟石各一 亞鉛華六 白糖一

右調勻為散等分十二服每一時一服

主治 嬰兒ノ搐搦症及他ノ癩癩ニ宜シ

○第一千二百四十方 護私篤

亞鉛華二 吐根末一 艾根末一 甘草末 茴香油

糖各半

右調勻為散等分十二服每半時取半服乃至一服冷水送

下

主治 護私篤氏ニ據レバ此方嬰兒癩癩ノ發作ヲ治スル

ノ經驗方タリ

○第一千二百四十一方 趣魯渴屈

鹽酸銀一 健質安那二 至

右調勻為散等分八服日三服

主治小兒癩癩ニ宜シ

○第一千二百四十二方 格耳列優的兒

亞爾箇兒製艾根越幾斯ハ四 亞刺毘亞蘆謨ハ一 白糖

錢三 甘扁桃乳三

右調和每四分時服一茶匙

主治小兒癩癩ニ宜シ 備魯滿名姑的爾滿同烏篤辟爾同

醫攝耳篤同 等モ亦皆小兒癩癩ニ艾根ヲ稱用セリ 備魯

滿氏乳兒ニ與ルニ第一包ハ艾根半ハ半時ノ後第二包

ハ一ハ又半時ヲ經テ第三包ヲ末服トシテニハトハニ

歲以上ノ兒ハ初ヨリ半時毎ニ一ハ乃至二ハヲ服セシ

ム但病症ノ劇易ニ準シ大抵三服ニシテ分利ヲ得ルニ

足ルトハ然氏或ハ感觸亢ブリテ將ニ搗搦ヲ發セント

スル者ハ尚且一時毎ニ艾根ヲ加用セザルベカラズ

○第一千二百四十三方 遠突土

麝香ハ六 硃砂華ハ四 白糖錢三 研和加後味

加密列水半一

右調勻每半時服一茶匙臨用宜振盪

○第一千二百四十四方 福偈篤

麝香ハ二 加苗香水六錢麗春花舍利別一弓徐々

搗和再加後藥

鹿琬精 一

右調勻每一時服一茶匙

主治 幼兒ノ痙攣症ニ宜シ

舞蹈病 コレア。スチ。キ。チ。羅。シ

此症醫藥ノ扶助ヲ須タスシテ暫久不定癒ユル者往々之アリ
若自然ニ治セザル者ハ癩癩ニ處スル所ノ方法亦皆施用
スベシ然レ頗謹慎ヲ加ヘテ之ヲ療シ所謂猛藥イカヲ用
フル一早ニ失スル一勿レ醫氏最着眼スベキ者ハ原因ニ
在リ蟲症ニ起因スル者屢之アリ故ニ殺蟲劑及ヒ下劑ヲ

用フ奇藥ノ中ニ就テ亞鉛華劑 千二百四十五方至 硃銅礬

劑 千六百七十四方至 鍊劑 千二百五十五方至 消酸銀 千二百七

千八百七 綠橙葉 方千二百一十五方 續草 千九百九十六方

及ヒ艾根 千五百九十二方 至 千五百九十二方 以テ最トス或ハ諸種

ノ神經藥 千二百六十二方 至 千二百六十二方 亦佳効ヲ奏スル者アリ但

此症麻酔藥ハ廢シテ用ヒス○外用ハ屢脊椎ニ擦藥 千二百六

方十四ヲ施ス一アリ即吐酒石軟膏發疱膏等ニ宜シ濯水冷

水浸法硫黃浴ハ卓越ノ効アリ但硫黃浴ノ法每次硫酸剥

篤亞斯霸王 四弓ヲ用ヒ半時間浴スルヲ度トス每週五次

之ヲ行ヒ大抵十次乃至十二次ニシテ治ス○私室名 兒

...

ハ尋常症科レアト脊椎ニ係ル症科レアヲト區別セリ
 其脊椎ニ係レル症ハ其因項ノ第七椎腫起シテ或ハ痛ミ
 之ガ為ニ神經根壓迫セラル、ニ由テ神經ニ激衝狀ヲ發
 スルニアリトス而ノ私室イバ兒氏之ヲ療スルノ法其患フ
 ル所ノ項椎ニ蟻鍼ヲ施シ甘汞ヲ内用シ脊椎ヲ浴ヘテ水
 銀膏ヲ擦シ其他脊椎ノ兩側ニ打膿ヲ稱用シ此ニ由テ骨
 ノ腫起速ニ消散スト云フ

○第一千二百四十五方弗耶爾田蒲蘭度

亞鉛華六 菲阿斯越幾斯二 白糖一

右調和等分六服每一時一服

主治 舞蹈病其他痙攣病ニ宜シ○亞鉛華ノ量更ニ増加
 シテ可ナリ○穢歌蘭度氏ハ十六ハ至加増シ日ニ三服
 シテ偉効ヲ得タリト云フ

○第一千二百四十六方預結

鹽酸亞鉛附一 加甘海鹽精ニ錢溶解

右調勻先毎二時服五滴後十滴

主治 舞蹈病癩癩面痛ニ慎テ用フベシ

○第一千二百四十七方

青酸鏡亞鉛附四 蒸餾水ニ弓溶解

右分服四次一日盡之

○第一千二百四十八方羅仙私室爾歌爾踏私

青酸錢亞鉛附半 纈草末一 纈草越幾斯適

右調勻為丸每粒二衣桂末早晚服一九

○第一千二百四十九方福倭篤

青酸鍍亞鉛附半 麻倭涅失亞二 丁寧搗和加後藥

纈草油二滴加密列舍 纈草末十

右調勻三衣為一九麻倭涅失亞每服六九日三次漸加

踏病二宜 增
主治第一千二百四十七方ヨリ一千二百四十九方至舞

○第一千二百五十五方噎魯利阿篤損

格碌屈私末兒秩斯半刀至

右分為十二服每二時乃至三時一服

主治舞蹈病二宜シ噎爾利阿篤損此方日二半至服

セシム但之ヲ服スルノ前先瀉藥ヲ與レ常ニ之ヲ用ヒ

テ平治スト雖六週八週乃至十二週ヲ經ルノ後ニアラ

ザレハ効ヲ見スト云レ蓋舞蹈病六週乃至十二週ヲ過

グルレハ醫治ヲ須タサルモ亦癒エル者アリ

○第一千二百五十一方護私篤

開達格碌屈私末兒秩斯 芳香散各二 硫酸規尼捏

廣西方彙 卷十一 廣半堂

艾根末

右調和為散分十二服日三服

主治一少女舞蹈病ヲ患フル七年此ヲ與ヘテ佳効ヲ得タリ之ニ兼テ浴湯ニ硫酸ヲ加ヘテ浴セシムルニ宜シ

○第一千二百五十二方

橙葉 大黃錢各一 纈草 純精酒石錢各三

右調和內私葛肘刺名器晨夕服半茶匙強

主治舞蹈病癲癩及ヒ他ノ神經病ニ宜シ

○第一千二百五十三方弗栗私

艾根末

右隔晚取一茶匙強温麥酒和服

主治十九歳ニシテ舞蹈病ヲ患フル者此ヲ與ヘテ良効ヲ奏セリ

○第一千二百五十四方欲燼僞

遏屈答刺設謨沙根末一附

右每服一茶匙日三次

主治舞蹈病ニ宜シ

○第一千二百五十五方密葛栗思

葛爾達密布刺典私花碎米薺ノ一種末一刀至一錢

白糖刀一

右調勻為散分八服早晚一服

○第一千二百五十六方

葛爾達密布刺典前出私花半出

滾湯適宜浸漬瀝過取

ハ弓加後藥

橙皮舍利別弓半

右調勻每一時服二食匙

〔主治〕右二方千二百五十五方舞蹈病及ヒ他ノ痙攣病ニ

宜シ此方ハ達列名始テ鎮痙方トシ稱譽セシ所ニシテ

殊ニ拔結耳名ハ歇倚私的里性ノ痙攣症ニ稱用セリ一

少年十四歳ニシテ舞蹈病ニ罹ル者密葛栗名私名之ヲ用

フル一三時毎ニ一錢ニ至リ六週ヲ出ズシテ治セリト

云フ○葛爾達密布刺典私ハ特ニ發汗ノ効アリ尚且恐

ラクハ殺蟲ノ能アラン○今世之ヲ棄テ用ヒズ恐ラク

ハ穩當ナラジ

○第一千二百五十七方弗爾田蒲蘭度

葡萄酒葉 亞兒尼加花各二 滾湯適宜浸漬四分時

瀝取一比加白糖二弓

右調勻每一時服半小盞

〔主治〕虛性舞蹈病ニ宜シ

○第一千二百五十八方護私篤

遠西本草 卷一 舞蹈病 三十三 廣 膠 堂

旃那 一錢至三錢

橙葉

續草

葡萄草葉

各半

右細剉分三裹每日取少許泡出用

主治 舞蹈病ニ宜シ ○三女子アリ一八十歳一八十四歳一ハ二十六歳其性皆感覺敏捷二三月來舞蹈病ニ罹リ猛烈ノ鎮痙劑及ヒ強壯劑ヲ投シテ寸効ナシ 謨私篤氏之ニ命ノ餐食ヲ減少セシメ八日毎ニ吐根吐酒石ノ吐方ヲ與ヘ上ノ泡劑ヲ用ヒテ微瀉セシメ以テ暫時ニ全功ヲ收メリト云フ

○第一千二百五十九方 〔摺〕

阿魏 五刀

番木鱉越幾斯 一刀

右調勻為丸每粒一ハ衣石松粉早晚服五丸乃至六丸
主治 舞蹈病頑滯セル症及ヒ諸般ノ神經病其因脊髓ニ在ル者之ニ宜シ

○第一千二百六十方 〔羣的爾〕

阿魏

續草越幾斯 各二錢

苕芎越幾斯 六ハ

亞鉛華 一

葛私篤 カス トレ ヲ ヲ

樓謨 レ ヲ ヲ

右調勻為丸每粒二ハ衣石松粉每服五丸日三次

主治 頑固舞蹈病ニ宜シ

○第一千二百六十一方 〔拔魯寺庚〕

龍腦

麝香 各四ハ

白糖 一

遠西本草 卷一 三十三 廣 膠 堂

右調勻為散分四包每二時半服一包

主治 拔魯寺戾氏每常舞蹈病ニ之ヲ用ヒテ偉効ヲ得タリ但晚ニ方リテ阿魏ト阿芙蓉ヲ配伍ノ灌腸セリト云

○第一千二百六十二方 栗屈的兒

實百兒油錢一 忽弗滿液三錢溶化

右玻璃壘收貯黑紙被覆每服二十滴乃至三十滴日四次

主治 瘧病殊テ舞蹈病。癩癩及ヒ聖及僣ニ宜シ

○第一千二百六十三方 佛列池篤

吐酒石六 菩提樹花浸液六勺溶解加後味

實亞格地温半一

右調和每一時服一食匙

主治 同上

○第一千二百六十四方 羅仙私的印 佛列私珍

丁子油 肉豆蔻板尔撒謨附各錢 杜松子精四

右調勻供擦藥

主治 舞蹈病ハ脊椎ヲ浴ヘテ之ヲ擦シ下利ハ肚腹ニ塗ルベシ

聖及僣シカタルシ スンブシア蘭 羅

此症モ亦舞蹈病ト同ク 其治期限 醫治ヲ須タズノ瘥ル者

間之アリ故ニ多般ノ方法ヲ費ヤシテ徒ニ患者ヲ勞シ害
 ヲ招ク_一勿レ唯緩性神經藥ヲ施スベシ治法先病原ヲ探
 索シテ之ヲ防止シ既ニ之ヲ除クモ其症猶荏苒退カザル
 片ハ神經ノ運營ヲ變革セシムルヲ治療ノ第二義トス續
 草阿魏小量吐根トイソクローイト葡萄草麝香亞鉛華銹劑等約ノ之ヲ言ヘ
 バ癲癩舞蹈病ノ條ニ列載セル方法悉皆此症ニ相當_ハ聖
 及偃ハ唯歇倚私的里ノ傍証タル_一往々之アリ此症治法
 歇倚私的里ト一般外用法ハ越列幾的爾及ヒ麻偃涅篤良
 効アリ然_レ氏先微温浴湯ヲ施シ其後浴水法殊ニ海水浴ヲ
 行_フヲ最稱賛ス

○第一千二百六十五方叔密篤滿

亞鉛華 麝香各ニ 銹粉六 桂皮半 續草一

右調和為散分八服每一時半一服

主治聖及偃ニ宜シ一少女聖及偃ニ罹リ日ニ四發乃至
 六發セル者叔密篤滿氏此方ヲ與ヘテ治セリ

