

遠西方彙

十三

○卷之十三
喘

○癭攣喘

○粘液喘

○密兒刺爾喘

○骨布喘

百日欬

十武

237

13

明武
號 237
卷 13

伊東瑤川院譯

五帙

遠西方彙

原本紀元一
千八百五十
二年鏤行

廣胖堂藏



遠西方彙卷之十三

獨乙 加幾安頓



和蘭 傑斐婆都 譯

侍醫法眼貫齋伊東 貞文仲 重譯

南洋伊東 健夫 參校

喘 アストマ
ストカラ
ンブ蘭

此症其原因ニ從フテ諸種アリ故ニ其因ヲ蹤跡シテ相當ノ治ヲ下スベシ其最重症トスル所ノ者ハ痙攣喘粘液喘是ナリ痙攣喘ハ呼吸器ノ痙攣ニ因テ發シ粘液喘ハ肺中

遠西方彙 卷之十三 廣胖堂

粘液太過ニ因テ生ス○小兒ニ在テハ密兒刺爾喘骨布喘
 二種アリ此二症實ニ其本性ヲ異ニスルヤ否未之ヲ發明
 セズ之ヲ要スルニ畢竟皆破裂軟骨ノ攣急ニ因テ来ルナ
 リ○凡喘息發作ノ時ハ專醫治ヲ要スルヲ勿レ衣服狹窄
 ノ者ハ之ヲ寬解シ病者ヲ坐セシメ牖戸ヲ開キ清涼新氣ヲ引クヲ
 故トスル胸部及ヒ足心ニ芥子泥ヲ貼シ或ハ兩足ヲ蒸濕
 シ病人強實多血ナラハ放血スヘシ猛烈哥喜一小盞ヲ取
 リ或ハ其症ニ準メ之ニ阿芙蓉丁幾二三滴ヲ加レハ諸藥
 ニ勝リテ効ヲ奏スル者間之アリ○又此症ヲ寬解スルニ
 祿別利丁幾二十滴乃至二十五滴ヲ用ヒテ殊効アリト云

フ○根治法ハ疾患間歇ノ時ニ方リテ之ヲ施スベシ蓋瘰
 癭喘ハ鎮瘰劑千三百十九方至千三百卅六方ヲ用ヒ粘液喘ハ專痰ヲ豁
 利スルヲ以テ要トス千三百卅九方至千三百六十四方腹内壅塞ヲ生スル
 者屢之アリ善ク之ヲ解散セシメ尚且發疱打膿法等ノ如
 キ猛烈反對刺衝法ヲ施メ胸中ノ分利ヲ促シ之ヲ持久ス
 ルヲ最要トス○密兒刺爾喘ハ密兒刺爾氏阿魏内服千三百六十五方
 百六十七方灌腸俱ニ稱用セリ千三百七十七方患屈滿名ハ麝香
 ヲ好トス○骨布喘ノ治法衆說未一定セズ熱ヲ帶フル者
 ハ頸圍ニ放蟻シ甘汞ヲ與ヘテ的當スル者多シ鎮瘰藥ハ
 殊ニ亞鉛劑千三百七十四方及ヒ麝香ヲ佳トス又硫酸規

遠西方彙 卷十三 廣肺堂

尼捏殊ニ之ヲ鎮痙劑ニ配スル者千三百七十六方至千三百七十八方衆醫稱賛スル所ナリ此症起因病者ノ稟賦ニ在ル者屢之アリ此素因ヲ治スルハ療痙藥ノ中ニ就テ最沃胃謨劑及ヒ肝油ヲ良トス

第一痙攣喘アストマスバ

○第一千三百十九方別連杜

祿別利丁幾附ニ錢

右喘息發作中毎二十密扭篤乃至三十密扭篤十滴沙糖和服

主治痙攣喘ニ偉効アリト稱ス又肺心若クハ肝ノ器質

病ニ係ル者之ヲ用ヒテ其症大ニ寛解ス越魯涅屈名此

効能ヲ確定セリ○噎利阿篤損名人及ヒ失倔門突同等ハ

間歇ノ間モ亦一時毎ニ三十滴乃至四十滴ヲ服セシム

○第一千三百二十方拏傑兒

阿魏丁幾半

右每一時服二十滴

主治假証痙攣喘ニ宜シ

○第一千三百二十一方

顯草丁幾半

右每服二十滴沙糖和服日二次

主治痙攣喘ニ宜シ其發作ヲ緩和シ又間歇ノ間ニ與ヘテ根治ノ効アリ

○第一千三百二十二方 佛蘭葛魯突

堽爾比尼謨昆速利達丁幾 附半ヲ

右每服二十滴乃至三十滴日三次

主治痙攣喘ニ宜シ

○第一千三百二十三方

吐根 赤十ニハ 白糖 錢二

右調勻為散等分十二服每一時乃至一時半一服

主治同上○小量吐酒石或ハ安質沒尼酒モ亦吐根ニ代

用スヘシ

○第一千三百二十四方 吐篤

刺屈黜私非祿沙越幾斯 十六附 桂水三錢溶化

右調勻早晚服二十滴乃至三十滴

○第一千三百二十五方 同上

歇爾蘭獨留謨子 錢三 綿答幾里私布 加密列 各半

橙葉 錢六

右細剉取二食匙強滾湯四小盞泡出

主治右二方痙攣喘ニ宜シ

○第一千三百二十六方 叔拔爾託

硃砂加過泥子精

安質沒尼酒各一錢半

過爾托煎五

阿芙蓉舍利別一

右調勻每一時服一食匙

主治癩癰喘。窒息。聖京。風氣鬱畜。鼓脹等。宜シ

○第一千三百二十七方颯爾版私

金硫黃四 菲阿斯越幾斯十二

刺蝟石半

白糖二錢

右調勻為散每一時服一茶匙

主治癩癰喘。宜シ。○颯爾版私名百方不効ノ症此散ヲ

用ヒテ根治セリト云フ

○第一千三百二十八方蒲列刺

昆侖訥尼葛答兒百附三錢至半

井水適宜煮濾取八加

屋施蔑兒半一

右調勻每一時服一匙

主治癩癰喘奇方ト稱ス

○第一千三百二十九方 福烏列爾名煙草浸

烟草葉劉一錢

滾湯二浸漬二十密扭三薦一濾過加亞爾

筒兒二

右調勻每服三十滴乃至八十滴茶或裸燕麦汁和服日二

三次

主治喘息及ヒ胸水ニ宜シ又骨布名ハ小便淋瀝ニ稱用

ス

○第一千三百三十方 過。佛。栗。屈。的。魁

海葱越幾斯 雙鸞菊越幾斯 各六 揮發鹿角鹽 十五

葛私篤僕謨 錢半 阿魏 錢半

右調和二為一九衣石松粉每服十九日三次

主治瘧疾喘ニ宜シ

○第一千三百三十一方 歌。愷

改制硫酸蘆薈越幾斯 未詳 吐根 未半 薄荷油 五

右調勻為三十九衣伊里私弗祿連底那末晨夕服一九

主治喘息ニ宜シ

○第一千三百三十二方 咄。篤

著草越幾斯 錢半 律比九料 錢一 阿魏 錢半 亞鉛華 五十

右調和為丸每粒二公衣石松粉每服五丸乃至八九日三次

○第一千三百三十三方 同上

阿魏 錢半 民埤列里精 一 溶解加後味

苗香水 五 硝砂加過泥子精 錢二 過爾抱舍利別 一

右調勻每一時乃至一時半服一食匙

主治右二方假証瘧疾喘ニ宜シ

○第一千三百三十四方 乙德

曼陀羅葉ハニ 白糖ハ

右合勻為散等分八服朝夕一服

主治喘息諸証殊ニ其症時ヲ刻メ發シ心臟ニ關係スル者之ニ宜シ

○第一千三百三十五方 穢歌蘭度

葛私篤倭謨丁幾 忽弗滿液各一 薄荷油ハ 舍電

阿芙蓉液ハ

右調勻每二時服四十滴

主治喘息腸胃風氣鬱畜ニ因テ來ル者ニ宜シ

○第一千三百三十六方 咄篤

葛私篤倭謨丁幾 鹿角精 忽弗滿液各二

右調和每四分時服二十五滴乃至三十滴

主治歇倚私的里性喘息發作中用之歇倚私的里條下ヲ照スベシ

○第一千三百三十七方 母私篤刺爾

複方大黃越幾斯附 勿搦奈亞石鹼各一 菲阿私越

幾斯半

右調和二ハ為一丸衣石松粉每朝服五丸

主治夜發喘ニ通常兼發スル所ノ腹内壅塞ニ宜シ私篤

刺爾氏稀淡加密列泡劑ヲ熱服スルヲ奇方ト稱ス之ヲ

飲服スレハ腹中雷鳴シ噯氣及ヒ放屁シテ發作速ニ退
クナリ

○第一千三百三十八方攝列魯

撒爾非亞葉半 迷迭香葉錢 茉沃刺那葉錢 注井

水ハ弓蓋閉微温浸漬濾過加後呆

麻爾羅歇越幾斯半 蒲公英越幾斯錢 蜜去泡沫

右調勻每一時服一食匙

主治羅惆名地ノ地方一種ノ喘息流行ス攝列魯氏其由

ヲ探索スルニ土地ノ湿濡食物ノ性及ヒ木綿製造局ノ
作業ノ致ス所ニ係ルナリ此症上方ヲ用フルニ宜シ又

攝列魯氏ハ阿列蘊及ヒモスベシ一ノ果實泡劑ヲ兼服

セシム

第二粘液喘アストマ

○第一千三百三十九方鋤蘊私丁

接骨木花一 滾湯適宜浸漬濾取ニ弓冷定加後藥

海葱蜜 屋施茂兒各一 吐酒石一

右調勻每一時服一食匙

主治輕証肺焮衝並ニ粘液喘ニ用ヒテ痰ヲ豁利スルニ

宜シ

○第一千三百四十方弗瓜隣

麴謨安沒尼亞幾錢二 土木香越幾斯 甘草越幾斯

硫黃華錢各一 伊里斯弗祿連底那根錢末半

右調勻二八為一九甘草末為衣每服八九乃至十二九日
一二次

主治喘症肺臟弛弱ニ因ル者之ニ宜シ

○第一千三百四十一方捕綸涅爾

麴謨安沒尼亞幾 阿魏錢各一 加雞子黃二箇合和更

加過爾托舍利別半弓

右調勻每一時服一食匙臨用宜振盪

主治粘液喘ニ宜シ

○第一千三百四十二方室里列魯

土木香越幾斯錢半 地榆丁幾 甘草丁幾錢各一 和胸

丁香錢附二 苗香水弓三 實亞格地温弓半

右調勻每一時服一食匙

主治粘液質ノ人喘息ニ罹ル者之ニ宜シ

○第一千三百四十三方佛落屈結德

結刺薦尼子粗弓 井水一比半煮濾取一比

右一日服盡

主治喘息欬嗽百日效ニ宜シ

○第一千三百四十四方 設兒名和胸解凝舍利別

廣胖堂

蘊謨安沒尼亞幾錢 硃砂各一 海葱蜜各半 安質沒尼

酒錢一 過爾托舍利別各四

右調勻食匙抄頻服

〔主治〕久欬粘液喘等二宜シ

○第一千三百四十五方〔歌〕 歌蘭度

海葱錢末半 勿擲祭亞石 驗錢一 蘊謨安沒尼亞幾鼠

婦末各 拔爾撒謨骨拜霍 宜適

右二八為一丸衣桂末朝夕服二丸乃至四丸

〔主治〕喘息水腫腎膀胱ノ疾患二宜シ

○第一千三百四十六方〔同上〕

蘊謨安沒尼亞幾錢二 亞刺昆亞蘊 蘊謨漿宜適 加苗香水

六弓作乳劑加後味

硃砂加過泥子精錢半 海葱蜜 甘草舍利別各一

右調勻每半時服一食匙

〔主治〕喘息粘痰膠凝其シク豁利シ難キ者之二宜シ

○第一千三百四十七方〔同上〕

阿魏 蘊謨安沒尼亞幾 勿擲祭亞石 驗 蒲公英越

幾斯錢各二 金硫黃刀一

右調勻二丸為一丸衣石松粉早且午後及晡時服十九

○第一千三百四十八方〔同上〕

廣胖堂

護謨安沒尼亞幾 亞兒尼加越幾斯 遠志越幾斯

土木香越幾斯錢各二 海葱末 金硫黃各一

右調勻二公為一九衣石松粉每服八九乃至十九日三次

○第一千三百四十九方同上

土木香越幾斯錢二 硃砂加過泥子精一錢半 苗香水二

右合和每一時服八十滴

主治一千三百四十七方ヨリ一千三百四十九方至粘液

喘ニ宜シ

○第一千三百五十方同上

和胸劑料二 葡萄草葉 麻爾羅歇葉各半

右細劉供泡劑料

○第一千三百五十一方 炮百暴劉私名人和胸越栗失爾

土木香 伊里斯弗魯連底那根 海葱各一 安息香

沒藥 過泥子 甘草膏 精製護謨安沒尼亞幾各半

雜腹蘭錢三

右調勻加再留燒酒一比如法作越栗失爾每服六十滴乃

至八十滴日數次

主治右二方千三百五十一方 喘息粘液分泌多ナル者

之ヲ用ヒテ稍肺ヲ强壮スルノ効アリ

○第一千三百五十二方 穢歇蘭度蔣蘿葡萄酒

蔣蘿蔔屑五 麥酒二 蓋閉冷浸十二時加後味

沙糖舍利別一

右調勻小盞抄服頻々十二時或二十四時間服盡

主治小便閉水腫尿道粘液鬱積及粘液喘二宜シ〇刺ラ

胃チ私ハ名人ハ壞血病ニ之ヲ用ヒテ佳効ヲ得タリ

〇第一千三百五十三方〔過傑栗屈的兒〕

沒藥水製越幾斯 麻爾羅歌越幾斯 精製蘆謨安沒

尼亞幾錢各二 金硫黃錢一 精製甘草膏錢三

右調勻一匁為二九衣石松粉每服四粒乃至六粒日三次至四次

〇第一千三百五十四方〔同上〕

阿魏 瓦爾拔奴謨 沒藥水製越幾斯各二 撒爾末

兒秩斯錢一 橙皮丁幾宜適

右二匁為二九衣石松粉每服十二粒乃至十五粒日二次至三次

〇第一千三百五十五方〔同上〕

海葱末 葛私加栗刺越幾斯各二 金硫黃 揮發鹿

角鹽錢各半 過泥子油滴六 甘草膏宜適

右二匁為二九衣石松粉早晚服八丸

主治一千三百五十三方ヨリ一千三百五十五方至皆老

年虛弱家ノ粘液喘ニ宜シ

○第一千三百五十六方弗陽

瓦爾拔奴謨錢二 海葱醋二 弓溶解加後味

苗香水弓二 民埕列里精錢二 甘消石精錢一 遏兒托舍

利別弓半

右調和每服一食匙日四次

主治 喘息湿氣ニ起因セル者殊ニ老年弛弱惡液質ノ婦人此症ニ罹ル者之ニ宜シ

○第一千三百五十七方遏兒托舍

琥珀鹽カ一 民埕列里精弓二 薄荷水 沙蘿蔔水各三

白糖弓半

右調勻每一時服二食匙

○第一千三百五十八方同上

蓮謨安沒尼亞幾錢一 海葱蜜一弓溶和加後味

洋芹水弓三

右調勻每一時服二食匙

○第一千三百五十九方同上

精製消石 鼠婦末 杜松子末各一錢 海葱末九

右調勻為散等分九服早旦午後及日晡一服

主治 右三方一千三百五十七方至一千三百五十九方 老年弛弱ノ人小便不

利症ニ兼テ水腫及ヒ喘息交發スル者西謂喘息係小便不利症之宜シ

○第一千三百六十方 〔蜜里列魯〕

土木香越幾斯錢半 地榆丁幾 甘草丁幾各一錢 越堙
里和胸丁幾附二錢 苗香水三錢 實亞格地温半錢

右調勻每一時服一食匙

主治 粘液喘ニ宜シ ○越堙里和胸丁幾ハ土木香伊里斯弗魯連底那海葱甘草赤珊答里木過泥子沒藥安息香安沒尼亞雜腹蘭右再餹燒酒ニ浸漬ル者此劑肺臟粘液鬱積症粘液喘等ノ如キ慢性胸疾ニ四十五滴乃至六十滴

ヲ服スル一日ニ二次或ハ之ヲ他ノ密幾私丟爾ニ加ヘ用フ然レ唯粘液質ノ人ニ適當スルノミ

○第一千三百六十一方 〔別連杜〕

蘄謨安沒尼亞幾錢二 雞子黃適宜 苗香水五錢 硃砂加過泥子精三錢 安質沒尼亞二錢 拔爾撒謨亭露舍利別

子一

右調勻每一時服一食匙

主治 粘液喘肺臟衰弱シテ咯痰シ難キ症窒息聖京偃ニ用フ

○第一千三百六十二方 〔藏過漸謨〕

白芷半 滾湯適宜浸漬飽熟八分時濾過取八分加後

味

幾那越幾斯錢二 海葱越幾斯刀一 硃砂加過泥子精錢一

右調勻每二時服一食匙

主治粘液勞及七粘液喘二宜シ

○第一千三百六十三方咄篤

蘼謨安沒尼亞幾 硃砂各一 金硫黃錢四 加後味搗

和

亞刺昆亞蘼謨 甘草膏各一 茴香水八 麗春花舍

利別一 非阿私越幾斯錢四

右調和每半時服一食匙

○第一千三百六十四方同上

金硫黃錢八 亞刺昆亞蘼謨錢二 加後味搗爛

默栗薩水 海葱蜜各半 甘草舍利別一

右調勻早晚服半食匙

主治第一千三百六十三方ヨリ一千三百六十四方至粘

液喘二宜シ

第三密兒刺爾喘ラストマ

○第一千三百六十五方密兒刺爾

阿魏錢二 民埵列利精一 弓溶解加後味

綿答幾里私布水三 雜腹蘭舍利別半

右調勻每半時或一時服一茶匙若一食匙

主治密兒刺爾喘二宜シ但阿魏灌腸ヲ兼用スベシ百十七

○第一千三百六十六方 穢歇蘭度催吐舐劑

吐酒石一 蒸餾水一勺溶解加後藥

海葱蜜 沙糖舍利別各半 吐根末一

右調勻每八分時與一茶匙以至得吐

主治多般ノ肺疾。腦病。義膜咽喉焮衝。密兒刺爾喘。百日效。等之二宜シ是管二胃中ヲ掃除スルノミナラズ又鎮瘧

ノ効ヲ呈シ能ク胃腦肺ノ異常交感ヲ治ス

○第一千三百六十七方 穢歇蘭度

阿魏錢二 民埵列利精錢三 亞刺毘亞趨謨漿適 加默

栗薩水三勺作乳劑再加扁桃乳舍利別一勺

右調勻每半時服一小食匙

主治初催吐舐劑千三百六十六方ヲ與ヘ後此乳劑ヲ用ヒ阿魏

灌腸千三百六十七方 大量麝香。胸上肚腹及ヒ脊椎等ニ鎮瘧藥

ヲ塗擦シ又胸上ニ芥子泥。發疱膏ヲ貼スベシ

○第一千三百六十八方 薦優爾肝西兒

上好麝香三 鹿琥精一 苗香水半 過兒拖舍利別

藥部 卷十三 黃半

右調勻每二時服一茶匙

主治密兒刺爾喘ニ宜シ

○第一千三百六十九方〔遠突五〕

續草錢三 滾湯適宜泡出瀝取四弓冷定加後味

麝香ハ 鹿角精ニ 橙花舍利別弓半

右調勻每四分時服二茶匙臨用宜振盪

主治同上阿魏灌腸ヲ兼用スベシ

○第一千三百七十方〔帶鑑典利篤〕

安息香花ハ 硃砂加過ア泥子精半 安質没尼酒錢二

海葱蜜 遠志舍利別 渴兒ル托舍利別各三錢

右調勻每半時服一茶匙

主治密兒刺爾喘神經ノ運營沈衰シ窒息ノ懼アル者之

ニ宜シ麝香二三ハ乃至四五ハ上方ト更換ノ半時毎ニ

用フベシ兼テ香竄藥湯ニ浴シ胸上芥子泥及ヒ發疱膏

ヲ貼スベシ

○第一千三百七十一方〔謨私篤〕

甲方

王幾那錢三 井水六弓煮將熟投續草半弓絞瀝取三弓

半加後藥

遠西方藥 卷三十一 廣 肺 堂

硫酸規尼捏ハ 葛私篤カ 樓謨丁カ 幾カ 橙花舍利別カ

右調勻每半時服一食匙
主治密兒刺爾喘間歇ノ間之ヲ用ヒテ後發ヲ防止スベシ

○第一千三百七十一方同上

(乙方)

葶苈葉ハ 番木鱉越幾斯ハ 白糖ハ

右調勻為散等分八裏朝夕服二裏

主治同上此方幾那煎ハ 更換シ用フ

○第一千三百七十二方篤優爾肘垂兒

阿魏ハ 雞子黃ハ

右加纈草浸四ハ 徐々搗爛作乳劑二分供灌腸

主治百日欬密兒刺爾喘二宜シ並ニ阿魏ヲ内服セシム

千四百方 千四百一方

○第一千三百七十三方葛私百兒

芫菁丁幾ハ 複方白芷精ハ 龍腦精ハ 礪砂加石

灰精ハ 香水ハ

右調勻塗擦胸上及脊椎

主治密兒刺爾喘ニ宜シ

第四骨布喘ハ ストマチミキムハ 羅

遠西方藥 卷三十一 廣 肺 堂

○第一千三百七十四方 發健私的結魯

清酸鐵亞鉛附 甘汞各半 實芟答利斯末三分 白糖

右調勻為散分十二服日三服

主治 發健私的結魯名之ヲ骨布喘ノ奇方ト稱ス暗別兒

偃名地ノ患篤滿名及ヒ他醫モ亦此効ヲ確徵セリ半歲乃

至一歲兒ノ用ニ供ス

○第一千三百七十五方 患篤滿

亞鉛華 甘汞各一 實芟答利斯末八分 白糖半

右調勻為散分八服每一時一服

主治 三箇月ノ兒骨布喘ニ罹ル者ヲ治ス先耳後放蟻三

頭灌腸法及ヒ胸上脊椎ニ芥子泥ヲ貼スベシ

○第一千三百七十六方 同上

硫酸規尼捏三 茴香水一 橙皮舍利別一

右調勻每一時服一茶匙

主治 骨布喘ニ用ヒテ發作ヲ預防スルニ宜シ

○第一千三百七十七方 同上

硫酸規尼捏六 莨菪根末二 白糖錢一

右調勻為散等分六服日三服

主治 骨布喘發作ヲ防止スルニ宜シ患篤滿名上方ニ兼

テ腰椎ノ上頭按シテ痛アルノ部ニ蜈蚣四條ヲ施シ蜈
口癒ユルノ后的列並油ヲ温メテ朝夕之ヲ塗擦シ皮表
赤色ヲ發スルニ至ル

○第一千三百七十八方過私繆斯

硫酸規尺握ハ

亞鉛華ハ十六

白糖ハ四

右調勻為散等分ハ裏每服一裏日四次

主治ハ箇月ノ兒骨布喘ニ罹リテ百方効ナキ者過私繆

斯ハ此散方ヲ處セリ之ヲ服ノ其發作確著ニ減シニ服

ニメ全ク止ミ羸瘦骨立セル患兒一千八百四十二年五

月十八日ヨリ七月十七日至法ノ如ク之ヲ服ノ驚クベ

キノ大量ニ至リ規尺握ハ百九十九ハ亞鉛華四百四十ハ
ヲ盡スト雖之ガ為ニ些ノ害モ亦見ルハナク終ニ平愈
セリト云フ

百日効ハ羅キンキアスト蘭

百日効ハ實ニ小兒ノ固有病タリト雖大人モ亦甚之ニ類

似セル劇証痙攣効ニ罹ル者屢之アリ亦鎮痙解釋劑ハ百七

十九方至十ヲ要ス○小兒真ノ百日効第一期ニ在テハ炊

衝性ヲ帶ハル者アリ宜ク胸上ニ放蟻シ内服ハ清涼劑即

消石。硝砂。小量甘汞。等ヲ與フベシ然レ腸胃瘵物ヲ帶ヒテ

聖京強性ノ者多シ此症解釋劑ハ千三百九十一方至ハ用ヒ

兼テ和胸舍利別及ヒ吐劑千三百六ヲ更換シ施スヲ須要
 トス○第二期瘧疾ノニ及ビテハ鎮瘧藥ニ宜シ即苦扁桃
 水千三百九 靑酸千三百九 阿魏千三百九 哥攝千三百九 刺屈千三百九 刺屈千三百九 刺屈千三百九
 千四百百二 麝香千四百 失鳩千四百 菲阿千四百 刺屈千四百 刺屈千四百 刺屈千四百
 祿沙千四百 阿芙蓉千四百 列儒千四百 留私千四百 烈比千四百 煙草千四百 煙草千四百 煙草千四百
 廿二方 阿芙蓉千四百 列儒千四百 留私千四百 烈比千四百 煙草千四百 煙草千四百 煙草千四百
 百廿九方 列儒千四百 留私千四百 烈比千四百 煙草千四百 煙草千四百 煙草千四百
 至千四百方 等是ナリ然レ麻醉藥ヲ以テ效ヲ制スルヲ得
 ル者甚罕ナルガ故ニ過用スルヲ勿レ大量ニ之ヲ用ヒテ
 著シク害ヲ致ス者少シトゼハ輓近丹寧千四百 及ヒ結晶

硝酸銀ヲ稱賛ス或ハ硝酸銀ノ効少シト云フ者アリト雖
 他病ニ用ヒテ亦駭クベキノ効ヲ奏スルヲアリ又輓近鹽
 酸千四百 廢棄スト雖其功用亦最大ナリ蓋此症施治極
 メテ簡易法ニ從事スルヲ好トスルヲ猶他病ニ於ケルカ
 如シ緩性和胸舍利別ニ安質沒尼酒ヲ和用シ又吐藥ヲ互
 用スルハ世間ニ通稱スル所ノ諸種ノ奇方ニ優リテ多ク
 驗アリ世間稱賛スル所ノ吐酒石膏ハ利益ナキノミナラ
 ス却テ小恙之力為ニ大患ニ變シ或ハ斃ルニ至ル者モ
 亦間之アリ但穢歌蘭度書載スル所ノ緩性吐酒石膏千四百
 方十一或ハ骨布軟膏ニ白降汞ヲ加フカ如キハ六百卅 適宜

卷之三
 廣津堂

遠西方藥 卷三十一 廣濟堂

ノ及對刺衝法トス○第三期ニ至リ患兒大ニ虛憊セル者
ハ遠志千四百四十一方及ヒ芫菁ヲモ亦用フヘシ千四百四十三方
方至千四百而ノ仍効歎獨衰弱ノ為ニ荏苒除カサル者ハ
幾那或ハ規尼捏千四百四十八方及ヒ依蘭苔千四百四十九方
鎮痙劑ヲ配用シテ功ヲ收ムベシ

○第一千三百七十九方 收失結名和胸丁幾

甘扁桃油新絞 扁桃乳舍利別錢各七 亞刺毘亞護

錢二 櫻實水半

右調勻為舐劑茶匙抄服

主治 聖京偃効痙攣効ニ宜シ

○第一千三百八十方 刺野松

金硫黃三 阿芙蓉越幾斯二 白糖錢二

右調勻為散等分六裏朝夕服一裏

主治 大人痙攣効粘痰ヲ咯出スル者焮衝狀既ニ退クノ

后之ヲ用フヘシ

○第一千三百八十一方 同上

過兒托根 點失刺蘊葉各半 井水八ヲ煮耗至六ヲ

投菲阿私葉一錢蓋閉飽熟四分時濾過冷定加後味

阿芙蓉舍利別一

右調和服一二食匙宜從其症消息

遠西方藥 卷三十一 廣濟堂

遠西藥方彙編 卷三十一 百九日 廣濟堂

○第一千三百八十二方阿山

蜀羊泉莖越幾斯二刀至 精製礪砂二錢 精製甘草越

幾斯三錢 井水七

右調和每半時服二食匙強

○第一千三百八十三方頭寧假松

吐根未半 大黃未一 勿擲祭亞石鹼 葛爾儒別越

幾斯各二錢

右調和二刀為二九每二時半服五粒

○第一千三百八十四方

非阿私越幾斯一 吐根半 白糖半

右調勻為散分八服每二時一服

主治第一千三百八十二方ヨリ一千三百八十四方至大

人瘞寧效二宜

○第一千三百八十五方福假篤

非阿私越幾斯二 乳糖六錢 甘草半 亞刺昆亞越

謨二錢 茴香油糖三錢

右調和為散每服一茶匙以過尔托煎送下日三次乃至四

次

○第一千三百八十六方歌權

遠西藥方 卷十三 二十四 廣 伴 堂

阿芙蓉八末二 實芟答利斯末 吐根末各五 菲阿私越

幾斯錢半

右調和加亞刺昆亞護謨漿少許為丸三十粒衣石松粉玻璃壘收貯每一時半服一粒

○第一千三百八十七方骨布 大人瘧瘵效二宜シ

阿魏錢三 萬苴越幾斯二刀半

右為八十九衣石松粉每一時服二三九

○第一千三百八十八方遠突七

老利兒結爾斯水半 蒸餾水一 白糖半

右調和每一時乃至一時半服一茶匙

主治右二方千三百八十七方 上二同シ

○第一千三百八十九方弗肝爾田蒲蘭度

萬苴越幾斯刀一 亞刺昆亞護謨漿宜適 丁寧搗和加後

件

井水六 覆盆子舍利別半

右調勻每一時服二食匙

主治瘧瘵效不眠歇倚私的利二宜シ

○第一千三百九十方 叔泥姪爾名 鎮瘧丸

阿魏 纈草末各二錢 亞鉛華刀一 葛私篤僕謨二 莨菪

遠西藥方 卷十三 二十四 廣 伴 堂

越幾斯五 加密列越幾斯通

右二八為一九每服五丸乃至八九日三次

主治大人百日效及ヒ他ノ瘰癧病ニ宜シ

○第一千三百九十一方藏歌蘭度

孕驗酒石錢一 苗香水弓半 滿那舍利別弓一 海葱蜜錢二

安質沒尼酒滴二十 非阿私越幾斯八二

右調和為祇劑每二時服一茶匙

主治二歲乃至四歲兒百日效ノ第一期ニ用フベシ

○第一千三百九十二方阿山

孕驗酒石半一錢 苗香水二弓 溶解加後藥

安質沒尼酒錢一 滿那舍利別弓半

右調和每一時服一茶匙

主治一歲乃至二歲兒ノ百日效及ヒ他病ニ於テ緩下劑

トス

○第一千三百九十三方同上

蜀羊泉越幾斯錢半 孕驗酒石半一錢 苗香水三弓 溶解

加後藥

安質沒尼酒錢一 過兒托舍利別錢六

右調勻每一時服一茶匙

主治四歲乃至五歲兒ノ百日效ニ宜シ○蜀羊泉越幾斯

ノ量加増シテ二刀ニ至ルモ可ナリ

○第一千三百九十四方〔迦乙葛爾度〕

甘扁桃油錢六 苗香水刀四 鹿角鹽刀一 和胸舍利別刀半

右調勻小兒每一時服二茶匙大人服一食匙

〔主治〕百日效ニ宜シ○總テ乾效短ニノ離雜聲ヲ帶ビ所

謂勞效ニ類似シ而ノ胸中恰モ絞窄スルガ如キヲ覺ユ

ル症並ニ其症依朴昆堙兒及ヒ歇倚私的里家ニ發スル

者モ亦弗陽名ハ此方ヲ用フト云フ

○第一千三百九十五方

苦扁桃水刀一 菩提樹花水刀二 過兒托舍利別刀半

右調勻每一時服一匙〔布匙〕

〔主治〕小兒百日效ノ初起ニ宜シ

○第一千三百九十六方

青酸滴ニ 過兒托舍利別 蒸餾水各一

右調和內玻璃壘黑紙被覆每一時半服一茶匙

〔主治〕八歳乃至十歳兒ノ百日效痙攣ノ期ニ宜シ○青酸

ハ諸藥局ノ製法一ナラザルガ故ニ其性强弱ノ異アリ

是ヲ以テ青酸ヲ處スル氏ハ能ク其製法ヲ確定スルヲ

最要トス

○第一千三百九十七方〔醫布〕

遠西方書 卷十三 百日效 三 廣

阿魏六八至 加密列浸一 亞刺毘亞護宜適

右研和為三歲已下小兒灌腸一回之料

○第一千四百一方

阿魏半一錢 續草浸四至三錢浸漬 亞刺毘亞護宜適

右研和為三歲已上小兒灌腸二回之料

主治右二方千四百方 百日效密兒刺爾喘總テ瘵孿症

ニノ諸液循行遲鈍ヲ兼ヌル者ニ宜シ千三百七十二方 照查スヘシ

○第一千四百二方孿屈篤兒

哥攝尼爾ハ十 酒石鹽ハ一 白糖ハ一 熱湯ハ六

右調勻每服一茶匙日三次

侃私ハト 但篤治療書亦此方ヲ舉ク而メ小差アリ方中酒石

鹽ニ代ヘテ或ハ純精酒石一刃ヲ伍シ服法モ亦琶布匙

ニテ抄ヒ頻服メ十八時内ニ之ヲ盡スト云フ

○第一千四百三方辯涅志都

哥攝尼爾ハ四 酒石鹽ハ八 熱湯ハ一 沙糖舍利別ハ一

右調勻茶匙抄服十二時内二次服盡

主治百日效ニ宜シ○其症聖京倔ノ時期吐劑ヲ忌マサ

ル者ハ先之ヲ與ヘ右哥攝尼爾ヲ用フル上法ノ如ク

スベシ

○第一千四百四方趙利私

上好阿芙蓉半 上好麝香三 亞刺毘亞蓮未 謨一

白糖二錢

右調勻為散分六服每一時半一服

主治十歲乃至十二歲兒百日效無熱症ニ用フヘシ

○第一千四百五方鴉屑

上好麝香一 金硫黃 亞鉛華各半 白糖五

右調勻為散分八服每一時一服

主治百日效患者大ニ衰弱スル者之ニ宜シ

○第一千四百六方篤優爾脂西兒

上好麝香三 至六 加鹿琥精一 徐二 搗和更加後味

苗香水半 遇兒托舍利別一

右調勻每一時服一茶匙臨服宜振盪

主治百日效及ヒ小兒瘰癧症ニ宜シ

○第一千四百七方謨私篤

麝香東方產 金硫黃 吐根未 亞鉛華 菲阿私各

越幾斯各 白糖半

右調勻分十二服每一時一服

主治百日效ニ宜シ○謨私篤名麝香ヲ用フル時ハ之ヲ

大量ニス虛弱ノ兒全身搐掣ヲ兼ヌル者ニ最稱用セリ

○第一千四百八方噎兒私恒篤

麝香ハ半 桂油糖ハ一

右調勻為散蠟紙包裹安心窩

主治百日欬預防ノ効アリ

○第一千四百九方

菲阿私越幾斯ハ半 安質没尼酒半ハ乃溶化

右調和每服八滴乃至十滴日四次

主治百日欬ニ宜シ○五六歳児ノ用ニ供ス

○第一千四百十方白母布列屈篤

刺屈黥私非祿沙越幾斯ハ至ハ四ハ種ハ乳糖ハ四

右調勻為散ハ裹每服一裹日四次

主治同上○鎮靖藥トシテ卓越ノ効アリ劇症モ亦之ニ

○第一千四百十一方刺屈的兒

失鳩荅越幾斯ハ二 苗香水二ハ乃溶解加後藥

阿芙蓉加安息香酸丁幾附三

右調和每服一茶匙日四次

主治同上殊ニ其症瘳癒ヲ來ム者ニ宜シ

○第一千四百十二方

吐酒石ハ一 失鳩荅越幾斯ハ二 蒸餾水二ハ乃至四ハ乃

融解加覆盆子舍利別半ハ乃

右調勻每一時服一茶匙

主治百日欬ニ適當ノ密幾私丟爾トス

○第一千四百十三方母噎過極滿

失鳩荅葉末

開達格碌屈私末爾秩斯各一錢

健質安

那越幾斯宜適

右為百二十九夜石松粉初臨卧服二丸乃至四丸後漸加十二丸乃至十六丸

主治慢性刺衝欬殊ニ其症十歳已上ノ兒ニ在テ肺ニ焮

衝ヲ帶フルヲナキ者ニ宜シ

○第一千四百十四方穢歌蘭度

葭若越幾斯四濃厚苦扁桃水半ヲ溶化

右每服二十滴日四次

主治百日欬ニ宜シ○其症稍熱ヲ帶ヒ或ハ焮衝ヲ夾ム者及ヒ頭腦血鬱アル者ハ皆葭若適當ナラズトハ葭若ハ至テ微量トイヘ氏善ク欬嗽ノ痙攣ヲ鎮靖ス之ヲ服メ面色煩紅并ニ腦ノ運營亢盛ノ状アラバ速ニ後服ヲ停ムベシ

○第一千四百十五方同上

葭若根一錢白糖一錢

右調勻為散分八服早晚一服

主治 二歳乃至四歳児ノ百日効第二期 瘰癧ニ用ヒテ佳ナリ

○第一千四百十六方 薤利私

甲方

苳蓉根ハ一 精製阿芙蓉ハ半 白糖ハ

右調勻為散分八服朝夕一服

○第一千四百十六方 同上

乙方

的里亞加ハ一 苳蓉根ハ 阿芙蓉丁幾ハ各一 亞刺毘亞

薤謨ハ三 常水ハ適

右作煉膏攤革貼心窩

○第一千四百十六方 同上

丙方

過兒托葉ハ一 蜀羊泉ハ 甘草ハ各半

右細剉供泡劑料

主治 薤利私ハ各 右三方百日効ニ兼用ノ毎ニ良効ヲ得

リト云フ

○第一千四百十七方 扑瀝私

苳蓉越幾斯ハ各三 菲阿私越幾斯ハ各三 海葱蜜ハ半 過兒

托舍利別ハ二

右調勻每一時服一茶匙臨用宜振盪

主治八歲兒ノ百日效ニ宜シ

○第一千四百十八方福僞驚

苋若根五錢 硫黃華一錢 純精酒石五錢 苗香油糖二錢

右調勻為散分十裏每一時半乃至二時取一裏過兒把煎

送下

主治十歲兒ノ百日效ニ宜シ

○第一千四百十九方施倚迷詩爾

苋若根 托歇爾私散 阿魏半錢 蜀羊泉越幾斯

刃二

右調勻二八為一九衣甘草末每服三九乃至五九纈草淡

浸劑送下日三次

主治百日效第二期ノ者之ニ宜シ

○第一千四百二十方骨布

苋若根二錢 吐根一八半 硫黃華 乳糖各半錢

右調和為散分八服密紙包裹每服一裏沙糖水送下日四

次

主治三四歲兒ノ百日效ニ宜シ○苋若ノ量漸々増加メ

可ナリ

○第一千四百二十一方福僞驚

苳蓉葉四二 注熱湯適宜飽熟四分時乘溫瀉取二勺

冷定加後藥

安質沒尼酒錢一 遠志舍利別錢六

右調勻每服半食匙強日三四次

主治十歲兒ノ百日效ニ宜シ

○第一千四百二十二方 越屑涅魯

苳蓉葉 苳蓉根各半 熱湯適宜浸濾過取四勺冷定

加扁桃舍利別半勺

右調勻昼夜每一時服一茶匙乃至二茶匙

主治百日效ニ宜シ○其症聖京偃ノ時期ニノ熱アル者

越屑涅魯名八 甘汞名八 麻偃涅名八 失垂名八 實芟荅利名八 斯名八 配伍名八 連

進シテ綠便甘汞ヲ得ルノ後乃チ苳蓉方上ヲ與フ○又遠

屑涅魯氏之ヲ預防方トシ患者ノ年紀ニ準メ一茶匙乃

至二茶匙ヲ取り日ニ三服セシム此ノ如ク之ヲ持久ス

ル一三週ニ至ル

○第一千四百二十三方 同上

精製阿芙蓉 吐根未 結兒茂斯密涅刺列各三 白

糖錢一

右丁寧調和等分為十二服遠志舍利別和服日二三次

主治百日效瘰癧ノ時期其極度ニ及ビ膿様粘痰ヲ吐ス

ルニ至リ莨菪千四百ニ代ヘテ此方ヲ用フベシ○小兒未一歳ニ滿タザル者ハ遠屑涅魯氏方中阿芙蓉ノ量ヲ減殺シ或ハ之ニ代ヘテ麝香各服半ルヲ加ル上方ヲ服ノ時、嘔吐セザル者ハ他ノ吐藥ト番替シ與フヘシ

○第一千四百二十四方職歌蘭度

麻屈涅失亞各四 硫黃華各四 舍電阿芙蓉液一 白糖

右調勻為散令四服朝暮一服

主治劇証百日效第二期ノ者之ニ宜シ但連進スル勿

○末期ニ至リテ著シク其效ヲ鎮靖スル者ハ阿芙蓉

ヲ以テ最ト凶然氏頭旋昏睡其他險重ノ證状ヲ發シ易ク或ハ患者ヲ斃スニ至ル故ニ用ニ臨テ最謹慎ヲ加フヘシ但極メテ少量ニ與フルヲ許スノミ

○第一千四百二十五方

阿芙蓉加安息香酸丁幾錢二

右每服五滴乃至二十滴過兒托舍利別和服日二三次

主治三歳乃至六歳兒ノ百日效ニ宜シ

○第一千四百二十六方弗陽

阿芙蓉二 結兒蔑斯密涅刺列四 鹿角鹽八 白糖

遠西方彙 卷十三 百日效 廣脾

右調勻為散令八裏每服一裏或八日二三次

主治六歲乃至八歲兒ノ百日效ニ宜シ然氏此服量稍過多ナリトス

○第一千四百二十七方迷謂爾

醋酸莫爾比捏半 白糖二

右研和分六裏貼發疱硬膏剝表皮每晚撒敷一裏

主治百日效ヲ治ス甚稱譽アリ佛留母名及ヒ格列魯同

其効ヲ確定セリ○蓋賢堙兒麻質斯法トイヘ氏亦甚害

ヲ招キ易キガ故ニ用ニ臨テ最謹慎ヲ加フヘシ

○第一千四百二十八方羅遠私的印祿別取

白頭翁越幾斯一八至 續草二十四八至 苗香油糖

右調勻為散分八服蠟紙包裹日三四服

主治百日效痙攣ノ時期之ニ宜シ○屑矣突列爾名及ヒ

焚同モ亦之ヲ贊美セリ殊ニ焚氏ハ阿芙蓉効ナキ症モ

亦之ヲ稱用セリ窒息効ノ如キモ之ヲ用フル一二日

ニシテ即鎮靖以服量二月乃至六月ノ兒ハ每服四分ハ

乃至半ハトス一歳已上ハ一ハ七歳ニ至レバ一ハ半皆

沙糖ニ和用スル一日ニ三四次粘液夥多ナル者ハ海葱

蜜一茶匙宛與ヘテ以テ吐ヲ得ルニ至ル

遠西方彙 卷十三 廣脾

遠西本草 卷之三十一 百日效 廣胖堂

○第一千四百二十九方 唇突列爾

白頭翁越幾斯三六至 乳糖一錢

右調勻為散分六服早晚一服

主治百日效二宜シ

○第一千四百三十方 春姪隣

列儒謨頼留私葉三錢 睡菜葉半 熱湯適宜浸漬瀝取

六弓加蘆根流動越幾斯一弓

右調勻每一時半服一食匙

○第一千四百三十一方 連別倫歌憎

列儒謨頼留私葉半 滾湯適宜浸漬瀝取六弓先溶菲

阿私越幾斯六弓乃至十弓後加後藥

甘草膏越栗失爾附二錢 遠志舍利別弓

右調勻每一時服一食匙臨服宜振盪

主治右二方四百卅一方 千百日效二宜シ○隣涅名ガ證

徴ニ據ルニ列儒謨頼留私ハ私屢田名ノ醫始メテ試驗

セシ所ト云フ

○第一千四百三十二方 瀝篤澄兒

吐根四錢 旃那一錢 列儒謨頼留私葉一 熱湯適宜浸

飽熟半時瀝取四弓溶白糖一弓冷定再加後藥

硃砂加過泥子精一錢

遠西本草 卷之三十一 廣胖堂

遠西方景 卷十三 廣脾堂

右調勻每一時服半食匙臨服宜振盪

主治百日效二宜シ

○第一千四百三十三方西篤失魯布土

煙草葉刃半 熱湯適宜飽熟冷定瀝過取八勺加後藥

扁桃舍利別刃半

右調勻每半時服一茶匙

主治一二歲兒ノ百日效二宜シ四歲乃至六歲兒ハ每服

二茶匙八歲乃至十歲ハ每服一食匙トス

○第一千四百三十四方同上

煙草葉刃二 吐酒石刃一 亞刺毘亞護錢半 白糖錢二

右調勻為散分二十服每一時一服

主治百日效二宜シ

○第一千四百三十五方屋兒弗私歌

煙草葉越幾斯至二 苗香油糖刃半

右調勻為散分十二服日三四服

主治百日效二用ヒテ卓越ノ効アリ尿管ノ興奮機亢盛

セル者ハ小量甘汞ヲ配シ粘痰利シ難キ者ハ小量金硫

黄ヲ伍用スシ

○第一千四百三十六方謨私篤

煙草葉越幾斯刃三 蜀羊泉越幾斯刃半 肥束布水苗香

遠西方景 卷十三 廣脾堂

百日期
廣

水各半ヲ溶解加後藥
甘海鹽精ヲ半

右調勻每服二十五滴乃至四十滴遠志舍利別和服日三
次

〔主治〕百日期ニ宜シ

○第一千四百三十七方附設爾

煙草葉錢一 白芷錢三 甘草ヲ半

右熱湯適宜浸漬漉取ハヲ每四分時之三服ニ食匙

〔主治〕百日期癩癩麻痺其他頑滯神經病ニ宜シ

○第一千四百三十八方別連杜

亞鉛華三ハ至六ハ 纈草 白糖各半

右調勻為散分六服每一時半一服

〔主治〕百日期瘧癰期ニ宜シ

○第一千四百三十九方附秋

海鹽精錢二 蒸餾水ヲ六 沙糖舍利別ヲ一

右調勻每半時服ニ食匙

〔主治〕大兒百日期ニ宜シ殊ニ其症焮衝證既ニ退キ獨神

經力及ビ補給機ノ變常ノ証神經力盛ニシテ胃中粘液膜ノ運營減退セル者

是ナラ見ハス時期此方奇効アリ但嬰兒ハ海鹽精適當

ナラス初室見名之ヲ用ヒテ病ノ時期ニ拘ハル一ナシ

卷十三
廣

唯燉衝ノ期ニ於テ絶エテ之ヲ用ヒサルノミ○骨布名之ヲ用ヒテ鴻益アリシ者往々之アリト云蓋百日效ハ殆諸藥効ヲ奏シ難キノ久病タリ而ノ海鹽精ノ功用此ノ如ク其レ偉ナリ恐ラクハ當今醫流之ヲ忘失セルナラン

○第一千四百四十方〔秘屈秘〕

精製丹寧一ハ至三ハ 乳糖半

右調勻為散分ハ服毎一時乃至二時一服

主治百日效ノ兒虛弱ニノ粘液質或ハ惡液質ノ者失血及ヒ下利ヲ合併セル症ニ用フヘシ但燉衝証ハ丹寧ヲ

忌ム○胎孤名九歳乃至十一歳ノ兒十人ニ之ヲ試驗セリ服量始メ毎服半ハ日ニ四次漸ク加ヘテ一ハニ至ル其中十歳ノ女効嗽頻々劇發咯痰血ヲ交ユル者獨速驗ヲ呈シ十四日餘ニシテ全治ス然レ他兒ハ皆毫モ發作減セズ經過モ亦更ニ速ナル者ヲ見ズト云フ

○第一千四百四十一方〔遠突〕

遠志錢一 井水適宜煮濾過取四勺冷定加後藥

安質没尼酒カニ 過兒ル托舍利別ヲ

右調勻毎一時服一食匙

主治百日效第三期痰ヲ豁利スルニ宜シ

○第一千四百四十二方 [春煙隣]

遠志一錢半 常水適宜浸漬飽熟半時漉取四弓溶化炭

酸刺篤亞斯一弓亞刺毘亞蘆謨末一錢 又加後味

過見批舍利別半一弓

右調勻每一時服一食匙

[主治]百日款嗽衝證及ヒ熱退ク後之ヲ用フ

○第一千四百四十三方 [歌蘭度]

芫菁末半錢 至一錢 甘扁桃去皮 一弓 溫水十弓 白糖半弓

右調勻作乳劑每一時乃至一時半服一食匙

[主治]百日款人末期咯痰粘膠ニシテ款嗽衰弱ヲ存スル

ガ為久ク退カザル者之ニ宜シ

○第一千四百四十四方 [彌結魯]

芫菁半 甘扁桃去皮 一錢 白糖二錢

右先大理石臼研和後徐々注溫水五弓作乳劑瀝過但不

用絞〇每一時半乃至二時服半食匙乃至一食匙須準年

齡消息

○第一千四百四十五方 [遠突土]

芫菁粗末 一 白糖 亞刺毘亞蘆謨末各 二錢 丁寧研和徐

々加後味

甘扁桃乳五弓

右調勻每服半食匙乃至一食匙日四次

○第一千四百四十六方（瀝格魯杜）

幾那茶褐色者半勺 井水五勺煮漉取三勺冷定加後藥

芫菁丁幾 舍電阿芙蓉液各十滴 扁桃舍利別一

右調勻每服半食匙日四次

○第一千四百四十七方（同上）

芫菁丁幾半錢 安質沒尼酒二錢

右調勻每服二十滴粘汁點服日四次

主治千四百四十四方ヨリ千四百四十七方至百日効ノ

末期ニ用フ此期ニ在テハ芫菁殊効ヲ稱ス按スルニ芫

菁ハ腎臟ニ反對刺戟ヲ起シテ以テ胸腹ニ涉ル神經ノ
機運ヲ轉變セシムルナリ但之ヲ用フルハ尤小心ヲ要
ス

○第一千四百四十八方（穢歌蘭度）

硫酸規尼捏三六至六六 白糖一錢

右調勻為散分六服朝夕一服

主治百日効ノ第三期已ニ一二週ヲ經テ後熱去リテ獨
衰弱ヲ存スルガ故ニ欸欸連綿退カザル者之ニ宜シ此
期ニ在テハ規尼捏ト鎮痙藥ト配用スルヲ最適當トス
殊ニ其症著シク間歇スル者ハ規尼捏更ニ鴻益アリ

○第一千四百四十九方

依蘭苔 甘草 各半 常水適宜煮漉取七勺加白糖一

右調勻每二時服一匙若一食匙

主治 百日效粘液分泌夥多ニノ且久シク退カザル者後

治法 トシテ之ヲ用フヘシ

○第一千四百五十方 穢駭蘭度

依蘭苔 傑列 乙半 甘草 舍利 別一

右調勻每二時服一茶匙

主治 百日效ノ後治法トシテ之ヲ用フヘシ

○第一千四百五十一方 同上

吐酒石 錢一 家猪脂 半

右調和作軟膏每日取豆大塗擦心窩

主治 百日效第二期ニ方リテ反對刺戟法トシテ之ヲ用

フ○鑢典利篤 名ノ 軟膏之ヲ小兒ニ用フルハ猛烈ニ過

ク骨布 名ガ 白降汞膏 ハ六百卅 稱用スベシ

遠
西
方
彙

卷
十
三
百
日
款

三

廣
月
堂

遠
西
方
彙
卷
之
十
三

