

遠西方彙

十四

○卷之十四

吃逆


胃癰

疝

○鉛毒疝

吐糞病

武
237
14



門 試 9
番 237
卷 124



遠西方彙卷之十四

獨乙 加。幾。安。頓 著
和蘭 傑。婆。都 譯

侍醫法眼貫齋伊東 貞文 仲 重譯

南洋伊東 亨 健夫 參校

吃逆 ス シンギルチ
ス ロヒッキ
蘭

此症ハ普ク世人ノ知レルガ如ク横隔膜痙攣様ノ短促牽引ヲ頻發スルナリ其症過食急餐或ハ輕易ノ聖京屈ニ因テ起ル者ハ微患ニノ多クハ頓ニ治スル者アリ然レ若日



ヲ延キ週ヲ逐ヒ或ハ月ヲ累又ル片ハ尋テ危險ノ症ヲ發シ或ハ斃ル、ニ至ル者アリ熱病或ハ内部激衝ニ起因スル者ハ極メテ重症トス○通常ノ吃逆ハ呼吸ヲ歇メテ極メテ吸氣ヲ内ニ保持シ些ノ冷水ヲ徐々ニ飲下シ或ハ沙糖一塊ヲ含ミ徐々ニ融解セシメ以テ之ヲ治スルニ足レリ或ハ卒然驚駭等ノ事アリテ驟ニ心思ヲ轉スレハ即休スル者モ亦間之アリ或ハ嘔噎ノ如キ激動ヲ挑起ノ即効ヲ得ル者アリ故ニ非扑葛刺私名弗忽弗滿同等ハ嘔藥ヲ用フ又吐藥及ヒ催吐劑千四百五ヲ用ヒテ頑固ノ吃逆良効ヲ得シ者多シ又冰粒珠千四百五ニ硫酸千四百五ヲ奇藥ト稱

ス又阿芙蓉私名葛私私名儂私名謨私名麝香私名菘菟私名曼陀羅華私名亞鉛華私名硝酸毘私私名繆私名篤私名等ノ如キ鎮痙藥殊効アリ外用ハ胃部乾角法芥子泥發疱硬膏ヲ貼シ或ハ吐酒石軟膏及ヒ他ノ刺戟藥鎮痙藥ヲ塗擦シテ妙ナリ全身浴モ亦甚聲價アリ

○第一千四百五十二方的失結百

- 金硫黃一
- 亞鉛華二
- 精製消石三
- 白糖一

右調勻為散分十八服日六服

主治的失結百私名吃逆ニ之ヲ用ヒテ佳効ヲ得シ者多シ

○第一千四百五十二方我魯達地叔泥煙爾

- 收斂亞的兒錢二
- 覆盆子舍利別錢六

遠世方彙 卷十四 吃逆 一 廣厚堂

右調和每四分時取六十滴水三食匙點服

主治頑固吃逆ニ宜シ○或ハ叔泥姪爾氏間越栗失爾茂

印失屈薦附ニ水多量ヲ加ヘテ稀淡ニシ以テ施用セシ

トアリ兩方ノ効迅速ニシ且持久セリ○又順侃名ハ硫

黃精ヲ用ヒテ以テ良驗ヲ得ル者屢之アリ調藥格蒲仙

名モ亦骨片名澁健名ノ病院ニ於テ之ヲ用ヒ同効ヲ得夕

リト云フ

○第一千四百五十四方弗西暴兒土

硃砂加過泥子精錢 刺賢堙兒精子

右調和塗擦

主治小兒吃逆誓留セル症ニ宜シ

胃瘧カルジアルギ○ガストラルギ○

胃瘧ノ治モ亦醫ノ專着眼スベキ者其原因ニアリ畜血或

ハ慢性焮衝ニ原ツク者ハ胃部ニ放蟻シ或ハ其症ニ從テ

肛門若クハ婦人陰部ニ之ヲ施スヲ須要トス或ハ放血ヲ

要スル者モ亦往々之アリ腸胃惡物ヲ掃除スベキ者ハ解

釋緩下ノ劑ニ宜シ門脈系ノ畜血ニ因ル者モ亦同方法ヲ

處メ可ナリ又此ノ如キノ症ハ孕鹼酒石ニ解釋苦味ノ越

幾斯ヲ配スル者五十方五十二方及ヒ複方梅那昆設爾弗附

卓越ノ効アリ倭麻質斯ニ因ル者ハ内服雙鸞菊越幾斯百六

遠西方彙 卷十四 吃逆 廣用堂

四方至六方 格爾夫屈護子酒加阿芙蓉液。甘汞加龍腦ヲ良ト
 外用芥子泥發疱硬膏或ハ吐酒石軟膏四百五十一方及
 他ノ反對刺戟法六百廿六方至六百廿九方ニ宜シ胃中酸敗液ニ因
 ル者ハ麻屈涅六百廿九方及ヒ其他ノ制酸劑四百五十五方ヲ
 用ヒ後苦味藥ニ宜シ神經過敏ニ係ル者ハ鎮痙藥ニ宜シ
 殊ニ亞硝酸毘私六百廿九方ヲ以テ最品トス四百六十七方至
 又青酸鍍亞鉛附方四百七十九方青酸亞鉛附方四百七十八方至
 酸銀千四百八十三方莨菪千四百八十四方至千四百八十五方番木鱉千四百八十六方至千四百八十七方等殊効ヲ奏スル者ア山諸種ノ塗擦藥千四百八十八方至千四百八十九方及ヒ硬膏千四百九十八方ハ内服藥ヲ佐ケテ亦効ア

リ蓋口ヲ戒シ攝生ヲ節セサレバ全功ヲ収ムル者罕ナリ
 トス

吾又此ニ大人胃軟化症アガストロマラシヲ略述ス此症ノ
 監別並ニ其原由ヲ探究スルト未詳明ナラズ治法モ亦確
 實ナラズ蓋腦病及ヒ脊髓病結節腫神經熱等ニ繼發ス而
 ノ其腦病脊髓病モ亦慢性胃病ノ末期ニ繼發スル者トス
 ○輓近胃軟化症ノ主方トシテ丹寧酸ヲ稱用ス

○第一千四百五十五方穀優蘭葛
 吐根赤 曹達乾 枸橼根末各二
 右調勻為散分八服每朝一服

主治胃脘酸敗液並二腸胃衰弱ヲ兼ル者之ニ宜シ

○第一千四百五十六方（弗栗結）

過炭酸曹達 勿擲祭亞石鹼錢各二 亞硝酸毘私繆錢各三

蘆薈越幾斯錢一

右調勻一匁為一九衣石松粉每服八粒日三次

主治胃脘及ヒ疝痛酸敗液及ヒ膽液分泌ノ失常等ヲ兼

又ル者之ニ宜シ

○第一千四百五十七方（護秘篇）

亞刺毘亞護 甘扁桃油錢各六 加密列水 薄荷水

各三 麻屈涅失亞錢三 水製大黃丁幾 實亞格地煜

各一 忽弗滿錢一

右調勻每一時服一二食匙臨服宜猛力振盪

主治胃脘酸敗液ヲ兼ル者之ニ宜シ

○第一千四百五十八方（過傑栗屈的兒）

括夫亞屑錢半 石灰水六匁浸飽熟十二時後暫時煮沸

瀝過加後藥

薄荷水錢二 橙皮舍利別錢半

右調勻每一時服一食匙

主治胃脘胃中ノ酸敗液ニ原ツク者之ニ宜シ

○第一千四百五十九方 伯漢名複方扁桃乳

菲阿斯子錢

甘扁桃去皮半錢

稀淡苦扁桃水八錢

已上作乳劑濾過加後味

白糖六錢 煨製麻屈涅失亞一錢

右調勻每一時服一食匙強臨用宜振盪

主治此方胃症及嘔吐胃ノ感覺過敏及ヒ酸敗液ニ因ル者ニ屢試驗セリ○先菲阿斯子ヲ搗碎シ後扁桃ヲ加フルヲ好トス然ラサレハ搗糊ノ間菲阿斯子杵子ヲ道レ易シ○又櫻實水ヲ以テ扁桃水ニ代ルモ可ナリ

○第一千四百六十六方增霸憫

甲方

蜘蛛石半錢

薄荷油十滴以沙糖三錢作油糖

薄荷油丁幾附薄

荷舍利別各一錢

舍電阿芙蓉液半錢

薄荷水八錢

右調勻每一時乃至一時半服二食匙

主治胃症ニ宜シ○魯百弗蘭屈名之ヲ霸憫氏ノ一奇方

トス兼テ左ノ硬膏ヲ胃部ニ貼ス

乙方

刺佛達尼硬膏附半錢

龍腦 阿芙蓉各半刀

拔爾撒

護字露宜適

右作硬膏

○第一千四百六十一方過傑栗屈的兒

阿魏錢一薄荷舍利別一多溶解加後味

薄荷水八

右調和每四分時服一食匙以至胃瘕鎮定

○第一千四百六十二方溫私萬魯弗地過兒別爾私

阿魏半亞硝酸毘私繆篤緜草油各半

右二瓜為一九衣橙皮末每一時服五丸

主治右二方千四百六十一方胃瘕風脹二因九者二宜シ

又阿魏灌腸ヲ兼用スベシ千三百七

○第一千四百六十三方過傑栗屈的兒

硝砂揮發華水附加密列舍利別各六加密列水三

右調勻每四分時服一食匙以至胃瘕鎮定

主治胃瘕冒寒二因九者之二宜シ兼テ心窩ニ發疱膏ヲ

貼シ或ハ硝砂揮發加龍腦阿芙蓉膏或ハ捲埴兒精加芫

菁丁幾ヲ塗擦ス

○第一千四百六十四方弗陽

瓦爾拔奴謨牛膽各半越質屋布斯安質沒尼錢

失鳩荅越幾斯錢白石鹼半

右調勻二瓜為一九衣石松粉朝夕服二十粒

主治胃瘕局處ノ疾患ニ繼發スル者之二宜シ○陽名人曰

ラク近頃一婦人胃痛劇甚ニシテ吐逆便秘ニ心痛脊ニ

徹ノ灼クガ如キヲ覺ユル者此九子ヲ用ヒテ治セリト云フ○按スルニ此方服量過多ナリトス初朝夕十九ヲ與ヘ後漸ク加ヘテ二十九ニ至ラハ則佳ナリ

○第一千四百六十五方（新醫秘）

吐根末五分 大黃末半 達刺カト 促篤ト 蘊ム 護ム 漿適

右為二十九衣桂末朝暮服一二九

〔主治〕腸胃ノ衰弱及ヒ痙攣症ニ宜シ

○第一千四百六十六方（新醫秘）

吐根末五分 格綸僕越乾固者 幾斯ニ錢 燒酒適

右為四十九衣菖蒲根末每一時服一九

〔主治〕胃部壓迫疼痛膨脹ニ宜シ

○第一千四百六十七方（新醫秘）

吐根末五分 亞硝酸毘私六分 促篤十二分 麻屈涅失亞錢二分

右調和為散分十二服日三四服

〔主治〕倭麻質斯性神經性胃痙失血セントスル者ニ宜シ

○第一千四百六十八方

亞硝酸毘私三分六分 促篤十二分 麻屈涅失亞五分 纈草油

糖半

右調勻為散分六服蠟紙包裹日三服

○第一千四百六十九方（新醫秘）

亞硝酸毘私繆篤十二分至十五分

薄荷油糖半刀

右調勻為散分六服每一時一服

○第一千四百七十方朴滌粉

亞硝酸毘私繆篤十二分 姜八分 牡蠣未二分 白糖二錢

右調勻為散分八裏每服取一裏加密列或薄荷泡劑和用

日二三次

○第一千四百七十一方叔拔爾託

亞硝酸毘私繆篤半刀 續草越幾斯一錢 續草油十滴 續草未適

右為六十九衣

玻璃壘收貯每服六九日三次

○第一千四百七十二方歌蘭度

亞硝酸毘私繆篤二分 菲阿私越幾斯一分 麻屈涅失亞半刀

加耶普的油一滴 白糖一分

右調勻為散分十二服日三服

○第一千四百七十三方骨布

亞硝酸毘私繆篤三分至二分 刺屈黥私非祿沙越幾斯高

麻屈涅失亞四分 吐根至半分 加密半至二分

列油糖或薄荷油糖半刀

右調勻為散分十二服日三四服

主治千四百六十八方ヨリ千四百七十三方至胃症ノ試

驗方トス

○第一千四百七十四方福俣葛

亞硝酸毘私繆篤各半 番木鱉越幾斯各半 麻俣涅失亞

三白糖十五 薄荷油三滴

右調勻為散分十二服蠟紙包裹每一時半取一裹加密列

泡劑和服

主治感覺敏捷ノ人胃瘕ニ宜シ

○第一千四百七十五方私葛爾超

亞硝酸毘私繆篤八分至 莨菪越幾斯六分一分至

大黃末三分至六分 白糖半

右調勻為散分十二服日三服

主治之ヲ服スルヲ十二裹乃至十六裹ニメ通例胃瘕ヲ

治スルニ足レリ然レ爾後仍毎日一裹ヲ與ヘテ以テ再

發ヲ防遏スルヲ好トス○之ニ兼テ心窩或ハ心窩ニ對

面ノ脊椎ニ芫菁膏ヲ貼スベシ若其症倭麻質斯ノ致ス

所ニ由ル者ハ更ニ妙トス

○第一千四百七十六方好弗

亞硝酸毘私繆篤六分 莨菪根末六分 大黃末三分

甘草越幾斯 蒲公英越幾斯各適宜

右二氏為一丸衣石松粉玻璃壘収貯每服三丸日三次

主治胃脘極ノテ頑固ノ症先解劑ヲ用ヒテ後之ニ宜シ並ニ胃口硬結腫ヲ生スルノ始メ之ヲ用フ○叔泥姪名此丸ノ功用ヲ確定セリ

○第一千四百七十七方柳野私

亞硝酸毘私繆篤四八至 實芟答利斯十八至 牡蠣末四

右調勻為散分八服日二三服

主治第十對神經ノ痙攣症痙攣效胃脘等ヲ治ス殊ニ尿管系ノ興奮機尤盛ヲ兼ヌル者ニ好トス

○第一千四百七十八方同上

亞硝酸毘私繆篤一 蘆薈水製越幾斯半 過兒托末一

右調勻加達刺侃篤護漿適宜為四十九衣白桂末朝夕服二粒

主治胃脘腹内ノ畜血膽液分泌ノ洪滯大便秘結等ヲ兼併セル者之ニ宜シ

○第一千四百七十九方顯寧候

青酸鍊亞鉛附半 煨製麻屈涅失亞四 桂皮三

右調勻為散分四服每二時一服

主治胃脘ヲ治ス

○第一千四百八十方弗肝爾田蒲蘭突

青酸鍍亞鉛二氏至白糖錢一

右調勻為散分六服每一時一服

主治胃瘕ニ宜シ○其症ニ從フテ六服中ニ阿芙蓉ニ氏ヲ加フ

○第一千四百八十一方骨布

青酸亞鉛附十二分氏一續草油糖宜適

右調和為散分六服蠟紙包裹每一時一服

主治神經性胃痛間歇頭痛其他總テ神經痛ニ宜シ○此方小心ノ用フルヲ要ス骨布氏感觸靈敏ノ人ハ最初毎

服十六分氏日ニ四次トス或ハ漸々増加ノ半氏一氏二氏或ハ三氏ニ至レリ然レ一氏ヲ用フル日ニ數回ニ及ベハ劇甚ノ頭腦畜血症大苦悶神經過敏ノ重症或ハ間歇戰慄ヲ發ス

○第一千四百八十二方刺曹私

結晶硝酸銀半伊里斯弗魯連底那根錢一

右調和加亞刺昆亞護蒙少許為丸四十粒衣伊里斯弗魯底那每服一九乃至三九日二次

主治胃ノ感觸尤盛症胃瘕癩癩ニ宜シ

○第一千四百八十三方賜帝尼都

結晶硝酸銀五 蒸餾水適宜溶解加後藥

蒲公英越幾斯 甘草半錢

右調勻為二十九衣過兒托末朝暮服一丸乃至二丸

〔主治〕胃瘕二宜又粘滑液ヲ兼服セシム

○第一千四百八十四方 賦歌蘭度老利兒結爾斯加莨菪

水

莨菪越幾斯四 老利兒結爾斯水半

右溶和每服三十滴日三次乃至四次

〔主治〕食道胃及腸ノ頑固瘕攣。嗝噎。慢久嘔吐。胃硬結腫

ノ初起。又神經病二宜

○第一千四百八十五方〔祿斯〕

莨菪越幾斯二 利篤亞斯水錢一 薄荷水五 大黃水

製丁幾 大黃舍利別各一

右調和每一時服一食匙

〔主治〕慢久嘔吐胃中汚物二因セサル者之二宜○又胃

結節腫ノ姑息方トス

○第一千四百八十六方〔母謁過孫滿〕

莨菪根半 撒爾末兒秩斯一 硫酸規尼捏二

麻僂涅失亞半

右調勻為散分六裏朝夕取一裏沙糖水和服

主治胃脘酸敗液若クハ膽液分泌失常ヲ兼ル者之ニ宜

○第一千四百八十七方

番木鱉一 麻俚涅夫亞半

右調勻為散分八服日四服

主治私吐屈忽魯母地ノ婦人病院ニ在テ胃脘症ニ兼テ

嘔氣噯氣口味不佳胃部膨脹等ヲ患フル者ニ此方ヲ用

ヒテ良驗アリ

○第一千四百八十八方福俚篤

番木鱉十八 吐根四十 大黃一 牡蠣二 薄荷油

糖二

右調勻為散等分十二裏每一時半乃至二時取一裏默栗

薩泡劑送下

主治胃脘ヲ治ス

○第一千四百八十九方弗栗質

木鱉子丁幾 井水三

右調勻每一時乃至一時半服一茶匙

主治胃脘疼痛灼クガ如キ者之ニ宜之ヲ服ノ總テ多

脂酷厲ノ食餌及ヒ飲酒ヲ戒シ或ハ其景況ニ從ヒ哥喜

モ亦禁スル片ハ通例四日乃至八日ニシテ治ス其他諸

般ノ胃脘並ニ二三ノ子宮病即月經痛及ヒ經閉子宮出血等ニ宜シ又癩癩。疝因痔血閉者。慢性下利。慢性痢疾。脫肛。小兒遺尿。海上病。嘔吐。妊婦嘔吐。等ニ弗栗質名此人此方ヲ用ヒテ佳効ヲ得タリト云フ

○第一千四百九十方刺曹秘

當葡萄酒葉一 著草葉一 甘草一錢至

右細剉調勻取一食匙強注熱湯二三盞泡出一日服盡

主治胃脘及ヒ其他腹内脛攣症ニ宜シ又痔疾ニ用フ○

刺曹私名間旃那一二錢ヲ配用ス名地暴埜

○第一千四百九十一方澁結別爾屈

大黃水製丁幾一 忽弗滿液一 橙皮丁幾各半 葛私

篤儻謨丁幾一 亞的兒各一

右調勻每一時半服一茶匙

主治單純歇倚私的里性胃脛發作ノ間隙ニ乘ノ之ヲ用

己纈草浸及ヒ阿魏灌腸ヲ兼用スルニ宜シ

○第一千四百九十二方私葛爾老

甘汞十二 苣若越幾斯二 麻屈涅失亞謁陳佛錢半

白糖一錢半

右調勻為散等分十二裹日服三裹以至見甘汞瞑眩之候

主治胃脛既ニ慢性胃脛衝ニ變セル症ニ宜シ内羹汁或

ハ之ニ雞子黄ヲ加フル者及ヒ乳漣ハ此症ニ無比ノ滋養劑タリ但毎服必ニ食匙乃至三食匙ニ過グベカラズ數次ニ分チテ半時毎ニ與フヘシ便秘スル者ハ灌腸ヲ行フテ可ナリ然レ甘汞ノ能ニ由リ速ニ暗綠色ノ大便ヲ利シテ大ニ輕快ヲ得ル者多シ上方一劑ヲ盡シ既ニ嘔吐休ミ脊ノ煩痛モ亦立地ニ歇ム者少シトセズ甘汞ノ量十二匹乃至二十四匹餘ヲ要スル者ハ罕ナリ○更ニ劇甚ノ症ハ心窩若クハ脊ニ艾灸ヲ施スヘシ

○第一千四百九十三方弗肝爾田蒲蘭度

拔爾撒謨阿波德兒突古 阿芙蓉液錢一

右調勻塗擦心窩日四次

〔主治〕胃ノ痙攣痛ニ宜シ

○第一千四百九十四方 戢歇蘭度 名鎮痙軟膏

揮發加龍腦膏一 加耶魯的油 綿苔幾里私布油各半

阿芙蓉丁幾錢一

右調勻塗擦胃部

〔主治〕胃痙ニ宜シ○並ニ菲阿斯葉加密列ノ温暖琶布及

ヒ芥子泥ヲ貼シ胃部ニ冷水ヲ射注スベシ

○第一千四百九十五方渴傑栗屈的兒

肉豆蔻油錢一 薄荷油 刺賢堙兒油各十滴 再留琥珀

油錢半 揮發鹿角鹽半

右調勻塗擦心窩

○第一千四百九十六方同上

的里亞加 胡桃油各一 葛私篤儂謨 雜腹蘭東方

拔爾撒謨字露各一 枸橼油滴廿 龍腦錢半

右調勻塗敷麻布以貼胃部

○第一千四百九十七方同上

昏噶里亞哥寧低水附 捲埕兒精各一 阿芙蓉丁幾

半一錢

右調和醃紙貼心窩

主治 一千四百九十五方ヨリ一千四百九十七方至胃脘

二宜シ

○第一千四百九十八方 百過歌土名 胃膏エム プラスト

ノ或シトマキユム ムアウステルヘット 羅パル

黃蠟半 阿列機油半 的列並底那錢六 已上三

味熔和瀝過加後藥

刺佛達尼蘊謨附 荅葛末屈脂附 乳香各三 肉豆

蔻半一錢 拔爾撒謨字露 薄荷油 格墨茵油各廿

二 丁子油八

右調和作硬膏

主治胃腸ノ衰弱及ヒ痙攣ニ宜シ○此良膏ハ殊ニ善ク肌膚ニ牢著スルヲ以テ他方ニ優レリトス

○第一千四百九十九方茂杜

丹寧酸ニカ至一錢

桂水

亞刺毘亞蘆各三

右調勻每一時服一食匙

主治大人並ニ老人ノ腸胃軟化症ニ宜シ

疝コリカ羅コリキ蘭

疝ノ醫治每症左ノ規則ニ著眼スベシ扁桃油亞刺毘亞蘆

謨製乳劑十五方裸燕麥汁亞麻仁煎等ノ如キ粘滑油性藥ヲ

與ヘテ疼痛ヲ緩和シ安リニ起熱藥ヲ用フベカラズ恐ラ

クハ之カ為ニ腸焮腫ニ轉變スレバナリ外用鎮痙藥腹上

乾角法香竈温罨法菲阿斯油及ヒ揮發膏十五方等最的當

ト至十五方殊ニ鎮痙緩下ノ灌腸法至十五方佳トス灌腸

ハ汚物ノ常ニ腸中ニ鬱蓄シ疝ヲ持續シ且其レヲ益盛

サラシムル所ノ者ヲ排泄スルヲ以テ瀉益アリトス下劑

ヲ内服スルハ每次必効ヲ得ルヲ難シ痛一處ニ住著ノ劇

甚ニ且灼クガ如ク之ヲ按スルニ堪ヘスノ發熱スル者ハ

忽焮衝症ニ轉ズルノ懼アリ此症彼此ヲ論ゼス速ニ放

血シ後吸角法ヲ施メ之ヲ防制セスバアルベカラズ又疝

ハ能ク肚腹ヲ觀察シ額額有無ヲ檢スベシ既ニ疝痛

ハ能ク肚腹ヲ觀察シ額額有無ヲ檢スベシ既ニ疝痛

ヲ鎮靖シ得テ后緩和下劑ヲ與フヘシ但衝動セザル劑ヲ好トス○又疝ハ每症各自ノ治法ヲ下スベシ○即多血ニ因ル者ハ痔血若クハ經閉ニ原ツク者多シ是刺絡或ハ局處瀉血ヲ急ルヲ勿レ○膽液太過ニ因ル者ハ先乳劑五百方及ヒ橙汁一食匙強ヲ與ヘテ後荅五百方里歇利飲一方及ヒ橙汁一食匙強ヲ與ヘテ後荅五百方麻林度滿那孕鹼酒石九十三方五百七十五方至五百七十五方下劑ヲ投シ而メ疼痛已ニ鎮靖セル后適宜ノ吐劑ニ鎮瘕劑若クハ植酸ヲ配用ス例スルニ吐根純精酒石ヲ和用ス心等是ナリ○腸胃汚物ニ因ル者ハ先解釋劑四十九方至後其症ニ從フテ瀉藥四十五方至七十五方或ハ吐藥

ニ宜シ○風氣痞滯ニ因ル者ハ所謂驅風劑十五方至十五方ヲ稱用ス○膽石及腎石ニ因ル者ハ強實多血ノ人ニ在テハ多ク嫩衝性ヲ帶ブルガ故ニ能ク其候ヲ認メテ先刺絡或ハ砒鍼ヲ施シ後鎮痛罨法及ヒ塗擦法全身浴ヲ施シ油質粘滑ノ乳劑ニ菲阿斯ヲ和用十五方至一百方等好シ腎石疝ニ在テハ阿芙蓉モ亦佳ナリ但膽石疝ハ之ヲ用フル勿レ何者此症大便通利ヲ好トスルニ却テ阿芙蓉之ヲ閉澁スレバナリ○小兒疝痛ハ酸敗液及ヒ風氣痞滯ニ由テ起ル者多シ能ク相當ノ方千五百方至千五百方至千五百方○第一千五百方飛歇蘭度

遠西方彙 卷十四 疝 十八 廣野堂

甘扁桃油新絞者 亞刺毘亞錢 茴香水三 上好

滿那半 扁桃乳舍利別一

右調勻作乳劑每一時服一食匙

主治腹部創傷。癩麻質斯性及ヒ嫩衝性疝ニ宜之

○第一千五百一方同上

甘扁桃油新絞者 井水七 亞刺毘亞錢 護漿適

已上作乳劑加後味

上好滿那一 孕鹼酒石三錢至 扁桃乳舍利別半

菲阿私越幾斯六

右調勻每一時服二食匙

主治亦ニ用ヒテ疼痛痙攣ヲ鎮メ且微瀉ヲ促スニ宜之

○第一千五百二方叔泥埤爾

精製阿芙蓉二 格綸四

右調和為散等分四晝每服取一晝葡萄酒半盞和服

主治疝專胃中ニ係在スル者之ニ宜之

○第一千五百三方栗屈的兒

纈草半 加密列二 滾湯適宜浸瀝過取六三 冷定加

後味

葛私篤半 儂謨丁錢 橙花舍利別半

右調勻每半時服一食匙臨服宜振盪

主治純粹神經性ノ腹内痙攣症及ヒ痙攣疝ニ宜シ

○第一千五百四方同上

葛私篤カス樓ト謨ト丁幾ト 忽弗滿液ホフマン 錢各一

右調勻每服十滴乃至二十滴加密列泡劑點服日三四次

○第一千五百五方同上

甘消石精錢一 橙皮丁幾錢二

右調和每服十五滴乃至三十滴加密列泡劑點服日二次

○第一千五百六方孤刺優私

府利油錢半 亞的兒錢一

右調勻每一時十二滴沙糖點服

主治千五百四方ヨリ千五百六方至皆風氣痞滯風氣疝

等ニ宜シ並ニ肚腹ニ乾角法ヲ施スベシ

○第一千五百七方速別倫歌憎

過泥子油ト 甘消石精二錢確砂加過泥子精一刀溶化

右調勻每服十滴乃至十五滴日三四次

主治劇証風氣痞滯並ニ風氣疝ニ宜シ

○第一千五百八方歇倚澄

加密列油十五滴 甘消石精三錢溶化

右調勻每一時十五滴乃至二十滴沙糖和服

主治風氣疝其他肚腹痙攣症ニ宜シ珠ニ歇倚私的利婦

人二用フベシ

○第一千五百九方

薄荷油十二 甘消石精一錢溶化

右調勻每服十滴沙糖和服日三次

主治頑固風氣痞滯及ヒ風氣疝ニ宜シ

○第一千五百十方速効 倫歇愷

遏泥子油糖一 橙皮黃二 麻屈涅失亞加大黃散附

錢

右調勻為散內私葛點刺器每服一茶匙日三次

主治胃腸一痙攣症殊ニ風氣痞滯ニ宜シ

○第一千五百十一方阿藥魯

沒食子十六箇 注滾湯一此飽熟十二時

右瀝過每服一食匙日四次

主治風氣疝ニ宜シ○吾儕未風氣痞滯症ニ沒食子ヲ稱

用スルヲ見ズト雖阿藥魯名碩學ノ士ナリ何ソ此方

ヲ載セサルヲ得ンヤ且阿藥魯ハ明礬乳八百廿モ亦

此症ニ贊美セリ

○第一千五百十二方阿藥魯

硫黃華 麻屈涅失亞二 精製阿芙蓉 吐根各三

右調勻為散分十二服日四服

主治 僂麻質斯性若クハ依僂篤性ノ疝ニ宜シ

○第一千五百十三方弗陽

生明礬刀半 精製阿芙蓉刀一

右調和為散頓服

主治 所謂粘液疝コレキム腹痛劇甚ニシテ玻璃状粘液ヲ

下スフ夥多ノ症ニ陽氏累年上方ヲ用ヒ偉効アルヲ稱

ス○又痙攣性風氣疝ニ明礬佳効ヲ奏スレ凡腸胃汚物

ヲ兼ル者ハ之ヲ忌ム若其汚物ヲ兼ヌル者ハ先灌腸法

及ヒ其他相當ノ劑ヲ與ヘテ之ヲ排除スヘシ

○第一千五百十四方同上

麻僂涅失亞脱二分 純精酒石刀半

右和勻頓服

主治 嘈雜風氣痞滯疝腸胃汚物或ハ畜血ニ因ル者之ニ

宜シ

○第一千五百十五方暹傑栗屈的兒

格綸僕越幾斯錢二 水製大黃丁幾 桂水弓三 忽弗

滿液錢一

右調勻每服一食匙日三次

主治 疝治ノ後腸ヲ補益スルニ宜シ

○第一千五百十六方佛律屈涅魯

黃蠟 勿擲祭亞的列並底那錢各二 瓦爾拔奴謨 越

列密附各 已上四味上慢火熔解加後味

葛私附各 加密列加枸橼油附一

右調和作硬膏貼胃部若肚腹

主治胃瘕瘕瘰疬其他肚腹瘕瘰疬症二宜シ

○第一千五百十七方私託爾屈

菲阿斯油 白罌粟油錢各六 礪砂加石灰精 鹿琥精

舍電阿芙蓉液錢各一

右調和作軟膏塗肚腹日二次

主治風氣疝二宜シ

○第一千五百十八方私港私

綿苔錢各二 里私布葉 菜沃刺那葉錢各二 石鹼錢一

右細剉調勻分四貼每用取一貼水二盞泡出灌腸

主治同上

○第一千五百十九方過解栗屈的兒

燕麥去皮 加密列各一 井水適宜煮瀝過取八弓加

左味

亞麻子油 蜂蜜各一

右調和供灌腸

主治疝二用ヒテ大便ヲ促スニ宜シ

○第一千五百二十方 福屈列兒名入鎮瘕灌腸方

歌爾拔斯屈謨花 罌粟球各二錢

右細剉乳汁及水等分煮濃取十弓灌腸

主治黃疸胃瘕疝吐糞病箱頓貌優屈便秘腸ノ感覺過敏ヲ兼ル者及ヒ假障痛等ニ宜シ

○第一千五百二十一方 護私薦

甘扁桃油新絞六錢 雞子黃宜適 取已上二味加加密列水

顯草水各四弓作乳劑再加後味

菲阿私越幾斯カ 老利兒結兒斯水半錢 實亞格地

溫弓一

右調勻每半時服一食匙

主治膽石疝ニ宜シ○但先肝臟ノ部ニ緩和藥ヲ塗擦シ

全腹蒸湯法或ハ微温湯浴ヲ行フニシ或ハ其症ニ後ヒ放血モ亦可ナリ殊ニ肝部放蟻ヲ妙トス

○第一千五百二十二方 同上

過兒地軟膏弓一 菲阿斯油 礪砂揮發加龍腦膏各一錢

舍電阿芙蓉液錢二 的列並油錢一

右調勻朝夕塗擦肝部

主治膽石疝ニ宜シ

○第一千五百二十三方 佛刺

莨菪越幾斯十五 家猪脂半

右調和作軟膏塗擦腎及膀胱部

主治劇証腎石疝二宜シ

○第一千五百二十四方匹篤尖葛弗士

礪砂 苦扁桃水濃厚者各一錢 默栗薩水各四

右調和每半時服一食匙

主治月經痛二宜シ經血將ニ来ラントスル時及ヒ其已

ニ来ルノ初之ヲ用フベシ○又委中ノ刺絡且陰部放蟻

ヲ要スル者少シトセズ緩和琶布ヲ貼シ而後刺戟藥中

ニ足ヲ浸ス等皆佳ナリ月經不調ノ條ヲ參照スベシ

○第一千五百二十五方 羅仙私的印人 小兒乳

菩提樹花水各二 黑櫻實水 甘扁桃油新絞者各一 酒石

鹽各一 雞子黃各二 亞刺毘亞護膜漿各一

右調勻每四分時乃至半時與一茶匙

主治小兒腹痛ノ殊効方トス

○第一千五百二十六方護利私

茴香浸 茴香水各二 麻屈涅失亞十五 舍電阿芙

蓉液滴二 沙糖舍利別各半

右調勻每二時與一茶匙

主治小兒疝痛胃中酸敗液ニ因ル者之ニ宜シ

○第一千五百二十七方 秘濁耳柱

鹿琥精四十滴 舍電阿芙蓉液二滴至 橙花舍利別一

右調勻應用初生兒未滿一月者每服一茶匙晡後一服夜初更一服

主治小兒風氣疝ニ宜シ○夜間攣痛劇甚ノ者ハ秘濁耳柱杜名之ヲ與フル一ニ茶匙ニ止マラズ尚且半茶匙乃至一茶匙ヲ服セシム前ニ屢戒ムルガ如ク小兒病ニ阿芙蓉ヲ用フルハ最謹慎ヲ加フベシ小兒生下後一月ヲ過クル者ハ更ニ鹿琥精ヲ加増スルモ舍電阿芙蓉液ハ四滴ヲ以テ極トシ必之ニ過グル一勿レ

○第一千五百二十八方

甘扁桃油新絞半 亞刺毘亞護謨未半 菩提樹花水一
加密列水半 已上四味搗和作乳劑後加滿那舍利別半

右調勻每一時服一茶匙

主治小兒風氣疝便秘スル者之ニ宜シ

○第一千五百二十九方 弗栗結
甘扁桃油 亞刺毘亞護謨未各 礪砂加過泥子精二
過兒托煎二 冰糖一

右調勻每半時或一時服二茶匙

主治二三箇月乃至二歲兒ノ疝痛下利又嬰兒ノ粘液膜
諸病ニ宜シ若其症熱ヲ兼又ル者ハ礪砂加過泥子精ニ
代ヘテ消石半錢ヲ加フ水瀉甚シキ者ハ吐根末一以ヲ
加フ

○第一千五百三十方同上

甘汞十二分 吐根赤十六分 白糖半

右調勻為散分十二服早晚一服

主治胃腸病經久下利疝痛等ニ宜シ又幼兒ノ瘰癧或ハ
消削病其因皮膚運營ノ障碍ニ因ラザル者之ヲ用フベ
シ

○第一千五百三十一方

過泥子油錢一 肉豆蔻拔爾撒謨附二

右和勻塗肚腹

主治腸ノ痙攣症ニ宜シ殊ニ小兒ニ用フヘシ又痙攣性
下利ニ佳ナリ

○第一千五百三十二方篤優爾黠亞兒

阿魏六分 至 加密列浸弓一 亞刺毘亞護謨宜適

右研和供灌腸

主治幼兒風氣疝ニ宜シ

鉛毒疝コリカサエルニナ
羅ロドコリキ蘭

鉛毒症ハ專便秘ヲ治スルヲ以テ第一義トス而シテ又疼痛

及ヒ其他ノ諸証ヲ鎮靖スベシ即鎮痙藥或ハ峻下藥ニ油

質乳劑殊ニ蓖麻油ヲ以テ製スル者ヲ和用スヘシ

至千五百 卅五方 鎮痙藥ノ中ニ就テ阿芙蓉 千五百卅六方 至

卅五方 卅五方 菲阿斯烟艸

トス並ニ番木鱉 千五百卅九方 莨菪 千五百卅五方

斯篤揭私名ノ灌腸法 獨刺歇私名ノ毡布等ヲ稱用ス峻下

藥ハ巴豆油 千五百卅四 最殊効アリ 葯刺巴 千四百卅五方

大量甘 汞 千五百卅四 或ハ單味或 旃那 芒硝等モ亦効アリ

○又明礬 千五百卅四 方至 奇藥トス 硫酸 千五百卅四

方 卅五方 卅四 方 至 諸經驗法 エムベリ

テ 中ニ就テ

百年来巴黎私都府名病院ニ於テ施用スル所ノ方法 千五百

最稱スベシ 卅五方

○第一千五百三十三方 朴瀝私

蓖麻油 千五百三十三方 雞子黃 卅二 已上二味加罌粟舍利別一

茴香水 六 徐徐搗和作乳劑再溶化後味

菲阿私越幾斯 卅六 精製芒硝 卅一

右調勻每半時服一食匙乃至二食匙臨用宜振盪

主治 鉛毒症ニ宜シ又他病ニ用フベシ

○第一千五百三十四方 私的嗎擬

蓖麻油 千五百三十四方 亞刺昆亞蘊謨 卅一

已上二味加薄荷水

四弓徐徐搗和作乳劑再加後味
舍電阿芙蓉液十二滴 旃那丁幾一

右調勻分為四服每二時一服臨用宜振盪

主治鉛毒疝二宜シ

○第一千五百三十五方弗陽

蓖麻油一 鷄子黃一 已上二味加櫻實水三弓徐徐

搗和作乳劑再加後味

白石鹼半錢 阿芙蓉八 扁桃乳舍利別半

右調和每一時服一食匙

主治鉛毒疝二宜シ

○第一千五百三十六方磨連歌憶

阿芙蓉 龍腦各五 加密列越幾斯錢一 忽弗滿液

加密列舍利別各一 加密列水各四

右調和每一時服一食匙

主治同上○阿芙蓉ハ鉛毒疝ノ良藥タルヲ確實ナリ或

ハ阿芙蓉單味ヲ以テ半時毎ニ一匁至用フル者アリ蒲

里屑リヤ的テ鑿カ名人ハ數年來阿芙蓉ニ一至一時毎ニ用七且之

ヲ灌腸シ又硬膏ニ作リテ肚腹ニ貼ス而ノ瀉劑ヲ兼用

スルナシ

○第一千五百三十七方弗胎爾田蒲蘭度

精製阿芙蓉二錢 甘汞四錢 白糖一錢

右合勻為散分四服每一時半一服

○第一千五百三十八方同上

精製阿芙蓉二錢 龍腦二錢 硫黃華 白糖各半錢

右調勻為散分四服每一時半一服

主治右二方千五百三十七方 鉛毒疝二宜シ

○第一千五百三十九方施爾禮斯

番木鱉丁錢一

右每服十滴乃至三十滴日四次

主治鉛毒疝二宜シ

○第一千五百四十方

番木鱉丁二錢 麻瘋涅失亞六錢

右調勻為散分十二服日四服

主治私吐屈忽兒地名 婦人病院二 於元鉛毒疝二 之ヲ

用ヒテ良効ヲ得夕リ之ヲ服シテ後二日或ハ三日ニメ

燥黑硬屎ヲ得尋テ疝痛消散セリ

○第一千五百四十一方噶拉依私

生明礬二錢 達刺侃篤蘊錢一 阿仙藥各一錢 井水八分

列印酒四分

右調勻每半時服一食匙乃至二食匙

主治銘毒症ニ宜シ○明礬銘毒ヲ治スルノ功用其説未
 詳著ナラズト雖此症ニ卓越ノ一奇藥タルヲ確實ニシ
 テ疑ヲ容レス略百列魯^ル名^ハ大抵明礬ノミヲ用ヒテ他
 藥ヲ要セズ服量一晝夜六錢ニ至ル之ヲ粘滑藥煎ニ和
 用シ兼テ油藥ヲ灌腸セリ

○第一千五百四十二方〔薺都〕

罌粟子^子常水^水已上作乳劑瀉過溶明礬半錢再

加後味

沙糖舍利別^半

右調勻每一時服ニ食匙臨用宜振盪

主治銘毒症ニ宜シ○明礬ノ量漸ク以テ加増スベシ

○第一千五百四十三方〔乾度聞〕

生明礬^錢蒸餾水四勺溶化加後味

亞刺昆亞護謨舍利別^子

右調勻分為四服

主治同上○之ヲ服スルノ前一時又後半時患者ヲノ飲
 食ヲ斷タシムベシ若之ヲ服ノ吐若クハ瀉スル片ハ服
 量ヲ減スベシ

○第一千五百四十四方〔同上〕

生明礬^錢蒸餾水四勺溶化加後藥

硫酸 枸橼丁幾附各 枸橼汁舍利別各

右調勻每半時服一食匙

主治同上○此方前方ニ較スレハ効力更ニ優ルベシ

○第一千五百四十五方同上

硫酸錢一 蒸餾水北三 亞爾箇兒北二 枸橼丁幾十五滴

右調勻每服一盞大約容日三次

○第一千五百四十六方同上

硫酸錢一 蒸餾水北二 白葡萄酒北一

右調勻每服五勺日三次

主治右二方千五百四十五方 銘毒症ニ宜シ○然レ硫酸

○阿芙蓉明礬及ヒ巴豆油ニ方レリ

○第一千五百四十七方較母別兒

巴豆油三滴 白糖錢半

右調勻為散分三服每一時一服

主治銘毒症ニ宜シ○較母別兒名之ヲ治スルニ先巴

豆油ヲ用フ大抵一滴乃至三滴ニシテ瀉スルニ足ル而

ノ終日扁桃乳ヲ用ヒ晚ニ方テ阿芙蓉半瓜ヲ服セシム

○單結列兒名巴豆油ヲ以テ最適當ノ即効藥トシ且腦

病及ヒ脊髓病ノ再發ヲ防グノ良藥ト稱シ通例巴豆油

一滴大麥水一匙ニ和服セシムル日ニ一次或ハ間ニ

次ニ至ル之ヲ歴試スルヲ四百六十人ノ中二百八十人
ハ單味巴豆油ヲ與ヘ兼テ隔日ニ瀉藥灌腸ヲ施シ並ニ
瀝杜吉篤屑爾水鑛泉名ヲ用ヒ其餘八十人ハ巴豆油ヲ與
ヘテ即日瀉下灌腸ヲ施シ兼テ毎日阿芙蓉半匁ヲ服セ
シメ或ハ阿芙蓉液三十滴ヲ灌腸セリ已上通計四百六
十人ノ中四百二十五人ハ此法ニ由テ四五日内ニ癒ニ
其他不治ノ者ハ巴豆油ノ為ニ劇吐ヲ發スルガ故ニ後
服ヲ進ムルヲ能ハス且其治セシ者ノ中再感セシ者纔
ニ二十人トス

○第一千五百四十八方 羣的劑

○藥刺巴脂 白石鹼各一匁 硫加爾各一匁
右調勻一匁為一丸衣石松粉每一時乃至一時半服四丸
乃至五丸
主治 鉛毒疝ニ宜シ ○羣的爾氏先嶺草及上稱那浸ヲ
與ヘテ後此丸ヲ用フ

○第一千五百四十九方 新劑

護謨安沒尼亞各一匁 肝色硫黃 蒲公英越幾斯各一匁
白石鹼 大黃末各半匁 阿芙蓉越幾斯各三匁
右調勻二匁為一丸衣石松粉玻璃壘收貯每一時服五粒
主治 鉛毒疝頑固ノ便秘治メ后之ヲ用フベシ

○巴黎私都名病院療法

鉛毒症ノ患者初ノ病院ニ入ルヤ醫之ヲ診シテ發病ノ時期ヲ論セズ即伯印的爾ノ瀉下灌腸法ヲ行フ其方左ノ如シ

○第一千五百五十方

甲方

旃那葉子半 常水十二子煮瀝取八子加後味

芒硝子半 安質沒尼酒子四

右調勻

○同日所謂偈刺印名ノ阿沒勒劑ヲ服セシム其方左ノ如

シ

乙方

阿沒勒北一 常水煮如法瀝取二北加後味

酒酸加里曹達子一 吐酒石子三

右調勻或ハ私匹那屑非舍利別一子ヲ加フ

○晚ニ方テ左ノ鎮痛灌腸ヲ施ス

胡桃油子四 赤葡萄酒子十二

○其後一時半ヲ經テ的里亞加一錢半及ヒ阿芙蓉一子半ヲ與フ

○翌日施治ノ後方ヲ服ス

丙方

吐酒石六 蒸餾熱湯八

石溶和先服其半後經半時服餘半

○之ヲ服ノ吐ヲ得ルノ后次ノ煎劑ヲ與フ

丁方

葱瘡木 薩沙弗刺私 土茯苓 薩兒沙巴栗刺各一

甘草半

右常水三北煮瀝過取二北

○又晚ニ方テ再次鎮痛灌腸法ヲ施シ且的里亞加ヲ服

セシム

○第三日早旦復上ノ煎劑二北ヲ取テ四分シ用フ或ハ

之ニ旃那葉ヲ加フ發汗瀉下 午時再單方發汗飲ヲ與ル

フ前ノ如ク三日晡ニ至リテ先伯印的爾氏ノ瀉下灌腸

ヲ施シ一時ヲ經テ後更ニ第二方ノ鎮痛灌腸法ヲ施シ

且的里亞加及ヒ阿芙蓉ノ合劑一服ヲ與フ

○第四日又伯印的爾氏ノ瀉下飲ヲ與フ其方左ノ如シ

戊方

旃那葉二錢 熱湯適宜浸出瀝取六加後藥

芒硝半 藥刺巴末一錢 私匹那屑非舍利別附一

右調和

○又午後發汗飲ヲ與へ晚ニ鎮痛灌腸法ヲ施シ且的里亞加ヲ與フ

○第五日又發汗瀉下飲ヲ與へ晚ニ第一方ノ瀉下灌腸ヲ施シ後一時ヲ經テ又第三日ノ如ク第二方ノ鎮痛灌腸法ヲ行ヒ並ニ的里亞加ニ阿芙蓉ヲ配用ス

○第六日又下劑ヲ用テ後上ノ單方發汗劑及ヒ鎮痛灌腸法ヲ施用シ的里亞加阿芙蓉ヲ配用ス

大抵下劑ニ行ヲ得テ病勢ヲ制伏スベシ若疼痛連綿已マザル片ハ更ニ猛烈ノ瀉藥ヲ連進シ疼痛鎮靖スルニ至ルベシ峻藥モ尚効ナキ片ハ三時毎ニ百伯的兒名ノ

瀉下丸ヲ與フ其方左ノ如シ

癸方

上好蘆薈 大黃越幾斯各半 葯刺巴越幾斯 墨列

僕里越幾斯 蘇甘沒扭越幾斯各十 私匹那屑非舍

利別附適

右為六丸

已上列載スル所ノ者ハ銘毒疝ヲ療スル複法ニシテ即巴黎私ノ諸病院ニ於テ一定シテ用フル所ナリ注昔始メテ病院ヲ建立セシ時之ヲ創制セリ故ニ下劑及ヒ阿芙蓉ヲ以テ主藥トス之ヲ稱用スルヲ二三百年来ニシテ匹涅兒

人之ヲ經驗良法ト名之病院ノ治驗表ニ據ルニ十二年間
ニ上法ヲ以テ鉛毒疔ヲ療スル一
千三百五十三人ノ中
ニ就テ死スル者纔ニ六十四人ト云フ

上款ノ方法ハ一千八百二十二年拂郎西ノ醫戾布夫弗
名及ヒ蒲羅葛私同上ノ鏤行セシ葛的爾加樂室私扶暨
ヨリ拔萃スル所ナリ

○第一千五百五十一方 蘭結

莨菪越幾斯_ニ 亞的兒_子 老利兒結爾斯_水 子
右調勻為軟膏塗擦肚腹

主治 鉛毒疔ニ宜シ ○蘭結人ハ先半身浴ヲ施シ癒創膏

ニ夫鳩苔龍腦的里亞加吐酒石ヲ和シ硬膏ニ作り以テ
肚腹ニ貼シテ發疹セシメ而後其部ニ上ノ軟膏ヲ塗擦
ス兼テ阿列機油若クハ扁桃油四弓ニ亞的兒製莨菪丁
幾二十滴ヲ和シ灌腸スル一日ニ一二次但疼痛劇甚ナ
ル片ハ上ノ莨菪丁幾少許ヲ粘滑密幾私去爾ニ伍ノ兼
服セシム此ノ如ク之ヲ持重スル一日三四日ニシテ寬解セ
ザル者ハ蓖麻油少許ヲ以テ頻服セシム但力メテ上ノ
軟膏ヲ擦シ又巴ムヲ得サレバ上ノ硬膏中更ニ多量
ノ龍腦及ヒ吐酒石ヲ調和シ其上ニ貼セシム ○阿魯列
安私_地ノ病院ニ於テ蘭結氏上法ヲ以テ百五十人ヲ療

シ死スル者一人モアラスト云フ

吐糞病 イグレウス。エト。シセレレ。羅グルムイ

此症ハ常ニ他病ヨリ將出シ来ルナリ故ニ治法ノ大旨モ

亦其病根ヲ緩解制伏スルニ在リ箱頭癩^レ屈ニ基因スル

者多シ此症ハ唯外療法ヲ以テ治スベキノニ其他發因ヲ

ナス者即腹内ニ潜伏ノ其部ヲ逼迫スル所ノ腫瘍新生ノ

鞞帶腸管捲収^レ 腸ノ一部非常ニ廣潤シ若クハ縮収セルニ

上部ノ内ニ向テ上部下部ノ裏ニ向テ捲収シ或ハ下部

捲収スルヲ云フ等ハ存生ノ間之ヲ監察スルヲ容易ナラ

ズ是故ニ醫者唯經驗治法ヲ行フノ外他ノ伎倆ナキ者之

アリ然氏或ハ既ニ腸管ニ焮衝ノ在ルアリ或ハ積糞鬱閉

痙攣ニ因ルアリ醫者專此ニ著眼スベシ其焮衝ニ原ツク

者ハ猛烈消焮法即放血大量甘汞^レ 毎服五分乃至二十分或

ハ單味或ハ阿芙蓉ニ用或ハ寒罨法等ヲ切要トシ痙攣性ノ者ハ鎮痙藥及ヒ瀉

藥ヲ兼用スルヲ尤稱賛シ油劑殊ニ亞麻油^レ 千五百五 蓖麻

油^レ 千五百五 往往偉効アリ之ニ亞^レ 千五百五 瀉利鹽^レ 千五百五

五百^レ 千五百五 好トス舎電發^レ 千五百五 巴來大ニ稱用セリ巴上ノ藥

劑効アラザル氏ハ巴豆油^レ 千五百五 用フベシ又往往煙

草^レ 千五百五 稱用セリ然氏内服藥ハ立地ニ吐出

スル者多キカ故ニ煙草^レ 千五百五 及ヒ莨菪^レ 千五百五

方^レ 千五百五 灌腸並ニ巴豆油^レ 千五百五 外用ヲ佳

六十三方ノ灌腸並ニ巴豆油^レ 千五百五 外用ヲ佳

ト又羅獨窠篤兒ノ灌腸法偉効アリ或ハ一北トス此
 灌腸ハ他ノ諸藥ニ優リテ泄瀉ノ効偉ナリトス欲爾田斯
 名ハ阿魏ニ錢ヲ以テ加密列濃浸ニ和シ灌腸スルヲ稱譽
 セリ遠突土名ハ瓦刺扶阿刺草半錢ノ煎汁ヲ以テ灌腸ハ
 慢嬰兒名吐糞症尋常ノ方法効アラザル者ハ亞麻子油多
 量ヲ以テ一時半或ハ二時毎ニ灌腸ノ殊効ヲ得タリト云
 フ腸管ノ一部捲又詳ニ上セルニ因テ来ル者ハ上ヨリ下
 ニ捲シ下ヨリ上ニ捲スルヲ論セズ救急會私機名空氣ヲ
 腸ニ送入シ或ハ排氣器ヲ以テ腸中ノ氣ヲ排除スルヲ稱
 賛ス○乾角法下腹緩和鎮座琶布微温湯浴等皆此症ニ於

テ怠ルベカラス○危篤ノ症他藥効ナキハ生水銀ヲ試
 ムベシ謾ニ之ヲ畏レテ用ヒザル者アリト雖已ニ庶幾ス
 ル所アラザル者モ亦之ニ由テ死ヲ援フト往往鮮シトセ
 ズ但燃衝ノ徴アル者ハ嚴ニ忌ムベシ每服一食匙
秤量一亞麻子油ニ和用ス或ハ更ニ加増ノ半北乃至一
半トス此ヲ用之之ヲ服ノ速ニ瀉スル者尠カラス

○第一千五百五十二方穢歇蘭度

亞麻油新絞者

右每半時服一食匙或隨其症尚加多

主治此劑ハ腸中ノ鬱畜ヲ排泄シ腸ノ運機ヲ本復スル

一他ノ峻下劑ニ優リテ一良藥トス

○第一千五百五十三方

蓖麻油子四

右每半時服一食匙乃至二食匙

主治同上

○第一千五百五十四方戒歐蘭度

上好滿那 荅麻林度 瀉利鹽各一

井水十二子煮耗至八子投旃那葉二錢瀝過加後味

萊阿私越幾斯八 麗春花舍利別子一

右調勻每半時服二食匙

主治 亞麻油効ヲ獲サル者此方ヲ用ヒ且之ヲ服スル毎
ニ亞麻油一匙ヲ兼用セシハ嘔吐ヲ制スルハ里歐利飲
方ヲ兼施スベシ

○第一千五百五十五方同上

甘扁桃油 瀉利鹽各一 蘆薈水製越幾斯半 菲阿

私越幾斯子一 井水子八

右調和丁寧振盪每一時服二食匙

主治 吐糞病之ヲ用ヒテ偉効ヲ奏スルト往往之アリ

○第一千五百五十六方過傑栗屈的兒

瀉利鹽子一 蒸餾水八子溶解加後藥

亞麻油 白罌粟舍利別各一 阿芙蓉越幾斯五

右調和每八分時或四分時服一食匙

主治吐糞病頑固ノ便秘ニ宜シ○若此劑ヲ服ノ每服吐
出スル者ハ稍阿芙蓉ノ量ヲ加増スベシ

○第一千五百五十七方新劑秘

巴豆油五 過爾托根末半

右加達刺ラガト佩篤ペドク護ゴ護ム漿ム適宜為七丸衣白桂末每服一丸乃
至二丸

主治吐糞病ニ用ヒテ瀉スルニ宜シ但焮衝アル者ハ之
ヲ禁ス

○第一千五百五十八方秘歌辭度

煙草葉三錢

右井水九ヲ煮耗至七ヲ濾過每半時服半小盞

主治吐糞病ニ卓越ノ一良藥タリ○蓋服量半小盞トス
ル者ハ稍過多ナリ大抵一食匙或ハ一食匙半ニシテ足
レリ

○第一千五百五十九方連瀉布地葛新墨爾

煙草丁幾二錢

右每半時服十滴

主治吐糞病ニ宜シ兼テ解凝劑ノ罨法ヲ施スベシ

○第一千五百六十方 疝 歇蘭度

煙草葉 半

右熱湯ハ弓乃至十弓浸漬飽熱四分時瀝過供灌腸

主治 總テ内服藥ハ通例立地ニ吐出スルガ故ニ此方更ニ佳ナリトハ實ニ之ヲ施セハ麻酔ノ効ヲ見ハシテ病者萎弱シ大抵萎弱中ニ瀉ヲ得ルナリ ○ 歇蘭度氏上方ヲ以テ功ヲ得タリト云フト雖予ガ見ヲ以テスレバ煙草ノ量甚過多ナリ故ニ之ヲ戒メテ而ノ每症左ニ掲クル 過別爾格弄丕 名ノ灌腸方ヲ稱用ス

○第一千五百六十一方 過別爾格弄丕

煙草葉 十五

右熱湯六弓浸漬十密扣瀝過供灌腸

主治 吐糞病ニ宜シ ○ 過別爾格弄丕 名ノ灌腸ノ効ヲ

獲ザレバ半時ノ后再煙草葉一弓ノ浸液ヲ射注セリ ○

煙草烟ヲ腸ニ送入スルモ亦同ク良効アリ

○第一千五百六十二方

莨菪葉 半刀至

右熱湯適宜浸漬瀝過取六弓供灌腸

主治 痙攣性腸貌 倭屈吐糞病ヲ兼ヌル者之ニ宜シ ○ 莨

若ヲ用フレバ大ニ筋纖維弛緩ニ兼テ知覺機ノ興奮セ

ルヲ制伏ス此故ニ吐糞病腸ノ緊張甚シキ症ニ莨菪ヲ以テ第一等ノ藥トス然レ既ニ麻痺ニ傾ク者ハ之ニ由テ或ハ生命ヲ害スルヲアルガ故ニ用ニ臨テ尤慎重スベシ○且之ニ兼テ貌^グ儂^ク屈^ク上ニ莨菪葉^レ布ヲ貼スベシ

○第一千五百六十三方秘單紐斯

莨菪根錢一 熱湯適宜浸蓋閉飽熱半時瀝過取二三

右加加密列浸等分一頓灌腸或二分用

主治吐糞病ニ宜シ○此灌腸ハ非常ノ峻法ナリト雖私

單紐斯名或ハ加増ノ莨菪根一錢半ヲ用フト云ノ或ハ

云フ顯^シ糞^ス斯名ハ一錢半ヲ用フト

○第一千五百六十四方麻儂里過利

莨菪越幾斯刀一 家猪脂弓一

右調和作軟膏塗擦貌^グ儂^ク屈^ク

主治一千五百六十二方ニ同シ

○第一千五百六十五方

巴豆油五滴至二十滴 白罌粟油五滴至二十滴

右調和大概六滴乃至十二滴塗擦臍傍

主治總テ小腹壅塞ニ宜シ殊ニ吐糞病ニ好トス或ハ此

油劑二三滴ヲ取テ舌上ニ擦スルモ亦可ナリ

○第一千五百六十六方沒魯

遠西方彙卷之十四

巴豆油三滴

亞刺毘亞護護末一錢半

煙草葉浸五草葉浸

錢一

右調和供灌腸

主治吐糞病ヲ治ス○一患者十四日来大便秘閉シ諸藥効ナクノ死ニ瀕スル者此灌腸法ヲ施シテ一時ノ后惡臭ノ大便大ニ瀉下シ速ニ之ヲ救活スルヲ得タリ

遠西方彙卷之十四

