

遠西方彙

十五

○卷之十五

第三 神經痛

面痛

第四 係神經核系症

依朴昆堙兒

歇倚私的利

自十五百六十七至千六百七十八方

十武9

237

15

武
號 237
卷 15



遠西方彙卷之十五

獨乙 加幾安頓

和蘭 傑婆都 譯

侍醫法眼貫齋伊東 貞文仲 重譯

南洋伊東 亨 健夫 參校

第三 神經痛 子ウラルペイ子ン 羅七

神經痛ノ諸症大抵麻酔藥殊効アリ即非阿斯七方千五百六十

六方莫爾比捏子千五百六十九方 曼陀羅華七方千五百

至千五百七十七方 莨菪千五百八十五方 老利兒結爾斯水等

至千五百七十七方 莨菪千五百八十五方 老利兒結爾斯水等



是十山格碌屈私末兒秩斯千五百八十九方至諸種ノ亞鉛

劑千五百九十四方及ヒ格魯林酸加里千五百九十八方ノ

如キ鑛劑モ亦佳ナリ的列並油六百五十六方。六百五十七

二方モ亦下肢ノ神經痛ニ偉効アリ若夫神經痛ノ發作定

期アル者ハ最幾那劑ヲ的當トス外用ハ灌水殊ニ滴水浴。

射水浴或ハ全身水浸法ニ宜シク又壓定巾。鍼。麻。僞。涅。篤。越

列幾的爾。瓦爾波尼。其他諸種ノ皮膚刺戟法。灸。諸般ノ塗擦

藥千五百七十四方至千五百七十六方。千六百二方至千六百八方ヲ稱賛ス患所ノ神經ヲ

截断ノ良効ヲ奏セシハ僅ニ二三症ノミ

○第一千五百六十七方稱讚蘭度

菲阿私葉 菲阿私越幾斯各十五方 甘草越幾斯適
右為三十九衣石松粉每半時或一時服一粒以至疼痛鎮定

主治諸種ノ疼痛ヲ鎮靜スルニ宜シ

○第一千五百六十八方秘傳松

菲阿私子十方至三十方 白罌粟子一方半至二方 黑櫻實水八

扁桃舍利別二

右調和作乳劑每半時服一食匙

主治神經痛及ヒ不眠ニ宜シ

○第一千五百六十九方麻健蓋

醋酸莫爾比捏六 蒸餾水二 溶解化加後藥

醋酸一 亞爾箇兒二十 滴

右調勻每服五滴乃至十滴

主治神經痛不眠疼痛痙攣ニ宜シ○此液三十六滴中大率醋酸莫爾比捏一ハヲ含畜ス

○第一千五百七十方樓攝魯涅兒

曼陀羅華越幾斯一ハ至 白糖半

右調勻為散分四服每日一服

主治額及七顎ノ神經痛ニ宜シ之ニ兼テ痛處ニ徐徐ニ曼陀羅華越幾スヲ塗ルベシ方中曼陀羅華越幾斯ノ量漸

ク加ヘテ微微麻醉ヲ覺ユルニ至ル

○第一千五百七十一方萊爾質涅篤

的列並油 煨製麻偃涅失亞各半 白糖適

右為四塊每服一塊日四次

○第一千五百七十二方列加爾爾

的列並丁幾附 亞刺昆亞護謨末半 沙糖半

橙花舍利別弓

右調勻分三劑日服盡一劑每服用封糊二箇被包與

主治右二方千五百七十一方諸神經痛殊ニ勝神經及ヒ

足神經ニ係ル者之ニ宜シ六百五十六方及七百五十七方ヲ參照スベシ

○第一千五百七十三方佛列篤叔泥埵爾

升汞一錢 蒸餾水三勺 溶化加後味

舍電阿芙蓉液錢半

右調勻早晚服一食匙

主治經久神經痛癱瘓質斯ニ因ル者之ニ宜シ○升汞ノ量漸ク加ヘテ三錢ニ至ル○濕濡ノ布片ヲ以テ患處ヲ纏包シ以テ發汗セシムル片ハ姑息ノ効アリ○未久ヲ經サル症ハ格兒失屈謨子丁幾ヲ稱贊ス

○第一千五百七十四方刺散松

醋酸莫爾比捏六錢至八錢 家猪脂一錢至二錢

右調和作軟膏剥表皮塗擦

主治神經痛及ヒ劇症癱瘓質斯痛ニ宜シ○蓋莫爾比捏ヲ用フルニ最慎重スヘキハ固ヨリ論ヲ俟タズ

○第一千五百七十五方彪匹

菲阿私油煮製者 二錢 醋酸莫爾比捏一錢

右調勻塗擦

主治前額及ヒ顛顛神經痛ニ宜シ○先芥子粉半勺冷水少許ヲ以テ泥ヲ作り痛所ニ貼シテ後一時毎ニ上方ヲ塗擦ス通例芥子泥ヲ貼スル一二次之ヲ塗擦スル一ニ三日ニメ疼痛鎮靜スルニ足レリ

○第一千五百七十六方 屋兒弗

芥子油十二滴 再留燒酒半勺溶解

右供塗擦

主治 癩麻質斯性諸疾患 癩麻質斯痛 麻痺症等之ニ宜シ

面痛 子ウラルギア。子ル非。チリゲミニ。○プロソパルキア。ドロール。スシエイ。ヲテルギリ。羅ヲテルギルセ。アト

ペンゲシフツ
ペインシフツ

第一原因ヲ蹤迹シテ之ヲ攻ムヘシ 癩麻質斯依屈篤ニ因

ル者ハ雙鸞菊 朴屈福烏篤 蜀羊泉 格爾失屈謨 硫黃劑 安質

没尼劑 升汞等ニ宜シ 間歇スル症ハ規尼捏ニ宜シ 其最劇

症ハ砒石モ亦用フヘシ 列爾砒石溶水ノ如キ之ニ宜シ

腹臍硬結腫アル者ハ吐下藥及ヒ解釋劑ニ宜シ ○直達法

ハ面痛症ノ奇効藥ヲ用フ其品類最多シ即曼陀羅華千五百

十七方至千五百方 雙鸞菊千五百 亞格尼質捏千五百 菘若

千五百八十八方 苦扁桃油千五百 失鳩答千五百 八十七

方 格碌屈私末兒秩斯千五百 至 青酸鋁亞鉛千五百

十四方 鹽酸亞鉛千五百 甘汞或ハ之ヲ單用シ或ハ沙糖ニ

和用シ或ハ麝香ト配シ千五百 或ハ失鳩答越幾斯ニ伍

ス千五百 格魯林酸加里千五百 方 拏攝尼爾設布

點彪奴屈丁幾千五百 等是ナリ又謨私篤氏著ハセル一種ノ

治法アリ千五百 ○外用法ハ麻酔擦藥千五百 硬膏

遠田方彙 卷十五 面痛 四 廣月堂

類水銀膏升汞水。發泡膏吐酒石膏。鉞瓦爾波尼及ヒ越列幾的爾等ヲ稱贊以弄別兒名ハ數回海水南海殊ニ浴スルヲ好トス

○第一千五百七十七方遠埜爾私恒篤

曼陀羅華越幾斯ハ白糖半

右為散分五服早旦一服後四分時一服過一時又一服三服後尚未見麻醉之候者翌朝須取後服次第用

〔主治〕面痛ニ宜シ○經久症ハ先其本病儂麻質斯ニノ后二三日此散ヲ連用スベシ若間歇アリテ屢發作スル者ハ曼陀羅華ノ量一日三分ハ一至ルヘシ之ヲ服

ノ麻酔証ヲ發スル者ハ其治廢幾スヘシ後療法ハ開達格碌屈私末兒秩斯ニ宜シ○別戾名獨碌私的上屋兒弗私歇情上等此治法効驗アルヲ確證セリ

○第一千五百七十八方斯屈列西爾

曼陀羅華越幾斯ハ升汞三蒸餾水半

右調和每一時服三十滴乃至四十滴臨服宜振盪

〔主治〕儂麻質斯痛及ヒ神經痛殊ニ面痛膝痛ニ宜シ

○第一千五百七十九方別連杜

曼陀羅子半玫瑰昆設兒弗半錢入白丁香搗碎加

後味

過兒托根末 宜適

右為六十九衣石松粉每服十九日二次

主治 痺麻質斯痛神經痛 = 殊効アリ 最面痛 = 宜シ

○第一千五百八十方 秘傳 篤滿

甲方

曼陀羅華丁幾 二錢 苕若越幾斯 刀半 苦扁桃濃水 二

右溶和每二時服三十滴乃至四十滴

主治 面痛 = 宜シ ○乙方ト更換シ用フベシ

乙方

鏡屑 刀半 白糖 錢一

右調勻為散分十六包每二時服一包

○之ニ兼テ丙方ヲ患所ニ塗リ以テ其効ヲ助クベシ

丙方

曼陀羅華越幾斯 苕若越幾斯 各一 苦扁桃濃水 三

弓溶解

右每一時半塗擦

○第一千五百八十一方 福 倭 篤

曼陀羅華越幾斯 ハニ 安質没尼酒半弓溶化

右每一時半取二十滴 默栗薩泡劑和服

主治 面痛及ヒ神經病 = 宜シ

○第一千五百八十二方〔穢歌蘭度〕

雙鸞菊丁幾忽弗滿 製半弓

右每服五十滴日四次

主治 儂麻質斯性面痛ニ宜シ

○第一千五百八十三方

垂格尼質捏甘草末十六沙糖舍利別適

右為十六丸衣石松粉每一時半服一粒

主治 垂格尼質捏ハ尤劇劑ナリ殆内服ヲ容スベカラサ

ル者トス一老婦十五分ハ一ヲ服ノ將ニ斃レントス

ルニ至レリ肘倫滂爾名嘗テ屢之ヲ用ヒ十六分ハ一

ニ至レリ然レ後速ニ棄テ用ヒス○今此ニ上方ヲ列舉

スル者ハ特ニ此書ヲ全備セシメンガ為ナリ

○第一千五百八十四方〔私的印律屈〕

菘蓉根 格碌屈私末兒秩斯各三 苜蒲油糖一

右調勻為散分四服蠟紙包裹晨夕服一包

○第一千五百八十五方〔斃倫篤〕

菘蓉越幾斯四老利兒結爾斯水半弓溶化

右每服三十滴日三次

主治 右二方一千五百八十四方面痛ニ宜シ

○第一千五百八十六方〔調忽倫〕

第一千五百八十六方〔調忽倫〕

苦扁桃油二十滴

再餹燒酒三

右調和每服十滴乃至二十滴日四次

主治神經痛殊ニ面痛ニ宜シ○蓋之ヲ用フルハ尤謹慎ヲ加フベシ

○第一千五百八十七方第陽

阿魏 失鳩答越幾斯各二錢 纈草根 鹿角鹽各一錢

右調和加琥珀丁幾二為一丸衣桂末朝暮服十粒

○第一千五百八十八方同上

瘡瘡木脂 阿魏 失鳩答越幾斯各一錢 雙鸞菊越幾

斯半錢 甘汞十五

右調勻二為一丸衣桂末朝夕服五粒乃至十粒

主治右二方一千五百八十七方面痛ニ宜シ

○第一千五百八十九方第篤中損

格碌屈私末兒秩斯一錢 苜蒲油糖半

右調勻為散分六服蠟紙包裏每服一裹日二三次

主治衆醫格碌屈私末兒秩斯ヲ以テ顔面神經痛ノ一奇

藥トシ或ハ之ヲ多量用フ○其他神經性頭痛耳痛胃痛

等ニ卓越ノ効アリ

○第一千五百九十方第篤結

格碌屈私末兒秩斯二錢 桂皮末半錢

右調勻分為六服日服三服

主治面痛ニ宜シ

○第一千五百九十一方刺骨私

格碌屈私末兒秩斯半 白糖一 過泥子油糖錢二

右調勻為散每服一茶匙日二次乃至四次

主治神經痛並ニ全身殊ニ胃腸衰弱ニ宜シ

○第一千五百九十二方委私爬田名地栗屈的兒

撒兒末爾秩斯十二 曹達乾者六八

右研和為散日三服

主治面痛ニ宜シ○一患者格碌屈私末兒秩斯ヲ連用ス

ル一七週其量漸ク加ヘテ終ニ每日一錢ニ至リ之ヲ三分シ用フルモ絶エテ効ナシ今栗屈的兒氏滌弗涅兒名ニ倣フテ上方ノ如ク新製格碌屈私末兒秩斯ノ方ヲ處セリ服量每次五ハ日ニ十五ハヲ連用スル一四日ニシテ既ニ疼痛減シ十日ノ後全ク鎮靖セリ而メ之ヲ持重スル一十八日ニ至レリト云フ

○第一千五百九十三方職屈私

格碌屈私末兒秩斯錢三 醋酸莫爾比捏一 芳香散錢一

右調和為散分十服每一時半服一服

主治同上○兼テ朴麻篤膏附 半ヲ歇刺篤里涅二ハヲ調

和ノ軟膏ヲ作り塗擦ス

○第一千五百九十四方速別備歌懼

青酸銹亞鉛半々至 府利油糖五

右調和為散分六服蠟紙包裏日三四服

主治面痛ニ宜シ○小心ノ漸漸服量ヲ加増スベシ

○第一千五百九十五方預結

鹽酸亞鉛一 甘海鹽精二錢溶化

右調和每二時五滴沙糖水和服

主治面痛癩癩舞蹈病ニ宜シ○蓋鹽酸亞鉛ノ内服ハ尤

慎重スヘシ

○第一千五百九十六方乙。百。弗。蘭。屈。乙。弗。蘭。屈。

上好麝香一 甘汞 金硫黃各半 白糖六

右調勻為散分八晝晨夕服一晝

主治諸種ノ面痛頑固ニシテ他藥ヲ受ケザル者ハ上ノ

ニ氏此散ヲ用ヒテ治セリ○弗フ肝レ爾ル田テ蒲ハ蘭シ突ト名ハ甘ハ汞ハヲ

用フル一日ニ四ハヨリ六ハニ至リ沙糖ニ研和ノ四服

以テ大ニ吐涎セシム或ハ水銀膏日ニ一錢乃至二錢ヲ

塗擦シ此法ヲ以テ面痛二十人ヲ全治セリ弗フ律レ墨ル爾ハ名

ハ二症ヲ療メ水銀膏ノ効驗アルヲ確證セリト云フ

○第一千五百九十七方没列魯

甘汞ハ 失鳩答越幾斯ハ 白糖ハ

右調勻為散分六服朝夕一服

主治面痛ヲ根治ス

○第一千五百九十八方葛弗歇魯綿私篤庚土

格魯林酸加里ハ 蒸餾水ハ 四勺溶化

右調勻每一時服二食匙

主治癩麻質斯性神經痛面痛神經性膝痛ニ宜シ

○第一千五百九十九方兒越索斯

格魯林酸加里ハ 白糖ハ

右調勻為散分八包每服一包日三次

主治面痛ニ宜シ○索斯ハノ説ニ據ルニ格魯林酸加里

ハ確効ノ奇藥トス可ラス唯之ヲ佐藥トシ用ヒテ可ナ

リ○然ル格魯林酸加里ヲ用ヒテ其症多少寛解ヲ得シ

者尠カラス或ハ先哲之ヲ經驗シ此痛楚全治セル者モ

亦之アリ○又索斯ハ甚鹹治ヲ稱賛セリ假令根治ヲ得

サルモ劇痛之カ為ニ姑息シ數月間微痛モ亦發セサル

者アリ再發スル時ハ復ニ三日間鹹治ヲ施ス一日ニ一

次或ハ二次ス

○第一千六百方荷弗蘭屈

荷捕尼爾設布點彪奴屈ハ 丁幾ハ

右每服二十滴乃至四十滴日二三

主治面痛ニ宜シ○舒攝尼爾設布點彪奴屈名虫ハ新採ノ

者六十箇乃至八十箇ヲ以テ燒酒一弓ニ浸ス一八日ニ

メ成ル

○第一千六百一方 謨私篤名人傳染病防禦發汗散スニル

リフキス。アソコ。チコシ。タギオシス。モスチ

上好麝香 葛私篤モス 龍腦各半 精製消石

艾根半 吐根半 攝爾扁太里亞根 琥珀油糖

各六

右調勻為散分六畏

主治猩紅熱神經熱等ニ感染セル者謨私篤氏此散ヲ與

フ但其第一期異常ノ神經証ヲ見シ而メ全ク熱性或ハ

嗽衝ヲ帶ヒザル時之ヲ用フルナリ病者蓐ニ就キテ温

覆シ八分時毎ニ此散一畏ヲ服シ後接骨木花泡劑ヲ温

服セシメ以テ發汗スルニ至ル大抵ニ服乃至四服ニノ

効ヲ奏スルニ足ル又歇倚私的利家ノ半面痛膝痛及ヒ

面痛症患者衰弱シテ熱ヲ帶ヒサル者謨私篤氏此散ヲ

處ノ偉効アルヲ徵セリ○謨私篤氏面痛治法下款ノ如

シ總テ藥劑劇性ニノ身軀ヲ激スル者ヲ忌ミ病人強壯

ニノ面痛未久シキヲ經サル者ハ患ル所ノ一方ニ蟻鍼

二三條ヲ施シ刺戟衝動セザル飲食ヲ命シ冷水ヲ多服
セシメ梅那橙葉泡劑ヲ用ヒテ毎日大便ヲ得ル一二行
而メ二日或ハ三日毎ニ早旦上ノ散劑一畏ヲ服セシム
ルナリ此散ヲ與ル一十五畏乃至二十畏ニシテ
至十日ニ面痛重症ヲ全治セリ或ハ冒寒若クハ神思勞動
ノ爲ニ其症再發スル者モ亦之アリト雖能ク此方ニ由
テ功ヲ收ムルヲ證セリ又越列幾的兒鍼或ハ麻僞涅篤
ヲ以テ面痛ニ施シ殊效ヲ見タリト云フ

○第一千六百二方 穢歇蘭度鎮靜水
レキオアル。アレントエ
チキユス。ヒヘラエン

老利兒結爾斯水 護烏刺兒度水
各ニ 薔薇水 四

右調和供外用
主治 面痛ヲ洗フベシ且阿芙蓉膏若クハ鉛粉膏ヲ痛處
ニ貼シ項窩ニ角法若クハ串線法及ヒ灸ヲ施シ疼痛發
作スル時ハ小水節ヲ以テ冷水ヲ射注シ疼痛歇ムニ至
ルヘシ○其他穢歇蘭度氏男女ノ春情旺盛及ヒ此ニ基
因セル症即遺精夜間依朴昆垓兒歇倚私的利陰莖勃起
花風病等ヲ治スルニ此水藥ヲ以テ陰部ヲ洗滌スルヲ
稱贊ス但此諸症ニ施ス時ハ醋一二弓ヲ和メ尤效アリ

○第一千六百三方 列如 鄮爾 篤 躑 設 奧 薄 贏 寄 爾

青酸加里附 蒸餾水一弓溶解

右調和醃木棉塗痛所

主治面痛ニ宜シ青酸加里ハ劇藥ナリ青酸鎂加里ト混

同スルヲ勿レ

○第一千六百四方弄拔取度

青酸加里二弓至 家猪脂一弓

右丁寧調勻作軟膏塗擦痛所

主治面痛其他諸神經痛ニ宜シ

○第一千六百五方噎別爾松

精製歌刺篤里捏五弓 家猪脂半弓至

右調和作軟膏取豆大塗擦痛所近圍日二三

主治面痛。膝痛。コキサ一サ一ル一ジ一 一一 膝痛之 肩痛ニ宜シ○歌刺

篤里捏ノ内服ハ不要トス何トナレハ服量僅ニ十六分

ハノ一ニシテ消食機ヲ衰弱セシメ嘔吐頭眩不食症等

ヲ招ケバナリ外用モ亦大ニ謹慎ヲ加フヘシ感覺過敏

ノ人ニ在テハ殊ニ然リトス

○第一千六百六方倚私的爾連

亞格尼質捏六弓 阿列襪油一 家猪脂三錢

右丁寧調和塗擦患所

○第一千六百七方同上

亞格尼質捏ハニ 亞爾箇兒二錢乃至四錢溶化

右用法同上

主治二方皆面痛及ヒ其他ノ神經痛ニ宜シ○亞格尼質

捏ヲ外用スルハ慎重スヘシ第一千五百八十三方ヲ參照スベシ

○第一千六百八方蒲羅揭松

甲方

亞格尼質捏ハニ 再餾燒酒宜適 家猪脂手ニ

右調和作軟膏初取豌豆大塗擦痛所

主治面痛ニ宜シ○此軟膏刺痛ヲ發セシムト雖之ヲ塗

擦スル一二三回ニ及ベハ發作罕ニシテ且劇勢ヲ減ス

之ヲ持重ノ疼痛全ク退クニ至ルヘシ

○第一千六百八方同上

乙方

過篤羅匹涅三ハ至五ハ附 家猪脂三錢

右調和作軟膏供塗擦

主治面痛症患部寒冷ヲ覺ユル者之ヲ用ヒテ卓越ノ効

アリ○過篤羅匹涅ハ苳苳根ヨリ取ル所ノ一分ノ鹵鹽ハカロイ

ナリ其質無色ニメ針芒ヲ結成シ苦味酷烈ニノ惡ムヘ

シ○其効力ヲ較スレバ過篤羅匹涅一分苳苳越幾斯二

百分ニ比スベク又苳苳葉六百分ニ敵スベシ○越箇督エゴウ

耳名入ハ之ヲ水ニ溶化シ内外用ニ供セリ

第四

係神經核系症

シド、レイテン、ノット、フアルヘール、セー、ミ

コノール、ペンス

依朴昆垚見イポコンデリイア羅蘭

此症腹内壅塞アリテ本因ヲナス者多シ其治亦專此ニ從

事スヘシ痔疾條ニ列載セル諸藥九百二方至九百十

此症ニ適應ス即解釋越幾斯劑ニ醋酸加里液孕鹼酒石ヲ

加フル者酒石酸加里曹達四十九方至五十植物絞汁九百

方百一護謨華爾斯藥ニ白石鹼或ハ牛膽ヲ加フル者千六百

千七百方十六百二十九方末里印泉及ヒ葛爾思泉等皆

此ニ屬ス而ノ其清涼鹽類ハ其人感觸過敏ニノ畜血症ヲ

發セントスル者ニ用フベク起熱性ノ護謨華爾斯劑ハ粘

液質ノ者ニ施スベシ硫黃ヲ加フルハ痔疾ノ素因アル者

殊ニ宜シ且感觸非常ニ亢進セルヲ轉變セシムルハ此症

ヲ治スルノ一術タリ其功ヲ收ムルハ之ヲ轉變スル顯草

阿魏千六百廿五方等ノ如キ神經藥ヲ稱用ス輒近ニ至テ

強壯劑殊ニ鑿劑ヲ好トス但先苦味越幾斯劑ヲ與ヘ爾後

括失亜冷浸劑ヲ用ヒ尋テ幾那ヲ投シ終ニ緩性鑿劑ヲ與

ヘ千六百廿五方最後天然ノ鑛泉ヲランセンスブリンスク

ウルバクス並ニ鑛泉ノ名等ヲ用ヒテ全效ヲ收ムヘシ依朴

遠西方彙 卷十五 廣肝堂

昆垚兒家ハ猛烈起熱ノ强壮藥ヲ服スルニ堪ヘズ○總テ
依朴昆垚兒家ハ喜ンテ藥ヲ服スルト雖猥リニ藥劑ヲ用
ヒテ之ヲ侵ス勿レ最要ノ藥劑ニ止マルヲ良トス殊ニ上
圍適度ナラシムベシ開竅氣中ニ運動シ身心操作ノ定課
ヲ立テ食養ヲ淡薄ニスルハ尤須要ノ事件トス○其他冷
水ハ飲料浴法殊ニ又海水浴共ニ用ヒテ神經系ヲ轉變シ且全體
ヲ強健ナラシムルノ一良法ナルガ故ニ殊ニ之ヲ依朴昆
垚兒ニ稱賛ス

○第一千六百九方

蘆根越幾斯 蒲公英越幾斯各三錢 孕鹼酒石半

以上三味如後件溶化

薄苛水 蒸餾水各二

右調勻每頓一食匙日四次

主治感覺過敏多血質ノ人依朴昆垚兒ニ係リ其因有形
ニノ腹内壅塞ニ原ツク者之ニ宜シ植物絞汁及ヒ第四
十九方乃至五十三方モ亦佳ナリ

○第一千六百十方歐蘭度

護謨安沒尼亞幾三錢 白石鹼二錢 硫黃乳 大黃末各一

錢 蒲公英越幾斯適

右二入為一九衣石松粉每服十九日三次

主治筋肉弛緩ノ冷工粘液多キ人ニ於ケル依朴昆埴見
有形ノ因ヨリ来ル者之ニ宜シ其硫黄ヲ加フル者ハ腹
内畜血アル者ニ尤稱用スル所ナリ此症時時肚門ニ放
蟻スルヲ亦好トス

○第一千六百十一方同上

炭酸加里 硃砂各一錢 薄荷水三勺溶化加後味

蘆薈 沒藥 瘡瘡木脂 大黃各半錢 雜腹蘭一錢

右如法飽熟作越栗失爾每服四十滴乃至六十滴日三次

主治上二同

○第一千六百十二方 室卒德名人丸

白石鹼 護謨安沒尼亞幾 蒲公英越幾斯各半

右調勻二匁為一九衣石松粉每服十粒乃至十五粒日三

次

○第一千六百十三方 薩乙歇爾土名人丸

白石鹼 牛膽煮熱者 蘇甘沒尼各三錢 開達格碌屈斯

末兒秩私半錢

右調和加珊篤里越幾斯適宜二匁為一九每朝空心服四

丸

備考其他薩乙歇爾土名人丸ノ一方アリ第七百九十二方ヲ

見ヨ

○第一千六百十四方加乙葛爾度

牛膽煮熱者

珊篤里越幾斯

健知亞那越幾斯各二錢

右調和加大黃末適宜二八為一九衣石松粉每服七粒乃至十粒

○第一千六百十五方過傑栗屈的兒

護謨安沒尼亞幾

白石鹼

大黃末

牛膽煮熱者各一錢

吐酒石水適宜溶化者六八

右調和二八為一九衣石松粉每服十九乃至十五九日三次

○第一千六百十六方同上

白石鹼 阿魏 蒲公英越幾斯各半

右調勻二八為一九衣石松粉服法同上

主治第一千六百十二方ヨリ一千六百十六方至腹內壅

塞症及ヒ依朴昆垺兒ニ宜シ壅塞症經久ノ者ハ灌腸法

九百十九方至九百二十二方ヲ施スベシ○第九百九方乃至九百十四

方及ヒ九百十八方モ亦用フベシ○解釋鑛泉類殊ニ末

里印泉及ヒ結僂私泉並ニ鑛泉ノ名ヲ尤稱賛ス輓近剛鏡泉モ

亦用フ

○第一千六百十七方吐篤

白屈菜越幾斯 蒲公英越幾斯 阿魏 硫黃乳各二錢

蘆薈

透明者十五分

白石

適宜

右二以爲一九衣伊里私弗魯連底那末每服八九乃至十四九日三次

主治依朴昆垚兒ニ宜シ○其症ニ從テ服量ヲ増減シ毎日軟便二三行ヲ得ルヲ度トス

○第一千六百十八方

結列印名依朴昆垚兒散

大黃末

橙皮黃

各二錢

孕鹼酒石

三錢

麻屈涅失亞

一錢

苗香油糖

半

右調勻爲散玻璃壘收貯每服一茶匙日三四次

○第一千六百十九方

硫黃乳

二分

大黃末

一錢

橙皮黃

麻屈涅失亞

各一錢半

孕鹼酒石

各三錢

苗香油糖

各三錢

右調和爲散玻璃壘收貯每服一茶匙日三次

主治依朴昆垚兒殊効方トス瀉下ノ効十分ナラサレハ梅那葉末一錢乃至三錢ヲ加フ○其他第九百九方ヲ參照スヘシ

○第一千六百二十方

沈殿硫黃

二分

大黃末

三分

麻屈涅失亞

五分

孕鹼酒石

橙皮油

半滴

蒲公英越幾斯

適宜

右爲十二塊衣伊里斯弗魯連底那末玻璃壘密封日服三

塊

主治前ノ二方一千六百十八方ニ代用スヘシ

○第一千六百二十一方湯。傑。栗。屈。的。兒。

白石鹼錢二 瘡瘡木越幾斯 牛膽錢各一 橙皮越幾斯

蘆薈水製越幾斯各一

右調勻二公為二九衣桂末從其症每服至八九

○第一千六百二十二方謨私篤

大黃末錢二 白石鹼錢一 蝟蛄石 瘡瘡木末 茴香末

加耶普的油糖各一

右調勻為散每服一茶匙日三次

主治右二方依朴昆垚兒胃中酸敗液ヲ兼ナル者之ニ宜

○第一千六百二十三方嗽。癰。度。

收斂亞的兒錢二 微篤人健胃丁錢六

右調勻每服六十滴乃至八十滴冷水或燕麥粘汁一小盞

和服日三次

主治依朴昆垚兒歇倚私的利症遺精或ハ月經過多等ノ衰弱ヨリ来ル者之ニ宜之ヲ用ヒテ感覺過敏ヲ調理ノ后括失亞格綸僕依蘭苔幾那等ヲ用ヒ灌水ヲ施スヘシ

○第一千六百二十四方同上

明礬 阿仙藥 幾那越幾斯各二錢

右調和二以爲一九衣桂末早晚服五丸乃至十九

主治同上

○第一千六百二十五方過傑栗屈的兒

阿魏丁幾二錢 葛私篤樓謨丁幾 亞的兒各一錢

右調勻每服三十滴乃至四十滴日三四次

○第一千六百二十六方同上

著草越幾斯 纈草越幾斯各一錢半 薄荷水四弓溶解加

後藥

忽弗滿液一錢

右調勻每服一食匙日四次

主治右二方十六百廿五方 依朴昆堙兒及レ歇倚私的利

症ニ用レテ神經運機ノ不調ヲ制スルニ宜シ

○第一千六百二十七方聯屈斯

精製私的列幾尼捏半錢 麻偃涅失亞半錢 大黃 白糖

各一錢

右調勻爲散分十二畧每服一畧日三次乃至四次

主治依朴昆堙兒及レ歇倚私的利ニ宜シ

○第一千六百二十八方

珪土末 半錢至一錢

右分爲二十畏每服一畏日三服

主治近歲一患者アリ頑固ノ依朴昆堙兒ニ罹リ胃腸損敗及ヒ痔疾ヲ兼ヌ而ノ患者甚珪土ヲ喜ムニ由リ沈茂爾滿名精粹細末ヲ撰用シテ良效ヲ得タリト云フ但珪土ハスク連進スヘカラス○先哲モ亦珪土ヲ以テ粘液流出失血依朴昆堙兒心思鬱憂病瘕癰癩心悸動等ヲ治セリ

○第一千六百二十九方穢歌蘭度

蓖麻油一 格碌莖莖 篤丁幾 半

右調和塗擦

主治顯著ノ小腹内閉塞症内臟硬結腫及ヒ此ニ由テ起ル所ノ歇倚私的利ニ宜シ又石鹼硬膏等ノ解凝硬膏類ヲ久用ノ鴻益アリ

歇倚私的利ヘイス テ

此症原由依朴昆堙兒ト殊ニシテ小腹内諸器ノ疾患ニ係ル者ハ甚罕ナリ通例其因陰具ニ在リトス即月經不調白帶下子宮及ヒ卵巢ノ慢性激衝子宮ノ位置變常等持ニ此症ノ起因ニ屬ス○歇倚私的利ノ直達治法ハ神經ノ運機ヲ轉變セシメ之ヲ強壯ニスルヲ主トス是阿魏瓦爾拔奴

謨葛カ私カ篤カ儂カ謨カ橙葉等千六百三十方至千六百四十方所謂歌倚私的利藥ヲ用フル所以ナリ以上ノ藥劑其證ニ當ルキハ効アリト雖之ヲ誤用スル千六百四十六方亦往往之アリ之ヲ緩性瀉藥ト併用千六百四十六方ノ適宜ニ大便ヲ利スル片ハ其證大ニ整理スルガ故ニ更ニ之ヲ妙トス若夫根治ノ偉効ヲ奏スル者ハ保固強壯法トス即鍊劑千五百六十八方至灌水法河水浴海水浴ヲ施シ攝養ヲ節スル等是ナリ但鍊劑ノ如キハ獨尿管系ノ興奮機亢進セサル症ニ用ラベクノ而メ初緩方ヲ投シ後漸猛劑ニ轉スルニ宜シ蓋鍊劑ノ中ニ就テ格磔屈私未見秩斯カヲ優レリトス○冷水ニ浴スルニ福爾咩カハ

下法ヲ用フ其言ニ曰ク予病者ノ強弱ヲ論セス之ヲ冷水ニ浴セシム或ハ始微冷水ヲ用始ハ列氏二十二度乃至二十三度ノ冷水ヲ以テス而シテ患者水中ニ坐スルカ久シキモ毎回十瞥睨乃至十五瞥睨ニ過キカ病者漸ク之ニ慣ル、ニ從ヒ毎日浴水ノ冷一度ヲ降シ而シ其浴スル時刻モ亦隨テ減殺ス冷度漸ク降テ十度ヨリ十四度ニ至レハ其浸坐スルカ極メテ短促ニシテ瞥睨間ニ三次四次六次ニ至ル其法患者浴桶中ニ坐シ棉布ヲ冷水ニ醃シ不斷之ヲ頭上及ヒ頸圍ニ貼カ區寒冷ニ慣ルカハ其棉布上ニ冷水ヲ灌注カ區其

後布ヲ脱ノ裸體ニシ直ニ頭頸及ヒ脊椎ニ流注ス但每
日其度數及ヒ水量ヲ増シ冷度モ亦隨テ降ラシ此法
ヲ行フノ外予又冷水ヲ豚膀ニ盛リテ朝夕小腹上ニ安
セシム病ノ發作頻頻ナレハ隨テ頻頻之ヲ施セリ
上項ノ冷水浴ハ依朴昆堙兒歇倚私的利俱ニ適當ス○歇
倚私的利ノ瘧發作スル片ハ鎮瘧劑千六百四十七方至
千六百六十五方
ニ宜シト雖亦安用スルカレ或ハ羽髮ヲ焚キ或ハ蒜葱
ヲ剉ミ嗅シメテ殊効ヲ奏スルハ屢之アリ芥子泥モ亦貼
スベシ脚湯ハ却テ諸證増進スルハ間之アリ刺絡モ亦害
ヲナス症多シ○病婦訴ル所ノ證狀多多ナルカ故ニ逐一

其治方ヲ處スルハ能ハス蓋其症隱見速ナルヲ常ト凶然
氏患者藥ヲ好ムカ故ニ之ヲ投セスノ徒ニ辨説ヲ費シ以
テ之ヲ慰スルハカムルハ醫信ヲ失フニ殆シ是故ニ一
ニ其方ヲ轉ノ患者ノ需ニ應スルヲ巧ト凶局處ノ定證ヲ
治スルノ方ハ千六百六十六方ヨリ千六百七十一方至ニ
列載ス又歇倚私的利ノ局發證ニ寒罨法ヲ施シ鴻益ヲ得
ルハ多シ○諸種ノ塗擦法。硬膏及ヒ灌腸モ亦用フヘシ十
百七十二方至十
六百七十七方

○第一千六百三十方 舍電發謨名歇倚私的利丸
上好沒藥 瓦爾拔奴謨各一錢半 葛私篤儂謨十五 阿

魏刀半

右加拔爾撒謨李露適宜二公為二九衣石松粉每晚服三九

○第一千六百三十一方 類方

葛私篤儂謨十五 沒藥 瓦爾拔奴謨各半 阿魏一錢

右調勻加續草丁幾適宜二公為二九衣石松粉每服三九 乃至八九日三次

○第一千六百三十二方

瓦爾拔奴謨 白石鹼各二錢

右調勻二公為二九衣石松粉晨夕服六九乃至十九

○第一千六百三十三方弗陽

白石鹼三錢 阿魏 牛膽疑固者 各一錢

右調勻二公為二九衣石松粉玻璃壘收貯每服十九日二次

○第一千六百三十四方同上

沒藥 格綸僕根 撒爾末兒秩斯各一錢 葛私篤儂謨

蘆薈各半錢

右調勻加亞爾鮮越幾斯適宜二公為二九晨夕服十九

○第一千六百三十五方叔拔爾誌

葛私篤儂謨半錢 阿魏二錢 加密列越幾斯適宜

遠西方藥 卷十五 廣月堂

右為百二十九衣桂末玻璃壘收貯每一時半服十九

○第一千六百三十六方和港私

葛私篤儂謨錢一 精製阿魏錢一 薄荷油滴四 纈草越

幾斯宜適

右為九十九衣法尼利末玻璃壘收貯每服六九日三次

主治一千六百三十方ヨリ一千六百三十六方至歇倚私

的利有形ノ因ニ係ル者弛緩症粘液畜積風氣鬱畜墮孿

症等ニ宜シ

○第一千六百三十七方同上

纈草半 橙葉半 默栗薩葉二

○右細剉調勻早晚取二食匙乃至二食匙熱湯浸出

○第一千六百三十八方歇蘭度

綠橙葉 纈草 水楊梅 默栗薩葉各一

右細剉調勻每晚取二食匙注熱湯二小盞浸漬一夜早

晚取其半冷服

主治右二方歇倚私的利及ヒ依朴昆堙兒ニ用ヒテ神經

運機ヲ轉變スルニ宜シ○此方ヲ用ヒテ効ヲ得ント欲

スレバ數月連進スルヲ要ス

○第一千六百三十九方春煙隣

雜腹蘭錢一 蘇格爾需謨葉錢一 附 纈草錢三 橙花半

遠西方藥 卷十五 廣月堂

薄荷葉二錢 胡荽子一錢

右細剉調勻取二食匙水三小盞浸出每服一小盞日三次
温用

〔主治〕歇倚私的利及ヒ依朴昆埵兒ニ宜シ

○第一千六百四十方〔別連杜〕

雜腹蘭半錢 橙花三錢 加密列二

右細剉調和取二大食匙水三小盞浸出一日服盡

〔主治〕依朴昆埵兒及ヒ歇倚私的利ニ用ヒテ神經強壯劑

トス神効アリ

○第一千六百四十一方〔護私篤〕

寶芟荅利斯二 純精酒石一 杜松子油糖

加耶普的油糖各半

右調勻為散分二十二撮每晚若隔晚服二撮

〔主治〕歇倚私的利ノ發作ヲ防グニ宜シ殊ニ其症感觸敏

捷ニノ畜血ヲ兼ヌル者ニ用フベシ○又艾根一刃ヨリ

半錢至三四日毎ニ早旦温麥酒ヲ以テ送下シ蓐ニ就テ

發汗セシメ以テ歇倚私的利ノ發作ヲ防クヲ謨私篤氏

甚稱贊セリ

○第一千六百四十二方〔過佛栗屈的兒〕

大黃末 麻屈涅失亞各一 葛私篤樓謨六

右調勻為散頓服

主治歌倚私的利ノ發作胃中酸液ニ因ル者之ニ宜シ

○第一千六百四十三方〔謨私篤〕

纈草 白芷 默栗薩葉 蘓格爾需謨葉〔附〕 葡萄草

葉〔附各半錢〕 橙葉 加密列〔各一錢〕 菖蒲根 胡荽子 括

失亞 梅那〔各三錢〕

右細剉調勻泡出用

主治歌倚私的利便秘スル者之ニ宜シ○每日瀉二行ニ

過グレハ梅那ノ量ヲ減ス菖蒲根括失亞ノ為ニ嘔氣ヲ

發スル者ハ此ニ味ヲ去ル

○第一千六百四十四方〔過傑栗屈的兒〕

梅那 昆設爾弗〔六錢至十錢〕 酒石酸〔二錢〕 白糖〔半錢〕 橙花

水〔二錢〕 過設印亞的兒〔半錢〕

右調勻每半時或一時服ニ食匙以至得効

○第一千六百四十五方〔同上〕

大黃水製丁幾〔三錢〕 單方葛私篤儂謨丁幾〔二錢〕 滿那

舍利別〔一錢〕 忽弗滿液〔半錢〕

右調勻每一時服ニ食匙以至得効

○第一千六百四十六方〔渴優滿〕

謁刺篤留謨〔附〕 姜〔各一錢〕

右調勻為六十九衣石松粉每晚服一二九

主治千六百四十四方ヨリ千六百四十六方至歌倚私的

利ニ用ヒテ瀉ヲ促スニ宜シ

○第一千六百四十七方

葛私篤倭謨丁幾單方半方

右每四分時或半時取十滴乃至十五滴沙糖和服

○第一千六百四十八方

葛私篤倭謨丁幾亞的兒製半方

右每四分時或半時取六滴乃至十滴沙糖和服

○第一千六百四十九方抄瀉私

過設印亞的兒 葛私篤倭謨丁幾各一 緬草油五

右調勻每八分時服十五滴乃至二十滴以至痙攣鎮靖

○第一千六百五十方過傑栗屈的兒

葛私篤倭謨丁幾單方 忽弗滿液各二錢

右調勻隨症服三十滴乃至五十滴

○第一千六百五十一方同上

葛私篤倭謨丁幾一錢 緬草丁幾亞的兒製二錢 舍電阿笑

蓉液一

右調勻病證發作中每四分時若半時服十滴乃至二十滴

○第一千六百五十二方依拂朗屈

廣肺堂

緬草丁幾 橙皮丁幾各半 葛私篤樓謨丁幾二 亞
的兒半

右調勻病證發作中服一茶匙

○第一千六百五十三方別連杜

舍電阿芙蓉液一 葛私篤樓謨丁幾一 緬草丁幾的亞

兒製

右調勻每二時取十滴十五滴乃至三十滴加密列泡劑點

服

○第一千六百五十四方福假篤

葛私篤樓謨丁幾二錢 鹿角精三 忽弗滿液一

右調和每服四十滴加密列泡劑點服

○第一千六百四十五方過傑栗屈的兒

甘消石精一錢 鹿琥精一 阿芙蓉丁幾一

右調勻每服二十滴沙糖點服

○第一千六百五十六方歇憚

加密列油半 甘海鹽精一

右調勻每服十滴沙糖點服日三次

○第一千六百五十七方叔瀝煙爾

纈草油一的兒製 遏設印亞的兒半弓 溶解

右調勻每半時取十滴乃至十五滴沙糖點服

○第一千六百五十八方過傳栗屈的兒

菲阿私越幾斯刀 鹿瑰精半弓溶解

右調和每服十六滴漸加增

○第一千六百五十九方弗陽

亞爾鮮丁幾 葛私篤倭謨丁幾 鹿瑰精各二錢 舍電

阿芙蓉液刀

右調勻每服四十滴日四次

○第一千六百六十方同上

緬草丁幾 府利丁幾 遏設印亞的兒 各一錢 加密列

蒸餾油 薄荷蒸餾油 各十滴

右調勻每服三十滴乃至四十滴日四次

主治 千六百四十七方ヨリ千六百六十方至歇倚私的利

痙攣ニ亘シ ○但其神經運機ノ變常セル者脈管系觸動

機ノ亢進ヲ兼ヌルト否ルトヲ診別スルヲ要トス觸動

機ノ亢進セル者ハ衝動藥ヲ屏ケテ老利兒結爾斯水。菲阿

私越幾斯。亞鉛華。甘消石精等ヲ用フベシ

○第一千六百六十一方速別倫歌愷

加密列油亞的兒製 甘消石精二錢溶化加後味

礮砂加過泥子精一錢

右調勻每服十滴乃至十五滴沙糖點服日三四次

主治 歌倚私的利及ヒ風氣鬱畜症等ニ宜シ

○第一千六百六十二方 〔過瀉栗屈的兒〕

續草末弓半 葛私篤刀 倭謨二 揮發鹿角鹽錢半

右調勻為散分十五服臨症一服

主治同上

○第一千六百六十三方 複方默栗薩水

默栗薩新葉一 枸椽皮新鮮者 肉豆蔻 胡荽子

桂 水楊梅各一

右細剉注再餹燒酒六比默栗薩水二比飽熟二日後蒸餾

取液減至四分一

主治 此方諸種ノ神經病殊ニ歌倚私的利及ヒ風氣鬱畜

症ヲ治スルニ往昔大ニ稱用セリ用法每服半茶匙一茶

匙乃至二茶匙日ニ二三次

○第一千六百六十四方 類方

默栗薩新葉一 枸椽皮新鮮者 肉豆蔻 白芷各三

桂 水楊梅各一

右注再餹燒酒六比默栗薩水三比飽熟三十六時

○第一千六百六十五方 劉西人名水アリク

白石鹼三 亞爾箇兒一 弓溶化瀘過加後味

鹿角鹽錢半 硃砂加石灰精弓二

右調勻每服五滴乃至二十滴冷水或茶點服

主治歇倚私的利瘧。蛇毒等。宜。○又嗅藥。二用。ハ

○第一千六百六十六方 〔歇私〕

精製酒石鹽錢一 芸香越幾斯錢二 纈草水 綿苔錢里

私布水 加密列水各二 忽布滿液錢一

右調勻每半時服一食匙

主治歇倚私的利瘧。變性嘔吐。宜。○里歇利飲。方及ヒ

沸騰散二方。三方。八百。八百。方。モ亦同効

○第一千六百六十七方 〔弗陽〕

別私バ點ツ設セ弗フ神經丁幾ニ非阿私越幾斯半

右調勻每二時十五滴沙糖或薄荷泡劑點服

主治所謂歇倚私的利家ノ偏頭痛ニ宜シ

○第一千六百六十八方 〔歇私〕

拔爾撒謨露一 甘海鹽精 燒酒各適

右溶和取一茶匙塗擦頭痛處

主治偏頭痛或ハ歇倚私的利家ノ局所頭痛イヌテリキ

スニ宜シ。○亞的兒ヲ點滴シ或ハ枸櫞皮ヲ貼スルモ亦

偉効アリ。歇爾名頑固ノ歇倚私的利頭痛ヲ治スルニ忽

弗滿拔爾撒謨非荅ヲ以テ曼陀羅華丁幾ニ和シ痛處ニ

塗擦スル日ニ二次乃至三次

○第一千六百六十九方秘刺律私

精製阿魏錢半 民埜列里精一弓溶解

右調勻每服四十滴乃至五十滴日三次

主治腦ノ第十對神經ノ瀰蔓セル部ニ係ル歌倚私的利性諸症。痙攣。欬。嘔。咽。喉。及ヒ胃ノ痙攣ヲ兼併セル者此

方ニ宜シ六十八方

○第一千六百七十方弗。貯。爾。姪。蒲。蘭。突。

萬苜越幾斯刀半 亞刺昆亞護謨漿適

已上二味丁寧調和加後味

井水六 覆盆子舍利別半

右每一時服二食匙

主治痙攣。欬。不眠。及ヒ歌倚私的利性諸症ニ宜シ

○第一千六百七十一方福。屈。篤

雜腹蘭末十八 阿芙蓉末三 洛黥私 非和 沙十 越幾斯

蒿苳ノ一種

右調勻為十二丸。衣金箔。玻璃。壘。收貯。每晚臨卧取一丸。顯草泡劑送下

主治歌倚私的利不眠症ニ宜シ

○第一千六百七十二方

卷之三 欽和私的利 三十一 廣 月 堂

阿芙蓉丁幾 硃砂加石灰精各一錢 忽弗滿拔爾撒謨

非荅半 複方白芷精二錢

右調勻塗擦

○第一千六百七十三方過佛栗屈的兒

阿魏丁幾 阿芙蓉丁幾各二錢 複方乳香精半

右調勻塗擦心窩

○第一千六百七十四方同上

琥珀油半 薄荷油十五滴 硃砂揮發華水 鹿琥精

舍電阿芙蓉液各一錢 非阿私油 加密列油各煮製者六錢

右調勻塗擦心窩

○第一千六百七十五方同上

瓦爾拔奴謨加雜腹蘭膏附一 阿魏膏二錢 薄荷油十二滴

滴

右捏和攤單貼心窩

○第一千六百七十六方別連杜

加密列一 熱湯適宜浸瀝過取五 加後味

雞子黃二箇 阿列襪油二 白糖半

右調勻作乳劑為灌腸方

○第一千六百七十七方

阿魏二錢

黃 半 堂

遠西方彙 卷十五 歌倚私的利 三十一 廣 月 堂

右加嬰粟殼煎一匙搗爛濾過為灌腸劑

主治一千六百七十二方ヨリ一千六百七十七方至歌倚

私的利證ニ宜シ

○第一千六百七十八方癩歌辭度

格綸僕根半 井水十二勺煮熟至八勺濾過加後味

錢丁幾 纈草丁幾 橙皮丁幾各一錢

右調勻每服二食匙日四次

主治歌倚私的利ニ強壯劑トシテ用ヒ功ヲ収ムルニ宜シ

遠西方彙卷之十五

江戸芝神明前

書肆

和泉屋吉兵衛

