

遠西方彙

六

○卷之十六

第五 精神病

第三類

慢性病係補給器系症

第一 甲 粘液太過症

鼻孔及氣管粘液太過症

○聖京倔 ○欬嗽

肺臟粘液勞

胃腸粘液鬱積

膀胱聖京倔

十武9  
237  
16





門 七 貳 〇  
番 237  
卷 16

伊東瑤川院譯

# 遠西方彙

原本紀元一  
千八百五十  
二年鏤行

廣胖堂藏



遠西方彙卷之十六



獨乙

加幾安頓

著

和蘭

傑婆都

譯

侍醫法眼貫齋伊東貞文仲重譯

南洋伊東健夫參校

精神病 モルビシキシ 羅

醫者精神病ヲ診シテ其原由一箇有形病ニ係ルヲ會得ス  
ル時ハ乃其本病ヲ治スルヲ第一簡要トシ蓋門脈系ニ壅  
塞アリテ原因ヲナス者常ニ多シ是解釋微苦ノ越幾斯劑

遠西方彙 卷之十六 廣胖堂



二中和鹽類ヲ配スル者四十九方至五十三方九百二方至九百九方緩下劑五十四方至六十一方七百植物絞汁九百  
百八十方護謨安沒尼亞幾九百一十一方九百一十二方九百一十四方  
 老利兒結爾斯水八百八十五方至八百九十七方鑛泉等ヲ用ヒテ鴻益ア  
 リ腹臑感觸甚遲鈍ノ症ハ上ノ諸劑ニ吐酒石ヲ加ヘテ連  
 綿惡心ヲ起サシメ或ハ峻下劑ヲ與フルニ宜シ全身多血  
 及ヒ貴要ノ部多血畜積スル者ハ刺絡及ヒ蟻鍼ヲ施シ總  
 テ消焮法ヲ佳トス○若其起因ノ探索スベカラザル症ハ  
 其腦中異常ノ運營ヲ他部ニ誘導シ或ハ其症狀ニ從フテ  
 之ヲ鎮靜シ感觸敏捷ノ症或ハ之ヲ挑起スベシ腦ノ運營衰弱若  
 麻痺セル者

其之ヲ誘導スルノ法或ハ吐下藥ヲ以テ腸ニ導キ千六百八  
 十一方  
至千六百八十七方或ハ全身浴打膿法串線法灸或ハ頭項胃部等ニ  
 吐酒石軟膏六百三十五方ヲ塗擦シ若クハ吐酒石硬膏六百三  
 十六方ヲ  
 貼シ皮表ニ引クニ宜シ甘朮モ亦瀉ヲ得ルニ至レハ誘導  
 ノ効アリ殊ニ腦焮衝症ニ轉スルノ恐アル者ニ稱用シ全  
 身微温浴ハ每症須要トス頭ニ多血畜積セル者ハ微温湯  
 中ニ浸坐セシメテ頭ニ灌水スルヲ好トス○腦ノ運機尤  
 進セルヲ鎮靖スルニ麻酔藥ヲ以テ功ヲ収ムルノ宰ナリ  
 ト雖然凡實芟答利斯千六百八十八方曼陀羅華千六百九  
 十一方  
千六百九十二方菲阿斯老利兒結爾斯水青酸菘若千六百九十三方  
 千六百九十四方

遠西方書 卷十一 精神病 廣勝堂



阿芙蓉等ヲ用フルヲ常トシ慾火旺盛セル者ハ殊ニ龍腦  
千六百九十五方ヲ稱用ス○腦ヲ挑起スルニハ續草亞兒  
 尼加麝香法尼利亞的兒類ノ衝動藥ヲ專用ス然レ亦効ナ  
 キ者少シトセズ○此他能ク注意ノ以テ飲食消化皮表蒸  
 發大便通利ノ障碍無カラシムルヲ醫治ノ須要タリ蓋其  
 方法極メテ簡易ナルヲ好トス○精神病ニ多量ノ服藥ヲ  
 要スルノ論說ハ不可ナリ却テ之カ為ニ危險ニ陥ル者多  
 シ○精神錯亂ヲ醫スルハ轉神治法心思ヲ轉移シ或ハ之  
 ヲ慰愉スルノ法ヲ云フ  
 ○第一千六百七十九方密優篤設兒

孕鹼酒石 蘆根越幾斯 白蜜各半 已上三味蒸餾  
 水三勺乃至四勺溶解

右每半時服一二食匙  
 主治神思鬱憂及ヒ精神錯亂症腹内壅塞ニ因ル者之ニ  
 宜シ○此方ヲ以テ切ヲ収メント欲スレハ久服ヲ要ス

○第一千六百八十方秦姬隣

孕鹼酒石半勺至一勺 蒲公英流動越幾斯一勺至二勺 綿苔  
 幾里私布水五勺 溶解加後味  
 老利兒結爾斯水半錢 安質沒尼酒錢二  
 右調勻每一時乃至一時半服一食匙臨用宜振盪



主治神思鬱憂症腹内壅塞ニ因ル者之ニ宜シ○或ハ瓦刺秩阿刺越幾斯一錢乃至三錢ヲ加フ然レハ輓近ニ至テ峻下藥ヲ廢シテ用ヒス亦宜ナラズ乎

○第一千六百八十一方 蓮珍帶陽

瓦刺秩阿刺越幾斯 二錢至三錢 櫻實水 三勺 融解加後藥

老利兒結爾斯水 二錢至三錢 精製蜜 一

右調和每服一食匙日四次

主治精神病ニ宜シ

○第一千六百八十二方 連別倫歇愷

瓦刺秩阿刺越幾斯 一錢 格碌董篤丁幾 二錢 溶化加後

味

老利兒結爾斯水 三錢 安質沒尼酒 二錢 橙花舍利別 半

右調勻每服二十滴三十滴乃至四十滴日三次臨服宜振

湯

主治神思鬱憂及ヒ精神錯乱症腹内壅塞或ハ粘液畜積

及ヒ膽液損敗ニ由テ来ル者之ニ宜シ之ニ兼テ格碌董

篤丁幾ヲ塗擦スベシ

○第一千六百八十三方

瓦刺秩阿刺越幾斯 瓦刺秩阿刺末 各一錢 達刺侃篤

蘊護漿 適宜

遠西本草 卷之六 精神病 三 廣勝堂



右二氏為一九衣桂末每服四九乃至六九日二次

主治神思鬱憂症腹內壅塞二因ル者ニ宜シ

○第一千六百八十四方孤刺律私

瓦刺秩阿刺葉八 薄荷油半

右調勻為散分十二服蠟紙包裹每一時半服一包

主治精神病ニ宜シ ○瓦刺秩阿刺漸ク加ヘテ半刃ニ至

ル

○第一千六百八十五方遠突土

白墨列僕里根十五 醇醋適 煮八分時濾取五号加

白糖一号

右調和每一時半取一匙冷水半小盞和服

○第一千六百八十六方灰兒

黑墨列僕里根錢 井水適宜煮濾過取八号溶化孕齧

酒石一号再加後味

清淨蜜二

右調勻每一時半服一食匙

主治右二方鬱憂症及ヒ精神錯乱等其症未發前腹内ニ

頑帶硬結腫アリテ起因ヲナス者ニ宜シ往昔黑白ノ墨

列僕里ヲ以テ精神病ヲ治スルヤ其量患者之ヲ服ノ連

綿不快ヲ覺エ或ハ吐下ヲ發スルヲ以テ度トセリ



○第一千六百八十七方

拔結耳名強壯丸

黑墨列僕里越幾斯

水製沒藥越幾斯各一錢

葛爾儒

別葉宜適

右一氏為一九衣石松粉每服三九四九乃至六九

主治精神錯乱水腫經閉二宜シ

○第一千六百八十八方

實芟荅利斯丁幾半

右每服二十滴乃至三十滴日四次

○第一千六百八十九方

實芟荅利斯葉一至一錢

熱湯適宜浸漬瀝過取四至加

後藥

過爾托舍利別半

右調勻每一時服一食匙

主治右二方千六百八十八方精神病脈管運營尤進シ脈

動心跳疾數ノ症ニ宜シ服量漸ク加増ノ患者不快ヲ覺

工。瀉瀉シ脈不整ヲ見ハスニ至ル

○第一千六百九十方穢歌蘭度

實芟荅利斯葉半 注井水適宜飽熟八分時瀝取六至三

加後藥

老利兒結爾斯水二 精製曹達三錢

石... 藥... 精製曹達



右調勻每一時服二食匙

主治精神病脈管ノ運機元進セル症ニ宜シ之ニ兼テ小量吐酒石ヲ與ヘ且内外冷水ヲ併用セリ蓋外用ハ灌水法ニ宜シク内服ハ密幾斯失爾トシテ日服十六北ヨリ二十北ニ至ル

○第一千六百九十一方 遍茂倫伍

曼陀羅華丁幾半

右每服十滴漸加至二十滴若三十滴日二三次

主治精神錯亂症脈管系ノ太過運管退クノ後之ヲ用フ又感觸過敏ノ症ニ宜シ

○第一千六百九十二方 別連杜

曼陀羅華越幾斯半 甘草膏二錢

右調勻為六十九衣石松粉每服十九日二次

主治精神錯亂及ヒ癲癩ニ宜シ

○第一千六百九十三方 凝格魯杜

菲阿私越幾斯刃半 莨菪越幾斯刃半 老利兒結爾斯水

一弓溶解

右調勻每一時服二十滴

主治精神病感觸過敏ヲ鎮靖スルニ宜シ○菲阿斯ハ阿芙蓉ニ優レル症多シ病人全身多血及ヒ頭ニ多血畜積



シ若クハ便秘シ易キ者ノ如キハ阿芙蓉適當ナラス然  
氏甚過敏ノ症ハ僅ニ一二日ヲ用ヒテ姑息鎮降セシメ  
睡眠ヲ促ノ鴻益アルヲ屢之アリ

○第一千六百九十四方調戒歇蘭度

莨菪越幾斯半 瓦刺秩阿刺錢二 老利兒結爾斯水一

弓溶解

右調勻每服三十滴乃至六十滴日三次

主治精神錯乱及ヒ鬱憂症ニ宜シ○戒歇蘭度ハ老利兒  
結爾斯加莨菪水千四百八ノ殊効ヲ經驗セリ

○第一千六百九十五方暹設耳

龍腦錢半 白糖 亞刺毘亞蘊護漿各一錢

已上三味研和加後藥

酢弓半 接骨木花水弓六 麗春花舍利別弓一

右調勻每一時服一食匙

○第一千六百九十六方

龍腦錢半 亞刺毘亞蘊護末錢一 白糖錢二

已上三味入石臼徐々搗爛加後味

酢弓六

右溶和每服一二食匙日二次乃至四次

主治石二方精神病陰部ノ感觸敏捷ヲ兼又ル者殊ニ此



方二宜シ

○第一千六百九十七方警魯歇屈篤

甘汞二 薩毘那越幾斯四 罌粟舍利別適

右適宜分為塊塊每服一塊

主治精神錯乱症經閉ニ因ル者之ニ宜シ

○第一千六百九十八方同上

格綸僕末錢 大黃末刀二 加密列越幾斯錢二 葛縷子

油五 雜腹蘭舍利別適

右適宜作丸每服四九日二次

主治精神錯乱症經閉ヲ兼ヌル者又歇倚私的利及ヒ依

朴昆垚兒ニ俱ニ供用スベシ

○第一千六百九十九方新滿

醋酸亞鉛錢 蒸餾水六号溶解

右每半時服一食匙

主治神經熱ノ譫語及ヒ顔面羅斯又精神錯乱ニ宜シ○

醋酸亞鉛五錢乃至六錢餘ヲ與ル者往々之アリ

第三類

慢性病係補給器系症

第一 係諸液分泌器症

甲 粘液太過症



鼻孔及氣管粘液太過症 グレンノルロ。ナトリウム。エト。タラセ。カカリユス。コロニキス。羅

○聖京 〇效嗽

單純聖京 〇效嗽 須タズ大抵接骨木花或ハ菩提樹花  
浸一二盞ヲ服ノ以テ其蒸發氣ノ閉塞ヲ復スレバ其症暫  
時ニ一掃スルニ足レリ若其効力更ニ強キヲ要スレハ民  
埵列利精 千七百 若クハ鹿琿精 千七百 ヲ用フベシ其症熱ヲ  
帶フル者ハ聖京 〇效嗽ノ治ニ從事スベシ ハ四方乃至四十方ヲ參照スベシ  
嗽ヲ治スルハ先皮表ノ變調ヲ整復スルヲ要シ後  
和胸泡劑 千七百五方至千七百八方 燕麥粘汁。諸種ノ和胸舍利別等ヲ  
用ヒテ之ヲ寬解スベシ更ニ劇症ニ至テハ礪砂 千七百九方。千七百

十安質沒尼劑及ヒ硫黃劑ヲ必要トシ效嗽頻々ニノ粘液  
分泌夥多ナルモ痰質甚粘膠ニシテ之ヲ豁利スルニ勞苦  
スル者ハ金硫黃 千七百二十六方至千七百二十七方 結兒茂斯密涅刺列 千七百二十七方 小量吐酒石 千七百七十八方 及ヒ蘘葜華兒斯殊ニ蘘葜  
安沒尼亞 千三百五十三方。千三百五十八方。千三百六十四方。千三百六十九方。千三百七十四方。千三百七十九方。千三百八十四方。千三百八十九方。千三百九十四方。千三百九十九方。 ヲ稱用シ其他慢性聖京 〇效嗽ニ用フル所ノ藥劑ハ各  
方下ニ主治ヲ詳ニス

○第一千七百方

民埵列利精 一 接骨木花浸 四 接骨木子舍利別 半  
右調勻每一時服一食匙



〔主治〕單純咳嗽及ヒ聖京偏ニ宜シ

○第一千七百一方

鹿琥精錢一 安質沒尼酒半

右調勻每一時二十滴接骨木花或ハ菩提樹花泡劑點服

〔主治〕聖京偏無熱症及ヒ咳嗽ニ宜シ

○第一千七百二方〔私匹〕 荳

華澄茄錢二 拔爾撒謨篤露露六 拔爾撒謨字露舍利別

甘草膏各一 亞刺毘亞蘆謨宜適

右十以為一球衣桂末每服一球日二三次

〔主治〕經久鼻孔ヨリ粘液流出スル症及ヒ感冒ニ宜シ○

穢歇蘭度氏ノ噴嚏散モ亦用フベシ○羅遠私的印名八

吐酒石四百五 溶液ヲ鼻中ニ射注シ良効ヲ得タリ

○第一千七百三方〔過傑〕 栗屈的兒

甘秉半 菲阿私越幾斯一 蘆謨散附 白糖各十

右調勻為散分四畏每一時半服一畏

〔主治〕聖京偏ノ初起之ヲ制伏スルニ宜シ○栗屈的兒氏

ハ甘秉菲阿斯ノ量ヲ一倍シ用フ

○第一千七百四方〔同上〕

鹿琥精錢一 阿芙蓉丁幾滴 阿芙蓉舍利別附一

右調勻每一時服一茶匙



主治同前

○第一千七百五方戒歇蘭度

和胸劑料弓二 麻爾羅歇葉弓一

右調和為和胸泡劑料

○第一千七百六方

過泥子錢二 甘草錢三 過爾托弓三

右調和為和胸泡劑料

○第一千七百七方孤刺律松

亞麻仁末錢二至 甘草粗末錢一

右調和水二彬篤少項煮沸瀝過取液一日服盡

○第一千七百八方穀優蘭篤

點失刺錢一 過爾托弓半 茴香 過泥子各二錢

右調和為和胸泡劑料

主治一千七百五方ヨリ一千七百八方至聖京屈症ニ宜シ

○第一千七百九方刺雷私

礪砂 消石各半錢至二刀 沙糖舍利弓半 櫻實水弓四

右調勻每一時服一食匙

○第一千七百十方戒歇蘭度

礪砂錢二 甘草膏弓半 茴香 井水各四 過爾托舍利

別弓一 安質沒尼酒滴四十



右調勻每半時服一食匙

主治右二方千七百九方急性及慢性ノ聖京屈ニ用

○第一千七百十一方利胃秘

點尖刺蓮末 冰糖各半

右調勻為散每服一茶匙日三四次

主治聖京屈胸内ニ係ル症粘液膜ノ感觸過敏ヲ兼子粘

痰豁利シ難キ者之ニ宜シ

○第一千七百十二方篤姓

甘扁桃油一 亞刺昆亞蘆謨末適 黑櫻實水半 橙

花舍利別半

右調勻為散劑每三時服一茶匙

主治刺衝秋ニ用ヒテ咯痰易カラシム

○第一千七百十三方賦歐蘭度

蘆根越幾斯半 麻爾羅歐越幾斯 酒石葉各二 安

質沒尼酒 老利兒結爾斯水各一 苗香水各六

右調勻每一時半服一食匙

主治慢性乾咳ニ宜シ

○第一千七百十四方 福偏列爾名和胸散

葛爾儒別葉半 半夏二 過泥子 苗香各一 硫黃

華半



聖京僞 效軟 廣 膠 堂

右調勻為散每服一茶匙日三四次

主治胸内聖京僞二用ヒテ咯痰易カラシムルニ宜シ

○第一千七百十五方 賦歇蘭度聖京僞越栗失爾

葛爾儒別越幾斯<sub>錢一</sub> 蜀羊泉越幾斯<sub>錢一</sub> 苗香水<sub>錢一</sub>

老利兒結爾斯水<sub>錢一</sub>

右調勻每服六十滴日四次

主治乾嗽二用ヒテ非凡ノ効アリ

○第一千七百十六方

金硫黃 菲阿私越幾斯<sub>各二錢</sub> 白糖<sub>錢一</sub>

右調勻為散分六畧每服一畧日四次

○第一千七百十七方

金硫黃 菲阿私越幾斯<sub>各四錢</sub> 亞刺昆亞蘊謨末<sub>錢二</sub>

甘草末<sub>錢三</sub> 白糖<sub>錢六</sub>

右調勻每服一茶匙和胸泡劑送下日四次

○第一千七百十八方

金硫黃 菲阿私越幾斯<sub>各三錢</sub> 亞刺昆亞蘊謨末<sub>錢三</sub>

過爾拖舍利別 井水<sub>各一</sub>

右調勻每一時服一茶匙臨服宜振盪

主治千七百十六方ヨリ千七百十八方至軟嗽二用ヒテ

祛痰ヲ促スニ宜シ○感觸遲鈍粘液質ノ人最能ク金硫

廣 膠 堂



黃ヲ服スルニ堪フ

○第一千七百十九方

金硫黃原本分量 土木香越幾斯宜適

右為三十九衣石松粉每服一二九日三次

主治胸内聖京屈ニ用ヒテ祛痰ヲ促スニ宜シ

○第一千七百二十方弗陽

精製消石半 金硫黃一 龍腦半 精製阿芙蓉四分之

右調勻為散分八畏每服一畏日三四次和胸飲送下

主治乾欬頑固ニ患患者大ニ苦悶シ胸中緊張収縮或ハ

壓迫ヲ覺ユル者ニ陽氏此ヲ稱用セリ

○第一千七百二十一方別連杜

金硫黃錢半 精製蘆謨安沒尼亞幾一錢 遠志末錢

海葱末十五 蒲公英流動越幾斯宜適

右為百五十九衣伊里斯弗碌連底那末玻璃壘収貯每服五六粒日三次

主治經久胸内聖京屈ニ用ヒテ祛痰ノ効アリ

○第一千七百二十二方速別倫歇愷

金硫黃六 加達刺侃篤蘆謨適宜徐々研合加後味

苗香水五 菲阿私越幾斯六 精製甘草膏一錢半 遠



志舍利別 子一

右調勻每一時服一食匙臨服宜振盪

〔主治〕慢性胸中聖京低ニ用フ又氣管嫩衝症ニ用ヒテ局  
處ノ分利ヲ進ムルニ宜シ

○第一千七百二十三方

結爾茂私密涅刺列四ニ以至 菲阿私越幾斯三ニ以至

白糖錢一

右調勻為散分六晝每服一晝日四次

〔主治〕肺臟聖京低ニ用ヒテ痰ヲ利スルニ宜シ○結爾茂  
私密涅刺列ハ金硫黃ト同効ニシ彼ニ比スレハ強力ア

○第一千七百二十四方弗山降  
月故ニ其服量ヲ減セザルベカラズ結爾茂私ハ消食機  
ヲ衰弱セシメ或ハ吐瀉ヲ起シ易シ粘液質家ニ用ヒテ  
最適當ス

○第一千七百二十五方薑室

結爾茂私密涅刺列一 甘草越幾斯三 白糖刀一

右調勻為散分六服早晚一服冷水送下

〔主治〕同上

○第一千七百二十五方薑室 祛痰麻兒茂刺列姪

結爾茂私密涅刺列四 上好滿那錢六 甘扁桃油 海

葱舍利別 遠志舍利別各二



右調勻每一時服一茶匙

○第一千七百二十六方 速外倫歌愷

結爾茂私密涅刺列刀 蜀羊泉越幾斯宜適

右為四十九衣伊里斯弗魯連底那根末玻璃壘收貯每半時服一丸

○第一千七百二十七方 秘拔爾記

結爾茂私密涅刺列刀 刺發私越幾斯宜適

右為四十九衣石松粉每半時服一丸

主治已上二方慢性感胃二宜

○第一千七百二十八方 秘結魯

吐酒石刀半 水適宜融解加後味

白蒸餅心 白糖各適宜

右為百三十九衣石松粉早晚服一丸

主治慢性聖京屈二宜

○第一千七百二十九方 秘歌蘭度

蜀羊泉宜半 井水十勺煮耗至七勺加後藥

孕鹼酒石錢 安質沒尼酒滴六十 甘草舍利列一

右調勻每服二食匙日四次

主治乾救經久ノ症此方之ヲ主トル無テ弗刺涅兒ヲ以

テ胸上ヲ覆ヒ又上膊若クハ胸部ニ發疱膏ヲ貼シ二三



遠西藥書 卷六 聖京屈 咳嗽 廣 肺 堂

週間之ヲ打膿セシムベシ

○第一千七百三十方同上

蜀羊泉越幾斯錢 硫黃華錢半

右調勻一氏為一九衣石松粉每服四五丸乃至八九日四次

○第一千七百三十一方 戒歇蘭度發汗散

精製硫黃錢 金硫黃 龍腦各八 白糖錢

右調勻為散每服一刃尖日二次乃至四次

主治聖京屈。僕麻質斯及ヒ依屈篤症ニ宜シ

○第一千七百三十二方 戒歇蘭度

硫黃華 純精酒石各半 甘草錢 過泥子油糖錢

海那葉二 金硫黃六

右調勻每服一茶匙日三次

主治慢性咳嗽ニ宜シ 兼テ燕麥粘汁。接骨木花泡劑。和胸

飲等ヲ多服セシムベシ

○第一千七百三十三方骨布

精製硫黃二錢至五錢 甘草膏 乳糖 甘草各三錢 伊里

斯弗魯連底那錢

右調勻為散每一時服一茶匙

主治頑滯聖京屈。喘息ニ宜シ 又救血痔疾ニ因スル者及

遠西藥書 卷六 廣 肺 堂



遠西方藥 卷之六 聖京伍 救救 廣 肺 堂

七肺勞初起ニ用フベシ但煖衝性及ビ多血症ハ決メ硫黄劑ヲ投スルヲ勿レ

○第一千七百三十四方同上

精製硫黄三錢 甘草膏四 白糖二

右調和分爲錠七十個每一時服二個乃至四個

主治同上

○第一千七百三十五方 越埵兒名人祛痰散

安息香酸一 甘草末 伊里斯弗魯底那各二錢 精製硫黄半 白糖二 過泥子油 茴香油各十滴

右調勻爲散私葛點刺名器収貯每服一茶匙日三次

○第一千七百三十六方設留室

硫黄華 茴香各一錢 伊里斯弗魯底那 旃那葉各一

錢半 甘草三

右調勻爲散每一時半乃至二時服一刀尖

主治聖京伍ニ宜シ○或ハ病性ニ從テ尚他味ヲ任用ス

ベシ例スルニ吐根末二三分非阿私越幾斯六分精製阿

芙蓉二分或ハ結爾茂私密涅刺列四分或ハ精製礞砂半

錢乃至一錢或ハ精製消石一二錢ヲ配スルカ如キ是ナ

リ

○第一千七百三十七方 複方甘草散

遠西方藥 卷之六 聖京伍 救救 廣 肺 堂



甘草末 旃那葉末各二錢 苗香末 精製硫黃各一錢

白糖六錢

右調勻為散朝夕服一茶匙

主治 聖京屈二宜之又之ヲ瀉藥トスベシ

○第一千七百三十八方

斯百兒麻攝篤錢三 白糖一錢

右調勻為散每服一茶匙日三次

○第一千七百三十九方 戒歇蘭度

斯百兒麻攝篤錢六 亞刺毘亞護錢三 白糖一錢

已上三味徐徐研和加蒸餾水四勺

右調勻每一時服一食匙臨服宜振盪

○第一千七百四十方

斯百麻攝篤錢二 消石錢一 伊里斯弗魯連底那根末

白糖各半

右調勻為散每服一茶匙日三四次

主治 右三方至一千七百三十八方 聖京屈症 欬嗽等二宜之

○第一千七百四十一方 刺曹私

土沐香錢二 井水八勺煮瀝過取六勺加後味

精製礪砂錢一 吐酒石一錢 阿芙蓉舍利別半勺

右調勻每一時服一食匙



主治經久聖京傷及肺管粘液蓄積セル者ニ宜シ

○第一千七百四十二方同上

瓦列阿布失穗點失刺趨附

一種

過兒托各一

甘草錢二

右細剉調和四分取其一水一北半煮一日服盡

主治慢性胸中聖京傷將ニ粘液勞ニ陥ラントスル者肺

臟結核ノ二三軟化ノ膿ヲ吐出スル者此方ニ宜シ

○第一千七百四十三方越層涅魯

瓦列阿布失葉一

右井水一北煮四分時瀝取液十二時間服盡

主治慢性肺管聖京傷ニ宜シ○世上通知スル所ノ栗管

魯人和胸劑一名佛蘭見歇名人ノ泡劑ト稱スル方モ亦

瓦列阿布失葉ヲ以テ製スルナリ

○第一千七百四十四方蓮珍

蘊謨安沒尼亞錢一

鷄子黃宜適

肥束布水四

海

葱蜜一

右調和每一時服一食匙臨服宜振盪

主治肺臟粘液鬱積及ヒ麻痺ノ初起ニ宜シ

○第一千七百四十五方叔拔爾託

蘊謨安沒尼亞錢一

過兒托各半

安質

沒尼酒四



遠西方藥 卷之六 聖京偏 效嗽 廣月堂

右調勻每半時服一茶匙

主治慢性聖京偏二用ヒテ粘痰ノ膠着セルヲ治スルニ  
宜シ

○第一千七百四十六方 福御篤

蓮謨安沒尼亞幾錢一 加甘草舍利別一 半捏和為泥

加後藥

角苗香水錢三 精製礮砂錢二

右調勻為舐劑每服一小茶匙日四次乃至六次

主治肺管ノ粘液膜弛緩及ヒ之ニ因テ發スル所ノ慢性  
粘液款ニ宜シ

○第一千七百四十七方 弗陽

苗香水錢二 越埵兒名和人 和胸丁幾錢二 鹿琬精錢一 實亞

格地温錢二

右調勻每時服一茶匙

主治聖京偏症肺臟ノ感觸過敏緊脹牽急或ハ頑固ノ乾

款ヲ兼ル者ニ宜シ

○第一千七百四十八方 列布野

葛兒儒別越幾斯錢一 至 菲阿私越幾斯錢八 至 苗

香水 甘草舍利別各一 礮砂加過泥子精錢一

右調勻每時服一二食匙

遠西方藥 卷之六 廣月堂



○第一千七百四十九方別連杜

白麻爾羅歇越幾斯錢二 蜀羊泉越幾斯錢一 苗香水

五 礪砂加過泥子精錢二 過兒托舍利別半一

右調勻每一時服一食匙

主治右二方慢性胸中聖京屈二宜

○第一千七百五十方弗栗結

礪鉄華四 菖蒲根末 白糖各六

右調勻為散分十二服每服一服日三四次

主治呼吸器及七腸管上部粘液膜ノ慢性疾患二宜

○第一千七百五十一方穢歇蘭度

依蘭苔 蜀羊泉各半 井水十四勺煮耗至八勺濾

過加後藥

礪砂加過泥子精六十 甘草舍利別一

右調勻每服二食匙日四次

主治頑固欬嗽二宜兼テ攝爾都兒水ヲ用ヒ及ヒ瑞香

皮ヲ以テ片膊ニ貼ス劇症ニ至テハ兩膊ニ貼スベシ

○第一千七百五十二方歇兒仙

依蘭苔煎八 舍電阿芙蓉液十 屋施茂爾二

右調勻每一時服一食匙

○第一千七百五十三方同上

依蘭苔煎八 舍電阿芙蓉液十 屋施茂爾二



實菱荅利斯一以至一以半 此好沒藥 過泥子油糖各五

葛カス私カス加カス栗カス刺カス皮カス刃半

右調勻為散分八服每一時半一服

○第一千七百五十四方同上

阿仙藥引半 常水引四 阿芙蓉加安息香酸丁幾一錢半

屋施茂爾錢六

右調勻每一時服一食匙

○第一千七百五十五方同上

格綸僕末 礪砂華各十 實菱荅利斯一以 乳糖五

右調勻為散分六服每一時半一服

主治一千七百五十二方ヨリ一千七百五十五方至弛緩性聖

京偃咯痰甚過多ナル者ニ宜シ

○第一千七百五十六方弗栗結

甘扁桃油 沒藥丁幾各半 遠志舍利別 橙花舍利

別各一 雜腹蘭丁幾錢一

右調勻每半時服二茶匙

主治聖京偃咯痰十分ナラリル者ニ宜シ

○第一千七百五十七方秘泥煙爾

撒爾非亞油滴八 肥束布油 薯草油各四 亞兒魯末

白糖各一



右調芍為散每一時服一茶匙

主治慢性粘液效二宜シ

○第一千七百五十八方〔職〕歇蘭度

地榆丁幾子一

右每服二十滴乃至四十滴沙糖和服日三四次

主治所謂煩欬二奇効アリ

○第一千七百五十九方〔郵〕彰秘

白地榆根錢三 井水適宜浸漬飽熟四分時瀝過取四子

加後味

過兒托舍利別子半

右調勻每一時服半食匙

主治慢性嘶嘎及七肺管粘液分泌過多ノ症二宜シ

○第一千七百六十方〔庚〕兒

白地榆丁幾錢二 海葱蜜 過兒托舍利別子各一

右調勻每一時半服一茶匙

主治慢性嘶嘎二宜シ

○第一千七百六十一方〔福〕傑爾

安質沒尼酒滴二十 甘草膏丁幾錢半 苗香水子半 過兒托舍利別子一

托舍利別子一

右調勻每三分一時服一茶匙







百四十七方至千亞的兒油類千七百五十七方地榆千七百五十八方至千七百六

方天造拔爾撒謨千七百六十九方等方用方之方歇爾蘭獨

留謨菲阿斯及ヒ阿芙蓉等ノ鎮痙藥モ亦須要ノ症多シ肺

中粘液充積ノ室息ノ恐アル者ハ吐根ノ吐方最即効アリ

○第一千七百六十三方謨私篤

礪砂各二錢 遠志各二錢 甘草各二錢 金硫黃半錢 茴香油半錢 糖半錢

右調勻為散每一時半一茶匙冷水送下

主治輕證粘液勞ニ宜シ

○第一千七百六十四方越魯濕屈

祿別利丁幾不詳一錢 過爾托煎六

右調勻每一時乃至一時半服一食匙

主治聖京屈後之ヲ用ヒテ痰ヲ豁利シ又肺ノ粘液流出

症ニ宜シ

○第一千七百六十五方那連杜

過麻刺葉及根一錢 井水十四方煮瀝過取八方加後味

甘海鹽精一錢 過兒托舍利別一

右調勻每一時服一食匙

主治肺臟弛緩及ヒ粘液溢流症ニ宜シ

○第一千七百六十六方孤剌律秘

遠志一錢半乃 井水十方煮耗至六方加亞兒尼加花

至二錢

卷十六 廣 財 堂



一錢蓋閉飽熟八分時濾過放冷再加後藥

鹿琥精錢一 海葱蜜錢六

右調勻每一時服一食匙

主治老人聖京傷肺ノ弛緩ヲ兼ヌル症胸水初起及ヒ室息症ニ宜シ○鹿琥精ニ代ヘテ礪砂加過泥子精ニ刃ヲ用フルモ亦好

○第一千七百六十七方謨私篤

遠志各一 亞兒尼加各一 水適宜煮濾取四弓半加後藥

龍腦五以亞刺昆亞龜謨研和 安質沒尼酒錢半 遠志舍利別弓半

右調勻每一時乃至一時半服一食匙

○第一千七百六十八方同上

礪砂錢二 龍腦錢六 亞兒尼加花錢半 金硫黃錢五 白糖錢一

右調勻為散每服一茶匙日四次

主治右二方粘液勞肺ノ感觸遲鈍ノ症ニ宜シ

○第一千七百六十九方越平録弗

拔爾撒謨字露化者二錢 幾那水製越幾斯錢六 玫瑰蜜錢三

右調勻為散劑每一時半服一茶匙

○第一千七百七十方弁拂



拔爾撒謨骨痹霍一刀至 加沙糖適宜捏為泥加後味

新鮮驢馬乳北半 攝爾都兒水或法仲水北一

右調勻日服

主治右二方千七百六十九方 肺勞二宜之

○第一千七百七十一方秘拔爾詔

麻爾羅歇越幾斯錢三 依蘭苔濃煎六弓溶化加後藥

甘草膏丁幾錢一 遠志舍利別錢六

右調勻每半時服一食匙臨服宜振盪

主治肺臟粘液溢流弛緩二因ル七ノ及ヒ 粘液勞二宜之

○第一千七百七十二方過傑栗屈的兒

依蘭苔 過麻刺根各三 甘草錢六 蜀羊泉莖錢三

右細剉調和三分取其一水適宜煮每日飲服

○第一千七百七十三方福倂篤

依蘭苔半 幾那錢二 遠志 甘草各一 角茴香錢半

右細剉調勻分六包每日一包水一北煮瀝過服盡

主治右二方肺管粘液溢流症弛緩二因ル者ニ 宜之○第

三百六十九方ヨリ三百七十五方至亦應用方トス

○第一千七百七十四方秘歇蘭度

依蘭苔錢六 蜀羊泉莖錢三 井水十六弓煮耗至八弓瀝

過加後藥



拔爾撒謨舍利列<sub>子</sub>

右調勻每服二食匙日三次

主治聖京屈肺ノ衰弱ニ因ル症粘液溢流ヲ兼又ル者ニ

宜シ

○第一千七百七十五方同上

依蘭荅傑列乙<sub>子</sub> 蜀羊泉越幾斯<sub>半刀至</sub> 甘草舍利

別<sub>子</sub> 礪砂加過泥子精滴<sub>二</sub>

右調勻頻々茶匙抄服一日服盡

○第一千七百七十六方

洞庭藍葉 依蘭荅<sub>各半</sub> 已上二味細剉常水適宜煮

八分時濾過取一北加後味

清淨蜜<sub>半</sub>

右調勻每一時半服半小盞

主治石一方粘液勞<sub>二</sub>宜<sub>シ</sub>

○第一千七百七十七方賦歇蘭度

沒藥水製越幾斯<sub>錢一</sub> 酒石葉液<sub>子一</sub>

右調勻每一時半服四十滴

主治同上

○第一千七百七十八方過傑栗屈的兒

阿魏 蜀羊泉莖末<sub>各一</sub> 紺百設木末<sub>錢三</sub> 沒藥水製



越幾斯錢二

右調勻一匁為一九衣石松粉每服九九日三次

主治栗屈的兒名此人此丸ヲ用ヒテ粘液勞已ニ重證ニ至ル者ヲ治セリ

○第一千七百七十九方賦歌爾度

王幾那 刺達尼根各半 井水十二匁煮耗至八匁濾

過加後味

明礬錢半 過兒托舍利別一匁

右調勻每一時服二食匙

主治粘液勞吐痰夥多ノ症緩劑依蘭苦沒藥効ヲ奏セサル者

之ニ宜シ但其症呼吸ニ妨碍アラサル者ニ用フベシ

○第一千七百八十方思翁傑滿

肝色硫黃錢二 葛兒儒別越幾斯錢二 菩提樹炭末一錢半

拔爾撒謨字露一匁

右調勻為丸衣伊里斯弗魯連底那根末玻璃壘汗貯每服十九日三次

主治肺勞及ヒ氣管咽喉ノ粘液ニ宜シ

○第一千七百八十一方栗屈的兒

麻爾羅歇越幾斯 沒藥越幾斯 精製蘆謨安沒尼亞

幾錢各二 金硫黃錢一 精製甘草膏錢三



右調勻二匁為一九衣伊里斯弗魯連底那末每服四九乃至六九日三次

〔主治〕肺臟粘液溢岀症弛緩ニ因ル者ニ宜シ

○第一千七百八十二方 蒲耳法歇名拔爾撒謨名九

斯百兒麻攝多 勿擲祭亞的列並底那各二

已上二味調和加後味

沒藥末 鵝栗拔奴謨末宜適

右二匁為一九每一時半服一九

〔主治〕粘液勞ニ宜シ

○第一千七百八十三方 低栗匪篤名削瘦病密幾斯去爾

沒藥錢 アレキレテリー水七勺燒酒六錢溶解加後

味

亞爾鮮鹽錢 撒爾末兒秩斯十二 過兒托舍利列一

右調勻每服大食匙日三次

〔主治〕軛近此密幾斯去爾ヲ廢ノ用ヒズト雖粘液勞刺衝

緊張ノ証徴無ク却テ衰弱弛緩ヲ見ハシ全ク熱性ヲ帶

ビズ設令熱アルモ甚微ニ病者夥ク膿樣粘液ヲ咳出ス

レ氏血ヲ混セザル者此方殊効アリ

○第一千七百八十四方 類方

沒藥錢 アレキシテリー水七勺肉豆蔻水半勺溶解



遠西方藥 卷十六 粘液勞

加後藥

幾那丁幾錢六 亞爾鮮鹽刀二 撒爾末兒秩斯刀十六 白糖刀半

右調勻每服二食匙日三次

○第一千七百八十五方 類方

沒藥錢一 酒石鹽刀五 綿刀十 荅幾里私布水刀八 撒兒末

爾秩斯刀一 白糖刀半

右調勻每服一二食匙日四次臨服宜振盪

○第一千七百八十六方 龍腦刀二 白糖刀一

安息香花刀四

右調勻為散分六服每一時一服

主治粘液滯衰弱弛緩甚シキニ係ル症痰粘着シ脈沈ナル者之ニ宜シ兼テ胸上發疱膏ヲ貼スベシ

胃腸粘液鬱積スグレノルロエア。左ントリキリ。エト。インテ

レイムオ。プホル。ムカナル。イン。

此症解釋劑ヲ用フベシ即礪砂四百一方至五百方。二百二十

百八十 孕驗酒石五十方至 孕禁酒石至千七百八十八方 瀉利

七方 鹽吐酒石等之ニ屬ス並ニ峻烈ノ華爾私性植物。彌那。大黃。

千七百九 藥刺巴。蘆薈千七百九十四方至 等ニ宜シ○但已

十一方 上藥劑ノ用量ヲ斟酌シ為ニ虛憊セシメザランコトヲ要ス

遠西方藥 卷十六 粘液勞



胃腸粘液鬱積 廣 肝 堂

胃腸大ニ汚物畜積スルニ後ト時々吐下藥ヲ與フヘシ病  
後切ヲ収ムルハ苦味藥千七百九十六方ヲ用ヒテ以テ各  
部ノ衰弱ヲ復シ再粘液ノ聚積ヲ妨クベシ

○第一千七百八十七方

精製礪砂 精製甘草膏各一錢 吐酒石一

已上三味橙花水四ヲ融解

右調勻每一時服一食匙

主治胃腸粘液畜積ニ宜シ

○第一千七百八十八方

精製孕礬酒石半 常水六ヲ溶解加後味

蒲公英流動越幾斯三錢

右調勻每一時服一食匙

主治同上○五十方ヨリ五十三方至及ヒ五十六方ヨリ

六十一方至亦同効

○第一千七百八十九方穢歌蘭度

麻屈涅失亞 孕礬酒石 大黃 薄荷油糖各二錢

右調和為散每服一茶匙

主治飽食セル者之ニ宜シ又胃腸汚物及ヒ粘液ノ畜積

ニ用フ

○第一千七百九十方朴麗私

第一日 廣 肝 堂



遠方齋 卷十一 胃腸粘液鬱積 三十四 廣 廣 廣

精製麥麩酒石錢二 大黃刀二 茴香油滴六 葛兒儒別越

幾斯宜適

右為六十九衣茴香末每服五丸乃至八九日四次

主治胃腸粘液畜積二宜シ

○第一千七百九十一方同上

大黃 蝟蝟石各一錢 薄荷油滴十 牛膽凝固者二錢

薯草葉末宜適

右為百二十九衣伊里斯弗魯連底那根末每服五丸乃至

八九日三次

主治同上粘液痔二稱譽セル方九百四十四方至七百亦此二

用フベシ

○第一千七百九十二方

蘆薈水製越幾斯錢一 複方大黃越幾斯附半錢

右調勻二爪為一九衣石松粉早晚服一二丸

○第一千七百九十三方敬愷

蘆薈水製越幾斯錢半 葯刺巴末八爪

右調勻為二十九衣石松粉每晚服一九乃至三九

主治右二方胃腸粘液畜積二宜シ

○第一千七百九十四方同上

蘆薈水製越幾斯錢半 葛私篤儂謨末 亞刺毘亞護謨

蘆薈水製越幾斯錢半 葛私篤儂謨末 亞刺毘亞護謨



末各五

右調勻為二十九衣石松粉玻璃壘收貯早晚服一二丸  
主治依朴昆垤兒家胃腸粘液畜積二罹ル者之二宜シ

○第一千七百九十五方屋兒弗

芥子亞的兒油二 亞刺昆亞蘊謨宜適 キイスダム水

白糖二錢至

右調勻為乳劑每一時服一食匙

主治胃中粘液畜積及ヒ之ニ因ル不食症ニ宜シ

○第一千七百九十六方職歇蘭度

忽布滿健胃丁幾附一 橙皮丁幾一錢 格綸僕越幾斯

刃一

右調勻午前午後服八十滴

○第一千七百九十七方同上

亞爾鮮丁幾 複方橙皮丁幾附各

右調勻用法同上

○第一千七百九十八方同上

忽布越幾斯原本秤量 薄荷水一 桂水半

右調勻每服六十滴日三次

○第一千七百九十九方抱久

整魯別利涅附精製 白糖六



右調勻為散分十二包每一時半服一包

主治 瀉弗涅兒名ハ消食器衰弱症ニ整魯別利涅ヲ用フ

托久名ハ衰弱症本復ノ期粘液熱下利格列刺等ニ之ヲ

試用セリ○整魯別利涅ハベルベリス植物名ヒルガリス

及ヒ他種ノベルベリス上同根皮ヨリ採製シヌベルベリ

デ上同ノ類屬タル「マゴニウ」ヨリ得タル結芒質ニシ

テ窒素ヲ含畜ス具氣無ク味甚苦ク黄色微細ノ芒針ニ

シテ光澤絹絲ノ如シ

○第一千八百方秘拔爾記

括失亞半 橙皮錢二 上好列印酒半一北

右浸漬一日濾過每服一盞日三次

○第一千八百一方秘拔爾記

括失亞 睡菜葉各六錢 山柰根 良姜各二錢

健智安那 橙皮各半 蕨那各二 鐵屑六錢

右上好列印酒或昏鳴爾酒ハ右浸安暖所飽熟十二時每

服一利リ遮爾蓋日三次乃至四次

主治 千七百九十六方ヨリ千八百一方至粘液畜積症治

ノ後胃腸ヲ補益スルニ宜シ

膀胱聖京伍リブレノルコウトヘイトデルグラース蘭

膀胱聖京伍ハ痔瘻壅塞ニ因テ来ル者屢之アリ其症ハ肛



門周圍時々蟻蟻ヲ施之解凝劑及ヒ硫黃劑ヲ與ヘ又總テ膀胱粘液痔ニ處スル所ノ藥劑ヲ佳トス九百四十七方至九百五十三方

○且強壯劑衝動藥ヲ併用ヲ用フルヲ最要トス即薯草連

錢草洞庭藍紐百設木幾那殊ニ烏白烏爾識九百四十七方至九百五十二方

撒謨骨拜霍十千八百一十一方是ナリ飲料ニ櫟實寄喜ヲ用拔爾

阿仙藥八百三十一方八百三十三方刺達尼八百三十三方至八百三十二方

篤爾綿點刺九百七十五方等ハ効力更ニ猛烈ナリ用ニ臨

テ尤慎重スヘシ若疼痛増進シ或ハ血脈系ノ觸動機尤盛

セル證狀ヲ見ハセハ速ニ廢メ用フベカラス石灰水百十

方至千八百其藥力更ニ緩ナリ滲出液甚粘膠ナル者或ハ

尿酸ヲ交フル症並ニ尿石若クハ膀胱内潰瘍ヲ發セル症

尤之ヲ用フルニ宜シ○輓近多ク膀胱中ニ藥液ヲ注射ス

ルノ法ヲ稱ス秩歇魯其人ノ法先乳汁扁桃乳亞麻仁煎過

兒托煎等ノ緩和劑ヲ用ヒ後罌粟球阿芙蓉水製越幾斯菲

阿斯越幾斯莨菪越幾斯等ノ麻醉藥一二匹ヲ上ノ藥汁ニ

和用匹其之ヲ施ス一日ニ三次乃至五次トス而シテ每次藥

液ヲ膀胱ニ停ムルヲ十密扭ヲヨリ二十密扭ヲニ至ル膀胱

ノ感觸過敏ヲ鎮靜シ得テ后麻醉加拔爾撒謨劑ヲ注射

ス其方莨菪越幾斯一二匹水三四匹ニ溶ス者及ヒ拔爾撒



護骨滑霍一二錢漸加ヘテ一至鷄子白ヲ加ヘテ乳劑トナシ  
 用之而ノ其之ヲ注射セル毎日一次或ハ隔日ニシテ以  
 テ粘液ノ流出全ク止ムニ至レリ但焮衝証ヲ見ハス片ハ  
 速ニ之ヲ休止ス○又刺魯列滿度名刺拔突同及ヒ秋歇魯  
 其同ハ腐蝕藥液ヲ注射ノ微々焮衝ヲ挑起シ以テ粘液流  
 出ヲ制スト云フ○終ニ會鑛泉ヲ用ヒテ以テ切ヲ収ムベ  
 シ井ルジュンゲル水ヲ用フルヲ最佳トス

○第一千八百二方瀝篤溼兒

精製礪砂 甘草各一

右調勻為散分八畧每一時半服一畧

主治膀胱粘液流出症及ヒ慢性遺精ニ宜シ

○第一千八百三方速突止

烏白烏爾識葉半 茶葉一 常水六勺煮濾過加後味

過爾地舍利別錢六

右調勻每服一食匙日四次乃至六次

主治膀胱聖藥結石等ニ宜シ

○第一千八百四方速別倫歇慳

刺發斯越幾斯錢三 烏白烏爾識葉煎六勺  
者烏白烏爾識葉半勺取

之溶解加後藥

曹達錢一 杜松子傑列乙一



右每一時服一食匙

主治腎膀胱粘液流出症水腫ヲ兼又ル者及ヒ結石ノ初起ニ宜シ

○第一千八百五方福爾篤

烏白烏爾識葉 撒爾非亞葉 松芽各二錢 玫瑰花一錢

洋芹子半錢

右細剉為私百尖斯分六撮取一撮注水一椀容量一名供一日飲料

日飲料

主治利尿器ノ粘液流出症水腫及ヒ結石ニ宜シ○九百四十七方ヨリ九百五十二方至亦膀胱聖藥ニ殊効アリ

リ

○第一千八百六方

〔甲方〕弗肝爾煙蒲蘭突

阿訶尼私根一 井水適宜煮四分時瀝取一匕加後味

海葱蜜半

右調勻每半時服半小蓋

主治膀胱聖藥腎臟結石ニ宜シ

〔乙方〕口ク井サ地 獨都 櫻櫻 櫻櫻

石松粉半 雞子黃二 著草葉浸五

右為乳劑每半時服一食匙



主治膀胱聖京<sub>二</sub>宜<sub>レ</sub>○<sub>一</sub>較姪<sub>ノ</sub>度<sub>ノ</sub>兒<sub>ノ</sub>度<sub>ノ</sub>八<sub>ノ</sub>此症<sub>ヲ</sub>治<sub>ス</sub>

○第一千八百七方護私篤

連錢草 洞庭藍<sub>各二</sub> 滾湯適宜浸漬濾過取<sub>四</sub>弓加

後味

著草越幾斯<sub>錢二</sub> 紺百設木越幾斯<sub>刀二</sub> 精製礪砂<sub>錢一</sub>

右調勻每一時服一食匙

主治膀胱聖京<sub>二</sub>宜<sub>レ</sub>

○第一千八百八方新醫秘

華澄茄末<sub>弓半</sub> 清淨蜜<sub>適宜</sub>

右為煉膏每服一茶匙日三次乃至四次

主治膀胱及<sub>レ</sub>尿道聖京<sub>二</sub>宜<sub>レ</sub>並<sub>二</sub>總<sub>テ</sub>經<sub>久</sub>粘液流出<sub>症二</sub>

宜<sub>レ</sub>

○第一千八百九方雜

麻爾羅歇越幾斯 沒藥越幾斯 吉納護謨<sub>各二</sub> 撒

爾末兒秩斯<sub>錢一</sub>

右調勻二以<sub>為</sub>一九衣伊里斯弗魯連底那每服八九日三

次

主治膀胱及<sub>レ</sub>直腸粘液流出<sub>二</sub>宜<sub>レ</sub>又慢性肺臟聖京

偃弛緩<sub>二</sub>因<sub>ル</sub>者<sub>二</sub>用<sub>フ</sub>



○第一千八百十方

石灰水北一

右每服半小盞

附考或ハ石灰水甘乳若クハ酪等分混和シ之ヲ服ル日

三一北半ニ至ルト云フ

○第一千八百十一方護秘篤

烏白ハ爾識葉ヲ半 井水適宜煮濾取四ヲ加後味

石灰水ヲ一 扁桃乳舍利別ヲ半

右調和每一時乃至一時半服一食匙

主治右二方膀胱聖藥二宜シ

○第一千八百十二方春煙陸

括夫亞屑ヲ半 石灰水ヲ十ハ 入玻璃壘蓋閉浸漬二日

濾過加後味

桂酒水ニ附

右調勻入玻璃壘密閉貯每服半盞日三次

主治虛性粘液流出症殊ニ利尿器ノ粘液流出ニ宜シ又

腸胃衰弱及ヒ依倭篤性全體衰弱ニ用フ

○第一千八百十三方扶歇魯其

拔爾撒謨骨ヲ半 明礬 血竭 阿仙藥錢各一 麻

倔涅失亞適



右為百九日服十九至三十九

主治膀胱粘液流出二宜シ

○第一千八百十四方別連杜

芫菁

乾者

甘扁桃

去皮

石灰水

十

白糖

一

右為乳劑濾過但不用絞每一時乃至一時半服一食匙臨服振盪

主治利尿器ノ虚性粘液流出ニ宜シ○蓋之ヲ用フルハ

大ニ謹慎ヲ加フベシ

遠西方彙卷之十六



