

遠西方彙

十七

○卷之十七

痲

久痲

包莖

○龜頭箱窄

翠丸焮衝

攝護腺焮衝

徽毒焮衝眼

龜頭痲

白帶下

十武9

237

17

門 武 9
 號 237
 卷 17



遠西方彙卷之十七

獨乙 加幾安頓 著
 和蘭 傑婆婆都 譯

侍醫法眼貫齋伊東貞文仲重譯

南洋伊東亨健夫參校

痲 ドブレノルロ ホイスロド
ロイプル 蘭
 痲ハ醫藥ヲ要セス體ヲ勞セス刺戟衝動ノ飲食ヲ

戒メ微温乳錦葵葉若クハ歇爾拔私屈謨煎ヲ以テ毎日數



田龜頭ヲ浴スレハ大低二三週ニメ平治シ後患ヲ遺ス
 ナシ燕麥粘汁。大麥水。米飲。或ハ後ニ列載スル所ノ煎液
 八百二十四方至千方等ノ如キ粘滑飲料ヲ最要トス尚且油質粘
 滑乳劑五百三若クハ扁桃乳。嬰粟乳。大麻子乳千八百十五
 方十七或ハ粘滑散劑千八百ヲ用フベシ○焮衝癩ハ衆醫精
 製消石但多クハ適ヲ乳劑ニ和用シ千八百或ハ甘汞百廿
 方ハヲ佳トス焮衝劇度ニ進ミテ尿閉症ヲ發スルキハ瀉血
 及ヒ温暖琶布ヲ施シ焮衝退クキハ阿芙蓉越幾斯ヲ乳劑
 ニ和シ與フ千八百焮衝癩ハ大使秘スル者多シ清涼下劑
 ニ宜シ千八百三十一方○瘰癧性ノ者ハ乳劑ニ老利兒結

爾斯水五百十 菲阿私越幾斯五百十三方千 或ハ舍電阿芙
 蓉液五百十 和用ス他ノ同種藥例スルニ阿芙蓉小量吐
 根及ヒ龍腦千八百三十三方至モ亦敏性癩ノ痛苦ヲ緩和
 スルニ妙トス之ニ兼テ鎮瘞射注法千八百四十三方ヲ施
 スベシ若其痛失血ヲ兼ヌル者ハ疊布或ハ他ノ射注法
 五百四十方ヲ施スベシ○末期ニ至レハ大抵弛緩症ニ轉移ス
 ルカ故ニ鹽酸重土ニ老利兒結爾斯水千八百方ヲ和服シ或
 ハ拔爾撒謨骨泮藿每服十滴日ニ三服以テ粘液流出ヲ止
 ムヘシ但拔爾撒謨ノ服量漸ク加ヘテ二十五滴ヨリ三十
 滴ニ至ル射注法ハ往昔專行ハレ千八百方輒近復之ヲ稱

遠西方彙 卷十一 癩 廣 册 堂

用スト雖安頓ノ意ニ從ヘハ廢ノ用ヒサルヲ優レリトス
○痲毒ヲ滅スルニ往昔刺必私高私質屈斯ノ射注法千八百四
方ヲ用フ栗格爾突名ハ結晶硝酸銀ノ濃溶液千八百四
最妙ト稱ス吾輩未之ヲ親驗セズト雖身命ヲ委メ救治ヲ
請フ所ノ病者ニ在テ此ノ如キ猛劑ヲ輕試スルハ敢セサ
ル所ナリ

○第一千八百十五方過傑栗屈的兒

甘扁桃去皮 白罌粟子各半 加蒸餾水或如密 一坩搗

爛作乳劑加後味

亞刺昆亞獲謨錢一 過爾托舍利別錢六

右調勻每一時服半小盞

○第一千八百十六方同上

大麻子搗碎 甘扁桃去皮各半 加井水一坩徐々搗碎作

乳劑濾過加後味

過兒把膏附半

右調勻每一時服半小盞

○第一千八百十七方佛律屈涅魯

大麻子一 加常水十六弓徐々搗碎作乳劑濾過溶後

味

亞刺昆亞獲謨錢二 白糖錢六

廣勝堂

右調勻每一時服半小盞臨服宜振盪

主治千八百十五方ヨリ千八百十七方至癩疾ニ宜シ

○第一千八百十八方

阿訥尼私根附一 井水九勺煮瀝取六勺加左味

白糖勺一

右調勻每一時服二食匙

○第一千八百十九方

蘆根一勺至二勺 井水一匕煮

右日服

○第一千八百二十方

蘆根 蒲公英根各半 井水半匕煮將熟加左味

甘草錢二

同上

○第一千八百廿一方

過兒抱根勺四 甘草錢三 亞麻子勺三 大麻子勺二

右調勻供泡劑

○第一千八百廿二方聯歌蘭度

過兒抱根 大麻子各二 茴香 甘草各半

右細剉調勻取二大食匙水四盞煮日服

○第一千八百二十三方篤煙

廣月堂

錦葵葉弓四

過兒托根弓一

大麻子弓三

右細劉調勻取二食匙水四盞乃至六盞煮日服

○第一千八百二十四方

過兒托根末弓半

甘草

垂刺毘亞護謨錢各二

白糖弓一

右調勻為散每服一茶匙亞麻子泡劑送下日四次

〔主治〕千八百十八方ヨリ千八百二十四方至諸痲應用方

トス

○第一千八百二十五方〔遠突土〕

消石一錢半

甘扁桃乳十弓溶解加後味

沙糖舍利別弓一

右調勻每一時服半小盞

○第一千八百二十六方〔同上〕

大麻子搗碎

加常水一匕徐々搗爛為乳劑溶枸椽酸

加里二錢後加左味

過兒托舍利別弓一

右調勻每一時服半小盞

〔主治〕右二方焮衝痲ノ初期ニ宜シ○消石ハ通例利尿器

ノ疾患ヲ進マルガ故ニ衆醫廢ノ用ヒス

○第一千八百二十七方〔同上〕

甘黍廿四

精製硫黃 蜩蛄方各二

上好砂糖弓四

遠田方集

卷十七

四

廣月堂

右調勻為散分八晝早晚服一晝

〔主治〕痲疾焮衝劇度ノ期ニ宜シ○方中甘汞ハ微毒ヲ解スルニアラズ又焮衝ヲ制スルニアラズ大便通利ヲ調理スルガ為ナリ

○第一千八百二十八方〔同上〕

罌粟子半

甘扁桃

去皮四箇

加蒸餾水ハ弓搗爛作乳劑

後加左味

阿芙蓉越幾斯

三

上好砂糖

錢三

右調勻每半時服ニ食匙

〔主治〕痲後ノ尿閉ニ宜シ○先放血シ或ハ會陰ニ蟻鍼六

頭乃至ハ頭ヲ施シ而ノ後麥糠ニ乳汁ヲ和シ或ハ緩和

劑ノ毳布ヲ貼シ温水及ヒ乳汁ノ蒸氣ニ浴シ或ハ接骨

木花歇爾拔斯屈謨浸ノ蒸氣ニ浴シ粘滑藥ヲ以テ灌腸

シ微温湯半身浴等ヲ好トス此ニ由テ焮衝已ニ退クキ

ハ乃上ノ乳劑ヲ與ヘ又菲阿斯葉ノ毳布ヲ用フルニ宜

シ

○第一千八百二十九方〔同上〕

孕鹼酒石

錢二

上好滿那

弓一

右加沸騰大麥煎五弓溶解每半時服ニ食匙以至得効

○第一千八百三十方〔同上〕

答麻林度

半一弓

純精酒石

半

覆盆子舍利別

宜適

右為砥劑早晚服二大茶匙

○第一千八百三十一方〔秘由尼阿魯〕

酒石酸加里

乳糖

各一

右調勻為散每一時乃至一時半取一茶匙冷水和服

主治一千八百二十九方ヨリ一千八百三十一方至焮衝麻大

便不利或ハ胃腸汚物ヲ挾ム症ニ宜シ

○第一千八百三十二方

白罌粟乳

五

菲阿私越樂斯

五

白糖

半

右調勻每一時服一匙

主治靈敏性ノ麻ニ宜シ

○第一千八百三十三方〔遠突土〕

精製阿芙蓉

二八至四八

蜷蛄石

砂糖

各一

右調勻為散分四晝每晚服一晝

○第一千八百三十四方〔婦兒屈〕

吐根末

二

精製阿芙蓉末

四

白糖

二

右調勻為散分四晝每晚臨卧服一晝

○第一千八百三十五方〔遠突土〕

龍腦

四八至八八

薤謨散

二刀

右調勻為散分四晝每晚服一晝

○第一千八百三十六方 〔謨私〕 篤

吐根末 精製阿芙蓉 各一 龍腦 二 白糖 二

右調勻為散分四服每晚一服

○第一千八百三十七方 〔遠突〕 土

龍腦 八 亞刺昆亞蘊謨漿 一 已上二味搗和徐徐加

後味

扁桃稀乳 四 砂糖 三

右調勻每二時服一食匙

主治 千八百三十三方ヨリ千八百三十七方至靈敏性ノ
人麻ニ罹リ夜間陰莖勃起疼痛スル者之ニ宜シ此症先

陰莖根ニ蟻鍼二三條ヲ施スベシ

○第一千八百三十八方 〔遠突〕 土

杜松子傑列乙 二 大麥煎 四

右調勻每二時半服一食匙

主治 痲疾特ニ瘰癧質ノ人麻ニ罹リ嫩衝既ニ退テ後此

方ヲ用ヒテ久痲ヲ防クニ宜シ之ニ代ヘテ蜀羊泉煎ニ

杜松子舍利別ヲ加ヘ用フルモ亦可ナリ

○第一千八百三十九方 〔歌〕 懺

鹽酸重土 半 老利兒結爾斯水半ヲ溶解

右調勻每半時服十五滴乃至二十五滴

主治 痲ニ用ヒテ粘液分泌ヲ減スルニ宜シ 痲衝ノ時期
モ亦用フベシ ○安頓ハ痲衝既ニ去テ后此方ヲ用ヒテ
屢佳効ヲ得タリ 最初重土半ヲ老利兒結爾斯水半ヲ
溶シ漸ク重土ノ量ヲ加ヘテ半錢ニ至ル

○第一千八百四十方 依。過。秘。密。也。

刺必斯高私蟄屈斯 半ハ至 蒸餾水一北溶解

右調和微温每一時半或二時注尿道

主治 交媾後之ヲ施メ痲毒ヲ消亡スルニ宜シ 然レ此腐
劑ヲ施スル過度ナルカレ動輒痲衝ヲ發スレハナリ ○
或ハ痲毒ヲ滌除スルニ微温乳若クハ扁桃油ヲ射注ス

ヘシ ○交媾ヲ終リテ速ニ尿ヲ通スルヲ甚好トス 但包
皮ヲ括約ノ尿孔ヲ閉テ暫時耐忍シテ尿ヲ尿道ニ停ム
ベシ

○第一千八百四十一方 栗格爾突

結晶硝酸銀 十五 蒸餾水一弓溶解

右調勻隔日一回用玻璃水節射注尿道

主治 痲毒ヲ感染シテ後第一日未痲衝ヲ發セサルノ前
減毒方トメ之ヲ用フ

○第一千八百四十二方 其魯單涅爾

阿芙蓉越幾斯 ハ 蒸餾水四弓溶解 加後藥

密陀醋ハ 亞刺毘亞蘊護漿半

右調勻射注日二次

主治 焮衝既退キテ後尚尿道ヨリ毎朝粘膠液淋瀝シ其症彌久スルノ懼アル者之ニ宜シ○密陀醋ニ代ヘテ鉛糖醋三四匁ヲ用ヒテ更ニ妙トス是沉澱スルナケレバナリ○安頭ハ急性麻ニ決ノ射注法ヲ要セス上方ノ如キハ特ニ久麻ニ適當トス

○第一千八百四十三方 遠突土

阿芙蓉越幾斯ハ 蒸餾水二匁 檳榔核汁一匁 溶解

右調勻微温射注日二三次

○第一千八百四十四方 叔列傑兒

白罌粟子半 加常水六匁 搗爛作乳劑加左味

老利兒結爾斯水一錢

右調勻微温射注日三四次

主治 右二方 千八百四十三方 靈敏性ノ麻疾陰莖勃起疼

痛甚シキ者之ニ宜シ

○第一千八百四十五方 遠突土

生明礬一錢 過兒把煎三匁 溶解

右調勻供射注劑

主治 麻疾陰莖勃起ニヨリテ大ニ出血スル者之ヲ止ム

ルニ宜シ亞刺毘亞蘊謨溶液ヲ射注シ或ハ尿孔ノ周圍ニ疊布ヲ施スモ効アラスノ其症危急ニ至ル者獨上方ヲ施スベシ

久麻 ゴノルロア、セキユンダリア

鈍性久麻ヲ治スルノ最峻藥ト稱スル者ハ拔爾撒謨骨痺

霍是ナリ 千八百四十六方至千八百六十一方 華澄茄モ亦同効アリトスト

雖胃腸ノ拔爾撒謨ヲ服スルニ堪ヘザル者ノミ獨之ヲ用

フベシ 千八百六十二方至千八百六十八方 又兩藥相合ノ用フルニ屢之ア

リ 千八百五十六方至千八百六十一方 其他列並底那 千八百六十九方

七方 扶爾撒謨 千八百六十九方 阿仙藥 千八百七十一方

二方 露沒藥 千八百七十七方

番木鱉越幾斯 千八百三十七方 幾那 千八百七十五方 加里

丁幾 千八百七十一方 芫菁 千八百七十九方 等ヲ用フト雖簡易

ヲ好トスルノ醫ハ決メ之ヲ配用スルニ病初刺戟収

飲ノ劑ヲ施スニ十分ナラザレハ其症鈍性久麻ニ變スル

ノ後亦刺戟収歛藥ヲ用フベシ而ノ其類方蕃庶ナリトス

中ニ就テ最試驗ヲ經ルノ多キ者ヲ摺撫シテ此ニ列スハ

八百八十二方至千八百九十二方 ○久麻感觸過敏ニ原ツク者ハ決メ刺戟

衝動藥殊ニ拔爾撒謨劑ヲ用フルニ勿レ内服ハ鑛酸類ハ

八百九十三方并ニ鉛糖加阿芙蓉等 千八百九十五方 嘉稱 千八百九十七方 射

注方ハ嬰粟乳加老利兒結爾斯水 千八百九十四方 阿芙蓉越幾斯

阿芙蓉越幾斯

溶液ニ鉛醋少許ヲ加フル者千八百四醋酸亞鉛溶液等ニ
宜シ千八百九○久麻尿道中ノ潰瘍ニ因ル者ハ華涅滿溶
汞散千八百九硝酸汞千八百九ヲ内服スルノ最簡要タリ但外
用ハ外汞千八百九或ハ刺必斯高千八百九私千八百九蟄屈斯千八百九溶液
ヲ射注シ又婆菱ヲ挿入スルニ宜シ○又婆菱ハ久麻尿道
ノ狹窄ニ因ル者ニ多ク歴驗ノ法タリ

○第一千八百四十六方

拔爾撒謨骨泔霍一

右每服十五滴乃至二十滴日三次

主治鈍性久麻ニ宜シ漸ク増シテ四十滴六十滴ニ至ル

私越秩鐔爾名ハ拔爾撒謨骨泔霍ヲ服スル毎ニ後越栗
失爾茂印失屈篤十五滴水少許ニ和服セシムルヲ妙ト
ス何トナレバ之ニ由テ胃能ク拔爾撒謨ニ堪フレバナ
リ○拔爾撒謨骨泔霍ヲ用ヒテ後尚粘液ノ流出止マザ
ル者ニ暴訥爾田名人幾那濃煎慢症ハ燒酒ヲ以テ尿道ニ
射注シ且冷水ヲ以テ屢陰莖ヲ洗ハシハ

○第一千八百四十七方婦兒屈

拔爾撒謨骨泔霍三 鷄子黃三 加井水五三 搗和加

後味

桂水一 桂舍利別半

右調勻每一時半服二食匙

○第一千八百四十八方録私恒土

拔爾撒謨骨拜霍錢二 亞刺毘亞蘆謨末錢半 已上搗和

加後味

枸櫞水錢二 枸櫞汁舍利別錢六

右調勻每服一茶匙日四次

○第一千八百四十九方祇設思

拔爾撒謨骨拜霍錢半 忽弗滿液錢二 桂舍利別錢一

右調勻每服一茶匙日四次臨服宜振盪

○第一千八百五十方理魯筋屈

拔爾撒謨骨拜霍 枸櫞汁舍利別 橙花水 綿苔錢一

里私布水各半 稀硫酸錢半

右調勻每服一茶匙日四五次燕麥粘汁和服

備考若此方ヲ用ヒテ瀉スル片ハ每服阿芙蓉丁幾二三

滴ヲ加フヘシ

○第一千八百五十一方醫仙滿

拔爾撒謨骨拜霍錢一 薄荷油滴八 丁子油滴二 阿芙蓉

丁幾刀四

右調和每服三十滴砂糖點服日三次

○第一千八百五十二方醫私百鬼

甘扁桃 六錢

丁香搗爛加後味

遏爾把根末 錢一

阿仙藥末 錢半

拔爾撒謨骨泔霍 錢三

右調勻為煉膏每一時乃至一時半服一茶匙

備考此方善治拔爾撒謨骨泔霍惡味ヲ掩フト雖口内

ニ粘着スル片ハ其味嫌フベシ

○第一千八百五十三方 遠突

拔爾撒謨骨泔霍 錢半

蜀羊泉莖越幾斯 錢二

大黃末 錢一

亞刺昆亞蘊謨末 宜適

右調和二公為一九衣桂末每服七九乃至八九日四次

○第一千八百五十四方 西粟布

白蠟 錢一 上微火熔解加後味

拔爾撒謨骨泔霍 錢三 大黃末 錢六

右調勻二公為一九衣桂末每一時服八九

○第一千八百五十五方 嘴兒

拔爾撒謨骨泔霍 加麻屈涅失也 少許者一弓

大黃末 錢二

右調勻四公為一九衣桂末每服六九日三次

主治一千八百四十七方ヨリ一千八百五十五方至鈍性久瘰

ニ宜シ拔爾撒謨骨泔霍ハ此症ニ最効アリ○之ヲ用フ

ルノ後強哥喜少許ヲ服スハ速ニ拔爾撒謨ノ惡味ヲ

消スルニ妙ナリ上方更ニ多量ヲ服スレハ腹痛下利ヲ
發シ易シ大抵拔爾撒謨二三ヲ用ヒ盡セハ其症ヲ治
スルニ足ルト雖後尚量ヲ減メ連進スル一十四日ニ至
ルベシ兼テ又冷水ヲ以テ屢陰莖ヲ洗フベシ

○第一千八百五十六方〔福僞篤〕

拔爾撒謨骨湃霍四錢 加鷄子黃一箇攪和加後味

華澄茄末四錢 玫瑰昆設兒弗半

右調勻作舐劑每服一茶匙日三次乃至四次臨服宜振盪

〔備考〕此方味甚不佳ナリ

○第一千八百五十七方〔袂設兒〕

拔爾撒謨骨湃霍 亞刺昆 亞薺謨末各二錢 橙花水二

已上二味丁寧搗和加後味

華澄茄末二錢

右調和為六塊衣桂末每服一塊日三次

○第一千八百五十八方〔弗附爾田蒲蘭突〕

拔爾撒謨骨湃霍 華澄茄末各一錢 亞刺昆 亞薺謨漿

〔適〕

右三瓜為一九衣石松粉每服五六丸乃至十九或十九餘

日三次

○第一千八百五十九方〔弗栗結〕

右三瓜為一九衣石松粉每服五六丸乃至十九或十九餘

白蠟錢二 上微火熔解加拔爾撒謨骨湃霍半弓捏和放冷些時再加後味

華澄茄末弓一

右調和二八為一九衣桂末每服六丸乃至十九日四次

備考此方殊ニ嘉稱アリ

○第一千八百六十方依不夫門

白蠟錢二 上微火熔解放冷些時加後味攪和

拔爾撒謨骨湃霍錢二

右為八十九衣桂末每一時服八九漸加增

備考每粒拔爾撒謨一八半ヲ含ム

○第一千八百六十一方同上

白蠟刀二 上微火熔解放冷些時加後味攪和

拔爾撒謨骨湃霍錢二 華澄茄末弓半

右為百二十九衣桂末服法同上

備考每丸拔爾撒謨一八華澄茄二八ヲ含ム

○第一千八百六十二方

華澄茄 白糖各一

右調勻為散每服一茶匙日三次

主治久麻ニ宜シ○別魯列印地名ノ病院左法ニ依テ華澄

茄ヲ用ヒテ久麻ヲ治ス其法華澄茄砂糖各一弓ヲ調和

遠方藥 卷十七 十五 廣脚堂

シ散ト為シ之ヲ二分シ每朝卯牌半時ニ方リテ其一分ヲ取り温乳四分彬容量篤名ニ和シ頓服セシメ午牌至後服ヲ停メ午後時々一刀尖ヲ服用メ晚酉牌半時ニ至テ全ク一劑ヲ盡サシム後二日間服藥ヲ停メ唯稀淡ノ飲料ヲ多服セシメ第四日ニ至テ復華澄茄ヲ用フル初日ノ如シ又第五日第六日ハ總テ藥用ヲ停メ第七日ニ至リテ更ニ又華澄茄ヲ用フル初日ノ如シ假令麻ノ流出既ニ休止スル者モ亦之ヲ服セシム第八日ニ方リテ甘汞藥刺巴ノ瀉劑ヲ與フ○上法ノ如ク是ヲ療メ若其症治セザル者ハ復華澄茄ヲ用ヒズノ他藥ニ轉スル

ヲ佳トス○華澄茄ハ胃腸宿患アル者ニ在テハ拔爾撒謨骨泮霍ニ優レリ或ハ之ヲ阿芙蓉ニ配スルヲ要ス何者華澄茄ヲ多量服スルハ患者不和ヲ覺エ或ハ吐瀉腹痛等ヲ發スルヲアレバナリ若華澄茄ヲ用ヒテ便秘スル片ハ此症間瀉利鹽ヲ配用ス勞瘵質或ハ卒中ノ素因アル者及ヒ痔疾家ハ華澄茄ヲ忌ム木乙失速非屈私人ハ諸症ニ害アリト云フ

○第一千八百六十三方謨秘篤

華澄茄半 刺姑石錢 麻屈涅失亞錢 乳糖半
右調勻為散每二時乃至一時半服一茶匙

遠西方彙 卷七 久麻 十一 廣脾

○第一千八百六十四方叔密士

華澄茄錢半

吐根三分八

薄荷油滴一

右調和為散分十二包蠟紙包裹每服一包日四次

○第一千八百六十五方私託爾屈

華澄茄半錢至一錢

礪砂

甘草各半

右調勻為散分六服每一時半一服

○第一千八百六十六方

華澄茄錢一

吉納六

甘草一

右調勻為散分八包每服半包或八一包日四次乃至六次

○第一千八百六十七方獨碌私的

華澄茄 黑櫻實水各一

拔爾撒謨骨泮霍 扁桃舍

利別各半 稀硫酸錢半

右調和為砥劑每一時半服一茶匙

○第一千八百六十八方好斯滿

華澄茄越幾斯亞的兒

亞刺昆亞蘆謨末錢半

蒸餾水

錢一 麻倔涅失亞半一錢

右調勻為九十九衣石松粉每服十九日三次

主治千八百五十六方ヨリ千八百六十八方至久麻弛緩

ニ因ル者ニ宜シ○焮衝ノ時期華澄茄ヲ用フルハ甚危

シ

○第一千八百六十九方遠突上

的列並底那半 上好沒藥錢一 精製甘草膏宜適

右三以為一九衣桂末每二時半服四九

○第一千八百七十方同上

上好沒藥半錢 撒爾末兒秩斯錢三 篤爾綿黥刺根末

錢二 亞刺昆亞護謨漿宜適

右二以為一九每服七九日四次

○第一千八百七十一方同上

阿仙藥錢三 大黃末錢半 勿搦祭亞的列並底那宜適

右二以為一九衣桂末每服五九日四次

○第一千八百七十二方佛蘭葛爾度(祇救首秘)

的列並底那 健質亞那各三錢 吉納 撒爾末兒秩斯

各一錢半

右調勻二以為一九衣桂末每服十九日四次

主治一千八百六十九方ヨリ一千八百七十二方至弛緩

久麻ニ嘉稱アリ此劑必小量ヨリ始メ漸加ヘテ大量ニ

及フベシ

○第一千八百七十三方私託爾屈

番木鱉越幾斯亞的兒製 沒藥末錢二 拔爾撒謨骨拜

霍錢一

遠西本草 卷十 廣脾堂

右調勻二八為一九衣桂末每服六九日四次

主治久麻尿道ノ粘液膜大ニ衰弱セルニ因ル者之ニ宜

○第一千八百七十四方

漢姪爾名治麻煉膏

番木鱉越幾斯水製

胡瓜煎汁六弓溶解加後味

亞麻油鷄子黃研和者一弓蜜弓半

右調勻每一時服一食匙臨服宜振盪

主治時期ニ拘ラス淋ニ應用方トス最久麻ニ好シ

○第一千八百七十五方遠突上

王幾那錢六熱湯適宜浸漬飽熟四分時濾過取九弓放

冷加後味

阿芙蓉丁幾滴八拔爾撒謨亭露舍利別弓一

右調勻每一時服一食匙

○第一千八百七十六方婦兒屈

幾那末錢六井水五弓浸漬飽熟六時屢攪動濾過加後

藥

桂水 橙皮舍利別各半

右調勻每一時半服一食匙乃至二食匙

○第一千八百七十七方同上

幾那末 鐵粉各半 列印酒北

右冷浸十二時屢攪和每一時半服半小盞

主治一千八百七十五方ヨリ一千八百七十七方至弛緩久麻ニ宜シ○幾那ハ弛緩一部ニ止ラズメ全身ニ及ブ者ニ殊稱アリ

○第一千八百七十八方

加里丁幾附ニ老利兒結爾私水半

右調勻每一時三十滴乃至四十滴燕麥粘汁和服

主治弛緩久麻ニ宜シ

○第一千八百七十九方館兒屈

芫菁丁幾三錢

右每一時半五滴乃至二十滴粘滑藥煎汁和服

主治久麻感觸甚遲鈍ノ症ニ用フ○但芫菁ハ假令小量ニ用ヒ或ハ遲鈍家ニ用フルモ亦麻ヲ治セズ直チニ小便艱澁ヲ發スルガ故ニ館兒屈名人モ亦甚其効ヲ疑ヘリ故ニ寧廢ノ用ヒサルヲ優レリトス○若小便艱澁ヲ發スル者ハ乳劑ニ龍腦ラ和用シテ即効アリ

○第一千八百八十方遼突

芫菁末二 龍腦六 乳糖三

右調勻為散分十二畏早晚取一畏裸麥煎汁送下

○第一千八百八十一方同上

光菁末三 亞刺昆亞蘆謨末二 白糖六 甘扁桃皮去

一

右搗爛加蒸餾水八一作乳劑每一時服一食匙

主治右二方八百八十八一方十經久麻感覺甚遲鈍ノ症二

宜シ

○第一千八百八十二方婦兒

石灰水四 榎植核粘汁半

右調勻供射注劑

○第一千八百八十三方同上

刺必斯高私秩屈斯三 蒸餾水四一溶解加後藥

阿芙蓉越幾斯水製 榎植核粘汁半

右調勻同上

○第一千八百八十四方同上

鉛糖一錢至 蒸餾水五一溶解加後藥

榎植核粘汁一

右調勻同上

○第一千八百八十五方同上

皓礬半 蒸餾水或薔薇水四溶解加後味

亞刺昆亞蘆謨漿半

右調勻同上

○第一千八百八十六方同上

升汞二 蒸餾水五勺溶解加後藥

阿芙蓉越幾斯水製 槓植核粘汁一

右調勻同上

○第一千八百八十七方

硝酸銀結晶者一 蒸餾水四勺溶解

右供射注劑或加阿芙蓉丁幾半勺

○第一千八百八十八方婦兒

明礬半錢至 井水五勺槓植核粘汁半勺溶解

右供射注劑

○第一千八百八十九方別

上好幾那一 井水適宜煮四分時濾取液十勺放冷加

後味

赤葡萄酒二 明礬一

右調勻射注日三次

○第一千八百九十方葛拍爾

老利水揚波附 井水適宜煮四分時濾取液八勺溶

後味

明礬一

右射注日三次

○第一千八百九十一方格爾照誤

沒食子末半 井水適宜煮濾取八勺溶後味

明礬錢二 皓礬錢二

右調勻同上

○第一千八百九十二方

阿仙藥 沒藥錢各一

右石灰水四勺溶解用法同上

主治千八百八十二方ヨリ千八百九十二方至弛緩久麻

ニ宜シ○猛烈ノ收斂藥ヲ射注スレハ尿道狹窄シ易シ

○第一千八百九十三方遠突土

越粟失爾必篤利阿里

右每服三十滴乃至四十滴冷水點服日三四次

○第一千八百九十四方同上

硫酸密幾私去爾 代用收斂亞的爾半錢 沙列布淡煎六 覆盆

子舍利別一

右調勻每一時服一食匙

○第一千八百九十五方同上

鉛糖 精製阿芙蓉各三

右調勻為散分十二服每服一服日四次

主治千八百九十三方ヨリ千八百九十五方至久麻感觸

過敏ニ因ル症ニ宜シ○一病者此方ヲ用フルヲ三日ニ
ノ全治セリ

○第一千八百九十六方〔安威〕

醋酸亜鉛ハ 蒸餾水ヲ

右微温射注日二三回

〔主治同上〕○或ハ叔列傑兒名人及ヒ其魯單涅爾名人ノ方ハ
百四十四方ナリ此症ニ用フベシ

○第一千八百九十七方〔遠突五〕

硝酸汞溶液ハ 蒸餾水ヲ

右調和早晚服一食匙

〔主治〕麻ニ因テ尿道潰瘍ヲ生スル者ニ宜シ○之ニ兼テ

華涅滿名人水銀硬膏ノ婆菱ヲ用フベシ

○第一千八百九十八方〔門的斯西〕

升汞ハ 蒸餾水四ヲ溶解

右供射注劑

○第一千八百九十九方〔其魯單涅爾〕

刺必斯高名秩屈斯半 蒸餾水六ヲ溶化紙濾

右射注日三次

〔主治〕右二方久麻尿道潰瘍或ハ狭窄ニ因ル者ニ好シ○
婆菱ハ此症ニ偉効アリ

包莖 龜頭 箱窄 シモシス。エト。ハラ。ピモシス。羅フルナ一井
グ。スシ。ヘット。ルー
テホトフト蘭

焮腫甚シキ症ハ包皮ニ蟻鍼三條乃至六條ヲ施シ次テ麥
糠及ビ籩烏刺兒度水ヲ以テ琶布ヲ作り微温シ施スヲ好
トス或ハ緩和劑ニ菲阿斯葉乳汁ヲ加ヘテ琶布ヲ作り温
暖シテ貼スルモ稱譽セリ但之ヲ施スハ慎重ヲ要ス何者
安頻緩和藥ノ温暖發法ヲ施シテ后其症寒壞疽ニ變シ尋
テ斃レ、者アリシヲ想ヘハナリ○上症ニ及ノ焮腫頗羅
斯性即水腫状ノ症ハ香竈藥ニ龍腦ヲ加ヘ千九百方至
蒸劑トスベシ○総テ包莖ハ微温乳汁或ハ過爾托煎或ハ
石灰

水ノ加フヲ射注ノ龜頭及ヒ包皮ノ内面ヲ清潔スベシ
九百三方千九百方
或ハ患處感觸過敏ナラザル者ハ外汞射注法千九百方ヲ稱
用セリ寒壞疽ニ變セントスルノ恐アル者ハ幾那櫛皮ニ
止腐藥ヲ加ヘテ琶布或ハ蒸漏法トスヘシ千九百五方至
包莖ニ外術ヲ施スハ尤危険ノ法トス之ガ為ニ焮衝ヲ増
シ寒壞疽ニ變スルヲ愈速ナレバナリ○内服藥ハ効アル
トナシ但シ真焮衝症ハ乳劑ニ消石ヲ和シ用ヒ方十一或ハ
刺篤亞斯ニ枸椽汁ヲ和スル者方一ヲ稱用ス羅斯性焮衝ハ
阿芙蓉加龍腦ニ宜シ包皮内ニ微毒瘡アル者ハ水銀劑ヲ
用フルヲ要ス

○龜頭籍窄症ハ之ヲ包莖ニ變セシムベシ
或ハ明礬溶水千九百方或ハ消石礪砂溶液千九百方ヲ以テ龜頭ヲ掩フベシ上方効アラザルハ毘私ストク利リ器キヲ以テ包皮ヲ截割スルノ外他術アルナシ其他一々包莖ノ治法ニ同シ

○第一千九百方

薄荷葉 菲阿斯葉 各半 加密列 接骨木花 豆粉 各一

右為散作藥枕子温暖貼之

○第一千九百一方

薄荷葉 接骨木花 各二 龍腦 一錢
右為散用法同上

主治右二方羅斯性包莖頗神經性ヲ帶フル者ニ宜シ

○第一千九百二方

默栗薩葉 迷迭香葉 加密列 接骨木花 各末一 龍腦 一錢

右調勻乾貼

主治水腫状包莖ニ宜シ

○第一千九百三方層矣堙爾

石灰水三 過爾托煎三

右調勻射注包皮內

主治之ヲ射注ノ包皮内ニ鬱畜セル汚物ヲ洗除スベシ

○第一千九百四方

升汞二 蒸餾水八三 阿芙蓉丁幾半錢溶化

右調和用法同上

主治包莖感觸靈敏ナラザル症ニ宜シ並ニ包皮内ニ發

セル疔瘡ニ好シ

○第一千九百五方遠突

幾那末三 芸香葉 亞兒尼加花各末一

各末一

右調勻加温酒作毬布

○第一千九百六方同上

檫皮三 井水適宜煮四分時煮將熟投亞爾鮮葉蘇格

爾需謨葉各一三 浸漬八分時濾過取一坵冷定加後

味

龍腦精三

右調勻微温浴患處

主治右二方千九百五方 包莖症包皮惡色ヲ見ハシ茶褐

班ヲ生シテ寒壞疽ニ變スルノ恐アル者之ニ宜シ○此

方ヲ施スノ前焮衝極度ノ時期氷冷水ノ罨法ヲ行フベ

遠西方書 卷十七 包莖 三 廣

○第一千九百七方

木炭 幾那錢各六 水楊皮 菖蒲根各二

右調勻為散加赤葡萄酒作毬布微温貼患處

主治寒壞疽性包莖及龜頭箱窄ニ宜シ

○第一千九百八方私由尼阿魯

明礬 菲阿斯葉煎六寸溶解

右調和為冷罨法

主治龜頭箱窄ニ用ヒテ包皮ヲ縮収スルニ宜シ

○第一千九百九方

精製消石錢一 精製礪砂半 醋三 常水五

主治同上○此方病床ニ於テ調和シ鹽類溶化スルニ乘

メ用フベシ

畢九焮衝オルキチス、ゴノルロイカ、羅オン、トステ、キーキング、デル、バルレン、蘭

強實多血ノ人ニ在テハ放血スベシ會陰焮腫ノ部及ヒ腹

輪ニ蟻鍼八頭乃至十二頭ヲ施シ爾後裸燕麥麥糠ニ乳汁

ヲ加ヘ或ハ亞麻仁末ヲ緩和藥ニ加ヘテ毬布ヲ作り温暖

シテ之ヲ貼シ其后陰囊ヲ醋蒸氣ニ浴セシムベシ之ニ浴

スルハ洩器ヲ用フベシ最施シ易シトス兼テ瀉藥ヲ以テ

灌腸シ孕齡酒石溶液ニ滿那ヲ加フル者千八百廿九方荅麻林度

千八百三十方。或ハ甘汞加葯刺巴千九百一十方ヲ用ヒテ瀉ヲ促
スニ宜シ。煖衝勢退クハ早晚内股ニ灰白水銀膏千九百
半錢ヲ塗擦ス此ニ至レハ緩和葯法ヲ轉メ解釋葯法ヲ施
スノ期トシ麥糠ヲ水ニテ煮鉛糖ヲ加ヘテ葯法トシ千九
方。或ハ解凝藥末一匕中礪砂二三錢ヲ混和メ葯法トス但
夜間ハ葯法ヲ施スニ便ナラザルガ故ニ解凝硬膏千九百
ヲ貼スベシ。○硬結腫ヲ遺ス者ハ軟膏ニ沃胃謨加里或ハ
沃胃謨沃胃ヲ和メ千九百十六方之ヲ塗擦シ内服甘汞ニ失鳩
荅葉ヲ配用スベシ千九百十八方失鳩荅葉葯法千九百十四方モ亦稱用
セリ。輓近壓定繃帶法ドムックヲ施メ大ニ驗アリ時々

吐劑ヲ用フルモ亦硬結腫ヲ消解スルノ効アリ

○第一千九百十方遠突土

荅麻林度二 井水適宜煮四分時瀘過取十ヲ溶和瀉

利鹽一ヲ加後味

覆盆子舍利別一

右調勻每一時服半小盞以至得効

主治葯丸煖衝麻ト合併スル症ニ宜シ

○第一千九百十一方同上

甘汞一 葯刺巴 蜷蛄石各一 白糖二

右調勻為散分十包每一時半服一包

主治同上

○第一千九百十二方 [同上]

過爾托軟膏 灰白水銀膏 各半

右調勻早晚取八分一塗擦外股

主治畢九焮衝麻ト合併スル者焮衝証已ニ退テ后之ヲ

用フ

○第一千九百十三方 [其魯單涅爾]

鉛糖 錢二 醋 三 蒸餾水 七二 白蒸餅心 適

右作琶布

主治麻後畢九焮衝ニ宜シ

○第一千九百十四方 拂連屈

滿突刺蘊落根 附 失鳩荅葉 菲阿斯葉 各一

右細剉調勻作琶布

○第一千九百十五方 [館兒屈]

菲阿斯硬膏 失鳩荅硬膏 水銀硬膏 各半

右捏和

○第一千九百十六方 [弗館兒的爾]

沃胃謨加里 精製炭酸曹達 各半 蕃薇軟膏 半 至

右調和早晚取豆大塗擦

主治右諸方 千九百十四方至千九百十六方 麻後畢九硬結腫ニ宜シ

兼テ患處ニ細狭ノ膠着膏ヲ貼シ壓定繃帶ヲ施スベシ

○第一千九百十七方暴訥爾

沃胃謨ヨダハ至十五 灰白水銀膏半

右調和早晚塗擦腫處

主治畢九硬結腫ニ宜シニ三日毎ニ塗擦ヲ休息スベシ
後皮膚剥爛羅斯狀ノ焮腫ヲ發スルニ由テナリ感觸靈
敏ノ人ニ在テハ殊ニ然リトス

○第一千九百十八方

甘汞二八至四八 失鳩苔葉十六至二十四 麻俣涅失一

白糖錢

右調勻為散分八服早晚一服

主治畢九硬結腫ヲ解散スルニ宜シ

攝護腺焮衝プロスタチス。コノルロイカ羅オントステ
刺絡ノ多量ノ血ヲ瀉シ屢會陰ニ放蟻シ内股ニ水銀膏ヲ
塗擦シ緩和藥ニ菲阿斯葉或ハ失鳩苔葉ヲ加ヘ緩和鎮瘻
琶布ヲ作リテ會陰ニ貼シ鎮瘻灌腸法ヲ行ヒ大量甘汞ヲ
内服セシム但瀉血後小便閉ヲ發シ或ハ瘻孿甚シキ症ハ
阿芙蓉ヲ加フベシ律私篤名人已上ノ方法ヲ用ヒテ毎ニ此
症ヲ解散セシメ化膿或ハ硬結腫トナルヲ預防セリ○若
上法効ナクメ焮腫化膿セントスル者ハ温暖琶布ヲ施シ

外科 卷一 膿腫

釀膿ヲ進ムベシ膿成レハ之ヲ尿道ヨリ漏シ或ハ會陰ヲ
 破テ排泄スヘシ其他ノ療法ハ外療書中ヲ檢スベシ○硬
 結腫ニ轉スル者ハ大量礮砂千九百二十九方ヲ最良藥トス
 且沃胃謨加里軟膏千九百二十九方ヲ塗擦スルニ宜シ○荅婁百兒
 名ハ會陰串線法ヲ殊稱シ内服ニ大黃消石ヲ用ヒ消石毎
晚三十
 五又八日毎ニ甘汞ハハ麻痺涅失亞半錢ニ和シ與フ○
 暴訥爾田名ハ鹽酸金鹽ヲ用フ
千九百
廿二方或ハ瑞香皮及ビ烏
 白烏爾識葉煎ヲ稱用スル者アリ

○第一千九百十九方過弗肝設爾

精製礮砂 精製甘草膏各一 蒲公英越幾斯宜適

右分作十二塊衣伊里私弗魯連底那末每一時服一箇
 主治痲後ノ攝護腺硬結腫ニ宜シ又膀胱粘液膜卵巢食
 道胃腸等ノ硬結腫ニ用フベシ

○第一千九百二十方麻健莖

骨霜附末
半刀 精製礮砂末刀 失鳩荅越幾斯八 精製
 甘草膏適
宜

右為十二塊衣伊里私弗魯連底那末每服一箇日三次
 主治攝護腺ノ腫起及ビ結節腫ゲヌス
トニ宜シ

○第一千九百二十一方颯爾滿

沃胃謨加里半 家猪脂一
半

右調勻作軟膏

主治攝護腺及ヒ子宮等ノ硬結腫ニ宜シ○且會陰ニ揮發膏。水銀膏ヲ塗擦シ或ハ芫菁軟膏ヲ貼シ瓦爾法尼越列幾的爾海水浴等ヲ行フベシ○焮衝証ヲ兼ヌル者ハ放蟻スベシ○總テ刺衝藥ヲ塗擦シ焮衝ヲ催起スルヲ戒慎スベシ之カ為ニ惡性膿潰ヲ為シ易スケレバナリ

○第一千九百二十二方（倭録都溼兒）

鹽酸金鹽三八至四八 家猪脂半錢

右丁寧調勻作軟膏

主治硬結腫結節腫ゲスマール骨瘤殊ニ其症徽毒ニ因セル者ニ宜シ故ニ此軟膏ヲ攝護腺硬結腫ニ亦用フベシ且此症鹽酸金鹽ヲ内服セシムベシ内用方ハ癩病水腫。徽毒結節腫。癌腫ノ條下ニ見エタリ

徽毒焮衝眼ゴレバルオオプタルミアゴノルロイカ羅シ

痲內陷ニ因ル者ハ刺衝藥ヲ尿道ニ注射シ千九百廿三方或ハ婆

艾ニ赤降汞ヲ塗リテ挿入シ陰部ニ温暖緩和罨法ヲ施シ

或ハ陰部ヲ浴スベシ少壯多血家ハ刺絡ニ宜シ輕症ハ顛

顛ニ蟻鍼八頭乃至十二頭ヲ施シ吸角法ヲ施スモ亦可ナ

ラシ乎峻誘導法トシテ項上吐酒石軟膏六百三十五方ヲ塗擦シ

屢耳後ニ芥子泥ヲ貼シ刺戟藥ヲ加ヘテ脚浴ヲ行フベシ
内服芒硝ニ精製消石及ヒ吐酒石ヲ加フル者十五方至五十
方九方瀉利鹽ニ吐酒石ヲ配スル者六方至十等清涼瀉劑ニ宜シ或
ハ感觸銳敏ノ者ハ孕鹼酒石五方至十酒石酸加里五方至十
方五方等ヲ好トス或醫甘汞ヲ稱賛ノ每服一二日ニ數服ノ
水瀉ヲ得ルヲ度トシ外用ハ先眼水ニ舍電阿芙蓉液ヲ加
ヘ千九百或ハ嬰粟殼煎ヲ冷用スベシ爾後升汞千九百及
ヒ廿四方皓礬溶液廿九方等衝動眼水ニ宜シ○上法ニ兼テ水銀
軟膏ニ菲阿斯越幾斯ヲ加ヘテ千九百眉邊ニ塗擦スル
日數次病末ニ至リテ過多ノ粘液分泌ヲ制スルハ赤降汞

千九百三十一方或ハ白降汞千九百ヲ以テ眼軟膏ニ合和
スベシ

○第一千九百二十三方〔按假見〕
吐酒石二方至 蒸餾水一弓溶化

右射注尿道

主治 微毒喉衝眼ニ施メ尿道ヨリ流出セシ粘液ノ抑壓
ヲ喚起スルニ宜シ

○第一千九百二十四方

榎植核粘汁四錢至 井水四 舍電阿芙蓉液十二滴
滴六錢

右調勻洗眼日數次

主治 毒毒眼衝眼ノ第一期ニ用フ

○第一千九百二十五方〔私貯健別魯儼〕

升汞ハ 蕃薇水六錢溶化加後味

舍電阿芙蓉液錢半

右調勻為眼水

主治 結膜嫩衝毒ニ因ル者之ニ宜シ○私貯健別魯儼名

先剪刀或ハミルテ名樹葉刀名ヲ取テ角膜ニ屬スル所ノ

結膜ヲ截除シテ淚管ニ至リ出血止テ后又其部ヲ乱刺

ハ其後毎半時上ノ眼水昆刺地名ノ方ヲ射注シ且蒸漏シ次ニ

チンストイフル貨弊名大ノ芫菁膏ヲ作リテ上視筋ノ部

ニ貼シ其發泡セル處ニ灰白水銀軟膏ヲ貼メ繃帶ヲ施

ス已上ノ療法ニ由テ三日乃至四日ニメ危險ヲ防キ得

タリ

○第一千九百二十六方〔秘密土〕

皓礬カ 鉛醋錢半 蒸餾水十 龍腦精錢二

右調勻為眼水

主治 毒毒結膜嫩衝ニ宜シ○方中龍腦精ヲ去レハ之ヲ

昆刺地名ノ方ニ代用ノ可ナリ然レ其効力彼ニ

比シ難シ

○第一千九百二十七方 拂連突蕤謨永半 牛乳一匕煮

右醮疊布貼眼

主治 儼毒焮衝眼ニ宜シ

○第一千九百二十八方 刺必私醫仙滿

刺必私高斯秩屈斯 苒若越幾斯六

已上二味 薔薇水六弓溶解

右調勻洗眼日數次

主治 儼毒焮衝眼ニ宜シ 焮衝ノ劇勢已ニ退ケバ 苒若越

幾斯ニ代ヘテ 阿芙蓉丁幾ヲ用フベシ

○第一千九百二十九方 別見

華涅子滿溶永散二 無鹽酪新鮮者 龍腦四

右調勻為眼軟膏

主治 儼毒焮衝眼瀉血後之ニ宜シ

○第一千九百三十方

菲阿私越幾斯四 灰白水銀膏半

右調勻塗擦眉邊日四次

主治 儼毒焮衝眼ニ宜シ

○第一千九百三十一方

赤降永一 無鹽酪新鮮者

右丁寧研和為軟膏早晚取豌豆大塗擦眼瞼

○第一千九百三十二方

赤降汞 二八 至 無鹽酪 一 錢

右丁寧調和為軟膏早晚塗擦眼瞼

○第一千九百三十三方

白降汞 二八 至 無鹽酪 一 錢

右丁寧調和為眼軟膏

主治石三方 千九百三十三方至 徽毒焮衝眼ノ末期粘液ノ

流出過多ナル者ニ宜シ

龜頭麻 ゴノルロエア。グランジュラリス。ロバ
ラニチス。羅エイケルドロイブル蘭

患處唯微痛ヲ帶ブル症多シ此等ノ症ハ屢冷水ヲ以テ患

部ヲ洗滌スレバ暫時ニ治スルヲ常トス然レ若其症速

治セサルハ粘滑劑千九百三十三方 或ハ石灰水乳汁等分ノ合

劑或ハ鉛糖稀溶液千九百三十三方 既ニ患處剝爛ノ底

面豕肉状ナル者ハ升汞稀溶液ニ阿芙蓉丁幾ヲ加ヘ千九百三十三方

或ハ硝酸汞溶液ニ水多量ヲ加ヘテ稀釋シ千九百三十三方

用フベシ已上ノ諸藥ハ患處ニ點滴スルニ宜シ之ヲ綿撒

絲ニ蘸シテ龜頭ト包皮ノ間ニ挿ムモ亦可ナリ然レ包皮

龜頭ヲ覆フテ之ヲ外翻シ能ハザル者ハ上ノ水劑ヲ以テ

龜頭ト包皮トノ間ニ射注スルノ毎數次スベシ此症再

發ラ防クハ久ク硝酸汞溶液ヲ連用スルヲ要トス第一千九百三十八方ノ金屬溶液モ亦稱用スベシ大抵包皮ヲ外翻メ龜頭ヲ空氣ニ觸レシメ以テ此症再發ヲ禦クニ足ル

○内服藥ハ蛇足ニ屬ス唯患處ノ剝爛恐ルベキ景況アル

○第一千九百三十四方 榎植核汁一錢至 井水六

右調勻供外用

○第一千九百三十五方

鉛糖四八至 蒸餾水六ヲ溶化

右調勻供外用

○第一千九百三十六方遠突止 升汞二 蒸餾水二ヲ溶解加後味

阿芙蓉丁幾 右調勻供外用

○第一千九百三十七方同上

硝酸汞溶液二 蒸餾水二

右調勻外用

主治 一千九百三十四方ヨリ一千九百三十七方至龜頭

麻ニ匣シ

麻ニ匣シ

○第一千九百三十八方同上

升承 鉛糖カ 蒸餾水四 可溶化加後味

白亞鉛華カ

右調勻外用日二三次臨用宜振盪

主治龜頭贅留焮衝及粟粒疹ノ素因ヲ治スルニ宜シ

○此合劑分離術ノ則ニ違フト雖然其効大ナリトス

白帶下ブレノルロエアヲギナエコレウコロエアロフ

テロ井ッテフ

一ニ之ヲ婦人麻ト名ク此症他人ヨリ傳染シ獲ル者ト全身或ハ局處ノ弛緩ニ由テ自ラ發スル者ト能ク區別スベ

シ○大率傳染症ハ經過更ニ急ニ其治男子ノ麻ト同シ

但稍斟酌アルノニ焮衝勢劇シキ者ハ罕ナルガ故ニ焮衝

ノ時期ニ方テ乳汁ニ石灰水ヲ加ヘ或ハ鉛糖稀溶液ノ射

注法ヲ施スベシ焮衝既ニ退クハ速ニ収斂衝動ノ射注

法ヲ行フ一猶男子ノ麻ニ於ルガ如シ千八百八十二方至

千九百五十四方至 內服拔爾撒謨骨洋霍 千八百四十六方至

葦澄茄千八百六十二方至 其他前ニ揭ル所ノ収斂密藥私

去爾千八百六十九方至 其與ニ佐治法トノ琥珀乳香名 鵝栗

拔爾撒謨其他拔爾撒謨劑ノ薰法ヲ施スベシ火爾滿 名布線

ヲ以テ耽朴ヲ作リテ腔中ニ充填シ分泌粘液ヲ吸收セシ

メ或ハ之ニ明礬ヲ塗リテ挿入スト云フ○男子ノ麻ハ交感症ヲ發スルノ恐アルガ故ニ更ニ難症トス婦人ノ麻ハ通例患部弛緩シ慢性ヲ帶フルカ故ニ經過多クハ緩ナリ患處剥爛セントスルノ恐アラハ其第二病ヲ繼發スルノ危険ナルガ故ニ承劑ヲ須要トス○自發白帶下ハ先其病因ヲ治スルヲ要ス乃腹内閉塞。瘰癧質。依倨篤質。皮疹内陷。脚汗閉止等是ナリ爾後拔爾撒謨骨。辟霍。華澄茄。的列並油。薩毘那。白續。浙花。明礬。錢劑等ノ如キ此症ノ持効藥ヲ用フヘシ上ノ諸藥ニ兼テ射注法ヲ行フベシ但先緩劑ヲ以テシ漸ク劇劑ニ轉スルヲ良トス然レ過劇ノ品ハ害アリ之

ガ為ニ硬結腫及ヒ癌腫ノ基因ヲ萌生シ易ケレハナリピロモンテ^名ル^{鑛泉}チリビニルゲル^同及ヒスパワートル^同偉効アリ河水浴及ヒ海水浴モ亦好トス

○第一千九百三十九方

蘼謨安沒尼垂幾 白石鹼 蒲公英越幾斯 牛胆

大黃末

錢各二

右調勻二匕為一九衣石松粉早晚服五丸

○第一千九百四十方秘訣蘭度

大黃^ハ 蜥蜴石^四

右調勻為散分八包早晚一服

主治右二方白帶下腹內壅塞ヲ兼ヲル者ニ宜シ

○第一千九百四十一方〔帶布〕

百屈林子一乃至半錢 白續斷花一錢半

右細剉調勻分十四畏朝午晚取一畏熱湯一盞泡出飲服

主治白帶下ニ宜シ○此泡劑ハ殊効藥トス但久服ヲ要ス

○第一千九百四十二方

喝兒祿爾名人 拔爾撒謨越栗失爾各一錢 拔爾撒謨骨泮霍 再留的列並油 再留琥珀油各一錢

右調勻每服三十滴乃至六十滴沙糖和服日三次服後當

飲赤葡萄酒半盞

主治白帶下及ヒ其他ノ粘液流出症及ヒ遺精ニ良トス

○第一千九百四十三方〔幾魯列謨〕

蒲刺實爾附各 歛皮煎附三 拔爾撒謨骨泮霍和雞子黃者

林檎酸鐵丁幾附各 一錢 拔爾撒謨舍利別半

右調勻每一時服一食匙

主治久麻及ヒ白帶下ニ宜シ

○第一千九百四十四方〔的鄉矣別魯士〕

勿擲祭亞的列並底那附二 白石鹼三錢 渴兒把末適

右調和二以為一九衣石松粉早晚服五九乃至十九

○第一千九百四十五方

甲方

大黃末錢半 橙葉末 應的刺皮末各一錢 麻屈涅失

正錢二

右調勻為散朝午晚服一茶匙

○第一千九百四十五方

乙方

麻爾羅歌葉 烏白烏爾識葉 默栗薩葉 著草穗

橙皮各二錢 白續斷花半

右細剉調勻每次取一食匙注滾湯三盞泡出

主治右二方白帶下宜甲方方服スル每ニ後乙方一

盞ヲ飲ムベシ

○第一千九百四十六方拔爾的兒秘

刺達尼丁幾錢

右每服十滴日三次漸加增

主治白帶下宜兼テ刺達尼濃煎ヲ外用スベシ但先

單味之用ヒ後刺達尼越幾斯ヲ加フ

○第一千九百七十七方私的印別爾傑魯

健質亞那越幾斯 亞爾鮮越幾斯各一錢半 葛私加栗刺

皮末 亞爾鮮葉各適宜

右調勻二瓜為一丸衣桂末每服五丸日三次

主治 白帶下 宜之 爾後鐵丁幾ヲ用フ

○第一千九百四十八方 弗陽

沒藥 乳香 瘰瘡木脂 蜀羊泉越幾斯

濱瞿麥越幾斯

右調勻二八為一九衣石松粉每服八九日三次

主治陽之ヲ經久白帶下ニ用ヒテ屢効ヲ得タリ

○第一千九百四十九方 飛歌蘭度

阿仙藥 明礬 幾那越幾斯

右調勻二八為一九衣桂末每一時半服四九

○第一千九百五十方 忽倫

拳參越幾斯 沒藥末 撒兒末爾秩斯

右調勻二八為一九衣桂末每一時半服六九

○第一千九百五十一方 骨布蘭度

龍腦 撒爾末兒秩斯 硫酸規尼 加密列越

幾斯 拔爾撒謨字露

右調勻為三十九衣桂末每服二三九日二三次

○第一千九百五十二方 春姪隣

格碌屈私末兒秩斯 葛私加栗刺末 紉百設木越

幾斯 健質亞那越幾斯

右調勻二八為一九衣石松粉每服五九乃至十九日三次

主治 千九百四十九方ヨリ千九百五十二方至白帶下ニ
宜シ

○第一千九百五十三方〔福爾嘴〕

明礬 礪鏡花 芳香散 幾那越幾斯寒製各半錢 桂油

十二滴

右調勻二匕為一丸衣桂末玻璃壘收貯早晚服五丸乃至十九

○主治 白帶下其人粘液質者之ニ宜シ

○第一千九百五十四方〔過傑栗屈的兒〕

阿芙蓉越幾斯水製一錢 薔薇水八勺 溶化加後味

密陀醋一 榎楂核汁一

右調勻微温射注患處日二三次

○主治 白帶下腔中ノ感觸充進セル者ニ用フ○薤謨漿及

ヒ鉛糖ヲ用フルヨリ榎楂核汁密陀醋ヲ更ニ良トス何

者沈澱スルヲナケレハナリ

○第一千九百五十五方〔骨布〕

薩毘那葉一 井水適宜煮濾過取十二

右供射注劑

○主治 白帶下子宮ノ弛緩ニ因ル者是ニ宜シ

○第一千九百五十六方

膽礬五六至 井水一匕溶化

右供射注劑

主治白帶下愀衝既ニ退キテ后患者ノ體質ニ由テ緩慢
症ニ變スルノ恐アル者ニ用フ○千八百八十二方ヨリ
千八百九十二方至亦同上ノ症ニ施スベシ

○第一千九百五十七方骨布

刺達尼根錢十 井水三匕煮耗至一匕濾過放冷加後味

刺達尼越幾斯錢半 阿仙藥丁幾 吉納丁幾各一錢半

右調勻供外用

主治白帶下ニ宜シ每晚臨卧尿利ノ后海綿ヲ取テ上ノ

煎液ニ醖シ腔中ニ挿入ス○脱腔ニモ亦能ク適當ス

遠西方彙

卷十七

白帶下

四

廣
月
堂

可名一無名類中一錄入又○錄附一十香培入書

