

遠西方彙

六

○卷之十八

乙 排泄失常症

慢性嘔吐

泄瀉

完穀下利

乳糜利

肝崩

十武田
237
18



門試
號 237
卷 18



遠西方彙卷之十八

獨乙 加幾安頓

和蘭 傑婆婆都 譯

侍醫法眼貫齋伊東 貞文仲 重譯

南洋伊東 亨健夫 參校

乙排泄失常症

慢性嘔吐 フミエス。コロニキユス羅

嘔吐ノ治法其因ニ從フテ諸種ノ別アリ胃腸汚物ハ吐下
劑ニ宜シク慢性炊衝ニ因ル者ハ蜚鉞ニ宜シク倭麻質斯



或ハ依倨篤ニ原ツク者ハ芥子泥羌膏若クハ吐酒石軟膏ニ宜シク胃ノ神經敏捷ニ因ル者ハ鎮痙藥及ヒ沸騰散ニ宜シク千九百五十八方至千九百六十三方器敗ヨリ發スル者ハ其症ニ應ノ的當ノ術ヲ行フヘシ○總テ慢性嘔吐ハ其因器敗ニアル者モ亦一時毎ニ乳汁一小盞ヲ飲服セシムルヲ主藥トス以テ其元氣ヲ保チ治ヲ試ムヘキナリ乳汁灌腸モ亦併用スヘシ

○第一千九百五十八方

過炭酸曹達四

酒石酸一錢

枸橼油糖一

白糖十六

右調勻每半時取一茶匙乘沸騰飲服

○第一千九百五十九方

過炭酸曹達八

酒石酸五

白糖半

右調勻為散分六裹每半時取一裹乘沸騰飲服

○第一千九百六十方

甲方

過炭酸曹達半

右分六服白紙包裹與之

乙方

酒石酸半

右分六服青紙包裹與之

○每半時取甲方一裹沙糖水半小盞溶化投乙方一裹乘沸騰飲服

○第一千九百六十一方

甲方

炭酸刺篤亞斯半 枸橼油糖五

右調勻為散分七服白紙包裹與之

乙方

酒石酸 白糖各八

右調勻為散分八服青紙包裹與之

○用法同前

○第一千九百六十二方

麻僞涅失垂 茴香油糖各二

右調勻為散私葛點刺收貯每服取一茶匙以冷水少許及枸橼汁加沙糖者一食匙頓服

○第一千九百六十三方

麻僞涅失垂半 純精酒石 枸橼油糖各二

右調和為散玻瓈壘收貯每半時取一茶匙冷水少許送下

主治千九百五十八方ヨリ千九百六十三方至嘔吐胃ノ

感觸過敏ニ因ル者ニ宜シ先胃部ニ芥子硬膏ヲ貼メ后

沸騰散ヲ與フヘシ標悍ノ品モ亦許シ與フヘキ症ハ商

沸騰散ヲ與フヘシ標悍ノ品モ亦許シ與フヘキ症ハ商

遠西方彙 卷十八 慢性吐瀉 廣 附 堂

滂名酒一盞沸騰ニ乗シ飲服セシメテ甚効アリ或ハ胃ノ
 感覺元進ノ服藥ニ堪ヘサル者往ニ之アリ宜シク氷塊
 或ハ冷水一匙ヲ與フヘシ總テ大量ニ藥ヲ與ヘテ胃ヲ
 飽滿セシムルコト勿レ○此他第一方三方及ヒ八百八方
 ヲ參照スベシ

○第一千九百六十四方戒歌蘭度

酒石鹽錢ニ 新絞枸橼汁適宜飽和為度 默栗薩水三 菲阿

斯越幾斯六

右每半時服ニ食匙

主治痙攣性嘔吐ニ宜シ○此方効ヲ得サルハ阿芙蓉

丁幾八滴ヲ加フ

○第一千九百六十五方同上

複方乳香精附六 忽弗滿振爾撒謨非答半 阿芙蓉

丁幾錢ニ

右調勻塗擦胃部或為菴法

主治痙攣性嘔吐ニ宜シ且綿苔幾里私布ヲ酒煮シ布囊
 ニ盛リテ藥枕子ヲ作り胃部ニ襯シ或ハ芥子泥ヲ貼シ
 殊ニ乾角法ヲ施スヘシ此ニ由テ劇吐止ムコト屢之アリ

○第一千九百六十六方秘秘

過炭酸剝薦亞斯 枸橼油糖各一錢 蒸餾水ニ可溶化

右時之服一食匙

主治嘔吐ニ宜シ○此方服スルニ臨ミテ先枸櫞汁三四茶匙ニ沙糖水少許ヲ和シ服スベシ

○第一千九百六十七方 福僊列爾名入鎮嘔散

吐根末三錢 純精酒石二錢 白糖六錢

右調勻為散每服半食匙乃至一食匙

主治嘔吐ヲ鎮靖スルニ宜シ

○第一千九百六十八方 骨布

吐根末六錢至十八錢 叔格刺度適宜

右為百二十錠每一時服一錠

主治癩性嘔吐ニ宜シ殊ニ妊婦ノ嘔吐ニ好トス

○第一千九百六十九方 福傑兒

格綸僕二錢 精製阿芙蓉二錢 綿苔幾里私布 油糖一錢

右調勻為散分六裏每服一裏日三次

主治癩性嘔吐ニ宜シ○一病者二年來飲食スル毎ニ後必嘔吐ス福傑兒氏此ヲ用ヒテ治セリト云フ

○第一千九百七十方 栗屈的爾

過設印亞的兒 纈草亞的兒 丁幾 阿芙蓉液各一錢

右調勻每一時十滴乃至三十滴沙糖和服

主治癩性嘔吐ニ宜シ○此ノ如キ有力ノ鎮癩藥ハ服

遠西考 卷十一 癩性嘔吐 四 廣 膠 堂

スルニ堪ヘサル者屢之アリ故ニ每常更ニ緩ナル藥劑ヲ撰ミテ先少量ヨリ進ムベシ即過設印亜的兒三四滴白蒸餅小塊ヲ酒ニ醃ス者薄荷錠チーパールミン一二個等ニ宜シ

○第一千九百七十一方 〔戒歇蘭度〕

橙皮丁幾錢 葛私薦樓謨丁幾 蘆薈丁幾各一錢
右調勻每服十五滴日三次

主治 歇倚私的利家ノ嘔吐頭痛セハラホ 屢發作スル者其發作ノ間隙ニ方テ之ヲ用ヒテ偉効アリ○〔戒歇蘭度〕 著書載スル所ノ用量每服六十滴日ニ二次トク愚按

スルニ過多ナリ

○第一千九百七十二方 〔同上〕

瓦爾拔奴謨硬膏附一 龍腦 揮發鹿角鹽 阿芙蓉
各半 加耶普的油 薄荷油各廿

右捏和取一握攤革貼胃部

主治 船注ニ宜シ

○第一千九百七十三方 〔春埜隣〕

瓦爾拔奴謨硬膏一 龍腦 揮發鹿角鹽各半 加耶普的油四十

右調和作硬膏攤革貼胃部

主治痙攣性嘔吐。船注等ニ宜シ。○輓近船注ニ結列阿速
多ヲ稱用ス

○第一千九百七十四方 同上

麻僞涅失亞 孕礬酒石 大黃 芳香散各二錢
右調勻為散每服一小食匙日三四次

主治早且嘔吐及ヒ過酒家ノ嘔吐ニ宜シ

○第一千九百七十五方

失鳩峇越幾斯半錢 老利兒結爾斯水半ヲ溶化
右調勻早晚服三十滴

主治同上

○第一千九百七十六方

枸橼酸安沒尼亞精半 菩提樹花水四
右調勻每一時服一食匙

主治 枸橼酸安沒尼亞精確砂華一分 冷水五分ニ溶化シ
和ヒハ早且嘔吐ノ殊藥タリ按スルニ是民埏列里精ト

同効ナリ英吉利及ヒ拂郎斯ニ於テハ之ヲ發汗劑トシ
熱病ニ用フ

○第一千九百七十七方 愚格魯杜

麻僞涅失亞二錢 酒石酸半錢 枸橼油糖一錢
右調勻為散私葛點刺名器取貯每服取一茶匙加冷水乘沸

滾服

主治 妊婦ノ嘔吐ニ宜シ ○嘔吐病人口ヲ戒スルヲ嚴ニ過クル勿シ難化ノ食餌却テ消化易キ者ニ勝リテ能ク胃ニ堪フルヲ間之アリ ○倚拂朗屈イリフク名ノ經驗ニ從フニ大抵妊婦ハ油煤肉硬固蒸餅葡萄酒及ヒ冷水一盞ヲ最良ノ飲食トスト云フ ○謁弗西暴爾土イフホ名ハ默栗薩水桂水イフホ等分ヲ稱用ス或ハ諸藥十驗ナク妊娠五六個月ヲ過テ嘔吐自ラ止ム者屢之アリ

○第一千九百七十八方妊婦ノ慢性吐 龍涎香丁幾各半

越栗失爾茂印失屈篤 龍涎香丁幾各半

右調勻每服四十滴日三次

主治 妊婦ノ嘔吐ニ宜シ兼テ胸上ニ芳香硬膏一千九百七

ヲ貼ス ○屋爾噶私土イハカ名地ノ歇魯列爾イハカ名此方ノ殊効ヲ確

徴セリ ○鵠屑カク名ノ經驗ニ據ルニ桂酒水ニ龍涎香丁幾

ヲ加エテ香竄藥ノ泡劑ニ和服シ屢良効アリト云フ只

胃ニ循ル血絡ノ盈張嘔吐ノ原因ナラバ此症妊婦ニ甚多シ此方

害アリ而ノ刺絡最良効アリ

○第一千九百七十九方慢性吐

収斂垂的児一錢 龍涎香丁幾二錢

右調勻每服三十滴日三次冷水一小盞點服

主治同上

○第一千九百八十方瀝格魯杜

麻屈涅失半錢

大黃丁幾

水製六錢

橙皮舍利別

二錢

右調勻每一時乃至二時半服一茶匙

主治小兒嘔吐胃中酸敗液ニ因ル者之ニ宜シ

○第一千九百八十一方

碱歇蘭度

名小兒應用鎮痙散

榭寄生

蜩蛄石

鹿角屑

纈草

各一錢

右細末為散每服一小刀尖日三四次

主治幼兒酸敗液。泄瀉。嘔吐。生齒刺衝。其他神經性諸証ニ

宜シ

泄瀉ジアロヘア羅ド

泄瀉ハ他病ノ見証トノ發スル者常ニ多シ故ニ其原因ヲ

制スルヲ醫治ノ專務トス是故ニ先其功ヲ收メテ而後泄

瀉ヲ止ムルモ病者ニ害アラサルニ至リ方ニ之ヲ治スル

ノ方法ヲ議スベキナリ最初粘滑藥。油質藥。粘滑乳劑五百

方至五百卅三方。千九百八世一沙列布煎。舍電發謨白煎三百八

或ハ漿粉灌腸百九十八方。二千十等ヲ施メ排泄物ノ酷厲

ヲ制シ以テ腸ノ感觸ヲ緩和スルヲ要ス次ニ腸管ノ感

覺ヲ減殺スヘシ是阿芙蓉及ヒ吐根千九百八十三方ノ主

トル所ナリ之ニ由テ功ヲ收ムルヲ常ニ多シ若効アラザ

遠西方藥 卷十 慢性吐瀉 廣濟堂

ル片ハ收斂保固劑ヲ用ヒテ腸ノ粘液膜ノ分泌機ヲ制ス
 ヘシ然レ此劑不相當ノ症ニ在テハ害ヲ招クヲ屢之アリ
 收斂保固劑ニ属スル品ハ即大黃千九百八十七方至 依蘭
 苔格千九百九十八方至 葛千九百九十三方至 亞兒尼加
 根二千三百五方至 刺達尼西根二千六百方至 西瑪劉拔皮二千七百方至 紺百設木
 九方阿仙藥二千九百九十七方 赤石脂二千九百九十五方 等是ナリ○輓近泄瀉ヲ治
 スル一種ノ藥アリ即硝酸銀九百九十五方 鉛糖三百九十五方
 木鼈千九百九十七方ノ如キ佳稱アリ○肚腹ニ香竈温暖
 罨法ヲ施スハ泄瀉並ニ胃腸ノ膨脹及ヒ痙攣症ニ殊効アリ
 裸麥製蒸餅細末八食匙乃至十食匙丁子搗末一茶匙乃

至ニ茶匙肉豆蔻研末或ハ格墨因一茶匙ヲ取テ調和シ赤
 葡萄酒若クハ燒酒三四食匙ヲ加ヘテ泥トナシ適宜ノ稠
 ラ得セシメニ重麻布間ニ塗ル其厚サ手指横經可リ此ノ
 如ク毬布ヲ作り竈上ニ煖メ以テ全腹ヲ掩フ此毬布ヲ貼
 シ四時五時乃至六時ヲ經テ之ヲ去リ次日又赤葡萄酒或
 ハ燒酒少許ヲ加ヘ煖メテ以テ再貼スベシ○此他諸種ノ
 藥局製胃硬膏及ヒ肚腹香竈塗擦方皆佳効アリ○小兒泄
 瀉ヲ治スルノ應用方其最良ノ者ヲ撰テ二千十九方ヨリ
 二千十八方至ニ列載セリ
 ○第一千九百八十二方

通西藥 卷六 泄瀉 加 廣 脾 堂

精製阿芙蓉末 吐根末 各一匁 至二匁 白糖 二匁

右調勻為散分四服早晚一服

主治單純泄瀉宜或ハ其症ニ準シテ日ニ四服セシムルモ可ナリ

○第一千九百八十三方

吐根 十五匁至十八匁 滾湯適宜浸瀝過取四匁加後味

亞刺昆亞護謨漿 半匁 阿芙蓉液 六滴八滴乃至十滴

右調勻每二時服一食匙

主治泄瀉腸ノ感觸尤進スルニ因ル者之ニ宜シ

○第一千九百八十四方

甘扁桃油 錢二 亞刺昆亞護謨漿 錢六 加黑櫻實水四

弓混和作乳劑更加後味

阿芙蓉丁幾 八滴 過兒托舍利別 半匁

右調勻每二時服一食匙

○第一千九百八十五方

甘扁桃油 錢二 亞刺昆亞護謨漿 半匁 雞子黃 一箇 加

井水四弓搗和作乳劑更加後味

阿芙蓉丁幾 八滴 扁桃乳舍利別 半匁

右調勻每二時服一食匙

主治右二方 一千九百八十四方 尋常夏月泄瀉ニ宜シ或ハ

其症ニ準シ千九百八十二方ヲ與フヘシ

○第一千九百八十六方 穢歌蘭變

甘扁桃油ヲ一 精製礪砂錢二 亞刺昆亞護謨漿ヲ半 井

水ヲ六 菲阿斯越幾斯ハ六 扁桃舍利別ヲ一

右調勻作乳劑毎一時服ニ食匙

主治水瀉症腸痛劇甚舌上苔ヲ帶フル者ニ宜シ○方中

ノ礪砂總テ一錢ニメ足レリ又按スルニ此方全量過多

ナリ殊ニ夏月炎熱ノ候此乳劑宿用スベカラザルカ故

ニ半劑ヲ處スルヲ好トス

○第一千九百八十七方 倚設私託爾屈

沙列布ヲ半 井水ハ弓煮濾過加後味

礪砂錢一 大黃丁幾水製 舍電阿芙蓉液ヲ一 實亞格

地温ヲ一

右調勻每半時或一時服ニ食匙

主治腹痛泄瀉ニ宜シ此方亦半劑ヲ處スルヲ更ニ好ト

ス

○第一千九百八十八方

大黃丁幾水製

右每服一茶匙日四次

主治七八月ノ際屢發スル所ノ尋常泄瀉ニ宜シ但大黃

ヲ散トシ用フレハ更ニ効アリ

○第一千九百八十九方〔穢歇蘭度〕

大黃丁幾水製 薄荷水ヲ 蒸餾水ヲ 精製硃砂錢一

過兒托舍利別ヲ

右調勻每一時半服五食匙

主治尋常夏月泄瀉ニ宜シ

○第一千九百九十方

大黃末錢半 白糖刀四

右調勻為散分八服每一時半乃至二時一服

主治夏月泄瀉ニ用ヒテ屢効アリ但諸果實菜蔬萵苣酸

性物麥酒等ヲ戒メ只粘滑ノ飲食ヲ與フヘシ

○第一千九百九十一方〔穢歇蘭度〕

大黃末錢六 吐根末錢二 牡蠣末刀四

右調勻為散分八服每四分時一服

主治水瀉ニ宜シ

○第一千九百九十二方〔同上〕

大黃末錢二 刺蝟石 蘄謨散各一 舍電阿芙蓉液滴二

肉豆蔻末錢三

右調勻為散分六服日二服乃至三服

○第一千九百九十三方〔過儂栗鼠的兒〕

大黃丁幾水製 結列印健胃丁幾 桂水各一 阿笑

蓉丁幾四十滴

右調勻每服一食匙日三四次

主治泄瀉症腸弛緩ニ由ル者ニ宜シ

○第一千九百九十四方抄私

鹽酸 格綸僕越幾斯 格綸僕末各一 沙列布末宜通

右為八十九衣桂末玻璃壘收貯每服十九日四次

主治膽液性泄瀉ニ宜シ

○第一千九百九十五方骨布

結晶硝酸銀三 蒸餾水適宜溶化加後味

甘草末宜通

右調勻不加他味為三十六丸衣銀箔每一時服一九六日服

主治骨布名此方ヲ胃瘞吃逆慢性嘔吐乾嘔痧神經症ニ

稱用セリ○肝爾私名泄瀉虛嫩衝ニ由リテ而メ將ニ腸

ノ潰爛症ニ移ラントスル者ニ此方偉効アリトス

○第一千九百九十六方戒私

番木鱉越幾斯三 肉豆蔻四 蜥蜴石半

右調勻為散分六服日三服乃至四服

主治慢性泄瀉ニ用ヒテ間偉効アリ

○第一千九百九十七方利私

番木鱉越幾斯亞兒箇 兩製 大黃末 水銀九料各八 格

碌屈私末爾秩斯糖十六 阿芙蓉八 甘草膏適

右為十六丸衣石松粉每服一九日三次

主治弛緩性泄瀉尋常ノ保固收瀉藥効ナキ者之ニ宜シ
通例之ヲ用フルト三日ニメ已ニ良効アリ連進十四日
ヨリ久シキヲ要スル症ハ罕ナリ涅爾欣名入此効ヲ專番
木鱉ニ歸ス番木鱉ハ腸ニ循ル神經運管ヲ進メ以テ乳
糜脈ヲメ能ク養液ヲ吸收セシメ且大腸ニ尿ヲ貯留セ
シムルニ由テナリ鐵ハ保固ノ効アリ方中ノ小量大黃
及ヒ水銀ハ瀉下ノ効ヲ奏セズノ分泌管ノ運機ヲ復ス

阿芙蓉ハ去ルヘキ症往々之アリ

○第一千九百九十八方私弗蘭屈

格綸僕末錢二 府利油糖錢一

右調勻為散分六服日四服

○第一千九百九十九方賦歇蘭度

格綸僕末半 井水十二勺煮耗至六勺濾過加後藥

橙皮舍利別勺一 舍雷阿芙蓉液滴十

右調勻每一時服一食匙

○第二千方別連杜

格綸僕半 水十勺煮耗至六勺投葛私加栗刺二錢

瀉過加後藥

橙皮丁幾錢二 桂舍利別一

右調勻每一時半服一食匙

主治千九百九十八方ヨリ二千方至皆泄瀉習僻ノ症殊ニ其症弛緩ニ由ル者ニ宜シ

○第二千一方歇喘

阿芙蓉末 吐根末各五 葛私加栗刺越幾斯錢一 阿

仙藥末適宜

右為七十五丸衣桂末每服二丸日三次

主治弛緩泄瀉ニ宜シ

○第二千二方歇歇蘭度

葛私加栗刺越幾斯錢一 薄荷水 加密列水各二 亞

刺毘亞護謨漿半

右調勻每一時服一食匙

主治泄瀉ヲ止ムルニ宜シ藥害アルヲナシ

○第二千三方同上

亞兒尼加越幾斯 格綸僕越幾斯 著草越幾斯

硫黃華各二錢

右調勻二丸為一九衣石松粉每服十九日三次

○第二千四方別連杜

亞兒尼加根 格綸僕根各二錢 葛私加栗刺皮三錢

滾湯適宜浸漬瀝取七勺加後味

橙皮舍利別一

右調勻每一時半服一食匙

○第二十五方藏歌蘭度

亞兒尼加根三錢 葛私加栗刺二錢 井水十勺煮耗至

六勺瀝過加後味

阿仙藥丁幾二錢 舍電阿芙蓉液十二滴 過兒托舍利別一

右調勻每服二食匙日四次

主治二千三方ヨリ二千五方至泄瀉習僻症或ハ慢性症

二宜

○第二十六方設倚迷調爾

刺達尼根末二錢 精製阿芙蓉一 白糖四

右調勻為散分八服每一時半一服

主治習僻泄瀉二宜

○第二十七方密都兒利弗

西瑪爾拔皮二錢至六錢附 常水適宜煮瀝取六勺加後藥

橙皮舍利別一

右調勻每一時服一食匙

主治慢性泄瀉ニ宜シ並ニ格列刺ノ末期熱及ヒ炊衝証退キテ后之ヲ用フ

○第二千八方〔藏歌蘭度〕

府利丁幾弓半 舍電阿芙蓉液錢半

右調勻每服三十滴日三四次

主治習僻及ヒ弛緩ニ由ル泄瀉他藥効ナキ者此方佳効ヲ得ルヲ多シ

○第二千九方〔同上〕

紺百設木末弓一 橙皮錢一 井水十二弓煮熬至八

主 弓瀉過加後味二十五至五 煎膏稠液八對

橙皮舍利別弓一

右調勻每一時服ニ食匙

主治習僻泄瀉ニ宜シ但小量阿芙蓉液ヲ加フルノ症モ亦之アリ

○第二千十方〔福傑兒〕

阿仙藥錢一 精製阿芙蓉錢六 丁子油糖弓半

右調勻為散分十二服蠟紙包裹每一時半服一裹

○第二千十一方〔藏歌蘭度〕

赤石脂錢半 肉豆蔻錢三

右調勻為散分六服每一時半一服

○第二千十二方列設爾

升錢鹽錢二 蒸餾水三勺溶化

右調勻每服半食匙乃至一食匙日三四次

主治 二千十方ヨリ二千十二方至泄瀉ニ用ヒテ腸ノ分
泌運營ヲ直ニ制止スルノ効アリ

○第二千十三方弗陽

生明礬 葛カス私カ栗カ刺カ越カ幾カ斯カ 錢各一 加密列水勺 亞

刺毘亞護謨 橙皮舍利別各半

右調勻每二時服一食匙

主治 泄瀉腸ノ衰弱弛緩ニ因ル者ニ宜シ但明礬ヲ用フ

ルハ最慎重スヘシ其最之ヲ禁戒スベキハ腸中瘀物及
ヒ腹内畜血アル者はナリ

○第二千十四方湯列魯

苳麻勺半 井水半綿シユル首魯容量 浸漬飽熟八分時乃至

四分時

右每半時一小盞温服

主治 格列刺狀泄瀉及ヒ格列刺ニ宜シ

○第二千十五方膏布

升汞六分以一 蒸餾水勺 亞刺毘亞護謨半

精製阿芙蓉末勺

右調勻二分每次取一盞温煖灌腸

主治慢性泄瀉及ヒ格列刺症阿芙蓉及ヒ他藥効ナキ者之ニ宜シ

○第二千十六方

漿粉錢二 井水一北煮放冷加後味

雞子黃個二

右調勻灌腸

主治漿粉灌腸ハ泄瀉ニ良効アリ但小量ニ灌キ且極メテ久シク腸中ニ保持スルヲ要ス○燕麥粘汁ニ新鮮雞子黃ヲ和シ灌腸スルモ亦良驗アリ百九十八方ヲ參照スベシ

○第二千七方

漿粉錢一 至錢二 加冷水少許捏為泥更加熱湯六勺乃

至ハ勺溶解放冷再加後藥

舍電阿芙蓉液一刀至半錢

右調勻灌腸

主治水瀉或ハ酷厲物ヲ瀉スル者之ニ宜シ

○第二千十八方福俣篤

漿粉刀一 阿芙蓉越幾斯水製一八半 熱湯勺四

右調勻四分取其一温煖灌腸日二次

主治瀉ヲ止ムルニ宜シ

○第二千九方

亞刺毘亞蘆謨漿 菩提樹花水 各一 過兒托舍利別 各半

右調勻每半時服二茶匙

主治小兒熱性泄瀉二宜

○第二千二十方 刺胃私

甘扁桃油 一錢 亞刺毘亞蘆謨 半錢 加密列水 半

右為乳劑加沙糖二錢調勻每半時或一時服二茶匙

主治幼兒泄瀉二宜 大兒二用フルキハ阿芙蓉丁幾一二滴ヲ加ヘテ可ナリ

○第二千二十一方 過傑。栗屈的兒

甘扁桃油 亞刺毘亞蘆謨 扁桃舍利別 各二 桂水

半 苗香水 一 已上五味調勻每半時服一二茶匙

主治幼兒泄瀉二宜 香竄胃硬膏及ヒ漿粉灌腸モ亦兼

施スベシ

○第二千二十二方 弗梨結

過兒托煎 二 甘扁桃油 亞刺毘亞蘆謨末 各二

硃砂加過泥子精 廿五 冰糖 二

右調勻每半時或一時服二茶匙

主治初生後二三個月ヨリ二歳至ノ兒粘液膜諸病皮表

ノ運營妨碍ニ由テ發スル者即疝泄瀉等ニ宜シ

○第二千二十三方（速突出）

沙列布淡煎三 大黃丁幾 水製 桂水半 白糖二

右調勻每半時服二茶匙

主治嬰兒無熱泄瀉症舌上苔ヲ帶フル者之ニ宜シ

○第二千二十四方（穢歇蘭度）

蝟蛄石 苗香油糖 遏兒把末各一 舍電阿芙蓉液

滴一

右調勻為散分四服每二時一服

備考小兒ノ泄瀉ヲ遏止スルハ極メテ慎重スヘシ而メ

阿芙蓉ノ如キハ僅ニ其量ヲ過キ或ハ不適當ノ症ニ之

ヲ用フレバ速ニ卒中狀ノ症ヲ發メ斃ル世人之ヲ諳知

スルヲスシ是故ニ上ノ散方ヲ處スル前先更ニ緩藥ヲ

施スナリ即油質粘滑乳劑或ハ之ニ雞子黃ヲ加フル者

沙列布煎米飲雞卵水漿粉灌腸肚腹肉豆蔻拔爾撒謨（附）

塗擦自製蒸餅心胃硬膏香竄温煖赤葡萄酒等是ナリ已

上方法ヲ用ヒテ効ナク泄瀉頑然トメ止マズ將ニ知覺

過敏症ニ陥ントスル片ハ上ノ散藥一服ヲ與フ之ニ由

テ泄瀉速ニ鎮定スヘシ但已ムラ得ザルノ症ニアラザ

レハ二時後第二服第三服或ハ第四服ヲ連用スル勿レ

多血肥滿或ハ頭上熱シ顔面赤色ノ兒ニハ決メ此散ヲ
處スベカラズ

○第二千二十五方〔骨布〕

甘汞一 乳糖十八

右調勻為散分六晝早晚取一晷乳汁和服

〔主治〕小兒泄瀉ニ宜シ○他ノ醫モ亦至小量甘汞ヲ以テ
此症ノ殊藥トス大便綠色ニノ腹痛甚シキ者ハ最好ト
ス其便透明白色ニメ雞卵ヲ破ルカ如キ者ハ効ナシ甘
汞ヲ用ヒテ泄瀉減スル者ハ骨布氏速ニ後服ヲ停ム○
上方服量ハ哺乳兒ニ充ツル所ナリニ歲乃至ハ歲兒ハ

甘汞一日ニ四分日ニ一次乃至三次ニ分服セシ此
方ヲ用フルモ尚泄瀉緩慢治セザルキハ骨布氏硝鐵華
丁幾或ハ檳楂加鍊丁幾或ハ小量炭酸鍊ヲ用フ而ノ骨
布氏ハ此ノ如キ嬰兒ニ絶テ阿芙蓉ヲ與フルナシ

○第二千二十六方〔遠突土〕

菖蒲根 滾湯適宜浸濾取三勺加後味

亜刺昆 亜護謨一錢 白糖二錢

右調勻每二時服一茶匙

〔主治〕小兒胃弱及ヒ虛性泄瀉ニ宜シ之ニ兼テ肚腹ニ香

竄藥登法ヲ施スベシ

○第二千二十七方 同上

王幾那粗末弓半 滾湯適宜浸八分時濾取三弓溶化

紺百設木越幾斯一錢加後味

桂水 橙花舍利別各半

右調勻每半時服一琶布匙

主治小兒頑固泄瀉二宜

○第二千二十八方 穢駭蘭度

葛カ私カ加栗刺越幾斯十五 苗香水二 沙列布漿過兜托舍

利別各半

右調勻每二時服一茶匙

主治小兒慢性下利或ハ屢反復スル下利二宜

○第二千二十九方 護利私

格綸僕錢一 沙列布刀半 井水適宜煮八分時濾過取

三弓加後味

加密列舍利別弓半

右調勻每半時服一兒匙

○第二千三十方

沙列布煎二弓以八 格綸僕末八八至 阿芙蓉液二滴

實亞格地温弓半

右調勻每半時乃至一時服一琶布匙

主治右二方二十廿九方 大兒ノ慢性瀉ニ宜シ

○第二千三十一方遠突土

格綸僕越幾斯錢一 沙列布淡煎牙三 茴香油糖刀二

右調勻每半時服一二茶匙

主治小兒經久脫衰下利ニ宜シ

○第二千三十二方過傑栗屈的兒

葛私加栗刺錢一 錢至 滾湯適宜浸濾取二勺乃至三

勺溶水製番木鱉越幾斯一匁乃至二匁再加後味

亞刺昆亞護謨漿 過兒托舍利別各一

右調勻每二時服一匙布匙臨用宜振盪

主治小兒泄瀉生力虛脫シ。胃化衰耗。腸ノ感覺充進裏急後重及ヒ脫肛スル者ニ宜シ

○第二千三十三方履結

精製礬土刀十二 黑櫻實水 亞刺昆亞護謨漿 過兒

托舍利別各半

右調勻每半時服一茶匙

主治乳兒ノ泄瀉ニ宜シ

○第二千三十四方

精製礬土刀一 硃砂加過泥子精刀二 過泥子水刀二 桂

舍利別半

右調勻每半時服一匙布匙

（第二千三十五方）肝爾私

結晶硝酸銀四分 蒸餾水二勺溶解加後味

亞刺毘亞蘆謨二分 白糖二分

右調勻內玻璃壘黑紙被覆貯每一時服一茶匙或一匙布

匙

主治離乳泄瀉ラジアロエリ。アブニ宜シ之ニ兼テ硝酸銀

四分ハ一粘汁半勺阿芙蓉少許ヲ調和シ灌腸ス肝爾私

氏ガ此ニ離乳泄瀉ト稱スル者ハ世醫或ハ胃腸軟化ス

トシロバト云ヒ律私名ハ嬰兒格列刺ト云ヒスコレライシ

臃滿名ハ血質不良卒中ト云ヒシ。ホ。フ。レ。キ。オ。ル。シ。ト阿爾連板篤

名ハ養管麻痺ラリシス。カ。ナ。ト。云。フ。者。同。一。症。ナリ。此

症誘因ハ生齒速因ハ離乳トス生齒ト離乳ト一齊ニ來

ル者ハ殊ニ此症ヲ發スルナリ只病初泄瀉輕ク熱勢熾

ナル時ハ格魯林ヲ用フヘシ葛私加栗刺格綸僕安侃私

點刺西。瑪。爾。拔。等。保。固。藥。ハ。唯。輕。症。ニ。適。當。ス。ル。ノ。以。明。礬

及ヒ鐵劑殊ニ外。鍊。鹽。撒。兒。末。爾。ハ。効。力。優。ニ。勝。レ。リ。他。藥

ノカヲ須タズノ効ヲ得ルアリ鉛糖ハ稱譽スヘキニ

アラズト雖肝爾私曾テ之ヲ二三兒ニ用ヒテ良効アル

ヲ見タリ已上諸藥ニ勝リテ結晶硝酸銀ヲ上法ノ如ク

用ヒテ卓越ノ効ヲ得タリ其大便減シテ稠厚トナリ既ニ二三日ニメ全ク止ミル后灌腸法モ屏ケテ用ヒサルニ至レリ

○第二千三十六方篤優爾黠亞兒

林檎酸鈣丁幾 香竄丁幾各半

右調勻每服十滴二十滴乃至三十滴日三次

主治小兒腸ノ衰弱及ヒ粘液鬱滯症胃中酸敗液ヲ帶フル者泄瀉蟲症及ヒ陰部ヨリ粘液流出スル症等皆此方ニ宜シ

○第二千三十七方

肉豆蔻油 薔薇軟膏各二錢 忽弗滿拔爾撒謨非答錢半

至一錢 阿芙蓉丁幾一錢

右調勻為軟膏塗擦肚腹

主治小兒慢性泄瀉胃腸衰弱及ヒ肚腹膨脹症ニ宜シ

○第二千三十八方穢歌蘭度

遏兒托軟膏 肉豆蔻拔爾撒謨附各半 綿答幾里私布

油六滴 舍電阿芙蓉液一錢

右調勻同上

主治同前○大抵肉豆蔻拔爾撒謨單味ニメ足レリ

○第二千三十九方叔渴耳杜葛列私

番木鱉越幾斯 水製一公 至二公 蒸餾水二錢溶解

右調勻乳兒每服二滴乃至三滴大兒六滴乃至十二滴臨服宜振盪

主治 小兒泄瀉後屢患フル所ノ脱肛ノ奇方ナリ○頑固症ハ刺達尼越幾斯ヲ加フ

完穀下利 スベリスロープ 蘭

此症世人ノ通知セルカ如ク食後少頃ニシテ不化ノ飲食肛門ヨリ下ルヲ謂フナリ輓近謁噶刺歇 名人 第二症ヲ記セリ其症大抵軍中ノ歩卒ニ限リテ痢疾後ニ發シ之カ為ニ死スル者他病ヨリ多シ其証黑色流動ノ少シク惡臭ヲ帶ル

物絶エス肛門ヨリ流下ス其中著シク不化ノ食物ヲ交フ

病者死ニ臨ム至食欲ヲ失ハズト雖速ニ虚脱スルナリ○

第一症ハ阿芙蓉 千九百八十二方 至千九百八十四方 菲阿斯老利兒結爾斯

水 八百八十一方 至八百八十五方 等麻酔藥ヲ用ヒテ腸ノ感觸過敏ナル者ヲ遅鈍ナラシメ兼テ私昆列印 名ノ歴驗ニ據リ

テ皮表ノ誘導諸法殊ニ微温水ニ刺篤亞斯ヲ加ヘタル浴

法ヲ施シ其后苦味收斂ノ方法ニ移ル即依蘭苔格綸僕 九

至 百九十八方 至二千九百八十二方 葛私加栗刺 二千一百一十方 阿仙藥 二千一百一十方 吉訥

二千四百方 紺百設木 二千九百九十四方 明礬 二千九百九十四方 鐵劑 二千九百九十四方

方ノ如キ是ナリ但之ニ麻酔藥ヲ配用スベシ倚弗蘭屈 名

ハ皓礬ヲ與ヘテ良驗ヲ得タリ每服皓礬一匁ヲ以テ健質
 亞那越幾斯二匁ニ伍シ日ニ三服セシム危篤ノ症ハ倚百
 弗蘭屈名人及ヒ私昆列印名人等巴豆油及ヒ藤黃ノ如キ峻下
 劑ヲ試用セント思欲セリ疇昔一症アリ頑固ノ完穀下利
 ニノ百方寸効ナシ一醫一方ヲ施メ治セリ倚百弗蘭屈名人
 其方ヲ記ス即旧製玫瑰昆設爾弗三弓的里亞加三錢槓植
 煉膏適宜已上三味合メ舐劑トシ病者他ノ飲食ヲ禁メ每
 次一羅獨ヲ取り服スル一日ニ三次スト云フ私傑福傑兒
 名ハ安私傑刺煎汁ニ紺百設木越幾斯阿芙蓉及ヒ槓植
 舍利別ヲ加フル者ヲ稱用セリ○第二症ハ噉刺歇名小腹

ノ左側ニ大發疱膏ヲ貼スルヲ以テ最良法トシテ之ヲ稱
 用シ並ニ漿粉灌腸法或ハ之ニ阿芙蓉丁幾ヲ加フ百九十
 千十六方至二千十八方内用ハ小量吐根ニ宜シ但丁幾二千四
 者最妙トス末期ニ至テハ紺百設木煎或ハ格綸僕煎十七方ヲ好
 トス

○第二千四十方秘列傑兒

甲方

括失シ亞屑ニ 冷水六弓浸屢振盪經十二時濾過加

後味

老利兒結爾斯水一錢至

右早午晚服一食匙

主治完穀下利ニ宜シ○之ニ兼テ漿粉溶液ニ老利兒結爾斯水ヲ加工灌腸スルヲ要トス

乙方

漿粉一錢半

微温水一匕溶煮沸少頃濾過加後味

老利兒結爾斯水一錢半

右調勻二分供灌腸

○第二千四十一方〔溼優滿〕

阿仙藥 肉豆蔻末

炭酸曹達各六

酒石酸三 白

糖半

右調勻為散分十二服每一時半一服

主治完穀下利ニ宜シ

○第二千四十二方〔蒲列刺〕

吉訥六

阿仙藥五

明礬半

玫瑰昆設兒弗適

右為八九衣桂末每服一九日三四次每服後宜飲玫瑰浸

液

主治粘液流出因弛緩症完穀下利泄瀉虛性咯血過多痔

血ニ宜シ

○第二千四十三方

紺百設木六錢

井水九勺乃至十二勺煮耗至六勺濾

過加後味

桂舍利別弓半

右調勻每二時服二食匙

主治完穀下利末期二宜シ

○第二千四十四方 明礬乳清

牛乳新鮮者 生明礬一錢

右和勻令凝結後漉過加白糖一弓每服三弓日三次

主治虛性咯血。子宮出血。慢性下利。完穀下利等二宜シ

二十七方ヲ
参照スヘシ

○第二千四十五方

肉豆蔻油一錢

肉豆蔻拔爾撒謨附一

杜松子酒二

右調勻塗脊椎日數次

主治此方完穀下利二偉効アルベシ

○第二千四十六方私傳。福傑兒

格綸僕越幾斯二錢

肉豆蔻拔爾撒謨錢半

舍電阿芙蓉

液廿滴至 龍腦半

右調勻塗麻布貼肚腹

主治泄瀉。完穀下利等二宜シ

○第二千四十七方謁嚙刺歌

吐根丁幾一

遠西本草 卷六 完穀下利 一 月 膠 字

右每一時半服十滴乃至十五滴

主治痢後ノ完穀下利ニ宜シ此症ヲ治スルハ小腹左側

ニ大發疱膏ヲ貼スルヲ第一奇法トス次テ漿粉灌腸ニ

宜シ或ハ之ニ阿芙蓉丁幾ヲ加フ

○第二千四十八方羅仙私的印

越質屋布私麻兒秩斯 葛私加栗刺越幾斯各二錢 桂

舍利別宜適

右二匹為一九衣銀箔每服三九乃至五九日三次

主治大兒泄瀉ノ末期ニ宜シ兼テ二千四十五方ヲ塗擦

スベシ

○第二千四十九方灑格魯杜

鐵粉 桂皮各十 白糖一

右調勻為散分十二服早晚一服

主治同上

乳麩利フユキニス。クローリアキ

此症ハ粘液下利及ヒ直腸粘液流出症ノ一種トス其治第

一病因ニ着眼ノ之ヲ索ムベシ而後著草括失亞格綸僕九千

百九十八方 良姜二千五十一方至 紺百設木二千九方二及

至二千方 鐵劑等ノ如キ苦味強壯方ヲ用フベシ醫或ハ灌腸法ヲ

稱賛ス葛爾科名地ノ獨戾失倔名ハ鉛糖及ヒ阿芙蓉越幾斯

三十二

遠西方藥 卷六 乳麩利 廣 朋 堂

蒸餾水ニ、密發私去爾ニ胡蘿蔔ヲ加用シ或ハ虚症ヲ治
スルニ没食子煎ニ迷迭香油忽弗滿液及ヒ阿芙蓉丁幾ヲ
加シ栗屈的兒石人ハ石灰水ニ外承ヲ和用セリ

○第二千五十方私傳福傑兒

硫黃華 上好沒藥 癒瘡木脂 角苗香 白糖各二錢

右調勻為散分三十服日三四服

主治乳麩利ノ痔疾ニ因ル者ニ宜シ○時々肛圍ニ蟻鉗

ヲ施スヘシ

○第二千五十一方獨民失僂

良姜末二錢 熱湯六勺浸漬蓋閉飽熟一時半濾過加

後味

越栗失爾茂印失屈篤二錢 葛私加栗刺越幾斯二刀 橙

皮舍利別一

右調勻每半時服一食匙

○第二千五十二方同上

沒食子 良姜各末二錢 熱湯六勺浸漬蓋閉飽熟一時

半濾過加後味

越栗失爾茂印失屈篤二錢 水楊皮越幾斯一錢 橙皮舍

利別半

右調勻每半時服一食匙

遠西方藥 卷六 三十三 廣 朋 堂

乳糜利 廣用堂

主治右二方敏性衰弱ノ乳糜利ニ宜シ之ニ兼テ腎上ニ
發泡膏ヲ貼スヘシ

○第二千五十三方同上

沒食子 良姜 健質亞那各末半刀 苜蓿油二滴

右調勻為散分六服蠟紙包裹每一時取一畏冷水送下

○第二千五十四方

亞兒尼加花 苜蓿根各一錢半 熱湯五勺浸漬蓋閉飽

熟一時濾過放冷加後味

硃砂加過泥子精一錢半 沙糖舍利別半勺

右調勻每半時服一食匙

○第二千五十五方獨戾失憊

白芷 薄荷各一錢 熱湯四勺半浸漬濾過放冷加後

味

七葉樹皮越幾斯 良姜丁幾 忽弗滿液各一錢 沙糖

舍利別半勺

右調勻每半時服一食匙

主治二千五十三方ヨリ二千五十五方至鈍性衰弱ノ乳

糜利ニ宜シ

○第二千五十六方襟過栗儷的兒

枸橼汁一勺 甘扁桃油半勺 渴爾托舍利別半勺

西方書 卷一 廣用堂

右調勻每二時半服一食匙

主治頑固慢性泄瀉及ヒ乳藥利等ニ宜シ○私的印歌憎

名モ亦甚稱賛セリ

肝崩フリキユスヘパチキス羅

此症治法專原因ニ從フテ處スベシ多クハ腹臍ノ壅塞硬
結腫其他諸般ノ器敗病ニ因テ發スルカ故ニ通例緩解釋
劑ヲ用ヒテ効ヲ得ベシ勁性収瀋劑抑壓藥ハ罕ニ効ヲ奏
スルノミ是故ニ紺百設木二千九方二及ヒ明礬乳八百廿
四四十ノ如キ間良驗アリト雖却テ之レカ為ニ病惱ヲ倍
スル一屢之アリ衰耗羸瘦セル者ハ滋養劑三百六十二方
至三百八十二

方例スルニ幾那浸劑或ハ煎劑百六十一方百六十二方二
ヲ用ヒテ之ヲ補益スベシ

○第二千五十七方

幾那六錢 熱湯適宜浸安微温所飽熟四分時瀘過取

液五勺加後味

橙皮舍利別一

右調勻每二時服一食匙

○第二千五十八方

幾那半 井水十二勺煮耗至六勺瀘過

右每二時服一食匙

遠西方彙
卷十八
肝崩
三
廣
月
堂

主治肝崩及ヒ他病ニ用ヒテ生カヲ補益スルニ宜シ

遠西方彙卷之十八

書肆

江戸芝神明前

和泉屋吉兵衛

