


遠西方彙

二十

吐涎	○陰萎	遺精	尿崩	○小便淋瀝 ○尿石	小便瀰滯	小便失禁	黃疸 ○膽石	便秘	○卷之二十
----	-----	----	----	--------------	------	------	-----------	----	-------

十武 9
237
20



門 武 9
番 237
卷 20



遠西方彙卷之二十

獨乙

加。幾安頭

和蘭

傑。婪婆都

譯

侍醫法印伊東瑤川院 貞文仲 重譯

南洋伊東亨健夫 參校

便秘オグストムクチオアルヒハルドレイヒフヘイド蘭

大便常ニ秘スル者ハ屢開豁氣中ニ逍遙シ早晚冷水ヲ多
服シ總テ難化ニノ便秘ヲ致シ易キ食餌ヲ戒シ菜蔬果實
及ヒ肉食ヲ要トス其人假令便氣ナシト雖毎日同時ニ上



本草綱目卷之二十一
卷二十一
黃半堂

園ヲ試ミ以テ習慣スルヲ切要トス蓋其定期ノ如キハ每
 朝哥喜ヲ喫スルノ後ヲ以テ妙トス間亦服藥ノ瀉ヲ促ス
 フ要スルモ尚用ヒザルヲ優レリトス鹽類瀉劑ハ腸ヲ弛
 弱セシムルカ故ニ之ヲ要セス大黃ヤラバ藥刺巴及ヒ蘆薈劑ヲ
 佳トス左ニ列舉スル方法ノ外第七百四十方乃至第七百
 五十三方第九百二方乃至第九百六方九百九方九百十方
 九百廿四方等瀉ヲ促スニ用ヒテ可ナリ○輓近巴黎斯ノ
 商家ウツ娼兒ル頭名植物ヲ調合ノ散末ニ作り謁爾法連答ト名
 ケテ四訖キ祿グ屈ク焚フ墨メ種量ヲ一包トナシ之ヲ頑固便秘ノ秘
 方ト稱ソ世ニ嚮グ此散四羅獨乃至六羅獨ヲ取り乳汁或

ハ肉羹汁半比若クハ四分比ノニヲ以テ煮ル一六密扭篤
 乃至八密扭篤ニ粥トナシ毎朝空心ニ服シ或ハ晚際再
 服一劑服盡ノ効十分ナラザレバ又第二劑ヲ服ス此方
 良効アリ而メ害ヲ致スナシヒ滌フ涅ル兒ル名ノ說ニ從ヘバ此
 散豆粉ヲ以テ製スト云ヒテ耆シ的リ弗フ名ニ從ヘハ謁魯ル穢シ謨
 噎シ爾ル利リ亞ア附フノ粉末ヨリ成ルト云フ○娼兒頭ノ家ニ格
 董キ機キ那ナ砂サ糖ト舍シ利リ別ベ詳シ未ミヲ嚮ク謁爾法連答ノ効力足ラサル
 者ハ之ヲ加ヘテ以テ其効ヲ扶ク
 ○第一千八百八十一方穢歌蘭度

梅那末ニ 蒲公英流動越幾斯適

右為六十九衣石松粉每朝服五丸乃至十九

主治便秘ニ宜シ○旃那ハ便秘症ニ用ヒテ毎ニ害ナク且確効ノ藥劑タリ然レモ常住之ヲ用フルト勿レ

○第二千八百二十二方 折魯蔑印名國浸劑

旃那葉弓四加再餹燒酒飽熟十二時濾去液陰乾合後

味

接骨木花半二弓

茴香

過泥子各一弓

純精酒石六錢

右調勻

主治常習便秘ニ宜シ○此劑ニ弓ヲ取り水五弓ヲ注キ暖所ニ安シ飽熟スルト五時ノ後濾過ス此浸液半錢ヲ

與フ胃弱家ハ麻刺瓦酒少許ヲ加ヘ服ス其効確實ニシ

テ數回之ヲ用フルモ毫モ害ヲ遺スナシ

○第二千八百三十三方 嚙名地未利

白石鹼錢二 砂糖舍利別適

右調勻二ハ為一九衣麻樞涅失亞或甘草末朝餐與午食之中間或晚間臨卧服四丸乃至五丸

主治常習便秘ニ宜シ此丸連服二三週ニ全功ヲ收ムルニ至ル之ヲ服メ通例四日乃至六日ノ後始メテ効ヲ呈スヘシ毎日一回平便ヲ得ルニ至ラハ服數ヲ減シ或ハ一日休歇ス累年頑固ノ便秘症及ヒ其症膽石ヲ兼併

セル者末利名上法ノ如ク此丸ヲ與ヘテ脱然根治セリ
之ヲ久服スルモ決ノ胃弱等ノ害ヲ致ス一ナカリシト
云フ

○第二千八百八十四方〔秘歌蘭度〕

牛膽 白石鹼 大黃末各一錢 蒲公英越幾斯宜適

右二丸為一九早晚服十九

○第二千八百八十五方〔福二倔篤〕

白石鹼三錢 大黃越幾斯半錢 大黃末宜適

右調勻作坐丸三個衣蕃薇軟膏蠟紙包裹早旦取一個挿
入直腸

○主治右二方二千八百八十四方便秘習僻ノ者ニ宜シ

○第二千八百八十六方〔秘私〕

透明蘆薈一錢 大黃 白石鹼各一錢 蒲公英越幾斯宜適

右為六十九衣伊里斯弗魯連底那末晚間服二三九

主治大便ヲ促スニ宜シ○緩効ヲ要スル時ハ早晚六丸
乃至八九ヲ服スベシ

○第二千八百八十七方〔歌憎〕

蘆薈越幾斯半錢 葯刺巴末一錢

右調勻為二十九衣石松粉内玻璃壘固封日晡服一九乃
至三九

○第二千八百八十八方同上

蘆薈越幾斯錢半 加拔爾撒謨字露舍利別一弓白搗更

加後味

格魯董篤丁幾錢一

右調勻日晡服一小食匙臨用宜振盪

○第二千九百九十九方私託兒名 瀉下丸

格魯董篤越幾斯 透明蘆薈各一錢半 鐵粉錢半 亞刺毘

亞蘆謨漿風

○右為四十九衣石松粉晚間服一二九

○第二千九百九十九方戒歇蘭度

上好蘆薈 鐵粉各一

右調勻一匁為一九衣石松粉日晡服一九乃至三九

主治二千八百八十七方ヨリ二千九百九十九方至常習便秘

罹リ易キ者ニ宜シ○歇憎名通例二千八百八十七方ヲ用

フ但其九十分ノ効ヲ奏セサルハ二千八百八十八方ヲ

與フ

○第二千九百九十一方百私列斯弗名 瀉下丸

鐵粉錢十五 蘆薈越幾斯錢一 複方大黃越幾斯附半

右調和加再留火酒少許為四十五丸衣石松粉早晚服二

丸乃至三九

主治此方衰弱セシムルナク連綿緩下ヲ促スニ好

○第二千百九十二方〔歌〕 穢シ蘭度

蘇甘沒各一 鐵粉各一

右調勻一匁為一九〔衣〕石松粉日晡服一九乃至三九

〔附考〕 鐵粉少許ヲ加フルハ蘆薈及ヒ蘇甘沒〔各一〕効大

ニ倍加ス

○第二千百九十三方〔秘〕 滌私

藥刺巴脂一錢 白石鹼一錢 加密列加枸櫞油〔附〕十

再餹火酒〔適〕

右為六十九〔衣〕石松粉早晚服二九乃至四九

○第二千百九十四方〔歌〕 穢

複方蘆薈丁半錢 藥刺巴末一錢 旃那煉膏一

右調勻早旦服一茶匙

主治二千百九十二方ヨリ二千百九十四方至便秘常習

ノ者ニ宜シ

○第二千百九十五方 穢〔歌〕 蘭度人造蓖麻油

巴豆油一 白罌粟油一

右調勻每一時與一食匙以至得瀉

主治瘰癧性便秘ニ宜シ

○第二千百九十六方〔歌〕 穢

蓖麻油半 格魯莖篤丁幾

右調勻早晚取一茶匙塗擦肚腹

主治便秘二宜又腺腫ヲ解釋スルニ好

○第一千九百九十七方設備室

藥刺巴二 甘汞四 孕礬酒石一

右調勻為散分二畏若四畏若八畏準年每一時與一畏以

至得効

主治常習便秘ニ相當シ難シ但内臟粘液畜積及ニ蟲症

ニ用ヒテ更ニ的中ス

○第一千九百九十八方倚私的爾連

巴豆油滴 甘扁桃油錢 亞刺昆亞護謨錢 白糖半

右加常水三勺搗和作乳劑每半時服一食匙以至得効

○第一千九百九十九方同上

巴豆油滴 加白石鹼一錢搗爛再加後味

藥刺巴石鹼附 藥刺巴脂各一

右調勻為三十九衣石松粉每服二九乃至四九日二三次

○第一千二百方 巴豆油糖

巴豆油滴 桂油糖錢

右調勻為散每服十片乃至三十片日二次

主治右三方頑固便秘嫩衝症ヲ帶ヒザル者ニ宜シ

遠西方書 卷二十一 便秘 廣

○第二千二百一方

白糖一錢

精製漿粉廿四

歐朴魯毘刺室利實油龍骨木脂

右調和作羅黥刺十ノ類附一個九人大人每服二個或三個小兒一個

主治暴瀉ヲ促スニ宜シ○歐朴魯毘刺室利實油ニ三種アリ一ハ絞搾ノ取ル者ニハ亞爾箇兒製三ハ亞的兒ヲ加ヘ列兒氏ノ搾具ヲ用ヒテ搾リ取ル其第一第二ハ吐瀉ヲ發シ或ハ失氣昏冒ヲ起スアリ第三種ハ瀉下ノ効更ニ倍スト雖昏冒ヲ發スルコトナシ而ノ服量一錢半

ニ至テ始メテ吐ス○疇昔此油ヲカタヒチア。ミノリス油ト唱ヘ用フ輒近葛兒達利尼名人及ビ拔耳備爾同之ヲ巴豆油ニ代ヘテ稱用セリ臍別名人乙蘭名人及ヒ末兒珍同ハ頑固便秘。鉛毒症。繚蟲等ニ用フ

○第二千二百二方

大黃舍利別六錢 滿那舍利別 海葱蜜各二錢

右調勻茶匙抄服

主治乳兒ノ下劑トス

○第二千二百三方孤老私

亞爾鮮越幾斯半錢 格魯莖篤越幾斯半錢 薄荷

至一錢半

水酒製附

右調勻每日取一二茶匙塗擦肚腹

主治大便閉並小兒蟲症ニ宜シ

黃疸 イクラリス 羅ゲ ○膽石 カルキリ ビリオン

黃疸ハ膽液ノ分泌障碍アリテ膽液十二指腸ニ流通セザ

ルニ因ル故ニ排泄失常症ノ列ニ算入シテ可ナリ ○黃疸

焮衝性ヲ夾ム者ハ放蟻清涼劑酸性瀉藥 五百七十五方至

中和鹽 四十九方至五十五方 或ハ其症ニ準シテ甘汞モ亦用

フベシ ○瘵攣ヲ帶フル者ハ加密列默栗薩續草ノ浸劑民

垓列利精阿魏菲阿私越幾斯阿芙蓉吐根 二千二百 等ニ宜シ

○原因門脈系ノ壅塞或ハ肝脾ノ腫脹ニ係ル者ハ解凝劑

ニ宜シ總テ絞汁殊ニ白屈菜新絞汁 始メ毎服一茶匙漸ク

三次ニ用ヒ且肝部ニ灰白水銀膏ヲ塗擦スベシ 大黃及

七蘆薈 二千二百八十四方至二千二百八十六方 ハ皆此症ニ奇

効アリ極テ頑固ノ症ハ穢歇蘭度莨菪ニ大黃ヲ加ヘ 二千

方ニ過兒栗屈的兒 名ハ青酸莨菪水 稱用セリ

之ニ兼テ鑛酸脚湯 五百八十七方 ヲ急ル勿レ ○黃疸膽石ニ繼テ

發スル者ハ油性劑及ヒ鎮痙劑ヲ與ヘ其見証ヲ鎮靜メ後

膽石根治ノ法ニ移ルヘシ 二千二百十六方至 ○初生兒ノ

黃疸ハ惟緩瀉藥 二千二百十五方至 一二服ヲ要スルノミ

遠西方彙

卷二十一

九

廣勝堂

堂

○第二千二百四方〔按魯賢佛兒〕

吐根錢一 橙皮錢二 井水適宜浸漬瀝取三 弓溶孕鹼酒

石一錢更加後味

加密列舍利別一

右調勻每一時半服一食匙

主治瘵癯性黃疸二宜シ

○第二千二百五方〔按駝蘭度〕

蒲公英越幾斯 白屈菜越幾斯各一錢半 孕鹼酒石二錢

水製大黃丁錢半 薄荷水一 蒸餾水二 薄荷舍利

別弓半

右調勻每一時服一食匙

○第二千二百六方〔同上〕

蒲公英越幾斯 白屈菜越幾斯 白石鹼 蘧謨安沒

尼亞幾 大黃末各一錢 蘆薈一

右調勻二丸為一九衣石松粉早午晚服十二丸

主治黃疸緩瀉藥ヲ與ヘテ効ヲ見ザル者之ニ宜シ

○第二千二百七方〔福俚列爾〕

蘧謨安沒尼亞幾 孕鹼酒石各二錢 蒲公英越幾斯適宜

右二丸為一九衣石松粉每服六粒乃至八粒日三四次

主治帝ニ之ヲ黃疸ニ用フルノミナラズ總テ之ヲ以テ

蘧謨安沒 蘧謨安沒 蘧謨安沒 蘧謨安沒 蘧謨安沒 蘧謨安沒 蘧謨安沒 蘧謨安沒 蘧謨安沒 蘧謨安沒

解釋瀉藥トス

○第二千二百八方〔過佛乘屈的兒〕

精製蘘蓎安沒尼亞幾 蒲公英越幾斯各三錢 白屈菜

越幾斯一錢 白石鹼二錢

右調勻二匁為一九衣大黃末每服十粒乃至二十粒日三

次

〔主治肝臟變質症及ヒ黃疸ニ宜シ〕

○第二千二百九方〔匹篤夫葛弗士〕

水製蘆薈越幾斯五匁至十匁 蒲公英越幾斯二錢 桂水六

可溶化加後味

苦扁桃濃水半錢至一錢

右調勻每半時服一食匙臨服宜振盪

○第二千二百十方〔百叔泥姪爾〕

精製蘘蓎安沒尼亞幾二匁 白屈菜越幾斯 白石鹼

大黃末各二錢 布律謨蔑爾散 失鳩苔越幾斯各一匁

右調勻二匁為一九衣石松粉早晚服十粒乃至十二粒

〔主治黃疸原因器敗ニ係ラサル症總テ之ヲ稱用ス之ニ〕

兼テ大草根泡劑ヲ服シ礪砂揮發加龍腦膏阿芙蓉丁幾

及ヒ的列並油ヲ調和メ肝部ニ塗擦スル一日ニ數回又

屢石鹼温浴ヲ行フベシ

○第二千二百十一方弗廉珉偲

白屈菜越幾斯 大黃末 白石鹼各二錢 失鳩峇越幾

斯一 甘汞半

右調勻二為一丸衣甘草末晨夕服十九乃至十二丸

主治黃疸肝臟、硬結腫係ル症之宜シ

○第二千二百十二方歐蘭度

葶藶一 大黃五 白糖一

右調勻為散分八服早晚一服

主治肝脾、閉塞及硬結腫頑固黃疸並瘵癆喘及

心悸動宜シ

○第二千二百十三方私鳩爾

過兒祿山五 甘草末半

右調勻為散分十二服日三服

主治慢久胃腸ノ虧損肝ノ腫脹及焮腫ヲ兼ヌル症黃

疸吐涎削瘦勞瘵熱等皆危險ニメ其治望ム可カラサル

が如キ者此方良効アリ之ヲ服シテ黃尿能ク利シ大便

順下シ諸候漸々減退セリ○往歲既ニ利毘偲名之ヲ驗

查セシニ過兒祿山ハ肝臟病ノ一要藥タリト云フ○過

兒祿山ハ尿酸ト硝酸ト和ノ生ズ無色ニ真珠ニ類シ

光輝玻瓈ノ如キ結晶物ナリ味鹹酸不佳ニ殆鑛屬ノ

遠西方彙 卷二十一 黃疸 十一 廣肝堂

如シ能ク水ニ溶化ス

○第二千二百十四方 穢歇蘭度大黃砥劑

大黃舍利別 苗香水 各半

右調勻每服一茶匙日三次乃至四次

○第二千二百十五方 遠突土

蜷姑石 一 苗香水 一 弓溶加後味

大黃水製丁幾 滿那舍利別 各半

右調勻每一時服一茶匙臨用宜振盪

主治右二方初生兒ノ黃疸ニ宜シ

○第二千二百十六方 穢歇蘭度

白石鹼 半 蘄謨安沒尼亞幾 亞爾鮮越幾斯 各二錢

右調勻二匁為一九衣石松粉每服十九日三次

○第二千二百十七方 受蘭度 名 膽石水

的列並油 半 亞的兒 二錢

右調勻每服三十滴乃至六十滴日三次

附考上方ハ穢歇蘭度ノ書ニ據レリ他人記スル所ノ膽

石水 ギニツキ ラン ダ ハ亞的兒半弓的列並油二錢ヲ調和シ每

服十五滴乃至三十滴日二三服

○第二千二百十八方

新鮮牛膽 薄荷水 各二

遠西方彙 卷二十一 廣濟堂

右調勻食匙抄服

主治 二千二百十六方ヨリ二千二百十八方至膽石症ヲ

根治スルニ宜シ ○哆田トウデン名ハ石灰水一坵中ニ炭酸曹達

二錢ヲ溶解シ毎日飲服十四日間持重セシム又乳養法

此症ニ嘉稱アリ鑛泉ノ中ニ就テ「カル、ハ泉」マリオン

「バット」エムス等ヲ良トス ○菜蔬ヲ食シ身體ヲ運動シ冷

水ヲ多服シ總テ便秘ノ療法ヲ行フニ宜シ

小便失禁 ユニレシス ○インコンチチア。ユリナエ

此症痙攣性或小靈敏性ノ者ハ殊ニ胃腸ノ汚物蟲 腸

脱痔尿石ニ注意スベシ 解釋下劑殊効アリ其他吐根ニ 百

方十九 苳若阿魏微温湯浴半身 全身角法等ヲ稱用ス ○麻痺性及

鈍性ノ症ハ其治甚難シ此症麥奴ニ 二千二百二十方及ヒ

芫菁ニ 二千二百方ヲ殊稱セリ其他番木鱉私 的列幾尼捏臘 實

干斯烏華烏爾識葉ヲ用ヒ並ニ衝動藥ヲ以テ膀胱ノ部ヲ

洗滌シ薦骨上ニ芫菁膏ヲ貼スル等之ニ宜シ一病者十八

歳小便失禁ヲ患フ按スルニ是其因膀胱括約筋ノ無形障

碍ニ係ル苟連名 地ノ捐篤私葛兒屈名 硝酸私的列幾尼捏每

服十六分ハ一日ニ三服速ニ平治ス蓋之ニ兼テ腰上發

疱法ヲ施シ其部ニ刺戟軟膏ヲ塗擦セリ餘ハ膀胱麻痺條

下ニ列載セル方法千 百五十二方至千 百六十三方ヲ參考スベシ ○小兒

夜間ノ遺尿ハ多ク習慣ニ係ルアリ

○第二千二百十九方別栗的兒

吐根末三 甘汞六 莨菪越幾斯四 結麗土一 糖二 錢二 乳

右調勻為散分十二服早旦空心一服及日晡臨卧各一服

主治夜間遺尿ニ宜シ○一人十九歲遺尿ヲ患フ栗的兒

名此散ヲ連進スル一四箇月ニシテ又外用松脂硬膏ニ

吐酒石ヲ和シ薦骨ノ部ニ貼セリ且栗的兒氏ノ說ニ據

ルニ敏性ノ遺尿ヲ治スルハ極メテ尿ヲ緩和スルヲ以

テ第一義トス故ニ扁桃乳。罌粟乳。及ヒ大麻子ニ石松粉

ヲ加用スルニ宜シ

○第二千二百二十方私戒蒲兒

麥奴一 錢一 滾湯四勺浸

右每半時服一食匙

主治麻痺性遺尿ニ宜シ○一人六十五歲遺尿ヲ患フ私

戒蒲兒名此浸劑ヲ與フル一八日ニシテ癢ユ○別栗的兒

名ハ麥奴丁幾ヲ用フ始早晚半茶匙後一茶匙砂糖水ニ

和服セシメテ良驗ヲ獲シ一屢之アリ但頑固症ハ莨菪

丁幾ヲ加フルヲ要ス始每服五滴後毎滴ヲ增加ノ

小便微痛ヲ覺ユルニ至ル

○第二千二百二十一方私的印覽屈

甲方

麥奴煎

四勺煮半
勺取之

葭若葉浸

二勺浸
一刃製

磷酸

二錢

鼈越幾斯

五

滿那舍利別

一

右調勻每二時服一食匙

主治麻痺性遺尿ニ宜シ○ニ老人嘗テ痔疾ヲ患ク今胃

寒ニ由テ驟ニ遺尿症ニ罹レリ私的印覽屈之ニ上方ヲ

處ニ治セリ後調方トノ左ノ水劑ヲ與フ

乙方

葭若越幾斯

四

番木鼈越幾斯

六

磷酸

一

右調勻每服十五滴砂糖水點服日三次

○第二千二百二十二方同上

芫菁末

一

麥奴末

二十

白糖

一錢

右調勻為散分六服每二時半一服

主治婦人麻痺性小便失禁症分娩ニ因ル者之ニ宜シ之

ニ兼テ芫菁丁幾ニ忽弗滿拔爾撒謨肝荅ヲ加ヘ外用ス

○又膀胱麻痺ノ條ニ列載セル方法殊ニ千百六十方乃

至千百六十二方ヲ用ヒ且千百六十三方ヲ塗擦スルニ

宜シ

○第二千二百二十三方偃録都涅兒

遠西方彙 卷二十 黃便失禁 十五 藥膳堂

鹽酸金鹽ニ 蒸餾水一匁溶解

右調勻每一時服十滴

主治 水腫。小便失禁。黑障眼。侵蝕頑癬。及口總テ補給力不足ノ症ニ宜シ。但畜血ニ傾ク者ハ適當セズ。一老人嘗テ水腫ヲ患ヒ。爾後小便失禁ス之ヲ患フル。既ニ久シ。屈祿都涅兒之ヲ用ヒテ全癒ス。

○第二千二百二十四方 璣歌蘭度

曹達カ 純精酒石六

右調勻為散分八畧每服一畧日二三次

主治 小便失禁。症膀胱中尿沙畜積ニ因ル者ニ宜シ

小便瀰滯 イキピア 羅ムシイエレ

小便淋瀝 ドストラ プルギリアア 羅

小便閉 イスキリア 羅ベシテ

尿石 カルキ ステリナリ 蘭

小便ノ疾患ハ每症皆粘滑油質藥或ハ之ヲ石松粉ト配用スルヲ好トス。焮衝性尿閉ハ刺絡蟻鍼ヲ缺クベカラズ。爾後灰白水銀膏ニ菲阿私油及ヒ龍腦ヲ和メ膀胱部ニ塗擦シ。又緩和蒸劑及ヒ灌腸法ヲ施シ。内用甘承阿芙蓉ニ宜シ。三百九 痙攣性尿閉ハ油性乳劑ニ阿芙蓉。菲阿私越幾斯或。四百五 老利兒結爾斯水ヲ和スル者 五百八方。五百九方。五百九十四方。至五百九十四方。至

五百九十六方二 石松粉 石松葉 二千二百廿六方至二千二百廿八方 吐根乳劑 五百三十三方 阿魏 二千二百廿二方 小量吐根 八百六十一方 或ハ吐根乳劑 五百三十三方 阿魏 二千二百廿二方 等ニ宜シ之ニ兼テ鎮痙ノ塗擦蒸溺法及ヒ局處蒸氣浴等ヲ行フベシ

○麻痺性尿閉ハ先葛麥的爾ヲ以テ小便ヲ利シ内用龍腦杜松子 二千二百廿二方 烏華烏爾識天造拔爾撒謨劑的列並底那 芫菁 三千一百一十一方 亞兒尼加 幾那等ニ宜シ外用薦骨上ニ發痲膏ヲ貼シ衝動藥ニ芫菁丁幾ヲ和シ塗擦スル等佳トス後調法ハルジンゲル水ヲ用フベシ其他膀胱麻痺ノ條下ニ載スル所ノ方法 千六百五十二方至千六百六十三方 並ニ麻痺性遺尿ニ處スル方 二千二百廿三方 參照スベシ

尿閉ノ因器敗ニ係ル者ハ其治法自ラ種々別アリ手術ノ助テラ須ツ症多シ尿石ニ因スル者ハ先油質粘滑藥 十二百三十五方 用ヒテ之ヲ緩和シ後尿石根治法 二千二百廿六方至二千二百三十四方 移ルベシ

○第二千二百二十五方弗陽

亞刺昆亞蘆謨 錢二 雞子黃 錢三 石灰水 三 扁桃油 一

阿芙蓉丁幾 錢一 白罌粟舍利別 一

右調勻每四分時乃至半時服一食匙

主治陽名ノ經驗ニ據ルニ尿閉小便淋瀝結石病ヲ治スルニ未此方ニ優ル者ヲ見ズト云フ

○第二千二百二十六方〔穀煙燻兒度〕

石松葉三

右細剉取二匙水半彬篤煮耗至四分一彬篤每十密搗篤
温服一小盞

○第二千二百二十七方〔同上〕

甘扁桃油錢二

亞刺昆亞蘆護適

加石松葉煎煮二錢取之

四弓作乳劑加後味

旃那煉膏〔附〕半

右調勻每半時服半食匙

主治右二方二千二百廿六方尿閉瘰癧性者或ハ膀胱

之筋及上裏膜衰弱ニ因ル者或ハ膿水若クハ砂粒畜積

ニ因ル者等皆此方ヲ用ラベシ

○第二千二百二十八方〔戒歌蘭度〕

石松粉半 李肉三

右調勻為紙劑每一時服一茶匙

主治大人小便瀯滯小便淋瀝及ハ小便閉ニ宜シ

○第二千二百二十九方〔昆刺地〕

阿魏半 吐根 阿芙蓉各二 薄荷油滴二

右調勻二瓜為一九衣石松粉每服十九日三次

主治瘰癧性小便淋瀝ニ宜シ○叔泥埕爾名八此丸ヲ奇方

トシ稱賛ス又一老人八十二歳胃寒ニ因リテ劇甚ノ尿閉ニ罹レリ此丸ヲ用ヒテ偉効ヲ得タリ

○第二千二百三十三方璣歌蘭度

杜松子舍利別一 洋芹水四 稀鹽酸二

右調勻毎一時服一食匙

主治麻痺性小便滯滯ニ宜シ

○第二千二百三十一方同上

芫菁末一 龍腦六 亞刺毘亞蘊謨漿適

右為四丸衣石松粉早午晚一丸燕麥汁送下

主治同上○上方ニ兼テ膀胱及ヒ薦骨ノ部ニ寒罨法或

ハ灌水ヲ施シ冷水灌腸或ハ膀胱ニ冷水ヲ射注シ脊椎ノ下部ニ衝動藥ヲ塗擦シ芫菁膏灸越列幾的兒等ヲ施スベシ

○第二千二百三十二方

的列並油二 雞子黃一 薄荷水三

右丁寧攪和作乳劑塗擦橫隔及膀胱部位

主治尿閉ニ宜シ○礪砂揮發加龍腦膏及ヒ阿芙蓉丁幾

モ亦用フベシ

○第二千二百三十三方璣歌蘭度

石松粉二

右分四畏早晚服一畏

主治 幼兒ノ小便淋瀝ニ宜シ

○第二千二百三十四方同上

石松粉錢一 過兒托舍利別錢六 水一

右調勻每一時服二茶匙

主治 小兒小便瀦滯。小便淋瀝及レ小便閉ニ宜シ

○第二千二百三十五方別連杜

亞麻油新絞者 一 弓半 雞子黃適 宜 井水五 弓 過兒托舍利別一 弓

半

右調勻每一時服一食匙臨服宜振盪

主治 膽石尿石ノ攣痛ニ宜シ

○第二千二百三十六方穢歌蘭度

曹達錢半 純精酒石 白糖各一 刀

右調勻為散分十二服日三服

主治 尿石ニ宜シ ○石灰水日服 一 此 曹達水曹達半 錢セルツ

溶化「カル、スバット」鑛泉「スシ」同「ゲイルナウエル」

同「井ルジゲル水」同等撰用スベシ

○第二千二百三十七方別連杜

白石鹼 曹達乾者各 二 錢 睡菜越幾斯適 宜

右調勻二匕為一九衣甘草末每服五丸乃至十九日三次

主治 尿石 胃中酸敗液等ニ宜シ

○第二千二百三十八方 屑兒肺耳濕魯

礪砂一錢半 曹達半錢 健質亞那越幾斯三錢 加密列水

右六

右調勻每服一食匙日六次

主治 尿石ニ宜シ

○第二千二百三十九方 法兒格涅魯加里室氣水メアロキカ

酒石鹽一錢至二錢

攝爾都兒水三十六弓溶化

右每服二三盞日三次

主治 尿砂 膀胱結石ニ宜シ ○酒石鹽三ハ乃至四ハヲ攝

爾都兒水一盞ニ溶化スルモ亦更ニ簡便ナリトス

○第二千二百四十方 弗婚兒的爾

酒石鹽一錢半 加後味溶和

桂水三弓 實亞格地温半弓

右調勻每服半食匙日四次

主治 結石症ニ宜シ ○之ニ兼テ三色堇菜葉附浸ヲ多服

セシムベシ

○第二千二百四十一方

的列並底那半錢 白石鹼 甘草膏各三錢

右調勻二丸為一丸

主治尿石ニ宜シ○此方的列並底那硫黃拔爾撒謨ヲ以テ製スル所ノ「ハールラムル油」ニ類ス

○第二千二百四十二方〔穢歇蘭度〕

榎植核 アシシ。シノスバト 杜松子 各半

右調勻為散每服一茶匙日三次

主治尿石ニ宜シ○又烏華烏爾識葉ヲ散ト為シ每服半

錢日三次乃至四次並ニ之ヲ煎用スベシ千八百三方至千八百五方

且穢歇蘭度氏ハ大根子。栗蠶子。蜜等ヲ稱用ス

○第二千二百四十三方〔繆爾別苦〕

阿禱厄私根

金花草葉 各半

右細剉分六畏注熱湯四盞

主治腎石ニ宜シ

尿管ジアベテス羅ピ

此症醫治甚難キガ故ニ其方法モ亦隨テ多シ別鈴突土名

ニ據レハ第一吐劑阿芙蓉。硫磺。或ハ礪銅礬ヲ用ヒテ消食

器殊ニ胃ノ生カヲ轉變スルヲ要トス○第二硫黃劑。亞

兒加里劑ヲ與ヘ肉食ヲ命シ務メテ消食機及ヒ全身ノ生

力植物生機ニ傾クヲ防クベシ○第三麻醉劑阿芙蓉有力誘

導法冷水浴。蒸氣浴。腎部光ヲ施シ腎臟ノ運營亢進セルヲ

青膏吐涎法。下劑等

抑遏スベシ ○其最要藥トスル者ハ即阿芙蓉吐劑硫磺水
附二千四百六十六方 硫磺 二千四百九十九方
至二千四百八十八方 明礬 二千五百五十五方
八百廿七方 結列阿速多 二千二百五十二方
七方 拔爾撒謨字露 二千二百五十三方
牛膽 二千二百五十四方 全身浴湯及ヒ蒸氣浴是ナリ ○私
葛爾老人名ノ 說ニ據ルニ尿崩ノ近因ハ脊髓ノ畜血ニ係ル
之ヲ防グノ法第一腰椎第一ヨリ第五ニ至ルノ部ニ串線
打膿烙鐵灸或ハ腐蝕藥ヲ施シ以テ腰部ノ反對刺戟法ト
シ第二脊髓ニ灰白水銀膏ヲ塗擦スト云フ

○第二千二百四十四方〔秘録〕

吐酒石丁幾〔詳末〕 阿芙蓉液各二錢

右調勻每服二十五滴裸燕麥粘汁和用日三四次

〔主治〕尿崩ニ用ヒテ胃ノ感觸亢進セルヲ制スルニ宜シ

○第二千二百四十五方〔秘録〕

吉納蘆謨二錢 龍腦半錢 芳香散一錢 亞鉛華半錢

右調勻為二十九丸衣石松粉早晚服二丸

〔主治〕尿崩右股ノ搐掣及ヒ麻痺ヲ兼ナル症ニ〔蠶〕名此丸

ヲ用ヒテ治セリ但續草丁幾吉納蘆謨丁幾ヲ兼用セシ

ム

○第二千二百四十六方〔秘録〕

硫磺水〔附一〕

右初每服四滴後十二滴桂水或枸橼水一食匙點服日四次

主治蜜尿症ニ之ヲ阿芙蓉ト併用シ且肉食ヲ命ス○韋列名及ヒ列突歇亞倫同ハ肝色硫黃ヲ用フ

○第二千二百四十七方〔歇歇蘭度〕

硫磺水滴八 點栗薩水手四

右調勻每服二食匙日三次乃至四次

主治尿管關節依倔篤腫關節屈折ニ宜シ

○第二千二百四十八方〔叔拔爾託〕

硫磺水 阿芙蓉丁幾各三十 蒸餾水手三 桂水手一

右調勻每一時半服一食匙

主治尿管依倔篤等ニ宜シ

○第二千二百四十九方〔別路突篤〕

礪銅礬各十 精製阿芙蓉各十 蒲公英越幾斯 過兒托末各二

右調勻二公為一九早晚服五丸

○第二千二百五十方〔同上〕

醋酸礪爾比捏十五 礪銅礬錢半 牛膽凝固者 括失亞末各四

右調勻為百丸衣石松粉早晚服五粒

主治蜜尿ニ良驗アリ

○第二千二百五十一方 〔秘私〕

膽礬 五〇至 礪砂精 精製一錢

右加蒸餾水適宜溶和作藥液全量一匁每服十滴乃至二十滴日服二次至四次

主治蜜尿ニ用ヒテ胃腸病的運管ヲ轉變スルニ効アリ

○第二千二百五十二方 〔秘私〕

結列阿速多 十六滴 亞刺昆亞蘊謨 白糖 各三十

右調勻為三十二丸衣桂末隔日早晚服一粒

主治尿崩ニ良驗アリ ○結列阿速多ノ量漸加ヘテ三十

滴ニ至ル ○暴爾栗 地名ノ謁兒鄰傑魯 地名蜜尿ヲ治スルニ

結列阿速多ヲ礪銅礬及ヒ醋酸謨爾比 子ト併用ノ偉効

ヲ得タリ之ニ由テ尿ノ質ト量ト俱ニ復良シ且全體殊

ニ肚腹ニ夥多ノ瘡ヲ發シ其瘡含ム所ノ液蜂蜜ノ臭氣

アリ小水一日ノ量先ニ四十五北ノ者今ハ減少ノ十五

北ニ至ル此ニ於テ結列阿速多ヲ木炭末ト配用シ之ニ

兼テ魯西亞ノ蒸氣浴ヲ施セリ爾後速治ス二月後再發

○第二千二百五十三方

拔爾撒謨李露

シ大ニ効咳スルモ他治ヲ須タズノ癒ユ

右每服十滴漸加至三十滴或六十滴日三次

主治尿管及尿管尿宜シ○尿管優滿尿管甫メテ切ニ拔爾

撒謨字露ヲ稱用セリ尿管淫慾衰エ小水過多ニ其質ト味ト

變ノ饑渴甚シク尿管ノ證徵疑似ナキハ速ニ拔爾撒

謨字露ヲ取テ尿管的兒或ハ尿管爾箇兒ニ溶化シ與フベシ

尿管但亞爾箇兒ヲ溶スルハ尿管淫優滿氏拔爾撒謨ヲ用フルノ

量初日ニ一乃後漸ク加ヘテ四乃ニ至此ニ由テ十日

ノ後既ニ尿管中糖質ヲ含ムトナクメ著シク小便ノ本真

ヲ現ス然レ尚且又シク連進シ房事ヲ戒ス○其後尿管私

名及ヒ尿管爾都同尿管淫優滿氏ノ經驗ヲ證セリ蓋尿管爾

都ハ每服三十滴乃至六十滴砂糖若クハ麵粉泥ニ和用

スルト日ニ三次一症尿管ニ肺勞ヲ合併セル者上法ノ

如ク之ヲ施シ小便減シ尿管中脂肪ノ沈澱舌上黒苔掌中

熾熱等皆去リテ乃本復セリ拔爾撒謨ハ胃ニ害ヲ致ス

トナカリシト雖終ニ及テ嘔氣ヲ發シ後服ヲ停メサル

ヲ得ザリキ又尿管一症アリ他醫尿管爾都ノ稱譽ニ

據リテ拔爾撒謨ヲ用ヒ暫時ニ尿管中ノ糖質全ク去リ

尿量減シ皮膚潤澤シ生力復康セリ○安頓尿管ニ拔爾

撒謨字露ヲ試用シ殊効アリ初碯銅礬ノ丸劑ヲ與ヘ微

温全身浴ヲ施シ後魯西亞發汗浴ヲ行フ之ニ由テ其症

著シク緩解スト雖然此丸ヲ服ノ一二回不安症ヲ發
スルガ故ニ病者後服ヲ欲セズ因テ轉ノ板爾撒謨字露
ヲ用ヒテ治ス全癒ニ至ルマテ他ノ療法ヲ要スルナ
シ

○第二千二百五十四方〔蒲蘭度〕

牛膽凝固者 白石鹼各一錢

右調勻為三十九衣石松粉每服五粒日四次

主治百侃私担篤名ノ病人ニ於テ蜜尿症ニ前方ヲ與ヘ

兼テ獸肉食ヲ命メ以テ之ヲ治セリ○膽ヲ以テ尿管ヲ

治スルハ新法ニアラズ穢歇蘭度名ノ病人及ヒ越乙都同既ニ

之ヲ稱贊セリ但穢歇蘭度ノ用量ハ病者ノ胃ニ堪フル
ヲ度トス設願私鳩爾徒名ノ病人及ヒ弄別兒同モ亦牛膽ヲ
用ヒテ之ヲ治セリ

○第二千二百五十六方〔福傑兒〕

燐酸曹達各半錢 煨麻屈涅失亞十五

右調勻為散分八晝每日取一晝分服四次

主治蜜尿症ニ此散ヲ用ヒテ尿中ノ糖質全ク消セリ然

レ此散ヲ停テ后糖質復生ス

○第二千二百五十七方〔密溫見地好溫爾〕

醋酸謨爾比涅半 桂水一弓溶化加後味

浴ヲ行フベシ○陰萎症ハ房勞過度ニ因ル者多シ強壯劑
 ヲ要ス即括失亞二千二百六十八方格綸僕二千二百六十
六方幾那鍊劑五千四百至千四百二十方殊ニ人造鍊浴千五
七方及ヒ天然鍊泉一〇ルモント〇スバヲ用ヒ
 龍涎香七千方法尼利二千二百七十一方羌菁千五百五十
百七十五方至千八百七十一方等衝動藥ヲ併用スル
 二宜シ外療ハ冷水ヲ以テ陰部ヲ洗ヒ脊椎下部及ヒ會陰
 二灌水シ撒兒非亞煎附蟻精附忽弗滿液及ヒ其他ノ衝動藥
二千二百七十九方ヲ以テ陰部附施スベシ之ニ兼テ雞卵叔格
刺度蝮蟪羹汁三百七十六方鼈羹汁三百七十六方牡蠣鹿角傑列乙三百八醇酒

等極メテ滋養ノ食餌ヲ用フヘシ

○第二千二百五十九方職歌蘭度

収歛亞的兒弓半 越乙土幾那丁幾附

右調勻每服五十滴乃至八十滴水一小盞點服日三次

主治遺精ニ宜シ○或ハ單味収歛亞的兒每服十滴乃至

二十滴日三服スルモ可ナリ

○第二千二百六十方過傑栗屈的兒

龍腦 漿粉 白糖各半

右調勻加過兒托舍利別適宜為十九衣石松粉頓服四粒

日一次

主治遺尿ヲ治ス之ニ兼テ穢歇蘭度鎮靜水二十六百ニ龍腦精少許ヲ加ヘテ外用ス

○第二千二百六十一方欲爾田斯

龍腦一錢半 精製消石一錢 純精酒石一錢

右調勻為散分五服早午晚一服

主治小便ト共ニ遺精スル者之ニ宜シ但陰部ニ冰冷菴

法ヲ施スベシ

○第二千二百六十二方烏魯設耳

磷酸乾者一錢 龍腦一錢 錢粉四十八 赭色幾那末一錢 葛

私加栗刺越幾斯 宜適

右調勻為二百四十九衣桂末每服十九日三次

主治遺精患者虛衰シ陰部感觸亢進セル者之ニ宜シ胸

内諸器ニ感動ヲ見ハスキハ隔日ニ服スヘシ乳汁ヲ服

スルヲ禁忌ス

○第二千二百六十三方穢歇蘭度

格綸僕末半錢 井水十弓煮耗至六弓瀝過加後藥

橙皮丁幾二錢 橙皮舍利別一錢

右調勻每一時半服一食匙

附考強壯劑ノ中ニ就テ格綸僕ハ花風陰莖勃起及遺

精等ノ最適藥ニノ單ニ之ヲ服ノ治スル者屢之アリ

○第二千二百六十四方同上

阿仙藥 明礬 王幾那各一錢 撒兒末爾秩斯各半錢 括

失亞越幾斯一錢

右調勻二公為一九衣桂末早晚服十九以漸加增

主治遺精二殊効アリ○冷水ヲ桶ニ盛リテ屢腎尻及ヒ

陰部ヲ浸スキハ甚佳効アリ

○第二千二百六十五方欲爾田斯

幾那末半錢 葛私加栗刺末 括失亞末各二錢 撒爾末

兒秩斯一錢 加耶普的油糖三錢

右調勻為散晨夕服一茶匙

主治遺精後ノ弛緩衰弱ヲ復スルニ宜シ

○第二千二百六十六方欲爾田斯

麥糖二錢 龍腦二錢

右調和作藥枕子安畢丸周圍

主治遺精ニ宜シ

○第二千二百六十七方同上

格綸僕末半錢 井水十勺煮耗至六勺濾過加後味

別私點攝神經丁幾附二錢 桂丁幾一錢 橙皮舍利別一錢

右調勻每二時半服一食匙

○第二千二百六十八方同上

括失西越幾斯半錢 忽弗滿健胃丁幾附 越乙士幾那

丁幾附各半錢 別私點攝神經丁幾附二錢

右調勻每服八十滴日三次

○第二千二百六十九方同上

括失西越幾斯半錢 撒兒末爾秩斯一錢 桂末半錢

右調勻二匹為一九夜石松粉每服十九日二三次

主治右三方陰萎ニ宜シ但補益ノ食餌古葡萄酒鋼酒五千

十四方千五十六方千八百一方 香竈藥コルモント水等ヲ併用ス○或

ハ陰萎假症ノミ是小腹壅塞スル所アリテ神經ノ運管

抑壓セラル、ニ因ル此症カル、スバトノ鑛泉ヲ甚嘉稱

○第二千二百七十七方錢 龍涎香各一錢 阿芙蓉二

橙皮越幾斯 幾那越幾斯 龍涎香各一錢 阿芙蓉二

右調勻二匹為一九每一時半服五丸乃至十九

主治陰萎ニ用ヒテ有力ノ淫情挑起方トス

○第二千二百七十一方葉爾鳩私

法尼利丁幾 葛刺布呂篤神經丁幾附二錢

右調勻每服二十滴葡萄酒點服日三次

主治葉爾鳩私名經閉弛緩ニ因ル症之ヲ稱用ス並ニ陰

萎ニ宜シ○然レ法尼利ハ特ニ陰萎症陰部ノ弛緩鈍性

衰弱ニ係ル者ニ的當ニ敏性衰弱ニ在テハ恐ラクハ害
アラシ

○第二千二百七十二方速別倫歇愾

法尼利丁幾錢一 越栗失爾必篤里阿利錢二 桂酒水附四

桂舍利別錢一

右調勻每四分時乃至半時服一食匙

主治速別倫歇愾名腸ノ麻痺壞疽性腹滿數發崩漏及

壞疽性子宮焮衝ニ稱賢陰萎鈍性衰弱ヲ兼タル者之

ニ宜シ

○第二千二百七十三方

纈草一 白糖半 水五 亞爾箇兒三

右調勻為舍利別取半勺乃至一勺飲液和服

主治淫情挑起方トス

○第二千二百七十四方嗽歇蘭度

光菁丁幾錢一

右每服三滴乃至四滴粘滑液點服日二次

主治其人鈍質ニシテ陰萎ニ罹ル者其他光菁的當ノ症

例スルニ膀胱麻痺ノ如キ之ニ宜シ蓋此法ヲ用フルハ

尤慎重スベシ

○第二千二百七十五方

光菁粗末二八至 甘扁桃油新絞者 薰燠滾湯蒸氣

飽熟八分時瀘過加後藥

亞刺昆亞護末錢二 白罌粟舍利別一 井水五

右調勻作乳劑每一時服一食匙臨用宜振盪

主治性素遲鈍陰萎ヲ患フル者之ニ宜シ○又光菁ヲ要ス

ル諸病并ニ用フベシ

○第二千二百七十六方

菖蒲根 良姜各二錢 法尼利附一錢半 麝香東方產半錢 光

菁末二 以上五味丁寧調和加後味

忽弗滿液一錢 橙皮舍利別宜適

右為煉膏每服一小匙

○第二千二百七十七方

菖蒲根 橙皮黃 法尼利附各二錢 麝香東方產一錢 ペル

油 橙皮油 過泥子油各半錢 過設印亞的兒二錢 丁子

莖菜舍利別宜適

右為煉膏每服一小匙

主治土耳其人精神ヲ振起スルニ此ニ方二千二百七十七方

七方ヲ用フ此方十分効力アリ

○第二千二百七十八方

○第二千二百七十八方

鏡酒石球末附一 水楊皮四 井水六斗煮耗至四斗

瀘過放冷加後味

刺賢堊兒精三

右三分加浴湯

主治陰萎宜シ又總テ脫衰病後ノ補益ニ好

○第二千二百七十九方穢歇蘭度

蟻精二 忽弗滿液 忽弗滿拔爾撒謨貯答各半 薄

荷水 雪耳匹兒草名 水各三

主治陰萎症之ヲ以テ陰部及ヒ腰部ヲ洗フベシ

吐涎ピキアリスキスルフルトア

吐涎ハ承劑膜眩ニ因ル者最多シ其症ハ瀉劑滿那煉膏

等滿那 硫黃劑二千二百八十四方至 沃胃謨二千二百八十五方

方方 鑛酸ヲ粘滑液ニ和スル者八十八方 結列阿速多百八十二

方九 龍腦阿芙蓉鉛糖等ヲ撰用スヘシ○外用粘滑收斂ノ含

漱水ニ宜シ即錦葵花葉 遏兒杞根煎ニ乳汁ヲ加ヘ或ハ之ニ

礪砂若クハ石灰水ヲ和スル者撒爾非亞葉水楊皮及ヒ櫛

皮煎九十九方 格魯林加爾基 二千二百九十一方或ハ格魯

林曹達溶液 明礬九千三百九十四方 ノ溶液的列並油

九千二百九十五方鹽酸九千二百九十六方 等是ナリ○又腹臟殊ニ臍ノ壅塞

見証トシテ流涎スルアリ其治解釋劑ニ宜シ或ハ失苟兒

見証トシテ流涎スルアリ其治解釋劑ニ宜シ或ハ失苟兒

陪苦ノ見証トシテ發スル者ハ壞血病藥ヲ用ヒテ治ス或ハ歇乙私的利ニ因ル者アリ阿魏ニ宜シ

○第二千二百八十方婦兒風

硫黃華半 麻僞涅失亞 菖蒲根各二錢 枸櫞油糖半錢

右調勻為散每一時服一小茶匙

主治流涎汞劑ニ因ル者之ニ宜シ之ニ兼テ撒爾非亞浸劑ヲ以テ含漱セシム

○第二千二百八十一方弗越埜僅度

甲方

精製硫黃 菖蒲根末 白糖各一

右調勻為散分六服日晡一服

主治吐涎汞劑暈眩ニ因ル者ニ宜シ但左ノ密幾私失爾ヲ飲料トシ併用ス

乙方

精製硝酸二錢 井水半面 白糖三

右調和傑乙爾糖謁兒水或攝爾都兒水俱鑛泉 混和適意飲服

附考原本硝酸半亨ニ作レ氏其量過多ナリ恐ラクハ謬誤ナラン

○第二千二百八十二方滿濕滿

孕礬酒石四 純精酒石半

右調勻為散分十四畏每服一畏砂糖水一盞和服日三次

○第二千二百八十三方〔穢歌蘭度〕

會硫加爾幾安質沒尼錢半 達刺侃篤蓮謨漿宜適

右為六十九衣石松粉玻璃壘收貯每服五丸日二次

○第二千二百八十四方〔同上〕

含硫加爾幾安質沒尼子二 井水五斗煮耗至四斗

右每服一小盞日四次

〔主治〕右二方承劑吐涎及七惡液症承劑久服二因ル者并

三經久悽麻質病腹内壅塞腺腫等二宜シ

○第二千二百八十五方〔葛弗歌魯綿私篤庚上〕

沃胃謨ハニ 沃胃謨加里ハ三 井水三斗溶化

右調勻初每服半匙經四日後一匙日四次

〔主治〕衆醫未嘗テ此方ノ効ヲ説ク者アラズト雖承劑流

涎ニ用ヒテ屢利アリ

○第二千二百八十六方〔簿刺狽斯〕

沃胃謨ハ六 沃胃謨加里ハ十二 蒸餾水六斗溶解加後

味

砂糖舍利別半

右調勻每服一食匙日三次

主治瘰癧腫及汞劑流涎ニ宜シ

○第二千二百八十七方葛弗。歇魯綿私篤戾土。

沃胃謨六 健質安那越幾斯錢一 亞刺毘亞護謨漿適

右為二十四丸衣桂末每服三丸日四次

主治失荷兒陪苦性吐涎及汞劑吐涎ニ宜シ

○第二千二百八十八方遠突土。

硫酸密幾私去爾 沙列布淡煎六 覆盆子舍

利別一

右調勻每二時服一二匙

主治汞劑流涎ニ宜シ汞劑ヲ服シ終テ十二時ヲ經ルノ

后始メテ酸ヲ用フベシ○硫酸密幾私去爾ニ代ヘテ稀

磷酸ニ錢ヲ用フルモ可ナリ之ニ兼テ玫瑰蜜若クハ榧

植核汁ニ硼砂ヲ加ヘ或ハ覆盆子絞汁ヲ塗藥トシ若ク

ハ錦葵接骨木花ノ浸劑ニ乳汁ヲ加ヘテ含漱水トス口

中熱ノ痛ム者ハ冷水ヲ最好トス○遠突土名ハ汞劑流

涎ニ決メ硫黃劑ヲ用ヒズ何者之カ為ニ水銀ノ奇効力

ヲ失フカ故ナリト云フ又幾那篤爾綿黥刺及ヒ其他ノ

収瀋藥ヲ用ヒズ何者皆吐涎ニ兼發スル熱ニ嫌忌スベ

キニ由ルト云フ

○第二千二百八十九方實的里屈

結列阿速多錢半 石松粉錢二 亞刺毘亞護謨漿宜適

右調勻為六十九夜石松粉每服三九乃至五九日二三

主治汞劑流涎二宜シ

○第二千二百九十方婦兒服

撒爾非亞葉 水楊皮 榭皮各三錢 井水十六乃至十八

右浸漬濾過供含漱水

主治汞劑流涎二宜シ ○或ハ阿仙藥丁幾若クハ阿芙蓉

丁幾ヲ加フルモ亦可ナリ

○第二千二百九十一方歌乙別爾偈

格魯林カール加爾幾カール 井水六 溶化加後味

清淨蜜六錢

右為含漱水

主治同上 ○或ハ格魯林加爾幾ヲ加増スベシ ○達林偈

人名ハ格魯林曹達ヲ稱用ス

○第二千二百九十二方篤劉仙

格魯林加爾幾錢二 井水一 溶化加後味

再留燒酒一 薔薇油二滴

右調勻取二三茶匙加冷水一盞以洗滌口中

○第二千二百九十三方

明礬錢一 薔薇水五 溶化加後味

玫瑰蜜錢三

右調勻供含漱水

備考明礬末モ亦用フベシ之ヲ用フルハ指ヲ濕ホメ細末ヲ摻布シ以テ齒齦及ヒ口中粘液膜ニ塗敷スルナリ血兒百與名ノ論ニ據ルニ之ヲ施ス一三四日ニメ治スト云フ

○第二千二百九十四方礬屈松

龍腦刀一 加塔埵兒精適宜薄荷水八勺溶化加後味

明礬錢一 玫瑰蜜勺一

右溶和為含漱水

○第二千二百九十五方刺健地 抱昔

的列並油錢三 加亞刺昆亞蘊謨末一錢捏作泥加後味

醋錢半 薄荷水錢半

右調勻為含漱劑

主治二千二百九十二方ヨリ二千二百九十五方至承劑流涎ニ宜シ○傑陳偃私人名亦上方ニ類セル密發斯去爾ヲ含漱劑ニ用ヒ或ハ單味の的列並油ヲ以テ齒齦ニ塗擦セシム

○第二千二百九十六方骨布

鹽酸錢三 桑椹舍利別勺三

遠西方彙卷之二十

右調勻加撒爾非亞浸劑作佳味酸液供含漱

主治汞劑吐涎二宜シ

○第二千二百九十七方

膽礬半錢至撒爾非亞葉浸六分浸半分製之溶化加後味

沒藥丁幾阿仙藥丁幾各一分地榆丁幾一分蜂蜜六錢

右調勻含漱後吐出之

主治汞劑吐涎頑固ノ症ニ宜シ

遠西方彙卷之二十

