

武庫
237
21



遠西方彙卷之二十一

獨乙

加幾安頓



和蘭

傑婆都

譯

侍醫法印伊東瑤川院

貞文仲

重譯

南洋伊東亨健夫

參校

第二

蟲症

ヘルミンチアシス
ヲルハシンキテ蘭

此症姑息根治ノ二法アリ姑息法ハ蟲ノ所爲ヨリ發スル
所ノ攣痛ヲ鎮靖スルヲ旨トス其方乳汁ヲ以テ奇藥トス

遠西方彙

卷二十一

廣伴堂

主治 蟻蟲ヲ一掃スルニ宜シ但此丸ハ二三月連用スルヲ要ス○大人ニ奇効アリ

○第二十三百方 刺胃秘

攝綿施那一錢 滾湯適宜浸漬瀝過取液三勺加後味

橙皮舍利別二錢

右調勻每半時服一食匙

○第二十三百一方 叔拔爾託

攝綿施那二錢 藥刺巴 白糖各一錢

右調勻為散分六服每二時半一服

主治 右二方大人蛇蟲及ヒ蟻蟲ニ宜シ

○第二十三百二方 穢歌蘭度

攝綿施那一錢 藥刺巴半 甘汞二

右調勻為散分三裹早晚服半裹

主治 蛇症之ヲ連進スル一三日六歲内外ノ兒應用方トス

○第二十三百三方 護利秘

攝綿施那 纈草各一 甘汞二 白糖二

右調勻為散分四裹每服一裹日二次

主治 四歲乃至六歲兒ノ蟲症ニ宜シ

○第二十三百四方 傑過栗屈的兒

遠西方彙 卷二十一 廣濟堂

攝綿施那一 續草 精製孕礬酒石各半 藥刺巴四

撒兒末爾秩斯一至二

右調勻為散分十二包每服半包日四次乃至六次

主治六歲乃至八歲兒ノ蟲症ニ宜シ

○第二千三百五方穢歌蘭度

撒兒末爾秩斯二 藥刺巴 攝綿施那各一

右調勻為散分三包早晚服一包

主治大人ノ虻蟲ニ宜シ

○第二千三百六方狐刺律私 栗布私名病院驅蟲散

撒兒末爾秩斯四 攝綿施那 藥刺巴 續草各六

太那設黠謨亞的兒油一滴

右調勻為散分六包每服一包日三次

主治虻蟲蟻蟲ノ奇方トス

○第二千三百七方筒過秘密土

攝綿施那 太那設黠謨葉各二 越秩阿布斯密涅刺

列 藥刺巴各一 桂錢一

右細末調和加白糖蕃薇水融解者三弓半捏為泥二錢為

一錠大人每服一錠日一二次

主治蟻蟲及ノ虻蟲ニ宜シ

○第二千三百八方篤埤

攝綿施那末一 白糖適宜 稠為度

右為十二錠早晚服二錠

主治大人虻蟲二宜シ

○第二千三百九方福備薦

攝綿施那末五錢 葯刺巴一錢 叔格刺度末三錢 亞刺毘

亞護謨漿適宜

右為六十錠每服二三個日四次

主治十歲兒ノ蟲症ニ宜シ

○第二千三百十方弗戾私

攝綿施那末二錢 叔格刺度末半 達刺侃篤護謨漿適宜

右為三十錠每一時半服四錠乃至五錠

主治蟲症ノ兒特ニ佳味ヲ喜ム者之ニ宜シ

○第二千三百十一方歇爾滿

攝綿施那末 葯刺巴末 纈草木各半 海葱蜜或 胡

蘿蔔舍利別 適宜

右為十二暴律私每服一個日三四次

主治大人虻蟲及ヒ蟻蟲ヲ驅除スルニ宜シ

○第二千三百十二方秩結

攝綿施那 纈草各二錢 滾湯適宜浸漬漉過取液四弓

加後味

胡桃子越幾斯 忽弗滿液 橙皮丁幾 各半

右調勻每一時服一匙布匙臨用宜振盪

主治十歲乃至十二歲兒ノ蟲症ニ宜シ

○第二千三百十三方 羅仙私的印名驅蟲煉膏

撒兒萊爾秩斯八 攝綿施那半 葯刺巴末 清淨蜜

各一

右調勻頓服

主治大人蟲症ヲ治ス小兒ハ一茶匙ヲ與ヘテ以テ大便

二三行ヲ得ルニ宜シ

○第二千三百十四方 私篤魯屈名殺蟲煉膏

攝綿施那末 纈草末 葯刺巴末 世硝各半 海葱

蜜

右調和作煉膏每一時乃至一時半服一茶匙

備考前四味ノ量等分ニ作ルハ適當ナラズ

○第二千三百十五方 私篤魯屈名製殺蟲煉膏

攝綿施那末錢二 纈草末錢一 葯刺巴末半 海葱蜜

右作軟煉膏每一時半服一茶匙臨用宜攪和

○第二千三百十六方 設兒列名殺蟲煉膏

攝綿施那錢六 撒爾萊兒秩斯 幾那越幾斯各二 桂

舍利別通

右作煉膏每服一茶匙日二三次

○第二千三百十七方 穢歇蘭度殺蟲煉膏

攝綿施那末錢半 纈草末錢半 葯刺巴末錢一 孕鹼酒

石錢二 海葱蜜錢三 覆盆子舍利別宜適

右為煉膏每服一茶匙日三四次

○第二千三百十八方 漢名殺蟲煉膏

纈草末 綿馬根末 攝綿施那錢各三 蜜宜適

右作煉膏每一時半一茶匙乃至二茶匙須準小兒年齡消

息

備考初四日間甘汞一瓜ヲ以テ砂糖ニ和シ每晚服セシ

ハ而ノ上方ニ劑ヲ服盡スルノ後葯刺巴ノ峻下藥ヲ與

フヘシ○此煉膏ハ前方ノ如ク嘔氣ヲ發スルヲナシ○

二千三百十三方ヨリ二千三百十八方至蛇蟲蟻蟲俱ニ

用フベシ

○第二千三百十九方撰私篤

(甲方)

攝綿施那 纈草錢各三 井水適宜浸慮過取液六弓加

後藥

未熟胡桃子越幾斯 硃砂錢各一 纈草丁幾錢一 清淨

蜜弓一 海葱蜜弓半

右調勻每一時服一食匙

主治蛇蟲ニ宜シ○謨私篤氏此密幾斯去爾ヲ用フルノ後左ノ舐劑ヲ連進スル一三日

(乙方)

攝綿施那末錢 纈草末 葯刺巴末各一錢 越秩阿布

私密涅刺列半錢 清淨蜜三

右調勻為煉膏小兒八歲乃至十四歲者每服一茶匙日三次更幼者每服半茶匙

備考謨私篤氏蟲症百餘名ヲ治シテ此二方偉効アルヲ證セリ但此方弦月時ニ於テ用フルヲ好トス

謨私篤醫學領府ニ

蟯蟲ニ宜シ○攝綿施那末の兒越幾斯服量大人ハ八ハヨリ十二ハ至三四歳兒ハ四ハヨリ五ハ至

○第二千三百二十四方

精製珊篤尼捏二 乳糖六

右調勻為散分三服每一時一服

主治蟯蟲及ヒ蛇蟲ニ卓越ノ効アリ○大人ハ四ハ乃至六ハ散ト為シ數服ニ分テ用フルハ暫時ニ驅蟲ノ功ヲ収ムルニ足ル小兒ハ年齡ニ準シ半ハ乃至一ハヲ與ヒ或ハ之ヲ甘永大黃若クハ葯刺巴ト配用ノ可ナリ珊篤尼捏ハ刺戟衝動ノ害ナキヲ以テ諸症皆用フベシ病

者瘰癧ヲ兼ヌル者ハ標實製哥喜ヲ甚稱用ス

○第二千三百二十五方

撒拔實爾子末 苗香油糖各半

右調勻為散分六裏每朝服一裏

主治蛭蟲及ハ蛭蟲ニ宜シ○此方宿繆結爾名創メテ之

ヲ施用セリ撒拔實爾子ノ量每服半錢トス按スルニ其

量過多ナリ此子ヲ過服スレハ嘔吐腹痛大瀉脈不整苦

悶及ヒ五神失常等ヲ發スルカ故ニ用ニ臨テ最慎重ス

ヘシ是故ニ小兒ニ在テハ用ヒザルヲ好トス○撒拔實

爾ハ甚酷厲ナルカ故ニ粘滑藥或ハ蜜ト配用スルヲ佳

トス

○第二千三百二十六方護歌耳秘

撒拔實爾子四 滾湯九ヲ浸飽熟八分時瀝過取液ハ

ヲ每服二匙日二次

主治蟲症ニ宜シ

○第二千三百二十七方秘刺律秘

撒拔實爾子末二 撒爾菜兒秩斯末一 攝綿施那

麻屈涅失亞各半

右調勻為散分八服日四服

主治大人蛭蟲ニ用フヘシ

○第二千三百二十八方 私篤兒

胡桃子越幾斯 錢二 桂水半勺溶解

右每服四十滴乃至五十滴日四次

主治三四歲兒 / 蛇蟲 二宜

○第二千三百二十九方 別連杜

胡桃子越幾斯 錢二 林檎錢丁幾 附三 桂水二勺溶解

加後味

白糖 錢三

右調勻每服一匙布匙日三次

○第二千三百三十方 秘拔爾記

胡桃子越幾斯 錢二 太那設黥謨油 錢一 遏爾託末 宜適

右調勻為六十九衣石松粉每一時服二粒乃至五粒

主治右二方蛇蟲 二宜

○第二千三百三十一方 弗肝爾埤蒲蘭度

太那設黥謨越幾斯 錢各一 鱗草越幾斯 錢各一 加密列水

大黃水製丁幾 各三

右調勻每一時服二食匙

主治蟲症 二宜

○第二千三百三十二方 速別倫歇檣

太那設黥謨花 亞爾鮮葉 錢各二 熱湯適宜浸漬瀝取

液六勺溶纈草越幾斯一錢又加後味

橙皮丁幾

錢半

橙皮舍利別

錢六

右調勻每一時服一食匙臨服宜攪和

主治蟲症胃腸衰弱及七瘕瘰癧兼併セル者之宜之

○第二千三百三十三方〔穉歌蘭度〕

鷓鴣菜

錢三

井水八勺煮耗至四勺濾過

右每一時服二匙

○第二千三百三十四方〔叔拔爾託〕

鷓鴣菜

勺半

井水六勺煮瀉取液四勺加後味

清淨蜜

勺一

右調勻早晚服二食匙

○第二千三百三十五方〔骨布〕

鷓鴣菜

攝綿施那

錢各一

旗那葉

錢一

角茴香

勺一

右調勻為散分三包每日取一包泡出連服三日

主治二千三百三十三方ヨリ二千三百三十五方至蛇蟲

及七瘕蟲ヲ治ス但此方大人ノ用ニ供ス

○第二千三百三十六方

傑頭弗祿矣皮

勺一

井水十二勺煮耗至八勺加後味

砂糖舍利別

勺一

右調勻每一時服一二匙

〔主治〕 疥蟲及七蛇蟲ニ宜シ ○傑頭弗祿矣ハ峻下劑タリ
服量過多ナルハ泄瀉血ヲ交ヘ裏急後重 疝痛 嘔吐 大
苦悶等ヲ繼發ス

○第二千三百三十七方 〔穢 歌 蘭 度〕

斯必竭里亞根 〔附〕 二 錢 井水一斗沸滾瀝過

右每一時服半小盞

〔主治〕 大人蛇蟲ニ宜シ

○第二千三百三十八方

斯必竭里亞葉 十六 六 六 甘汞 四 六 六 至

右調勻為散頓服應用四歲已上小兒

〔主治〕 蛇蟲及七疥蟲ヲ治ス ○此散二朝連進シ其第二日
ハ午後又一服シ爾後蓖麻油或ハ旃那浸ニ滿那ヲ加ル
瀉藥ヲ與フベシ

○第二千三百三十九方 蒲列刺 名 殺 蟲 瀉 下 飲

蓖麻油 新 絞 者 薄荷水 各 二 錢

右調勻每服一食匙日二三回臨服宜振盪

○第二千三百四十方 穢 屈 秘

蓖麻油 新 製 一 錢 雞子黃 一 錢 石榴根皮煎 煎 半 錢 者 五 錢 枸櫞

汁 二 錢

右調勻每半時服一食匙

主治右二方蛇蟲二宜之

○第二千三百四十一方

水銀清淨者

右內土器加井水二斗用水匙屢攪滾煮一二時紙濾小盞頻服

主治羅仙私的印人名及七穢歌蘭度等蛇蟲及七蟻蟲二稱用セリ

○第二千三百四十二方

青蒿葉六錢至一弓

熱湯適宜浸漬安暖所飽熟八分時濾過取液六弓乃至八弓加後味

亞麻子油一弓

右調勻供灌腸

○第二千三百四十三方 劉也肝

阿魏三錢

右加牛乳五弓搗爛濾過供灌腸

○第二千三百四十四方 過傑栗屈的兒

纈草 攝綿施那各半

過取液八弓加後味

阿魏加雞子黃溶解者一錢

右調勻為灌腸二回之料

主治 二千三百四十二方ヨリ二千三百四十四方至蟲症
殊ニ蟻蟲ヲ治ス○又乳汁ヲ以テ蒜ヲ煮タル液蒜ニ錢
乳汁六
弓或ハ的列並油大人半弓ヨリ一弓至
小兒一錢ヨリ半弓至ト裸燕麥汁ヲ合
シ灌腸スルニ宜シ

○第二千三百四十五方福屈篤

太那設黠謨花 纈草 攝綿施那各二錢

右細剉調勻分六畏早晚取一畏熱湯ニ盪浸漬取液灌腸

主治 十歲兒ノ蟻蟲及レ虻蟲ニ宜シ

○第二千三百四十六方運珍

撒拔實兒列子附二錢 井水十弓煮濾過取液七弓加後

味

牛乳三弓

右調勻為灌腸二回之料

主治 蟻蟲ヲ治ス

○第二千三百四十七方歌庚

太那設黠謨油一錢 家猪脂半弓

右調和塗擦肚腹

○第二千三百四十八方突弗城爾士

牛膽 胡桃子越發斯各四刀 家猪脂一弓

以上三味微温捏和放冷加後味

太那設黠謨油刀

右調和作軟膏塗擦肚腹

主治右二方蛇蟲ヲ治ス

○第二千三百四十九方骨布

甘汞半 蠟膏錢一 太那設黠謨油九滴

右調勻作軟膏每晚取少許塗直腸

主治肛門搔痒蟻蟲ニ因ル者之ニ宜シ

繚蟲タリニア羅リ

○第二千三百五十方 越倚傑兒名 繚蟲治法

芒硝半 井水二北溶化

右每晚服一小盞

主治 繚蟲ヲ治ス○之ニ兼テ越栗失爾茂印失屈篤三十

六滴若クハ収斂垂的兒十滴ヲ取り砂糖水半小盞ニ點

服セシムル一日ニ二次○此ノ如ク數月連用スルヲ要

ス○此法臧歇蘭度モ亦模倣シ簡易ニシテ此モ害ヲ致サ

ザルヲ以テ世間甚稱贊ス○律私篤ハ蟲症ニ食鹽半錢

ヲ取テ空心ニ服サシメ以テ卓越ノ効ヲ得タルヲ證セ

シ繚蟲ヲ治スレニ亦同ク之ヲ用フ

○第二千三百五十一方 越倚傑兒名 改製繚蟲治法

収斂垂的兒錢二 芒硝一 綿馬根末錢二 水六 砂糖

舍利別半

右調勻每一時服一食匙

主治 絲蟲ヲ治ス○王國宇漏生ノ步卒絲蟲ヲ患フ列實
綿篤軍隊ノ名醫鷄兒名上方ヲ處セリ病者越倚傑兒氏ノ
舊法ニ倣ヒテ肉羹汁ヲ喫スル一日ニ三次其他飲食ヲ
禁スル一三日ノ後上方ヲ服一之ニ由テ絲蟲頭ヲ具セ
ル者無量肛門ニ臨ム尚且肉羹汁ヲ喫スル一前ノ如ク
而ノ上方ヲ持重セシ后絲蟲ノ切片ヲ下ス一夥多終ニ
又頭ヲ具セル絲蟲長ニ噎兒ノ者一條ヲ獲タリ爾後更
ニ上方ヲ用フト雖復下ル者ヲ見ズ後遂ニ蟲症ノ患一

ル一ナシ

○第二千三百五十二方謨私葛質

龍腦錢半 亞刺毘亞護錢一

右加井水半匕搗和食匙抄服

主治 絲蟲ニ宜シ

○第二千三百五十三方秘瀾耳杓

石腦油錢半 阿魏丁幾錢六

右調勻每服四十滴日四次

○第二千三百五十四方東布攪

再留的列並油錢一 清淨蜜適

右作煉膏臨卧分服二次乃至三次服盡

○第二千三百五十五方茂幾

再留的列並油一 鷄子黃二 白糖半

右調勻早旦空心頓服

主治繚蟲宜シ○茂幾名一人一二日食ヲ断テ而ノ後上方

ヲ服セシム後二三時ニシテ腹痛泄瀉スル片俱ニ繚蟲

ヲ下スヲ通例トス

○第二千三百五十六方鬼弗蘭屈

的列並油六 亞刺毘亞蘊謨末二 加密列水六

以上調勻作乳劑加後味

亞的兒二

右調勻早晚服二匙

主治繚蟲宜シ○繚蟲有無ヲ確知センガ爲ニ的列並

油六錢鷄子黃ニ和シ冷水一匕ニ合シ臨卧一時間ニ服

盡セシム

○第二千三百五十七方 葛拔魯篤人殺蟲油

實百兒油一 再留的列並油三

右飽熟三日密封貯

主治同上○此劑味不佳ナリ每服五滴乃至十滴日二三

次但漸ク加ヘテ每服六十滴ニ至ル其味ヲ佳ナラシム

遠石方續 卷三十一 廣 半 堂

ルニ枸櫞舍利別二分ヲ加フ

○第二千三百五十八方過荷。極温耳也

傑頭弗祿矣皮子

右加井水二匕火酒四勺飽熟六日而後煮耗至一匕早旦空心每半時服二食匙三次二日連進

主治 繚蟲ニ宜シ ○第三日ニ甘黍藥刺巴ノ下劑ヲ與フ

○第二千三百五十九方 獨僅倨名 繚蟲治法

綿馬根去皮者 井水一匕煮瀝取液八勺加白糖適宜

令味佳

右每服半小盞一日服盡

主治 繚蟲ヲ驅除スルニ宜シ ○獨僅倨名ハ繚蟲ヲ治ス

ルニ胃腸ヲ補益スルヲ旨トス故ニ口ヲ戒スルヲ左ノ

如シ早起冷水半彬彬乃容量ヲ飲マシム而シテ每飲暫時口

中ニ含畜セシム此ノ如クスルハ虛弱ノ胃モ能ク水

ヲ受クルニ堪ヘ其腎臟ニ循行スルモ亦速ナラズ久

ク腸中ニ住持スルナリ其後大便ヲ促スヘシ即冷水四

分彬彬乃乃至半彬彬乃ヲ以テ灌腸シ極メテ久ク腸中ニ住

持セシム最初灌腸スルノ後或ハ便氣甚迫ルハ病者

ヲ行步セシメテ以テ容易ニ之ヲ防キ便氣自ラ已ム而

メ卯牌後半時ニ當リテ淡薄ノ朝餐ヲ命フ又適宜ニ緩

廣 半 堂

歩セシメテ後午時ニ至リテ冷水少許ヲ飲マシメ以テ
 午膳前ニ胃ヲ強壯ニス食餌ハ新菜蔬淡果肉類殊ニ不
 熟ノ乾肉果實白蒸餅及ヒ牛酪ヲ好トス蒜葱ハ一リシ
 グ名魚等ハ胃ヲ刺戟スルヲ甚シクノ却テ胃ヲ虚衰セシ
 ムルカ故ニ之ヲ禁ス晩ニ至テ冷水ニ浴セシム但寒冷
 ノ時令ニハ暖室中ニ在テ浴スヘシ浴スルキハ肚腹殊
 ニ肝部ヲ壓迫ス彌僅僣ノ説ニ據ルニ繚蟲症ハ通例肝
 臟ニ患アリ或ハ肝部ニ滴浴ヲ施スモ亦佳ナリ夏月ハ
 懸泉浴ヲ好トス其水幅六獨乙謨厚一獨乙謨ニノ十四
 フー卜ノ高キヨリ懸タルナリ病者全體ニ之ヲ灌グノ

後其所ニ卧メ以テ更ニ二三密拮篤ノ間肚腹ニ懸水ヲ
 灌之灌水終テ後適宜ニ體ヲ運動シ緩々蒸發氣ヲ進メ
 尋テ晚餐ヲ命ス若繚蟲劇証ヲ發スル片ハ彌僅僣氏ミ
 子ラーレマヅ子チスミスヲ施メ佳効ヲ得タリ或ハ其
 証ヲ量リテ肚腹ニ寒罨法ヲ行フ少頃アリテ後乃上ノ
 綿馬根煎ヲ用フ此方決メ身體ニ害アルヲナシ二三日
 ヲ經ルノ后繚蟲ノ切片ヲ下シ其久シキ者モ八日乃至
 十四日ニシテ竟ニ全蟲頭ヲ具メ泄下ス或ハ此ニ下劑
 ヲ要スルヲアリ○彌僅僣ノ經驗説ニ據レハ繚蟲ハ一
 回其全體ヲ下スト雖復更ニ生ス故ニ之ヲ逐除スルヲ

三四次ニ及ブ者往々之アリ一人十三回ニ及ブ一アリ
ト云フ然^レ氏能ク攝養ヲ守ルキハ再生ノ蟲ハ其成育初
生ノ半ニ至ラス蟲ノ下ルモ亦更ニ速ナリ又其後生ズ
ル者ハ益成長セズ之ヲ逐除スルモ亦容易ニ終ニハ
綿馬根ヲ用ヒテ十二時或ハ六時内ニ功ヲ収ムル一ア
リ而メ病者ノ體ヲ補益スル一十分ナレバ緜草末症全ク
去テ蹤跡ナシ○吾輩憶フニ此症治法極メテ簡易ヲ貴
フ世上用フル所ノ方法多クハ腸中緜草末ヲ生スルノ素
因ヲ滋蔓シ或ハ身體ヲ害スル者屢之アリ故ニ益此病
ノ施療困難ヲ致スナリ

○第二千三百六十方叔叔爾托

綿馬新根末錢三 緜草末錢一 清淨蜜錢三

右調勻為^レ砥劑每一時半服一小食匙

主治 緜草末ヲ治ス○阿魯魯名ハ早旦空心綿馬根三錢ヲ
取り水五勺乃至六勺ニ和服セシム或ハ舍利別ヲ加ヘ
テ暴律私ハニ作りテ用ヒ後一時ヲ經テ蓖麻油二勺ヲ取
リ四分時毎ニ一食匙肉羹汁ニ和シ服サシ此方簡易
ナルガ故ニ最稱用スベシ

○第二千三百六十一方百失寄爾

綿馬越葵斯一的兒製 綿馬根末十二 玫瑰昆設兒弗

宜適

右調勻為十二丸乃至十六丸石松粉分二服臨卧服用
主治絲蟲ニ宜シ○日晡申牌半ヲ過クレバ患者食ヲ断
テ而ノ翌朝緩下劑ヲ用フ但蓖麻油ニテ取テ三服ニ
分テ四分時毎ニ用フ服後過見托若クハ菩提樹花泡劑
一小盞ヲ飲服セシムルニ宜シ

○第二千三百六十二方 刺骨私

綿馬越幾斯

西的兒 製半錢

玫瑰蜜半

右調勻分二服臨卧一服又翌朝空心一服

主治 絲蟲ニ宜シ○刺骨私ハ絲蟲ノ大切片ヲ下スヲ見

ルノ後ニアラザレハ決メ綿馬根越幾スヲ用ヒズ絲蟲ノ頭

遺ルヲ屢上方ヲ服シ終テ三時乃至四時ヲ過キテ未効

ヲ見ザルバハ瀉劑ヲ用フ○刺骨私ハ石榴根皮ヲ以テ

綿馬越幾斯ニ優レリトス

○第二千三百六十三方 暴優埵篤

錫屑一乃至半

胡蘿蔔舍利別宜適

右作煉膏早旦頓服

○第二千三百六十四方 蒲錄

錫屑錢

葯刺巴末半

蜜宜適

右作煉膏每二時服

○第二千三百六十五方 百弗蘭屈

錫屑一錢 健質安那越幾斯二錢 蜜適

右作煉膏每一時半服二食匙臨服宜攪滾

○第二千三百六十六方

錫屑英吉利產 二錢 撒兒末爾秩斯 攝綿施那各一錢

右調勻為散分十二包早晚一服或每日與瀉藥

主治右諸方絛蟲ヲ治ス

○第二千三百六十七方 帶過。祿斯

錫屑 綿馬根末各六錢 白糖半

右調勻為散分四十八服每四分時一服

主治絛蟲ヲ治ス○此散ヲ服スルノ後峻下劑ヲ用フ

○第二千三百六十八方 聯歇蘭度

石榴根皮半 井水十二勺煮耗至八勺濾過

右每四分時服二食匙

主治長節絛蟲ツタリウニアノ試驗方ナリ然氏功力甚緩ナ

リ或ハ之ヲ服ノ嘔吐ヲ發スル者間アリト雖懼レテ後

服ヲ停ムルコト勿シ通例瀉劑ヲ要セズ北方産ノ石榴皮

ハ大率効アラザルガ故ニ南方産ノ者ヲ撰用スベシ

○第二千三百六十九方

石榴新根皮二三至 井水二斗浸漬十二時後煮耗至

一此瀝過取液加白糖適宜味佳為度

右朝起空心每四分時服二三食匙至液服盡

主治 繚蟲 宜之 ○又或ハ四分時毎ニ本劑ノ四分一若

クハ三分一ヲ服ノ可ナリ ○繚蟲下ラザレハ次日再上

方ヲ與フ或ハ初二三日間石榴根皮一弓半煎液ヲ取

リテ朝夕ニ服セシム

○第二十三百七十方 昆歇兒度名繚蟲治法

石榴根皮一 井水一北煮瀝過取液八弓加後味

蓖麻油半弓

右調和

主治 早起空心ニ一小盞ヲ服レ爾後四分時ヲ經テ哥喜

ヲ飲シム但之ト俱ニ他物ヲ食スルコトナシ又四分時ニ

ノ半小盞ヲ用テ後尚四分時毎ニ半小盞ヲ服メ以テ全

量ヲ盡スニ至ル此ニ於テ一時乃至一時半休歇シテ後

蓖麻油一食匙ヲ用ヒ又四分時ノ後一食匙ヲ用フ或ハ

其症已ムコトヲ得ザル者ハ又四分時ノ後服メ第三回ニ

至ル爾後四分時ヨリ一時至ニ繚蟲片ヤトナリテ下ル

通例 繚蟲頭ヲ具ニ上方ヲ服シテ酩酊狀ノ証ヲ發スル者屢アリ

ト雖其証四分時ノ後乃休ル此方ヲ服スルノ初即吐出

スル氏ハ但吐スル者稀 功用確實ナラズ又服藥ノ日ハ

病者ヲ戒メ唯消化シ易キ食餌ヲ許スベシ○昆歇兒度ハ縲蟲ヲ驅逐セル後一年間八週乃至十週毎ニ石榴根皮煎ヲ用ヒ又時々苦味藥ヲ用ヒテ飲食ヲ節ス

○第二千三百七十一方〔姪斯蘭狄私〕

石榴根皮越幾斯〔亞兒箇爾製六錢〕 菩提樹花水 枸椽汁各三

弓 達刺侃篤薙護〔適宜〕

右調勻每四分時服半劑

○第二千三百七十二方〔同上〕

石榴根皮越幾斯〔亞兒箇爾製六錢〕 薄荷水 菩提樹花水

枸椽汁各二

右調勻每八分時服本量四分一

主治右二方縲蟲ヲ治ス

○第二千三百七十三方〔弗肝爾姪蒲蘭度〕

藤黃 甘黍各一 芍刺巴 白糖各一

右調勻為散分四裹毎二時服一裹

主治縲蟲ヲ驅逐スルニ宜シ

○第二千三百七十四方 歇爾連斯縮度〔人名〕 縲蟲治法

甲方

綿馬根末一錢

右分四服

○此散連服スル一ニ日トス但早起空心一服晚一淡薄ノ食餌ヲ喫シ後一時ヲ過ギ又一服ス此ノ如ク二日連用シテ第三日ハ旦日空心ニ左ノ散ヲ與フ

乙方

藤黃十二

亞爾鮮鹽半錢至一錢

私答爾幾石鹼二

右丁寧調和

○之ヲ服ノ後通例吐瀉二三回宜ク微温湯若クハ淡味泡劑ヲ服ノ緩和スベシ後一時半ヲ經テ蓖麻油一匁ヲ取り肉羹汁一小盞ニ和服ス又半時ヲ過キテ再同量ヲ服シ而後繚蟲下ラザレハ又一時ノ後蓖麻油ヲ用フ此

ノ如クニシテ蟲未下ラザレハ乳汁冷水等分ニ混和シ蓖麻油三匁ヲ加ヘテ晚ニ方テ灌腸ス○此治法峻効アリ然レ病者ノ體ヲ侵ス一モ亦甚シ

○第二千三百七十五方 烏耳店便其人繚蟲治法

甲方

綿馬根一 井水三斗煮半時加瑞香皮一匁乃至半錢或一錢濾取液再加後味

綿馬根末二錢至三錢

右早旦頓服或分爲數服半時間服盡

○之ヲ服ノ後病者外ニ出テ緩歩シ後又一時半乃至二

時ヲ經テ左ノ散ヲ用フ

乙方

甘汞 撒爾業兒秩斯 各半

右調勻

○若之ヲ服メ吐出スルキハ再服スベシ服後日晡ニ至テ繚蟲尚未下ラザレハ又左方ヲ與フ

丙方

大黃末 葯刺巴末 各二

右調勻頓服

○第二千三百七十六方 別屈名繚蟲治法

甲方

甘汞 一 鹿角霜 安質沒尼末 各半

右調勻為散記ハ符

乙方

藤黃 葯刺巴 葛兒儒別葉 鹿角霜 各廿五 綿馬根

錢一

右調勻為散分三服記B符

○日晡申牌半ニ當リテ甲方一包ヲ取り水一食匙ニ和服シ又夜間肉羹汁少許ヲ喫スルノ後甘扁桃油二勺ヲ用フ翌朝乙方一包ヲ取り桃花舍利別一食匙一和用ス

然、氏、繇、蟲、下、ラ、サ、レ、ハ、乙、方、第、二、包、ヲ、服、シ、尚、効、ア、ラ、ザ、レ、
ハ、第、三、包、ヲ、與、フ、ル、ナ、リ、亦、復、効、ヲ、見、ザ、レ、ハ、苦、味、藥、ノ、煎、
液、ニ、瀉、利、鹽、ヲ、和、シ、テ、灌、腸、ス、悉、上、欸、ノ、方、法、ヲ、用、ヒ、盡、ノ、
畢、竟、効、驗、ア、ラ、サ、レ、ハ、一、時、半、内、ニ、左、方、ヲ、與、フ、ヘ、シ、

丙方

藥刺巴末錢一 瓦刺扶阿刺葉錢一

右調勻為散分三服

○此方極メテ猛烈ナリ獨壯實ノ人ノミ之ヲ用フルニ
堪フベシ

○第二千三百七十七方

紐歇爾篤人 繇蟲治法

甲方

綿馬根末錢三

右記△符

乙方

甘永 蘓各二 沒各二 扭各二 脂各二 藤黃五

右加水仙花昆設兒弗適宜搗和作暴律斯記B符

○病者水一斗半新鮮酪ニ之乃至三斗白蒸餅ニ之食鹽
少許ノ晚餐ヲ喫セシメ若其日不大便ノ者ハ錦葵花湯
爾把葉煎ニ食鹽及ヒ阿列襪油ニ之ヲ和メ灌腸シ翌早
旦甲方一裹ヲ取り綿馬若クハ菩提樹花ノ浸劑六斗ヲ
以テ送下之之ヲ服ノ吐スルキハ嘔氣退クヲ俟テ再第

二服ヲ進ハ爾後一時ヲ經テ乙方ヲ與フ蓋素性過敏ノ病者ハ今テ二服トスベシ却テ強壯ノ効アリ病者ニ命ノ早朝時々稀淡ノ綠茶一小盞ヲ喫セシメ且午餐ヲ節メ度ニ過クルトナカラシハ然レ乙方モ亦吐スル者ハ二時ノ後瀉利鹽二錢乃至一弓ヲ以テ熱湯ニ溶解シ用レ繚蟲始メテ下ルキハ之ヲ挽クト勿レ又其全體下ラサルノ前廁ヲ出ルト勿レ瀉利鹽ヲ服メ瀉ヲ促スト要トス若繚蟲ノ切片二三ヲ下メ未全體下リ盡ザルキハ翌朝再綿馬根末ヲ與フ蓋上ノ峻下暴律ヲ私劑ニ代ヘテ瀉利鹽一弓乃至一弓半ヲ用フルニ宜シ○此治法モ亦

甚猛烈ナリ廣節繚蟲ボトリオセバヲ治スルニ殊稱スベシ

○第二千三百七十八方 末質人繚蟲治法

甲方

錫粉英吉利産一弓 綿馬根末六錢 攝綿施那末半弓 葯刺巴

脂末 霸王鹽末各一錢 蜜適

右調勻作煉膏記ハ符

乙方

葯刺巴脂末 霸王鹽各二刀 蘇甘没尼末一刀 藤黃

末半 蜜適

右調勻作煉膏記B符

○此方ヲ施スノ前數日飲食ヲ節シ殊ニ淡薄ノ羹汁及
ヒ鹽藏物殊ニハヲ用フルヲ要ス其後甲方ヲ取リ一
時毎ニ一茶匙ヲ服メニ日乃至三日間持重シ患者腹内
ニ惡ムベキ蟲証ヲ覺ユルニ至ラバ乃乙方ノ煉膏ヲ取
リ一時毎ニ一茶匙ヲ與ヘ連服シテ絲蟲下ルヲ度トス
但大便利セサルキハ蓖麻油二三匙ヲ飲マシメ或ハ之
ヲ以テ灌腸ス

○館倭列爾及私祿私並ニ絲蟲治法

先絲蟲ノ有無ヲ確知センガ爲ニ左ノ乳劑ヲ處ス

○第二千三百七十九方

甲方

勿ハ擲ナ祭サ亞ア的テ列レ並ニ底チ那ナ
錢一 雞子黃適

右加薄荷水四勺作乳劑食匙抄服

○絲蟲一二節下リテ其蟲尚存スルヲ確徵シ得ルキ
ハ一月間鹽藏酷厲ノ食餌即チハ一リン名魚乾肉鹽藏
肉酷厲酪等ヲ用ヒテ而ノ飲酒平生ノ度ヲ過グサシム
而後始メテ治ラ下スベシ左方ヲ用フ

乙方

甘汞十二 牡蠣半

右調勻淡薄晚餐後冷水頓服

○同夜臨卧甘扁桃油或ハ蓖麻油一弓ヲ與フ又一日ヲ隔テ、早旦左ノ散方ヲ服ス

丙方

藤黄世六 末レ兒失温名癩癩散 白芷根末各八 葛カ

兒儒別葉末一

右調勻為散分三裏泡劑一盞和服

○此散一服ニシテ通例數回ノ吐瀉ヲ得ベシ宜ク葛兒儒別葉泡劑ヲ用ヒテカメテ之ヲ鎮靜スベシ其後一時ヲ經テ縲蟲下ラザレハ第二裏ヲ與フ已ムトヲ得ザレ

ハ一時ヲ過ギテ又第三裏ヲ與フ

○第二千三百八十方 批ト篤ト繆ト兒ト列ト爾ト縲ト蟲ト治ト法

甲方

甘永十ニ 蝮ト蝮ト石一

右調勻為散記△符

乙方

藤黄世六 縲ト草ト末ト攝ト綿ト施ト那各十

右調勻為散記B符

○先暫粘液解釋劑ヲ與ヘ其後始メテ甲方ヲ取テ晚酉牌半ニ當リテ之ヲ用ヒ戌牌半臨卧甘扁桃油一弓半ヲ

與フ之ニ由テ夜間瀉ヲ得翌朝卯牌半ニ至リテ乙方ノ
第一裏ヲ取り泡劑一盞ヲ以テ送下スレハ大抵吐瀉ス
又辰牌半ニ當リテ其第二裏ヲ用フレハ嘔吐ヲ發スル
一ナクメ大便利シ隨テ絛蟲ヲ下スベシ第三裏ヲ要ス
ルハ甚罕ナリ拙篤繆兒列爾名ハ此治法ヲ施スノ後危
險症ヲ發スル者唯一人ヲ見シノミト云フ蓋此療法ヲ
行フノ間ハ都テ葶中ニ在ルヲ要ス

○啞蟥度人絛蟲治法

病者毎朝猛烈哥喜一盞ニ砂糖ヲ和服シ辰牌半ニ當リ
テ「サルデルレ」或ハ「ハーリングスラ」俱ニ下ノ名ニ油及

ヒ多量ノ葱ヲ加ヘテ食シ午牌ニ至リ牛肉ニ沙蘿蔔ノ
煮タル者ヲ加ヘ日晡ハ沙蘿蔔ノ新擦屑ニ油及ヒ醋ヲ
加ヘテ喫ス此ノ如ク三日間食ヲ節シ而メ第四日ノ朝
空心左ノ丸ヲ用フ

○第二千三百八十一方

甲方

巴豆油滴 加白石鹼末半錢丁寧搗和再加後味
藥刺巴水製越幾斯藥刺巴末 綿馬越幾斯兒製
甘草越幾斯適
右為六十九衣桂末每半時或一時服四丸乃至五丸

○甲方ニ兼テ同日左ノ湯液ヲ用フ

乙方

鷓鴣菜 綿馬根去皮各半 常水一斗煮濾過取液八斗

右時々服半小盞

○歌戾名人 繚蟲治法

甘汞藥刺巴及ヒ繚草亞的兒油ヲ調和シ下劑ト為シテ先之ヲ與ヘ後一日ヲ隔テ左ノ丸ヲ用フ

○第二千三百八十二方

甲方

牛膽乾者 勿撈子ナ祭亞的列並底那 阿魏各二錢 蘆薈越

幾斯水製ニマ

右調勻ニハ為一丸每服十九乃至十二丸日二次或每日得軟便一行為度

○此丸ヲ服ノ二三日ヲ過グレハ通例已ニ繚蟲二三節ヲ下スナリ此丸ヲ連服スルハ十四日ノ後ハ之ニ代ヘテ左ノ舐劑ヲ與フル繚蟲此丸ニ慣ガ故ナリ

乙方

錫粉半 攝綿施那錢二 亞爾鮮越幾斯錢一 蜜適宜 右作煉膏每服一茶匙或二茶匙日二次

○此方ヲ持重スルハ八日ノ後方中ニ綿馬根半ヲ加

透西初齋 卷二十一 緋蟲 三四 廣 用 堂
へ又八日連服、後再海慈蜜一弓ヲ加フ之ニ由テ緋蟲
數節下ルヲ通例ト凶然、氏若其効驗ヲ見ザル片ハ左ノ
水劑ヲ與フ

(丙方)

過私巴兒篤油附半 亞的兒適宜溶化爲度

右朝暮服二十滴乃至二十五滴

○後治法ハ苦味越幾斯劑及ヒ銕劑ニ宜シ○再緋蟲ノ
成長ヲ防クガ爲ニ時々上ノ舐劑一二茶匙ヲ服スルヲ
要トス○此法ハ他ノ方法ニ異ニシテ身體ヲ侵ス少
ナキガ故ニ殊ニ稱賛スベシ

○緋歐蘭度緋蟲緩治法

○第二千三百八十三方

(甲方)

垂爾鮮丁幾 阿魏丁幾 各半

右調勻每服六十滴日三次

主治 一婦人體質嬌柔緋蟲ヲ患フ緋歐蘭度上ノ水劑ヲ
用ヒ之ニ兼テ次ノ舐劑及ヒ蓖麻油ヲ與ヘ八日內ニ全
治シテ後害アルナシ又其食ヲ減節シ酷厲ノ鹽藏物
ヲ撰用ス

(乙方)

交 西 初 藥 卷 二 一 繚 蟲 三 十 廣 興 堂

錫粉一 綿馬根末二 玫瑰昆設兒弗適

右作煉膏每服一茶匙日三次但每服兼用蓖麻油一匙

○穢歇蘭度繚蟲劇治法

繚蟲ノ有無明ラカナラザルハ本治法ヲ處スルノ前
二三日間毎日癒瘡木脂及ヒ苦扁桃水ヲ用フ之ニ由テ
繚蟲ノ切片泄下スルナリ爾後數日ハ一リングザルデ
ルレ並ニ魚名其他酷厲鹽味ノ食餌ヲ用ヒ晚ニ唯淡味羹
汁ヲ與フ此ニ於テ乃本治ヲ施スヘシ臨卧綿馬根末一
錢或ハ其症ヲ量リテ二錢ヲ服シ若クハ之ニ代ヘテ綿
馬亞的兒油三十滴或ハ綿馬亞的兒越幾斯ヲ以テ散トシ服ヒ翌朝

冷水一盞ヲ飲ミ又左ノ散ヲ與フ

○第二千三百八十四方

藤黃六 甘汞 菲阿私越幾斯各一 麻屈涅夫亞半

右調勻

四分時ヲ經ルノ後蓖麻油半ヲ用ヒ乳汁ヲ以テ灌腸
シ肚腹ニ石腦油ヲ塗擦之ヲ施スノ後繚蟲下ラザレ
ハ一時ノ後再上法ヲ施スヘシ尚未効ヲ見ス瀉モ亦十
分ナラサル者ハ同法ヲ行フ一第三回ニ至ル繚蟲直腸
外ニ懸ルキハ強テ之ヲ牽断スル勿レ小心シテ之ヲ
木片ニ卷キ以テ縮收スル一ナカラシム温暖乳汁ヲ桶

廣 興 堂

ニ盛リ腎ヲ其中ニ浸シ漸徐ニ條蟲ヲ牽キ出スナリ

○屋兒弗私歌憎名人名條蟲治法

○第二千三百八十五方

(甲方)

綿馬根末三錢

菩提樹花水五

右調勻早旦空心半服又四分時後半服臨用宜振盪

其後半時ヲ經テ後方ヲ服ス

(乙方)

白肝油三

右

四分時毎ニ一食匙ヲ取り枸櫞汁ヲ加ヘテ以テ之ヲ服
盡シ一時ヲ俟テ後又瀉利鹽ヲ用フル一左方ノ如シ

(丙方)

精製瀉利鹽三

至

井水半斗溶解

右毎四分時或半時服一麥酒盞宜視瀉下之劇易消息

之ヲ服スレバ通例五六時内ニ條蟲片々トナリテ下ル

○渴ヲ消スルニ猛烈哥喜ニ砂糖舍利別多量ヲ加ヘテ

飲服シ午饌前ハ單穀粉製ノ物若クハ白蒸餅少許ヲ與

フ食ヲ断ツハ更ニ妙トス午饌ハ「ハーリングスラ」飯下

名ノニ多ク葱ヲ加ヘ晚餐ハ消化シ易キ羹汁ヲ用フ○若

施治ノ際嘔吐ヲ發スルハ縲蟲下ルナシ直ニ後服ヲ停ムベシ

○名 娵烏留屈名 縲蟲治法

娵烏留屈名 縲蟲ヲ治スルハ断食驅蟲後調ノ三法アリ

第一断食ヲ以テ蟲ヲ衰弱セシメ其驅逐ヲ容易ナラシムルナリ故ニ三四日間唯白蒸餅少許及ヒ脂肪乏シキ肉羹汁ヲ用フル一日ニ三次ノ外總テ飲食ヲ断テ而メ時々次ノ解釋劑ヲ服セシム

○第二千三百八十六方

甲方

蒲公英根 失格列乙根各一 井水適宜煮八分時濾

過取液ハ弓加後味

精製礮砂錢一 失格列乙加大黃舍利別弓一

右調勻每二時服二食匙

○之ニ兼テ過兒托葉。歐爾拔私屈。謨花及ヒ麗春花ノ浸劑ヲ以テ灌腸スル一數次又驅蟲法ヲ施スノ前夜ハ脂肪乏シキ肉羹汁ヲ用ヒ酉牌ヨリ戌牌半至半時毎ニ亞麻仁煎ニ乳汁ヲ加ヘテ灌腸ス

第二縲蟲ヲ驅除スルハ左方ニ宜シ

乙方

綿馬根末 二錢至半

右分三裹

丙方

蓖麻油 二勺至三勺

右

丁方

藤黃 甘汞 各六 白糖 一

右調勻為散分三裹

戊方

橙皮黃 半

右供咀嚼

○朝卯牌ニ當リテ灌腸シ。又四分時ヲ過キテ又灌腸ス且脂肪多キ羹汁ヲ與フ。卯牌半ニ至リテ蓖麻油ニ食匙ヲ用ヒ。又四分時ノ後綿馬散第一裹ヲ服シ。辰牌ニ至リテ再蓖麻油ニ食匙ヲ與ヘ。又四分時ヲ經テ綿馬散第二裹ヲ用フ此ノ如ク尚之ヲ連用ノ蓖麻油及ヒ綿馬散ヲ服盡スルニ至ル飲料ハ茶ヲ用ヒ午牌ニ至リテ峻下劑丙方第一裹ヲ用ヒ之ニ兼テ肚腹ニ緩和蒸漏法ヲ施ス此ニ於テ繚蟲下ラザルキハ一時乃至一時半ノ後下劑第二裹ヲ與フ此ノ如クニシテ亦復効ヲ見ス且焮衝証モ

透田方藥 卷三十一 雜錄

亦發スル一ナケレハ申牌後四分時ニ當リテ下齋第三
裏ヲ半分シテ服セシメ同時ニ灌腸ヲ行フ通例下齋第
三裏ヲ服スルノ後半時一時乃至一時半ニシテ絛蟲ヲ
下スナリ

第三後療法ハ腸ノ衝動ヲ制スルヲ以テ旨トス即沙列
布淡煎ニ砂糖ヲ和用シ緩和蒸漏法及ヒ灌腸ヲ施シ或
ハ其症ヲ量リテ肚腹ニ放蟻ス而シテ飲酒及ヒ其他衝動
起熱ノ飲食ヲ禁ス○此法満月時ニ於テ施スルハ殊ニ
効驗アルベシ

蒲廉設爾石絛蟲治法

○第二千三百八十七方

甲方

攝綿施那或太那設粗黠粗 纈草末二 葯刺巴末
半錢至 孕礬酒石一錢半 海葱蜜適
二刀 右作煉膏每服一茶匙日二次乃至三次

○此煉膏ヲ服盡スル後早晚葛別爾篤名殺蟲油附二茶
匙ヲ服シ服後冷水少許ヲ追飲之ヲ持重スル一十日
乃至十二日ニシテ大抵殺蟲油ニ弓半ヲ盡スニ至ル尋テ
左ノ瀉藥ヲ與フ

乙方

遠西方藥 卷三十一 黃半堂

遠西藥彙 卷三十一 廣朋堂

藥刺巴末一 旃那末半錢 孕礬酒石一錢

右調勻為散分三服每半時一服以至得瀉

○次日再葛別爾篤殺蟲油上見ヲ服スルヲ始ム其量繚

蟲強弱ニ準ノ或ハ四弓乃至五弓或ハ七八弓ヲ服盡ン

甫ノテ蟲ヲ驅除スルヲ得ル者間アリト雖大抵最初

ニ於テ下ルナリ但通例蟲體既ニ消化スルカ故ニ尿中

ニ之ヲ看得スルヲ容易ナラズ蒲廉設爾ルハ久ク葛別

爾篤油ヲ持重ノ以テ繚蟲再生ノ素因ヲ防止スト云コ

若此油病者ニ不佳ノ感動ヲ起ノ頭旋ヲ發スルハ服

量ヲ減少シ大小便ノ時ニ方リテ灼クガ如キ知覺アル

者ハ油質乳劑ヲ與フ味ノ不佳ナルハ桂皮或ハ丁子ヲ
咀嚼スルヲ最妙トシ此法ヲ施スノ際ハ粗製穀粉ノ食
餌果實莢ヲ被ル者多脂ノ物等ヲ禁忌ス○後調法ヲ行
フヲ要セズ然レ病者素質粘液ヲ釀シ蟲ヲ生ジ易キ
者ハ左ノ水藥ヲ投スベシ

丙方

奧私ル的爾ル名複方蘆薈丁幾一 林檎酸銹丁幾附越栗一

失爾必篤里阿利論産一

右每服十滴乃至三十滴冷水點服日三四次

○第二千三百八十八方 叔密土名繚蟲治法

遠西藥彙 卷三十一 廣半堂

甲方

顯草錢六 旃那錢二 滾湯適宜浸漬瀝取液六勺融解精

製芒硝三錢太那錢六設點錢謨油糖二錢再加後味

滿那舍利別子二

右調和每二時服二食匙

○之ヲ服スル一早旦空心ヨリ始メテ晚酉牌半ニ至ル

服後猛烈哥喜ニ砂糖或ハ舍利別ヲ和シ用ニ午餐ハ淡

薄穀粉製ノ食餌及ヒ白子ヲ孕メルハ一リンダ魚名二三

個ヲ喫セシメ晚戌牌ニ方リテハ一リンダ飯名スラー

馬鈴薯ヲニ煮ザル乾肉ヲ細剉セル者葱及ヒ油ニ多ク

加ヘス

砂糖ヲ加ヘ食セシム飲料ハ砂糖水ニ宜シ此ニ由テ既ニ
縲蟲ノ數節下ルナリ○翌朝卯牌ヨリ始メテ左ノ丸藥ヲ與フ

乙方

精製阿魏四十 藤黃 大黃 葯刺巴各半 吐根

實芟答利斯各 金硫黃各二 甘黍半 太那錢六設點錢謨

油 過泥子油各四 蘆根流動越幾斯四十

右調勻二匁為一九衣石松粉玻瓈壘收貯每半時取六丸

以砂糖舍利別一茶匙送下

○上方ヲ服スルノ間ヲ窺ヒ時々猛烈哥喜ニ多量ノ砂

糖或ハ砂糖舎利別ヲ加ヘテ飲服ス上ノ丸藥一服ヲ用
 ヒテ後四分時ヲ過ギ蓖麻油一匙ヲ用フ日午肉羹汁少
 許ヲ與フ午後未牌若クハ未牌半ヲ過クレハ縲蟲ヲ下
 スヲ通例トス若効アラザレハ再蓖麻油二三食匙ヲ與
 ヘ以テ瀉ヲ得ルニ至ル○又次日其功用確實ナラシメ
 レガ爲ニ再上ノ丸藥少許ヲ服セシムベシ爾後數日縲
 蟲再生ヲ防止スルニ「ハリリングスラ」^出前及ヒ細劉沙
 蘿蔔ニ酢及ヒ多量砂糖ヲ加ヘテ屢與フ又八日毎ニ前
 ノ丸ヲ一二服スルヲ佳トス後調法ハ補益ノ食餌^{肉羹汁雞}
 子黃葡萄^酒及ヒ苦味劑ニ宜シ

○縲蟲ノ有無ヲ確證セザレハ先左法ヲ施スヘシ病者
 毎日午饌前ハ穀粉製琶布ノ外食餌ヲ禁ジ日晡ハハリ
 ングスラ「ラ」喫シ飲料ニ砂糖水ヲ用フルヲ數日ノ後
 早旦空心ニ左ノ散藥ヲ與フ

丙方

甘汞 藤黃 ^{各六} 攝綿施那 ^半 葯刺巴 ^{十五} 太那 ^十

設點謨油糖 ^{一錢}

右調勻爲散

○午饌ハ穀粉汁晚餐ハ「ハリリングスラ」飲料砂糖水
 ニ宜シ爾後大便數行アリテ大抵縲蟲二三節ヲ下スベ

シ但其全體下ル者ハ穿ナリ

○此治法ヲ禁忌スル所ノ者ハ老衰。妊娠。經事ノ前後。燼衝症。勞瘵。歎血。痔血等是ナリ○極メテ幼少ノ兒ハ其年齡ニ準ノ少量ヲ用フヘシ○其他此法確効ヲ奏シ危險ノ懼ナク既ニ良効ヲ得タル者往々尠シトセズ

○第二千三百八十九方 儒朴チボイ乙ス私入名 緋蟲治法

甲方

錫屑英吉利産一タ 丹寧精製 藤黃各半 加耶普的油糖五

右調勻為散分ニ裹卯牌服第一裹四分時後服第二裹
主治長節緋蟲ソリウムヲ驅除スルニ宜シ○此治法ハ

預食餌及ヒ攝生ヲ節スルヲ要セザルガ故ニ他法ニ優レリ○此散ヲ服スル毎ニ猛烈ノ哥喜加砂糖ヲ二小蓋ヲ飲マシム嘔氣アル者ハ過設印亞的兒二三滴ヲ用フ大抵一時許ノ後疝様ノ疼痛ヲ發シ隨テ緋蟲下降ス其蟲多クハ全體ヲ具シテ下ルナリ其痛増進スル片ハ直ニ猛烈哥喜ヲ飲ムニ宜シ儒朴乙私氏此法ヲ施ス下既ニ十人皆偉効ヲ得タリ

乙方

葛刺布呂カ篤ラ錢丁附幾ニ 越乙土强壯丁幾半
右調勻毎ニ時半四十滴赤葡萄酒點服

主治 絛蟲驅除セル後腸中粘液膜ノ生カヲ振起スルニ宜シ

○第二千三百九十方 陽

黑酸化銅二八 白糖半

右調勻為散分二服日三服乃至四服

主治 刺堙未設屑名絛蟲ニ之ヲ稱用シ屢奇驗ヲ得タリ

此酸化銅ハ能ク絛蟲ヲ殺スカ故ニ之ヲ用フレバ既ニ

其半消化セル蟲節自ラ下リ隨テ其証消除ス○此方人

體ヲ損害スルヲナキガ故ニ他ノ劇劑ノ嫌忌スヘキ症

ニモ亦用ヒテ佳ナリ此ヲ以テ絛蟲ノ首尾下ラサルノ

憂アルヲナシ○又刺堙未設屑ハ醋酸化銅丁幾附ヲ與フ

○第二千三百九十一方 爛傑

甘汞二 藥刺巴錢 桂皮半 綿馬越幾斯亞的兒製一

白糖半 達刺侃適 蕪蘆適

右作百六十錠衣甘草末早晚服五錠乃至八錠

主治 小兒絛蟲ニ宜シ

書肆

江戸芝神明前

和泉屋吉兵衛

遠西方彙

卷三十一

雜品

四十五

廣月堂

