



遠西方彙

其

水腫	肥滿	風脹 <small>鼓脹</small>	第四 風氣脂肪及水液畜積病	禿瘡	癩 縮髮病	肝斑 皮膚搔痒	夏月斑 <small>雀斑之類</small>	癬 <small>銅色疹</small>	○卷之二十三
----	----	-------------------------	------------------	----	--------------	----------------	----------------------------	-------------------------	--------

十武9
237
23



明 賦 9
番 237
卷 23



遠西方彙卷之二十三

獨乙 加幾安頓 著
和蘭 傑斐婆都 譯

侍醫法印伊東瑤川院 貞文仲 重譯

南洋伊東 健夫 參校

法利ソリ子子羅羅蘭蘭 敵赤炮キツタ羅ユ一一プロルロロセセ一一アアクク子子 (酒敵鼻)

此二病類症ナリ治法モ亦同シ其起因畜血ニ係ル者多シ
宜ク相當ノ食忌ヲ守ラシメ清涼下劑キョルシセセイイドドシシラ
用ヒ或ハ其症ニ應メ頤上吸角及ヒ脚浴等ヲ施スベシ○



腹臟妨碍ニ係ル者ハマリオン泉。カルス泉。キンゲン泉
 等ノ解釋劑ヲ用フヘシ。○其他依倔篤。瘰癧毒。徽毒等ノ合
 併ニ着眼スベシ。○過利便土名ハ甘汞。硫黄。及ヒ紫堇。越幾
 斯ノ丸劑ヲ稱用シ。歇惰名ハ安質。没尼石。鹼液。ボリキオ。ル。サ
 アニ格碌。莖篤。丁幾ヲ和用シ。四十方。百。噎利阿篤。損名ハ結
 列阿速篤。每服ニ滴。日ニ三服セシム。穢歇蘭度氏一婦人。四
 十一歳ニノ鼓赤炮ヲ發シ。百方効ナキ者ニ内外石墨ヲ用
 ヒテ全癒スト云フ。ニ千四百五十三方。○外用。嫩衝性ヲ
 帶フル者ハ扁桃乳。榎植核粘汁。及ヒ其他緩和劑ニ宜シ。且
 酒石鹽。肝色硫黄。硼砂。安息香。外汞等ノ洗水。ニ千四百九十
 一方。至ニ千四百

百九十
 八方 並ニ硫黄或ハ白降汞ヲ加フル軟膏ヲ稱譽ス又ア
 ケン子ウンドル。フ。エイル。セ。地並名等ノ天造硫黄泉。鴻益
 アリ

○第二千四百九十一方叔拔爾記

安息香末錢ニ 苦扁桃去皮者 六錢 薔薇水ハ 已上三味

調和作乳劑。濾過加硼砂二錢

右調勻洗滌。臨用宜振盪

主治 婦人鼓赤炮鼻上ノ細絡畜血ニ因ル者之ニ宜シ

○第二千四百九十二方 婦女乳フク。ヒル キニウ。ム

苦扁桃錢ニ 甘扁桃一 加薔薇水五ヲ 搗爛作乳劑。溶

錢ニ 甘扁桃一 加薔薇水五ヲ 搗爛作乳劑。溶

安息香花一匁

右調和洗滌

主治法利及七鼓赤炮ニ宜シ

○第二千四百九十三方

穢歌蘭度洗潔水アークス
メチカヒヘラ

羅

扁桃油糟錢一

加薔薇水橙花水各三匁半搗爛作乳劑

加後味

安息香丁幾

硼砂各一錢

右調勻每晚洗滌

主治鼓赤炮法利乾頑癬其他皮膚病殊ニ面部ノ皮病ニ

宜シ○皮表感觸敏捷ノ者ハ硼砂ヲ去ル

○第二千四百九十四方穢歌蘭度

硫黃乳二錢半

龍腦一錢

蒸餾水九匁

右調勻每晚濡患所翌朝拭去

主治鼓赤炮及七法利ノ奇方ト稱スベシ

○第二千四百九十五方昆刺地

硼砂三錢

右薔薇水六匁溶化塗擦

○第二千四百九十六方穢魯滿

膽礬八匁 蒸餾水四匁溶化加後味

安息香酸錢二

右調和為洗水

主治同上

○第二千四百九十七方福佃篤

麥糠一弓

錦葵葉錢六

井水適宜者濾取液六弓溶後

味

礪砂錢二

安息香丁幾
弓半

右調勻為洗水

主治面部ノ法利ニ宜シ

○第二千四百九十八方

酒石油附三

薔薇水六

右調勻為洗水

主治同上

雀斑ルンチオス羅ソムム

汗斑カエスリス○マキラヘハチチ

雀斑ヲ防クノ最良法ハ春日面部ヲ將テ直ニ日光ヲ受ケ

ルヲ避クルニ在リ殊ニ面ヲ洗フノ後即時太陽ニ觸ルハ

害アリ若一たび之ヲ發スルハ植酸醋或ハ枸橼汁ニ

水ヲ加ヘテ洗フベシ即消散ス又ハ不熟ノシントヤンスベ

スセレノ名實汁ヲ確効藥ト稱ス其實始メテ赤色ヲ呈スル

續西方彙 卷之三 廣肝堂

時之ヲ採リ絞リテ汁ヲ取り硫黄乳一茶匙ヲ加ヘテ稀粥ノ稠ト為シ每晚面部ニ塗リ翌朝微温湯ヲ以テ洗滌スルニ宜シ之ヲ持重スル一十四日ニシテ斑消散ハ安息香花
二千四百九十一方至 礪砂方二千四百九十五
二千四百九十三方 礪砂方二千五百三方 酒石鹽 百一方
ヲ以テ薔薇水ニ溶化スル者等皆此症ニ適當ス○汗斑モ亦上方ヲ用フヘシ殊ニ礪砂ヲ好トス

○第二千四百九十九方 越婢兒的爾

安息香丁幾 一錢至半錢 芫菁丁幾 一錢 礪砂 二錢 橙花水

手ハ

右調勻洗滌

主治雀斑ニ宜シ

○第二千五百方 弗噶刺歌

沈澱硫黄 一錢 薔薇水 三 安息香丁幾 一

右調勻為洗水

主治眼瞼ノ頑癬及ヒ酒皰鼻ニ宜シ又雀斑ニ用フベシ

○第二千五百一方

酒石鹽 三錢 精製食鹽 二錢 薔薇水 八 橙花水 二

右調勻為洗水

主治雀斑ニ宜シ

○第二千五百二方 謙私篤

龍腦精半 扁桃乳三

右調和取一食匙加洗水

主治同上

○第二千五百三方歌蘭度

硼砂錢二 加後味溶化

橙花水 薔薇水各二

右調和洗患所日三四次

主治汗斑雀斑等宜シ○又本劑水一倍ヲ加ヘテ稀

淡ニシ婦人陰部癢痒ヲ治ス

○第二千五百四方弗蘭屈

白芥子細末

甘扁桃油四

枸橼汁適

右作軟膏塗擦

主治雀斑及汗斑宜シ

搔痒フミリコ
テルホイ
ド蘭

遍體搔痒ハ其因ニ注意スルヲ第一義トス浴法角法及

打膿法ヲ稱用ス又諸種ノ軟膏二千五百五方及ヒ洗水ヲ

用フ二千五百七方至
二千五百四方内服ハ安質没尼劑鑽酸類利尿劑及

ヒ下劑宜シ○陰部搔痒ハ專痔脈血鬱及ヒ經閉ニ注意

メ治ラ下スベシ腔中蟻蟲ノ這フニ因テ搔痒ヲ致ス者モ

亦間之アリ歌蘭度ハ純精格ハ私石鹼附ノ溶液並ニ升

廣用堂

汞ヲ蕃薇水ニ溶化シ以テ陰部ヲ洗フテ數次神效アリト云フ

○第二千五百五方 過利便ト人鎮痒膏

舍電阿芙蓉液 硫黄華各半 亞鉛華一錢 甘扁桃油

一家猪脂二

右調勻作硬膏

○第二千五百六方 備篤ト人鎮痒膏

朱砂 舍電阿芙蓉液各二錢 硫黄華半 家猪脂五

右調勻作軟膏

主治右二方皮膚搔痒ニ宜シ之ニ兼テ粘土或ハ硫黄ヲ

微温湯ニ和メ全身ヲ浴スベシ

○第二千五百七方 過ト人佛ト人栗ト人屈ト人的ト人兒

苦扁桃去皮

右注井水ハ弓搗爛作乳劑洗滌

主治慢性搔痒水泡疹ヲ發スル者ニ宜シ並ニ老人ノ搔

痒及ヒ陰囊搔痒ニ用フ

○第二千五百八方 簿刺ト人狎ト人斯

肝色硫黄二錢 過炭酸剝篤亞斯一錢

右加蒸餾水一北溶解洗滌

主治搔痒ニ宜シ

○第二千五百九方預結

沃胃謨十五

沃胃謨加里二

蒸餾水五勺溶化加再

餾燒酒一勺

右調勻每一時蘸海綿小塊塗擦皮膚

主治陰部搔痒ニ宜シ陰部搔痒ニハ水四倍ヲ加ヘテ稀

淡ニシ用フ○拔碌私名ハ此方ヲ連用スル一三週ニソ

十二年来ノ頑癬性會陰搔痒ヲ治セリ

○第二千五百十方匹篤失葛弗土

硼砂一錢至二錢

右蒸餾水一匕溶化洗滌

主治陰門搔痒ノ奇方トス

○第二千五百十一方篤輿設奧

炭酸曹達一乃至四

右滾湯三十二勺溶解洗滌日三四次

○第二千五百十二方達林偃

炭酸曹達二錢 井水四

右溶和洗滌

○第三千五百十三方遠突土

硝酸汞液十五滴附 蒸餾水一

右為洗水

○第二百五十四方秘列神傑爾

鹽酸錫一八至二八附

右蒸餾水六勺溶化洗滌

主治二千五百十一方ヨリ二千五百十四方至陰部搔痒

ニ稱用ス

癩スレ。アラ。エ。ハ。チ。ア。シ。ス。ラ。ヘ。イ。ド。蘭。

方今歐邏巴洲ニ此症希ニ有ル所而ノ病性モ亦輕シ安質

沒尼劑。汞劑。硫黃劑。安答刺格加利二。千。四。百。五。十。四。方。至。二。千。五。百。十。七。方。

五百十鹽酸金鹽二。千。五。百。十。六。方。砒石二。千。五。百。十。七。方。及。二。千。五。百。十。八。方。及二。千。五。百。十。九。方。及。二。千。六。百。一。十。方。過列那

里亞根。羊蹄根。薩兒沙。巴栗刺。蜀羊泉。莖薩沙。弗刺。和等ノ煎

汁ヲ用フ外用ハ諸種ノ塗藥二。千。五。百。十。九。方。至。二。千。五。百。廿。二。方。及ニ浴法ヲ行フ

○第二百五十五方薄刺標和

安答刺格加里二 甘草膏 甘草末各適宜

右為四十九衣石松粉每服二丸乃至六丸日三次

主治癩深蝕癩頑癬疥癬慢性温疹エ。ク。ゼ。マ。羅。ウ。ル。ム。テ。ホ。イ。ス。チ。ー。ス。蘭。等。

ニ宜シ

○第二百五十六方秘列秘珍

鹽酸金鹽五 白糖一

右入玻璃白丁寧調和加達刺侃篤蘘謨漿適宜分為四十

塊原本脫
服量

主治癩結節腫性ノ癩及ヒ白癩ニ宜シ

○第二千五百十七方 亞細亞丸

白砒六十 胡椒一十八

右入鑊臼搗和休息々四半日後加水及亞刺昆亞護謨各適

宜為丸八百粒

主治結節腫性ノ癩ニ宜シ○每丸砒石十六分ハノ一ヲ

含畜ス日ニ一粒ヲ服ス

○第二千五百十八方 類方

白砒錢一 黑胡椒錢六

右大理石臼研磨為微細末加亞刺昆亞護謨九錢調和一
丸為一丸衣桂末早晚服一丸

備考亞刺昆亞護謨漿ニ代ルニ植物越幾斯ヲ以テシ四

百八十九丸ニ作ル更ニ好トス

○第二千五百十九方 譚墨利

參爾弓一 家猪脂弓四

石調和作軟膏塗擦

主治癩及ヒ疥癬ニ宜シ○之ヲ全體ニ塗擦スルヲ日ニ

二回而ノ隔日硫黃浴ヲ施ス○此軟膏ニ阿芙蓉丁幾一

錢ヲ加フレバ巴黎斯都府ノ名ノ聖碌優乙私地ノ名ノ病院ニ於

テ皮膚搔痒ニ用フル所ノ者ト同方ナリ

○第二千五百二十方微魯中巽

白蠟一 精製硫黃 家猪脂 爹爾各半

硫磺水附半

右調勻作軟膏玻璃壘固封貯晚間塗擦掌大許翌朝洗除

主治慢性皮病殊ニ癩疥癬瘡痒頭瘡等ニ宜シ蓋最初甘

汞布律謨蔑爾散附 硫砂華等ヲ與フベシ○此部ノ軟膏

ヲ洗除シテ後又彼部ニ塗ルニ宜シ

○第二千五百二十一方備篤

沃胃謨硫黃附一 家猪脂一

至半錢

ヲ

右調勻作軟膏塗擦

主治癩頑癬疹ヘルペス。ビニ 鼓赤皰頑癬結節微毒ニ宜シ

○第二千五百二十二方備篤

普碌篤沃胃謨一 家猪脂一

右丁寧調和作軟膏塗擦

主治癩疥癬等ニ宜シ

縮髮病フリカ。ボロニカ。○チリコ

前兆ノ時期ニ於テハ浴湯殊ニ硫黃浴ヲ行ヒ之ニ兼テ大

黃純精酒石ノ下劑ヲ與フ蘆薈モ亦可ナリ杜松子浸ヲ用

ヒテ尿ヲ利シ硫黃或ハ安質没尼劑ヲ以テ蒸發氣ヲ催進

遠西方書 卷之三 十一 廣

ス○本症已ニ見一ル、時ハ稱用スル所ノ藥方甚多シ即
薩兒沙巴栗刺根蜀羊泉莖羊蹄根ヲランカウルシナリコ
ホチセラギノイヂス^{〔草名〕}ヒンカペルヒンカ^{〔草名〕}ニ千五百等
是ナリ但後ノ二品最効アリ而ノ唯内服ノミナラス之ヲ
用ヒテ頭ヲ洗滌シテ佳ナリ○或醫謂フ縮髮ハ本來ノ疾
病ニアラス多クハ梳沐ヲ怠リ或ハ頭巾過温燒酒過飲ヨ
リ發スト

○第二千五百二十三方^{〔傳弗蘭屈〕}

ヒンカペルヒンカ^{〔草名未詳〕}

右熱湯三斗浸漬飽熟一夜翌日煮四分時濾過取液十二

時間服盡

主治縮髮病ニ宜シ^{〔朴爾〕}人ハ尋常リコホチウムセ

ラギノイデス草^{〔一名ミスキ〕}ク^{〔一名ハチ草〕}ヲ用フ之ヲブランカー

ウルシナ^{〔草名〕}ホ^{〔詳名〕}煎ニ投シ蒸餅母少許ヲ加ヘ暖所ニ安

メ飽釀セシメテ後之ヲ服ス又外用ニ供ス

（第二千五百二十四方〔同上〕）

尖鳩答硬膏 阿魏硬膏^{各二錢} 羌菁硬膏^{二錢}

右調和

主治縮髮病ヲ治スルニ全脊椎ニ浴フテ此硬膏ヲ貼シ

偉効ヲ得タリ瓦爾拔奴謨硬膏或ハ松脂硬膏^{〔附〕}モ亦同

効

油風カルフチエス○オイトアロベシア羅カルホールフヂ

屢髮ヲ梳リ或ハ之ヲ剪除シ油藥ニ兼テ刺戟劑ヲ用フル

ハ最適當タリ○但髮ヲ剪リ去ルキハ外飾ヲ失フノ部ニ

在ル者ハ茂結魯名ニ倣ヒ食鹽ヲ以テ水或ハ火酒ニ飽和

シ其部ヲ濕濡ス數週或ハ數月之ヲ持重スルニ宜シ

○第二千五百二十五方

阿列襪油一 薔薇油四

右調和為髮油

○第二千五百二十六方

上好阿列襪油二 便嚙没篤油附一 過兒加那根細

半方

右浸漬十二時濾過為髮油

備考此方ハ為魯列兒名ガ製スル西汨都兒香油ルス井ツコ

オレイレント甚類似ス

○第二千五百二十七方

失訥シ羅ガ私ロ草ス汁新絞者軍山牛房根汁新絞者各半方

已上二味加無鹽酪二方煮耗絞濾加後呆

牛髓脂一方附 枸椽油 橙花油各廿滴

右調勻為髮油

○第二千五百二十八方錫便斐爾

赤幾那細末 甘扁桃油錢二 牛髓脂焯解慮過者六錢

已上三呆搗爛放冷加後味

便嚙沒篤油附六滴 拔爾撒謨字露廿滴

右調勻白玻璃壘收貯為頭髮膏

○第二千五百二十九方儒魁乙的連

幾那越幾斯冷製者 枸橼汁錢一 牛髓脂錢二 芫菁丁

錢一 枸橼油錢一 便嚙沒篤油附十滴

右調勻白玻璃壘收貯為髮油

○第二千五百三十方

精製牛髓脂錢一 鉛糖錢一 拔爾撒謨字露錢三 燒酒錢一

芫菁丁幾 桂丁幾各廿滴

右調勻為髮油

○第二千五百三十一方其便篤

精製牛髓脂錢六 甘扁桃油錢二 幾那末錢一

右調勻為頭髮膏

○第二千五百三十二方孫滿

幾那越幾斯錢二 甘扁桃油錢三 肉豆蔻油錢二

右調和為頭髮膏

○第二千五百三十三方味私澀爾

芫菁丁幾錢一

枸橼汁新絞濾過者半勺

迷迭香浸勺四

右調勻洗滌數回

○第二千五百三十四方遠突土

迷迭香

青蒿各三錢

已上二呆熱湯適宜浸濾過取液

六勺溶化結麗土二錢加後味

芫菁丁幾錢一

右調和洗滌數回

○第二千五百三十五方拔的滿

府利油錢二

燒酒三勺溶解

右調勻供洗滌

主治二千五百二十七方ヨリ二千五百三十五方至刺戟

劑トノ頭髮催生ニ用フ

○第二千五百三十六方惠魯損

香水勺二

芫菁丁幾錢二

迷迭香油

刺賢各十滴堙兒油

右調勻每朝塗擦頭上五密二扭二篤間

主治頭髮催生ニ宜シ○惠魯損名ハ每朝石鹼ヲ温水ニ

融解シテ頭部ヲ洗ヒ而後乾キタル粗布若クハ刷子ヲ

以テ摩擦シテ赤色ヲ呈スルニ至リテ上ノ洗水ヲ塗擦

スト云フ

○第二千五百三十七方朴滌私

黃半堂

蒜根 三個至四個細剉者

拂郎西酒精 七

浸漬十八時取上

澄加後味

山牛房根煎 八分煎取

右調勻此方能催生頭髮

主治油風ニ用ヒテ屢佳効ヲ得タリ此液ニ海綿ヲ醃メ每晚頭髮殊ニ肌膚ヲ濕濡シ帽子ヲ被ラシメ翌朝牛泥脂ノ軟膏ヲ以テ髮ヲ摩シ後粗櫛ヲ以テ梳止但數週連用スルニ宜シ山牛房根煎ニ代ヘテ櫛皮煎ヲ用フルモ亦効アリ

○第二千五百三十八方 飛加列私篤名地合藥師過參傑

葛加阿膏 葛加阿酪二分 扁桃油一分 或再餹燒酒二錢溶解者二分 丹寧 水溶者十六分 規尼揆 水香

右丁寧調勻令發佳香

主治油風ニ宜シ朝暮頭ニ塗擦シ三週毎ニ石鹼ヲ以テ丁寧ニ洗滌スベシ二三週間之ヲ用フレハ毛髮ノ脱落ヲ減シ久シカラズノ復多ク發生スルニ至ル

○第二千五百三十九方 索斯

光菁丁寧 迷迭香精 各一錢半 酒石鹽水 附一 常水 四

右調勻洗瘡痕日二次

主治瘡痕髮ヲ生セサル者ニ宜シ二千五百三十三方及

ヲ驅逐スル劑ヲ用フルニ宜シ腸中酸液ヲ釀ス者ハ麻屈
 涅夫亞牡蠣刺蝟石石灰水炭酸曹達礶砂加石灰精極稀者木
 炭末一乃至半錢日二服等ノ制酸劑ニ宜シ腐敗物ヲ釀スニ因ル者
 ハ鑛酸類冷水或ハ氷等ヲ佳トハ已上ノ方法効ナキ者ハ
 其畜積セル風氣ヲ直ニ脫除スルヲ要ス其法三アリ一ハ
 所謂排氣法キリスマイ是ナリ謁刺私秋加護護製ノ管長
 一布篤ヨリ一布篤半至ノ者ヲ以テ極メテ深ク直腸内ニ
 送入シ之ニ唧筒ヲ接合シテ以テ腸中畜積セル風氣ヲ排
 泄スルヲ試ムルナリ若糞屎アリテ管口ヲ閉塞スル片ハ
 水ヲ射注メ之ヲ通スベシ一ハ縛帶法コムプレ是ナリ縮

帶ヲ以テ肚腹ヲ纏ヒ漸徐ニ之ヲ緊縛スルナリ最初寔ニ
 苦ヲ覺ユト雖竟ニ風氣漏泄ノ寛解ス一ハ穿腹法是ナリ
 腫脹最甚シキ部分ニ鍼或ハ細小ノ「トロイカル」ヲ刺メ以
 テ風氣ヲ排除スルナリ頑固劇症ニ至テハ宜ク此法ヲ施
 スベシ○胃瘧千四百六十一方疝千五百四方及ヒ歇乙
 私的利千六百六十四方條下ニ列載セル方法亦此症ニ用
 フベク其他左ニ揭示スル所ノ諸方大ニ稱用スル所ナリ
 ○第二千五百四十一方歇蘭度

薄荷油滴 加後味溶和

忍布滿液錢 礶砂加過泥子精

纈草丁幾各一錢半

卷三 廣勝堂

右調勻每服三十滴乃至四十滴格墨因浸和服日一二次

○第二千五百四十二方同上

薄荷丁幾 葛私篤樓謨丁幾 忽弗滿液各一錢 舍電

阿芙蓉液十五滴

右調勻每服二十滴日一二次

主治右二方二千五百四十一方風脹ニ宜シ○每朝空心

ニ格墨因泡劑格墨因一錢熱湯ニ泡出ス一盞ヲ飲服シ又午後暴爾

氏ノ複方橙皮越栗失爾ヲ兼用スルハ甚益アリ

○第二千五百四十三方叔泥控爾

垂兒尼加花油四滴 甘海鹽精半ヲ溶化

右調勻每四分時取二十滴葡萄酒半盞點服

主治風脹及ヒ鼓脹ニ宜シ

○第二千五百四十四方思屑列幾

薄荷油五滴 加白糖二錢研和以薄荷水六ヲ溶解加後

味

薄荷丁幾 礪砂加過泥子精各一錢 桂舍利別一

右調勻每半時服一食匙

主治腸ノ風脹テムハニチスニ宜シ○劇症ハ氷屑ヲ

喫セシメ肚腹ニ氷片罨法ヲ施シ或ハ冷水灌腸ヲ佳ト

又又肚腹革製縛帶ヲ施シ漸次ニ之ヲ緊縛ス特效法ト

○第二百五百四十五方〔穢歇蘭度〕

阿魏 牛膽若熱稠 亞爾鮮越幾斯 括失亞越幾斯

橙皮越幾斯各一錢 加耶普的油半刀

右調勻二匕為一丸衣過兒把末朝暮服十九乃至十五丸

主治風脹症根治方トス

○第二百五百四十六方〔思屑列幾〕

阿魏二錢 纈草濃浸 加密列濃浸各八 龍腦一 亞

麻油二 雞子黃適宜

右調勻四分供灌腸

主治風脹風氣疝鼓脹ニ宜シ思屑列幾氏ノ説ニ從フニ

本症衰弱ニシテ知覺機亢盛シ脈管ノ運營減衰セル者ハ

阿魏卓越ノ効アリ脈管ノ運營旺盛ノ熱ヲ帶ビ而メ知

覺機沈衰セル者ハ阿魏禁忌ノ症ナシ其他阿魏ハ痙攣

ヲ鎮靖スルヲ以テ本症ノ發作ヲ制スルニ効アルノミ

ナラズ尚且異常ノ諸分泌ヲ復シ及ヒ胃ノ筋膜ヲ補益

スルガ故ニ根治ノ功ヲ收ムルニ好トス

○第二百五百四十七方〔壹篤繆兒列魯〕

肉豆蔻絞油一錢半 杜松子蒸餾油一錢 府利蒸餾油半

右調勻塗擦肚腹

遠東本草 卷之十一 肥肝 廣用堂

主治風脹ニ宜シ
○第二千五百四十八方 同上

蝮蛇石錢二 薄荷水三 桂酒水兩 苗香舍利別各三錢

右調勻每一時服一食匙

主治噯氣及胃中酸敗液ニ宜シ

○第二千五百四十九方 設法魯里兒

礪砂加石灰精三滴 薄荷水半 蒸餾水五

右調勻頓服或分為二服

主治食後ノ酸臭噯氣ニ宜シ

肥胖シアチホリス 肥肝シアチホリス 肥肝シアチホリス

食餌ヲ減シ身體ヲ運動シ睡眠ヲ減少スルハ肥胖ヲ治スルニ須要ノ事件タリ故ニ專植物水物ヲ喫シ肉食ヲ減少シ飲料ハ唯水ヲ用フルニ宜シ飲水法トルキドワハ鴻益アリ倚乙的列私名ハ過的來埜名泉ヲ用ヒテ治シ後調ハ倚私魯名泉ニ浴ノ功ヲ収ムト云フ○弗暗明名癒瘡木及ヒ遠志ヲ稱用ス叔末兒名ハ癒瘡木脂ニ遠志孕驗酒石或ハ旃那及ヒ砂糖等分ヲ配用ス越乙名ハ拔爾碌答附ヲ用ヒ五千五百弗噶刺名ハ沃胃護名ヲ與フ五千五百蒲碌秩名ハ刺篤亞斯名水每服一錢稀麥酒三次ヲ以テ累月連進此症ヲ治ス盆名ノ過兒別爾名ハ刺篤亞斯名浴每浴刺篤亞斯名

至三北乃ヲ施ス一十二回乃至二十回ニシテ治驗ヲ得タリ○
醋ヲ多飲スルモ亦能ク肥胖ヲ防止スト雖大ニ胃機ヲ傷
リ之ヲ復スル一難シ石鹼ヲ久服スルモ亦佳効ヲ奏ス

○第二千五百五十方〔伯林兒秘瀝爾強都越乙骨〕

拔爾碌答〔附〕十錢

注熱湯適宜飽熟八分時濾過取液

ハ弓更取餘滓加水一匕煮濃取液六弓合前液加後

味

過兒托舍利別

右調勻日服

主治肥胖ニ用ヒテ良驗アリ小兒ハ拔爾碌答四匕ヲ用

ニ盡ノ足レリ

○第二千五百五十一方〔弗嚙轉歌〕

沃胃謨ハニ 燒酒二錢溶解

右每服二十滴砂糖水點服日四次

〔附考〕此方小心シテ用フベシ嚙轉歌氏ハ施治ノ間時々

少量放血シ及ヒ下劑ヲ用フ

水腫ヒトトロプス羅ワ

水腫ノ治法其遠因ヲ防クヲ第一義トシ大率内臟殊ニ肝

臟ノ閉塞多シトス故ニ先之ヲ攻ムルヲ要トシ諸解釋劑

植物汁及ヒ甘黍等能ク其効ヲ奏スルナリ然レ此第一義

ノ功ヲ收ムルヤ人カハ此ニ至ラサル者甚多シ意○第二
 義ハ畜水ヲ排泄スルニアリ其法四道アリ一ハ腎ノ運機
 ヲ進メ一ハ瀉ヲ促シ一ハ皮表運營ヲ振起シ一ハ穿腹術
 テラセン 發疱膏或ハ乱刺法是ナリ○利尿ヲ催進スルハ
 通症施ス所ニ尋常ノ治法トス而シテ病者ヲ虛憊セシム
 ルモ亦甚シ若利尿藥相當ノ効アラザルハ二三日之ヲ
 廢シ唯解釋劑ヲ與フヘシ焮衝性水腫ハ清涼利尿劑ニ宜
 シ即孕鹼酒石 二千五百方 孕礬酒石 二千五百方 純精
 酒石 二千五百方 至 枸橼汁 二千五百方 酒石鹽 二千五百
 方 至 醋酸加里 二千五百方 民垣列利精 二千五百
 方 至 六十二方

六十方 消石 二千五百方 硝酸安沒尼亞 二千五百方 等是
 ナリ清涼利尿藥ト衝動利尿藥トノ中間ニ位スル者ハ實
 艾答利斯 二千五百方 至 是ナリ或ハ之ヲ清涼利尿
 藥ト配シ或ハ苛烈利尿藥ト伍メ施用スルヲ甚多シ衝動
 利尿劑ハ唯慢性水腫ニ投スル者ニノ海葱 二千五百方 至
 七方 格爾失屈謨 二千五百方 杜松子 二千五百方 至
 九方 拔爾碌答 二千五百方 失沒肝刺 二千五百方 至
 利亞爾 二千五百方 謁屈乙屑篤 二千五百方 煙草 二千五百方 至
 九方 的列並油 二千五百方 地膽沃胃謨 二千五百方 鹽酸金鹽 二千五百方 至
 婦 二千五百方 地膽沃胃謨 二千五百方 鹽酸金鹽 二千五百方 至

方二千六百等之二屬ス○刺發斯及ヒ阿訥尼私二千六百六
百廿三方等之ニ屬ス○刺發斯及ヒ阿訥尼私二千六百六
九方至二千五百七十一方等ハ利尿ノ良佐藥タリ症ニ
應ノ他藥ト配用スベシ瀉藥ニニアリ曰ク清涼下劑曰ク
衝動下劑峻下劑皆利尿藥ニ較スレバ病體ヲ侵ス其シ殊
峻下劑故ニ水腫ノ初期病者強實ナル時最之ヲ要トシ清涼
下劑ニ屬スル者ハ中和鹽類及ヒ甘汞之ナリ清涼ト衝動
トノ中間ニ在ル者ハ大黃加印加根ニ千六百廿五方至杜
衡根二千六百廿九方是ナリ衝動下劑峻下劑ノ中ニ就テ首
タル者ハ私匹那非ニ千六百廿五方至藤黃二千六百廿七方格
碌董篤二千六百四十一方蘓甘沒扭ニ千六百廿七方至巴豆油二千六百

四十蒲里阿厄ニ千六百四十五方調刺的律附ニ千六百四十五
方墨列僕里其他利尿劑ト峻下劑トヲ配伍セル諸方即約
寧名人二千六百拔結耳名人二千六百歇名人二千六百九方
等是ナリ○發汗法ハ安質沒尼劑龍腦蛇歇鬼散及ヒ琥珀
乳香杜松子等ノ香竈薰法熱沙浴蒸氣浴單方或ハ火或ハ
ベルケ名樹若クハエルセ名樹葉ヲ以テ身體ヲ被覆スル
等皆用フベシ發汗法ノ効アルト罕ナリト雖感冒及ヒ猩
紅熱後ノ水腫ハ佳驗尠カラズ但近年拔翎篤名大量砂糖
ヲ連服セシメテ大汗ヲ取り全治スルノ法ヲ世ニ公ニス
二十人ノ治驗ヲ得タリ之ヲ要スルニ居地ニ拘ラス病性

ニ由ラズ又病因ヲ論ズルナシ而ノ振翹篤氏ハ粗製砂糖ナドソヲ稱譽シ其缺ルニ會フニアラザレバ精製ノ者ヲ用フルナシ若單味之ヲ服スルニ堪サル者ハ亞刺毘亞護謨ヲ和ノ散ト凶然氏此治法ノ如キハ一向ニ深信スルニアラザレバ用ヒ難シトス○内服藥ハ諸塗擦法二千六百五十四方至二千ノカニ由テ能ク其効ヲ達スルナリ利尿劑ト下劑ト伍用シテ甚的當スル症多シ但常住一局ノ運機ヲ催進スルヨリ彼此更換ノ一回ハ腎ヲ攻メ一回ハ腸ヲ攻メ又一回ハ皮表ヲ攻ムルヲ更ニ妙トス○乱刺法及ヒ羌膏膏ヲ以テ畜水ヲ排泄スルハ創口速ニ寒壞疽ニ變

シテ竟ニ死ヲ促ス一屢之アルガ故ニ之ヲ施スハ甚危險ナリトス「穿腹術」ハ獨腹水ニ的當ス然レ病者生力大ニ衰弱シ或ハ劇熱アリ或ハ腹痛稽留シ或ハ腹臍ニ較著ノ敗敗アルヲ鑑察スルキハ決メ之ヲ施ス一勿レ

