

明武
號 237
卷 29



遠西方彙卷之二十九



獨乙

加幾安頓



和蘭

傑婆都

譯

侍醫法印伊東瑤川院貞文仲 重譯

南洋伊東亨健夫 參校

○第三千三十六方

鯨弗利爾ワフリースト及劉私篤リウシト並人塗擦法ニ

クキリーキール。ヲルゲンス。ロ

第一預備法

先藥刺巴二乃純精酒石一乃ノ緩下劑或

ハ非稠年ハチシノ私人シノノ瀉利水ヲ與シ翌日ヨリ毎日浴湯セシム但

遠方新編 卷二十九

湯温列氏二十九度ニ過キズ第十四日再下劑ヲ與ヒ若
 塗擦法ヲ急ニセント要スル片ハ預備ノ日數ヲ縮メテ
 初日瀉劑及ヒ浴湯ヲ施シ第二日ハ唯浴湯シ第三日再
 瀉劑及ヒ浴湯ヲ施シ第四日單ニ浴湯シ尋テ直ニ塗擦
 法ヲ施スベシ食餌ハ肉羹汁ヲ以テ米。粿麥ヲ煮午時之
 ヲ喫スルト半瓜爾篤容量日ニ三次ヲ度トメ之ニ過ク
 ルトナカラシム飲劑ハ唯薩兒沙巴栗刺煎或ハ牛房根
 過兒把甘草ノ煎液粿弗利爾氏ニ宜シ○第二塗擦法劉
 私篤氏ハ粿弗利爾氏ヨリ一等食規ヲ嚴ニス塗擦法ヲ
 終ル至每饌肉羹汁三小盞日ニ三次トシ上ノ煎藥三匕

ヲ飲マシム獨虛弱ノ病者ノミ古葡萄酒一二食匙或ハ
 哥喜少許用フルヲ許シ幾利失私ノ後ハ緩煮鷄卵一二
 個ヲ與ヘ其他膩味ヲ嚴禁ス病室ノ温暖列氏十八度乃
 至二十度トシ病者居恒ニ外出スルトナカラシム牖戶
 ヲ閉テ新氣ヲ通セズ襪衣。病床。其他衣服ヲ換ルト勿ラ
 シム之ヲ塗擦スルニ劉私篤名ハ百。暴爾名ハ灰白水銀膏
 ヲ用ヒ粿弗利爾名ハ家猪脂水銀等分ノ軟膏ヲ用フ軟膏
 量毎用二錢トス然レ已ニ水銀ヲ久服セル病者ハ初メ
 塗ルト一錢第三日一錢半第六日ニ至テ二錢トス順正
 ノ塗擦法ハ左ノ次序ニ從ヒ第一日早朝之ヲ塗ルト兩

足ノ踝骨ヨリ膝ニ至リ第三日膝ヨリ腰ニ至ル第六日
 早朝両手ノ腕骨ヨリ肩ニ至リ第八日早朝脊ニ塗り第
 十日早朝又脛ニ塗り第十二日股ニ塗り第十四日膊ニ
 塗り第十五日^キ幾利^シ失私汗ヲ發ス宜ク温飲ヲ以テ之ヲ
 催進スベシ第十六日又脊ニ塗ル但晚間之ヲ施スヲ好
 トス何者前日ノ發汗連綿トシ十二時餘ヲ延ク者モ亦
 屢之アルガ故ニ早旦施スルハ恐ラクハ之ガ為ニ其汗
 ヲ妨グル^テアラシ第十七日朝瀉劑ヲ與フ第十八日晚
 間脛ニ塗り第十九日下劑ヲ投シ第二十日晡時股ニ塗
 擦ニ第二十一日早旦下劑ヲ用ヒ第二十二日膊ニ塗擦

ニ第二十三日朝下劑ヲ用ヒ第二十四日晚脊ニ塗擦シ
 第二十五日朝下劑ヲ用ヒ第二十六日微温湯ニ浴シ石
 鹼及ヒ燒酒ヲ以テ身體ヲ洗ヒ襯衣及ヒ病室ヲ換フ○
 蓋吐涎早ク發スルカ或ハ甚シキニ過ルカ若クハ他ノ
 危険証ヲ傍發スル等彼此ノ事故アリテ上欸ノ次序ヲ
 改メ或ハ暫塗擦ヲ停ムベキ者屢之アリ今其數件ヲ舉
 ケテ此ニ載スルニ違アラズ本法ノ如ク塗擦十二回ヲ
 要スル者ハ宿根ノ症ニ間之アルノミ大抵九回或ハ唯
 五六回ニメ全體ノ癩毒ヲ治スルニ足レリ○第三調理
 法病者ニ命ノ數週間冒寒ヲ戒シ唯暖日ノミ病室ヲ出

癩毒
 廣用

ル一ヲ許シ食餌ヲ加増シ補益スルハ漸ク以テスベシ
 本復ノ時期ハ屢觀衣ヲ換ヘ微温浴湯ヲ施シ下劑ヲ服
 スルヲ肝要トス吐涎持續スルノ間ハ殊ニ然ク口内承
 毒瘡ヲ發スル者ハ玫瑰蜜ニ沒藥丁幾ヲ和シ或ハ律私
 篤氏ニ倣ヒ龍腦一錢ヲ以テ扁桃油一匁ニ溶シ點スベ
 シ其他一切醫藥ヲ要セズ是元氣本腹スル一非常ニ速
 ナレバナリ

此法屢全身ノ癩毒ニ試驗アリ然レ慎重ノ施サレバ
 危險症ヲ遺シ易シ肺勞水腫卒中失苟兒陪苦等ノ素質
 アル者ハ必此法ヲ禁ズ

○第三千三十七方(孤列秘珍)

鹽酸金一匁 石松粉十五匁

右調勻分十六裹每日取一裹塗舌上及齒齦

主治後証癩毒既ニ諸種ノ承劑ヲ用ヒシ者之ニ宜シ

○第三千三十八方(越魯涅屈)

奧私ト 鷓爾ル 名鹽酸金鹽一匁至廿四匁 乳糖十六匁

右調勻為散分八裹每用取一裹塗舌或唇日二次

主治癩毒ニ宜シ

○第三千三十九方(徧救涅兒)

鹽酸金鹽四匁 蒸餾水適宜溶加後杲

廣肝堂

雙鸞菊越幾斯^半 蜀羊泉莖越幾斯^{一錢} 過兒托末^{適宜}

右為八十九衣石松粉每服三九日三服

主治宿根癩毒骨痛アル者ニ宜シ之ニ兼テ薩兒沙巴栗刺及ヒ蜀羊泉莖ノ煎汁ヲ與フ○偃^{グロ}軟^ロ涅兒^ルノ試驗ニ據ルニ此症ヲ根治スル鹽酸金鹽十^ハニメ足レリト云フ鹽酸金鹽ハ深ク病的ノ補給機ニ達シ膏ニ變質セル器ヲ復良スルノミナラス豕肉狀骨腫^オトメ^ンテアノ如キ病的ノ質物モ亦能ク解散スルナリ

○第三千四十方^{抄印的}

私的列幾尼涅^{精製} 鹽酸金鹽^{各ニ} 玫瑰昆設兒弗^{半錢}

過兒托末^{十四}

右調勻為二十四丸過兒托末玻璃壺收貯早晚服一粒以漸小心加增

主治經久癩毒劇甚骨痛ヲ兼ナル者骨腫^{エキソ}腐骨疽等ニ宜シ

○第三千四十一方^{弗栗結}

甲方

鹽酸布刺^ハ扶那^ハ鹽^ニ附^ハ 蒸餾水^ハ

右調勻朝暮服一食匙

乙方

遠方... 癩毒... 廣府...

鹽酸布刺秩那鹽ハ 蒸餾水六

右調勻每服一食匙日四服

主治宿根癩毒經久癩白帶下ニ宜シ拂郎西ノ醫殊ニ鳩

兒列利爾ル及ヒ忽歇爾ル等輓近上症ニ布刺秩那ヲ稱

用セシヲ以テ威滌爾ル偏ル名地ノ病院ニ於テ復之ヲ試嘗ス

ト雖未其効驗アルヲ見ズ但左法ヲ以テ製スル所ノ鹽

酸布刺秩那鹽ヲ用フ即純粹布刺秩那半ヲ鹽酸六ヲ

及ヒ硝酸三分適宜ヲ加ヘテ十分溶解シ濾過ノ精製食

鹽七錢ヲ加ヘ蒸氣ニ上セテ蒸散セシメ乾涸結晶スル

ニ至ル此ノ如ク之ヲ製メ得ル所ノ量十四錢トス故ニ

其半ハ純粹ノ含水布刺秩那鹽ヲ含ムナリ○弗栗結名

ハ最初甲方ヲ與ヘ四日毎ニ服量一食匙ヲ加フ之ヲ用

ヒテ其害アラザレハ二三週ノ後始メテ乙方ニ轉シ亦

四日毎ニ服量一匙ヲ加増ス或ハ日服十匙ヨリ十一匙

ニ至ルナリ○弗栗結氏鹽酸布刺秩那ノ効ヲ試ムル

ニ第一小量ノ鹽酸布刺秩那鹽ハ分ハ一ハ顯著ノ異証

ヲ挑起スルトナクメ唯微々消食機ノ障礙便秘胃部壓

迫等ヲ覺ユルノミ而メ其証亦速ニ消散ス但更ニ多量

ヲ與フレバ大害ヲ生スルト確明ナリ第二小量ハ一器

ニ持効アルト明ナラズ第三之ヲ用フレハ補給機ヲ轉

變スルナルベシ然レ未之ヲ確徵セズ(第四)効力持ニ一
 系例スルニ達スルヲ見ズ(第五)體中毒アリテ發スル所
 粘液膜ニ贅肉或ハ器質變性等ニ著シク効ヲ顯ハス(一)ナシ第
 六故ニ經久麻白帶下贅肉贅骨(コンダ)癩毒器敗等ヲ治
 スルノ効確實ナラズ宜シク病者ノ性ニ準メ先他ノ根
 治法ヲ施シ而シテ鹽酸布刺秩那鹽ハ最後ニ用フベキナリ

○第三千四十二方(同上)

醋酸私的列幾尼捏半一

再餾燒酒半ヲ溶解

右調勻臨卧服三滴四滴二十滴乃至三十滴

主治劇甚ノ夜間骨痛ニ宜シ

○第三千四十三方

格屈林名密過私末秩加水

碯銅礬水一錢

蒸餾水十錢

右調勻初午饌後服一食匙後晡時服一食匙

主治經久惡液病殊ニ宿根癩毒潰瘍ヲ發シ永劑誤用ノ
 為ニ變性セル者之ニ宜シ穢歇蘭度ハ之ヲ用ヒテ腺病
 ヲ治ヒ歇乙涅見名ハ發疹病ニ宜シトス

○第三千四十四方

鹽酸亜鉛二蒸餾水四ヲ溶解

右調勻每服一食匙日四次

主治後証癩毒ニ宜シ○秩結名ハ鹽酸亜鉛四一乃至六

瓜ヲ以テ蒸餾水四勺ニ溶化シ毎日四食匙乃至六食匙
ヲ與フ然レ此服量過多ナリ

○第三千四十五方 別私那爾突ド人名癩毒丁幾

精製酒石鹽 桂水各半 精製阿芙蓉一 酒製桂水

二

以上各別溶解混和上沙火時々振蕩飽熟三週之後濾過
去滓加後味

上好亞刺毘亞趨謨一 礪砂華半

右加桂水三勺溶化内器密封靜定二三日後濾過貯

主治癩毒ニ宜シ○錦葵葉浸一盞ニ此丁幾去爾二十四

滴至ヲ點シ冷服セシハル一日ニ三次ト又序証及ヒ

後証ノ癩毒下疳便毒息肉等ノ洗水トス或ハ痲病射注水

ト此劑容易ニ癩毒ヲ根治スル能アリ故ニ諸承劑ヲ

要セズ別私那爾突ド人氏累年經驗スト云ク然レ他醫往々

之ヲ試用スルニ或ハ寸効ヲ見ズ或ハ屢害ヲ致シ唯輕

易ノ症些子ノ下疳鼠蹊腺ノ輕腫殊ニ些子ノ骨腫息肉

等ヲ治スルニ用フベシト云フ○既往拍乙利列名揮發

鹿角鹽ヲ稱用シ翳屑名艾茂爾名ハ酒石鹽ニ礪砂揮發華

水及ヒ阿芙蓉ヲ加ヘ用フルヲ佳トス

○第三千四十六方

硝酸錢 砂糖舍利別子 燕麥煎一匕煎燕麥半取液八子

右調勻每半時或一時服一食匙

主治後証癩毒殊ニ其症永毒或ハ失苟兒陪苦ヲ合併ス

ル者ニ好シ二千九百九十一方及二千九百九十二方ヲ參照スヘシ用量漸加ヘテ

日服二錢或ハ三錢ニ至ル○燐酸ハ殊ニ癩毒腐骨疽ニ

宜シ八百廿五方八百六十八方及三千八百九十九方ヲ照查スヘシ

○第三千四十七方婦刺骨

沃胃謨加里錢ニ 蒸餾水八子溶化

右每服一食匙日四次臨服宜振盪

主治經久變性癩毒症腺病及ヒ永毒ヲ合併スル者ニ上

方ヲ用ヒ浴法及ヒ沙兒薩巴栗刺煎ヲ兼用ス獨婦兒刺
屑氏ノミナラス英吉利拂郎西及ヒ獨乙ノ醫モ亦之ヲ
殊稱ス

○第三千四十八方穢歌蘭度

沃胃謨加里錢 沃胃謨一 蒸餾水五子溶化加嬰粟

舍利別一子

右調勻每服一食匙日三服

主治經久癩毒ニ宜シ

○第三千四十九方弗栗結

沃胃謨加里錢至 沙兒薩巴栗刺煎三子煎根一溶

沃胃謨加里錢至 沙兒薩巴栗刺煎三子煎根一溶

解加砂糖舍利別半勺
右調勻每服二食匙日四服

主治後証癩毒殊ニ永劑誤用後ノ者之ニ宜シ又腺病及
口律彪私病等ニ宜シ

○第三十五方 實の里屈

沃胃謨加里三 漿粉半

右調勻為散分九包每服一包日三服

主治後証癩毒ニ宜シ○每四日沃胃謨加里一二勺ヲ加
増シ終ニ毎日三十二勺ヨリ四十勺ヲ服スルニ至ル病
症退キテ后モ尚十四日間之ヲ持重ス但漸々減殺シテ

前量ニ回復スベシ

○没乙失束欬屈斯名人用沃胃謨劑治癩毒法

始メテ陰部ニ潰瘍ヲ生スル者直下ニ其性ヲ確知スル
ハ良ニト雖亦能ハサルカ故ニ總テ不潔ノ交媾後陰部
ニ小疱ヲ發シ若クハ剝脫スル片ハ二三日間癩毒ノ治
ヲ試ムルヲ佳トス故ニ暖度齊整ノ室中ニ居リ諸種ノ
飲液清水砂糖水過兒托葉歇爾拔私屈謨花接骨木花ノ
淡浸劑或ハ蘆根煎等ヲ多服セシメテ以テ蒸發氣ヲ催
進スルヲ要ス大便ヲ促メ適度ナラシムルニ宜シ但溏
瀉セシムル勿レ恐ラクハ皮表ノ蒸發之ガ為ニ妨碍セ

ラレント外治ハ温水或ハ過兒拖根錦葵花煎汁等ヲ以テ患所ヲ洗浴スベシ但一時半毎ニ洗浴シ每浴四分時間且屢浴液ヲ換ヘテ以テ溫度ヲ平等ニシ且其分泌セル病毒ヲ再吸收スルヲ防クベシ浴セサルノ間ハ上ノ藥液ヲ棉巾ニ蘸シ瘡所ニ置カシ凶包莖ノ者ハ藥液ヲ射注スベシ但包被ヲ截開スルハ之ニ優レリ○攝養法病者ニ許シテ平生ノ食餌ヲ與ヘ唯少シク食量ヲ減セシ凶但病室ヲ離ル、トナカラシ凶此ノ如ク此治法ヲ持重スルト數日ノ后其瘡癩毒性ノ者ニアラサレバ瘡面初平滑ナル者今ハ則凸凹トナリ白色ノ底面ニ陷

ル所アリ形状恰數點ノ小島ニ似タリ是瘡底ノ表肉既ニ腐穢シ裏面ニ膿ヲ醸スニ由テ表肉離ル、ガ故ナリ此腐肉剥離スレハ真ノ瘡底ヲ現シ良膿底面ヨリ滲出シテ速ニ瘡ニ是ヲ以テ本症癩毒ニアラザルヲ證スベシ本症真ニ癩毒ナラハ上ノ証狀ニ及メ瘡底ノ表肉上ノ如ク剥離スルトナク瘡瘡未熟セサル片ハ稀淡不潔ノ水液夥ク滲出ス瘡面小ナレハ其滲出液ニ至テハ則居多ナリ此ノ如ク水液滲出スルト連綿持久シ其部終ニ十分潰爛シ盡クルニアラサレハ止マザルナリ此証狀ニ由テ其瘡瘡タルト明證セバ尚上ノ治ニ從事シ

テ之ヲ持重スヘシ但皮表ノ蒸発氣ヲ促サンガ為ニ排
 毒飲ヲ温服セシムベシ即薩兒沙巴栗刺。癩瘡木。山牛房
 根阿訥尼私。過列那。里亞根。謁久乙。屑篤。附煎。及。木類煎
 等ニ宜シ病者原健康ニメ惡液質ニアラサレバ患所ニ
 新生セル病的ノ分泌器此ニ於テ腐壞シ近部ニ純良ノ
 焮衝ヲ發シ其運管ニ由テ剝離シ去ルナリ爾後自然良
 能ニ由テ暫時ニ癒エ後患ヲ遺スナリ此症ノ經過三
 週ヨリ四週ニ至ルベシ○其人若惡液質或ハ腐藥等ヲ
 施スニ由テ自然ノ經過ヲ謬ルキハ立地ニ其部ノ運管
 ヲ妨障抑壓シテ病毒容易ニ他部ニ轉移シ全身癩毒症

ニ罹ルニ至ル其轉移ヲ防過スルハ上ノ治法ニ兼テ速
 ニ烈シク補給力ヲ挑起スルノ藥劑ヲ投スルヲ切要ト
 ス其功效ヲ収ムル者唯一品トス即沃胃謨加里是ナリ
 之ヲ多量内服セシメ或ハ浴法發法ニ用フベシ
 若故アリテ疔瘡自然ノ經過抑制セラレ病的運機鼠蹊
 腺ニ轉移スルキハ病毒或ハ其力ヲ逞シウメ腺ノ一部
 及ヒ近圍腐壞シテ便毒ヲ發スルナリ宜ク速ニ破開ス
 ベシ便毒未發セサルキハ其腫起セル所ノ腺ニ水發法
 或ハ温浴法及ヒ蒸漏法ヲ施メ以テ病的運管ヲ故所ニ
 喚歸スルヲ試ムヘシ之ヲ試ミテ功ナク既ニ腺中ニ水

液ヲ釀ス片ハ速ニ寒菴法ヲ廢シ温暖琶布ヲ貼ノ便毒
ノ釀熟ヲ促スベシ若微々波動ヲ覺エ周圍ニ赤色ヲ見
ハス片ハ破開スルニ宜シ但水液腫起ノ中央ニ聚マル
者ハ刀ヲ用ヒ膿道數行ニ岐分スル者ハ腐藥ヲ用ヒテ
以テ悉ク膿道ノ間隔ヲ穿透スヘシ便毒ハ自然ノ治ヲ
俟ツベカラザルカ故ニ病毒ヲ吸収シテ全軀ノ症ニ轉
スルヲ防ギ而シ沃胃謨治法ニ從事スルヲ須要トス○
便毒破開ノ后ハ分泌液ノ排泄ヲ進ムルヲ以テ第一義
トス屢洗滌シ緩和琶布ヲ施シ半身浴湯ヲ行フニ宜シ
沃胃謨治法ヲ處スルニ或ハ預備法ヲ要スル者間之ア

リ其法病者便秘スル片ハ之ヲ瀉シ及ヒ皮膚ヲ清淨ス
ルニ宜シ瀉藥ハ旃那葉浸或ハ旃那瀉下飲附最適當ス
皮膚ヲ洗滌スルハ石鹼湯浴ヲ好トス此法沃胃謨ヲ與
フル前一日ニ方リテ施スベシ○沃胃謨ノ用法分テ五
トス一ハ順正ニ沃胃謨加里ヲ内用ス二ハ沃胃謨鹽浴
三ハ局處ノ症ニ沃胃謨溶液ヲ外用ス但此症自ラ各箇
ノ治法ヲ要ス四ハ攝生ヲ節メ醫則ニ應スベシ五ハ適
當ノ食餌ヲ用フ

第一沃胃謨加里順正内服法沃胃謨加里ノ服量ハ劇ク
補給機ヲ催進シ而シ水脈系ノ運管吸ヲ促サバルヲ度

トス小量ハ吸収カラ進メ大量ハ補給機ヲ充進ス癩毒
 ラ治スルハ單ニ補給機ヲ進ムルヲ要フルカ故ニ十分
 大量ニ與ルヲ好トス然レ左ノ二件ヲ計リテ其量ヲ斟
 酌スベシ一ハ胃能ク其量ニ堪フルヲ要ス病者之ヲ服
 メ毫モ不快ヲ覺エサルヲ要ス○最初ヨリ直キニ過度
 ノ大量ヲ與フレハ咽喉及ヒ胃中灼熱或ハ嘔氣ヲ發ス
 病人虛弱神經質ノ者或ハ胃中酸敗液多キ者ハ殊ニ然
 リトス但真ニ嘔吐ヲ發スルニ至ル者ハ甚罕ナリ舍利
 別或ハ護膜漿類ヲ以テ沃胃謨加里ヲ送下レ若ハ香
 竈水液越發斯劑収斂物等ノ配用ヲ禁スレハ大量沃胃

謨加里ヲ與フト雖亦病者速ニ慣レテ能ク之ヲ服スル
 ニ堪ル沃胃謨加里ニ堪ヘサルハ大抵其製ノ純精ナラ
 サルニ由ル者多シトス○每常最初衆人ニ處ス可キ限
 量一定シ難シト雖没乙失速故屈斯氏之ヲ歴驗スルニ
 十五歳已上ノ人日服一カニシテ可ナリ人皆此量ニ堪
 ヘ二三日連服スレバ既ニ著シク輕快ヲ覺エル者往々
 之アリ病者一カヲ服スルニ堪フルヲ見バ十カヲ加フ
 ベシ此量ヲ與ヘ兼テ沃胃謨ヲ合メル浴湯ヲ行フハ
 數日ヲ過キズノ既ニ本病寛解ス若數日ヲ經テ著シク
 輕快ヲ覺エサルハ日服二カ五十カヨリ一錢ニ至ル

癩毒方書 卷廿九 癩毒 十三 廣用

已ニ其極度ニ至レハ容易ニ其度ヲ過ルヲ要セズ此量
ヲ連進スレハ其症漸次ニ本復ス通例没乙矢速故屈斯
氏カ最初處スル所ノ方左ノ如シ

○第三千五十一方

(甲方)

沃胃謨加里^一 蒸餾水^三

右分為三服午饑前服盡

○每服一弓ノ藥液患者ニ於テ過多ナルヲ察セハ減メ
半弓トスルモ亦可ナリ病人ノ神經質ニメ屢胃瘳ヲ患ル
者ハ没乙矢速故屈斯氏蒸餾水ニ代ヘテ黑櫻實水ヲ用

エテ佳効ヲ得タリ黑櫻實水ハ沃胃謨加里ヲ分離スル
トナシ○上方ヲ服スルニ磁蓋ヲ用フベシ若鑛匙ヲ用
フルト數回ニ及ベハ病者終ニ嫌厭シ匙モ亦真珠色ニ
變ス此方必饑前ニ用フル所以ノ者ハ胃中空虛ニシテ
藥カ十分ニ達スルニ由ル藥液食物ト直ニ相觸ルハ片
ハ消化ノ際夥多ニ分泌スル所ノ胃液ニ由テ藥液ノ成
分分解セラレ而シテ第一道ヨリ排泄スルナリ初第一服
ハ早旦時宜ヲ量リテ飲服シ未服ハ午饑前凡一時ヲ隔
テ用フベシ第一服後半時餘ヲ過キテ淡薄ノ朝餐ヲ喫
スルニ宜シ○往昔没乙矢速故屈斯氏更ニ大量ヲ用ヒ

廣勝堂

或ハ純精沃胃謨少許ヲ和用セシテ屢アリト雖之ヲ歷
驗スルニ多量ノ劑ハ消化シ難キヲ證ス

第二沃胃謨浴法 大人ハ最初一湯中ニ純精沃胃謨一錢
ヲ率トシ先沃胃謨ヲ以テ井水適宜ニ溶解ス但沃胃謨
加里適宜ヲ加ヘサレハ融解セサルナリ沃胃謨一錢十
分ニ溶化スルニ沃胃謨加里一錢半ヲ用テ浴湯ニ鹽ヲ
混和ス而シテ海鹽ト山鹽ト其量同シカラシ海鹽ハ極メ
テ苛烈ナルカ故ニ一湯ニ二匕ヲ加ヘテ是レリ山鹽ハ
少キモ三匕ヨリ下ル可カラス海鹽ヲ搗シ一日前多
量ノ温水ヲ加ヘテ振盪シ以テ夜間十分ニ溶解セシメ

是ニ於テ微温湯ヲ浴桶ニ盛リ之ニ鹽水ヲ加ヘテ能ク
混和セシム浴湯温度ハ病者ノ意ニ随フベシト雖若其
度ヲ過ギテ上衝若クハ發汗ノ為ニ病者ヲ惱マス一ナ
キヲ要ス病者浴湯中ニ坐スルノ後浴桶上ニ細板木板
ヲ横架シ又廣キ綿布ヲ重子テ桶ノ前ニ懸ケ病者ノ頭
ヨリ桶縁ニ垂ル木板ハ其綿布ノ湯中ニ垂下スルヲ支
ヘシカ為ナリ又別ニ綿布ヲ取りテ後ヨリ病者ノ項ニ
懸ケ結繃針ヲ以テ之ヲ頭ノ左右及ヒ前ニ於テ上ノ布
ト缝合シ唯病者ノ頭ヲ露出シテ浴湯ノ蒸氣昇騰スル
トナカラシム上ノ沃胃謨溶液ハ玻璃壺ニ入レ密閉シ

廣野堂 卷廿九 癩毒 七

綿布ノ下ニ於テ病者ノ手ニ授ケ持セシメ藥液ヲ浴湯
 中ニ傾フケ出シテ適宜ニ湯ト混和セシム病者ノ浴湯
 中ニ在ル一凡半時トス浴湯冷ユレハ温湯ヲ加ヘテ可
 ナリ然レ其浴スルノ時限ハ延テ半時四分時ニ至ルモ
 可ナリ○其綿布ヲ以テ之ヲ遮障スルハ病者ヲシテ始
 終沃胃謨氣ヲ嗅引セシメサラシガ為ナリ感覺靈敏ノ人
 殊ニ勞瘵質ノ人之ヲ嗅ケハ害アルベシ且綿布ヲ覆ヘ
 バ沃胃謨氣再復湯中ニ吸収セラレテ浴湯ノ効力モ亦
 倍加スルナリ○此浴湯法ハ必病者ノ居室中ニ於テ施
 スヘカラズ○浴湯ヲ終レハ速ニ其居室若クハ寢室ニ

往テ蓐ニ就キ發汗第一湯ノ後ハ未發汗セサル者間一
 過メ後起立シ蓐ヲ出テ日ヲ終フベシ雖大抵汗出ルヲ常トス通例第一湯ノ時
 既ニ微々搔痒及ヒ皮膚灼クカ如キヲ覺工暫時ニ止
 ムト雖浴湯後半時ニシテ其証復大ニ發ハ間其証劇甚ニ
 ノ恐ラクハ瞬間モ湯中ニ坐スル一能ハサルカ如キ者
 アリト雖此苦楚ハ大抵暫時ニシテ去リ病者尚半時或ハ
 更ニ久シク湯中ニ在テ而シテ惡ムベキヲ覺ユル一ナシ
 上ニ書載セル藥量ヲ以テ浴湯ヲ施ス一三日或ハ皮表
 稍灼クカ如キヲ覺ユルノ間之ヲ持重ニ病者若クハ覺
 エサルニ至レバ沃胃謨ヲ加増メ一錢半ニ至ル但沃胃

謨加里ノ量ハ沃胃謨溶解スルヲ度トス鹽ハ唯病者ノ
 皮膚枯燥スル一甚シキ片ニ増スベシ第七日第八日ニ
 至リテ沃胃謨ヲ増メニ錢トシ沃胃謨加里ヲ三錢トス
 第十日或ハ第十一日ニ至テ通例熱狀ヲ發シ頭重ク身
 心不安煩渴シ。皮表感覺靈敏且眠ヲ得難シ日中或夜間
 皮膚搔痒灼熱刺衝ヲ増シ既ニ猩紅色ノ疹ヲ發シ此疹
 屢出沒シ第四日ニ至テ十分發生スルヲ通例トス大抵
 晨朝及ヒ浴湯後盛ナリ第十五日ニ至レハ最初發疹セ
 シ部已ニ白屑剥落シ第十七日遍身ニ及ブ是癩毒消除
 ノ徵ニメ則施治ノ結局ナリ但病人性質遲鈍肥滿ノ者

及ヒ久シク嚙刺^{カサ}袂^{カサ}便^{カサ}傑^{カサ}兒^{カサ}ノ^{カサ}飲水法ヲ用ヒシ人ハ上
 ノ例ニアラズ第十七日ニ至リテ初テ大ニ發疹シ第
 二十一日ニ及ンテ白屑始テ剥落シ第五湯或ハ第六湯
 ノ後既ニ兩手暗黃色ニ變スル一確著ニシテ白屑剥落ス
 ルニアラサレハ其色消セサルナリ○没乙失速款屈斯
 氏劇症癩毒ヲ治スルニ上ノ浴湯法ヲ用ヒシ以來ハ嚙
 ニ内服ヲ專ニセシ時ニ比スレハ時日ヲ費ス一其半ニ
 シテ足リヌト云フ

第三沃胃謨劑外用法骨腫及ヒ潰瘍ノ大ナル者鼻中瘡
 一オナ^{オナ}頸圍潰瘍息肉下疳泡等ハ沃胃謨内服ノ他外用モ

廣野堂
 癩毒
 卷廿九
 遠西方藥

亦簡要ナリ宜ク純精沃胃謨及_レ沃胃謨加里ノ濃溶液ヲ用フベシ患所溶液ヲ貼スベキノ面大ナルニ準_レノ益稀淡溶液ヲ用フベシ但藥液ノ濃淡ハ患所適宜ノ灼熱或ハ癢痒ヲ起スラ度ト_レ序証癩毒ノ如キハ患所小ナルカ故ニ之ヲ綿撒絲ニ醃シ貼_レ可ナリ此症没_レ失速_レ故屈斯氏ハ左法ヲ常用トス

乙方

精製沃胃謨

_ハキ

沃胃謨加里

_ハ六

蒸餾水

_ハ一

右溶化外用

其瘡所掌大ノ者ハ左方ヲ用フ

丙方

精製沃胃謨

_ハ十

沃胃謨加里

_ハ一

蒸餾水

_ハ一

右溶化外用

此溶液ヲ綿布ニ醃_レ瘡所ニ貼シ其上ニ罨劑ヲ施シ一時毎ニ更換ス速ニ乾燥スル者ハ頻々更換スルニ宜シ鼻中瘡_ハオサ_ナノ深キ者ハ此液ニ温水少許ヲ加ヘテ之ヲ掬シ或ハ小盞ニ盛リテ嗅引セシム此法モ亦一時毎ニ施スベシ口内咽喉及_レ頸圍ノ潰瘍ハ半時毎ニ之ヲ口中ニ含マシメ或ハ含漱セシム温水ヲ加フル_レ要セズ○息肉瘡瘡後ニ發_レノ形状尖ル者ハ沃胃謨溶液ヲ綿

撒絲ニ醮シ貼スレハ即治ス蓋癰毒ヨリ来レル息肉腫
厚固ニシテ形状大ニ雞冠ニ類似セル症ハ上ノ例ニアラ
ズ之ヲ治スルハ埴優篤沃胃謨軟膏ヲ要ス

(丁方)

埴優篤沃胃謨 一錢至 單膏半

右調勻外用

先硬膏ヲ攤へ中央ニ圓窓ヲ穿テ瘡所ニ貼定シテ以テ
周圍ヲ防キ其上ニ此軟膏ヲ貼スル一猶他ノ硬膏ヲ貼
スル法ノ如シ小ナル息肉ハ二三日ニシテ治スル一恰モ
掃除スルカ如シ其大ナル者ハ數次軟膏ヲ貼スルヲ要

ス○頭髮ノ内ニ發スル所ノ癰毒瘡ハ頑固ナル者ナリ
遍身癰毒全治ノ後尚局處病トシテ久シク淹滯スル者
屢之アリ之ヲ治スルハ上ノ濃溶液ヲ點スル一數
回且隔日ニ埴優篤沃胃謨軟膏ヲ塗ルベシ○癰毒瘡
ハ通例内服藥ヲ以テ治スト雖亦上ノ溶液及ヒ毳布ヲ
施メ内藥ヲ佐クルヲ要スル一問アリ骨腫スエキソ焮衝
痛ヲ兼ヌル者ハ局處瀉血或ハ氷罨法ヲ施メ後沃胃謨
柔軟膏ヲ用フ但初硬膏ノ如ク之ヲ貼定セル時或ハ蠟
紙ニ攤
ベ用フ瘡痂脱落ノ後ハ軟膏ヲ貼スルガ故
之ヲ塗擦ス

第四 飲食法 嚴ニ断食スルハ没乙失速款屈斯ガ癰毒論

ト相反ス故ニ良性ニ消化ニ易ク滋味ニ食餌ヲ用フ
ルヲ好トス但其量モ亦能ク胃ニ堪アルヲ度トシ必胃
ヲノ飽滿セシムルヲ勿シ食餌ノ性ヲ撰フテ更ニ簡要
ナリ澱粉^{ゼト}ハ沃胃謨ヲ變化スルテ分離術ニ由テ
明カナリ而シテ沃胃謨加里ハ之カ為ニ其性變ズルナキ
ト體外ノ試験ニ由テ世人知ル所ナリト雖然氏没乙失
速故屈斯ノ實驗ニ據ルニ病人毎日沃胃謨加里一カ沃
胃謨一カヲ服シテ穀粉製食餌ヲ用ヒシ者其服藥大抵
糞尿ト共ニ泄下シ尿中ヲ檢査シ沃胃謨加里十五カヲ
得タリ是ニ由テ總テ漿粉ヲ含メル食餌ヲ禁シ唯肉類

及ニ植物ヲ許スノ説ヲ立テリ之ヲ守レル病者ハ其糞
屎中沃胃謨ヲ含ムトナシ設令之アルモ甚輕微ナリ其
効功モ亦大ニ異ナリ肉類ト植物トノミヲ餐セシ者ハ
其病著シク治ス穀粉或ハ他ノ漿粉ヲ含メル物ヲ喫セ
シ者ハ其癒ユルヲ緩慢或ハ終ニ不治ノ者モ亦往々之
アリ没乙失速屈斯氏ハ左ノ食餌ヲ命ス朝饌ハ乳汁單
果或ハ茶。歇爾拔斯屈謨花。菩提樹花。麗春花。泡劑等ヲ兼
用シ空心ニ朝饌ヲ欲スルヲ甚シキ者ハ攪肉羹汁及
ニ雞卵或ハ哥喜乳^{コルキ}一盞ヲ用ヒ午饌ハ刺護優
篤^肉煮汁若クハ攪肉汁ニ雞卵ヲ加フ夏月ハ菜蔬煮汁

ニ宜シ而後攪肉或ハ油煤肉ニ菜蔬或ハ其好ミニ應ノ
蘿蔔若クハ果實ヲ加フルモ可ナリ病久蒸餅ノ嚴禁ニ
堪ヘサル者ハ服藥後一時半ヲ過キテ乾餅一塊ヲ以テ
肉ニ添ヘテ喫セシム飲液ハ清水ニ宜シ或ハ食後少頃
アリテ後醇酒少許ヲ飲ムモ亦可ナリ晚餐ハ茶乳汁肉
羹汁ヲ用ヒ飢ルト甚シキ者ハ油煤肉一塊ニ果實ヲ加
ヘ喫セシム

第五攝生法病者常ニ適宜温暖ノ所ニ居ルヲ要トスル
カ故ニ室外ニ出ルヲ戒ス但夏月無風ノ日ハ昼一二時
間外氣ニ觸ルトモ可ナリ衣服ハ寒暖ニ準スベク又総

テ七情ノ感動ヲ避ルハ論ヲ待タス

沃胃謨ヲ用フルト法ノ如クナレハ瘰癧毒ヲ治スル
ノミナラス汞毒症并ニ癩毒ニ汞毒依強篤腺病等ヲ合
併セル變性症ニ一種ノ奇藥タリ之ヲ適宜ニ連服シ隨
テ分離疹サキリチセエキヲ發スル者ハ必本病再發ノ恐
アルトナシ三週乃至四週内ニ治ヲ終フヘシ治ヲ終ル
后病者容貌旺盛シ強壯ナルト治ヲ受クルノ如シ後必
調理或ハ消毒藥ヲ用フルヲ要セズ

○第三千五十二方 噎別爾秘

沃胃謨 沃胃謨加里 各半刀 石鹼硬膏 錢二

右丁寧調勻攤革貼

主治癰毒症或ハ依倨篤性贅骨及ヒ腺腫等ニ宜シ

○第三千五十三方

複方甘草散半弓 精製硫黃一錢至二錢

右調勻每服半食匙乃至一食匙日三服

主治癰毒症誤治ニ由テ全癒セサル者ニ宜シ之ニ兼テ

隔日ニ微温硫黃浴一回ノ浴湯ニ肝色硫黃ヲ施シ十四日ヲ過クルハ毎三日一浴ニ可ナリ但爾後頑固皮病

アル者ハ硝酸浴硝酸一弓乃至二弓加フニ宜シ別魯列印地名ノ病

院ニ於テ此治法ヲ持重スル一三四週ニ至ル又シキモ

六週ニ及ヒテ尚癒エサル者ハ瀉利鹽ノ治方三千ニ轉ズト云フ

○第三千五十四方私越秩鏗爾

薩爾沙巴栗刺根三 滾湯三斗浸漬六時後煮耗瀝取

液二斗日服

主治諸癰毒及ヒ汞毒ニ宜シ

○第三千五十五方穢歌蘭度

薩爾沙巴栗刺根 山午房根 濱瞿麥根 甘草 癒

瘡木 蜀羊泉莖各二

右細剉合取一弓乃至二弓半水二斗煮日服

主治永劑ヲ以テ癩毒ヲ治スルニ此方良佐タリ

○第三千五十六方刺屈涅鏝

薩爾沙巴栗刺根三 瑞香皮二 井水四北煮熟投後

呆

胡荽子 甘草各一

右瀝過取液三十二弓每服一弓日四服

主治經久癩毒骨疾ヲ兼ナル症及ヒ頑癬等ニ宜シ

○第三千五十七方穀優蘭篤

瑞香皮半 薩沙弗刺斯一 薩爾沙巴栗刺根二

蜀羊泉莖三

石水煎供飲料

主治經久癩毒永毒及ヒ骨痛ヲ帶フル者之ニ宜シ又惡液性皮膚病及ヒ粘液流出症ニ宜シ

第三千五十八方 悉篤滿煎

甲方

薩爾沙巴栗刺根十二 加井水四十八北二綿十四內錫

器飽熟十二時

礬糖附一 甘汞半 朱一錢

後三呆盛囊與煎藥併煮耗至十六北八綿四投後呆

旃那葉細剉 遏泥子 苗香各搗碎

右下火投甘草一弓半冷定濾過取液貯名峻方煎汁

(乙方)

峻方餘滓 薩爾沙巴栗刺根搗碎 加井水四十八比

飽熟十二時後煮耗至十六比投後果

枸櫞皮 桂皮 益智各搗碎

右下火投甘草六錢冷定濾過名緩方煎汁

主治經久癩毒永毒經久癩麻質斯及口依屈篤頑滯皮病

等好シ○此煎液ヲ服スルノ前日左ノ丸ヲ用フ

(丙方)

巴豆丸料未詳 甘汞廿四 葯刺巴脂半

右調勻為八十九衣桂末頓服九粒乃至十二粒○次日未
ト 蓐ヲ出テサルノ前峻方半瓜爾篤トヲ温服シ發汗一過
ト 拭ヒ去ルベシ午後緩方一瓜爾篤トヲ用ヒ臨臥ニ又
峻方半瓜爾篤トヲ飲服ス但此二服ハ冷服ニ宜シ此ノ
如ク連用スルノ四日ニノ次日治療ノ再前ノ丸ヲ服シ
又前法ニ仍テ煎液ヲ用フルノ四日第十一日ニ再九劑
ヲ用ヒ施治ノ間ハ病者唯粘滑羨汁炙肉一小片白蒸餅
少許ヲ用フルノ日ニ三次午前ハ蓐ヲ出ルノナク午後
ハ室内ヲ歩スルヲ許ス是緩方ヲ能ク利尿ノ効ヲ達
セシムルカ為ナリ藥用終リテ後尚六日乃至八日間口

ヲ戒シ病室ヲ出ツルコト勿ラシム一田治ヲ終ヘテ尚瘡
ハサルキハ又半劑或ハ其症ニ準ノ一劑ヲ與フ

○第三千五十九方 袿私煎名

薩爾沙巴栗刺根三 魚膠一錢 亞刺昆亞籬謨二

生安質沒尼四 盛緊 丸囊

右井水六匕煮耗至三匕濾過取其半分為三服一日服盡

主治頑癬及七經久癩毒ニ宜シ

○第三千六十方 朴林人煎名

薩爾沙巴栗刺根 土茯苓 生安質沒尼各半 胡桃

殼十

已上五味細剉合加井水二綿首爾北蓋閉煮四分時
去滓再煮減半取上澄

右早旦空心及晚際服一匕

○第三千六十一方 栗屈的兒人改製朴林人煎名

薩爾沙巴栗刺根一 癩瘡木六錢 胡桃殼二錢 硫黃安

質沒尼天造 井水三匕煮耗至二匕加後杲

桂水單 橙皮舍利別各一

右調勻一日服盡

○第三千六十二方 穢歌蘭度改製朴林人煎名

薩爾沙巴栗刺根一 蜀羊泉莖半 生安質沒尼末一錢

井水二匕煮耗至一匕半加旃那葉半錢乃至一錢瀝
過取液加後呆

紫葢舍利別方

右一日服盡

主治右三方經久癩毒及口疳毒症二宜シ

○第三千六十三方 複方薩爾沙巴栗刺煎

薩爾沙巴栗刺根 遇列那里重根附 暴爾名木類煎

各二 井水適宜煮耗至一匕加後味

旃那

右瀝過日服

主治宿根全身癩毒及口疳毒鼻中及口咽喉潰瘍骨疾皮

病等二宜シ○便列印地名ノ病院ニ於テ之ヲ悉篤滿煎ニ

代用ス効力相同シ晨朝蓐中ニ在テ半劑ヲ温服シ發汗

一過ノ之ヲ拭ヒ去リ午後又半劑ヲ冷服シ室中ヲ歩ス

ルニ宜シ尋テ大抵瀉ニ三行ヲ得ルナリ通例此劑ヲ用

フルノ前瀉利鹽溶液ヲ飲マシムル一二三四

○第三千六十四方秘麻利

薩爾沙巴栗刺根四 常水十二匕煮熟投甘草半五煮

耗至八匕放冷瀝過

右分爲十六壘每朝空心飲服但每八分時用一壘

主治承劑ヲ用ヒス經久癩毒ヲ治スルニ宜シ○此劑ヲ用フルキハ室内ヲ歩シ或ハ午後屋外ニ出テ產業ヲ營ムモ可ナリ最後ノ一擲ヲ服ノ後半時ヲ過テ平常ノ午饌ノ喫セシノ病人飲酒ニ慣ル者ハ一二盞ヲ許スモ可ナリ○此治法皮表ノ運營ヲ催進シ殊ニ能ク利尿シ癩毒性發疹及ヒ骨疾ニ最稱贊シ依ホ昆垚鬼家ノ如キ胃腸虛弱ノ者ハ此方ニ堪ヘザルカ故ニ之ヲ忌ム○暴訥爾田名ハ本法人如ク過列那里亞根ヲ用ヒ諸種ノ効ヲ奏スト云フ

第三十六十五方 刺歌屈的優爾名癩毒舍利別

薩爾沙巴栗刺根各九 土茯苓 癒瘡木 薩沙弗刺私

各六 赤幾那各三

已上五果細剉加常水百四十弓浸漬二十四時煮耗至三分之一乘温猛力絞瀝取滓再加水百四十弓煮至三分之一瀝過取液與前液合加砂糖舍利別二比半煎熬為舍利別之稠減至三分之二瀝過再煮沸移繆爾林器取暴爾來尼私花附一弓半及過泥子八刀囊盛浸漬蓋閉至冷以木棍攪和內玻璃壺密閉貯之

主治經久癩毒ヲ治ス

第一豫備法 第一日及ヒ第二日 苦味ノ大麥水例スルニ撒刺那失

越幾斯ヲ加フ二三麻篤ノ容量ヲ飲服セシム第三日甘汞
 藥刺巴或ハ瀉利鹽ノ緩瀉藥ヲ用フ第四日大麥水ヲ與
 へ多血家ハ瀉血シ胃腸汚物アル者ハ吐劑ヲ與フ○豫
 備法ヲ施スノ間ハ飲食節シ植物ノ食餌ヲ用ヒ而シテ
 汗飲液哥喜乳汁等ヲ禁ス

第二本治法第五日晨朝夕牌ニ方リテ上ノ舍利別ヲ取

リ男子ハ六匙婦人ハ四匙乃至五匙ヲ用ヒテ葶中ニ卧

サシム辰牌後四分時毎ニ薩兒沙巴栗刺ノ淡煎薩兒沙

巴栗刺ニ二弓ヲ煎ノ液四九弓三小蓋ヲ用ヒテ以テ煎液二十八瓜

爾篤ノ容量ヲ服盡スルニ至ル午牌油牒肉一小片白蒸餅

五六兩ヲ喫セシム但此時薩兒沙巴栗刺淡煎ノ飲液ヲ

用フル一ナシ申牌ニ至リ再舍利別六食匙ヲ用ク又酉

牌ヨリ戌牌後四分時ヲ過クル迄四分時毎ニ薩兒沙巴

栗刺煎九弓ヲ與ク戌牌半ニ及テ食餌ヲ與フル一午時

ノ如シ第六日ヨリ第十四日至毎日療法第五日ノ如シ

第十五日ヨリ第十六日至食餐ヲ減シ唯薩兒沙巴栗刺

煎ヲ用フル一第十七日瀉藥ヲ與ク第十八日大麥煎

ヲ用ク第十九日ヨリ第二十四日至毎日第五日ノ如シ

○治法此ニ止マル然レ後尚十四日間薩兒沙巴栗刺淡

煎ヲ服シ口ヲ戒メ減食セシム○施治ノ間ハ注意ノ蒸

發氣ヲ催進シ唯温暖晴朗ノ日ハ外氣ニ觸レシムベシ
 發汗過多ナルキハ薩兒沙巴栗刺煎ヲ減シ瀉甚シキ者
 ハ舍利別ノ量ヲ減シ便秘症ハ晚餐前四分時ニ方リ灌
 腸ヲ施シ熱ヲ帶フル者ハ肉ニ代ヘテ穀粉製食餌酪無ヲ
 用フ○此法ヲ施セハ大抵平癒スルナリ○之ヲ悉篤滿煎
 ニ比スレバ病者ノ體ヲ戕賊スルコト少シトス

○第三千六十六方優弗祇天

癩瘡木比

右井水ハ比浸漬一夜翌日上慢火煮至四比

主治經久後証癩毒承劑効ナク既ニ承毒証ヲ發セル者

或ハ癩瘡及ヒ失苟兒陪苦ヲ合併セル症之ニ宜シ○早
 晚蓐中ニ在テ此煎液半比ヲ温服シ其中間ハ緩煎本方
 滓ヲ取り水ハ比ヲ加テ以テ用フ○天氏曾テ親自
 煎シ慮過ス之ヲ緩煎トス
 病ノリシキハ癩瘡木五比ヲ用ヒ盡セリ他ノ病者ハ八
 比乃至十六比ヲ用ヒシト云フ

○第三千六十七方

癩瘡木比

薩沙弗刺私

撒兒沙巴栗刺

蘆根各一

甘草

蜀羊泉各半

茴香二錢

右細剉調勻取二食匙加水二比半煮耗至二比一日服盡

○第三千六十八方私越樹鐵爾

黑腐蝕水

甘汞錢一 石灰水弓四

右調和外用

○第三千六十九方同上

黃腐蝕水

升汞錢十五

加石灰水一匕溶解

右調勻外用

○第三千七十方律私篤

律私篤名黑腐蝕水

甘汞錢半

阿芙蓉錢二

石灰水弓二

右調勻醮綿撒絲貼患所日二三次

○第三千七十一方遠突土

升汞錢二

加蒸餾水二弓融解加後味

阿芙蓉丁幾單方半錢

右調勻外用

○第三千七十二方

甘汞錢一

阿芙蓉末錢半

家猪脂弓一

右調勻為軟膏外用

主治

三千六十八方至三千七十二方

下疳ニ宜シ○藥液ヲ綿撒絲ニ醮

シ患所ニ貼スル一日ニ數次○軟膏ヲ用フルモ亦之ニ

同シ

○第三千七十三方

赤降汞錢十五

朴麻篤膏附二

右調勻外用

主治 知覺鈍性下疳周緣高クノ臍狀ヲナシ底面不潔ノ者ニ用フ○此症赤降汞末ヲ撒布スルモ亦可ナリ

○第三千七十四分 預結

鹽酸亜鉛二 蒸餾水一ヲ溶解加後呆

鹽酸一

右調勻醮綿撒絲貼患所日三四次

主治 下疳及ヒ其他汚穢ノ潰瘍ニ宜シ又預結氏ハ諸般

ノ癩毒千五百九十五方及ヒ三千及ヒ慢性皮膚病。腺病。癌

腫等ニ鹽酸亜鉛ヲ内服スルヲ稱賛ス但毎常慎重ノ二

十分一ノ一。十六分一ノ一。十二分一ノ一ヲ取リ日ニ三服乃至四服ス

○第三千七十五方 律私篤

甘汞半 阿芙蓉末二 加石灰水三乃至四一研和

右每用振盪射注龜頭及包被間

主治 包莖癩毒ニ用フ

○第三千七十六方 遠突土

過兒托軟膏附 水銀軟膏各半

右調勻塗内外股日二次

○第三千七十七方 同上

失鳩答硬膏 附 水銀硬膏 若幾論膏 各半

右調勻攤革貼患所

主治 右二方經久便毒ニ宜シ ○ 艮弗利爾名人及ヒ私私松松名名ノ説ニ據ルニ便毒ヲ療スルハ極メテ醫治ヲ加ルヲ要セス唯自然良能ノ妙機ヲ妨ケサルヲ以テ旨トシ化膿ヲ欲スルモ亦之ヲ催進スルハ適當ナラズ便毒ハ最初之ヲ自然ニ委シ而シテ熾衝増進シ結膿ノ前兆確著ナルニ至リテ始メテ薤謨若幾論膏若幾論膏二片乃至四片ヲ貼ス疼痛甚シキ者ハ温暖琶布ニ宜シ結膿緩慢ナレハ琶布ニ葱綠石鹼若クハ芥子ヲ加フ膿化破潰自然ノ後尚暫

ク温暖琶布ヲ貼ノ縛帶ス但周圍ノ硬結減スレハ薤謨若幾論膏ノ中央ニ孔ヲ穿テ之ヲ貼シ及ヒ蠟ヲ綿撒絲ニ塗リテ瘡口ニ貼スベシ ○ 諸般ノ小技ヲ施スハ益ナク却テ害アル者多シ方今壓定帶ヲ施シ便毒ヲ消散スルヲ稱譽スト雖亦殊ニ害アリトス

○ 第三千七十八方 孤劉傑

薤謨若幾論膏 附 一 光菁硬膏 各半

右調勻

主治 鈍性便毒ニ用ヒテ熾衝及ヒ化膿ヲ振起スルニ宜シ

○第三千七十九方栗格爾突

失鳩答硬膏大掌 吐酒石廿四

右為硬膏

主治鈍性便毒ニ貼シ衝動膏トスルニ宜シ

○第三千八十方預結

鹽酸亜鉛錢一 海鹽精錢半 蕃薇軟膏一

右調勻為軟膏塗擦

主治便毒ニ宜シ

○第三千八十一方佛蘭葛爾突

蒸餅三 白芥子末二 黑石鹼一

右加井水及燒酒各適宜調和攤革貼

○第三千八十二方過兒栗屈的兒

黑石鹼三 熱湯二 上文火煮少頃加後呆

葱埋熟灰煨
細剉者 白芥子末各三

右再上微火煮少頃屢攪和作琶布

主治鈍性便毒膿化ヲ促スニ宜シ結倫突人ノ 琶布ヲ

製スル法左ノ如シ葱ヲ以テ灰ニ埋ミ煨キテ細剉スル

者及ヒ芥子末各二兩黑石鹼半兩ニ水ヲ加ヘテ琶布ト

シ熱湯ヲ以テ琶布ニ作ル更ニ妙 厚一度乙謨ニ作リテ貼スベシ其温

ハ病者ノ堪フルヲ度トス又尋常温暖琶布ヲ以テ其上

ニ貼シ數回更換ノ以テ前ノ琶布ヲ温保ス前ノ琶布ヲ更フルハ一日一回トハ夜間ハ琶布ニ代ヘテ礪砂硬膏附ヲ貼スベシ

○第三千八十三方詩忽倫

琶布劑料二 加井水適宜煮作琶布加後味
葱煨 黑芥子末各一

右温暖貼定

主治 鈍性便毒ノ釀膿ヲ促スニ好シ○但此琶布ヲ合藥局ニ命メ製スルハ不佳ナリ

○第三千八十四方律私篤

升汞六分至十二分 蒸餾水適宜溶化加後呆

失鳩答越幾斯 加密列越幾斯各二錢 阿芙蓉丁幾錢

半玫瑰蜜一

右調勻為塗液

主治 頸圍ノ癩毒潰瘍其性急ニ廣大ヲ成シ其部竟ニ非常毀敗ニ及フ者之ニ宜シ○或ハ格魯林加爾幾ノ溶液ヲ以テ含漱劑トス

○第三千八十五方

薩毘那葉末二錢 蕃薇軟膏附六錢

右調勻塗綿撒絲每日貼之

主治癩毒贅肉ニ奇効アリ

○第三千八十六方弗民便倭倭拂連

升汞錢一 龍腦錢半 再餉燒酒一弓溶化

右調勻黑玻璃壘收貯點息肉日二回

主治緩慢贅肉ニ宜シ○大抵此方奇効アリト雖余カ輩

硝酸銀ヲ以テ優レリトス便列印ノ病院ニ於テハ腐

藥ヲ用ヒテ右護烏刺兒度水ヲ重布ニ蘸シ贅肉ニ貼シ

結痂剥落スレハ又腐蝕藥ヲ施ス此ノ如ク數回ニ贅

肉消滅スルニ至ル○但先彼ノ部ヲ療シ後一二日ヲ經

テ此部ヲ治シ一齊ニ其焮衝ヲノ甚瀰蔓セシムルヲ勿

○急性贅肉ハ上ノ溶液絶エテ効アルヲナシ宜シク

其熟スルヲ俟テ而後腐蝕藥ヲ施スベシ其肉頭白色ヲ

呈スルヲ以テ熟スルノ徴トス剪刀ヲ以テ其肉ヲ截除

シ後硝酸銀ヲ以テ療スルハ最簡易法タリ小贅肉或ハ

肉脚廣キ者ハ最初ヨリ腐蝕藥ヲ用フルニ宜シ

○第三千八十七方溫德私德士地私葛爾篤列兒

亞鉛華或 亞硝酸毘私繆篤刀半 甘汞刀 家猪脂錢一

右調勻作軟膏貼日一二回

主治贅肉ニ宜シ之ヲ用フレバ通例三日ニ癒ユ

○第三千八十八方遠突士

水銀硬膏一 精製阿芙蓉一 錢

右調和攤革貼

主治便毒及_レ其他ノ癰毒腫ニ宜シ

○第三千八十九方同上

稀鱗酸二 沙列布淡煎六 覆盆子 舍利別半 至

右調勻每一時服一食匙

主治腐骨疽癰毒ニ因ル者之ニ宜シ八百二十五方及八百六十八方ヲ參

照ス

○第三千九十方同上

華涅滿溶汞散三 蝟蝟石末半 上好砂糖三 錢

右調勻為散分十二服日三服

主治初生兒ノ癰毒ニ宜シ

○第三千九十一方同上

甲方

甘汞三 薤膜散附二 錢

右調勻為散分十二服日三服

主治初生兒癰毒甘汞散單味ヲ用ヒテ瀉スル者之ニ宜

シ之ニ兼テ左ノ軟膏ヲ用フベシ

乙方

落薇軟膏 胡桃油各半 忍福滿拔爾撒謨非答 錢

主治塗擦胃與臍之間

○第三千九十二方（秘屈私）

華涅滿溶承散一八

甘扁桃油錢一

亞刺昆亞蘆謨末

錢半 橙花水

櫻實水錢各六

扁桃乳舍利別錢半

右搗和作舐劑每一時半服一茶匙

主治初生兒ノ癩毒ニ宜シ

○第三千九十三方（遠突七）

清淨水銀錢六

羊脂錢半

入石臼研和至不見點加後呆

葛加阿油錢一

右四肢ノ内側治吸收管塗擦

主治初生兒ノ癩毒ニ宜シ尋常ノ灰白水銀膏ハ用フルニ堪ヘス

遠西方彙卷之二十九

