

遠西方彙

卅

○卷之三十

第十

結節腫

○胃結節腫


癌腫

○胃癌腫

武9

237

30止





ト此ニ屬スル藥劑ノ中砒石ヲ以テ第一品トス慎重シ  
 テ之ヲ少量ニ久服スルニ宜シ福烏列爾名八砒石溶液三百  
 方三滴乃至五滴日ニ二三服或ハ亞細亞九千三百或ハ三  
 千九十四方ヨリ三千九十六方至用フベシ其功用砒石ニ  
 近キ者ハ莨菪トス或ハ根每日半分乃或ハ越幾斯ヲ以テ  
 老利兒結爾斯水ニ溶解シ用フ千四百ハ青酸ハ砒石及ヒ  
 莨菪ノ効ヲ佐クルニ最良ナリ沃胃謨三千九百及ヒ  
 鷓胡菜ノ如キ沃胃謨ヲ含蓄セル海草三千四百ハ結節  
 腫ノ萌症ニ用ヒテ殊効アリ金三千五百至ハ腺病及ヒ  
 癰毒ヲ合併セル症ニ稱賛セリ肝油六百八十五方ハ結節

腫性ノ硬結腫ニ稱用ヒ悉篤滿煎三千五百方ヲ用ヒ新食法ヲ  
 行フ亦結節腫ノ萌症ニ効アリ磷酸鏡格碌屈私末兒秩斯  
 三千九百一方至及ヒ沃胃謨三千二百金蓋花三千一百及  
 失鳩答三千一百至加爾刺亞三千一百及  
 七明礬三千一百ハ最鎮痛ノ驗アリ腫所ニ於テ毎々蟻鍼ヲ  
 要スル者屢之アリ○第二義ハ刀若クハ腐藥ヲ以テ消滅  
 スルニアリ三千一百但此法ハ獨截断ヲ施スベカ  
 ラサルノ部ニ行フベキハ論ヲ待タス又外部ノ結節腫其  
 根硬固ノ部ニ發セル者ハ縛帶ヲ施メ以テ腫中血管ノ開  
 クヲ抑壓シ且其腫ノ軟化ヲ防クニ宜シ○第三義ハ姑息

癰腫  
 廣用

法是ナリ癌腫ヲ治スルニ多ク之ヲ簡要トス即麻醉藥千  
百廿六方至三ヲ内外ヨリ用ヒテ疼痛ヲ鎮靜シ白參參法  
千百廿三方ヲ行ヒ或ハ炭末三千百四格呂林加爾基溶液三千百四等  
ヲ用ヒテ惡臭ヲ去リ且毒膿ノ近部ニ侵襲スルヲ妨クテ  
要トス強壯滋養ノ食餌ヲ以テ生カヲ補フベシ各器ノ癌  
腫ヲ治スルノ方法多シト雖此小冊子枚舉ニ違アラス宜  
ク余ガ著セルヲスセシビユフ。ズル。アウセレ。カラシクヘイ  
テシ書ノ癌腫條ヲ參照スベシ此書和蘭ニ於テ始故ニ此  
テ翻譯梓行セリ編尾ニ於テ獨胃癌腫ノ治法一二ヲ掲クルノミ  
○第三千九十四方

白砒一 蒸餾水一匕溶化

右初毎服半食匙後一食匙乳汁和服

主治癌腫ヲ生スルノ素因ヲ除クニ宜シ○靈敏ノ人ニ

ハ毎服阿芙蓉液五滴乃至十滴ヲ加フ

○第三千九十五方

白砒二 黑椒一 白糖一 過兒抱末二 蒸餾水半

右調勻為六十九丸早晚服二丸

主治癌腫ノ素因ヲ治ス

○第三千九十六方〔秘傳〕

福烏列爾砒石溶液一 老利兒結爾斯水三

錢三百廿六 錢六

右調勻每服十六滴乃至二十滴日四服

主治癌腫ニ宜シ

○第三千九十七方 亞細亞丸

白砒半錢 黑椒一錢 石臼研磨為細末加後杲

亞刺毘亞護漿一錢半

右每丸二匹作八十粒衣白桂末早晚服一九

主治癌腫ニ宜シ○此他ノ二方ハ二千五百十七方及

二千五百十八方ニ揭示セリ

○第三千九十八方

老利兒結爾斯水

右每服三十滴日三四服

主治總テ癌腫ニ好シ阿西安姪爾氏ハ殊ニ子宮癌腫ニ

稱用ス

○第三千九十九方 劉翹爾

精製沃胃謨半 沃胃謨加里一 蒸餾水三

右晨朝及午後取六滴砂糖水一盞和服

主治結節腫頑癬等ニ宜シ○一週毎ニ每服二滴ヲ加ヘ

以テ三十滴ニ至ル六歳以下ノ兒ハ二滴乃至五滴ヲ服

ス七歳ヨリ十四歳至ハ五滴乃至十六滴ヲ服ス

○第三千百方 同上

精製沃胃謨四分 沃胃謨加里一分 蒸餾水八分  
右調勻分二三服二日服盡漸加增十四日後須一日服盡  
本量

○第三千百一方同上

沃胃謨一分 沃胃謨加里二分 蒸餾水八分  
右調勻服第三千百方之後四週乃至六週間分服此方每  
日二三回

○第三千百二方

沃胃謨一分四分 沃胃謨加里二分半 蒸餾水八分  
右調勻頑固症服第三千百一方數週之後分服此方每日

二三回

主治 三千百方ヨリ三千百二方至結節腫及頑固腺病  
等ニ宜シ

○第三千百三方私屈呂埤兒

鷓胡菜四錢六錢 乃至八錢  
右熱湯ハ弓浸漬五時乃至七時瀝過取液每服一盞日三  
服食前一時半服之

主治 結節腫及癰腫ニ宜シ

○第三千百四方同上

遠志一錢 土木香一錢半 鷓胡菜半

右細剉調勻分六包水浸六時後煮五密扼篤服之

主治結節腫及癰腫宜之○晨朝叩牌空心一服午

後未牌一服又夜亥牌一服每服三勺凡二食匙トハ四週

連用ノ後鵝胡菜ヲ增ノ六錢ニ至止此ノ如ク累月持重

シ兼テ格碌屈私末兒秩斯煤焙及ヒ金盞花越幾斯ヲ丸

トシ三十百十一方用フ且隔日全身浴剉篤亞斯ハヲ施スヘシ

但淡薄ノ食餌ヲ命シ大便ヲ促スニ宜シ

○第三千五百方律私篤

鹽酸金鹽一白糖二

右調勻分十二服日二服

主治潰爛癰腫ニ宜シ○鹽酸金鹽ノ癰腫ヲ治スルノ効

實ニ他藥ニ優レル者ヲ見ズト雖疼痛ヲ緩和シ且滲出

液ノ惡臭ヲ減スルハ甚好シトス

○第三千六百方遠突土

鹽酸金鹽六八至半刀失鳩答越幾斯 失鳩答葉末各一錢

右調勻加亞刺昆亞蘊謨漿適宜一ハ為一丸衣石松粉朝

暮服一丸隔日增一丸

主治腺ノ硬結腫及ヒ結節腫等ニ宜シ

○第三千七百方同上

鹽酸金鹽一八至三八蕃薇軟膏一

右調勻分十二服日二服

右丁寧調和作軟膏塗擦患處日數回

主治 結節腫及<sub>レ</sub>其他諸硬結腫ニ宜シ千九百廿ニ方ヲ參照スベシ

○第三千百八方

鹽酸金鹽一錢 白糖一錢

右調勻為散分十二包每日取一包塗舌上齒齦及兩頰內面或唇

主治 諸癌腫殊ニ子宮癌腫及<sub>レ</sub>癩毒ニ宜シ金鹽ノ量漸ク加ヘテ每用半一或ハ二一ニ至ル

○第三千百九方列聖傳

格碌屈斯末兒秩斯 金盞花越幾斯 金盞花及葉末

各一錢

右調和加亞刺毘亞蘊漿適宜為九十九衣粉末每服五丸乃至八九日三服

○第三千百十方律私篤

格碌屈私末兒秩斯四 府利油糖半

右調勻為散分五服日二三服

主治 右二方總テ結節腫及<sub>レ</sub>癌腫ニ宜シ又子宮癌腫ニ殊効アリ

○第三千百十一方

格碌屈私末兒秩斯二錢 煤焙末 金盞花越幾斯各三錢



右調勻為四百八十九衣粉未晨朝辰牌至夜亥牌每二時服六丸

主治結節腫及二瘡腫ニ宜シ○四週連服ノ后格碌屈私未見秩斯ヲ加増ノ三錢ト匹之ニ兼テ上ノ浸劑三千方ヲ服スベシ

○第三千百十二方東撰

沃胃謨鏡二八至三六 蒸餾水九錢 橙皮丁幾一錢  
右調勻為飲劑頭服日三次

主治腺病結節腫瘰癧毒黃胖ニ宜シ

○第三千百十三方越私的林假

金盞花三錢 井水適宜煮濃過取液五勺加後味  
橙皮舍利別半勺

右調勻每服二食匙日三服

主治強腫殊ニ皮表ニ發スル者之ニ宜シ

○第三千百十四方律私篤

(甲方)

金盞花越幾斯 失鳩答越幾斯 格碌屈私未見秩斯  
各二錢 金盞花及葉一錢半

右調勻二以爲一丸衣石松粉每服五六九日三服

主治破潰セル瘰癧腫ニ宜シ○之ニ兼テ左ノ軟膏ヲ外用

(乙方)

金盞花越幾斯 加密列越幾斯 失鳩答越幾斯各二錢

老利兒結爾斯水一 阿芙蓉丁幾一錢

右調和醃綿撒絲貼瘡口

○第三百十五方嚼麻

失鳩答越幾斯二錢 甘汞半錢

右調勻一丸為一丸衣石松粉晨夕服一丸漸加增

主治瘰癧二宜シ

○第三百十六方整倫私的印

(甲方)

失鳩答越幾斯 薤謨安沒尼亞幾各一錢

白石鹼二錢 金硫黃半錢 大黃丁幾適宜

右二丸為一丸衣石松粉晨夕服八丸

主治乳房結節腫打撲ニ因ル者此丸ヲ用ヒテ六週内ニ

治セリ漸ク服量ヲ加増シ第八日二十粒ニ至レリ之ヲ

持重スルヲ十四日ノ後疼痛去リテ腫モ亦動クニ至レ

リ爾後左ノ丸ヲ用ヒテ功ヲ収メリ

(乙方)

失鳩答越幾斯 失鳩答葉末 瘰癧木脂

蓮謨安沒尼亞樂各二錢 藥刺巴脂半錢 金硫黃一錢 亞

刺毘亞蓮謨漿適宜

右二以為一丸衣石松粉每服八九日三服漸加至十九或十二丸餘

○第三千百十七方律私篤

失鳩答葉末錢二 失鳩答越幾斯適宜

右二以為一丸衣粉末每日服一丸漸加至十九

主治結節腫腺病ヲ合併セル症安質沒尼劑ト配用スベ

○第三千百十八方越乙層

加爾剎亞扭麻里二以至三以 甘草半

右調勻為散分十二服蠟紙包裹日二三服

主治乳癌及ヒ子宮癌ニ宜シ○癌腫ノ初起ハ獸炭鴻益

アリ

○第三千百十九方麻健對

精製加爾剎亞扭麻里半 礪砂末一 失鳩答越幾斯

以二 甘草越幾斯適宜

右為暴律私衣伊里私弗魯連底那末分十二服日三服

主治攝護腺及ヒ尿道ノ結節腫ニ宜シ

○第三千百二十方穢私的爾

明礬錢一 玫瑰昆設兒弗宜適

右為三十六丸衣桂末晨夕服二丸漸加至六丸

〔主治〕子宮頸ノ癰腫ニ宜シ○之ニ兼テ後ニ揭示スル所

ノ明礬水射注法三千百廿六方ヲ施スベシ○又明礬浴ヲ稱用

ス每浴明礬ノ量ニ弓ヨリ五弓ニ至ル

○第三千二百二十一方 格私墨名砥石散

白砥二 朱砂錢二 血竭十二 靴底霜八

右為細末収小玻璃壘号格私墨散供外敷

〔主治〕面部癰腫ニ最好○此散一分ヲ取水少許ヲ加ヘ捏

テ泥トナシ筆ヲ以テ瘡上ニ塗ル厚刀背ノ如クスベ

シ○或ハ亞刺昆亞蕪謨漿ヲ加テ泥トナスモ亦可ナリ

○第三千二百二十二方 袂密松度名拔爾撒謨鎮癰膏

〔甲方〕

鉛糖一 失鳩答越幾斯 拔爾撒謨字露各一 舍電

阿芙蓉液半 蠟膏一

右調勻作軟膏

〔乙方〕

袂密松度複方砥石膏 甲方一 格私墨砥石散三千百廿一方

右調勻為軟膏

〔主治〕袂密松度氏ノ治法律私篤氏之ハ効力更ニ緩慢ニ

ノ破潰癰腫ノ緩症ヲ治スルニ最好ト此複方砒石軟膏ヲ綿撒絲ニ塗リテ以テ瘡上ヲ掩フ但瘡縁外ニ餘マ  
 ス一ニ列印トス翌日其綿撒絲ヲ去リテ結痂及ヒ腐肉  
 ヲ除キ又前ノ如ク縛帶ス此ノ如ク連施スル一五日乃  
 至八日ニ善ク其結痂ヲ去リ輕々格私墨散（三千百ヲ）  
 外敷シ後瘡ヲ洗淨ノ單ニ甲方ヲ塗リテ縛帶ス

○第三千百二十三方（過爾涅滿）

白砒 硫黃華錢各一 蒸餾醋 蜜陀醋膏各一

右調勻薄攤綿布貼瘡上

主治破潰癰腫ノ腐藥トス

○第三千百二十四方（促癰阿印）

鹽酸亞鉛分一 漿粉五分四分三 井水適宜七十滴  
滴三 或二分 六十滴四十五

十滴

右供腐藥

主治癰腫。豕肉腫。纖維腫。軟骨腫ニ宜シ○杵ヲ以テ之ヲ  
 半列印乃至四列印ノ厚ニ作ル此琶布ヲ貼スレハ十二  
 時乃至四十八時内ニ結痂ス而シテ四日ヨリ六日至ニ剥  
 落ス○此腐藥ハ劇痛ヲ發シ且其能力モ亦深ク通徹ス  
 ○或ハ鹽酸亞鉛ヲ乾シ瘡面ニ撒布スル一厚一列印亦  
 可ナリ

○第三千二百二十五方同上

鹽酸亞鉛分一 安質沒分二 扭酪分二 漿粉五分四分 井水  
宜適

右作泥供腐藥

主治破潰セル瘡腫厚クノ瘡面不平ノ者ニ宜シ安質沒  
扭酪ヲ加フレハ其泥能ク粘質ヲ得ルガ故ニ表面不平  
ノ所ニ貼スルモ能ク粘着ス

○第三千二百二十六方律私篤

白砥八 加密列水三 老利兒結爾斯水三  
右調勻供縛帶用

主治乳癌ノ姑息法トス

○第三千二百二十七方列聖俄

菘若根一 井水適宜煮八分時濾取液一匕加後味  
失鳩答越幾斯 加密列越幾斯各半 白砥六

右調勻每一時半醮綿撒絲濡癌腫

主治潰爛セル癌腫ノ姑息法トス○或ハ生菘若草及ヒ  
失鳩答ヲ細剉シ乳汁ヲ以テ煮テ琶布トシ或ハ煎ノ液  
ヲ取り或ハ越幾斯二錢乃至三錢ヲ取り水一弓ニ溶メ  
洗滌若クハ射注ニ供スルモ可ナリ

○第三千二百二十八方 歐爾田私人名 治破潰癌腫琶布

失鳩答葉一

生胡蘿蔔汁半

舍電阿芙蓉半

右調勻為一布

○第三百二十九方〔藥邊栗屈的兒〕

失鳩答越幾斯一

非阿私越幾斯半

莨菪葉末一錢

民垵列里精適

右作一布取其半薄攤一革貼患處

主治右二方破潰癰腫ノ姑息法トス

○第三百三十方〔新野松〕

失鳩答葉

著草葉

黠失刺蓮

加密列花一

右細剉水煎取一碗加亞麻仁油二匙灌腸

主治直腸狹窄及ニ結節腫性硬結ニ宜シ○此方能ク痛

ヲ去リ後重ヲ緩メ粘液ノ漏泄ヲ減シ大便ヲ促ス

○第三百三十一方〔結和頤〕

老利兒結爾斯生葉一

滾湯半

右浸漬冷定濾過取液加清淨蜜一ヲ調勻醮細布或綿撒

絲貼患處

主治唇癰腫ノ姑息法トス最妙

○第三百三十二方〔弗那爾田蒲蘭度〕

醋酸莫爾比涅四

水銀膏

蠟膏各二錢

右調勻作軟膏取豌豆大塗擦陰部日二次

主治子宮癌腫ニ施ノ疼痛ヲ減スルニ宜シ○或ハ阿芙蓉殊ニ莫爾比涅ヲ以テ鎮痛藥トシ内服ニ供ス直腸癌腫ハ阿芙蓉一二分ヲ取テ朝暮肛門ニ挿入ス

○第三千百三十三方弗列結

忽布末ホツブ一分 家猪脂イノシシ三分

右上沙火飽熟二時半乃至三時瀝過塗瀝定中

主治癌腫ノ疼痛ヲ鎮靜スルニ宜シ

○第三千百三十四方爾爾滿

沃胃謨加里ウキイ錢半 家猪脂イノシシ一分

右調和作軟膏供塗擦

主治子宮及ニ攝護腺癌腫ノ姑息法トス

○第三千百三十五方弗陽

沃胃謨ウキイ錢三 水銀膏スイギン二分

右調和取一茶匙塗擦日三回乃至四回

主治結節腫ニ宜シ○陽氏此軟膏ヲ用ヒテ卵巢ノ大結節腫ヲ治セリ

節腫ヲ治セリ

○第三千百三十六方秘私的爾

亞麻子アサヒ或過兒托煎ヒ二六滴至阿芙蓉液アモク八滴至明礬メイラン二分

右四分供射注

主治子宮頸ノ癌腫ニ用フ○或ハ明礬一分乃至二分ヲ



加ヘテ乳房腋下腺等ノ癌腫ヲ洗フニ宜シ○之ニ兼テ  
明礬二弓乃至五弓ヲ加ヘテ全身浴ヲ施ス三千百廿方  
ヲ參照スヘ

○第三百三十七方 薄老度名煤始膏

煤始 家猪脂各半 苕若越幾斯錢一

右丁寧調和作軟膏塗綿撒絲

主治 癌腫ニ宜シ○薄老度氏或ハ本方ノ苕若越幾斯ヲ  
去ル

○第三百三十八方 私的印

金盞花新絞汁一錢至  
一錢半 新鮮無鹽酪一

右調和作軟膏塗瘡施縛帶日三次

主治 皮表癌腫ニ宜シ○之ニ兼テ金盞花一錢乃至一錢  
半ノ煎汁ニ乳汁十八弓ヲ和メ内服ニ供ス

○第三百三十九方 律私篤

孕礪酒石二錢至  
六錢 水六弓溶化加後果

老利兒結爾斯水二 菲阿私越幾斯三

右調勻供縛帶用

主治 乳癌ノ姑息法トス

○第三百四十方 叔碌堙兒

結列阿速多四 胡桃油二 葛加阿酪十四

右調勻作軟膏塗擦

主治叔碌垓兒氏ハ前ニ載スル所ノ方法三千百三方。三千百四方。三千

百十ノ外或ハ癰腫ヲ截除ノ后此軟膏ヲ用ヒテ佳驗ヲ

得タリト云フ

○第三千百四十一方紐爾

鹽酸白金一錢 石鹼硬膏附一

右調勻攤革貼患處

主治總テ癰腫ニ宜シ乳癰ニハ最妙○之ヲ施セ、疼痛

漸ク減シ更ニ病勢ヲ制剋スルノ効アリ一

○第三千百四十二方律私篤

蘓合香軟膏或拔實里膏 菩提樹炭末各一 加密列

末半 龍腦 沒藥各二 的列並油適

右調和作軟膏供縛帶用

主治潰爛セル癰腫ニ用ヒテ惡臭ヲ去リ分離機ヲ復良

スルニ好シ

○第三千百四十三方同上

鹽酸加爾幾錢二 常水ニ比溶化加後果

老利兒結爾斯水二

右調勻射注

主治子宮癌ニ宜シ殊ニ臭氣ヲ去ルニ妙トス

胃瘡 シキルリス。エト。カルシノマ。五ノ

胃瘡ハ慢性胃焮衝後ニ發スル者多シ此症時々胃部ニ放  
蟻シ灰白水銀膏ヲ塗擦シ甘汞ニ莨菪ヲ加ヘ千四百九與

フルヲ以テ病勢ヲ防止スルノ適當法トシ其他液質不良  
ラシカ等此病ノ原由ヲナスヲアリ此ニ注意スベキヲ論

ヲ待ダス胃瘡一タビ發スレバ必本復ヲ望ムベカラハ此  
症ニ殊稱スル所ノ藥劑ハ則莨菪殊ニ穢歌蘭度老利兒結

爾加莨菪水千四百八 莨菪加亞硝酸昆私繆篤 千四百七十

七方 莨菪加酒石鹽水千四百八 失鳩答三千四百四十四方 至

六方 金盞花越幾斯結晶硝酸銀三千四百 砒砂千九百 沃胃謨解釋

植物越幾斯類攝爾都兒水。ズシンケン。エムス。マリオンバツ

ト。カルスバツト。キッシンゲン等 皆鑛泉名 是ナリ叔密篤繆爾列兒

人及ヒ呵列爾名 第三千四百四十八方及ヒ三千四百四十九方

ヲ以テ佳効ヲ得シ者アリト雖亦之ヲ廢セリ或ハ強テ吐

下劑並ニ苦味健胃丁幾劑ヲ用フル醫モ亦アリト雖極メ

テ害アリ乳汁ヲ以テ最適當ノ補劑トス胃中酸敗液多キ

者ハ石灰水ヲ配用ス 胃瘡盛ナル時期ニ及 或ハ消化シ易

キ肉類ハ許シテ可ナリ諸酷厲酸味鹽藏香竈ノ食餌ヲ禁

ス其他ノ食物モ亦極メテ少量ヲ要トス○外用ハ胃部芥  
子泥發泡硬膏吐酒石軟膏六百廿 及ヒ硬膏六百廿 劇症ニ

至テハ灸ニ宜シ累月嘔吐シ腹痛甚シキ者ニ臧歇蘭度氏  
 嘗テ之ヲ施シテ非凡ノ偉効ヲ獲タルトアリ大便遲滯ハ  
 灌腸メ之ヲ促スヘシ○病ノ末期ニ至テハ姑息法ヲ要ス  
 腹痛嘔吐ヲ治スルハ沸騰散二方三方八百八方千九百五  
 里歇利飲千九百六ノ沸騰ニ乗メ老利兒結爾斯水少許ヲ  
 和シ或ハ少量攝爾都兒水ニ微温乳少許ヲ和スル者或ハ  
 少量菲阿私越幾斯阿芙蓉失鳩答莨菪莫偃林九五千五百  
 ヲ與フルニ宜シ之ニ兼テ胃部ニ菲阿私葉失鳩答葉ニ白  
 嬰球ヲ加ヘタル鎮痙布ヲ貼シ或ハ失鳩答硬膏芥子硬  
 膏ヲ更換シ用フ此方法尚効ヲ見サル片ハ轉メ莫爾比捏

賢姪兒未秩斯法ヲ施スヘシ其吐止所テ物惡臭ナル者  
 ハ白參汁ヲ取テ時々一茶匙ツ用フ此ハ其臭即消ス病  
 者諸食物ヲ吐逆スルハ枸櫞大切片或ハ小氷塊ニ砂糖ヲ  
 撒附メ以テ煩渴ヲ消スヘシ此ノ如キ衰ムベキ病者ヲ養  
 フハ肉羹濃汁ニ雞子黃ヲ加ヘ或ハ乳汁ヲ以テ灌腸シ又  
 傑列乙浴每浴傑列乙一ヲ行フベシ

○第三千四百四十四方羣的爾

失鳩答越幾斯錢半 精製瓦爾板奴謨 牛膽錢各一 亞  
 硝酸毘私繆篤錢一 白石鹼錢二  
 右調勻三瓜為一丸衣甘草末每服三九日三服漸加至六

丸餘

○第三百四十五方百連爾度

失鳩答越幾斯錢二 精製瓦爾拔奴謨 牛膽各半 硫

黃安質沒尼錢一 白石鹼半

右調勻二為一丸衣石松粉每服八丸乃至十九日三服  
乃至四服

○第三百四十六方空便頓

失鳩答越幾斯六十四 甘永四

右調勻為十六丸衣石松粉早晚服一丸

主治三百四十四方ヨリ三百四十六方至胃病ニ宜

○第三百七十七方弗鐮典利篤

結晶硝酸銀一 蒸餾水六勺乃至八勺溶解加後味

亞刺昆亞蘆謨漿一

右調勻每服一食匙日三服乃至四服

主治胃痛ニ宜シ○鐮典利篤氏硝酸銀ヲ以テ胃痛ノ崩

症ニ殊効藥ト稱シ其既ニ發スル者ハ之ヲ用ヒテ姑息

ノ奇方トス

○第三百四十八方秘密篤繆爾列兒

甲方

...

...

...

...

醋酸加里半一弓 失鳩答越幾斯錢半 番木鱉越幾斯水  
乎十六 蒲公英越幾斯錢三 薄荷水弓六 蒲公英舍利  
別半一弓

右調勻每一時服一食匙

(乙方)

莨菪葉末弓三 白糖弓一

右調勻為散分八服每日或隔日一服

〔主治〕右二方併用ノ胃痛ニ宜シ○叔密篤繆爾列兒氏或ハ失鳩答及ヒ番木鱉ノ用量ヲ加増シ或ハ莨菪散ニ甘承一弓ヲ加フルヲアリ此方法ニ由テ以テ根治セル者

ハ人アリト云フ

○第三千四百四十九方 (阿列爾)

(甲方)

阿芙蓉弓一 甘承錢一 白石鹼弓半

右調勻三弓為一九晨夕服三丸

(乙方)

健質亞那越幾斯錢半 苗香水錢六 亞的兒錢二

右調和每半時服十滴乃至十二滴

〔主治〕右二方胃痛ニ宜シ呵列爾氏ハ吐涎スル至九藥ヲ持重シ已ニ吐涎スレハ水劑ヲ與フ食養ハ米粥ヲ用フ

ト云フ

○第三千五百五十方 莫徧林各人丸

非阿私越幾斯 續草越幾斯 亞鉛華各一錢

右調勻三匕為二丸衣石松粉日服一丸

〔主治〕胃痞嘔吐ヲ鎮靜スルニ宜シ又面痛ニ好シ漸服量

ヲ加ヘテ六丸ヨリ八丸ニ至此或醫本方ニ紫堇越幾斯

一錢ヲ加フルコアリ

遠西方彙卷之三十終

江戸芝神明前

書肆

和泉屋吉兵衛

