



明武  
第24  
卷11

九折堂慎懷之弁  
氏圖書之記



大便秘閉弁  
結傍流  
燥糞

佛爵

大承氣湯  
梔子鼓湯



協熱下利  
身體發熱

黃龍湯之弁

正陽夕明胃熱之弁

瘧病經驗之弁 六ヲ

三和口禁之弁 セウ

東垣全生羌活湯之弁 ルヲ

休息痢經驗之弁 目ウ

頭痛經驗之弁 九ヲ

嘔吐經驗之弁 九ヲ

大黃舌胎弁 十

老黃胎弁 十二

薰黃胎弁 十四

黑胎之弁 十五  
純黑胎之弁 十六

潤黑胎之弁 十七  
黑舌之弁 同  
○生脉散  
○滋陰降火之姜  
○參胡芍藥之姜

芒刺舌之弁

大難治

十八

亡津液一症也

有熱者涼補

雜病參苓白朮

錢氏白朮

乾燥舌之并十八  
滋補涼補  
赤舌之并同  
極不治也

列衣舌之并十九  
大難治  
白胎三舌之并同  
白胎乾燥之并二十  
小兼氣之并二十一

上焦痞滿甚者并二十一  
微  
和胃氣之并二十二  
無痞滿之并二十三  
上中下三段之并二十四

燥實堅之并二十五  
玄明粉之并同  
大陷胸湯之口授同  
大結胸之并同

決結胸之并二十六  
胸結必兼痰飲二十七  
大陷胸湯藥品并二十八  
虛氣結胸之并二十九

胸滿之并三十一  
枳實理中丸目的并三十二  
結胸經驗之并同  
清火化痰湯之并三十三  
解熱下痰湯之并同

一方經驗三十三  
水結胸之并三十四  
血結胸之并同

寒實結胸之并三十五  
小陷胸湯之并三十七  
大陷胸湯再并三十八  
小陷胸湯再并三十九

痞結之并三十九  
三和口授同  
大便秘結之并同

脈沈結之并四十

懊懷之弁

許學士曰傷寒身熱無時々謔語因下利大便

不通非煩燥亦寒非痛盡夜不得卧但心中無曉會處或時發一聲

如歎息之狀此懊懷怫鬱二証俱作也胃中有燥屎者兼

氣湯下燥屎二十餘枚得利而解此乃懊懷也是懊懷二ハ

梔子豉湯ノ懊懷有レレ其ハ彼ト是ト諸症ヲ引併スハ是

ハ虚煩ノ懊懷是ハ大兼氣湯ノ懊懷ト云フニハ區別ハ速ニ知ルハ

者ハ惟懊懷ノスカタヲ知ルカ肝心ニ乃チ此医按申心中無曉

會處或時發一聲ヲ如歎息之狀ト云フ文句ヨク懊懷ノスカ

タヲ今日見ル如クヨク書取タル者ハ其上善テ太息スルハ

懊懐ノ具コトバト知テ書外ニ懊懐ノ症ハ是ニ相違ナレト  
云フコト書外ニ合点メ居ヘキコト次ニ佛爵ト云フモ燥糞燥  
屎カ腸胃ノ間ニ積カサナウテ夫ヨリメ批毒カ其燥糞燥屎  
ヨビ集ムルコト假令ハマサレタル者ニ蒼蠅ノムラカリ集ルカ如ク燥糞  
ト批毒カ一牧ニナウテ腸胃ノ間ニ爵促スルニ因テ其勢力胸ノ  
邊迄モ蒸ツク故心ノ中何トカ角カ云ハレザル苦ニ有ヨリ思ハス  
知ラズ発一声其佛爵懊懐ノ句文ヲ假リニ発スル声ト知ラ  
ハナトカ懊懐佛爵ノスカタヲサトラサラセバ此筆墨ス書盡スルニ  
ホス書外ニ思唯メ其病状ニ熟スベシ

大便膠閉之弁

大便膠閉トハ膠ハニカワシ大便カ膠ノ如クナ  
ル至極悪キ臭ニ有大便ヲ通スルヲ膠ト云フ閉ハ同シナカラモ  
利病ノ如ク滞リテ通シ兼ルヲ云フ是カ大便膠閉ニ然ル此膠閉  
ノ症ニ存ノ外大兼氣湯ヲ用ヒ下メヨキ症カ有傷寒時疫を  
多キ症ニ是モヤハリ批毒カ陽明府ノ入ル寸ニハ極メテ有症ニ或  
人間テ曰大兼氣ノ症ハ大便秘結ヲ以テ目的トスルニ加様ニ大便  
ノシマラヌ症ニモ大兼氣湯ヲ用ル例有ヤ答テ曰傷寒論於テハ  
其例ナシ惟後世ニ至リ只有可カ濕疫論ニ此理ヲ論スルコト至  
テ詳シ是ヲ治療ノ上ニ經驗スルニ大効ヲ得ル往々有此弊

驗ノ旨ハ

熱結傍流之弁

熱結トハ結ハ結糞トナルト云フ心テ熱結ト

云フ傍流トハ傍ハカタワラトヨシテ熱結ノカタワラヨリ汚水カ流ル  
ト云フ心テ傍流ト云フ此症ハ腸胃ノ中ニ熱結ノ燥屎カ團子ヤ  
兎ノ糞ノヤウニハリツヒテアル然ルニ其燥糞ハ出ヌメ燥糞ノカタ  
ワラヨリ大便クサキ水ノ下ルニ計リ目ヲツケテ虚証ナリト思ヒ兼  
氣ヲ用ルハ存モヨラス只一應ニタワイモナキ茶ヲ用ヒ甚シクメハ  
人參黄耆ノ如キ補劑計リテ用テ其熱毒ノ燥糞ヲ補注  
スルニ至ル此様ニ療治ヲ間違スルモ畢竟ノ処目的ニウラキ故ニ其

目的ニ明ナルハ間違ハナキト此証ヲ知ルハ先舌ヲ見ルヘシ舌ノ色  
黒キハ一ツノ目的ニ其次ハ腹ヲ見ヘシ腹硬クメ手ニテ推メ痛ム  
ハ是ニツノ目的ニ其次ハ小腹ヲ見ヘシ手ヲ以テ推メ見ルニ團子ノ如キ  
者棒ノ如キ者有ラズ指頭ニ覺ルハ是果メ燥屎ニ是ニツノ  
目的ニ脈沉ニ実ナルモノ是四ツノ目的ニ胸膈痞悶スルモノ是五ツ  
ノ目的ニ芒刺アルヤナキ是決定ベシガタクハ更ニ種々舉ル処ノ目的  
ノ諸症ヲ引併セ結糞ノ有ヤ無ヤヲ診察スヘシマキルハ有ヤ不  
可此症甚似ヨリタルヲ以テ陶節庵カ傷寒六書ニモ論々見ヘタリ  
併セ見ル

協平

潮熱下利之弁

協ハ合シ此下利ハ熱メ下ルシ大兼氣湯ノ極ハ

三

前ニモ段ク云フ通り<sup>ニヤ</sup>周身ノ熱カ腸胃ノ落コム故ニカラタノ熱ハ反テウ  
スクナルガ陽明府熱ノ常ニ然ルニ此協熱ハ體ノ熱モツヨクメ白  
虎湯ノ散漫ノ熱ノ様ニヒドク又腸胃ノ熱モ舌胎ノ黒クナル程ニ  
ヒトクメ内ノ熱モカラタノ熱モゴカクニ強ケレハ内外熱ヲ合スルト云フ  
意テ協熱トハ云フシ此通り内外ノ熱カゴカクモ強キ上ニ熱クサキ  
大便カ浮スルシ是ヲ協熱下利ノ症トハ云フシ此症モ腹中カ浮スレ  
ト腸胃ニ熱カ落ル<sup>ト</sup>同シ故ニ大便ニカマラス大兼氣ヲ用テ熱  
毒ヲモラセハ反テ熱モサメ大便モナラシメ問テ曰目的ハ何ヲメアテニ

スルヤ答テ曰是モ常ニ大便ノ浮シヤスキ癖ノ有人ノ熱病ニ有<sup>レ</sup>シ  
油斷ス不可<sup>レ</sup>医者ノ見ソコ子易キ症シ是協熱下利モ亦兼氣  
ノ目的ニ取ルノ有増<sup>シ</sup>  
口梅傷寒論曰大陽病外症未除而數下之遂  
協熱而利利下不止心下痞鞅表裏不解者  
桂枝人參湯 枝四兩 甘草四兩 白朮人參乾姜各三兩

黃龍湯之弁

此方ハ陶節庵カ傷寒六書ニ出ル方<sup>也</sup>其

方大兼氣湯ニ加人參甘草當歸枳椇姜棗<sup>ヲ</sup>タル方<sup>也</sup>治極邪  
傳裏胃有燥屎心下硬痛身熱口渴謔語下利純清水<sup>ニ</sup>或  
人間テ曰今此症有燥屎何以<sup>テ</sup>又下清水<sup>ヲ</sup>陶節庵曰此水  
内寒而利<sup>スレ</sup>乃日飲湯菜而下<sup>シ</sup>也名熱結利<sup>ト</sup>庸醫妄謂<sup>ニ</sup>漏  
底傷寒<sup>ト</sup>以<sup>テ</sup>熱菜<sup>ヲ</sup>止之<sup>ル</sup>殺人<sup>ト</sup>多矣以上云フ處熱結停流協



熱下利下利純清水三條大兼氣湯ヲ用テ此ヲ治スル各其甚  
危此時大兼氣湯ヲ用ル目的ノ諸症ニ令キ寸ハ多ク療治ヲ誤ル  
有診察肝要

正陽明胃熱之弁

王純庵カ医方集解ニ云フ胃ハ為水穀之

海四旁有病皆傳入胃已入胃府則不復傳他經如太陽  
傳入胃則不更傳陽明傳入胃則不傳女陽經ノ字有シヤ女陽傳入胃則  
不傳三陰經曰陽明居中土也萬物所飯無所得傳〇傷寒  
傳經ハ太陽ヨリ陽明經女陽經ト段々表三經ヲ傳テ又  
裏ノ三經ニ及ヒ夫ヨリ裏ニ入テ各順次ヲ以テ藏ニ傳フ是ヲ傳經ノ症

ト云フ然ルニ其熱邪太陽經ヨリ直ニ胃ノ府ニ熱カ飯スルヲ有又女  
陽經ヨリ熱カ胃ニ飯スルヲ有如此六經皆様子ニ因テ他經ハ  
傳不直ニ胃ノ府ニ熱カ飯スルヲ有是ヲ女陽明胃ノ府ノ熱  
ト云フモハヤ熱カ胃ノ府ニ入テ女陽明ノ症トナル寸ハ三陽經  
ニモ傳ヘス三陰經ニモ傳ヘス惟胃ノ府キリニテ死スル症ハ死シ  
生ル症ハ生ル大兼氣湯小兼氣湯調胃兼氣湯ノ三方ハ是胃  
熱ノ症ニ用ルタメニ設ケタル方也但胃ニ熱カ入ル寸ハ體ノ大熱ハ大キニ  
薄クナル者ニ惟熱ノ烈キ處ノ兩ノ腋下ト手心ト足心ト此六ヶ  
處ニ有者ハ是ハ何故ナレハ手足ハ胃ノ處屬ナレハ熱カ強キ兩ノ

腋下モ亦然リ此熱カ胃ノ府ニトツフリト落コム熱ノ模様若體  
 ニモ大熱モ有テ白虎湯散漫ノ熱ゾ如ク周身ヲ蒸タテル症有此  
 有者ハ末胃ノ府ニ熱カ十分ニ落キラヌニ因テ周身ニ散トチリ漫ト  
 ヒロカリテ有ク此寸女陽明ノ症ヲ備ヒト云ヘ凡毎リニ兼氣ヲ用不  
 可此下ス場カウシ早キト知ルヘシ若シ其熱カ周身ヲ引テ腋下  
 手足ノ心ニ集リテ稠ル汗カシシト出ル者是大兼氣湯正面  
 症ニテ遅クモナケレハ早クモナシ大兼氣湯眞坪ノ時ト知ルベ  
 シ此ヲニバイ書外ニ吞コシテヲクベシ是又大兼氣湯ヲ用ル肝心  
 心得ク若此場ヲ知ラスメ急キアワテ其調場ヲ早メル寸ハ未傳

寒中 結胸心下痞硬其外種ノ變症ヲアラワス又初難メ後  
 溘スル等ノ禍有是ヲ謹ムベシ況ヤ女シモ惡寒ノ脈浮大兼熱  
 等ノ表症ヲ下スヲヤ此兼氣ヲ用ル大禁ナル者此等ノ謂  
 ハ諸書ニ云フテ有ラナレハ其巨細ヲ爰ニ略ス博覽メ其理ヲ得ヘ  
 瘕病之經驗之弁 金匱要略曰瘕爲病胸滿口噤臥  
 不着蓆脚絛急必介齒可与大兼氣湯云云瘕ハ俗ニ云フソリ  
 ノフシ予此條ニタヨリテ瘕ノ太病ヲ治シタルト有和泉村ノ十郎  
 右門ト云フ人ノ娘歳二十三ニテ産シケル産后十日計ヲ経テ腰湯  
 ヲシケリ其夜寒熱ノ脈數ノ近村ノ医者ノ茶ヲ飲シケレトモ

其寒熱イヨクツノリテ第四日ニ至テ瘵ヲ瘥ス其証目ヲ張り  
 テ人ヲ白<sup>ミラ</sup>眼ツメチヲフルワシ足ヲ動シ後(ソリ)弓ノ如ク齒ヲカ  
 シシメテ茶モ咽(通り)難シ瘥リシアリサニ目ト見ラレヌアリ  
 サシ脈ハ數ニメカラナシ病家モ死者ト覺語ヲ極メテ茶ヲ予ニ  
 求メケル予止ムヲ得ス大兼氣ヲ予(タリ)一服飲ヲワル頃瘥リ  
 勢余程ユルクニ二服メニハ瘥リノセイ十ニ七八モ緩リタリ三服メニ  
 ハ早瘥リ有カナキカト云フ位ニウスシ因テ后清心柳胆湯ヲ用  
 ル下二十四五服計リ用テ全快シタリ○又予カ下女ニ使ヒシ女道  
 処ニ家持ニナリテ百姓ヲワトメケリ一日濱(アサリ)ヲ取ニ出テ足ニ

竹ノ刺五六分計ノ毛ノヲタテタリ其刺ヲ抜又明日濱(アサリ)ヲ取ニ  
 行ケリ家ニ飯テ其夜寒熱メ安語ヲ云ヒ太熱タリ予葛根湯ヲ  
 予(タリ)効ナクメ愈ク大熱トシ面赤キヲ朱ヲ塗シ如ク刺ノ一疵  
 ロヨリ血ヲ出ス一ヨホトク予又如聖散ヲ予レヒ一向ニ効ナシイヨク  
 諸症ツノリテ悪クシ瘥ヲ瘥ス予又東垣羌活湯ヲ予フ是ニテ  
 モ一向ニ効ナクイヨク<sup>ヤウ</sup>様ス悪クナルニ因テ一度他ノ医ヲヨシテ見ス  
 (シト)云(氏)一向無人ニテ他ノ医ヲ呼イナラス予止ムヲ得ス大兼氣  
 湯ヲ予一服ニメ大キニ瘥リ靜リテ快シト告ケ来リ因テ行テ見ルニ  
 成程快キニ違ヒナシ因テ又大兼氣二服ヲワカリス吞終テサ

ツハリト治シタル故(茶ハ吞ムセトテ止メタリ其后二三日ヲ経テ平  
日ノ如クテ予カ家ニ来リ礼ヲ云ヒケリ右ノ二人ハ太甚ノ奇効ナリ  
ケル故夫ヨリ續テ二三人モ治シケル何レモ効有必ス經驗スヘシユルカセ  
ニ見ルコト勿レテ様ナル療治ハ理ヲ離レテ經驗スヘシ理ニカラズテハ  
反テ經驗モナリニクキモノ)是又理外ノ理ニテ經驗ヲ救ムル一ツ  
ノ心得

三和散口噤之并

予此理ヲ按スルニ口噤ハ<sup>筋</sup>攣筋ノ萎ニ<sup>手</sup>急ハ此方神効有故ニ効有ト見ユ○三和散ヲ總分量一匁五分  
程ニ調合紅花七分ヲ加(常ノ如ク煎シ用ユ産后ノ口噤ヲ治スルニ

妙ト救病不邪秘方ト云妙茶書ニ見タリ予カ同字ノ者例ニタ  
ル効ヲトリタル一有ト云フ産后ニ血茶ヲ用ルハ常ノ<sup>ハ</sup>氣茶ヲ用ルハ  
常ニ<sup>ハ</sup>常ヲ答シテ用ユモ又例ノ有<sup>ル</sup>隨分心カケテ誠ムヘ  
キト

東垣全生羌活湯之并

産后或小産后大脱血寒熱如水火  
血暈頻々不知人事或瘧病トナルヲ治ス四物湯ニ羌活獨活  
葛根升麻柴胡藁朮細辛蔓荊子紅花ヲ加(タル方)東  
垣<sup>ハ</sup>蘭室秘藏ニ出タル方<sup>ハ</sup>此方妙効ヲ因字醫叢ト云フ本  
ニ甚神効有者トホメテ見(タリ)成<sup>ハ</sup>程其調場(用ヒタル)

ニハ妙効アルヘキ方ニ隨分試テ可シ予未タ人ニ傳ル程ノ經驗ナシ后日ヲ待ツ

休息痢經驗之弁

金匱要略曰下利已瘥至其年月日

時復發者以病不<sub>レ</sub>尽故也當下宜<sub>レ</sub>以大<sub>レ</sub>養<sub>レ</sub>氣<sub>レ</sub>湯<sub>レ</sub>云友松子治<sub>レ</sub>人何列一富兒十三歲七月中旬下痢赤白諸治無効求<sub>レ</sub>予治<sub>レ</sub>脈之<sub>レ</sub>滑<sub>レ</sub>金匱曰下利脈滑當有所<sub>レ</sub>去<sub>レ</sub>宜<sub>レ</sub>大<sub>レ</sub>養<sub>レ</sub>氣<sub>レ</sub>湯<sub>レ</sub>因<sub>レ</sub>予大<sub>レ</sub>養<sub>レ</sub>氣<sub>レ</sub>湯一貼減半二貼愈七八后用木香異功瘥次年七月中旬旬亦忽患<sub>レ</sub>浮<sub>レ</sub>痢日十餘次又請<sub>レ</sub>予<sub>レ</sub>脈<sub>レ</sub>之<sub>レ</sub>又滑<sub>レ</sub>因<sub>レ</sub>問<sub>レ</sub>其<sub>レ</sub>父<sub>レ</sub>曰令<sub>レ</sub>即<sub>レ</sub>痢去秋始患<sub>レ</sub>耶<sub>レ</sub>答<sub>レ</sub>曰兒八歲患<sub>レ</sub>浮<sub>レ</sub>而<sub>レ</sub>后<sub>レ</sub>變<sub>レ</sub>痢服<sub>レ</sub>白

朮散百餘日僅愈<sub>レ</sub>敏<sub>レ</sub>后<sub>レ</sub>每年七月必<sub>レ</sub>患<sub>レ</sub>痢疾每患服<sub>レ</sub>白<sub>レ</sub>朮<sub>レ</sub>散<sub>レ</sub>每服僅愈去年之痢白朮散似無効因又<sub>レ</sub>予<sub>レ</sub>大<sub>レ</sub>養<sub>レ</sub>氣<sub>レ</sub>湯<sub>レ</sub>數貼痢止又強<sub>レ</sub>予<sub>レ</sub>數貼<sub>レ</sub>景<sub>レ</sub>浮<sub>レ</sub>下<sub>レ</sub>腸<sub>レ</sub>垢<sub>レ</sub>碗<sub>レ</sub>計<sub>レ</sub>而<sub>レ</sub>次年<sub>レ</sub>不<sub>レ</sub>再<sub>レ</sub>作<sub>レ</sub>矣<sub>レ</sub>予<sub>レ</sub>モ<sub>レ</sub>此<sub>レ</sub>治<sub>レ</sub>効<sub>レ</sub>テ<sub>レ</sub>休息<sub>レ</sub>痢<sub>レ</sub>ヲ<sub>レ</sub>治<sub>レ</sub>シタル<sub>レ</sub>一<sub>レ</sub>二<sub>レ</sub>三<sub>レ</sub>人<sub>レ</sub>モ<sub>レ</sub>有<sub>レ</sub>時<sub>レ</sub>ヲ<sub>レ</sub>追<sub>レ</sub>テ<sub>レ</sub>發<sub>レ</sub>ル<sub>レ</sub>病<sub>レ</sub>俗<sub>レ</sub>ニ<sub>レ</sub>云<sub>レ</sub>屬<sub>レ</sub>瘡<sub>レ</sub>ア<sub>レ</sub>ク夕<sub>レ</sub>病<sub>レ</sub>復<sub>レ</sub>發<sub>レ</sub>病<sub>レ</sub>ノ<sub>レ</sub>變<sub>レ</sub>是<sub>レ</sub>此<sub>レ</sub>等<sub>レ</sub>ハ<sub>レ</sub>根<sub>レ</sub>治<sub>レ</sub>カ<sub>レ</sub>肝<sub>レ</sub>要<sub>レ</sub>ニ

頭痛經驗之弁

凡<sub>レ</sub>テ<sub>レ</sub>疫<sub>レ</sub>熱<sub>レ</sub>熱<sub>レ</sub>ガ<sub>レ</sub>サ<sub>レ</sub>シ<sub>レ</sub>テ<sub>レ</sub>来<sub>レ</sub>ルト<sub>レ</sub>頭<sub>レ</sub>痛<sub>レ</sub>カ<sub>レ</sub>ワ<sub>レ</sub>ル<sub>レ</sub>程

スル<sub>レ</sub>カ<sub>レ</sub>有<sub>レ</sub>此<sub>レ</sub>証<sub>レ</sub>頭<sub>レ</sub>痛<sub>レ</sub>ノ<sub>レ</sub>治<sub>レ</sub>法<sub>レ</sub>ヲ<sub>レ</sub>用<sub>レ</sub>テ<sub>レ</sub>効<sub>レ</sub>ナ<sub>レ</sub>ク<sub>レ</sub>ハ<sub>レ</sub>是<sub>レ</sub>初<sub>レ</sub>ニ<sub>レ</sub>強<sub>レ</sub>ク<sub>レ</sub>發<sub>レ</sub>汗<sub>レ</sub>ノ<sub>レ</sub>劑<sub>レ</sub>ヲ<sub>レ</sub>用<sub>レ</sub>テ<sub>レ</sub>汗<sub>レ</sub>ヲ<sub>レ</sub>取<sub>レ</sub>ラ<sub>レ</sub>ント<sub>レ</sub>メ<sub>レ</sub>邪<sub>レ</sub>氣<sub>レ</sub>ヲ<sub>レ</sub>上<sub>レ</sub>ハ<sub>レ</sub>ツ<sub>レ</sub>リ<sub>レ</sub>ノ<sub>レ</sub>ホ<sub>レ</sub>セ<sub>レ</sub>タ<sub>レ</sub>ル<sub>レ</sub>故<sub>レ</sub>ニ<sub>レ</sub>大<sub>レ</sub>養<sub>レ</sub>氣<sub>レ</sub>湯<sub>レ</sub>ヲ<sub>レ</sub>用<sub>レ</sub>テ<sub>レ</sub>其<sub>レ</sub>邪<sub>レ</sub>ノ<sub>レ</sub>上<sub>レ</sub>升<sub>レ</sub>ル<sub>レ</sub>ヲ<sub>レ</sub>引<sub>レ</sub>キ<sub>レ</sub>下<sub>レ</sub>セ<sub>レ</sub>ハ<sub>レ</sub>兼<sub>レ</sub>氣<sub>レ</sub>湯<sub>レ</sub>ノ<sub>レ</sub>下<sub>レ</sub>降<sub>レ</sub>ヲ<sub>レ</sub>引<sub>レ</sub>レ<sub>レ</sub>テ<sub>レ</sub>頭<sub>レ</sub>痛<sub>レ</sub>ハ<sub>レ</sub>治<sub>レ</sub>セ<sub>レ</sub>ス

凡此是表証ニ兼氣ヲ用ル一格也ト温疫論ニ見ヘタリ予此法ニ働テ表証ノ頭痛ヲ兼氣ニテ治シタル一有然レ凡此ハシカト邪氣上升ト云フ一ヲ熱ト見定メタ上ノ一ノ輕易ニ思フ不可又雜病ノ頭痛トウノモ効ナキニハ必ス大便ヲ問フヘシ若大便秘結スルナラハ大兼氣ノ糞ヲ用テ効ヲ取ル一珍シカラヌ一ノ假令ハ酒樽ノ吞口ヲ秘ケハ上ノ酒カヘル如ク也

嘔吐經驗之弁

疫病ノ羊ニ至テ風ト嘔吐カツイテ種々治スレ凡効ナキヲ有此証必ス大便ヲ問フヘシ若大便カ久シク通セス通メモ硬クメ秘スルナラハ是必ス下カ塞ル故ニ邪カ逆上メ嘔吐トナルカ

故ニ調胃兼氣湯ヲ用テ其逆勢ヲ取りヒシク寸ハ治スト瘟疫論ニ見ヘタリ予此法ニ因テ傷寒瘟疫ハ素ヨリ雜病ニ用テモ効ヲ取リタル一有吾徒是ヲ試ムヘシ金匱大黃甘草湯ノ條下ニ食ニ已テ即吐者ハ大黃甘草湯主之有又外臺ニ吐水者大黃甘草湯主之ト有又周揚俊カ翻胃ノ大便秘結ヲ目的ニ施覆花代赭石湯ヲ用テ妙効有ト云フモ皆是瘟疫論ノ意ニ凡テ右ノ如ク大黃ナトノ穀品ヲ上カラ逆氣ニ推チカケル心持ニ輕ク心得テ使フ亦是一法ニ大兼氣湯ヲ重ク使フト輕ク使フトノアハハイナハ書外ニ合点スヘシ

大黃舌胎之弁

凡テ傷寒時疫ノ症舌胎ノ様スヲ見ル

十

至テ肝心ナルハ誰レモ知リタルニテ今更改メテ云フ迄モ然ルニ  
前ニモ云通り傷寒論ニハ此汝汰ナレ一向ニナシ疑ニキナラヌヤ  
此舌ノ模様ニ因テ死生吉凶病ノ輕重ヲ知ルハ脈ヨリモ猶切ナ  
ル診処ノ胎ノ一ニ熱セサル医者ハ療治ヲ上手ニ取りテワスハ諸  
詮出来ヌ一ノ医者タルヘキ者舌ノ様子ニ熱ノ診察ヲ助スヘキ者  
或人間テ曰是追段ノ聞タル処ハ凡テ舌ノ黄色ニナルハ大黃  
ノ目的トナシテ療治ヲナスヘシト云フ説ヲ聞ケリ如何ノ謂有テ  
黄脈色字ハ大黃ノ目的ニ取テソヤ答テ曰胃ノ府ハ穀ヲ入ル、

袋ナレハ穢室ト同シ一ノ穢ト云フ者ハ土ヲ以テ組立テ拵タル者ニ其  
中ニ米ヲ以テ敷并ヘ火ヲ以テ是ヲ蒸ヌ寸ハ米忽ニ蒸セテ黄色ニナ  
ルニ是ハ何故ナレハ土ノ色ハ黄色ナルヲ以テ土ノ眞色トナス者ニ  
此五藏配等ノ正色ノ彼室ノ火ニ土ノ眞色ヲ蒸出メ土ノ色カ  
米ニ移ルノ故ニ其米黄色ニ成テ穢ト成シ今傷寒時疫ノ熱カ  
胃ニ入ル寸黄胎ヲ見ス道理此理ニ因テ故ニ黄胎ハ大黃ノ目的ニ取  
テ前ニモ云フ通り熱カ胃ニ入ル寸ハ輕キ寸ハ小兼氣湯調胃兼  
氣湯ヲ以テ胃ヲ和シ重キ寸ハ大兼氣湯ヲ以テ其燥糞其燥  
屎ヲ下メ胃中ノ熱ヲ驅解スニ此是ヲ陽明府熱ノ症ト云フ

テ極リタル療治ノ左方ニ此等ノ謂故舌カ黄色ニナルヲ見テハ  
 大黃ノ目的ト取ル<sub>レ</sub>是ヲ以テ其理ヲ熟ト合点スヘシ但此口訣ハ  
 諸ノ兼氣湯組合セ<sub>ル</sub>大黃計ノ目的ニハ非ス惟大黃一味ヲ  
 以テ外ノ薬<sub>ハ</sub>加フル寸ニ用ル心得ノ爲ニ示ス者<sub>ハ</sub>故人其方中ニ組合  
 タル大黃ノ使ヒ口ハ其方ノ條下<sub>ニ</sub>於テ論說ノ有<sub>リ</sub>ナレハ其  
 論說ノ趣ニ從テ大黃ヲ取捨勘弁スヘシ此ニハ惟大黃一味ヲ諸方ニ  
 加<sub>ヘ</sub>タキ寸ノ目的ヲ示ス者<sub>ハ</sub>但<sub>ニ</sub>黃胎ニモニ三種ノ區別有テ大  
 黃ノカケ引ニモ夫<sub>レ</sub>ノ區別有猶此未<sub>レ</sub>ノ<sub>レ</sub>條ヲ見テ其區別ヲ知  
 ルヘシ大黃一味ヲ諸方<sub>ハ</sub>加味スル<sub>ル</sub>例ハ假令ハ小柴胡ノ症カ備ハ  
 リテ有<sub>レ</sub>ハ舌ハ必ス白胎ニテ有<sub>ヘ</sub>キハツナルニ其白胎ノ中ニ黃胎カ交<sub>リ</sub>テ  
 見ル<sub>ハ</sub>此大黃ノ目的モ小柴胡ノ中ニ交<sub>リ</sub>テ有<sub>ク</sub>其寸ニ小柴胡湯  
 ニ大黃ヲ加<sub>ヘ</sub>テ用ルト云フノ類<sub>ニ</sub>此一例ヲ以テ其餘ハ推メ知<sub>ル</sub>ヘシ但<sub>ニ</sub>ケ  
 様ニ大黃ヲ一味ニテ加フル寸ノ黃胎ハ鮮<sub>ク</sub>リトメサヘル者<sub>ハ</sub>此サ<sub>ハ</sub>タル中ニ  
 黒<sub>ク</sub>シカ付テフスホリタル黃胎ヲ老黃胎ト云フ<sub>ニ</sub>猶次ノ條ヲ見テ知<sub>ル</sub>

老黃胎之弁

惟今モ云フ通り初ノ黃胎ハ舌ノ白キ中ニ咽ノ奥  
 ニ黃胎カ早<sub>ク</sub>交<sub>リ</sub>有<sub>リ</sub>位ノ舌ニテ表証ノ末<sub>ク</sub>除カ又中ニ<sub>ニ</sub>捩<sub>ル</sub>カ胃  
 ノ上<sub>ニ</sub>口<sub>ニ</sub>舞<sub>カ</sub>フサツテ蒸<sub>ク</sub>タル故ニ白胎ノ中ニ黃胎カ交<sub>ル</sub>然<sub>レ</sub>ハ



此黄胎ハ小柴胡ノ表証ニ胃ノ裏熱モ交リ各半ニ成テ居ル処ノ舌  
 下ト知ルヘシ但此寸舌ヲ見ルニ口傳有舌ヲ見ルニ米ノ粉ヲスリタル如  
 ク白キ舌ヲ見ヌナラハ病人ニ向ヒ口ヲ大キク開カセテ其咽ノ奥ヲヨク  
 見ルヘシ此時咽ノ奥ニハ早黄胎ノキサシカ見レテ有者ハ是ハ熱カ羊  
 表羊裏ヲ折コシテ胃ノ上口ヲ蒸故咽ノ奥ニ黄胎ヲ兼見ス者  
 之此時早ク大黄ニ手ヲマワシメ達原飲加大黄トカ小柴胡加  
 大黄トカ何カ左様ニ大黄ニ手ヲマワセハ思ノ外胃口ノ熱トシ  
 テ速ニ効モ有者然ルヲ胎ヲ見ルニ口ヲ大キク開カセテ見テハ咽  
 ノ奥見(サル)故此大黄ノカケ引ニ暗クナル之此等ハ大黄ニ手カ

マワラヌ療治ト云ヘシ此時ハ面大便ノ秘スルト秘セサルトニ委細カ  
 マワス惟舌ノ黄胎計ヲ目的ニ取テ大黄ヲ用テ苦ミカラス其巨  
 細ハ傷寒ノ瘟疫ノ熱カ胃ノ府ニ入ルニモ三段ノ區別有レハ  
 其三段ノ區別ト云フハ胃ノ上口ト胃ノ中程ト胃ノ下口ト此三  
 段ノ胃ノ上口ヲ蒸ハ其熱胃ニ入ルト云ヘシ未タ中程トツクリ  
 ト入りキラス熱ナレハ其熱淺ク輕ク夫ヲ折コシテ胃ノ中程ニ  
 入ルカ乃チ女陽明胃ノ府ノ熱ト云フテ此時ヲハ一向ニ離レキ  
 ツテニ胃熱ノ証トナル之而夫ヲ折コス寸ハ胃ノ底ニ熱カハリ  
 付テ蒸ス之此時大養氣湯ノ症之此女陽明胃ノ府ノ熱ヲ

三段ニ別テ其深淺輕重ヲ示ス者今此老黄胎ハ俗ニ云フヒ  
 子ト云フ一之黄胎カ段ノウノリテヒ子テ一等濃クソレニ此通リ  
 黄カヒ子テクルト初ハサヘテ黄色ナル者カ后ニ黄色ノ中ニ云ヒ  
 クスミカカハツテ濃クナル此時ハ黄胎カ咽ノ奥計テハサヒ各ノ  
 半スキ迫モノタリ出シテ黄色ニナル者今是ヲ老黄胎ト云フ  
 此時ハ胃ノ上ロヲ蒸シタテ計テナシ胃ノ府ノ中段迫熱カ  
 トツフリト入ル其故ニ老黄胎トナル此時一點ノ表症ナク  
 裏症計ニカタメル此寸大黄ノヲミライ表葉ハ大黄一味ノ  
 カケ引位ノ一ニテ治スヘキ寸ニ非ス是ヨリ兼氣湯受取マインノ  
 症ニ成ク是ヲ兼氣ノ舌ト云フモ可ク是ヨリ前ノ舌ハ表症ノ吟味  
 肝要ニ此老黄胎以後ノ舌ハ諸兼氣ノヲミライ肝要ニ其兼  
 氣ニモ亦輕重淺深ノヲミライ有各其條下ニ散見スルナレハ  
 併セ見テ其理ヲ知ルヘシ

薰黄胎之弁

薰ハフスホルト訓字ニ何ヲフスヘルナレハ前ノ  
 黄ヲフスヘル故ニ薰黄胎ト云フ前ノ黄胎ハ黒ヲカケテフ  
 スヘル寸ハ黒ミ半方黄色半方ニナル黄色半方黒半方ニナルハ  
 其舌濃キ茶色ト成ク此順ヲ以テ云ハ頓テ黒胎ニナルヘキ兆ノ  
 舌ト云フ此薰黄胎ノ謂前ノ老黄胎ハ邪カ胃ノ中徑ハ

トツクリト入りハ入レ入リタル迄ニテ未燥糞燥屎ヲ蒸シタテ、津液ヲ乾シセス程ノヲニモ至ラス故ニ老黄ハ老黄ト云フ迄ニ黒ト云フ交リ者ナレシ此薰黄ハソロソロ乾燥糞燥屎ヲムシ津液ヲ程ナクムシカワカメニス勢ヲ持タル古ノ故ニ黄黒相半メ茶色ノ薰黄胎トハナルコト是カ薰黄胎ノ謂テ有リ此ニッノ心得カ有ク其心得ト云フハ初表症交リノ黄胎ヨリ老黄胎薰黄胎迄ハ某ノカケ引ニ甚切者ノ入ル病人モ往々有リ其謂ハ或散漫ノ熱カ交リテ多キ寸ハ白虎湯ト出テ兼氣ノ類ヲハナト延引スルコトモ有又存ノ外柴胡ノ如キ者ハ大黃ヲ加ヘテ

スムコトモ有又急度上下行義ニ兼氣ノ類ヲ用テヨキコトモ有兎角黒胎ニシキラ又中ハ此指引有夫ハ諸症ノ目的ヲ併セ考ヘテ見方ヲヒニ切者不切者ナレト邪熱ノ進、ミマシハイノ目的ハ急ト右ノ通り心得テ居テ其上テ指引勘定ニ是カ目的ニ切者ナル人ハ療治ニ手カラモ有不切者ナル人ハヨクシテ取テ療治ノ上ニ拙キコト多シヨクク終行有ヘキ処ハ此等之コト此寸不切者ニ兼氣ナトヲ用ヒ過スニ因テ或血胸<sup>結</sup>或痞硬或未傳寒、中ナトノ諸症トナツテ大キナル患ヲ病人ニ残スコト有是医者ノ科ノヨクク心ヲ用テ診察肝心ノ時ト知ルベシ

黑胎之弁

凡テ物ヲ火ニ焼ハ黒クナル者モ其通クテ陽明府症ニ成テ胃ヲ大熱カ燒カ如ク蒸タテル故ニ黒クナル也此黒胎ハ前ノ薫黄胎ヨリ進ミ来テ黒クナル者ナレハ黒キ中ニ末<sup>ダ</sup>薫黄ハ十ノ者二三分ハヨリ有ク純黒胎ト云フニハヤシ間ノ有ク是ニ於テ熱毒カ一等深ク成テ胃ヲ蒸ス<sup>ト</sup>モ又一等強ク夫ヨリ胃中ノ津液ヲ乾シ毎日喰処ノ穀物ハコナレテ糞トハナレハ津液ノ潤ヒカナキ故ニ糞シフリテ肛門ニ下リ洩ル<sup>ト</sup>ナラヌヤハ腸胃ノ中ニ蓄積メ有ク様ニ其糞カ蓄積スル寸ハ假令ハ臭キ物ニ蠅ノ集ル如ク周身ノ熱カ此燥糞ノ臭ニ引レテ盡ク皆腸胃ノ

中ニ集ル是カ集リキルト乃テ次ノ純黒胎ニ成<sup>ル</sup>此黒胎ハ純黒胎ニナラントスル前ニ有ク是ヨリ大兼氣湯ヲ義スヘキ也ト云フ

純黒胎之弁

純ノ字ハモツハラト訓テ物ノ変リナキヲ純ト云フ今純黒胎ト云フ寸ハ前ノ黒胎ノ寸ニ三分ノヨリタル薫黄モ忒リテシメイ変リナクヘタ黒ニナル是ヲ純黒胎ト云フ然ルニ前ノ黒胎ノ寸熱毒カ津液ヲ乾シテ燥糞有レハ此寸末<sup>ダ</sup>黒胎ト成テ間モナケレハ津液モ十ノ物ナラハ二三分モヨリテ津液甘ツ<sup>バ</sup>リト乾クト云フ程ニ至ラサル也故ニ黒胎ト云フ也

ニテ純ト云フニ至ラズ然ルニ燥糞腸胃ノ中ニ有寸ハ燥糞ハ熱ヲ  
 ツ、熱ハ燥糞ヲ蒸シ愈包ハ愈蒸愈蒸ハ愈包熱ノ中ニ燥  
 糞有燥糞ノ中ニ熱集リ熱ト燥糞トカ一牧ニ成テ日夜ニ腸胃  
 ノ中ヲ蒸タテルニ假令ハ夏悪ク成タル臭肉ニハ必悪キ香ヲ生  
 スル者ニ此悪ク成タル臭肉ヲ道ノハタナトニ捨ヲク寸ハ此臭肉ハ  
 何方ニナク蠅カ臭肉ノ見ヘ又衽多ク集リテ其肉ニムラカリタ  
 カル者ニ俗ニ云フ臭キ物ニ蠅ノタカルト云フモ是ニ然ルニ今腸胃ノ  
 中ニ燥糞ノクモリ有モ其如ク熱臭ヒ燥糞ノ香腸胃ノ間ニ甚  
 シケレハ彼臭肉ニ蠅ノ集ル如ク周身ニハヒヨリテ有大熱モ自然ト

彼臭ニ陰レテ盡ク燥糞ノ処ニコレ集ル故ニ此府熱ノ証ニ成テハ  
 反テヤク周身ノ熱モ白虎湯散漫ノ熱リ如クヒトキ大熱ハ反  
 テ薄ク成ク是ハ如何ノ謂ナレハ周身ノ熱カ彼燥糞ノコレ集ル故ニ  
 體ノ大熱カ薄ク成ク惟兩ノ腋<sup>アキ</sup>下ト手心ト足心ト此処ニ熱カ強ク  
 シニトホテリ臭キ汗カ出ルニ是ハ腋下ト手足ノ心トハ胃ノ処  
 属成故ニ此衽腸胃ニ熱糞カ凝リ塊リテ蒸スナレハ胎モ  
 純黒ニナラ子ハナラヌ道理ニ夫故ニ純黒胎ヲ以テハ大兼氣ノ  
 正面ノ舌トハスル

潤黒胎之弁

潤黒胎ハ黒胎ニ潤ノタラト有舌ヲ云フ

之黒胎ニメ潤ナキ舌ハ実火ニテ下又舌之謂ハ是逆段ノ之通り  
之黒胎ニメ潤ハ此虚火ニテ補フ舌之虚实冷熱ノ区别同日ノ段ニ  
ハ非スヨクク諸症ヲ彼是引併セ同ヒ明メ療治ヲ誤ル不可

黒舌之弁

黒胎ト黒舌ト大キニ區別ノ有リ之黒胎ハ胎  
カ黒ク成之黒舌ハ脉胎ガナクメ惟舌カ黒クソレ之胎ハ厚ダマニリ  
物カ生スル是之此ヲトウシタ謂テ胎ト云フナレハ人ノ懐人メ腹ニ子ノ  
有ハ元ナキ者カ今有之胎カ舌ノ上ニ生スルモ其通り元ナキ者カ  
今有ト云フ意テ舌ノコビヲ胎トハ云フ之黒舌ハ此コビナクメ惟舌  
カ黒クソレ之此黒舌ト黒胎トノ区别之此黒舌ハ惟経気ノ餘

邪ニメ下ス舌ニハ非ス陰虚火動ノ人ノ傷寒ノ解シキヲサトニ右  
ノモ有又病后ニ陰火カ逆上メ舌カ黒クソレノモ有之然レ此舌ハ  
サリ驚ヘキ舌ニモ非ス其病症ノ茶ヲ用ル中舌ノ色自然ト治スル  
者多シ若シ治セス虚火ノ萎ニハ正脉散火逆ニハ滋陰降火ノ  
萎餘熱ニハ參胡芍薬ノ萎ヲ輕クアミライヲケハ何ツ治スルトモ  
ナク治スル者之是黒舌ノ謂ニ

芒刺舌之弁

芒刺トハ舌ノ上サメノ皮ヲ見ル様ニトケタツ舌  
ヲ云胎モナキニ惟芒刺計有リモ有或黒胎黒舌ニ交リテ芒刺  
ノタツノモ有雜病ニ久浮ノ症ニ津液ヲ乾スヨリ此舌有リ有

疫病傷寒ノ芒刺ノ弁ハ前ニ見ヘタリ又雜病吐浮ノ后ニ  
惟芒刺計有ハ吐浮ニ因テ津液ヲ亡スカ故ニ熱有ハ涼補ス  
ヘシ熱ナクハ惟錢氏白朮散或參苓白朮散ノ如キ者ヲ以テ  
ヒタト其津液ヲ調和スヘシ何レニモ此芒刺舌ハ大難治ノ症ニ  
乾燥舌之弁 是ハ舌ニ胎ナク惟潤ナクカラクト乾燥舌ヲ云フ  
此ハ老人虛人ノ傷寒時疫ニ有舌ノ是又津液不足ノ舌ニ  
舌ヲ以テ方ヲ云ハ滋補涼補ノ劑宜ク

赤舌ノ弁

此舌ハ舌ノ皮カ甚薄ク見ヘ甚シキハ竹紙ハ紅ヲ  
塗シ様ニ赤ク薄ク潤カトレテヨソツク舌ヲ云フ此舌ハ津液カ

八九分枯テシマイタル舌ノ極メテ不治ノ毒リニ許ス不可雜病ニテハ久瀉  
ナトノ症ニ多ク有舌ノ

裂舌之弁

是ハ舌カ裂テヒワレル舌ニ此舌ハ本下スヘキ症ヲ多ク  
下サス置ク中ニ元氣津液既ニ虚令メ熱毒モ又深キ症ニ潤シテ  
付元氣ヲ補ヒナカラソロクト下スヘシ急ニ下ス不可是又大難治ノ  
症ニ

白胎三舌之弁

凡テ傷寒温疫ノ初ニ見ス舌ニ有ハ淡白  
胎ニ一ツハ濃白胎ニ一ツハ厚白胎ニ是ヲ白胎三舌ト云フ之而淡白胎  
トハウスシラケウツスリト白キ舌ヲ云フ此舌ハ小柴胡湯ニ種々加減

サレ引ヲメ治スル者其次に濃白胎之濃白胎トハ右ノ淡白胎ノ色  
 カ一段濃成テ見ユルヲ濃白胎ト云フ胎ノ厚ク成ラズハ非ス是ハ小  
 柴胡湯ノ勢ノ強キ舌ナレハヤハリ小柴胡湯ニテ或石膏ナトヲ加（其  
 外種ニ小柴胡ニテ増損メ仕應スル舌之其次ハ厚白胎之厚白胎ト  
 ハ右ノ濃白胎カ一段厚ク成テ米ノ粉ヲヘツタリトヌリシ如ク見（ルヲ  
 厚白胎ト云フ之此厚白胎ノ舌ハ批毒カ愈クツノリテ頓テ胃（モ入  
 兼ル間敷キ時ニ見ハル、舌之此時ハ小柴胡湯アミライテハ届クコ  
 非スヨシ届ニメモ柴白湯或小柴胡加石膏湯煩渴スル者ハ白虎  
 湯大劑ニ宜シワキヒラ見ル不可何レニモセヨ石膏ニ心ヲ付（キ舌之此

厚白胎ニ煩渴ヲ兼シ証ナト黄芩黄連ナトノ若寒ニテ批ヲ解ントスル  
 一甚悪キ心得ク黄芩黄連ハ性止メテ不行カヌテ止批ヲ解スヲ多キ  
 者之石膏ヲ此場ニ用テ批ヲ解スマンハイ大キニ行キ方ノ違フダ者之  
 石膏ハ氣至テ輕クメ表ニモ達之故ニ石膏ハ表裏ノ批ヲヨク兼解ス  
 者之故ニ厚白胎ニハ必石膏正面ノ舌ト知レシ此厚白胎ニハ黄胎  
 カ変リ安キ者之其黄胎ノ見様ハ前ニ詳ニ説ニ後ニ略ス黄胎カ変リ  
 ハ周身ニ散漫シテ有批カワニマトヒテ頓テ胃ニ入トスル勢ノ批首舌  
 之故ニ厚白胎ニ黄胎ヲ兼ルヲ多シ黄胎ハ前ニモ云フ通り大黄ノ  
 持前之然レハ此厚白胎ニ黄胎ノ交リタル舌ハ大黄ト石膏ト



二味引かりノ舌ト云フ者此時大黃ヲ用テ石膏ヲ不用石膏月  
ヲ用テ大黃ヲ不用或大黃石膏凡ニ用テ表裏ヲ兼治スルカ此  
通り前後加減ノ次第ハ其時ノ病勢ノフリ合テ易ルニ推  
一途ニハ指南成難シ是白胎三舌諸方ノ有増ニ此厚白胎ノ  
次ハ黄胎ノ黄胎ノ弁ハ前ニ詳ニ併セ考フヘシ

白胎乾燥之弁

凡テ通例ノ白胎ハ燥キナカラモ潤ク皆ス  
ケキルト云フハナキ者今此白胎乾燥ハ夫トハ違ヒ初カラサツ  
ハリト潤カヌケテナクナル舌ニ是ハ如何トナシハ邪氣カ胃ニ入ル故ニ  
潤カトシテ乾燥スルハ白胎ト云ハ兼氣ヲ用テ下メヨキハ此白胎

乾燥ノ一ツニ限リテ有舌ニ是傷寒ノ時疫白胎ノ中ニ兼氣ヲ用ルル  
ト知ルヘシ然レモ是ハ表症未ク除カサルノ患定心付キ有ヘシ諸症ヲ  
就ト引併セ見テ裏熱ニ相違ナキヲ見届ケテ下スヘシウカツニ心  
得不可或人問テ曰邪熱カ胃ニ入ハ舌カ黄色ニナルヘキト此其常  
ニ然ルヲ反テ今舌胎白色ヲ見メ黄色ニ變セサル理如何答テ  
曰白胎カソロト黄ニナルハ熱邪モ又ソロト胃ニ入ル寸ノ一ニ是  
白胎乾燥スルハ夫トハ違ヒ惟今表ニ有ヘシ邪カニハツマナク急  
トツト胃ニ落込一種ノ症有此寸ハ舌モ黄色ニ變スル間カナキ故  
ヤハリ表熱ノ白胎ノ終テ乾燥スルニ畢竟ノ処ソロト邪カ

胃ニ入ル寸ニハ黄胎ヲ見シ急ニ入ル寸ハ乾燥ト成然レハ此乾燥ハ  
黄胎ノカワリナルヲ明白タリ是黄胎舌ノ變ナル者ニ

小兼気湯之口授

大黄四 厚朴四 枳实三 右水煎

上焦痞滿甚者之弁

前ニモ云フ通り痞滿燥实堅ノ五全ク

備ル者ハ大兼気湯ノ症ニ此小兼気湯ハ痞滿燥实堅五ノ目  
的ノ中痞滿ノ二強クメ燥实堅ノ三ハ未タ備ラサル者ニ用ルノ  
法ニト知ル見コレ兼気湯ナルベシ小柴胡立方ノ本旨ニ前ニモ云フ如ク傳経ノ熱ノ腸  
胃ニ入ルハ胃ノ上ロヨリメ入ルニ假令ハ德利ノ口ヨリ物ヲ入ルカ如ク  
此胃ノ上ロハ腹ノ中ニテ胸ノ邊ニ當ルニ故ニ熱カ落コム寸ハ胸カ

痞トツカハ腹カ滿トミナルニ此故ニ芩モ枳实ヲ以テハ胃口ニ集ル処ノ  
邪熱ヲハ胃ノ中ニサラヒコシ胃ノ中ニサラヒシクタル熱毒ヲハ大黄  
厚朴テ大腸ハ推シユカシテ熱毒ヲ大便ヨリ去ルニカケノ方之ニ此寸  
ハ未タ熱カ胃口ヨリ胃ノ中へ入りタル分ニテ大便モ惟硬ト云フ分ニ  
テ結糞燥屎ナト云フ段ニハ未タ餘徑間ノ有時ニ結糞燥屎  
トナラ子ハ津液ヲヒスト云フニモ未タ間ノ有寸ニ故ニ芒硝テ潤ス  
モ入ラヌ時ニ故ニ此一味ヲハ去ルニ然レハ此小兼気湯ハ胃中ノ結糞  
燥屎ヲ目的ニ組タル方ニハ枳ス胃口ノ熱ヲ重ニ組タル方ニト知ル  
故ニ此方ノ目的ニハ痞滿ヲ重ニ組タル方ニト知ルハ故ニ此方ノ目的ニハ痞滿

ヲ重ニ取テ燥実堅ト三ハ取ラヌ取ルモ是ヲ次ニ用ルハ是ニ因テ  
是ヲ見ルハ小兼氣ノ至柔ハ其要枳實ニ有<sub>レ</sub>之ハス此其理ヲ知ルベシ

微和胃氣之弁

傷寒論曰若腹大滿不通者可與小兼氣

微和胃氣<sub>ヲ</sub>勿令<sub>レ</sub>大泄下此傷寒論ノ文句ニテ小兼氣湯ヲ用ル  
調場サラリトスム<sub>ハ</sub>是ヲ六ヶ敷心得沙汰ハ大キニ惡シト云ハ大  
兼氣湯ハ結糞燥屎ノ石ノ如クコク<sub>ク</sub>スル程堅クコリタル大便ノ  
有<sub>レ</sub>症ニ用ヒ此小兼氣湯ハ腹カ大キニ滿テ大便ノ通セヌ者ニ用ルト云  
テ理屈ハサラリト別テ居ル腹カ大滿スルハ大便カ腸胃ノ間ヲタワ  
ラスメ<sup>ヒガ</sup>蔓<sub>リ</sub>テ通セヌ故ニ腹カ大滿スルハ大滿ニ計テ燥実堅ノ

三ハナシ故ニ腹大滿メ通セサル者小兼氣湯ヲ子フト云<sub>レ</sub>リ而又カシク胃ノ  
氣ヲ和スルト云<sub>レ</sub>ハ小兼氣湯調胃兼氣湯ノ二方ニ有<sub>レ</sub>ケレハ大兼氣湯  
ニハ胃ノ氣ヲ和スルト云<sub>レ</sub>ナシ是ニテ小兼氣湯ノ痞滿ヲ目的ニ用ルノ謂  
盡ク知ルヘキ<sub>ト</sub>又芒硝ヲ公テ小兼氣湯トシタル謂モ知<sub>レ</sub>ヘキ<sub>ト</sub>シク  
トク云フニハ及ハス〇傷寒論曰若不<sub>レ</sub>大便六七日恐有燥屎欲<sub>レ</sub>知<sub>レ</sub>之  
法少<sub>シ</sub>少<sub>シ</sub>小兼氣湯湯入腹中轉失氣者此有燥屎乃可攻之若  
不<sub>レ</sub>轉失氣者此初頭硬後澹不可攻之攻<sub>レ</sub>之必脹滿不能食也  
此文句ニテモ大兼氣湯ハ燥糞燥屎ヲ目的此方ハ惟腹滿便鞭キ  
ヲ目的ニ用ル方ナル<sub>ト</sub>知ル<sub>レ</sub>

調胃兼氣湯口授

大廣芒硝甘草此調胃兼氣湯ノ藥品也

大兼氣湯症無痞滿有燥實堅者乃調胃兼氣湯ヲ用ル  
正面ノ症ト知ルヘシ

無痞滿之弁

大兼氣湯ノ症ノ寸ハ腸胃ノ中ニ燥糞大燥屎

ノ有迄ニ熱毒カ十分ニ有上更ニ又アトカラ續テヒクモノ周身ノ

熱カ胃口ヨリ入ル勢有故ニ痞滿モ腹滿モゴクニ有ニ其故大兼

氣湯ニハ厚朴腹滿ヲ治シ枳實痞ヲ治スルノ藥品有枳實テハ胃口

ノ熱邪ヲ胃中ニ驅落シテ痞ヲ治シ厚朴テハ大黃ニカラソノカラ腹滿

ヲ治セントノ主意ニ今此腸胃兼氣湯ノ熱ヲフリ合ハ左ニ非ス惟腸

胃ノ中ニ熱毒カ集ルタケテ集ッテシコイ周身ノコケヘキ熱モナシコケベキ

熱ナケレバ胃口ニ塞ル熱モナシ胃口ニ塞ル熱カナケレバ痞滿モナキ

道理ノ痞滿ガナケレハ枳實ニ用ザシ又腸胃ノアラタニ落コム熱カ

ナケレバ惟先ニ落コムタル熱カ燥糞ヲムス計ニ然レハ腹カ硬キ計

テ腹滿ハナシ腹滿カナケレハ厚朴ニ用ハナシ此方ニ枳實厚朴ナキ処ノ

謂如此又熱毒カ傷胃ニ計有テ燥糞ヲ蒸スノ最モ強ケレバ津液

ノ乾キモ最強ノ津液ノ乾キカ最モ強キ寸ハ芒硝ノ湿リ氣下ス菜

ニハ又親切ニ入用ニ是此方ニ芒硝ノ有主意ニ大黃ハ云ハズ凡謂ハ知シ

タルト又此方ニ甘草ノ有謂ハ大兼氣湯ノ如クニニツマナク下スノ一

途ニ急ナル寸ハ久ク畜熱ニ苦ム腸胃ニクタヒレ有シテ恐ル故ニ甘草ヲ以テハ腸胃ヲ調和シナカラ緩ク下ス故ニ方ヲ調胃トハ云フ其上方甘草ニハ急ヲ緩フスルノ能有大黄芒硝ノ下行ノ勢ヲユルメテ腸胃ニ持セテ緩ルニト下ス心モ有ク此方ニ甘草ヲル至意如此何ノヲハナク大養氣湯ハ急ニ下シ此方ハ緩ク下ス方ト心得ヘシ甘草ヲ以テハ大黄芒硝ノ猛烈ニユルミヲ付クル者其緩ムタケニ腸胃ヲ助ケル場カ有ク謂胃ノ方名是ニ因テ味ヒ知ル

上中下三段之弁

小養氣湯ハ胃ノ上段ノ熱ヲ解シ大養氣湯ハ胃ノ中段ノ熱ヲ解シ調胃養氣湯ハ胃中ノ下段ノ熱ヲ解ス

是又三方解熱ノ役割ナル者

燥實堅之弁

燥實堅ノ三ハ前ニモ云通シ燥糞燥屎ノ

有三ノ目的ノ故ニ痞滿ナク燥實堅有者ハ調胃養氣湯正面ノ目的ト知ルヘシト教ル

玄明粉制之弁

芒硝ヲ磁鍋ノ中ニ入レ火ニカケテ口カシ磁鍋

ヨリ出メ熱トサマシ芒硝十兩ニ甘草二兩ヲ入レ細末ノ用ニ是ヲ玄明粉ト云王宇泰カ医鏡ニ此經驗有凡テ芒硝入ノ茶ヲ數服ツヒテ用ヒ度ト有レ氏后ノ倦怠<sup>クダヒシ</sup>ナトヲ恐レテ用ヒ難キ症ハ玄明粉ヲ用ユヘシ甚其性柔ニノ用テ害ナシ芒硝デ一公用ル処ニ公用テ

モサワリナシ相應ニ効有是乃々調胃養氣湯ノ大黃ナキ者ハ凡テ  
結糞ヲ朝夕持病ノ様ニ苦ム者是ヲ凡菜ニメ用テ効ヲ取ル有  
乃々調胃養氣湯ノ心得ヲ以テ用テ宜キ症有我徒是ヲ識テ可也

大陷胸湯口授

下後心胸鞭滿而大痛其勢引及小腹  
者大結胸也此方主之 大黃芒硝甘遂 右三味温服煎法傷  
寒論有略ス

大結胸之弁

凡テ傷寒ノ表邪ヲ裏邪ト心得テ誤リ下メ  
其裏ヲウカラス寸ハ邪熱カ其弱ハウケコンテ裏ニ入ル其裏ニ入ルニケ  
処ノ區別有先着ニ胸ノ其次ハ心下ノ胸ニ熱カ陷ル寸ハ結胸ノ症

ト名付ル心下ニ熱カ陷ル寸ハ痞ト名付ル胸ハ高ク心下ハヒクシ此結胸ト  
痞ト邪熱ノ陷ル高下ノ分ニ故ニ胸中ニ陷ル熱邪ノ症ヲ結胸ト云ヒ  
其菜名ヲ陷胸湯ト云フニ陷ハウケイルト訓字ニ大陷胸湯トハ  
裏ノ弱ニウケコンテ表邪カ大ニ胸ニ陷ルト云フ意テ大陷胸トハ名  
付タル者

決結胸之弁

結胸ラシキ病人ヲ受取ル寸是ハ結胸カ外ノ症  
カ其症方ラス疑ノ有ニ病人ヲ決スルハ傷寒疫病ノ糞ナラハ先医カ  
養氣ノ糞ヲ以テ下メ后ニ此痛ミ榮リシヤト問フベシ若下シタル有テ  
夫カラノ痛ミト云ハ是結胸ニ相違ナシ又雜病ニテモ食傷ノ吐泻

ナト強クシタルアトニテ心胸痛テ手モツケラレ又衽ナラハ是傷寒時疫誤リ  
 下メ致ス処ノ結胸ニハアヲ子尼吐浮ニ因テ中ヲワカラシ其ツカレノ弱太  
 批痰ナトカ付コシテ胸へ陷コムアハハ傷寒之瘟疫誤下ノ発ル処ノ  
 結胸ノ裏ニカワルナレハ其寸ハ結胸ノ某ヲ用テヨシ又心胸ノ造  
 ヲリ小腹ニ至リ痛ミ甚メ手モツケラレ又衽痛ム症ニ合ヒ結胸ノ痛カ  
 惟腹滿ノ痛ミカ是モマキラワシクメ別リ兼ルコトモ有シ夫ナレハ心胸ノ  
 痛ミカ腹へヒロカリテ痛カ又腹ノ痛カ心胸へ外リテ痛ムカト聞テ  
 心胸ノ痛ハ腹へヒロカリタルト云ハ是結胸ノ痛ミニ相違ナレ此結  
 胸疑似ヲ極ムルノ一方ニ

結胸必兼痰飲之并

劉心山曰結胸痞滿多由痰飲凝結心  
 胸故陷胸浮心用耳逐半夏枯薑枳實旋覆之類皆為痰飲  
 而設也云是至テ確説也邪熱カ痰ヤ飲ヲ心胸ニマ子キ集メテ痞  
 ト成結胸ト成シ或人間テ曰結胸ニ痰ト飲トヲ集ムル理ハ如何答  
 曰古語無形之邪類有形之物而凝結云フ有シ熱ハ無形之  
 氣也痰ト飲トハ形有物ノ無形者必有形物類テ集マラ子ハ集ラ  
 レヌ物ノ其語據ハ奇怪ナトノ晝バケル怪物ハナレ多ハ夜ハバケル是ハ  
 トウシタ謂ナレハ夜ハ陰ノ陰ハシメヨセテ形ヲナス者冬ノ氷カハルモ  
 是ニ而怪物ハ形ノナキ処ハ形ヲナスハ此形ノ無也其形ノナキ者ハ陰ノ

カラヲカラサレハ形ヲナスカ出素又ハ故ニ夜バケルコト又 靈ナトノ人ニ  
 取付テ崇リヲナスモ靈ト云フ者ハ氣計ニテ形ハナキ者ハ故ニ形ノ有人ニ  
 取ツイテウラミヲ云フハ是無形ノ氣ハ有形ノ者ニ固テ凝結ストハ是  
 ヲ云フ今有形ノ熱邪カ心胸ニ陷テ結胸ト成テ痛ヲナスモ右ノ理  
 ト同シク痰ト飲トハ有形ノ者ハ熱ハ無形ノ氣ハ無形ノ氣心胸ニ  
 凝ハ有形ノ痰ト飲ト持タレテ凝結スルハ是劉心山ノ云ハレシ処ノ  
 説ハ是ハ故ニ結胸ノ茶ハ必ス痰ト留飲トヲ治スル茶ガ有ハ此故ト  
 知ルヘシ痰ト飲トヲ治スルハ痰ト飲トニカラマル処ノ無形ノ熱ハ凝  
 ヲナスカ能ス凝血<sup>結</sup>ヲナスカナラ子ハ痛ミハ去ル道理也猶此并腹診<sup>并</sup>

痞積ノ條ニ詳ナレハ併セ見テ其理ヲサトルヘシ而大兼氣湯ノ症モ此  
 理ニハツル、一ハナシ熱ハ無形ノ有形ノ燥糞燥屎ニ因テタ、リヲナメ大  
 兼氣湯ノ症トナルモ是無形ノ邪ハ頼<sup>ラ</sup>有形之物ニ而凝結スト云フ理  
 トヤツハリ品ハカワレ氏同シク此理ヲ推メ心下痞硬ノ道理モヤハリ無  
 形ノ邪カ有形ノ物持タレテ痞鞭ト成理是又推メ知ルヘキ処ハ其  
 中心下痞硬ト結胸トノ區別ハ痞ハ輕ク結胸ハ重ク重キカ故ニ  
 大黃芒硝ニ甘遂ヲ組合セテ大陷胸湯トハナシタル者ハ輕キ故ニ黃連  
 半夏瓜蒌ノ三味ヲ組合セテ小陷胸湯トハナシタル者ハ其茶品ヲ  
 見テモ邪氣ノ輕重自ラ知ルヘシ



大陷胸湯藥品之弁

或人問テ曰大陷胸湯ノ藥品大黃芒

硝ノ有ハ何ノタメソヤ大黃芒硝ハ大兼氣湯ノ枳實厚朴ヲ合リタル者ノ  
結胸ハ無形ノ邪カ有形ノ痰ト飲トニ持タレテ結胸トナル結胸ハ  
其邪胸中ニ有然レハ大黃芒硝ヲ用テ科トカモナキ胃ノ府ヲ攻ルハ及  
ハ又道理ニ是此大黃芒硝ノ凝有処ニ結胸ハ痰ト飲トカ胸中ニ  
凝結血スルナレハ一味ノ其遂留飲ヲ逐ヒ驅痰スミタルト然ルヲ大兼  
氣湯ノ中ノ大黃芒硝ヲ爰ニ用ルハ畢竟ノ処トカナキ胃ノ府ヲ  
搏うつテ無益ノ藥品ト云フ位ノ者ニ然ルヲ此方ニ大黃芒硝ヲ加ハタル意ヲ  
知ルヘカラス如何答テ曰此時胃中ニトガナキト見ルハ大キニ誤トトガナキニ

何ソ大黃芒硝ヲ用ニヤ或人又問テ曰胃中ニトガ有ト云フ其謂如何答テ曰  
トガト云フハ胃中ノ燥糞燥屎ノ故ニ硝黃ヲ以テハ其燥糞燥屎ヲ  
去リ其傍ヲ其遂ノカラヲタスケテ痰飲蕩滌ス其立方ノ本旨成者ノ  
或人亦問曰結胸ハ誤下ニ因テ痰飲ヲ膈ニ結フ症ニ此時腸胃何ソ  
燥糞燥屎有ヤ答曰左ニ泄ス傷寒傳經ノ治方ハ凡テ兼氣湯糞  
ヲ以テ下サントスル寸ハ必ス表症ノ有ヤナシヤヲ盡ク診察ヲトケ若シ女  
ニテモ表邪除カザル寸ハ不可用盡ク除ヒテ其熱下筋ニ理裏ニ落ル寸ハ  
乃テ大兼氣ヲ用テ重ク下ス者カ小兼氣ヲ用テ輕ク下ス者カ何レ其  
輕重ヲ見合テ下スベシト云フカ傷寒治方ノヲキキ今此大陷胸之

結胸ハ熱邪カセ八分通リハ胃中ニ落込モハヤ燥糞燥屎ハ余程腸  
 胃ノ間ニ畜積シタル症然レ尺二三分ハ表邪ノ患有其寸医者此ヲ見  
 ル下早くニシテモハヤ表熱ハナシト覺テ大柴胡湯ヲ以テ誤下シタル  
 者然レハ大結胸ノ症ハ七分ノ燥糞ニ三分ノ痰飲ヲ凝結メ患  
 胸膈ニ止メテ大結胸ノ症ト成又無形ノ熱邪カ胃中ニ入テ燥糞  
 燥屎ト成テ熱毒ヲ胸膈ノ下ニ凝結シタル者然レハ痰飲計逐  
 テモスニス腸胃ノ燥糞ヲ逐計ニテモスニスハ腸胃ノ燥糞ヲ驅リ  
 ハ胸膈ノ痰飲ヲ驅リニツナカラ治サ子ハナラズ症之故ニ大黃芒硝ヲ  
 用テハ甘遂ニカラフシナカラ腸間ノ熱毒ヲモラシ甘遂ニテハ結胸ノ

熱邪ヲカルシカケノ方組此方ニ大黃芒硝ノ有処ノ主意故ニ心ヨリ小  
 腹ニ至テ硬滿ノ痛ニ不可近手モト有モ心胸ヨリ胃中ニ吐ガ有故如此  
 腹ハハイニ痛ミガ有シ若シ胃中吐ガナリ惟胸計ニ痰飲凝結スルハ  
 胸痛區別有ハツ如此硬滿痛ノ症決メ有不可放之胃中モ亦トガ  
 有知レハ是は大陷胸湯ニ大黃芒硝有処ノ主意

虚気結胸之弁

枳實理中丸至之霍行功曰傷寒結胸欲絶  
 心膈高起手不可近用大陷胸湯不瘥者此下后虚逆氣已不  
 理毒亦上攻當用枳實理中丸先理其氣次調諸疾用之如神活  
 人云誤下未成結胸者急頻理中湯自然解了蓋理中湯

治中焦故也胃中食和傷寒未退者宜候日數足却以養氣再

下之蓋前來之下未是也此條熟用心ヲ用テ訓(レ)前ニモ云フ処大結

胸ハ無形ノ熱邪カ有形ノ痰飲ニモタレテ心胸大實痛ヲナス症ノ

此枳實理中丸ノ症ノ虛氣結胸ハ胃ノ氣クダビレルヨリ惟無形ノ

氣カ烟ノ如ク霏霧ノ如ク胸中ニ無形ノ邪ヲサソヒツレテ上攻スル症ノ

故ニ是ヲ虛氣結胸ト云フ是乃虛氣モ無形ノ邪氣モ無形ノ無

形ノ虛氣カ無形ノ邪ヲサソフテ胸ニ凝ル是又一種ノ結胸然ハ

胸ニ太ニ痛テ高ク起リキモツケラレ又病勢ヲ見テハ誰モ大陷胸

湯ヲ用テ大結胸ノ症トハ見ベキ然レ其通リ療治ヲメ効ナキ寸ハ

是虛氣結胸ノ症シヤト医按ヲキリカエテ枳實理中丸ヲ用テ其胃ノ虛

氣ヲ調合ス<sup>理</sup>べし其効如神速ニ治スルト云フ謂又治人書ニ云ハ若誤

リテ下メ后ハ結胸トナラス凡下先急理中湯ヲ与テ其氣ヲ調理スル寸

ハ結胸ノ患モナク病症モ解スル有然レ凡邪氣患ヲナス者ハ燥糞

燥屎耳有テ表症盡ク去ルヲ待テ是ヲ下ス<sup>レ</sup>是ハ何ノ<sup>レ</sup>ハナク前ノ下

足ラヌ処ヲ下ス<sup>レ</sup>ト云フ<sup>レ</sup>此方ニ因テ經驗甚ク多ク凡テ結胸ノ治方此

ヲ面ニ治メ効ナキ寸ハ是必ス此ヲ裏ニ求メヨ實ニ求メテ効ナキ寸ハ是ヲ

虛ニ求メト云フ古語ノ教(實ニ虛氣結胸治方ノ謂)

胸滿之并

傷寒六書曰蓋表邪傳裏必先胸以至心腹入胃是

以胸滿多帶表症宜微汗傷寒六書云此意ハ先太陽經ノ邪氣  
 ヲ受テ表症ト成リ其表邪カ陽明經ノ傳ヘテ夫カラ  
 段々裏ニ傳テ頓テ胃口ニ熱カ落入トスル寸ハ必ス先其邪カ胸ニ集リ  
 胸ヨリ心下ニ集リ心下ヨリ又腹ニ集リ夫ヨリ胃中ニ熱カ入ル是傷寒  
 傳經ノ邪ハ胸ヲ經テ胃ニ入ル是傷寒傳經ノ常ノコウ云フ謂故  
 胸滿ハ多ク表症ヲ兼ル者ノ故ニ其治方モサシ汗ヲ取ルカヨト云フ意  
 此心ヲ結胸ノ上ニ移ル見ルヘシトガナキ胃ヲ下ス寸ハ表邪胸ニ集リ  
 テ結胸トナル道理分明也但六書云フ胸滿ハ惟無形ノ邪カ胃  
 ニ落コム処ノ胸滿ナレハ有形ノ者ヲサソワスメ胸滿スル結胸トハ理ハ  
 同ク相違有其相違ハ結胸ハ必ス有形メ痰飲ヲサメテ胸ニ凝結ス  
 是相違ノ治方モ又相違有結胸ノ胸滿ハ痰飲ヲ駈ルヘシ傳經ノ胸  
 滿ハ微汗ニ宜シ是其區別也

枳實理中凡目的之弁

此方ヲ用ルニ口訣有下后ノ虚逆ト云フニ心ヲ

用テ診察スヘシ是肝要ノ診処ニ大陷胸湯ノ痛ハ痰飲ト云フ者  
 カ有テ痛ム之故ニ推メ猶痛ニ推ザレバ 痛スル此方ノ痛ハ惟物  
 ナク無形ノ熱氣ト胃中ノ虚氣トカ胸ニシヨリテ痛ヲナス之假令ハ  
 紙ノ袋ハ息ヲ入レタルカ如ク滿痛スル之故ニ其痛ム処ヲ手ヲ以テ推ニ  
 大陷胸湯ノ如ク推ハ推ホド痛ムトハ違フ此方ノ痛ハ手ヲ以テ

輕ク推ハ反テ痛ミ一等チヲ重ク下ノ推ス寸ハ反テ其痛クシ快キ  
ヲ覺ユル是乃チ虚氣ノ結胸ノ痛ミヲシバイシは無形ノ熱ト無形虚  
氣トノ集ル迄ニテ物ナキカ故也

結胸經驗之弁

予一農夫ヲ治シタル有他(行テ酒肉ニマク心  
腹痛之甚シ医食爵ノ中焦ニ滯リ有テ見テ大養氣湯ヲ以テ是ヲ  
下ス浮利十八九度計メ腹痛全快ス間モナク心胸硬痛シテ小腹モ  
亦正クルカ如ク痛ム先医謂末々食毒カノコリ有故ニ痛モ強シト又備  
急丸ヲ用エ吐瀉甚ク腹痛モ亦強シ予治ヲ求ムヤ病付ノ沈多療  
治ノ沈多ヲ聞ニ盡シテ皆傷寒結胸ノ理ニ中レリ惟結胸ノ熱ノセク

メ女之病痛モ文リタル様ニ見ユ因テ枳縮ニ陳湯ニ黃連ヲ加(テ用ユ茶ニ三  
行咽ニ下ルト女シ快シト云フ都合茶服八九服ニメ全快ヲ告タリ是乃  
虚氣ノ結胸ノ變シタル者ニ是ニ限ラヌ結胸ニ痰茶ヲ用テ治シタル  
例甚多シ是結胸ニハ必痰ヲ集ルノ理其症明白也

清火化痰湯經驗之弁

此方回春出タル方也治熱痰在胸膈間

不吐不化咯出寒熱氣急滿悶作痛者

黃連 黃芩 梔子 瓜蒌 貝母 枳殼 陳皮 半夏 茯苓 蘇子 朴硝  
桔梗 甘草 杏仁 桑皮 木香 別研 姜水煎入竹瀝姜汁少許

解熱下痰湯經驗之弁

治傷寒結胸有痰有熱有氣滯

嗽失聲者<sup>エ</sup>

世三

蘇子 白芥 枳實 黃連 桔梗 黃芩 石膏 瓜蒌 杏仁 烏梅  
黃栢 甘草 生姜水煎 右二方傷寒溫疫結胸ノ症ニ用テ大効  
ヲ取シ一一度ノ之ヲヨリ以來結胸ムキノ症ハ傷寒論ノ方ヲ用ヒス此  
二方ノ中ヲ選ヒ用テ十ニ八九治セスト云フ一ナシ是ヲカ經驗ノ方

一方經驗

治大熱妄言胸痛痰喘脉有力者

桔梗 黃芩 杏仁 桑白皮 蘇子 石膏 枳實 甘草 陳皮 半夏  
茯苓 前胡 此方本岡本云治翁某方口傳ニ出タル方也此方モ大

熱ノ結胸ヲ治メ能効有方ト云カ門人語りケリ又一医ノ經驗ニ瓜蒌

枳實湯ニ木香ヲ添テ柴胡ヲ加ヘ小結胸ノ症ヲ治スト云ノ此又經驗スヘキ  
一我カ門人試見<sup>コノカ</sup>ノタメ爰ニ記シ置ク者

水結胸之弁

水飲過多水結胸下者胸中痛而引脇下怔

忡頭汗出小半夏加茯苓湯合小柴胡湯云大棗加牡蛎主之或人問  
曰水飲過多ナル寸ハトウシタ謂ニテ兩脇ノ痛ムヤ答テ曰水ハ潤下ノ  
性ナルヲ以テ多ハ兩脇ニ流シ是ヲ以テ痛ム又問テ曰怔忡ユル謂ハ  
如何飲邪上ヲ犯セハ心君其崇リヲ受テ安シセス故ニ怔忡スル怔忡  
トハム子カヲトルヲ云フ頭汗ハ如何答テ曰熱表裏ノ間壽スル寸ハ  
其地<sup>ハ</sup>邪外ニモル一ナシ故ニ飲邪ヲサソフテ上ニ走り頭汗トナル

但血方ニ走リテ上ル寸ハ血ト成氣方ニ壽スレハ頭汗ト成水結  
胸ノ症ニ此方ヲ用テ經驗シタルニ三人効ヲトレリ

血結胸之弁

胸膈痛手不可近嗽水不欲嚥喜忘如狂

大便黑小便利犀角地黄湯主之或人問嗽水不欲嚥一  
ヲ以テ血結胸ノ目的ニ取ル謂ハ如何答テ曰熱カ裏ニ有ハ渴メ水  
ヲ飲カ常ク今裏ニ熱カナキ故ニ水ヲ嗽ク追、飲又シ而水ヲ  
嗽ハトウシタ謂テ嗽クナレハ陽明ハ氣肉ヲ主ル唇ハ氣肉ノ  
根本ノ故ニ熱カ氣肉ノ分ニ有寸ハ唇カ燥テコツパノ如テ浮タ  
チカラクト成シ此自然ノ道理今水ヲ嗽クハ此唇ノ燥キヲ

シメサシカカニ嗽ク此陽明ノ經熱ニメ府熱ニハ非ス故ニ水ニ嗽テ飲  
不能ク又問テ曰陽明ノ經ニ熱カ有ハ如何ソ謂テ以テ血結胸トハ  
成シ答テ曰陽明ハ多氣多血ノ府ニ故ニ陽明ニ經熱カ盛ニ成寸ハ  
其血カ妄行逆上メ或血ト成或胸ニ上逆メ血結胸ト成又問テ曰  
喜テ妄一ツヲ以テ血結胸ノ目的ニトル謂如何答テ曰今療血胸中ニ上テ  
血結胸ト成胸ハ心ノ臟ノ処當ル心其血ニ犯サレテ心ノ本臟ヲ失フ  
故ニ物忘レヲスル又或人問テ曰如狂ト大便黑トノ二ツヲ以テ血結胸ノ  
目的ニ取ル謂ハ如何答テ曰其謂ハ桃仁承氣湯相當湯ノ條下ニ詳  
ク合セ見テ其理ヲ知ルヘシ又問テ曰小便利スル一ツヲ以テ血結胸ノ目

的ニ取ル謂如何答テ曰小便ノ利スルハ邪熱カ血分ニ有テ氣分ニナシ故ニ  
 小便カ利スル之若熱カ氣分ニ有ハ必々小便カ不利スルニ小便ノ利ト不  
 利トノ二ツヲ氣分血分ノ目的ニ取此謂ト知ルハ此血結胸ノ主方上  
 血ナルカ故ニ先其表ヲ治スルカタメニ犀角地黄湯ヨシト云フ者是ハ  
 輕キ寸ノ寸重キ寸ハ桃仁養氣湯デナケレバ効ナレト知ルベシ犀角  
 地黄湯ハ上血ノ未ヲ治ス故ニ輕キ症ニハ効有レ氏重キ症ニハ効ナシ桃  
 仁養氣湯ハ陽明ノ本ニカクテ血結胸ノ因テ來ル処ノ其本ヲ治ス故ニ  
 重キ症ニ用テ理有陽明ニ瘀熱ナリニハ血結胸モナキ道理ニ故ニ  
 陽明ノ瘀熱ハ血結胸ノ本ニ桃仁養氣湯ハ其本ヲ治スル方ニ犀角

地黄湯ハ其瘀血ノ末計ヲ治メ瘀血ノ本ハ治セサル方ニ此ニ方ノ輕重区  
 別ノ処ノ者ニ

**寒實結胸之辨**

寒實結胸トハ寒實メ結胸熱症ナキ者  
 ハ三物白散至之ニ三物白散ハ桔梗貝母巴豆細末ニ白湯ニ用  
 べシ〇寒實ト云ハ中寒寒毒ナドノ症ヲ見ル様ニ寒毒カソコニテ  
 夫ヨリ胸痛ナドガ起ル心得ルハ大キニ非ズ寒實トハ寒痰カ胸ニ實  
 メ結胸ト成ト云フ心テ寒實ト云フニ寒ハ惟性無熱ヲ指メ云フ手  
 足厥冷ナトノ寒テハナシ其症熱ナクメ痰集リテ結胸ト成是カ寒  
 實結胸ニ但熱ナシト云ハ氏一向ニナキデハナイ惟大結胸ノ熱カ



う見レハナイト云フモ同然ノ一故セハ熱ハ有レ一向ニ熱カナケレハ惟  
 一應雜病ノ痰ノ胸痛ト云フ者ニナル結胸ト云フハ下ノ邪カ胸  
 ニ陷リ更ヨリ水ヲ集メ瘀血ヲ集メ痰ヲ集メテ胸痛スルカ傷寒ノ  
 結胸ニ此外邪ノ陷入ガナケレバマハリ常ノ胸ノ痛テ有レ此傷  
 寒ノ結胸ト平日ノ胸ノ痛ト爰テ別ル処ニ至方ハ三物散是其  
 至方ニ陶節庵カ傳寒六書曰結胸ハ乃下早而成未嘗  
 経下者非結胸也ト云フヲ見テモ結胸ノ謂ヲ知ルべし右痰飲ノ  
 結胸ノ外ニ虚気結胸水結胸血結胸寒実結胸此四ツノ  
 結胸有其理ハ同シトナレ凡病因ハ五ツニワケ子ハオラス其巨細ハ

大陷胸湯ノ症ノ大結胸ハ其病同無形ノ熱邪カ痰飲ヲサソヒ集  
 メテ結胸ト成此一因ニ其次ハ惟無形ノ邪気カ何ニモサソワズ無形ノ  
 邪ト気カシユリテ結胸ト成此二因ニ其次ハ病人カ水ヲ飲スギテ折  
 シモ早ク下ス療治ニ遇テ邪気カ胸ニ集ル寸其水ニミクシテ凝結メ結  
 胸ト成此三因ニ其次ハ熱カ血分ニ有寸早ク下シ合テ瘀血ヲ胸ニサソフテ  
 結胸ト成此四因ニ其次ハ寒カ痰カ胸ニシユリテ結胸ト成是五ノ因ニ  
 此五因ハ乃チ其病人ノ早ク下ス寸其胸膈ニ有合セタル物ニ無形ノ邪  
 カ取合セテ結胸ト成レ左スレハ病人ノ其心胸ノ有合ノ物次第  
 ニテ或ハ水結胸ト成或血結胸ト成或寒実結胸ト成或又物カナ

ケレハ虚気結胸ト成シ此結胸ニ五ノ區別有ル者ニ是又心得ベ  
キノ一ツ

世七

小陷胸湯之口授

黄連一兩 半夏手引 瓜蒌一枚 右三味水煎ス

小結胸ト大結胸トノ區別ハ大陷胸湯ハ上心胸ヨリ下小腹  
ニ至テ盡ク滿痛スシカモ其痛キヒシクメキモ不可忍又此小陷胸  
湯ノ症ノ小結胸ハ傷寒下メ后心下之真中ニ有テセシ滿痛  
惟手ヲ以テ推サバハキヤクト痛ムヲ覺ズ手ヲ以テ重ク推スバハ  
愈ク痛ミ強キ者此乃チ小結胸ノ見様ノ區別ノ切要方義言若  
下后胸中滿痛スル者ハ因下之太早邪氣乘虚而入也本方合

小柴胡湯服之如神予此一方此ヲ病人ニ誡コトルニ小陷胸湯ニ合小柴胡湯  
此ヲ用ルニ實ニ爰ニ云フ通り一服ニメ大効ヲ取ル例ニセモ相違ナシ又一説  
ニ小柴胡湯ニ小陷胸湯ヲ合シ更ニ大黃一味ヲ加ヘ下メ后ノ小結胸ヲ治ス  
ル至テ効有下サヌ前ニテモ胸滿痛スル者ハ此方至テ宜シ下メ后ト下  
サヌ前トノ論セス是ヲ用テ手詰効ヲ取ト云フ手術有是又誡ハキコ  
然レ后下メ后ハ是ヲ結胸トモヒ下サヌ前ノ胸痛ハ是ヲ胸痛ト云フテ結  
胸トハ云ハス是医書ノ定板也其巨細ハ下后ノ胸滿痛者ハ水ト云フ  
者カ血ト云フ者カ痰ト云フ者カ何ソ物ヲサソヒ集メテ結胸トナル  
又下サヌ前ニ胸滿痛スル者ハ此傳經ノ邪ニテ惟物ヲサシハサヌメ

無形ノ邪計カ胸ニシユリ段々胃口ニ陥入ントメ胸カ滿痛スルハ  
是下メ后ト下サヌ前ト胸中滿痛スルニ種ノ區別成物ト下サ  
又前ノ胸中滿痛ニ惟小柴胡湯ニ桔梗枳殼ヲ加用ルカ是又  
醫書ノ定板也下后ノ胸中滿痛ニ物有下ス前ノ胸中痛ニ物  
ナシ物有ト物ナシト是結胸ノ別ル処ニ其外ノ結胸ヲ要論要語ハ  
大陷胸湯口授ノ條下ニ於テ是ヲ述レハ爰略ス

大陷胸湯再弁

大陷胸湯之症ノ上ニモ云フ通り裏ハ甚積ニテ

居ナカラ用ヒ難キ方ト云フコト合点メ於テ其上テ症ヲ明ナテ用

ヘキ其巨細ハ是ヲ下シ又其上ニ此ヲ下ス也是用ヒニクキ処ニ此再弁ノ

謂也

小陷胸湯再弁

小陷胸湯ハ黃連羊夏瓜蒌仁ニ味ニ羊夏瓜蒌

仁ニテ痰ヲ去リ黃連ニテ爵熱ヲ去ル処ノ黃連是ニテ黃連ヲ爵熱ヲ

治メ散漫ノ熱ハ治セヌ茶ト云フコト此方ノ組合セテ見テモ知ルハ黃

連ノ使ヒ口此黃連ノ組合ニテ悟ヘシ

痞結之弁

醫方集解曰鞭痛者為結胸鞭而不痛者為

痞氣不鞭不痛心下滿悶為支結

三和散口授

大便秘結之弁

王宇養曰秘者氣之秘也結者糞

之結也ト有是秘結トノ區別ハ秘ハ氣ノ秘スルトハ七情ノ氣カ腸

胃ノ間ニ滋寒スル寸ハ大便モ凡ニシユリテ通シテ流ラス故ニ秘氣ノ秘ト  
 云フ結ハ糞ノ結スルトハ腸胃ニ血液カ不足メ潤サキ時ハ大便モ是カ爲  
 ニ乾燥シ結ホレテ硬ク成テ痛<sup>通</sup>セザル故ニ血ハ糞ノ結スルト云フ故ニ其治  
 方モ秘ハ氣ニカ、リテ治シ結ハ血液ニカ、リテ治スサキ者ハ氣実ス故ニ  
 大便多ハ秘ス老人ハ血液カ燥ク故ニ大便多ハ結ス是其秘ト結ト大概ノ  
 弁<sup>レ</sup>秘ハ俗ニ大便ノ硬ヒト等ホラカトノニカ、リテ症ニテハ硬ヤ中  
 ニモ通シ意カヨケレハ秘ト云フ不可又兼テ通シ意カマシケレハ秘ト云フヘシ  
 氣カシユレハトウシタ謂テ大便ヲ流ラレテ通シ意ヲワルツスルト云フニスヘ  
 テ大小便ヲ心地ヨク通シサスルハ氣ニテシメユルヲスルカ故ニ其証據ニハ疊ノ上

テ何程急ニ二便ノ氣カ有テモ是ハ疊ノ上ナレハト氣ヲハル寸ハ通セヌ持ッ  
 テ居ルハ氣ニテシメテヲクニ二便カシメルハ糞ス又大便処一行テ是ハ苦シカ  
 ラス通メモヨヒト氣ヲユルセハ二便カ通スルハ是モ又氣ニテ通スルニ二便カ  
 快痛スルニハ糞ス氣カ快通スルニ然レハ二便ノ通ト秘トハ全ク氣ノシメ  
 ヌルメノアンハイ因ル<sup>ト</sup>知ルヘシ今故有テ七情ノ氣カ下部ニシユルハ氣  
 ノ不和ニ此不和カ大便ヲシメル故ニ通シ意カマシクナルニ三和散ハ此氣  
 ノ不和ヲトク茶<sup>ノ</sup>故ニ方名モ三和散ト云フニ大便ヲ通スル茶テハナ  
 ヒト心得ヨ方中ノ茶品ヲ見ヨ一味モ大便ヲ推ス茶ハナレ皆氣ノ不和ヲ  
 トク茶計テ有故ニ不渴者乃々氣秘耳未<sup>レ</sup>可以施硝黃ト方後ニ

云フテ有テ見テモ其方意ヲ知レシ疝氣ノ秘結ヲ治スルニ効有モ是等ノ理ヲ以テ知ルヘシ大抵三和散ノ便秘ノ模様ハ雪隠ニ畏居ニユリ景テフスト云フ人ハナニ七八三和ノ便秘ト知レシ此等カ此方ヲ用ル目ノ付処ニ夫故我カ郷食庭家ノ口訣ニハ大便秘澆ヲ治スル方ト教ヘテ大便秘結ヲ治スル方トハ教ヘス

脈沈結之糸

此三和散ヲ用ルニ脈ニ心ヲ付テ用テ効ヲ得ルト多ク有三和散ノ正面ノ脈ト云フハ沈結ト云フニ心ヲ用テ脈ヲ見ルカ此方ヲ用ル脈ノ心得ニ沈結トハ沈ハ浮中沈ノ沈ニテシムニ結ハヤリ字ノ如クムスホレノ脈カヤクシメル氣味カ有テ沈ム是カ沈結ニ沈ハ爰

テ云フテモ通スヘシ結ハ心ヲ以テ得ヘシ辞ヲ以テ得不可何モセヨムスホルト云ニ氣ヲ付ル寸ハ結ノ意自然ト知ラレシニ三和散ヲ用テ大効有病人ニツヒテ親ク其脈狀ヲ取り覺ヘシ左スレハ此脈カ乃々三和散ノ沈結ヨト意ニ然ト覺ヘ知レシ夫ヲ手本ニメ沈結ノ脈狀ニ熱スヘシニ三人モ識タナラハ沈結ノ脈狀ニハ熱スヘキ一ノ氣滯ノ脈ノ沈結ニキ一ハ惟此三和散ノ症ニ有計テナレシ分心氣飲セ氣ノ類皆氣劑ヲ用テ効有病人多ハ脈カシマフテ沉ニ来ル者ニ左スレハ沈脈ハ氣滯ノ目的ト常脈ト合点スヘキ一勿論ニ

