



門 斌 9
番 245
卷 12





九折堂山田
氏圖書之印



說二十卷本十三卷十九卷始



痘瘡治療口援 或ル一家ノ秘本曰痘瘡
療治ノ事イカニモシテ痘毒表ヘサレ発スル時ハ
痘ノ輕重耳ニテ恐ルヘキニ非ス惟恐ルヘキハ痘
毒内攻ノ變ニ有耳初批書リ十三日ヲサヘ毎
難ニ過レハ生ヲ得ル事疑ナシト云フテ有此文假
名書タリト云ヘ氏我カ饗庭家ノ痘瘡傳授
ノ旨ニ純カナリ有キ予又此旨ヲ廣メテ我カ門性ニ
示ス事左ノ如シ痘瘡ト云フ者ハ毒カ中ニ入ルト

命ニカ、リ毒カ羊ハ出羊ハノコルト生涯ノ憂トナル
ニシテモ兎角内攻也又ヤウ毒ノ腹ノ中ニコラヌヤウ
療治ナスル事痘瘡ト通りノ治療ニアツカル処ノ
大吸ノ心付ク加様心付テ居テサテ其術ヲ盡スヘキ事
其痘毒ノ内ノ内攻也又様ノコラヌヤウニスルハ兎角
内ヨリ外ノ毒ヲ進出スヨリ外ハ更ニ術ナキ事ニ是レ胞
瘡療治ノ大ワリ也○痘瘡内攻之奇 痘瘡ノ
内攻ニ三ツノ心得有一ツハ熱ノ内攻一ハ寒ノ内攻一ハ
虚ノ内攻也

ケカレノ内攻ニ三ツノ事ヲ以テ十ニ八九ハ救ハル事
ナレハ深ク論スルニモ及ハス惟恐ルヘキハ三ツノ内攻ニ
才一拙ノ内攻ト云フハ大拙ノ為ニ痘毒カサハエラレテ
外ノ達スルハカナラヌメ内ノ引ク是ヲ拙ノ内攻ト云フ
ニツハ寒ノ内攻ト云フハ寒ノ為ニ表氣ヲ閉塞カレテ
痘毒カ外ノ出ルハナラヌメ内ノ引ク是ヲ寒ノ内攻ト
云フニ三ツハ虚ノ内攻ト云フハ痘毒ノ表ノ絶養スルト
云フハ毒血ノハリ元氣ノハリニテ外ノ出ル者也然ルニ其小
児カ症ニ毒血元氣弱キ時ハ表ノ毒氣ヲ推シ出ス

カラナキ故ニ瘧毒自然ニ内へ引之是ヲ虚ノ内攻ト
云フ此ノ三ツノ内虚ノ内攻甚タ六ヶ鋪瘧ヲ治療ノ
至後モ又甚タメントウ之右ノ通リ寒熱虚ノ三因各
異ニメ其症別々ニメ其主劑モ又別クナレ然レモ
毒ノ内へ引理ハ寒熱虚ノ三ツカ、ワル事ハナシ日ク
内攻スル之内攻ハ一ツ耳更ニ謂有ニ非ス然ル時ハ療治
ノ法其毒ヲ追出ス様ニ是非セ子ハナラ又道理明白
シ追出スニ其功兼有事ニシテ追出ス按排故人ノ手又ケ
ノ処ヲ先ツ一ツ云フテ聞サニ虚瘧ノタクリノ劑ハ大

保元湯參苓鹿茸湯温中飲ナトノ如キ是ヲタクリノ劑
ト名付テ虚瘧ヲ外へタリ送スル形劑トアラヒテ世間一
日ニ珍重スル方ニ然ルニ以方ニモ手ヌケアリ其故ハ右ノ云
方ハハ氣血ニ氣ヲ補テ其氣血ニ氣ノハリ強キヨリ瘧
毒ヲ表へモチ送ラセトノ主意ニ然ルニ是ハマワリ遠キ
処有其マワリ遠キト云フ謂ハ瘧瘡ハ毒ヲ其毒
ヲ追ハスメ惟氣血ニ氣計ヲ盛ニメソレニ強キモタセテ毒ヲ表
モチ送ラセトスルハ假令ハ軍術ニ能キ謀有テヨキ士卒
ナキカ如シ軍術計ヨクトモハタラク士卒ニヨキ者カナケレハ

其イソサ必スマケニナルカ如ク今右ノ補劑計ヲ用テ瘧毒
ヲ毒(出サントスルハ是軍評條ノヨキ理)モヨキ理
メヨキ武士ヲ以テテキ人ニ推シヨセサレハ必ス理ヲ失フ
其シレシノ武士ナキト曰シ此ヲ以テ甚ノ大難症ニ及フ
時ニ惟保え温中益氣湯ノ温補計ノ方ヲ用テハ福
也ノ如ク効ヲナス事誠ニ百人ヨセテ兩三人モ救フカ
救ハレサルト云フ位ノ者シモ他ナシ温補ノ中(追手逐
毒)ノ手ヲテナキカ故ニ其追手逐毒ト云フハ危ノ方
ニ有耳 七味底野如方 白芷龍胆子大蒜炒良

姜桂枝夏根蜈蚣右七味細末シ先ツ水ニ子リ次ニ蜜ニ
テ子リトノフ蜈蚣ノ目方ハ五ツウ倍ニメヨシ外ノ藥ハ
白芷一分ナレハ餘葉モ各一分ノ蜈蚣ソレニ順シテ五
倍マシニ調合スヘシ蜈蚣ノ上ラミハ毒ノスルトキヲ以テヨシ
トスヘシ其毒多クノスルトキトスルトカラサルトヲ別ルハ人
其蜈蚣ニクワレテ病る輕キハ是蜈蚣ノ毒ノ輕キ也
又蜈蚣ニサシテ輕キ者ハカタワニナリ重キ者ハ其
人死スルニ至ル足蜈蚣ノ毒ノスルトキカ如ク水戸ノ蜈
蚣ハ其毒甚スルトシ多クハ蜈蚣ニサシタル者死セ

サレハ必スカメワトナル者多シ當國ナトノ^四蝮蛇毒色
甚ユルキト見ヘテ人ヲ害スル事甚落モト底野迦ハ蝮
蛇ノ一味ニテ効ヲナス方ニ中ニモ毒有蝮蛇ヲ用ヒサレハ
其効大キニ薄シ何卒毒多キ蝮蛇ヲアラヒテ相合
スヘシ以テ循國ニ有者ナレハ其毒多キヲキ、合セテ毒
氣強キ國ノ蝮蛇ヲ求メ得テ相合スル様ニ心カケヘシ是
肝心ノ心也○ト底野迦ノ方種々葺方有レトモ
徒効有トテ傳授シタリ紅色雜症ト云フ云ニ出タル方
其紅色雜症ハ文ヲノスル事左ノ如シ○**底野迦至治**

汗ヲ乾シ腫ヲ催シ瘡咳頭痛ヲ治シ嘔吐下利ヲトメ
胸膈塞リタルヲ開キ胸悸メ心氣安カラサルヲ鎮メ
積痛疝氣具化法ノ痛ヲヤワラケ食毒酒毒ヲ解
シ瘰癧疔瘡疔ニ中ニモ効有スヘテ強キ病ハ醋ニテ
トキ用ユ方病ノ病方ニ効有癩病瘰癧瘰癧瘰癧ニヨ
シ熱ノ指引有病ニハ將國申ニテトキ背ニヌルヘシ千ヨリ
毒便毒虫ヲサシタル病或ハ凡大ニカミ傷ラレタル瘰癧
中ニテユルメヌリテヨシ瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧ニ用ユヘシ大
人ハ木槌子一箇龍サテハ病ニ依テ二箇モ服スヘシ

小兒ハ黒豆一粒湯ニテモ湯ニテモ用ユ五ハ
何レノ病ニ用テモ効有ケルヲ鹿野迦ト云フ意ハモ
トアルモテリヤアカト云フ業名アルモハ商標多ク
シ業甚クサキ有テ下ニタリト云フ以上紅毛
雜症ノ文ヲ此ニ出ス者皆テリアカノ効能ハ世ノ人
トクク知テ珍奇スル業今記スルノ効能ヲ見ルニ何
用テモ宜シト見テ然レ氏等未タ廣ク經驗ヲ取タル
事ナシモ依テ外ノ効能ハけ通りニキクカキカヌカ慎
ニ人ニ示サレズ惟ホスヘキ者ハけテテ瘧疾ニ用テ其

効能ヲタシカニ心得タリ是ニ依テ其經驗ノウチ太効ナル
医案一條ヲ記シテ我カ門人ニ示ス事左ノ如シ負曲辰
之子瘧疾ヲ病メリ其症定テ戰咬牙泄瀉腹痛等
有テ瘧疾ハ皆盡ク内攻シテ膿一點モナシ其外難症ノ
諸症盡ク備リ生クヘキノ症一ツモナシ病家ニテモ將
油搗テ枕ニスナヲキキ免テ急待テ居タリ辛
鹿野迦ノ業ヲシヨジセリ温中益氣大保元參芍藥
茸其外難症ノ法方用ヒ盡セ氏効ナキニ依テ彼ニ鹿
野迦ヲ用タリ初ノ程ハホツカナク思ヒサシ計ヲ用

タリサレ初有ニ依テソレヨリシキリニ用タリ四五日ヲ経テ
 其効大ニ見(タ)リ遂ニ子死一生ノ難瘡全快ニ及(リ)
 小兒ノ難瘡ヲ虎野迦ヲ用テ治シタル事經驗ノ
 初メソレヨリソレヒテ經驗餘程有識ニ紅毛雜症ノ
 効能セノ通リサレモ相違ナリ虎瘡ノ一ツニ於テハ
 慎ニ是ヲ識ミタリ故ニ今レ一按ヲ記シテ其經驗ヲ
 函ル者ニスベテ虎野迦茶品ヲ見ルニ白芷龍胆子
 大蒜良姜桂枝百合根皆平和ソ劑ニテ萬死一生
 ノ難瘡ヲ一時ニ救フ効能ハナキ茶品ニ惟蝮蛇

一味効能ヨクニ其効有事ト見テ其謂ハ蝮蛇大毒
 ノ虫ニ大毒ノ蝮蛇ヲ以テ大毒ノ瘡瘡ヲ治スル甚理
 於テ切ク虎瘡ノ毒ハ有刑ノ毒ニ非ス無形ノ毒ニ
 蝮蛇ノ毒モ有刑ノ毒ニ非ス無形ノ毒ニ無形ノ
 毒茶ヲ以テ無形ノ瘡毒ヲ追出スヨ日争相求メテ
 其効有ハツノ事トトハ時ニ至テ始テ虎野迦ノ瘡瘡ニ
 用テ妙効有リサレリ然レハ虎野迦ノ一方六味ノ
 効ニ非ス蝮蛇ノ効ニ以テ我カ内ニ試テ之ニ○
 入門ニ毒散ト云フ方有其方人迷猫迷狗毒猪

止齒各等々盛砂鍋内火煨候冷研^七為細末每
取五分搥酒^下一二歲兒服三分五六歲兒服四五
分取効如神蓋黑證屬腎四齒亦屬腎故能^榮
腎毒ヲ又猫齒能解^抽毒若無猫齒只用人齒亦可
但^不如^四齒全方^以四齒散ヲ入門^ニ評メ蓋^シ黑屬腎
四齒亦屬腎故能^榮腎毒^云フハ一^處ノ見^ニ予^カ
思フハ左^ニ非^スス^テ法牙^諸骨ハ解毒降毒ノ能^ヲ
備フル者^ノソノウ^ハ齒ハケカレタル者^ノ痘瘡^ハ外^{ヨリ}
不^淨ヲ以^テケカス時^ハ其痘瘡^ケカレテ受^テ忽^チ内^ニ

攻スル事^是佐人^ノ志^ニル^ル也^今四齒散ヲ用ル^ニ意^ハ内攻^ノ
痘毒ヲ逐毒スル^ニハケカレタル四齒ヲ用^テ内^ヲケカス時^ハ
其痘毒表^ニ出ル^ノ理^{アリ}是^レ眼前^ノ理^ニ目^止齒^ハ骨^ノ
表^ニ骨^ハ解毒降毒ノ能^{アリ}左^ニ内攻^ノ能^ニ効^{アリ}
外^ニモ人^ノ凡^ク一服^ヲ分^ニ個^合モ並^ニ服^スル^ハ内攻^ノ毒^ヲ
能^表ニ出^ツト云^事有^是等^モ皆^内ヲケカメ^痘毒^ヲ表^ニ
追^出ス^シカケ^ノ方^ヲテ^ハ左^ニ四齒散^ノ効^能實^ニ逐^毒ヲ
至^ニ紐^立タル^方ト知^ルル^ニ然^ルニ蝮蛇^ノ毒^ハ甚^スルトク
シテ中^ニ四齒^ノ及^フ處^ニハ非^ス全^ク逐^毒ノ最^上ナル^薬ト

云フハ蝮蛇ニ止マルキ及理之故ニ神効有是ニ依テ是ヲ
見ル時ハ保元久遠鹿茸等外タクソウノ諸方用ユキ
事ハえヨリ知レタル子ニ然レバハ鹿野迦ノ如キ遂毒ノ音ヲ
兼子用ヒサル時ハナカクニ効手ヌルクシテ効立ツ子遅
シ遅キ時ハ痘毒又内攻スルノ理有時ニ大毒大力量ノ
有蝮蛇ノ如キ品ヲモ手ヌルキ補劑ノ中ニ兼用スル時ハ
子毒を痘毒ヲ遂チラシ思ハス知ラス毒ノ浮クノ理
有故ニ右ノ如キ神効ヲ養スルノ理的也是前ノ譬ノ
如ク上ニハ諸葛孔明カ如キ者有テ妙ニ軍慮ヲウナ

カシ下ニハ般急會カ如キツハモノ有テテキ門ヲ一時ニ閉
ク時ハ子軍全クカウヘキ此アリ蝮蛇ハ般急會ノ温補
ハ後者孔的ニ是緩急相備テ緩中ニ急ヲタステ
急中ニ緩ヲ備テテ効ヲ一時ニ見ハスノ理明白
痘瘰ハえヨリ日限ヲ極マリ時刻ノ定リタル者ニ
中ニ内攻ノ急者有ニナニトシテニトシタル緩効ヲ
以テ急効ヲ一時ニ取ラシヤハ処能ククフウ有キ如ク者
故人ノ手又ケト云フハコノ事ニ虚痘ニ虚ヲ治スルハ
モ知リタル事ニモ知レタル補劑ノナカハ遂毒ノ兼用

ナキハ是故人治瘧ノ療治ノ一ツノ手又ケナル者古ノ
如キ緩急ノ二ツ兼備シテサ(効ヲ一時ニ取ラシメテ)
ツカナキニ惟一應ノ緩功ヲ効ノ補劑ニテ十人二十人ナ
カラ効ヲ均シト思フハ我レ神スル事ナシ況ヤ右ノ通り
補劑ノ中へ遂毒ヲ兼テ大効ヲ均タシテ為ル手ニ
勤(テ足)有ラヤハ此處瘧疾一見ニ於テ大要編場
終(コト)口(シ)テリアカハ先ツ石所ノ長崎ヤ(言
ヒモ)セハ何程モ求メラル、幸(シ)然レ此是ニ大キニアタリ
ハツレ有ヨシ聞(ク)是ニ後テ見(ル)時ハ是モアテニハナリ然レ

ソレヨリハ蠅蛇ヲヨクエラヒ右ノ通り調合シテ用ル方ハルカニ
マサレリ且虫鼠賊ヲ救フニハモアタヒ輕メ又蒸氣トモナル
ヘシ是等ヲ終(ク)考(ヘ)併(セ)テテリアカノ一方ハ手割(シ)テ
ヲキタキヤ事(ト)

瘧疾秘説(ノ)條

凡ソ瘧疾ノ説処々ニ多ク出テ種々
アレドモ要トスル処ハ兎胎中ニ有テ受ル處ノ毒身内ニ
伏シタルヲ一時流シノ邪ニ効カサレテ棄スル是カ瘧疾
ソモク病因(ト)サレハ是レ伏毒ノ淺深ニ依テ瘧疾ノ輕
重有又復邪ノ淺深ニ依テ輕重有(ル)モ有(ル)輕ニ

至テハ業ヲ用ヒサレ凡愈ユモ至テハ業ノカラヲ盡
スト云レ凡死スル者有サレハ瘧疾ノ發スルヤ一時ノ邪氣
之見ニアタリ病疢ハ大陽ノ中凡或ハ傷寒ノ如ク瘧疾
頭痛惡凡レテ筋脉皆動ク發汗ノ効ヲ与テサシク
表邪解スル時伏シタル処ノ毒氣毒ニ見ル是ヲ瘧疾ノ
見點ト云フ又瘧疾扱至ノ為ニサハラレテ發セトス
レ凡發スル中ナラス搗搗或ハ有秋等ノ病ヲナシ死ニ至ル
者テ、有クハ見病ヲ詳ニメ瘧疾ヲ語ル中勿レ何加ニ
モレテ瘧疾表(サ)發スル時ハ瘧疾ノ症ノ輕重耳ニテ

恐ルヘキニ非ズ惟恐ルヘキハ瘧疾内攻ノ毒ヲ純瘧疾ス
ル様ニ心カケヘキハ初極ヨリ十二三日ヲサハ毎難ニ過レハ
生ヲ得ん中疑ナシ何レノ虫ニモ小兒門サハ有レハ瘧
疾ノ治方ヲ舉又虫ハサシモ外攻ノ毒ヲ瘧疾ノ治
法ヲ舉レレ一ツトレテタスケニナルヘキ虫ナシテ保赤金
虫幼々新虫活幼心法瘧疾神虫救偏鎖言ナト
モ外取リ用ユヘキ虫ナシ然モ救偏鎖言ハ少シ見処
有術ノタスケトモナルヘキヤト思ハル洗幼心法ナトハ日
數ノ割合ハ純瘧疾ニレ業方ノツケカタハラチモナキ

事有治方ニハナラヌ又ハ傷中ニモ瘧瘧ト傷寒ト治法、
小同而大異ト云ヘルカ如キハ大ヒナル心ヲカキテ以テ是
ヲ見ルニ大同而小異トコソ云フヘケレ如何トナレハ初熱ヨリ是
ニ加ニ至ルニテ傷寒ノ順例ニ異ナルヲナシ惟ニ瘧瘧ノ瘧瘧カ
出テ水ヲマワシ膿ヲハリ指リ驚蓋ヲ為シ愈ル耳別ニ
治法ニ於テハ必ス傷寒ニ別ハナシ内經ニモ瘧瘧傷心
火ノ病ト云ヘル如キモ一ツナルヲ知ルヘシ故ニ瘧瘧瘧甚
キ時ハ流云ヨシ安給シ鬼ヲ見ル状ノ如クス是心火ノ病ナ
レハ瘧瘧ノ急難ノ病多シ謹テ瘧瘧ヲ認ルヲ勿レ

此ノ瘧瘧ノ脈ハ傷寒ト同例ノ如ク此ニ略ス

初日ノ候

先ツ瘧瘧ノ發スルヤ大陽ノ中凡或ハ傷
寒ノ如ク發熱ニ惡寒ニ頭痛ニ或ハ食傷ノ如ク腹
痛スルモ有嘔吐スルモ有下利スルモ有指搦スルモ有
レモ着根湯ノ病之或ハ着根湯ニ羊其乾姜ヲ加ル症
モ有ヘシ是初日ノ方其之〇レ処古トシ流ト易リ有
処終ク考フヘシ此場ニハ有リ解シタル痾クニテハヤハリ
升テ着根湯ノ湯之又ハ食庭ホサトニテハ此処ヤハリ散
毒散ニテアシライヨクノ病多シ是等ノ処終ク考ヘ

合せて療治ヲ施スヘシ

二日之候

十日に至リテ

二日之候 十日に至リテ 熱即り
ヨリモ強ク耳赤ク耳後ノ筋脈動シ急キ時ハ有^{ニキ}熱
及張シ搞搦スル子有^ハシヤハリ著^ク根湯之病^ニ差^シ
視ツメキヒシキ時ハ一麥丹ヲ用ユヘシ 神仙丸モ用ユヘ
シモ^ハ吹ノ年ノ數ト毒系ノ輕重トヲハカリテ二三反
モ^ハフヘシ^ハ下利スルハヨシ^ハ日ヨリ少シニテモ見^ル點
スルハ多クハ末ニ至テ惡^ク瘧トナル^ハ多ク^ハ心^ハ好^ムベシ○^ハ此
有^ル弱タル瘧治ニテハ辰砂^ヲ用ヒ^ル或^ハ視ツ
ノ強^キ時ハ吸^キ毒^ヲ散^ル白^濁子^ヲ差^キ蚕^蛭蝟^ヲ用^ル場^ノ

合^テア^シライニテ^ハ勅^ナキ時^ハ著^ク根湯ノア^シライ一^反ナ^キ

三日之候

十日モ

三日之候 十日モ 熱強ク搞搦
スルモ有^ル又^ハ少^ク解^ルスルモ有^ル 赤^ク著^ク根湯ヲ用ヒ^ルナ^キヘシ
但^シ十日ニモ見^ル點スルハ宜^クシカラヌ^ハ○^ハ晚^ニ至^リテモ
熱^ナキヲヨシトス 四日之候 十日熱^ハツロ^ク退^テ瘧^ナク
ラ^ハホ^ラト見^ユヘシ瘧ノ粒^ヲ畫^ク別^レテ見^レ面部ハ天
庭^ノ印^堂頰^ノ車^ノ人^ノ中^ノ眼^胞ノ邊^ノカク^ハ結^喉邊^ノカク^ハ腹
或^ハ前^ノ陰^ノ邊^ニ一^向ナ^ク手足ニモ^ハら^ハニ^出テ^ハ飲^食進^ム
○^ハ元^氣系^ノサ^ワヤ^カナル^ハ順^切シ^ハ時^ハ茶^ヲ用^ヒス^メヨ^シ

若し日餘強キ者ハ小柴胡湯又ハ柴桂湯ノ差ヲ
 用ユヘシ先ツ是テカ瘧ノ順行ニ付桂子ニ及スルヲ惡
 瘧トスルニモ桂子ハ瘧瘧散サシ口チノ如ク地界ヲ
 分タス色モ赤ク熱強ク時ニ發言ニ發熱ニ唇口乾
 燥スルニ有是ニハ柴胡清毒飲ニ犀角ヲ加テ用テ
 ヲシ神効ヲ用テカ下利ヲ及モヨシ若シ又毒多
 クハ毒熱ニサヘラシ釜ニ煎ル時ハ大柴胡湯小柴胡湯ヲ
 トテ用ルルモ有又大柴胡湯加芒硝ヲ用ル瘧モアリ
 白虎湯ノ瘧モ有若シ又瘧瘧出テ地ニムラト小

瘧ノ如キ者見ユ有付時柴胡清毒飲ヲシキリニ用
 ヲシ若シムラト見ル小瘧ハキエテナクナリ瘧瘧
 計ニナル順行ノ夜ニ候ルニ皆然ルニ
 順行ハ瘧ナシ惡瘧ハ明日宮熱ヲ見合セ前劑ノ中
 ヲ用ユヘシ前劑の中ニテ瘧瘧ノ色モカシハナクナリ食
 モスハ瘧瘧ノ頭ヲ引タキタラハイヨク前劑ヲ用ユ
 へシ神効モカシ瘧メ用ユヘシサテヨリニ至テ瘧瘧ノ
 頭ヲツタツトスレバ水ヲモキタルヤウニ見ユル瘧瘧
 ハ大方ハ九日月ニハ上皮膚スリツツモ危キ瘧トナル者ニ

五日之候計日

是ヲ虚瘕ト云フ又々明りしるニ瘕瘕ノ色を赤
ク口中扱ふるク鼻を赤ナトアルハ九日ニ至テ大庭星色
ニナル者ニ是ヲ扱毒ト云フ或ハ十日以ニハ多クハ死スル
者ニ虚瘕ハ十二日ニ至テハ十日ハ必ス死
スル者ニ免角十日ナ六日月ハ大切ナル者ト知ルハ是也
紫里ノ瘕見ハタラハ銀鍼ニテ血ヲ出シテアトハ三聖
散ヲ知ニテトキヌルハ早ク瘕瘕セサレハ毒ヲ化ノヨキ
瘕瘕ノ瘕リテ足色ニナル者ニ右ノ如クスレハ是也
ト痛ノ又ケタルカ如クアトカウクニ解ノ瘕ニサワリナ

キ者ニ **六日之候** 十日頃瘕ナレハ早ク出タル瘕瘕ノ多ハ
ハヤサレワケルヲモルハ是ヲ肥脹ト云フ悪瘕ハイヨク解
カ下毒ノ劑宜シ酒ヲ飲セ又ハ餅ヲクハスハ心胸煩熱
アレハ伐毒深心湯ヲ用ユハ是レをヨリ心下ニ効有
カナキカヲ熱ト診フハ是レ効有ハ毒未止衛瘕
テユタナラヌ者ハコレナレハ是レ瘕ヲ瘕瘕トモコトワリテ
ヒテ瘕瘕ヲスヘシ又々アタリ止毒ヲキリト 咳ハ悪候
ニ於テ是レ瘕ヲ瘕瘕トコトワルハ **七月之候** 十日頃
瘕瘕ハ是レ痛ニアツテ瘕ハナク海ノ回ルスハ是レ瘕

ミツモリ

起脹ノ候ト云フニ其日ニ起脹ニカ、リテ七日目ニ起
 脹スル是ハ煩瘧ノ多シ惡瘧ハソレトハ千カヒ回ルモハカ
 ーシカラス血色モ悪ク見ユ乾キタルヤウニ見ヘ虚瘧ハソレ
 ーツフレテ多ク出ス者ニ 八日之候 十日煩瘧ハ地ハシ
 イヨクして目ヲ閉回ル満テ如ク面部ニハ本膿有ヘシ惡
 瘧ハ回ルセス瘧瘧乾テツヤナク煩悶ニ熱ハケレク
 後言ニ其語モ有ヘシ此解毒ノ劑ヲ出ラニ用ユヘシ虚
 瘧ハ多ク盛リテフヨクト一面ニハタテナクナル者ニソレ
 ナレハ桂枝黄芩湯カラ主ルヘシ或ハ柴胡湯ニ川芎當

的^キ黄芩ヲ加ヘル症モ有ヘシ又其所カク湯ノ症モ有柴枝湯
 ノ症モ有神化丸ハ十日テテステサカス必ス用ユヘシ十日
 寒戦有ヘシ惡瘧ニ 九日之候 十日煩瘧ハ灌膿ノ
 節ニテ面部ヨリ胸部ヨリ手足ニテ膿ヲモツヘシ膿ノ
 色濃ハヨシ汚ハ惡シ惡瘧ハ今日ニ至リテモ本膿ノ
 色ハ見ヘス者ニ 十日之候 十日ハ面部ヨリ口足ニ至ル
 テテ盡ク灌膿シテ面部ノ早クハ一ツニツ腐テ瘧
 瘧ノ頭ニヤニノ如キ者ヲ出ス是煩瘧ニ惡瘧ハ地膿
 少シ有テモツロヘシキ目モ開キ膿少シハ見ユレトナカク

五分にてモナリ痒之をクナル者こそは中通りの悪瘰
こサテをシヨサコシテ大悪瘰ハ臍少シモナク枯燥シテ
煩渴煩悶有虚瘰ハえヨリ一面ニ瘰瘰ヲカキツフニ
多流シ出テをアト流ハタニナリキニツイテ臭ヲ有
鷄ノ卵ノ腐レタルヤウナル臭ハヨシトウシテヨキナレ
ハ毒ヲカ内攻セス上へウクニ依テ臭ミカアル内攻ス
レハ臭ミハナシ故ニ臭ミノ有ヲヨシトスルニサテをニツイ
白豆ノ臭ミハ悪シ是瘰瘰ノ毒ヲ内攻スル故ニ白豆ノ
如ク臭ミカサシキニ出テ臭ミヲ強キハ香高者ノ粉ヲ

十六

付(シ)甚シキハ雞子白ヲスル(シ)付心煩動悸ハ瘰毒上
衝ノ候ニユタニス(カ)ラス付日ヨリ声ノガレモアリ是悪瘰
(黄)連石膏甘草湯或ハ白虎加人参湯或ハ潤燥湯
ヲ用ユ(シ)付時巴豆丸ノ糞ハ決メ用ユ(カ)ラスス(テ)瘰
瘰ノ向多瀦膿瘰癧ハヒタイヨリ効リ前(チ)リ膝(ハ)
サカリヌヒタイヨリ後(マ)ワリク(サ)カル者(ニ)加糖(ニ)順
ニ付ハ右是順瘰ノ事(ハ)悪瘰ハ是ニツムケリ
十日之候
日順瘰ハ大庭額ヨリ目ノ下通リガワロ(ハ)腎ル(ハ)
悪瘰ハ地腫モヒキ煩渴煩燥シタリヨクカレ或ハ

物ヲ言フ事ナラス或ハ薬ヲ喫身ヲフルクニ煩悶スル者ニ吸リ之ニ劑ノ内見合ニテカセテシキリニ用フヘシ冷温ニ依ラズメ數貼ヲ用ヒ盡スヘシ計時終クテ亦ミコトヲ勿ヘシ勿レシテモ声ニヒキ有ハ宜シヒキナキハ大惡瘡ト知ルヘシ薬ヲ用テ渴モ輕クナリ煩悶モ落クナリ亦モソロシ出タラハ吉微ト知ルヘシスヘテ内攻ノ惡瘡早キハ八日九日目ヨリ瘡スルモ有或ハ又十日十二日ニ至リ瘡スルモ有何レ難瘡ハ十六日迄ハエタレナラヌルノ中渴キ強キ計ノ病ハ治スルノモ有

十三日之候

今日順瘡ハ面部鬻地腫モヒキ咽ノ邊ヨリ下ニサカレシ惡瘡ハソレニ引カハ惡瘡ツソリ胎黒クナルヤウニ燥キ齒ヲ咬諸ノ惡瘡盡ク出大難瘡ノ瘡ハ日ニソロフニケラササレ過サハ何ナル大惡瘡モ十二生ヲ始ヘシ熟トシテ瘡ニスル事勿レ

十三日之候

十四日之候

十五日之候

濯湯ノ法

米粗多ニ升五

合猪ワカシテ后サシアヒサス(しむモ難痘痂ヲ結テ一面
ニカサフタヲナスハ右ノ湯ニ手拭ヲヒタシシホリテカサノ上
ヲ、ヒヒタシ手拭ヲ取カヘ二三度面部手足ヲ輕クスクフハ
シアトハ衣裳ヲヨキ程ニキセ凡ヲフセクヘシ着シ未タ熱
勢強ク又ハ周身ニ斑疹有ハ湯ハシハラク見合ヘシ班ハ
毒氣ノ移走スルヲナレハ必ス癢ク(カラス解毒伐毒
ノウキヲ消息シテ用ユヘシ難痘虚痘ノ敗レツイ(テカ
サ未タ不乾カニハモ乾クヲ候テ湯ヲカケヘシ**十六日之候**
々々ハ明クト曰ク痘ノ輕キニヨリテ治療スヘシ治方ハ

昨日今日明日ト曰シカルヘシ然レト變症有ハ格別ノ治方
見ニカ、ワルヘカラス **十七日之候** 々々ヲ還元ノ日ト云フテ
痘疹初發ヨリノ治方終ルノ日ニメケ日ヨリ以後是ノ
病人ト曰シ痘疹モ又丸種ニ心付ヘシ **痘疹總説** ス
ヘテ痘ノ治方別ニナシ順痘ハ業カヲカラスメヨシ惟難
痘ハ業カニ依ラズメハ愈ヘ難シ先ツ以テ強弱毒ノ
輕重ヲハカリテ業表ノ劑ヲ用ヒテハ消毒解毒ノ劑ヲ
用ユヘシ業表シテ熱ヲ解スルヲ有下利ヲ用テ熱ヲ解
スルヲ有回氣瀉膿ノ以テ至リテハ内攻シ業熱去ク

湯ヲ生シ煩悶シテ止齒カニナラモ身ヲフルワシ瘰癧ハ星
 色ニナリアカキ死ヲスル事有ソレナレハ解劑或ハ煩濁ノ
 治方シキリニ用ユシ用テ后極子靜ニナリ湯上ニ極ルニ
 解シ眠ヲ催スハ治スヘシ難瘰ニテモ十五日サハ過サハ治ス
 理ニト知ルヘシ初發極醒テ不食スルハ惡候之難瘰ニテモ
 食ヲ能クスル者ハ多クハ治スル者也又治方用ルニ和入ノ
 俗方ト云ハ此効有者ハ從テ用テ可也 **柴胡消毒飲ノ方**
 瘰癧深者或挾班疹者及瘰癧後余毒皆之之
 柴胡大 芩中 羊中 荊芥小 連翹小 牛

膏子防風辛 川芎小 甘草小 右十味各等 服 **解毒潤燥**
湯之方 此方ノ功效前ニ有者所々大 黃連 大黃中
 芍藥大 甘草小 粳米中 右六味各等 煎服 **伐毒三黃**
湯之方 此功效前條ニ載見ス大黃二 黃連一 黃
 芩 紫菀各 生地黄各 右五味各等 煎服 **神仙丸**
之方 巴豆一 麩粉二 右二味 麩粉ニ巴豆ヲツク
 ムスシ巴豆ヲ去テ麩ヲ丸トスル也 **桂枝加黃芩湯之方**
 桂枝湯ニ黃芩ヲ加ヘタル方之右記ス処ノ瘰癧ノ秘也
 此湯盡ク瘰癧ノ條ニテ取ルヘキ事多ク見ユ我カ

門是ヲユ、ロミテ可ニスヘテ治瘵ハミヲカサラスニ心切ニセ
タル是実智ヨリ出テ稱ヘキノツシケシクノ如キモ有
ニカナリ能ク熟読シテ他日ノ用ニ備フヘキ者ナリ
瘵瘵二十四類驗ノ辨ハセニ序有り左ノ如シ瘵科
數中有二十四類驗法ヲ結末盈五百字而瘵之驗
法舉吉凶治術者皆已盡矣余藉天寵々々靈
得從錦橋先生以受曼公戴君之秘訣也以茲每
侍帳前録其喧嘩以備遺忘今抄此一篇訓話
以和語示諸兒童若有熟讀者則不卒卷而思過

半如中疎漏則夫子存矣寬政十己未春二月揚阜
島翮撰

二十四類驗法 此二十四ト云名義通シカタニ篇中ヲ
細考スルニ二十四ノ事見之ス然ルニ未ニ点法ノ一條
アリ是ヲカワテ見ルニ二十四法アリ乃此事ナルヘシ二十
四ノ占法イウレモ面部ヲミテ吉凶ヲ占フニテ相家ヨリ
起リタルナルヘシ傳ニモ占人ノ生死亦莫如面トアリテ面部ヲ
八卦九岳五藏ニ配シテ吉凶ヲ占ヒ黒と赤と青とヲ見ル
ハ曼公ニモ有皆相法ヲ更ヘタルニ朱子ハ其名目ヲカサ

ヤリ面部ト云フニありタリ故面部第一眼部次之
耳部亦次之ト云テアリ而も此ト云フ瘡ノ形色ニテ
吉凶ヲ統ヘ辨セリ是正ニヤ此ヲ示シタルナリ古法ニ云フ
烏雀黒露點金白珠ナトシカト分リカタシ又見レテ
モ合ヌト有レシ瘡ノ色ト唇舌トノ確然タルニシカス故ニ
朱子ハ此ヲトラスナルレシ此ト云フ面部ヲ見ルニ二十四
ト云ヒナラハシタルユヘニコソ此各目ヲ拳タルヲナルレシ然レハ
古法ハ出サヌハツノヲナルニ世ニ移入セシヤ知ルヘカラヌ此知ハ
朱鳳大成ナトカ字本ノ時ニ移入セシヤ知ルヘカラヌ此知ハ

面部ヲ見ルトトノ見ルレシ色トシ鏡クハ數重ナルレシ顔驗
トハアラカシメ先カタヨリ后ノヲ驗シ知ト云フレ驗ハ
微ナリ此ト云フ
面部第一先ツ面部ト云フニ天
ルルニ十四ノ面部ノヲナルレシ今面部ト云フニ天
庭ヨリ頤マテヲ統テ云タルレシヨリ手足次之トカ胸
背次之トカ云ヘキニ眼部次之ト有ルハ不解ノ文ナリ
夫レユ昌又ノ傍注ニ天庭曉曰生司空日月宮輔
官大陰太陽是トアレハ面部ト云内ニテモ天庭ハ
神ノ舎スル処ニテ腎名要ノ位トスルレシ此知出齊記脹

スルハ悪候ナルヲ加ルシ他ニ上亭中亭下亭ノ多
アリ眼部以上ヲ上亭ト名ク上亭稠密ナルハ毒ノ種
明ノ望侵ストあるス悪候トス

眼部

眼部ヨリ

鼻ノ邊マテヲ中亭ト名ク眼胞鼻輔淚乃ナト云処
ニ先出ルハ天庭ニ早ク出ルホトノ悪候ニハ瓶木レ成ク
ト云フハ鼻準ハ脾ニ配シテ準頭中亭ノ多ニ密ナ
ルハ脾毒不解トス

耳部

耳部又

耳ハ腎ノ外候トス

ナシテ耳輪先出テ稠密ナルハ腎ノ毒トス悪
候ノ曼スノ脱ニテ面部ト云フ眉上ノ多トノ見テ

眉上眼部耳部トハカリ拳テハ口傍腮頤ノ一ハ面ニ云ハ
又ヤリシ又文面ニテモ面部ト云フハ眼部耳部ハ陽
以強ク道ル処ニテ多々多々血ノ流下スル故口鼻ノ両傍
ノ中両腮ハ先出先張シハ膿ニ先腐スルハ苦兆ト
スル故イハ又シテ面部ヲ見ワタシテ亦一ニ天庭ノ辺次眼部
耳部ヲ見ヨト教タルハ是ヲ二十四ノ預驗法トハ名ツケタル
之此外ニ面部三十六ノ圖傳アレヒ茲ニハ大略ヲ拳テ肝
要ノ処ヲ引クリテ述タル

假如

假如面舌耳凶則以面舌

為主

一部ヲ見合セテ要トスル処ハ天庭卯堂ノ地ニ



此知ノ瘡サ(吉ナラハ耳部ノ事ハ次トメイルト)天庭ヲ
三三夜タル
其三部俱不犯者、病を軽三部共ニ

吉ナラハ至極ノ輕症トスル
○是テハ出処ノ吉凶ヲ驗シ
次ノ章ヨリ瘡色ノ吉凶ヲ述タリ
頂白根紅者、血

分也在四日上血系ふ後必發瘡
此系總命ノ内ニモ

戴テアリ少ノ違ナリ
○瘡ノ形狀ハモハヤセ并ヨリ后ハ

頂白シテ光ヲ放ツヘシ此頂高ク白キ知ハ系ハ白ヤふ白ノ

ヲ見テえ系ノ虚实ヲ驗スヘシ根紅トハ血暈ヲ云ク

根ノ紅ニメ暈ヲ見スハ血アリ是ニテ血ノ榮ト枯トヲ察

ルニ系血ノ多ナクトハ多トアリト分レタル象ヲ云ク

計時ニ根窠脚地四圍ナク傳アリ右四日ノ上血系ふ

トハ四日ハ起脹ノ初ノ日ノ上ハ四日五日ヲ云此期ニナリテハ

白將水ヲイタキ根暈收緊スヘキニ頂モ白カラス血

暈モ散漫シテ血ト系トノ分カレハ又モノヲ血系不

分ト云ヒテハ七八日貫膿ノ期ニナルト瘡ヲ生シテ搨陷

トシ死傷ニナル此系血ふニ稠密ニシテ紅紫ナルト治

白ニシテふトアリ治別ル
項冲根附者、血

夫也在四日上窠白地消腫厚紅疤の治

冲ハ

ヒイルト訓ス大鵬冲天^二テ天へ日ヲ射ル如ク飛上ルヲ
云モ後ナリテ瘡ノ頂ノツキ上リタルヲ是ニテ
實ノ根ナリ根附トハ血暈ノ根基ノ処へトリツキ收
緊シテ居ルヲ云モハ形ナキモノナレバ是ニテ毒ヲ拘
テ止メツキ止メ血ハ形アルモノニテ根モトニテ毒ヲ緊シクトリ
マキククテ毒ノモレヌヤウニシテ有^レ根暈散スレハ止
ツキ上ケタルニテ毒モレヌ^レ毒^ノ内^ニ陷スル^レ項冲根附
ナレハ毒ハ血ニ依テ^レ位ニナリ血ハ毒ニツラレテ下ニ位ニテ
毒ハ血タカヒニ更リテ毒ヲ化シテ膿トナシ^レ痂トナス^レ是ヲ

血更ト云ハ日トトハ起脹ノ終リ六日ノ晩景ヨリ膿モ
コタナル期^ノ上トハ七八日貫膿ノ期ヲ云窠白ハ瘡ノ窠
ノ白ヲ云起脹ニハ項ハカリ白將^レイタ^レク六日晩景
ヨリ催シテ膿ヲ貫ヌキテ一窠ミナ白ク膿ト^レ根暈ハ
紅ノ系ニテク^レリタル如ナリ地トハ空隙ノ地ヲ云^レ内地
色ハ黄紅白ニシテキヨウカナルヲ云是ナレハ九日晩景
ヨリハ蒼蠟色トテウスクロクナリ十二日ハ腐^レ厚ク成
ル^レ紅^レ危トハ^レ痂ノ^レ為タルアトヲ云^レ是^レ瘡^ノ痕^ノウス^クア^カク^メ紫
赤ナラス淡白ナラ^レ子^ハ此^レ未^レ疔^ニ變^レ疔^ナシト枕ヲ高^クテ

二五

六

カタルヘレトナリ 疔ハ瘡痕ナリニ加テテモ痕色ヲ見
 ル傳アリ 桃花色ヲ告トス 淡白ノ者ハ氣血虚トス 肺虚
 トス 若シ治テ誤トキハ忽愛ヲ生ス 又調護失宜凡
 害ニ侵レ忽死スル者アリ 又疔色ハ赤黒ニテハ熱
 毒ノコリ有リナリ 又痕内凸起メ痒ヲナスハ凡熱
 疔ノ類ニヨリ

若見形色深紅大熱退者將欲發疔 若トハ
 前文ノ氣血分ル時分ノ若ナリ見点ヨリ也 疥ヲテテ
 フニ二日四日ハ頂白根紅クテルキニ 若又左ニアラスモ

痘色深紅ニメガニ大熱アリ 確サルハ結毒毒癰トス
 早く清涼ノ劑ニテ血毒ヲ解スヘシ 不然レハ疔ヲ發トス
 ルノ兆ニ凡テ血熱スレハ毒癰ニテ痘色赤紅紫ニナル是
 生斑生疔トスルニ十神解毒加苓連ニ至 則涼血攻毒飲
 清涼攻毒飲ノ類多ク考シテ用ヘシ 〇位処ニ淡白者ヲ
 舉キキニトモハサル者ハ是ニテニ氣血虚候ハ委曲ニノ
 へテアルニ愛ニ略シタルニ 四日上鏡用清法 四日上見点ノ
 日ヨリハ疥トナラズ云フ 瘡癰ニヨク尼清解スヘカラス 四日ニハ
 熱ササメテ見点スヘキニ 却テ熱強ク痘点赤紫ナラハ

血極タルる明之清解セシハ有(カ)ラス然(レ)此(ハ)四日五日

ノ期ヲ云フ **五日上終用下法** 五日ハ起脹ノ初日(ハ)五日ニ

メ結毒(ハ)解者ハ清解乃(チ)フ処ニ滌ス茲ニ至(チ)又下法ヲ

用(シ)然(レ)凡(レ)何(レ)行(ク)下(ル)六日(ハ)留(ル)キスト貫膿ノ期ニナリ

テハ行(ク)下(ル)ヲ禁(ス)又下(ル)之(レ)毒(ハ)去(リ)極(ル)去(ル)ヲ知(ラ)ス

連(ニ)トム(シ)左(ニ)終(ノ)字(ヲ)下(セ)リ清法下法補法凡(レ)終(ル)

用(ト)ム皆(レ)止(ム)る(ヲ)得(ス)レテ用(ク)之(ル)度(セ)サル(ヲ)示(ス)

六日上終用補法雖遲亦不(レ)過(ル)八日 六日晚景ヨリハ貫

膿セントスル(レ)九(ニ)テ瘡(ハ)ト六日(ハ)屬(ル)極(ル)下(ル)六日(ハ)屬(ル)室(ト)ス

友七日ヲ改限ノ日ト云(シ)其(レ)時(ニ)瘡(色)ヲ見(テ)唇(舌)ヲ詳(ニ)メ

名(ニ)虚(ナル)る(ヲ)知(ラ)ハ補法ヲ以(テ)レ是(レ)已(レ)終(ト)云(シ)三月(ヲ)付(テ)

補葉大過ナレハ水泡ヲナスノ憂アリ九日(ニ)至(レ)ハ收(斂)屬(ル)

ノ期ナレハ極(ニ)面(ル)レ(ル)左(ニ)多(ク)附(ク)用(モ)ノモ九日(至)リ膿(呈)ル

モノハ多(ク)附(ク)除(ク)治(淋)傳(ニ)詳(ナ)レハ此(ニ)略(ス) **大略繩墨**

如此 瘡ノ形状ト清下補ヲ用(ユ)ルノ繩墨ハ大略此(ノ)

通(ル)ノ繩墨ハ大(ニ)用(ル)ス(ニ)糸(ク)木(ノ)曲(リ)ヲ正(ス)ル(具)之(レ)

嘴牙相干聲之微甚カク強弱可以驗(之)也 嘴ハ此(ノ)

ト曰(ク)嚙(ク)闕(嘴)ハ屬(ル)室(ト)牙(ハ)屬(ル)實(ト)極(ニ)ト云(フ)ヲ

一句ニ論スル語之開嘴ハ唇ヲタヒ合スルノ憂ハ撃也
ト注ス此ニテハ咬牙ノ一之干ハ犯之觸之唇ヲ合セ齒ヲカム
ノヲ云々を好ム大ナル者ヲ定トシ小ナル者ヲ極トシカノ
ツヨキヲ定トシ弱キヲ極トス是ラニテ定極ヲ分ツ又
何ニ開レロモノ多ハ極合レロモノ多ハ定ニ属ノヨリアリ極
唇舌ト定極ニテ定極虚字ヲ糸ヲ係ルノ勿レ
有黒點如火刺者定然此然ノ字恐クハ何者ノ係リ
ナラシ然ハ燒ナリト位メモエル如クナル極毒ニテメモエタル
意ニテ火刺ヲ親シタルニ似レ尼夫ニテハ文字不足然テ

ニ七

癸泡ト三字一句ニスルハ定ノ字不穩定ヲ凡定ノ字カ火ノ
字ニシテ見サレハ通セス火ニスルハ火燒トアリタシ火然
トハイカトナリ按ニ此章星点ノ吉凶ヲ判シタル緒ナシソ
レ凶凶ノ字ニナシテ見レ定テ凶ト判シテ后句ヨリ火刺
ノ形狀ヲ注セリ金鏡ニ然ノ下ニ先字アリ是ニテ端ア
ラメナル処也

癸泡中黒陷如肉而四弦有細泡尖
起火刺之刑也金鏡ニ從ヒ先ノ字ヲ加テ凡ル黒点如火
刺モノハ先々ハシメ先泡ヲ癸シテ頂尖ラス凹里ク
ナル如肉ト云意アリ痴ヲナスニアラス肉ノ色ノ黒

一

下

ナリ四方ノ一リニ細カニ多クモ子テ黒瀉ニナルモ形多ク
 シテ后四日上ヲ過テ此ヤウニナルモノ○此レ治術要ナリ
 膿期ニ至リ如火刺如肉ナルハ血虚ニ宜唇舌ト余瘡ト
 ヲ見テ温補スヘシ正斜臨依シテ如鼓如痛平搨ナルハ
 血虚ニ根暈淡白ニメ乾枯ナルハ血虚ニ治術ニ是ヲ
 子虚ニトル此症血ノ虚ヲ治スヘキニ血虚ニトルハイカ、
 ト云ハ血ハ有刑子ハ無形ノモノ有子ノ血ニヨリテ居ル
 ノ木ニ附テ有ル如ク有ニ血虚スレハ子虚スレハ
 血虚ス日シ此ナル有子ヲ補フ時ハ血自長ス○若又

余瘡焦紫ニシテ肉地赤色ナラハ毒トス解毒スヘシ
 其ニ唇舌ヲ詳ニメ治ヲ得テ勿レ

能自多干而能自虧干常

人身血有常不

ク曼クモ榮衛ハ人ノ正略路子ト示メ血ニテ活テ居ル
 夫ユト血ハ有ルモノハ常度ニテサタメリタル
 自ハ自然ニ然ルニ人ノ血ハ定リテ多クモ血モアルヘキモ
 ノナルニヤ、モスレハ有餘有不足アリテ病ヲ生スこノ内ニモ盈
 ルハ難メ虧ケヤスキモノソトニ次ノ句ニ血實ノ下ヲ
 云ントテ先ツ虚シヤスキ者ト云瘡ハ有ルノ病ニ異ナル

ヲ云々 **其所以盈者毒應** 干系而火博干急血身

博ハ傳ノ誤火乾ト注ス火極ニテ血ヲカハカシコカスフ又
總命中ニハ博ニ作ル博ハ圖也ト注ノコトメルフ血ト火ト
一カタマリニ成ト云フ何ニモ意ハ月シ〇系血カハキヤスキモ
ノニテ血有餘スレハ系不足シル系有餘スレハ血不足ス今
盈ルト云ハ系血ノ全ク盈ルニハアラス極毒カ系ニ癰土
リテ系實ニ見ユル又極毒カ血ニ入りテ血實ニナルモ極
毒カ血ヲカハカシ焦スル赤色ノ血焦レテ深紅ニ變シ
此紫黒ニ變スルハ是ユヘ系實モ血實モテコトノ實ニ

アラス毒ノ實ソトシ

血過補成班系過補成泡 凡毒

系奪則虛邪系盛則實

左ニ補法ヲ行ニモヨキホト

ノ加減カアル事ヲ留補トテ度ヲ留ルト血實ノモノハ
班トナリ系虛ノ者ハ泡トナル此ヲ以テ此系間ニモ真
系奪則虛邪系盛則實ト云テアレ凡此類若總
用補法ト云テ照シタモノ也傳ニ總命ニハ血過補成班
系過補成泡ノ十字ヲ班者血有餘泡者系過甚
ニ十字ニナリテアリ此類ノ血過補ノ上ニ加テ見ルト詳カ

封眼在六日羊此陽系升提陰毒干至陽之分也羊ノ

字通シカタニ牛ノ字ノ隈字又午ニスレハ午后ト置タ
 キモノ此虫スヘテ文字ノ区ラヌヤウナル処多キ文之何レ
 此処ニモ恙字有レシ〇封眼ノ期ヲ云ハ六日ノ午后
 ヨリ眼封スルカ迄期ナリ六日ハ起腫ノ終ノ日也此時
 ニナレバ元陽ノ毒上ニ浮テ毒毒ヲ至陽ノ地ナル面部引
 アクル故眼ヲ封スルニ症案モ此期トハ頂尖リ白膿ヲナ
 ス毒類毒上ニ萃ルユナリ

未腫過封後必喪明

頭目無瘡者不封或封而誤破即退瘡六日ヨリ

面ノハレヌトキヲ云過封ハ封スヘキ期ヲ過テ早クハレタル眼
 先封スレハ眼胞ノ腫レルユヘ後必目疾ヲ生ルト也又六日
 ヲ封眼ノ期トスレバ頭ヤ目ノ迄ニ毒瘡モノハ封セス
 又封シテモヤシク腐スルト目開クニ〇四五日ニメ急ニ封
 スル者ハ毒虛ニ又四五日而面部忽ニ腫者ハ凡邪ナリニ
 症共ニ凶ノ兆也封眼ノ期ハ大瘡家ハ五六月ヨリ眼封シ
 テナニ三日ニ至テ開者ヲ吉トス中瘡ハ六月ヨリ封メ九月
 十日ニ開ヲ順トス稀瘡ノ者ハ七八月九日ニ至テ開ク
 又眼胞瘡稀少者或而面部少者ハ八日至リ即封メ

即開ク又十三日ニメ眼不開者或開后復封ルハ必ス
 眼疾ノ患アリ早ク圖ルヘシ又稠密ノ瘰ニテ封
 眼モノアリ后必目ニ疾ヲ生ス又六七日ニシテ眼胞ヲ
 揺スモノハ眼開カントスルノ兆也此時大便一復通スルト
 眼乃開ク大凶也至虚トス宜峻補スヘシ **毒盛者**
 清解之清解已盡不^テ解^ク之^ヲ以補^フ之^ヲ別六日上定有
 定顛咬牙之變灰白色示然 初二日ノ間血^ヲ搥^ル毒
 ノモノハ宜清解ノ劑ヲ用ユヘシ清解シテ毒^ヲ解^シタ
 ラハ經テ補^フ之^ヲスヘシ若補^フ之^ヲセサレハ六日費膿^ノ期ニ

至虚寧ノ症トナリ至^ニ戰^ル咬^ル牙^ノ變^ヲ生^スヘシ灰白^ノ白^ノ臨^ノ
 症トナルモ日ク補^フセサルノ過^ニ清^解ノ劑トハ清^熱解^毒
 毒^ヲ敗^ル母^ヲ和^シ中^ニ十^ニ種^ノ解^毒加^テ苓^ヲ連^ノ葉^ヲ云^フ清^解已^盡
 ハ何ヲ以テ知^トナラハ大便ヲ以テ試^ムヘシ大便ニクヒ
 通^シテ始^メ難^ク后ヤハラカナルヲ清^解之^ヲタリトナス
 煩^ト退^テ舌^ヲ黃^ク老^ニ成^{ナリ}是^レ補^フ之^ヲスヘキノ目的^也
 ○補^フ之^ヲハ内^ニ托^シ大^ニ補^シ保^ス之^ヲ葉^ヲ云^フ内^ニ托^シ散^ハ純^ニ補^ス
 ノ葉ニアラス托^シ葉^ヲ解^ノ劑^也清^解已^盡モノハシツ
 カリト補^フスヘシ毒^ヲ解^ハ毒^ヲ毒^ヲ傷^リ毒^ノ虚^ノ症^トナル

此アリ又六日前に戦咬牙スルハ屬極スルアリ如シ
空ニ属シ虚ニ屬スルモノハ木香異功散コレヨロシ

極三日而萌 此条ハ瘰癧ノ初期ヲ云先順瘰癧ノ初期ヲ

示メ險途ヲトラシム初發三日ノ極ハ薑蕪ノ極ニ付時

ニ瘰癧内藏ヨリ生セントスル芽ヲおストノ萌ハ羊木

芽ニト注メノキト刺スイマタむせセサルヲ云治法ハ疑似

ノアナルユ一加味升疔着根湯ヨシ極ツヨクハ吸毒和

中湯瘰癧ニ從テ方ヲ投スル也又ハ瘰癧ヲ見ル也 **亦三日而生**

瘰癧ノ順ナル者ハ三日月ノ晩四景ニ極ガサメテ四日ヨリ

此是初期ノ三日トハ瘰癧ノ此日毎三日ノ三日メニアラス

〇付時二丘血肌表ニ見ルヲ大極ノ始ト定ル此章ニ

云フ日期ハ初極三日ヨリニテ始終十五日ノウモリ順瘰癧ニ

初極ヲ日期ニ入レタルニ然レバ序極ニ多ク少アリテ定リ

カタキ初四ノ節ニハ是ヲ入レズ右極ヨリカソヘテ日期ヲタテ

四節ニ分ツ是極ノ〇見占ヨリむ併マテ三日ハ去ノ意ニ

陽春癸生ノ令ニ順養ノ疔ナラハ不用此業升疔着

根ニ業ヲ用ト却テ養業ヲ傷ル也 **三日而長** 起脹ニ

日ハ復三月ノ節ニ付時項放光紅影紅活アルヲ義ト

ス至^レ臍^ニラサ^ルヲハカラハ温補ス^レ空ク痒搦
 潰爛ノ憂ヲ防ク^レ三日而臍^ニ貫^ル臍^ニ三日ハ秋三月百
 葉成熟ノ節トス頂冲根暈収緊シテ臍^ニ充^ルズス^レ
 ノ時^ニ見^ル点ヨリ七日ヲ改限ノ日トス内ニ在^ルモノ皆表ニ
 出^ルテ内ハ空^ク虚^ク之^レ故ニ上^ニ六日ハ屬^ス極下^ニ六日屬^ス空
 スト云内^ニヲ卷^クフ^ル肝要本文ニモ和鍋中^ニ龍^ノ内^ニヲ
 陽起一分陽亦長一分^ノ薄アリ空ク臍^ノ空ト不足
 ヲ^レテ^テ寒^ク戰^ス啞^ク牙^ヲ浮^ク下内^ニ陷^ルノ憂ヲ防ク^レ凡^ク臍^ヲ
 ナスノ日次^ニ起^ル脹^ル冷^ルノ日ハ六日ヨリハ口^ニ吻^クヨリ臍^ヲナス

爽^ハイ^ハヤ^カ
 爽^ハイ^ハヤ^カ
 爽^ハイ^ハヤ^カ

へ七^日眼部下鼻ノ過^クハ八^日顔ヨリ天庭ヲ過^スへし
 九^日ハ腦后ニ至^ルへし九^日ノ後^ニ暴^クヨリハ面^ニハ時ヨリ年ノ
 背^ニ至^ル十日ハ腰^ニ兩^ニ足^ニマ^テテ白臍^ニメ紅暈^見ル^レ此^日
 ニ至^リ兩肘^ニ臍^ノモ^ノハ脾^毒不^レ解^ユへし下利^ノイ^ノ怪
 症^ヲ生^スル^レ油^ヲ煎^スル^ルヲナカ^レ三日而痂^ヲ收^ル腐^ス三日ハ
 冬^ニ三月^ニ收藏^ノ令^テ百^葉收^ル時^ニ之^レ痕^頂黃^臍ヲ吐
 キ^テ痂^ヲナス^レ此^日ハ面部^ノ痂^ヲ云^フ年^足ハ臍^テアル^レ
 若^キ年^足心^{ヨリ}腐^スル^モハ凶^ク怪^症ヲ生^スト云^フり
 始終^ノ如期^ニ不爽^也也^ハ爽^ハイ^ハヤ^カ心^ト淫^ス不爽^ハ日期

ヲ此通り違ハヌ有順美ノ處ト云フ

少一日則必遲三十四

一日ヲ女シク二日ヲ必ス遲ス二日ヲ少ハ不多ト後ス遍採テ菜ヲ黃ヲ少一人

ノ女ニテ三日ノ内一日カケテ初極ヨリ五日ニ見直スル

ヤハリヲソキト見テヨシ必ス遲一日ハ六日必齊クヲハルキ

ヲ七日ニ必テスムト云義少二日モ二日ツツヲヨクルルヲハ乃

序極ニ五日アリト云ニ多シ一日則必早ニ一日多シ二日必早ニ

二日見直三日ノ内一日早く見直スルト是ヲ一日多クス

ト云多二日モ日シ一日極即ハ二日極即ハ少ク見直

早キニ極キハアレト三日ヲノ朝ニ違ハナシト有ニ遲ニ一日

早一日ト云フトアリニ序極ハ三日トハ云ハレ月シカラヌ此一

系ヲ拳テソノ憂ヲホス是ヲ以テ曼公ノ傳ニ序極ハ四

節ノ日期ニ入レス多極ニ而出ル者ハ毒輕程法口決ニ

毒輕別極ニ輕ク毒ヲ別極ニ之ノ向アリ茲ニハ極多ハ

毒輕ト云テ大ニ反ス曼公ノ他ニ極ノ多者ニ云毒ノ多少

アリ極ノ少ナルモノモ輕キアリテ一根ニ命シカタシモ内

毒イカント見ルニ初極ト盛ナルモ肌毒ノ極ニシテ内毒

アルノ其精神清爽ニシテ寢食益故面色微黃紅

白ナラハモ毒輕シテ必極稀少ト知ルヘシ反ス者

ハ重シ **女塊** 而出者毒重 又初ニ **熱渴** 微ニシテ **頭温**

三十五

以冷ヨリ而蒸々内煩其面色深紅毛ナルハ是伏火伏毒
之入或面色或滯青色或慘黯若ハ毒虚ニ共ニ毒
をルト知ルハ輕ガニメ神志清爽寢食益故モノハ稀
瘕タルヲ明シ又他ニ血熱毒瘕又ハ毒虚血虚毒虚実
裏虚を實ノ病ヲ分テ治テ施スハ茲ニ略ス **毒重** 而ハ毒

血負者死運毒輕而毒血負者死運 **負ハ置之**

也ト注メニノウラシ荷フ物をケレハタカタシマクルソムクト訓
モト理ニ毒重ケレハ毒血ソレヲ負戴スルニタカスルニ死ス

そ毒血ノ負ルヲ見ルハ是毒虚令ニメ或失血シ或ハ毒血
小或ハ瘕見テモ凝伏シテ不長或ハ虫毒此毒毒
黒ノ瘕ニシテ伏火伏毒ノ病ニメ毒重ク毒血負ルトス是
鼻毒毒ヲ以テ死モ速シ○又毒輕ノ毒血負ルトハ
膿ヲ三ニ分ハナシタレハ是毒ヲカス或早ク目ヲヒコフキ
或深下シ遂ニ毒血虚ニ至ルルモノモ日ヲ追テ死ス
ルニ凡テ死病ト成ユ正ニハ皆毒重クシテ毒血ヲサレハ
血負ハ毒離血散ヲ以テ知シ毒離ハ頂ノクホメルニテ
血散ハ紅暈ノキルハ是毒血ノ離散ヲ驗スハ

將水僅羊成而身也。然能食者將必死。而得生以其毒

在肉也。胃膿ノ期ナリ全ク膿ノ量ルニハアヲ子ニ而ト

五分位ノ膿ヲ成シタルモノ羊死羊生ニメ決シカクシ是ヲ

見ルニ身ニ薑薑ノ極アリテ食ヲ能スルナラハ藏ノ毒

毒ハ外ニ切テ尽テ胃ノ内ニ固シトス此レハ只毒ノ肌

肉ニ壅メ全ク膿スルヲアタワサルヲ知ル者十三日ノ后

之毒肌肉ノ内ニテ之膿ヲ棄シ膿トナリ生ヲ得トスト

身涼能食者將必潰爛而得生以毒在皮也若又身

涼ニシテ薑薑ノ極ナキハ陽氣ノ虚ニ然レ能食スル者ハ

是モ内毒尽テ胃ノ内ニ固ナリ是レハ毒皮毛ノ下ニ

アリトス然ラハ瘡潰爛シテ膿汁ヲ吐メ生ヲ得此瘡

食ヲ能サレハ毒内ニアリテ胃ヲ敗ラヌルヲ知ル者ハカラ

ス〇膿熟シテ潰爛スル候ニ若膿未成シテ先潰ル者ヲ

班爛ト名ク班トハ二三窠ツクテレテ処々ニ在リ潰ハ一ニ

ニタルニテトス潰爛メ不結加ハ倒斃ニ三五腫潰潰

爛ハ疔蝕ニ共ニ十全大補ニヨリ

死食スルヲアタハサルモノハ毒イマタ藏府ニアリテ胃傷

受クテ食アタハス者ニ表ニ吐タル瘡モ毒ヲ化シテ膿

トシ痲トナスヲ又ハス忽内攻シテ下利呃逆煩躁
等諸惡症出テ死ス并トハ身熱者モ力冷者モ芒
ニナリ之瘕ハ九テ内毒外ニシテ胃腸内ニ全キヲ要ス
死飲食良ノ多クニテ眩ロシ急ヘシトシ

