



郷食庭秘説

渡瘡

十四

十武
245
13





鄉食庭家秘說
十四之卷

Handwritten notes in cursive script at the bottom of the pages, including characters like 月, 日, and 年.

九折堂山田

痘疹總說



凡痘之治方別ニナシ順痘ハ兼カヲカラス

惟難痘ハ兼カニ因テハ愈難ニ先兒ノ強弱毒ノ輕重ヲ度リテ発
表ノ劑ヲ用ヒ后ハ消毒解毒ノ劑ヲ用ヒニ発表ノ熱ノ解スル
有下劑ヲ用テ熱ノ解スル有回水灌膿ノ項ニ至リテハ内攻
発熱甚ク渴ヲ生シ煩悶ノ齒ヲ咬ナラシ身ヲ振シ痘瘡紫黑色ニ
アガキ死ニラスル有下劑或煩渴ノ治方頻リニ用ヒ用
テ后様ス静ニ成渴止ニ熱少シ解シ眠ヲ催ス治スベシ難痘
ニテモ十五日サハ過サバ治スル理ト知ルベシ初発熱醒テ不食
スルハ惡候也難痘ニテモ食ヲヨクスル者ハ多ク治スル者也又治ヲ用
ル下劑ノ俗方ト云ヘ凡効有者ハ從テ用テ可也

柴胡消毒飲之方

痘毒深キ者或挾斑疹者及痘後
餘毒皆去之 柴胡 大黃 芩 半夏 大黃 枳 荊 芥 連 竟 防 風



牛蒡子 川芎 甘草 右十味水煎服

解毒潤燥湯之方 此方効能前二有 杏仁 冬 黃連 大黃 中

石膏 甘草 粳米 右六味水煎服

伐毒三黃湯之方 此効能前條二散見ス 大黃 黃連 黃芩 紫苑 生地 黃 右五味水煎服

神仙丸之方 巴豆 麵粉 右二味麵粉ニ巴豆ヲ包ムスニ巴豆ヲ去テ麵ヲ丸トスル

桂枝加黃芪湯之方 桂枝湯ニ黃芪ヲ加ヘタル方ニ右記スル

痘瘡ノ秘書ハ皆書ク經驗ノ條ニテ取ルベキヲ多ク見ユ我カ門是ヲ試テ可ニ在テ治療ハ更テカザラズニ親切ニ書タル書有是

實智ヨリ出テ稱スベキノ書ニ今此書ノ如キ其旨ニカケリ能ク熟覽ノ他日ノ用ニ備フベキ者

痘瘡二十四預驗之辨

此書ニ序有左ノ如シ

痘科鍵中有二十四預驗法其語未盈五百字而痘之驗法舉吉凶治術者皆已盡矣余藉天寵靈得從錦橋先生以受曼公戴君之秘訣也以茲每侍帳前錄其咳唾以備遺忘今抄此一篇訓話以和語示諸兒童若有熟讀者則不卒卷而思過半如其疎漏則夫子存矣寬政十己未春二月揚

皋島翹撰 二十四預驗之法 此二十四ト云名義通シ雜シ篇中ヲ細見ス

ルニ二十四ノ一ニ見ヘズ然ルニ亦ニ 法ノ一條アリ是ヲカクヘテ

ニルニ二十四法有乃此ヲナルニ二十四ノ占法何レモ面部ノ皆

吉凶ヲ占フテ相家ヨリ起リタル成九レ傳モ占人ノ生死

亦莫如面ト有テ面部ヲ八卦九丘五藏モ配ノ吉凶ヲ占ニ果

二
氣青氣ヲ見ル一ハ曼公ニモ有皆相法ヲ交へタル也朱子天^其其各目
ヲ假リテヤハリ面部ト云一ニ取リタリ故ニ面部第一眼部次ノ耳部
亦次ノ是ト書テ有而共出ル処ト痘ノ形色ニテ古凶ヲ統へ
編ぜり是正シキ処ヲ示シタル占法ニ云一烏雀黒露黒金白
珠ナトシカト分リ難シ又見レテモ合ヌ一有^レ痘色ト唇舌トノ
確然タルニシカズ故ニ朱子ハ此訣ヲ取ヌ成ルベシ此時方面部ヲ見
ル一ヲ二十四ト云フタル故ニコレ此名目ヲ挙タル一成^レ然^レ占
法ハ出サヌ等ノ一成ニ世ニ稱スル故へ出シタルカ又ハ朱鳳大成カ馬
牛ノ時ニ挽^レ入セシヤ知ルべカラズ此処ハ面部見ル一ト見ル^レ色
ニニ説クハ鑿ナルベシ預^レ驗トハアウカジシ先カタヨリ后ノ一ヲ
驗シ知ト云一^レ驗ハ徴^レ証ト注ス

面部第一

先ツ面部ト云出タル故二十四ノ面部ノ一成一明

今面部第一ト云ハ天庭ヨリ頤迄ヲ總テ云タル也夫ヨリ手足次ノ
是トカ胸背次ノ是トカ云^レキニ眼部次ノ是ト有ハ不解ノ文也夫
故曼公ノ傍注ニ天庭曉星司空日月宮輔官大陰太陽是^レ
ト有ハ面部ト云内ニテモ天庭ハ神明ノ舍スル処ニテ緊要位トス
ル也此処出有起脹スルハ惡候ナル一ヲ加ルベシ傳上亭中亭
下亭ノ方有眼部已上ヲ上亭ト名ク上亭稠密成ル毒ノ神明
ノ坐侵スト爲ス惡候トトス

眼部次之

眼部ヨリ鼻ノ邊迄ヲ中亭ト名ク眼胞魚尾

輔觀淚道ナト云^レ先出ルハ天庭ニ早ク出ル程ノ惡候ニ非
サレ凡次之ト云ヒシ鼻準ハ脾ニ配メ準頭中亭ノ方ニ密ナルハ脾
毒不解トス

耳部又次之

耳ハ腎ノ外候ト成テ耳輪へ先出テ稠密

ナルハ腎ノ爵毒トス悪候シ曼公ノ説テ面部ト云フヲ眉上
 一ト而已見テ眉上眼部耳部ト分リ擧テハ口傍腮頰ノ
 ハ一向ニ云々様シ又又面部ヲモ面部ト先ツ云ハ眼部耳部ハ
 陽明經ノ過ル処ヲ多氣多血ノ処トスル故ハ口鼻ノ兩傍人中兩腮
 此処先出先脹先膿シ先靨スルハ吉兆トスル故云ハヌシ先面
 部ヲ見ワタシテ第一天庭ノ邊次眼部耳部ヲ見ヨト教タル
 是ヲ二十四ノ預驗法トハ名ツケタル也此外面部三十六ノ
 圖傳アレヒ茲ニ大畧ヲ挙テ肝要ノ処ヲ引ク、リテ述タル也
 假令面吉耳凶則以面吉為主 三部ヲ合見テ要トスル処ハ天
 庭印堂ノ地故ハ此処ノ痘サハ吉ナラバ耳部ノ一ハ次ト見ルベ
 シ天庭ヲ重ニ取タル也

其三部俱不犯者為症甚輕

三部共吉ナラバ至極ノ輕

症トスル也。是直ハ出痘ノ吉凶ヲ驗シ次ノ章ヨリ痘色ノ吉凶ヲ述
 タリ

頂白根紅者氣血分也在四日上血氣不分後必發癩

此條
 總論ノ内ニモ載テ有少ノ違也。痘ノ形状ハモハヤ出有ヨリ后
 ハ頂白シテ光ヲ放ツベシ此頂高ク白キ処ハ氣ハ白ト不白ヲ
 見テ元氣ノ虛實ヲ驗スベシ根紅トハ血暈ヲ云其根ノ紅
 ニハ暈ヲ見スハ血有是ヲ血榮ト枯トヲ察ル也氣血ノ分ナ
 別トハ氣ト血トノアリノト分レタル象ヲ云フ也 此時ニ根窠脚
 地四圍ナドノ傳有右四日上血氣不分トハ四日ハ起脹ノ初日也
 上ハ四日五日ヲ云此期ニ成テハ白漿ノ頂キ根暈收緊スベキ
 ニ頂モ白カラズ血暈モ散漫メ血ト氣トノ分が見ヘ又者ヲ血氣不
 分ト云是トバ七八日灌膿ノ期ニ成ト癩ヲ生シテ塌陷トシ死証

二成也此気血不分ニ稠密ヲ紅紫成ト冷白ヲ不分ト有治術別也

頂冲根附者気血交也在六日上頂白地清靨厚紅癩可

諸無變

冲ハヒイルト訓ス大

冲天一テ天ヘ日ヲ

ル如ク

飛挙ルヲ云其義ヲ取リテ痘ノ頂ノツキナリタルヲ是元氣実ノ兆也根附トハ血暈ノ根基ノ処ヘトリツキ收緊ノ居ヲ云氣形ナキモノナレト其氣ハ毒ヲ物ノ上ヘツキ出シ與形アルモノニテ根本ニ其氣ヲ緊クトリツキクワリテ氣ノ淺レ又様ニ有リ根暈飛散スレハ上ヘツキ上ケタル元氣モレ又故毒氣内ヘ陥イル也頂冲根附ナレバ氣ハ血ニ因テ其位ヲリ血ハ氣ニ連テ下ニ位シテ氣血互ニ交リテ毒花ノ膿トナシ加トナス也是ラ氣血交ト云六日上トハ起脹ノ終リ六日ノ晚ヨリ膿モコク成期之上トハ七八日灌

膿ノ期ヲ云窠白ハ痘一窠ノ白ヲ云起脹ニ頂キ許リ白漿ヲ頂キ六日ノ晚方ヨリ催メ膿ヲ貫キテ一窠皆白ク膿ト根暈ハ紅ノ系ニテクワリタル如ク成也地上ハ空隙ノ地ヲ云其内地ハ黄紅白ニ清カナルヲ云是ナレバ九日ノ晚方ヨリ瘡蟬色トテ薄黒ク也十一二日ニ靨厚ク成ル也紅癩トハ痂ノ落タルアトヲ云其痕ウスマカクメ紫赤ナラズ冷白ナラ子バ此亦ヒニ變証ナシト枕ヲ高メ諸ベシト也痂ハ瘡痕也痂落テ其痕色ヲ見ル傳有桃花色ヲ言トス冷白ノ者ハ氣虛トス肺虛トス若シ治ヲ誤寸ハ忽變ヲ生ズ又調護失宜風寒侵レ忽死スル有 痂色紫黒成ハ猶熱毒残り有テラシルヘシ又痕肉凸起ノ痒ヲナスハ風熱也荆防ノ類ニ宜シ

若見形色深紅大熱不退者將欲發疔

若トハ前夕ノ氣

血分ハ時方ノ若シ見点ヨリ出齊近ラ云フニ三日四日ノ期ハ頂
白根紅クテルヘキニ若又左ニ非其痘色深紅ヲ身ニ大熱有醒
ガルハ血熱毒壅ノ症也早ク清涼ノ薬ヲ熱毒ヲ解スベシ不然ハ疔
ヲ発ントスルノ兆也凡テ血熱スレハ毒壅メ痘色赤紅焦紫ト成是
生斑生疔トスル也十神解毒加黃連黃芩甚則涼血攻血攻毒
涼攻毒飲ノ類参考ノ用ベシ○此處ニ然白者ヲ挙グベキニ今云ハサ
ルモノハ是近ニ氣虛血虛ノ症候ハ委曲ニ述テ有故差畧シタル也

四日上總用清法

四日上六見点ノ日ヨリ出有迫ラ云序熱三日ハ
熱強ク凡清解ス不可四日ハ熱少シサメテ見点スベキニ却熱強ク痘
点赤紫ナラハ血熱タルト明ニ清解セズバ有不可然シ此ハ四日五日
ノ期ヲ云フ

五日上總用下法

四日ハ起脹ノ初日也五日ヲ血毒不解者

ハ清解ノ及フ處ニ非ズニ至又下法ヲ用ベシ然レ凡傳ニ行下六日
ニ過ト貫膿ノ期ニ成テハ行下ト禁ズ又下之毒去リ熱去ル
ヲ知ラ速ニ止ムベシ故總ノ字ヲ下セリ清法下法補法ト總ニ用
ト云皆止ムト得ズ用之テ過度セザルト示ス

六日上總用補法雖遲亦不過八日

六日晚景ヨリハ貫膿セ
ントスル也凡テ痘ハ上六日屬熱下六日屬寒ニ故ニ七日ヲ改眼
日ト云シ其時ニ痘色ヲ見テ唇舌ヲ詳ニメ氣虛成トテ知ラバ
補法ヲ行フベシ是モ總ト云ニ用テ付テ補茶大過ナレバ水泡ヲチ
スノ憂有九日ニ至レバ收靨ノ期ナレバ熱ニ回ル也故ニ參附ヲ用モノ
モ九日ニ至リ膿足ルモノハ參附ヲ

大略繩墨如此

痘ノ形狀ト系下補ヲ用ルノ繩墨ハ大畧此通
リ也繩墨ハ大工ノ用ル墨糸也木ノ曲ヲ正スルノ具也

喙牙相于聲之微甚力強弱可以驗寒熱

喙ハ唇ト同シ
喙ハ唇ヲ度ク合スル一受ハ擊シト注ス爰ニテハ咬牙ノ于ハ
犯シ觸シ唇ヲ合セ齒ヲ咬ム一ヲ去其声大ナル者ヲ寒トシ小ナル
者ヲ熱トナシ其力ノ強キヲ寒トシ弱キヲ熱トス是等ニテ寒熱ヲ
分ケ又傳ニ開口者ハ多ク熱合口モノ多ク寒ニ屬ノ一有猶唇舌
ト痘色ニテ寒熱虛実ヲ弁シ某ヲ誤ル一勿

有黑點如火刺者定然
此然ノ字恐クハ傳者ノ誤リ成ラン然
ハ燒成ト位ノ燃如ク成熱毒ニテ燃タル意ニテ火刺ヲ殺シ然似
レ凡夫ニテハ文字不足然發泡ト三字一句ニスレハ定ノ字不
穩定ヲ允定ノ字が火ノ字ニテ見ザレハ通ゼス火ニスレバ火燒
トアリタシ火然トハ如何也按ニ此章黑痘舌出ヲ判ル語ナシ

夫故ハノ字ニ成シテ見ルベシ定テ凶ト判メ后句ヨリ火刺ノ形狀ヲ
注セリ金鏡ニ然ノ下ニ先字有是ヲ端アラタタル也明白也

發泡中黒陷如肉而四強有細泡尖起火刺之形也 金鏡從

先ノ字多加テ見ル黒点如火刺モノハ先其初ノ水泡ヲ殺ノ頂尖ニ凶
ク黒ク成如肉ト云意有痴ヲナスニ非ズ肉ノ色ノ黒クシ
ニ水ヲ持テ黒陷ニ成其形奈ラノ后四日上ヲ過テ此痕殘ルモノ也
○此治術要ニ膿期ニ至リ火刺如肉ナルハ氣虚也宜唇舌ト餘
痘トヲ見テ温補スベシ不正針陷伏ノ如瘰如瘡平塌ナルハ氣
虚也根暈際白ニシ乾枯ナルハ血症也治術ニ是ヲ氣虚ニ取ル
此症氣血虚ヲ治スベキニ氣虚ニ取ハ如何ト云ハ血有形氣ハ無形
ノ物故氣ハ血ニ因テ居ル筋ノ木ニ附テ有如此故ニ血虚スレバ氣
虚也氣虚スレバ血虚スト同シ理ナル故氣ヲ補才ハ血自長ス

若又餘痘焦紫ニ肉地赤色ナラバ熱毒トス解毒スベシ共ニ唇舌ヲ詳ニメ治ラ誤ルル勿レ

人身氣血有常不能自盈于常而能自虧于常 人ノ一身氣

ト血ノ二ツシ曼公モ榮衛ハ人ノ正路ト示メ氣血ヲ活テ居ルシテ故ニ氣血常ニ有モノシ常ハ常度ヲ定リ久シ自ハ自然ニ然ル人ノ氣血ハ定リテ氣モ血モ有ベキモノ成ニヤモスレバ有余不足有テ病ヲ生ズ其内ニ毛盈ルルハ難メ虧ケヤスキモノゾト也次ノ句血實ノ一ヲ云シトテ先虛シ易キ者ト云痘ハ常ノ病ニ異成一ヲ示ス

其所以忽者毒壅干氣而火燔干血耳 燔ハノ誤火乾

也ト作ス火熱テ血ヲ乾シ焦ス一又總論中ニ燔ニ作ル燔ハ燔也ト注スマロメル下血ト火ト下塊リニナルト云一何ニ毛意ハ同シ〇氣血乾キ易キモノニテ血有余スレバ氣不足シ氣有余スレバ

血不足ス今盈ルト云ハ氣血全ク盈ルニハ非ス痘毒ガ氣ニ壅リテ氣實ニ見ユル又熱毒ガ血ニ入テ血實ニナル其熱毒ガ血ヲ乾シ焦ス故赤色ノ血焦レテ深紅ニ変ス紫黒ニ変スル是故氣實モ血實モ誠ノ實ニハ非ス毒ノ實ツト也 眞

血過補成班氣過補成泡故無氣奪則虛邪氣盛則實 故

補法ヲ行ニモヨキ程ノ加減ガ有失ヲ過補トテ度ヲ過ルト血實ノモノハ班ト也氣虛ノ者ハ水泡トナル是ヲ以テ素問ニ毛眞氣奪則虛邪氣盛則實ト云テアレ此語前ノ總論用補法ト云テ照シタモノ也按總論ニ血過補成班氣過補成泡ノ十字ヲ班者血有余也泡者氣過甚也ノ十二字ニ成テ有此語ノ血過補ノ字加テ見ルト詳也

封眼在六日午此陽氣升提陰毒于至陽之分也 午ノ字

通シ難シ午ノ字ノ誤乎又午ニスレバ午后ト置タキモノ此書
 テ文字ノ足ラヌヤウナル処ヲキ故レ此処ニモ落字有ベシ封
 眼ノ期ヲ云ヘバ六日ノ午后ヨリ眼封スルガ定期也六日ハ起脹ノ
 終ノ日也此寸ニ成レバ元陽ノ氣上ニ字ニテ痘毒ヲ至陽ノ地ナル
 面部ヘ引アグル故眼ヲ封スル痘窠モ此期トハ頂尖リ白膿ヲ
 ナス氣類毒上ニ舉ル故也

未腫過封後必表明頭目無痘者不封或封而訖醫即退痘
 六日ヨリ毒ヲ升提スル故頭面腫ル也夫故眼モ封スル未腫ト
 ハ頭面ノ腫ヌオラ云過封ハ封スベキ期ヲ過テ早ク腫レタル也
 眼先封スレバ眼胞ノ腫ル故也后必目疾ヲ生ルト也又六日ヲ封
 眼ノ期トスレバ頭ヤ目ノ邊ニ無痘モノハ封セズ又封ノモ少シク
 醫スルト目開ク也四五日ニ急ニ封スル者ハ氣虚也又四五日而

面部急ニ腫有ハ風邪也二症凡ニ凶ノ兆也封眼ノ期ハ大痘家ハ
 五六日ヨリ眼封メ十二三日ニ至テ開ク者ヲ吉トス中痘ハ六日ヨリ
 封メ九日十日ニ開クヲ頃トス稀痘ノ者ハ七八日ヨリ九日ニ至テ開
 ク又眼胞瘡稀少者或面部少者ハ入日ニ至リ即封メ即開ク又
 十二三日ニ眼不開者或開后復封ルハ必ス眼疾ノ患有早ク圖ル
 ベシ又稠密ノ痘ヲ不封眼モノ有急目疾ヲ生スル也又六七日
 ニ眼胞ヲ揺スモノハ眼開カントスルノ兆也此寸大便一度通ス
 ルト眼乃開ク大凶也氣虚トス空ク峻補スベシ

毒盛者清解之清解已盡不經之以補益則六日上定有
 寒顫咬牙之變灰白色亦然 初三四日間血熱熱毒者
 宜ク清解ノ劑ヲ用ベシ清解ノ熱ヨク解タラハ經テ補益スベシ
 若補益セサレバ六日貫膿ノ期ニ至虚寒ノ症ト也寒戰咬牙

ノ変ヲ生スベシ灰白白陷ノ症トナルモ同ク補セサルノ過シ清解ノ劑トハ清熱解毒敗毒和中十神解毒加芩連ノ類ヲ云清解已盡ハ何ヲ以テ知ルトナラハ大便ヲ以テ試ムベシ大便ニ一度通メ始ハ難ク后柔ナルヲ清解尽タリトナス煩熱退テ舌黄ニ成シ是補益スベキノ目的也。補益ハ内托大補大保元ノ類ヲ云傳内托散ハ純補ノ薬ニ非ス托裏丸解ノ劑也清解已尽モノハシツカリト補スベシ矣解ハ表氣ヲ傷リ表虚ノ症ト成傳有又六日前寒戰咬牙スルハ屬熱スルアリヤシ寒ニ屬シ虚ニ屬スルモノハ本香異功散宜之

熱三日而萌 此條ハ痘ノ定期ヲ云先煩痘ノ定期ヲ示メ險逆ヲトラシム初発三日ノ熱ハ薰蒸ノ熱也此時ニ痘毒内臟ヨリ生セントスル芽ヲ出ストシ萌ハ草木萌芽トト洋ノノギ下割

未出生セザルヲ云治法ハ疑似ノ間ナル故加味升麻葛根湯ヲ熱強ク敗毒和中湯痘ニ從テ方ヲ投スル也又ハ症ヲ見ル也

亦三日而生

痘ノ頃ナル者ハ三日メノ晩景ニ熱少サメテ四

ヨリ出ル是定期也三日トハ痘ノ出ル日並三日也三日メ非也。此時一点血肌表ニ見ルヲ大極ノ元始ト定ル也此章ニ云日期ハ初熱三日ヨリニテ始終十五日ノツモリ頃症故ハ初熱ヲ日期ニ入レタル也然レモ序熱ニ多少有テ定リ難キ故四節ニ是ヲ入レス太極ヨリカゾヘテ日期ヲ立テ四節ニ分ク是傳也。見点ヨリ出有連三日ハ春ノ節也陽春發生ノ令也頃養ノ痘ナラハ不用此薬升麻葛根ノ薬ヲ用テ却テ表氣ヲ傷ル也

三日而長

起脹三日ハ夏三日ノ節也此時頃放光紅影

紅活有ヲ養トス若シ膿足ラザルトテ度ラハ温補スベシ

宜ク痒塌潰爛ノ変ヲ防クベシ

三日而膿 貫膿三日ハ秋三月百穀成熟ノ節トス頂冲根暈收緊メ膿充足スルノ寸見点ヨリ七日ヲ改限ノ日トス内ニ在モノ皆表ニ出尽テ内ハ靈虚故ニ上六日ハ屬熱下六日屬寒ト云内氣ヲ養フ一肝要也本文毛和鍋中甑内氣陽起一方陽亦長一方ノ論アリ宜ク膿ノ足ト不足ヲ見テ寒戰咬牙瀉下内陷ノ変ヲ防クベシ凡膿ヲナスノ日次ハ起脹終ノ日ハ六日ヨリハ口吻ヨリ膿ヲナスベシ七日眼部下鼻ノ邊ウム八日ハ額ヨリ天庭ヲ過スベシ九日ハ腦后ニ至ルベシ九日ノ晚景ヨリハ面ニ六時ヨリ午ノ背ニ至十一日ハ腰兩足趾白膿ヲ紅暈見ル也此日ニ至リ兩肘不膿ノモノハ脾毒不解故ニ下利ノ類ノ怪症ヲ生スル也油斷スルト勿

三日而痂

收靨三日ハ冬三月收藏ノ令ニ百索收少時痘頂黃膿ヲ吐キ痂ヲナス也此三日ハ面部ノ痂ヲ去手足ハ膿ヲ有也若手足心ヨリ靨スルモノハ心ノ怪症ヲ生スルト云ヘリ始終如期不爽也 夾ハ差也感也ト注ス不爽ハ日期ヲ此通り違ハ又故頃養ノ痘ト云フ也

少一日則必遲一日少二日必遲二日

少ハ不多ト注ス遍掉菜莖少一人ノ少ニテ三日ノ内一日カケテ初熱ヨリ五日見点スルト也ヤリ遲ト見テヨシ必ス遲一日ハ六日出奇終ルベキヲ七日ニ出テスト云義少二日モ二日ツラ送ルヲハ 序熱五六日有ラズ

多一日則必早一日多二日必早二日

見点三日ノ内一日早是点スルト是ヲ一日多スト云多二日モ同シ一日熱即出二日熱

即出ノ下見点ノ早キ遅キハ有レ也三日ヅノ日期ニ違ハナシ
故ニ遲一日早一日ト云下有序熱ハ三日トハ云同シカラズ故
此一條ヲ挙テ其要ヲ示ス是ヲ以テ曼公ノ傳ニ序熱ハ四節ノ日期
ニ入レズ

多熱而出者毒輕

程法口訣ニ毒輕則熱輕毒重則熱重ノ
句有茲ニハ熱多ハ毒輕ト云テ大ニ反ス曼公ノ傳ニ熱ノ多者ニ云テ
毒ノ多少有熱ノ少ナルモノモ輕重有テ一言ニ論難其内毒如
何ト見ル也初熱上盛ナルモ肌表ノ熱ヲ内毒有ノ其精神精
爽ニ寢食無故面色微黃紅白ナラハ其毒輕ニ出痘稀少也ト
知ヘシ反之者ハ重シ

少熱而出者毒重

又初ニ熱勢微テ頭温足冷ヨリ而蒸
々内煩其面色深紅ナルハ是伏火伏毒也又或面色或帶青

氣或慘黯若ハ氣虛也共ニ毒重ルト知ベシ輕少ニ神氣清爽寢
食無故モノハ稀痘タルト明也又傳ニ血熱毒壅氣虛血虛表
虛表實裏虛裏實ノ八症ヲ分テ治テ施スベシ反ニ略ス

速

毒重而氣血負者死連毒輕而氣血負者死遲

負ハ置

於背也ト注メニノウ下ノ荷物重レバタヘカクシマクルソムクト
訓モ此理ニ毒重レバ氣血支テ負戴スルニ絶ヘス故ニ死ス其氣
血ノ負ヲ見ルニハ元氣虛乏ヲ或失血シ或氣血不交或痘見
テモ凝伏ノ不長或已虫變紫變黒ノ類皆伏火伏毒ノ症コ
テ毒重ク氣血負トス是梟毒甚ラ以テ死モ速也又其毒輕
ノ氣血負ルトハ膿ヲ三四分ハ成タレ比元氣ツカズ或早ク目ヲ閉キ
或泻下シ遂ニ氣血虛ニ至ル故ニ死ルモノモ日ヲ延テ死スル也凡テ
死症ト成所以ハ皆毒重クメ氣血絶ヘガル氣血負ハ氣離血

散ヲ以テ知ルベシ氣離ハ頂ノクボマルテ血散ハ紅暈ノキヘル
是ニテ氣血ノ離散ヲ驗スベシ

漿僅半成而身熱能食者將必發癰而得生以其毒在肉

也貫膿ノ期ニシ全ク膿ノ定ニハアラ子氏面上五方位ノ膿ヲ

成ルモノ半死半生ニ決シ難シ是ヲ見ルニ身ニ薰黃ノ熱有テ

食ヲヨク喰ナラバ藏ノ裏毒ハ外ニ出テ尽テ胃氣内ニ因シトス此

ハ只毒ノ肌肉ニ壅メ全ク膿スル一能ハザル一ヲ知ル故十三日右

ニ其毒肌肉ノ間ニテ癰ヲ発シ膿トナリ生ヲ得ントスル也

自涼能食者將必潰爛而得生以其毒在皮也一若又身涼ニ

ノ薰黃ノ熱ナキハ陽氣ノ虚也然レヒヨク食スルモノハ是モ内毒尽

テ胃ノ氣内ニ固シ是ハ其毒皮毛ノ間ニ有ク然ラハ痘潰爛ノ膿

汁ヲ出ラ生ヲ得ベシ此症食ヲ能セシハ毒内ニ有テ胃氣敗ラ受

ル一ヲ知ル活ク不可○膿熟ノ潰爛スルハ常候也若膿未成発

潰者ヲ班爛ト名ク班トハ二三窠ヅク爛レテ処ニ有ク潰ハ

一凹ニタレレシ重トス潰爛ノ不結痂ハ倒靨ニ三五腫癰

潰爛ハ疔蝕ニ共ニ十全太補ニ宜シ

若不能食并内攻者死 食スル一不能モノハ毒未藏府

ニ有テ胃受傷故ニ食フ一能ズ故ニ表ニ出タル痘モ毒ヲ化シ膿ト

セ痂ト成テ能ズ忽内攻ノ下利呃逆煩躁等諸惡症出テ死

ス并トハ身熱者モ身冷者モ共ニナク痘ハ凡テ内毒外ニ尽テ胃

氣内ニ全キヲ要ス故飲食ノ多少ニテ試ニ知ルベシト

酒湯之法 米泔水ニ升先一沸ヲ熱湯トス而痘兒ニ快食

ヲ進メテ右ノ熱湯ヲ杓ノ桶ニ入レ好酒ニ合或一合桶中ニ入テ

杓セ紅染ノ手搯テ熱湯ニ浸シヨク絞リテ水氣ノナキ様ニシ

先一番湯ハ頰眼胞兩ノ腮口鼻迄一面ニ湯ノ氣ヲ蒸ニ夫ヲ一
 遍ノ止直ニ蒲團ニ包テ乳婦ト凡臥ニ衣服ヲ頭面ニ覆ヒテ時
 計眠ラセテ微汗ヲ取ベシ是ヲ餘毒ヲ解スル也酒湯ノ后風寒ヲ
 防クヘシ又此日神送りノ礼有一番湯ヲカクル日神ヲ送ルヘシ必
 十二日ニ限ル不可總ノ世俗神送りヲセザル間ハ神ニ痘兒ヲアツ
 ケタル様ニ心得テ朝暮心ヲツケ念ヲ入ルト其神送りヲメ后ハ蘇
 未ニテ安シ故ニ勢カメテ百日ノ間禁忌ヲ謹ム一肝要ニ一番湯
 ハ一日間ヲ於テ三日目ニ又米泔水ヘ好酒ヲ入ル一前ノ如ク頭
 頂額前兩耳項前兩手ノ指迄熱湯ニ紅ニ染ノ手拭ヲ浸レ絞リ
 テ水氣ノナキ様ヲ一二遍ムス之蒸終テ直ニ前ノ如ク眠ラセテ微汗
 ヲ取如此スレバ其微汗ニ連テ其餘毒解スル也三番湯ハ又一
 日間ヲラキテ三日目ニ米泔水ニ好酒前ノ如クメ今度ハ頭面ヨリ

始テ手足ノ心迄前ノ如クニ遍程蒸ニ又微汗ヲ取ル一前ノ如クモ
 ヲ若末々余毒尽ザル者ハ又三日目ニ酒湯ヲカケベシ又痘瘡
 ノ輕重ニ從テ風呂ニ酒ヲ加テ入ルモヨシトス又痘兒ノ周身ニ酒
 ヲ塗リテ風呂ニ入ルモヨシトス世間ノ小兒於之ニ余快スト云
 一凡又餘毒ヲ恐ルベシ或風寒ニ感驚搐ヲ發シ或飲食ノ停
 滯ニ因テ又難治ナル者多シ酒湯ノ后七十五日ノ間禁忌ヲ
 謹ミ守ル一專要也

世俗通例酒湯之法

米泔水一升五合酒少シ大麥十
 粒赤小豆十粒鼠薺十粒古針ノ頭三三黑豆十粒笹十
 枚右八味熱湯ト成テ紅ニ染ノ手拭ヲ此湯ニ浸レヒク其外
 國ノ仕来リニ因テ色ニ有ト云ヘ凡米泔水ト酒トハ何レモ同シ
 ト知ルヘシ此意大麥ハ手ニ握リテ手ニツカヌ者故痘瘡ヲ

トツカヌト云フマゲナヒシ赤小豆ハ痘少キ者ハ赤小豆ヲニツニ割テ
 様ナル故是ヲ祝スルノ鼠ノ糞ハ常ニ尻ニツカズ是モ疱瘡ノ
 アトツカヌト云フ祝シ古針ハ早ク針ノ頭ノ如ク疱瘡ノ頭カ堅ク
 成ト云フ祝シ黒豆ハ一切ノ毒ヲ解スルヨリ水毒兼毒ヲ解ス
 ト云フ義ニ取テ入レル黒豆シ笹酒ト云フ義ヲ取テ用ルシ是等疱
 瘡ニ何ノ効モナキヲナレバ痘后ノマゲナヒシ一法ト知ルベシ是等
 ノイハ細ノテテ医ノ預ルベキ処ハ非然レモ是ヲ知テ置モ又
 至ル者ノ心ガケノ一ツナルベキカ〇凡テ疱瘡酒湯ノ期ト云ハ初
 発ヨリ十四日十五日頃トスモ疱瘡ノ輕シト重キトニ從テ
 十日十二日十五日十八日二十一日二十五日目ニ宜トス世傳
 二日目ニ疱瘡ノ酒湯ハ限ルト心得タルハ大ニ成心得違ヒ凡テ
 疱瘡ニ輕キト重キト有若不顺ナルハ十一日十二日頃ニ起テ

貫膿ノ生テ得ルハ十七日十八日迄酒湯ヲ見合スベシ又血膿
 痘ト云フ有五日六日ニ膿色充實シ八九日目ニ靨ルシ此疱
 瘡ハ十日ニ湯ヲカケルガヨレ凡テ世俗疱瘡ノ中ハ痘兒ヲ神頼
 ミヲキタル様ニ心得タルハ愚カシ凡テ神靈ハ非禮ヲ受ヌト云
 フヲ知テ十二日間晝夜怠ナク神ヲ祭テ諸事念ヲ入ル
 ト云ヘ凡神送りヲメ家内安氣ノ思ヲナシ又ヨリカイホウ諸
 事万端取扱ヒ次第ニ屏糸ニ成行禁忌ヲ傷ルハ世人ノ常ニ故
 ニ疱瘡輕キ者ハ十二日ニ酒湯ヲスル比妨ナカルヘシ若出痘多
 者ハ十二日目ニ酒湯ヲスルヲ忌ムシ凡テ頭面膿色豊満ノ
 九日目ニ至リ口ノ邊ヨリ膿水次第ニ乾キ始テ蒼蠟色トテ黃赤
 黒色疱瘡ノ頭ニシテハ潤澤トテ潤ヒ光リ有ヲヨシトス凡ソ
 口額ヨリ痂ヅクリ升テ一面ニ乾キ瘡痂厚ク十一日十二日

目ニ手ヲ撫レバ脂ガツクイモナクハ十二日ニ酒湯ヲスル比又内症
 ヲ候ヒ若内症ニ故有者ハ必酒湯スルヲ忌ムシ是モ痘瘡頃
 行ヲ撃キ症ヲ指ノ云々。○出瘡稠密ト云ヒ頃症ナレバ口角ヨ
 リ漿膿乾キ始テ痂ヲ結ビ十一二日ヲ兩觀額前膿色赤
 トノ乾キ兼ルモノハ一面ニ結痂ス比又白膿ヲ戴クモ有又頰
 糞ノ散ノ如キモ有手ニテナツレバ膿汁シタト林瀆ニ兩
 耳未漿膿痘実ヲ結痂セズ其内症ヲ候フニ諸症未退先酒
 湯ヲスルヲ忌又數ハヤルモノハ見合ス比真靨ニ非ズ又後未
 ノ急変ヲ恐ルベシ。○十一日十二日ヲ微湯微熱スルハ痘ヲ常候
 ヒ身体壯快精神清爽飲食無故能安睡ニ二便調ヒ音聲
 清亮目開キ手足搖動ニ安ク内症外症共ニ健実ナラハ結
 兆ニ天氣ヲ候ヒ見合テ酒湯スベシ必十二日ニ限ルヲ勿レ。

十一十二日ヲ痘色不順ヲナシ膿色未定或膿色流瀆ニ或惣身熱
 ノ如灼或頭面乾黒ニ或兩頰外剥ノ肌肉乾黒ニ或手足水泡
 ヲ發シ或譫語煩躁ニ或乳食不進煩渴止ズ精神困憤睡
 臥不寧或目刺メ赤ヒラカズ或臭氣坐中ニ滿テ鼻ヲ穿キ聲唾
 シ或大使溏泄メ呼吸痰声有モノハ酒湯スルヲ忌必黃泉隣
 ニ有。○十二三日ト云ヒ少ク不順ヲ加ハ必酒湯ノ見合セ内外ノ
 諸症平和ヲ候テ酒湯ヲスベシ世間往々痘兒ヲ見ニ酒湯ヲ成テ
 真ニ斃スルアリ是湯ノ人ヲ殺ニ非ズ医者ノ症ヲ審ニ候ハザル過チ
 成ト知ルベシ。○仙按ルニ酒湯ノ法ハ古来ノ例殘レリ往古ハ漢比
 ニ痘瘡ヲ煩テアレバ癩風瘡ト稱シ或異病ト稱メ山野深谷
 移シ置キ其郷里ヲ隔テ人跡ヲ絶ス快氣充人ハ百日ニ滿スル日一
 家親類打寄テ沐浴サセテ我家ニ飯ル是ヲ表瘡ノ忌明トス

此時酒宴ヲ催シ祝スト然ハ今酒場ト云モ其例残リト知ルベシ
○中頃築紫國村上某ト云外科有共子二人痘疹ヲ患ヒ一人鼻
痘一人ハ蛆痘雖供日ニ積テ痛痒難忍因之米泔水ハ性寒之酒尖
熱之寒温相和スル寸ハ陰ヲマシ陽ヲ行スカラ有一日是用テ此ヲ
薑蕪スル寸ハ痛痒半ハ退キ二日ヲ大半年愈三日ヲ其痘悉愈是
ヨリ酒場始ルト云本朝痘疹一覽見ヘタリ

擣抗痘治方之弁 此擣抗痘ハ俗ニウラヲウツト云フ是之此痘

元実熱症ヲヤウヤク膿色ヲナセ凡テ十二日目十三日ノ后ニ至リテ
風寒ニ感シ心熱メ再ニ膿透リテ膿水衣服ニツイテ身体ヲ動カ
トニ膿血流滯シ痛痒難忍夫ニ赤小豆ノ粉或象牙ヲ極細末
ニテ振リカケテヨシ左スレバ爛痘膿水乾キ再ビ痂ツクリテ
愈者ハ前湯ニハ餘毒ヲ解スルヲ用テヨシ○右方擣抗痘

ニ六限ズ凡テ醫テノ后膿水乾キ兼ルニ此方ヲ用テヨシ又或蕎
麦ノ細末ヲ振リカケテモヨシ再ビ膿汁乾テ再ビ痂ツクリテ愈ル
者

臭痘之弁 九日目ヨリ十三日十四日ニ至リテ臭気少シ有ハ

痘瘡ノ常ニ苦シカラズ若シ臭気至テ強ク鼻向モナラ又程ニ臭
ミテ強キハ凶変多シト知ルベシ又六日目七日目ニ鼻氣強キ者
ハ必ズ死又臭氣一向ニナキ者ハアトニテ餘毒ヲ煩ラ者ハ心得ベシ

痘瘡閉眼之弁 若痘瘡稠密ナルハ十二日目十三日目至

リテ兩眼少シ閉ラ大古トス若シ一度目閉テ十四五日目ニ
又再ヒ閉ルハ眼病ニ急ニ茶ヲ与ヘヨ遲キ寸ハ盲人ト成凡テ痘
后ノ眼病ニ六點茶ヲ忌ムベシ

痘瘡正靨之弁 九日目ハ貫膿ノ終リノ日ハ口ノ廻リヨリ

両ノ腮ニ至リテ膿色ハ山ニ滿根暈紅活テ痘瘡ノ真中黄色ニ薄黒キ色有テ正靨ト云フ此時微熱メ微渴シ睡卧安静ナルヲ大吉トス是ニ反スル者ハ逆シ○痘瘡ノ黄色ニ膿ヲ持ハ氣血ノハリシ中ニ薄黒キ色有ハ痘瘡ノ毒氣シ黄色計有テ痘ノ頂ニ薄黒キ色ナキハ其症ヨク見ヘテモ毒氣五藏ニ残処有ハ此痘瘡後日ニ至テ言方有ベシ心得ベシ

七八日大便之弁

七日八日九日ノ頂ニ大便ベタクト下ルハ凶

多シ若氣血ヨキハ妨ナシ若虚弱ナル症ハ忽面ノ腫引兩眼閉キ呼吸セワシク成ハ大變之急ニ温補セヨ遲寸ハ倒陷メ急ニ死ス

痘瘡微痒之弁

七日八日九日ニ痘瘡起発シ膿色豊滿ノ

少シ痒キラナスハ痘ノ常候ニ妨ナシ若凶痘ノ痒キラナスハ然ラズ頭面手足動搖シ頭ヲフリコワシ大キニ痒キニ堪ヘ難キ者

ハ大凶シ是ニ煩躁悶乱氣急スル者ハ必ズ死ス

難乳之方

七日八日九日ノ間鼻塞テ乳ヲ飲第ニ粳米

五々糯米五々ヲ薄粥ニ其稠リタルウワ湯ニヤキ塩ヲ少シ加テ乳ト兼トノ間ニ与ヨ但シ膿漿十分豊滿スル者ハ糯米ハ忌類米ノ粥ニ宜シ

出瘡吉処之弁

六日七日ノ間口ノ廻リヨリ次チクニ腮ヨリ

額ニ并リ起発スルヲ大吉トス其出痘標トシ瘡ノ頂白黄色ヲ根暈黃胎トテ紅ノ縮糸ニテクワリタル様ナルハ吉兆シ

大便度数之弁

六日七日八日目ニ大便數ニ通スルハ大凶

急ニ温補ヲ与ヨ但シ此寸人參ヲ撰フヘシ但六日右ハ大便秘ヲ通セサルヲ吉トス又通ズルハ難キヲ吉トス

大小便秘結之弁

七日八日九日目ヲ貫膿ノ期ト云俗ニ

ヤマアゲト云フ是ニ五日六日目ヨリ口ノ向リ膿色ヲ持テヨリ漸ニ
額ニ腫升兩眼封シ鼻塞リ能眠リ能食シ大小便秘結スルハ
大吉トス痘輕ケレバ大便通ノモ妨ゲナシ

泄瀉之弁

五日六日目疱瘡稠密成ハ兩眼閉ル一疱瘡
常ニ若痘瘡輕ケレハ眼不閉是モ常ニ若稠密ニテ眼閉テ居
世泻ノ忽チ眼閉クハ倒陷ニ急ニ治スベシ遲キ寸ハ治セズ

疱瘡下系之弁

金鏡錄ニ裏熱壅盛ハ下利ノ系ニ有サレハ
治ズ身熱火ノ如ク口乾吧シ兩眼血ノ如ク譫語狂妄煩躁凶亂腹
腰痛大小便秘シ昼夜安睡セズ面色青有又赤色ヲ朱丹如
キ有惣身出物紫赤ノモノハ急ニ良医ヲ迎テ下利ノ系ヲ用日
遲寸ハ治シ難シトス

痘瘡見点診法

疱瘡ノ序熱ハ日ニ淚ヲモチ呵欠ヲ鼻

柱冷ハ耳後赤紋有睡中ニ驚ク等ノ諸症有ハ是疱瘡常ノ診
法ニ然ルニ是等ノ症ヲ見シ存ノ外疱瘡ニ非ル者有十人二十人
十カラ是テ疱瘡ニ相違ナキ一ヲ見ルニハ二三歳ノ小兒ヲ先ツ
ソヘ坐サセテ見ルベシ坐スル中ニコロリト腰ガヌケテコロブハ疱瘡
ノ序熱ニ相違ナシ又五六歳ノ小兒ハ手ヲ引歩行テ見ルベシアル
ク中腰ガヌケテヨロクスルハ是疱瘡ニ相違ナシ是何ヨリモタシ
カナル診法ニ此謂如何トナレバ痘毒ハ腎ニ伏濁ノ毒ニ腰ハ腎ノ
所屬ナレバ腰ガヌケル筈ノ一ニ疱瘡ノ目的ハ故ニ此腰ノヌケ
ル一ツヲ以テ疱瘡ト知ル是家傳ノ口訣ニ

序熱灸治之弁

序熱四五日ヲ経テ醒難ク其熱ノ中ニ早疱
瘡見点スル是ヲ保赤全書ニ火裏苗ト云此熱ヲ醒サザレハ大キ
ニ害有此熱ヲ醒ス灸治有其法上ニ大推ヨリ下龜ノ尾ト云處

糸ヲ引其糸ノ尾ニテ切り去り其糸ヲ二三折大推ヘアテ下(低)下ニ其糸ノツクル処ノ骨ノ上ニ假点ヲメ繩ヲ去ル其假点ノ中ル処脊骨ノ両方ノツケキハニ点ヲツケル是穴所也中ノ假点ハ又グヒ去ルベシ穴所ニ非ズ此処へ小ノ灸ヲ五ツカ六ツスヘテヨシ妙ニ熱ヲ解スル也但是ハ序熱ノ熱許ヲ醒ス灸点ニ見点ヲノケテ此灸治効ナシ先ハ序熱三四日ノ中ノ灸治ト心得ベシ

避穢糸弁

坐中臭穢ノ有ハ必ス荆芥茵陳ノ二味ヲ火ニ燒テ其穢ヲ避ベシ然ラサレバ疱瘡穢ト害ヲナスコト有

糯米鯛酒之弁

糯米鯛トハヨク疱瘡ヲ起発シヨク膿色ヲ催ス能有酒ハ氣ヲ養ヒ保養スルカラ有者酒ヲ好ム痘兒六折ノ与テ

カマヒナシ

柳之虫之弁

近來浪華京師ノ医痘瘡ニ臨ニテ柳ノ虫ヲ用ル

モ有最俗医某肆媪孌婢並テ稀密寒熱ヲ不辨一概是ヲ用ルコソ愚ナレ予五十年來痘疹ニ志シ數十家ノ書ヲ見ルニ未柳虫ヲ用ルノ由ヲ不知嘗テ救偏鎖言ニ實熱燔灼凶惡大盛痘瘡起発セサルアレハ十二七八八葉虫ヲ濃煎ノ茶汁ニ和テ用ル其効如神予往々是ヲ用テ其効驗炳然ナリ都テ本ヲ喰虫ヲ耗盡ト云何レノ虫モ其形相似タリ故ニ其形ヲ見テ用未ルヤ又片假名ヲリウトワトヲ讀違ニニ非ヤ俗医合糸屋誤リソウチウヲリウチウト讀違ニニ非ヤ是ヲ用者是ヲ扱ヘ嘗テ葉虫ハ貴人高位ト云レ症ニ隨テ法ノ如ク用ベシ又柳虫ハ未痘瘡ニ用ル由詳ナラザレハ禁スベシ

出痘經水之弁

凡テ婦人ノ痘疹初熱ヨリ四五日ノ間ニ經水ニナルハ妨ナシ若貫膿ノ期ニ至テ經水ニナルハ凶症多シ其期ニ應テ治

方亦異也又熱毒血室ニ入レバ氣チカイノ如クニサワク者也兼テ繋リ
用レバ人ヲ殺ス一有又血熱血毒ノ深キ症ハ經水ニナリテ反テ嘔
症ト成一モ有又經水止マレバ血虛ノ疱瘡色淡白根血離散ノ
貫膿ゼサル者ハ必ス死ズ

婦人出痘之糸

痘科鍵ニ妊婦ノ出痘ハ常婦人ヨリ又重トス
始終安胎ノ糸ニ宜シ若腹中故ナキモノハ腹ヲ摩按ル一ヲ忌
若胎墜ル一有ハ初発ノ時ト見点ノ寸ト起発ノ寸ト貫膿ノ寸ト
收靨ノ寸ト其治法大ニ違ヒ有治スルモノ其寸ヲ誤ル一勿若大便
秘スレバ是ヲ下スニ口傳有遲寸ハ胎ヲツル一有急ニ良医ヲ迎テ
茶スベシ若貫膿ノ寸ニ胎ノ墜ルヤ必血虛ニ非ズ氣虛ニ急ニ大人參
ニ宜シ醫師任セテ茶スベシ傍人禁忌ヲ可慎

預防痘瘡之糸

凡テ痘毒ハ無形ノ毒氣ニ疱瘡ノ流行寸

ハ此痘毒自然ト集リテ疱瘡ト成之疱瘡ハマラ又前ニ此毒
氣何レノ処ニロソニ隱レテ居ルヤヲ知レヌ也假令ハ秋ニ成テ茸ノ生
スルト同レ一ニ茸トナルベキ氣地中ニ伏在メ有レト常ニ其氣地
中ヲ掘穿テ見レト元ヨリ無形ノ氣ナレバ何レノ処ニ有ヤヲ知ル
不可夫が時至レバ何コカラ集ルトクソコヘ氣カ集リテ茸ト成リ
テ生スルニ瘡瘡ノ人ノ體ニ生スルモ其通りニク様ニ空ナル毒氣ヲ
何連其前ビロニ消シ防ク理有ヤ痘瘡預防ノ糸ハ決メ小兒
不可用是眼前ノ理

婦人痘瘡涼血地黄湯之方 當飯川芎芍藥生地黃玄參
白朮升麻黃連人參甘草山梔子 右十一味水煎服ス○婦人出
痘發熱之初適遇經水如期而至則熱隨血解痘出亦輕不
須服藥若過三五日而熱不止痘不出者此熱入血室必妄行

為動中虛之患宜涼血地黄湯加人參治之
 加減升麻湯之方 升麻葛根芍藥甘草前胡紫蘇當
 歸連翹桔梗生姜三片右十味水煎服之有微汗為度。婦
 人發熱見點寸經行ノ者六此方ニ生地黃川芎ヲ加テ是ヲ治
 玄參地黄湯之方 玄參生地黃牡丹皮升麻山梔子蒲黃
 甘草燈心十 右八味水煎熱服ス此方經行ノ時ニ非ズノ發熱ノ
 間經水忽ニ至者ハ痘毒ノ火内ニ盛ニテ血妄行スルノ故ニ急ニ此
 方ヲ用ベシ或 四物湯ニ黃連解毒湯ヲ合シ血ヲ涼クスルヲ以テ
 主トスベシ。前ノ涼血地黄湯ハ婦人序熱ノ寸ニ經行ニ成者ニ用ル
 方也。但シ是ハ婦人持前ノ時經行カ通シ合スル時用ル方也。ト知ルニ
 而加減升麻湯ハ序熱ヲ過テ見點ノ寸經行ニナル婦人ニ用方
 也。ト知ルベシ。然レバ加減升麻湯涼血地黄湯玄參地黄湯此

三方ノ用ニ區別ハ婦人序熱ヨリ見點ニ至迄ノ中經水ニシタル婦人
 ヲ治スル三方也。凡テ經水ガ常ニ出ル寸ニ通スルカ又其寸ニ脈ガ急
 カケモナク通スルカ此ニツラ問フキ一婦人ノ序熱見點ヲ治スル得
 此心得ナレニ調合セバ三方ノ使ニ區別有不可是心得ベキノ
 一ツ也。

經行妄言瀉肝散之方

羌活 當歸 山梔子 龍胆草 犀

防風ハ大黃瀉 一方本通柴胡黃芩有テ大黃ナレニ婦人
 經水不斷之時適逢 出痘身發壯熱神志昏沈言語狂妄
 如見鬼神尋衣撮空此行經之後血室空虛天行邪乘虛而
 犯衝脉蓋肝藏為血海肝藏魂開竅於目神志昏者魂亂
 也目妄見者視亂也妄言者肝移熱於心也宜瀉肝散。保
 赤全書ニ曰此症小柴胡湯ニ生地黃牡丹皮ヲ加テ是ヲ用先

又可也。下有是八傷寒論熱入血室症下カワル下ナケレバ小柴胡湯加味ノ方最吉トス我カ徒是ヲ取捨肝弁ノ其宜ニ從テ其方ヲ用ベシ非時

經行涼血解毒湯之方 當飯一錢白芷二錢升麻四錢蘇一錢

紅花赤芍各一錢連翹一錢桔梗八分燈心一錢右九味水煎服ス。○心印曰非經行之時於發熱之間而經水忽至者此毒火內熾逼血妄行之故也痘多而毒盛急用涼血解毒湯倍加連翹牛房子便熱得清毒得解痘得出經得止始終無他變遲則內虛痘必陷矣。○或人問テ曰此症此方玄參地黃湯ノ症ト大ニ相似タリ二方ヲ用ル輕重如何答テ曰玄參地黃湯ハ此症ノ輕キ者ニ是ヲ用テ涼血解毒湯ハ重キ者ハ是ヲ用テ玄參地黃湯ヲ用テ効ナキ寸ハ此方ヲ用ベシ是玄參地黃湯ト涼血解毒

湯ト用ニ區別ノ処

崩漏十全大補湯之方 乃通例ノ十全大補湯也。○婦人

正直崩漏不止氣血俱虛之後適逢出痘此必不能勝任宜大補其氣血以十全大補湯或八物湯加木香黃耆官桂主之使裏氣充足毒無留停更能飲食則可保全否則倒掇不治矣。○口訣ニ曰若此症十全大補湯ヲ用テ后出痘灰白平陷ニ癸ニ雞ク難膿ニ者ニ熟附子一錢加テ治之

痘瘡附子用心得之方 舌白胎有テ上ニヌラトスル滑涎ヲ

引者是必附子ヲ用テヨキ舌ニ此症ニ限ル不可廣ク諸病ニ附子ヲ用ル心得トスベシ

暴瘡當飯養血湯之方 人參當飯麥門冬甘草升麻

升麻生地黃右六味各等分燈心ヲ加一水煎服ス○傳曰女子

出痘經水忽行暴瘖不能言語者心血虛不能上榮於舌故也先与此湯養心血利心竅待其能言者以十全大補湯調之

婦人熱入血室之治方

婦人發熱時經水適斷宜早服柴

胡合四物湯以防血室虛毒邪乘虛而入致生他疾若已憎寒壯熱神識不寧妄誕見聞言語錯亂者為熱入血室宜四物湯合導赤散與安神丸相間服之

貫膠經行治方

正當起發灌漿之時適遇經行過三

日不止者瘡必應起發而不起發應灌漿而不灌漿頂平形塌或灰白色或黑陷此為經血去多陰氣虧耗為陷伏壞症矣宜八物湯去地黃加黃耆木香熟附以調元氣或胡荽酒噴之便瘡起發灌漿或出增者為吉如寒戰咬牙

喘急腫消手足厥者為內脫不治。傳曰痘出四五日經水不止身熱未退精神虛耗痘不脹氣虛則食自減痘必陷伏宜十全大補湯主之如虛甚者加熟附鹿茸治之至六日猶不起脹者千金內托散參耆鹿茸湯回陽反本湯可參考

孕婦治痘之方

痘科鍵曰孕婦何如曰安胎為主曰胎可

安乎曰治之不失其時胎可安也夫胎之隨世非血熱則氣虛初行升散則火鬱散而陰得平。此處云升散劑八加味升麻葛根湯參蘇飲加減升麻湯。熱毒若中甚少痘瘡稠密スル者八連克升麻湯。類撰用此升散ヲ行フト云

次行清解則陽火消而陰得安已無血熱。若見点ノ后諸

症早ク者八惟安胎ノ方ヲ用テ幸トス。其主方八當服散紫

蘇和氣飲ノ類加減指引ヲ用ベシ若血実壅滯スルモ
ノ十神解毒湯涼血解毒湯ノ類其症ニ應メ用ベシ是ヲ清
解ヲ行フト云フ也

次行補澤則氣虛之無患 五六日參麥清補湯十全大補

湯加味四清散ノ類合セ考テ是用ベシ若シ氣虛甚クハ獨參
湯ヲ兼与ヘヨ六日ノ后テハ膿色起ラザル者ハ是ヲ峻補スベシ
是ヲ補澤ヲ行ト云フ也

凡治痘之業投之皆有安胎之用故胎可全而痘可保也

本文ニ云フ皆有安胎ノ用ト熱ガ有バ熱ガ邪魔ヲメ胎ヲ墮
スシ氣ガ虛スレバ其虛ガ邪ニテメ胎ヲ墮ス也如此皆其時
ノ胎ノ邪ニ成者ヲヨク療治ヲスル寸ハ安胎ノ業ヲ用ヒサレハ
皆安胎ト成シ何ゾ安胎ノ業ヲ用ヒ安胎トナスベケンヤ假令

安胎ノ業ヲ何程用ヒタレバトテ其胎ニ邪摩ラナス処ノ諸症ヲ治
セズバ安胎ノ業何ゾ効ヲナサンヤ是ヲ皆安胎ノ用アリトハ
云フ也

曰倘不可保何以為治曰着在何時如墮于初出之時則補
而升之 補而升之トハ十全大補湯ニ防風荆芥ノ類ヲ加ヘテ是
ヲ用ル是乃補テ是ヲ升スル者也

倘墮于小長之時則補而清之 補而清之トハ八物湯黃

芪防風連翹ヲ加ヘテ是ヲ用ユ或當飯散ニ保元湯ヲ合メ是
ヲ用ルノ類是補テ是ヲ清スル也

倘墮于行漿之時則峻補之 峻補之トハ參芪鹿茸湯

或回陽及本湯或獨參湯或參附膿煎兼与ルノ類是ヲ
峻補スルト云フ也

勢着形症逆順血色何如以別生死不可忽也 孕婦五日以後唇舌ヲ以テ其症ヲ別テ難シヨク 諸症ヲ引合セ其治ヲ施ノ可也

孕婦攻下之治方

懷人ノ婦人実熱ノ症有テ專ラ下サ子ハナラ又寸ニ懷人ヲハカリテ下サズニ置寸ハ其邪熱陰ヲ燥シテ必ズ墮胎スル者也 其寸ハ大黃芒硝ト云レ隨方苦シカラズ内經ニ有故無損ト有モ乃是也是乃大黃ノ莖毛時ニ因テハ安胎ノ菜ト成シ大黃ニ安胎ノ能ハナケレモ安胎ノ理ハ有シ此等ノ理ヲ采ヘテ治ヲ施スベキ者也

孕婦出痘安胎飲之方

人參白朮黃芩熟地黃川芎當歸芍藥砂參紫蘇陳皮甘草姜枣 右十三味水煎服ス 孕婦出痘始終以安胎為主不可觸動其胎其初發熱以

參蘇飲全之痘出現後多安胎為佳若起矣收靨遲則十全大補湯去肉桂用之

妊婦出痘墮胎黑神散之方

當歸川芎熟地乾姜螺桂心蒲黃香附子童便浸炒青皮木香右酒水各半煎服。痘瘡正在起發穰之時忽遇坐草分娩之期此氣血俱虛之候宜大補湯加熟附子半之補氣血固表裏若產後小腹急痛者是血未盡也黑神散畧與行之不必拘泥若寒戰咬牙腹脹作渴足冷身熱者此脾胃内虚外作假熱也大補湯加熟附一二劑用四君子湯加黃耆當歸陳皮木香多服止者吉不止者凶

臨產生化湯之方

當歸身五川芎二桃仁二十黑炒乾姜五甘草五如右五味濃煎服之。孕婦出痘正痘當盛時忽臨正產惟以大補氣血為主十全大補湯先腹中微痛此惡露未盡也宜

條去之生化湯主之

胎婦出痘正產治方

孕婦出痘正當甚時忽臨正產等只以大補氣血為主十全大補湯若腹中微痛此惡露未盡也宜四物湯去芍藥加乾姜桂心木香黑豆與之或產後或半月或十日之間適逢出痘此無胎孕繫累止以大補氣血為主以大補湯八物湯去芍藥與板之痘出多者加連壳大力子大硬自利者加肉豆蔻惟照常一體用藥施治不必妄為多疑之虛反致變誤也。○右婦人產後產前經水中痘瘡三等治方宜是ヲ手本ト成テ時ニ臨變ニ應メ治ヲ施メ可シ

痘瘡死症之弁

凡テ痘瘡虛陷屬スル者ハ多クハ九日ノ后症ヲ變シ死ヲ告ル者多シ或症ニヨリ様スニヨリテ數十日ヲ經死シモノアリ又實熱ノ難痘ハ其死六日ヲ過サル耳如此虛寒ノ者其

死遲ク實熱ノ者ハ其死至テ速シ治療ノ中此心得ヲ以テ病家カケヒキヲナスベシ

痘瘡照點診法

一發熱而候之究痘証之是非先用紅紙以真油濡拭子大如筆管者使房內為黑暗即以燃子令照火先者從人中地閣候之有何部何色點在左觀何色點有右觀何色點而又觀天庭印堂曉星日月角山根年上壽上鼻準而欲視其左移火光於右欲視其右移火光於左上下相隨如法照之則看其皮下歷々而是赤是紫是點是塊於肉中照入火光則曉然一點血明白也然又兩耳頂頸胸前乃手腕腕中肘門腰腿兩膝兩跟足心平照候之緊要也於此痘苗則在肉中根極深者是正痘也如麻疹則浮于肉外而肉中無根如正照則點而不見故照然紙覆于掌斜候之則照入肉內分明

也若晝日以天日之光觀之則不見矣

發熱死症

一日發熱何部何絡發一塊紅腫者大凶也先天庭印堂兩耳為連珠蟾窠痘者或心窩手足之心三五為叢者或面上覆青黑之氣者或瞳子貫血脉及口鼻有黑氣者或當印堂山根中心生異痘及破損或疔者此皆死之候也

發熱三日之死症

發熱三日內妄見妄語遺尿不知人事如見鬼神者暴瀉諸証不止死三日若三日若四肢僵直不舉動肌肉紫黑色小便如血者三日死

失血死症

死速也

發熱三日之內衄血不止者無妨外從七竅失血者其

紅塊死症

發熱面色慘暗輔頰發紫紅塊或作片堅破者血熱毒壅也到五六日不能起發失膿路者九日死稍見漿色

者延十二日死

青黑悶亂之死証

發熱忽退面上覆青黑氣煩躁悶亂坐卧不寧皮膚雖清涼內反大熱煩渴唇裂舌胎為坑赤點隱於皮下如疹前板齒生血絲口气臭穢唇腫大者六日死若加悶亂腹脹手足搖動者三日決死

痘母死症

發熱痘點特出面上未報先胸背手足為四聚為腫塊堅硬者似瘤非瘤似癰非癰此名痘母不治決死莫治

發熱腰痛声啞死候

發熱腰痛太甚而後見点在皮下未出者毒陷伏也舌白胎乾燥或為坑者声啞啞者六日死略起少有膿路者九日死

發熱果色死候

發熱用熱紙照火光候之則面上心窩及遍身皮肉或紫紅塊乍變黑色者三日六日死

發熱兩頰赤唇腫大死候
發熱兩頰赤如塗朱唇紫黑腫大

及口鼻者死或頭面赤如朱丹者亦死

發熱兩耳熱如火死候
發熱兩耳灼熱如火者死之候也

面上青氣腰腹痛死候
發熱痘形未現先面上青氣一乍者腰

腹痛不伸舌純赤唇燥裂戕黑血啼哭不休者死

發熱黑氣唇腫大之死候
發熱黑氣從太陽達耳唇大腫

或紫黑色者必死

兩耳紫黑死候
發熱兩耳前後紫黑或青氣貫透天庭

者不治

發熱面上赤色不治
發熱三日內面上肌肉帶赤色者猶是血

色未曾化水至四五日起發失膿路者甚凶也必悉不成漿

至收靨期潰爛而死

發熱頭溫足冷死候
發熱面上青就白頭溫足冷唇淡紫舌

白胎滑潤不見痘苗神氣困倦煩躁心煩吧洩者三日死

發熱驚搐死候
發熱忽發驚搐天庭眼部帶青氣者必死

四絕死候
目上竄者心之絕也直視不轉者腎之絕也非泣

而泪自出者肝之絕也微瞑者氣絕也

血貫瞳子死候
血貫瞳子者火勝水竭此皆死之候也

見點三日死候
見點一有死候
發熱見點偏身一有如虜

或赤色如橘皮色及十種逆痘此皆死之候也摸之不得手

者多六日死

血点黑痣死候
發熱一二日痘點頭焦變紫黑色者此毒

自血中出惡熱惡寒乍面色變改乾吧飲食不入血点如黑痣

者六日死

發熱一二日痘點頭焦變紫黑色者此毒

見點皮薄錫色死候

發熱一日出點大赤色根窠皮肉俱

爛紅者血熱也陰血為熱被煎熬而不能榮養故毒氣壅遏不鮮到三四日起發大驟皮薄易破損嬌艷如錫者至六七日必發癢痒不可救十二日必死

見點心腹痛死候

痘出之時心腹大痛不止口中臭氣動之出

唇乾裂舌作坑出瘡過赤轉紫黑色加煩躁者六日死稍起發稍見膿血者九日死

紅色嬌嫩死候

出瘡雖紅色嬌嫩者皮膚通紅唇舌皆紅滋

潤至六日雖有起勢痘頂嬌艷者必不成漿至七八日發痒塌九日死此名嬌艷痘

見點舌上黑痘死候

發熱舌上先塊黑痘一二粒如痣者雖外

痘應期至七八日疼嗽唾血十二日死

五心出痘死候

發熱他處未見痘先五心出痘者大凶也謂

五心之窩及兩手掌兩足心是也遍身後見者必稠密將毒不泄至四五日焦紫黑陷不能起發者九日死

見點叢痘死候

發熱一二日見點粘聚成叢模糊作塊不方

顆粒欲出不出欲盡不尽者此謂之伏痘如後者出先者或沒後者陷或癢俱潰成壞症二便無故雖能食至發膿期煩躁氣急者九日十二日死

見點兩觀堆聚

發熱出痘稠密兩觀堆聚成紫紅塊至出

奇期變黑色者九日死勿治

根暈枯燥死候

痘出頂紫赤或帶焦黑根暈枯燥肌肉枯

皴者後變黑陷不能起發精神困憤不寢時謔語雖能食心煩不安者必六日九日死

見点陽潑死候
氣絕也決六日死

痘出頂不起至四五日如湯洗及燈火燂者

見点偏身黑氣死候

痘出面上遍身黑氣慘暗目無神光必死

紫血泡後變黑陷者血迫妄行出有核尿血或血自口鼻出不能起者六日死稍起者稍有不膿路者九日死

見点陰痘死候

出痘二三日不快隱于皮下為水伏之形者

血至而氣不至也四五日而變紫黑色者乾枯焦而六日死

出痘挾雜症死候

痘出夾雜症者悉皆藏毒停滯肌肉

其變難許十種逆痘亦其本皆同矣嘗紅班者紫班者年死半生者黑藍班者十無一生

出痘水珠死候

痘出稠密頭面遍身如水珠純白者不治如變

黑色者六日死

紫黑鍼頭死候

痘出紫黑點如針頭者勢甚劇也

不待起者先肉脹睡臥不寧唇腫爛舌胎黃灰紫者大小便不利者雖投下方不為効必六日死

逆痘見点三五叢痘

亮熱輕面上胸前三五為叢顯

粒分明而腫硬者至四日熱不退又一齊湧出如瑣屑針頭作塊者先疎而後密也此謂之逆痘必後焦枯不能成膿者九日死微見漿路者十二日延至十五日而死

出痘陷伏死候

痘出如蠶種如蛇脫者氣至而血不榮

謂之乾枯如蚤咬如嘍者血至而氣不充也謂之陷伏若唇舌乾燥者至四五日不能起者加煩躁氣急者六日死

出痘赤浮萍痘死候

痘已出奇稠密或如赤浮萍微

高起如肥破有血水者急於解毒之中氣升散治之

能食為破爛者無妨如痘起發之時變紫灰黑色而不
起或陷伏不成漿乾枯者貼皮肉上如紫黑萍者死

出痘煩燥心亂死候

出疹期而熱未解而色既白而面眼

覆青氣者啼哭不休日夜呻吟煩燥心亂心氣不安者雖
稀痘不治如如瀉湯者九日死

出齊水伏痘死候

出疹期熱不退吐瀉不止衄血不休

飲食不進腰腹痛不止煩渴小便不利睡卧不寧痘水伏
不起痘色變灰紫黑色者或變白胎黑陷血陷者此十証
一有之者逆之徵也如腹脹煩躁心亂氣喘者此欲內攻之勢
也必死

出痘無縫色死候

出痘稍密無縫色者正氣不勝邪其

氣乖其勢逆也必至六七日為瘡泄內攻者氣傷也或脾濕

不洩者為外剝即形敗也十二日死

見点紫唇高腫死候

痘出之時紫唇高起諸痘不起

癸唇瘡獨白膿灌聚粒崩裂者胃爛班也變紫黑
青藍而口臭者必六日死又曰先發青班至四五日變黑
如痣者遍身痘色雖應期多十二日死

見点無名腫毒死候

痘前先發無名腫毒未復於平時

而出痘者十有九死如能食神氣爽睡卧安寧者得生

見点初痘過赤死候

痘苗初出自過赤始照燈斜候之面

上輔觀如橘皮色空地不分者九日十二日死

見点頭面不起死候

痘出頭面不起脹遍身手足痘勢雖

光壯至出疹期吐瀉不止痘色淡白或灰白唇舌虛冷或變
純白者不治舌白至唇者謂內積必死

見点臍中有瘡死候 痘出陸續臍中有瘡為堆粟此腎藏毒不解也又肛門為堆粟者腸胃間毒不解也二症俱至七八日加寒戰咬牙者九日十日必死百無一生

見点口中臭氣衝人死候 出痘稠密陷伏煩躁声啞喘嗽吐噦睡卧不寧口中臭氣衝人者此毒火煎熬肺胃而肺爛胃敗也一向大便不通者六日死稍便利者九日死○右八見点中之死証也

起脹死候 天庭兩頰水泡死候 起癸期天庭兩頰先發水泡漸大而如菉豆者至七八日期雖成膿悉清水銀色帶冷艷尚手足發水泡如湯火疱者大凶也十二日死如加世瀉者九日死

面瘡驟大死候 起脹而面上瘡起勢驟進長大而光亮如燈火或嬌紅而漸轉梅花色者皮薄清淡清水也古人曰苗而秀，而實者頰也苗而實者知大逆此謂之不至而至也二三歲之兒九日死四五歲以上到大人者十二日死

起脹腫塊堅硬死候 起脹後卒面上虛腫為片或有膊腰背腿臄皆發腫塊堅硬者不成膿九日死

起脹痘点過赤死候 起脹之期痘点素過赤如根暈大紅面上掀腫不分窠粒如瓠瓜之狀或如橘皮者九日死

起脹黑陷死候 起癸期變黑陷漸及遍身俱乾黑者六日死若天庭輔觀兩頰十窠中二三窠灌膿豐

滿能食者至十一二日後癩毒或為鼻爛有得生者十中五六

起脹黑痘如針死候

起脹時頭面痘平陷而皮薄一窠之真中帶黑氣或有黑孔者如針孔是氣血虛耗脾胃虛弱故也用溫補之藥標瘡不實者至九日十日發搔痒鼻爛絕十二日死

起脹頭面如餅死候

起脹之時頭面痘平陷而皮薄

一窠之真中帶黑氣或加泄瀉者九日死

起脹後灰白死候

出齊後出痘頂陷灰白紋路雖出部遍身根窠血散更加泄瀉煩渴唇舌淡白痰喘氣急不思飲食者是氣血俱敗也不治必十二日死

起脹平陷死候

起脹時吐利不止乳食不化出瘡平陷

不起二便下血者九日死

起脹咽喉腫痛死候

起脹時卒失音飲食不入咽喉

腫痛口气臭者必潰爛也寒戰咬牙者邪傳腎也瀉亂者神氣衰也休寒者脫陽也或嘔或瀉者腸胃俱敗也經曰五臟氣絕於內者利不止六腑氣絕於外者手足厥凡皆必死之候也

起脹血泡死候

起脹時癩血泡者此毒伏於心也不治

又癩水泡者此毒伏於肝必旋見癩塌而死

出齊後不起脹死候

痘齊而後全不起脹變成灰陷者或紫陷不起而成乾封陷伏慘黯不明者或癩如水泡痒塌者此血離氣背致毒下陷而外剝也不治必九日死

起脹陷伏紫黑死候 起脹時啼哭不止日夜呻吟煩躁不寧狂言胡亂如見鬼神者瘡苗陷伏變紫轉黑或沒者六日死

起脹出沒死候 起脹時先手足處見而後隱起而復塌紅而變黑者此根本已壞枝葉先萎之象也必六日死

貫膿死候 六日期倒陷死候 六日期而欲灌漿其痘平陷根暈紅潤膿色枯淡或皮薄破損凹有孔深者此名倒陷多九日十二日死

貫漿清淡水泡死候 貫漿出痘稠密天庭印堂雖有膿反清淡或水泡飲食減小腹雷鳴或轉矢氣者唇淡紅帶水

光舌雖滋潤必為溘世五六日期有此症者急用峻補之劑尚不止者至八九日發痒搔命宮破損者決十二日死

貫漿平陷死候 出齊期而凝伏不長起脹期而平陷不起

養膿期而乾涸不灌收靨期而皮薄不痂者雖能食急煩躁氣喘者十二日必死

貫漿皮薄淡白死候 出痘淡白皮薄光亮根窠枯皺至四

五日如赤小豆大虛脹嬌艷者不成膿清水也俗醫呼謂好痘進歡喜唇舌滋潤者失溫補則至八九日一泄則

抓破痒塌十二日死

貫漿清水嬌嫩死候 出痘四日而氣血不交根脚紅潤頂含清水嬌嫩玲瓏面色不腫手足先腫者為逆其痘至六七日矢膿路者必痒塌而九日死

貫漿遲滯死候 素氣血衰弱之痘症五六日期諸証無故當灌漿期遲滯不灌忽灰白平陷飲食減少

根稟乾枯漿色不滿足遍身雖漿或膿疱水泡相半者尚天庭輔觀不起者至十一二日不成痂必喘過而死或十五日十八日及延二十日必死

貫漿平陷癢痒死候

灌漿期根稟淡白平陷為癢痒

正氣虛也爬搔不定破爛皮脫肉黑無血水乍乾枯者十二日死

貫漿癢痒無時死候

若至膿期搔痒無時神識昏沈扒

破亂舞搖頭扭頂者

決死急則九日死或延十二日死

貫漿頂陷下痢死候

六七日期出痘頂陷者內元陽下

陷也故氣虛則晝自減不食則內虛如內虛則虛寒虛寒

下利下利則痘平陷不成膿故內攻九日十二日決死

貫漿大便初頭硬後寬死候

大人之痘症素稠密起發

灌漿膿半足惟至八日而大便解則初頭鞭後寬者雖無妨

多屬氣虛忽然自消腫消鼻孔閉者欲氣脫之勢也急

不峻補則至十二日煩躁氣喘其死速也

貫漿乾黑焦紫死候

六七日期皮肉不化痘平陷根脚

浮腫不活乾黑焦紫者九日死

貫漿癢痒悶亂死候

七八日期而癢痒無時扒破之處

膿水淋漓復腫灌精神安靜能食熟睡者生如癢痒

無時悶亂顛倒扒破無血水者雖能食九日十二日死

七八日癢痒不常死候

七八日期而膿色過半天庭印

堂山根年壽部位中心或扒搔或破損或疔者內元陽

下脫之勢也故額前屬心火毒妄行乘君位也心為君主

之宦君危則十二官俱危雖能食多半死半生如隨症

治之則破處再不腫灌或坑窟乾黑而他處復疔者至九日手足乾水疱皮脫如豆殼者十二日決死

七八日倒陷死候 七八日期而眉心鼻準唇口及兩耳先

焦枯黑陷者此名倒陷必十二日延十三日死

貫漿清泔水泡死候 至漿期皮薄清泔水泡者至八九

日痒癢扒破者十二日死如膿色過三四方者扒破濁水

淋瀝血肉不乾黑能食神氣靜睡卧寧厲血色不去

者到十二日後身熱肌肉紅色者必死癰毒得生

七八日擦破無休死候 痘七八日之期而擦破無休

者毒氣內攻腹脹聲啞煩躁疼喘氣急者九日死

七八日水泡清泔癢痒死候 七八日期痘色灰白乾

枯無膿漿手足水泡或清泔或平塌空殼者自手足乾

搔癢及遍身穿皮肉紫黑血乾枯者十二日死

七八日膿色不滿死候 至七八日期諸瘡膿色不滿足

根暈塌潤癢平陷天庭尚不起不漿者急用峻補之藥

不奏其功手足水泡如銀色加煩躁氣喘者十二日死

七日癢痒目闭死候 七日期面部痘色不紅活不起癢

膿路過半忽然作痒搔目闭唇淡舌胎涎如膠或癢喘

如鐺鋸遍身皮脫純白者九日死

七八日泄瀉死候 七八日期而寢食無故乍泄瀉日夜

兩三行痘色平陷根暈離散者氣血離去之兆也手足

冷過肘膝者脾胃之氣絕也古人是謂之氣脫心煩氣

喘急九日死

貫漿出血死候

養膿之時寢食無故忽然唾血又從

大小便矢血者九日死古人曰七竅矢血者不治訣曰出血上焦者陽給敗也血出下焦者陰給敗也故陰陽俱敗者血從上下走必死之候也

七八日嬌嫩皮薄死候

七八日期而痘素稠密起者

雖快反嬌嫩皮薄以手摸之軟而皮根離限已毒雖化漿多清水不稠膿不滿足者陽虛也後必變滑利而十二日十五日決死

八九日天庭灰白死候

八九日期而諸痘雖有漿天庭灰

白失膿路者必死如精神爽寢食無故者於頭頂發癰毒得生

七八日額上水靨膿清水死候

七八日期額上膿半足如

澆水清水淋漓其痘必皮薄易破漸延到兩頰兩腮水乾

赤黑色而似靨非靨者十二日死如至十一二日為此症者是謂之水靨無妨

養膿期惡臭衝人死候

養膿之期頭面腫大諸瘡欲腐

而壞瘡盡批破惡臭衝人穿鼻而肌肉紫黑色乾爛者二日死

八日期面腫乍退目閉死候

八日期而面腫乍退根

窠淡紅目閉變諸人雀躍者氣虛也不煩不躁神氣靜而不寢此痘必似有膿漿窠囊或清洪或空殼或瘡自如枯骨一泄即氣脫如腸鳴下氣者必溘世頻之寒戰咬牙心煩氣急者九日死如緩者十二日決死

八九日水泡鼻孔爛煤死候

八九日之期而面上膿

色半足或腿膝水泡大如桃核或發冷紫泡雖睡臥安

常能食鼻孔人中如塗煤唇嘴乾黑而離格者必至十二日急煩燥氣急死

七八日皮薄如水晶死候 七八日期痘灰白皮薄^擦破

無膿血肌肉白如水晶者九日死

乾 八九日痘色^乾枯死候 八九日期痘色乾枯面上七竅俱

乾黑者決十二日死

七八日瘡痒死候 七八日期而瘡痒無時^破之處膿

水淋漓復腫灌精神安靜能食熟睡者生如瘡痒無時

凶亂顛倒^破無血水者雖能食九日十二日死

七八日天庭^破死候 七八日期而^破色過午^死庭

印堂山根年壽部位中心或^破接或^破損或^破疵者內元

陽下脫之勢也故額前屬心火毒安行乘君位也心為

君主之官君危則十二官俱危雖能食多^半死^半生

如隨症治之則^破處再不腫灌或坑窟乾黑而他處

復^死者至九日手足^乾水泡皮脫如豆如^散者十

二日^決死

七八日痘陷死候 七八日期而眉心鼻準唇口及兩

頰兩耳先^乾枯黑陷者此名例陷必十二日延十三日死

貫膿期而水泡清^冷發癰得生候 至漿期皮薄清

冷水泡者至八九日痒瘡^破者十二日死如膿色

過三四方者^破濁水淋漓血肉不^乾黑能食神氣

靜睡卧寧^痂血色不去者到十二日後身熱肌肉

紅色者必^發癰毒得生

七八日擦破無^休死候 痘七八日期而擦破無^休

者毒氣內攻腹脹聲啞煩躁疹喘氣急者九日死

七八日手足瘙痒死候 七八日期痘色灰白乾枯無

膿漿手足水泡或清冷或平塌空殼者自手足發搔癢及遍身穿皮肉紫黑血乾枯者十二日死

七八日天庭不起不漿死候 至七八九日期諸瘡

膿色不滿足根暈塌儲瘡平陷天庭尚不起不漿者急用峻補之藥不奏其効手足水泡如銀色加煩躁氣喘者十二日必死

七日瘙痒目閉死候 七日期面部痘色不紅活不起

癩膿路過半忽然作痒瘙目閉唇淡舌胎涎如膠或痰喘如鑼錫遍身皮脫純白者九日死

七八日泄瀉死候 七八日之期而寢食無故乍泄

日夜兩三行痘色平陷根暈離散者氣血離去之兆也手足冷過肘膝者脾胃之氣絕也古人是謂之氣脫心煩氣喘急九日死

養膿時失血死候 養膿時寢食無故忽然唾血又從

大小便失血者九日死古人曰七竅失血者不治訣曰血出上焦者陽絡敗也血出下焦者陰絡敗也故陰陽俱敗者血從上下走必死之候也

七八日嬌嫩皮薄死候 七八日期而痘素稠密起發

雖快及嬌嫩皮薄以手摸之軟而皮根皴根已毒雖化漿多清水不稠膿不滿足者陽虛也後必變滑利而卡二日十五日決死

八九日天庭灰白死候 八九日期諸痘雖有漿天

庭灰白失膿踏者必死如精神爽寢食無故者於頭頂
毫癘毒得生

七八日水靨死候

七八日期而額上膿半足如澆水

清水淋漓其痘必皮薄易破漸延則兩頰兩腮水乾赤
黑色而似靨非靨者十二日死如至十三日為此症者
是謂之水靨無妨

養膿之時惡臭衝人死候

養膿之期而頭面腫大諸瘡

欲灌而壞瘡盡扒破惡臭衝人穿鼻而肌肉紫黑色乾
涸者十二日死

八九日腹脹煩躁手足戰動死候

八九日期而大渴

腹脹煩躁手足戰動凶亂音啞昏冒呻吟延舌者十二
死古人曰木陳者葉必落絃絕者聲必啞病深者聲

必啞由之觀之為死症明矣

七日後滑泄不止死候 七日後滑泄不止食不入腹

脹手足冷痘色灰白此犯五虛者或加唇舌淡白虛
冷則決死勿治

七八日空瘡死候

七八日期而痘雖有綻鬆之勢葉

中空軟者此名空瘡痘極危險症也急用峻補之劑天
庭不起不成漿雖然如額觀輔官十粒之內一二窠腫
起灌漿明潤紅活而空地又生小痘乍腫灌者復死中
得生矣不然則當靨不靨忽然內攻十二日死

九日胸前痘勢遲滯死候

九日期而漿色半或至

頂頸胸前痘勢遲滯服藥不効至十一二日飲食減
少或煩渴睡卧不寧神氣如醉困憤者十四五日必死

收靨死候

九日口唇痘黃色死候

痘至九日而當靨

而遍身未見稠膿惟口唇上下痘先黃熱者是毒氣內攻於脾也死

八九日口唇腐爛死候

痘至八九日未諸痘靨而

乍口唇先腐爛如敗及唇上下口中純白者死

九日足靨死候

九日面部肚腹未靨而脚先靨者

不治蓋陰勝於陽也

靨時乍發癰瘡死候

靨時遍身忽然痒癢抓破腕赤

紫色口外乾黑鼻孔傍中帶血色隨呼吸而出入者決死

靨時兩耳為塵痕死候

靨時先兩耳為塵痕唇更

黃兩腮乾靨按之如石者必死

痘未靨口唇先腐爛死候

痘未靨口唇先腐爛黃

水淋漓或過十二日唇猶腫硬不消者必癸走馬疳口臭肉黑涎血水穿頰鼻者死或三七日後死

手心先靨者之死候

面上未靨手心先靨者必痘后有怪疾

八九日兩脚先靨死候

八九日痘為不快靨遲帶兩

脚先收靨不食而常如嚼物口唇動不止者十二日死

九日十日口唇硬腫死候

九日十日期而口唇硬腫

上下不合者欲癸走馬疳之勢也急不治則一夜唇崩落者死不治

當靨咬牙泄瀉死候

當靨不靨忽然寒戰咬牙泄瀉

不止手足搖動五竅無神者十二日十五日必死

靨後聲啞者癰痕如霜死候

靨後聲音卒啞者氣

虛也癥痕如霜雪之白者氣血俱虛二症竝起而不食者雖過三七日必死

當醫發癢痒死候一 凡至九日十日當醫不醫癢痒肌破而不見膿血根血離散皮捲如豆殼乾涸者十二日死

當醫失音不乾死候 當醫皮膚脫如鼓肌肉濕淫不乾者脾虛不解也至十一二日溲世十四五日死

當醫後大渴世溲死候 當醫後大渴不止大便世者必為白帛後驚風者十無一生

當醫噎水失音死候 當醫噎水錯候不止或失音或乾吐或弄舌或皮脫或不食或卒大食者急煩躁亂決死

欲醫諸惡候死候

欲醫痘皮薄而軟色白如梅花片子醫薄易落胞白血枯者此為假醫必十一二日毒氣內攻而死急溫補氣血尚腸鳴下氣溲世不止寒戰咬牙者必死

醫後瘦脫死候

醫後腸風傷食而即瘦脫者不治蓋脾主肌肉是土崩脾敗也

痂後死候

痂後癥痕粉白死候 痂落後癥痕白如枯骨或粉白者是氣血盡也如大補氣血轉血色者生不則經數十日必死

痂後驚搐死候

痂後癸驚搐者是心氣已絕乍一驚即為陰癇氣神無所依故不治

痂後噤物作噎死候

痂後噤物作噎喉中如鋸腹

脹虛鳴痰喘頭汗者死

痲後吐瀉死候

痲後吐瀉不止舌虛冷而渴不止少陰之虛也目中無神面色者白者死

痲為落呵欠死候

痲欲落雖能食呵欠氣息睡中微喘面眼不宜唇舌淡白或紫黑色而滑潤者死

痘後餘毒加一病死候

痘後餘毒未解而一病復生飲食減少者五行勝復相乘也故多死

除中死候

出痘不能食向能食則生不食則死今能謂食者一向不食而今思食自少加多者胃氣自然和

也今忽大食者乃胃敗火盛邪火殺穀此名除中如燈之

將滅必大明而後滅死在旦夕

除中秘傳

傳曰能食穀氣不至痘色者此謂除中其

候在七日後

痘疹初中後死候

發熱湧出死候

出舌胎乍變黑者必死

發熱煩躁死候

死之候也

痘一二日而出死候

礙手者六日死

出痘四日驚搐死候

也

出痘觀額為叢死候

而為叢者多死

痘出現一二日內變紫黑色而不

出痘四日而驚搐不止者死之候

出痘模糊者額額五七連串

陷伏倒陷倒靨諸症毒入於骨

陷伏倒陷倒靨諸症毒入於骨

陷伏倒陷倒靨諸症毒入於骨

陷伏倒陷倒靨諸症毒入於骨

陷伏倒陷倒靨諸症毒入於骨

陷伏倒陷倒靨諸症毒入於骨

陷伏倒陷倒靨諸症毒入於骨

陷伏倒陷倒靨諸症毒入於骨

陷伏倒陷倒靨諸症毒入於骨

隨變黑者毒火入於腎也故死

蚊迹蚕班死候

蚊迹蚕班速於彈指蚕殺蛇皮易於

返掌必死之候也

發熱直視死候

發熱目直視手尋衣領亂捻物此毒

發於肝為亡魂

發熱洵亂喘急死候

發熱洵亂喘促手拍眉目鼻

面此毒發於肺為亡魂

發熱上竄咬牙死候

發熱上竄咬牙多叫哭驚悸或

不能言此毒發於心為喪神

發熱昏睡手足痠癢死候

發熱昏睡手足痠癢不

思飲食此毒發於脾為失意

發熱目無精光死候

發熱目無精光畏明欲墜下而

縮身此毒發於腎為失意故真臟見者必不治

五症死候

蒙頭鎖項不治。胸突起者不治。鼻閉

發者不治。口中臭氣者此火毒。薰煎於肺胃敗之

候也

失音死候

不欲食失音者此咽喉腫爛之候也

寒戰咬牙

寒戰咬牙者邪傳於腎之候也

洵亂

洵亂者神亡之候也

體寒

嘔吐泄瀉

嘔吐泄瀉者腸胃俱敗之候也

天柱折

天柱折頭軟者死之候也

聲音啞啞死候

聲音啞啞如破如硬者咽喉潰爛至九

日十日不清者死之候也

瘙痒痘点隐见死候

瘙痒者正氣此欲下陷乍見乍隱者此症欲陷伏也二証俱具而目闭妄言者謂之喪神必死之候也

出瘡耳後灼熱死候

出瘡稠密寒戰身冷汗出耳后反灼熱者死

痘未靨口唇腐爛

痘未靨口唇腐爛

痘未靨口唇腐爛者陽明府不解也或至十一日唇獨腫大而消二便秘或雖無故

十五日後必棄走馬疔早不圖則儼紫黑血齒齩腐爛死或寬者經數十日穿鼻孔者亦死

出痘必死之諸候 出痘首尾頭為逆首之尊故怕家頭項為關津之要偏嫌鎖項鼻準先出者陰毒犯於天根耳輪先現者梟毒侵乎玉堂皆是必死之候也

怪痘逆痘必死形狀

痘點初出時先面胸手足已見紅點却伏不起變紫色或黑陷至四日熱蒸不退加

悶亂氣喘者六日死若前症而起者不候者至七日不成膿漿平塌窠殼空軟雖稍有膿色却清水皮薄如漿纒得二三分者延十二日內攻死

無根痘死候

諸痘俱養候而地閣四圍陷伏枯涸或

灰白而不起

陷黑者腎水已絕也不治此名無根痘

大空痘死候

諸痘壯起而天庭曉星印堂山根不起者乃血不灌頂此氣至而血不至之類也故名之謂大

空痘十無一生

者乃血不灌頂此氣至而血不至之類也故名之謂大

猪頭痘死候

凡出痘喉頭心窩太多者此名謂猪

頸痘急服玄參桔梗

牛地牛旁子山豆根耳草之類遲

玄參桔梗

牛地牛旁子山豆根耳草之類遲

牛地牛旁子

山豆根耳草之類遲

山豆根耳草

之類遲

之類遲

之類遲

之類遲

之類遲

之類遲

之類遲

之類遲

之類遲

則其毒結咽喉飲水不利而當醫期必死

血疱水疱爛痘死候

發熱痘出便成血疱或面上腿

膝癢水疱乍破壞膿水淋漓皮脫者此名爛痘不治加

悶亂者六日死

蛇皮痘死候

蛇皮痘出痘稠密而頭面遍身無空地

平塌而白色或紫赤色至七八日而不能出漿乾枯如

有鱗者九日十二日決死

空痘死候

痘出遍身帶紅紫色瘡不潤澤至三日身

熱不退口渴唇燥者毒火鬱結於臟腑不解至七八

日必空殼而不作膿此名空痘至九日十日癢塌十

二日死若神氣爽睡卧寧能食者發癰膿有生者

鬼痘死候

痘出現三四日痘頂乾黑而頂如刺尖

者此名鬼痘以手掌撫之一顆血色凝滯不變也必當

膿不膿當醫乍起乍塌以番次引類延日久死治法以

燕脂水塗之其癢轉紅活者生

血痘死候

血痘其痘初出血熱紫色如朱筆點於遍身

者是也肉中根已腐外苗必萎六日之中決死

血泡死候

血泡痘初出過赤一二日而帶紫色至膿期

悉血漿也刺疱血黑者不治血紅者急清毒活血湯加犀

角与之外塗燕脂血化者有生

疔痘死候

痘出之時正痘之間如黑痘火刺螺蓋者

此疔也押之不知痛堅硬而有核也若發耳前後胸背結

喉大陽者必死之候

乾痘死候

痘出起發之時痘頭焦紫枯燥不肥澤或平

陷不起皮膚乾紅皴紅枯萎者此名乾痘唇裂舌坑煩躁氣急者六日死

九焦痘死候 九焦痘當額鼻頭頰地胸背耳後手足一二箇黑陷者是也多死

嫩瘡死候 出痘起發之期瘡色嬌艷皮肉緋紅至痘頂通紅者此名嫩瘡至七八日不能成膿痒塌而死

破黃痘死候 破黃痘初出之時先人中大便現他處痘象雖稀少六日以下傳經時必然發血瀉急死此脾已腐敗也

隱血痘死候 隱血痘其痘形如豆殼色灰白全無紅暈及擦破而後血出及無膿漿者決十二日死

濕痘死候 痘出起發之時唇大腫大或為堆遍身出瘡

皮嫩易破摸之濕手者此名濕痘至七八日痒塌二歲三歲兒九日死四五歲以上兒十二日死

漏痘死候 出瘡起發養膿之期瘡頭有小孔漿水漏出者必非稠膿必清於清水也此名漏痘急用溫補之劑不治則至六日七日必發癢癢三歲以前兒九日死

赤萍痘死候 赤萍痘其痘平陷而如浮萍者是也能食者生如紫萍痘及白萍痘者死証也

垂珠痘死候 垂珠痘其痘兩耳紅紫色如灼木腎之外候也故伏毒箭於腎者必死矣如兩耳輪之上

下連綿如串珠此毒氣傷腎也百無一生

四痘治術 報痘試痘賊痘疔痘之四症其治術

甲八
及候之有口訣

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like '及候之有口訣' and '...']

[Handwritten characters or marks at the bottom of the page, possibly bleed-through or additional notes.]



