


• 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 510 JAPAN



鄉食庭秘說

痘瘡唇舌

十六

Kodak

KODAK Color Control Patches © The Tiffen Company, 2000

	Blue	Cyan	Green	Yellow	Red	Magenta	White	Black
A	1	2	3	4	5	6	M	8
	9	10	11	12	13	14	15	B
	16	17	18	19				

武門
播卷
24
15


唇口秘訣


淡紅淡白氣虛也 乾紅少毒


唇上先見一
點

唇四角

頰赤唇紫肺癰之候







九折齋山房家秘後卷之二十四
氏圖書之記

元本十六卷同書也

唇口秘訣 唇口者肌肉之本也與五內相通故觀形察色於此可以預知內証之吉凶矣痘毒之癰子凡唇口舌三要紅潤而身熱音声清睡卧安常睡中微憐吐泻一而行神氣清爽者無微毒稀必不可過表散

淡紅淡白氣虛也 唇淡紅或淡白舌亦合格者氣虛也如汗多者表裏俱虛也不可用攻癰之劑候其放苗紅白宣補托

乾紅毒少 唇色紅活而不燥裂惟乾紅者是無輕而毒少

也如唇黃白或赤紫而不潤次者齒也

頰赤唇紫肺癰之候 唇口乾紅瘡癰頰赤唇紫者此乃欲成肺癰之候也 治宜清肺解毒

唇上先見一二點 唇上先現一二點或面部現四五箇既已如例收齶然以火照之紅點隱匿于內藏皮膚之間其宣散者其毒未散而毒反發于痘則必致成死訣無療矣此名曰復生痘

唇之四角如塗朱 唇之四角赤如火或如塗朱而雙唇發紫黑點者此乃脾熱極也此名曰赤珠繞唇 宜清大解毒唇口崩裂 唇口崩裂汎諸瘡俱好四肢紅赤者心肺脾不除者不治

三經熱甚治宜涼血清火解毒主之

唇先腫口臭 唇上先腫大如嘴尖紫赤乾燥者實熱毒盛也先用雙解清涼之劑猶加口臭者急下之服後口臭不除者不治

唇上瘡如堆粟 唇上瘡出如堆粟兩觀赤色如火二便秘結煩燥氣急者脾毒大盛必欲九竅走血之势也如唇燥裂者五六日而如蓼花而死

唇赤色乾燥 唇赤色乾燥睡中譖語妄言狂燥大小便秘結者內實也急微利之

唇口紫赤如烟火 唇口紫赤如烟火口氣粗前板齒乾燥者內

熱毒壅也

唇口紅活滋潤 唇口紅活滋潤而不頑燥日光精神神映瞭然
出瘡淡紅五神解明者吉之徵也

唇瘡先黃熟 唇上痘出相連諸痘末漿而此痘先黃熟而黃
硬者內潰已成他處亦難成漿矣更肺氣下脫氣血下陷毒
攻唇口必死期促

唇口多出瘡 唇口出瘡多者必咽喉稠密在後齶爛飲水
不入周身勻稱者名曰經喉宜急清肺利咽為主防八九
日間水噙銷喉遲則不治

唇青舌乾 唇青舌乾口苦面赤，脇肋作痛者此血之實也

宜涼血解毒

唇赤色黑痘一粒 唇赤色或紫赤當嘴角現一粒黑痘成
見異痘，獨虛大者此日覃鎖口若唇上下一周成串者此
曰騰蛇鎖口，皆惡候也

唇兩嘴現一粒 唇之兩嘴俱現一粒者此名曰雙鎖口又
名曰虎鬚瘡，最惡候也如兩角俱現一粒餘痘未見獨嬌大
者此曰鎖口必凶多

唇上人中一粒痘 唇上人中生一粒比衆痘大而痘雖稀
朗至六七日或十二日傳經時必然癰渴大飲痰喘氣促者益
睂已敗腐也

唇紫色如魚口 唇乾澀或紫黑色而紫縮如魚口者不治
唇紫黑如黑珠子 唇紫黑燥裂或微黑血乾黑而如黑珠子
者六日期乾枯焦黑者死九日期如薔薇花者死

唇先腐爛 唇先癰瘍如堆粟膿爛者肺氣破敗死莫治如唇
上牙壯先出痘不見他痘者死

唇嘴腫大口臭 唇嘴崩裂或腫大口出臭氣者此胃爛癰
班也不治

唇堆口中臭衝人 唇堆腫口中腥臭衝人者此邪火煎熬
肺胃脾敗也必失声乾呕喘促死經曰肺絕者七日死

唇紫赤口中惡臭 唇赤色或紫赤口中惡臭牙床潰爛舌
治

上聚堆黃胎而鼻梁癰紅豆者又牙齦唇內色如乾醬其
內臭爛或濺血一日爛一分二日一寸此名曰走馬疳不
治

唇口至舌內潰 唇口至舌為內潰者三日六日死者為實熱
九日十二日死者為虛寒

唇口焦裂咬牙 唇口焦裂咬牙戰慄者此乃血凝氣滯毒乘
攻胸也此名曰紫雲佈胸不治唇舌紫赤瘡色紫黑故也

唇腫咽痛 唇腫喉痛眼赤如朱者此肺脾胃火旺也如瘡色
氣血交會者宜急清解治之可愈若色慘暗乾紅則氣血離散

七日八日內必至鼻孔出血不救

唇青褐蛇虫出。唇青，褐蛇虫從口鼻及大便出，煩渴飲食不進。

寒戰咬牙者死。

辨唇六候之變語。自紅而淡。淡轉紅者生。自淡而白。淡變白者重氣血之虛也。自紅而赤。赤轉紅者生。自赤而紫。赤變紫者危。氣炎熾盛也。自紅而灰。灰轉紅者生。自灰而褐。灰變褐者逆。五內津液竭也。自紅而青。青轉紅者生。自青而藍。青變藍者危。木冠土脾絕也。自紅而紫。紫轉紅者生。自紫而黑。紫變黑者死。木勝火亡也。自紅而黃。黃變紅者生。自黃而腢。黃轉腢者死。脾胃絕也。

十二候之傳

滋潤，龜鰐氣血和暢，首尾不服藥，自愈。燥裂，癰熱，內火太甚，梟炎焰，廬舍煎熬，氣血○堆腫，陽明毒齒，伏肺，受傷，口臭，便秘，肉瘻。濺血，毒在血中，不出，故榮血受傷，甚則上下失血。水色，氣虛也，血虛也。虛寒也，氣脫也，急宜補益溫補。破崩，虛寒也，毒瘻也。脾土敗壞，四藏皆受傷之兆也。垂下，五藏氣下陷，不能升提，先心脾腎俱絕也。板實，裏毒已解，机毒壅，肌因政能，食心氣夾毒，作潰爛瘍毒。黃硬，毒瘤，脾經鬱，不出，脾胃傷，內攻之微也。繫縮，五藏為火毒所煎熬，腎液竭，政乾枯焦黑，而死。格離，肺脾失守，土崩，相火已亡之兆。

也近也

唇紅潤 盖シ唇ハ四角ナル以テ常ノ體トノス其形狀正ク四
角ニミテ其唇ノ色紅潤ナル者ハ外証也ト一此遂ニ多ク生
唇變常也 若唇常ヲ失ヒ或崩裂シ或唇白メ紅色少ク或
紫ニシテ紅少ク或黑クノ紅少キ者ハ外証ヨシト一此遂ニ多クハ
止ナルノ若純白純灰純黑純青純醬純鹽ニ全ノ紅急ブキ
有相火已ニシヒテ魂魄黃泉ニ歸ヌ餘ハ椎メ知ルべし。是ニ云
フ紅十云ノモノハヤハナリ常ノ唇ノ赤キ色ヲ以テ諸ノ唇ノ色ノ吉
凶ヲ別ル一是肝要也

診舌秘訣

告舌之訣

舌紅

而潔清者心藏無毒

也舌紅而滋潤者腎藏無毒也舌紅而白潤及音声清
亮者肺藏無毒也舌滋潤而血榮平純者肝藏無毒
毒也舌紅潤而厚圓而如滋味者肺藏無毒也
氣不足之診舌 若氣不足有一熱唇舌淡紅出苗淡白
血有餘之診舌 血有餘者一熱唇舌紅赤放苗乾紅
氣有餘之診舌 氣有餘者唇舌紅潤放標尖圓
血不足之診舌 血不足者一熱唇舌青白放點不紅活
唇舌滋潤易虛寒 大抵痘之大發上六日屬熱下六日屬寒
故中間之難証知投補益者十枚八九惟唇舌滋潤者或
潔淨者其變易虛寒此萬古之秘訣也

身甚熱無胎 大キニ赤ク大キニ紫ナル者 胎アル苦ノ舌ノ熱レヒ

惟紫惟赤半云ノ分ニテ胎ノナキ舌ハ血熱ニ相違ナシ 治方清

涼解毒ツトメテ行フベシ

舌上黑痘 總テ舌上ニ黒痘ヲ生スルハ大凶ノ症也

舌胎活潤 舌胎活潤ナル者ハ熱毒自然ニ解スルノ舌ナリ又三圍
淡白ナル者ハ氣虛トス舌上温潤ニミテ口中ヲツイテ腐熟ス

ルハ虛寒也是附子ノ應スル舌ニ

陰舌二十五種 漉淨○淡紅○淡白○微灰色○淡紫○

淡白魚○虛冷○灰黑○舌心微黑○瘦薄○灰紫○青白○

青藍○蜂窠○腐熟○失榮○溫潤○黃老謂潤○醬色

○褐色○濁潤○中央灰白○老垢○黑暈舌○淡灰紫

陽舌三十種 紅赤○乾燥○乾紅○燥裂○舌炕○焦紫○

紫赤○白胎○芒刺○黃老○白胎乾黑○黃黑胎○灰紫

黑○三積胎○兩白胎○班丘舌○兩黃根灰黑○堆腫

○堆粟○舌尖○乾刺○黃刺○灰刺○赤刺○薄胎通

明○根黃而白胎○人字裂○乾瓣○三積黑

凶舌十七種 舌硬○舌痿○舌緊○弄舌○舒舌○紙白○

紙赤○紙灰○紙紫○紙黑○紙藍○紙褐○紙醬○乾渴

褐○舌上黑痘○卷縮○短縮

煩痘舌六舌 紅潤○滋潤○豐滿○尖圓○厚潤○

血榮 痘中氣血平和

過赤舌 此舌ハ過赤ト云フハ赤キニスキルト訓テ常ノ舌ノ色ヨリ
ハ赤過ル舌ヲ過赤舌ト云フ也是カ痘ノ初ノ舌ノ色ニ是ヨリ段
々濃ク赤クナルヨリ熱ノ有餘ヲ知ル也此舌ガ熱ノ有最初ノ
舌セト知ルベシ

陰舌十三品 寒清○淡白○中寒微灰○淡紫○淡白魚○
淡紅○灰黑○舌心微黑○瘦薄○青藍○輝窠○腐熟○

朱榮

陽舌十三品 乾紅○燥烈○舌炕○焦紫○白胎乾黑○黃
胎○黃黑胎○兩白胎○灰紫黑○兩黃根灰○三積胎○班

魚胎○黃老

山舌七品 舌上黑痘○湿润加入二舌
共三十六○紫赤舌○純白○乾
洪褐○卷縮○短縮○傳日陽舌先見者急宜發其汗
猶不得潤色者為極急宜清涼解毒如二便秘疾者微利
之陰舌先見者不宜清涼不宜疎散不宜過癉於放苗時
使用保元稍兼解毒惟在治痘之妙要辨別陰陽二証

陰陽混雜九舌 淡紫○灰胎○淡黑○黑胎○黃黑胎○三積黑
○面白胎○根灰而黃胎○黃老○已上九舌陰陽混雜為難辨
別如瘡出乾炮帶色紅赤如絳身熱如焰舌上乾燥欲生刺
三圍紅赤而血榮如突起者為熱突胎滑潤者熱毒自解

之微也三圍淡白者爲氣虛舌上湿润口中如腐熟者爲虛寒三圍淡白乾枯者津液虛耗也

忌用參耆五舌 純赤○乾燥○紫赤○乾紅○燥裂裂○五舌俱爲抵爲實不可用參耆至土奇期無壅遏之患則唇舌滋潤者急宜托裏待漿否則忌之殺人

實火二舌 純赤○純紫○二舌癰熱一二日土苗深紅肌肉赤如煙火欲出不出口渴譴語大小便秘者爲抵爲實如赤如火紫如皂臘脂無胎壯熱不得至土奇期身熱盛瘡色乾紅滯色者爲血熱如赤若鬱因而失榮者爲虛火若紫如猪肝潤潤者爲虛爲寒

純陰無陽七舌 純灰○純白○純黑○純青○純褐○純藍○純漿○已上七舌爲純陰無陽陰陽失政而五液內竭也經曰以辛潤之故投峻補之劑不見陽光則死矣

虛實三舌 薄胎透明○白胎○黃胎○癰熱一二日薄胎透明二日而白胎如粉三日而中央黃胎如積粉者內火太甚乎舌上生胎者非毒火淺深此皆正氣虛也如舌紅鮮而生白胎者邪火在氣分如舌濁色而如老焰者邪火血分毒有氣分者易愈在血分者難愈氣無形易化血有形難化故也又三圍赤色而胎乾燥者爲熱爲實三圍紅潤而舌胎滑潤者毒自解矣如雞黃老舌上乾燥者既不可視多屬

內寒三圍乾紅者爲內火甚。三圍淡紅而滋潤者雖氣血微虛，裏內自和。三圍淡白者氣血大虛，或爲內虛。三圍淡白而從根至尖乾燥者津液虛耗也。

知痘毒淺深六舌

乾刺○黃刺○赤刺○灰刺○紫刺○

黑刺○已上六舌惟可知。鼻炎輕重痘毒淺深此皆毒大熾盛表裏俱實末苗前用發表之劑，發其汗而後舌上不得潤色者先峻宣清涼如大便秘結者當微利之。若小便如醃魚汁者必大便乾黑而如炭急宜攻之便色潤滑者止後服。若三圍淡白者雖秘結忌妄下如津液下陷五液不能滋養。舌本大腸燥結不通宜猪膽導瀉。若誤下

之則胃中津液竭舌乾黑而死。○傳曰傷寒之邪在表，則舌胎不生邪火傳裏則白胎漸生矣。候黃老者以下之痘疹一症異于雜病。自裏達表故惡熱無汗熱輕則毒亦稀。若發熱唇舌滋潤者勿服藥如內毒熾盛者將發先舌胎如粉唇乾燥或一日發熱白胎如積粉唇燥裂者以白胎下之。惟傷寒候其証以下之。嘗痘疹辨別唇舌以不虛其証究陰陽之至理以下之胡氏曰非微汗則表不解非微下裏不解又曰發熱壅遏未見形狀者當微下之此與傷寒大不相同治者不可不知矣。

類舌區別十條。潔清與紅潤相類。

紅潤者氣血充

實表裏俱和故莫服某清潔者雖表裏氣血俱和神元微虛故自中間已後必易虛寒不可虧溫補

淡紅與淡白相類

淡紅者屬氣微虛宜補益淡白者

屬氣虛或屬血虛或屬虛寒始終宜溫補

紅赤與紫赤相類

紅赤者屬熱宜微涼紫赤者屬火

毒如二症俱無胎身熱者爲血熱血毒宜清涼活血解毒

灰紫與淡紫相類

純灰紫者原血熱也中間變虛寒者

多有之純淡紫者血寒也二症俱屬微寒在初發不可

攻癰出奇後宜溫補

乾燥與燥裂相類

二症俱屬炎火毒急宜清涼

如二便秘滯者下之

白赤與芒刺相類

薄胎透明者難辨陰陽惟以紅不

辨之如白胎若粉或如積粉者三圍赤色如大中央

白胎帶黃色微爛者欲起刺之勢也此內火熾盛也

已必加清涼治之如三圍紅治胎老渴者到出奇期

內火自解之兆也忌投清涼如白胎透明者自乾刺

變黃刺者急宜清涼如自黃刺至赤刺者金石膏硝

黃又可用勿投參耆以實攻實餘飭之

黃胎與老黃相類 黃胎原自白胎或發熱見白期裏
炎熾盛表裏俱熱之微也急宜清涼解毒如三圍赤
色而生芒刺大便秘結者急下之訣曰行下重遲不
過六日黃老者當出奇前後黃胎中帶微黑者此謂
黃老三圍紅潤而中央渭潤者裏邪自解之微也於
此有氣虛之証候者急宜投參耆如唇舌乾燥者忌
用參耆

焦紫與舌炕相類 焦紫者先生白胎變黃黃而中央
乾燥而赤黑者爲熱毒太甚急宜清涼舌炕者一發
熱朝生白胎暮有舌炕者此爲積熱形狀急宜寒涼

之利遲則三日死

面白胎與根灰兩黃胎相類 面白胎者從根至尖中央
赤色而左右白胎如積粉者全身熱裏內無故若全
便秘不可妄下至臘期多虛寒治者如之根灰兩黃
胎者痘出起癰快毒根于裏乾紅掀腫頭陷不起
如大便秘者當三四日之間宜微利之五日後急宜
溫補

濕潤與膚熟相類 濕潤者初癰大便秘結不通胃中
濕毒不解則腸胃間湿抵薰蒸至六七日溏泄無度
變虛寒者多其舌淡白純白淡紫淡黑灰黑青藍潤

潤者是也。膚熟者原實熱形狀甚。滿舌胎燥而焦紫或焦黑者過服寒涼之劑或誤失治則卒爲藏寒致不治者多。漿後舌膚熟者用峻補不得紅色則爲湿润此泥土之象也故不治乎。

三積舌 三積黃○三積紫○三積黑○右三舌俱在初發乾燥者爲熱滑潤者爲退熱三圍赤色者爲火毒三圍淡白者爲虛寒三日四日用清五日後用補○灰胎與淡黑相類 灰胎者癰熱初紅赤而薄胎通明至五六日三圍紅潤中央淡白者全標色未綻鬆又轉順之兆也。氣血平和津液微虛投輕劑溫補則至。

八九日唇舌滋潤全得生矣○淡黑者癰熱二三日少用清涼四日後宜溫補。

黃黑胎與乾黑胎相類 黃黑胎者自白胎而轉黃中央變灰黑有及滿舌者又有不及者在初發宜清涼滑潤者宜溫補○乾黑胎者熱毒燔灼只乾燥中央帶純黑者爲內大寒甚惟宜清涼舌胎以厚薄浮沉辨之三圍紅潤者可救如舌乾黑者死。

灰黑與淡紫黑相類 二症俱三圍赤色而中央灰黑淡紫黑者在初發屬微熱出發後三圍淡紅而滋潤者屬氣虛如三圍淡白者屬虛寒宜溫補。

淡白班與班黑舌相類 班白舌者屬心肺熱 淡白班者
屬氣虛出吞後將虛寒之火也急宜溫神甚則淡白
或虛冷者急宜峻神与之舌轉紅者生純白者死
訣曰用峻神之劑陽氣猶脫者死無他治

瘦薄與舌尖相類 瘦薄者滋潤而淡紅或淡白或
薄長者皆屬心虛痘後氣血虛衰元氣未復者宜補
益舌尖者如根腫舌頭尖細小而赤如火者屬內火
失榮舌失榮者肝氣虛弱榮血失守則塗滿舌滋潤
不能榮養舌上滑而如鳥舌者凶也心肺虛極
舌硬與舌痿相類舌硬者舌瘦不能言舌痿者舌柔弱
急宜補益

弄舌與神舌相類弄舌者心肺虛耗神舌即如蛇舌是
也

堆腫與堆粟相類堆腫者屬心火○堆粟者一發熱舌
上口內出瘡如堆粟稠密者凶也五內鬱遏神氣
壅耗則邪火上炎發口舌先瘡出二三日宜清涼
解毒必如蜂窠水食不入者死者

膚熱與蜂窠相類二症俱屬心肺虛。與補陽則十枚三。

青藍與青白相類二症屬氣血虛。

褐色與齧色相類二症俱無胎成其色者初因血熱血毒成諸症遷變爲虛寒者多也。

舌上黑痘 癰熱末見餘痘先舌上生黑痘者逆也出脊後沉伏而不見者至六七日唾血或咳血九日十二日死。

必死三舌 乾澀褐○卷縮○短縮○已上三舌必死之徵也。

唇舌十八候 唇舌滋潤者表裏俱平和○赤色者爲內熱。

○赤紫者氣火燒廬舍○乾燥者津液虛耗○白脂者內火太甚○芒刺者煎熬氣血○黃脂者表裏俱火熱○黃老而乾燥者攻腸胃○濁潤者裏熱自解○燥烈裂者火毒焰血中○淡紅者氣血微虛○淡白者氣血虛寒○灰潤者氣血和津液微虛○紫黑者相火將亡○灰黑者裏寒而藏氣脫○褐色者脾胃破敗○齧色者脾土傷而肌肉脫○純黑者陰氣乘于陽位○以上十八舌辨痘症陰陽虛實之繩墨也捨之無他法矣。

舌三部九候之傳 舌出唇外而紅潤尖凹豐滿滋潤血榮解明者氣血充實初發全有此四鼻衄諸症反爲

美矣痘出淡紅明潤磊落神情清爽寢食二便如故易長易膿易癧易癰易癰者神元固于內故也始終美之微也勿服藥反之則陰也

舌出唇外而紅赤如火舌出唇外而紅赤如火薄胎透明一二日而白胎如粉或乾燥非常者陰也如皮膚堅厚肌瘦帶微黑光粉者此骨勝肉也。見眼中神光聲音清亮者此氣血盛雖其痘陰至五六日期。梟炎自解轉順也如淡紅淡白虛冷者出奇後不可虧溫補如六日後痘色平陷根暉竭潤不起脹者急宜峻補。

舌出唇外而赤色如朱無胎舌出唇外而赤色如朱無胎身熱如焰出瘡赤紫乾紅滯色者血熱也急宜清涼活血之劑或三圍赤紅中央白胎通明出瘡赤色欲出不出或出而不快者氣虛毒壅或氣虛血熱或從外証以辨之此皆陰而兼逆者也如誤失治則逆而加逆致不治者多若垂出唇外吐舌舒舌舌緊弄舌純白舌上黑痘者死之徵也

舌在唇內而不能伸者心氣虛也舌在唇內而不能伸者心氣虛也如赤色如火乾燥烈裂者梟炎焰血中宣涼血解毒若紅赤而中央白胎如積粉二便秘

結者內實毒壅也。陰宜清涼解毒。如白胎變黃中央乾黑者逆也。如大便秘結者攻下之利而後唇舌得潤色者生矣。否則死。如唇舌滋潤者。亟見急症。切忌妄下。救火。

舌不能伸者精氣虛也。舌在唇內而金紅潤不能伸者。精氣虛也。金滋潤不能伸者。心氣病也。清潔而不潤澤者。不能伸者。心腎俱虛也。淡紅而身無慾。自汗兼見吐泻者。不論痘未現已現之間。惟宜升陽補托。出痘後宜溫補。如淡白而乾燥者。津液下陷。如中間見雜症者。依虛之例。宜治之。如淡白而大便秘者。至四五日猶不通者。妄勿行下法。

此內虛津液耗虛也。至五六日候。自便利者以急。宜峻補。若誤失溫補。則致氣脫。九日十二日死。

舌在唇內者火毒也。舌在唇內而紅赤乾燥心煩口氣粗。睡卧不安。狂妄譖語者。火毒內壅。陰也。如白胎失敍。路黃黑而乾燥。或生芒刺者。逆也。急宜清涼解毒。如大便秘結者。急微利之。如白胎透明放苗欲出。不出皮膚乾枯無汗者。表實毒壅也。急宜解毒發表。至三四日大便秘者少可行。下法如及出痘期。舌滑潤者。內火自解。不宜清涼愈。唇乾燥而黃刺變赤。刺赤變紫而乾黑者。死。若舌上如堆粟。如蜂窠者。逆也。咽喉腫痛飲食不

入者逆也。声哑。嗰水錯候者。逆也。至出牙期。陷伏不起者。逆也。四日後失起。縱之勢者。逆也。六日後平陷灰白根暈塌潤者。逆也。六日後失血喘。呼腸鳴下氣者。逆也。至齶期。皮薄易破者。逆也。寒戰咬牙者。逆也。齶後髡驚搐者。逆也。首尾唇舌滋潤而至齶後新生白胎者。風寒襲於外也。爲逆。髡驚搐者死。

舌在齒內而不伸者。凶。舌在齒內而不能伸者多為凶。臨于痘欲驗舌或用情話或以湯水漱于唇舌不能出者。金標色無故睡卧安常二便快通。此皆神氣微虛也。如出牙後邪火漸退則宜神益。如舌紅潤而不能伸者。

肝先受傷也。如淡白滋潤而不能伸者。心先受傷也。如赤色乾燥而不能伸者。腎先受傷也。如白胎乾澀而不能伸者。肺先受傷也。如黃胎焦黑而不能伸者。脾先受傷也。又曰赤紫而不能伸者。熱毒煎熬藏府。至出牙後不解者。逆也。赤紫黑而乾燥不能伸者。火毒焰血中陰而兼逆也。淡白而乾涸不能伸者。氣血虛耗津液下陷陰而兼逆也。在初發不失治則十枚一二。在出牙後原陰而兼逆者。九死一生。如逆而加逆者死不治。若舌在齒內而全不能伸柔和而見舌數。采血鮮明滋潤上下轉動縱橫無盡住意者。此謂有舌神一例而不可諱。

舌在齒內而如屈者心膽虛耗也。舌在齒內而如屈者心胆虛耗也。故為逆。如紅潤而如屈者肝火盛多驚驚在初發無如在癥後必為逆。舌乾燥而如屈者內火熾丘液竭逆也。舌赤紫而如屈者血熱太甚陰而氣逆也。舌紅赤而如屈者無毒壅血肉脾氣受傷失表之過也。在初發治之則十枚一二在出脊後陰而加逆者不治矣。如舌在齒內如屈而不能伸者五藏之精氣下脫之微也。如舌雖轉動不和者舌尖向上齶而無紋路中央如手背者舌神已欲竭之徵也死在旦夕。

舌在齒內純色者不治。舌在齒內而純色者不治逆也。

白赤灰紫黑褐醬青藍或生芒刺乾黑者或焦紫乾枯而無紋路者潰爛如煮熟者溫潤而全無紅色者赤如瘀肉者木舌舌硬舌裂濺血者卷縮者死候也。

癰熱唇舌吉症。癰熱唇舌紅潤或滋潤身體溫和雖見吐泻鹹血驚搐諸症腰腹不痛凡山根年壽之間見光彩黃紅色面上全不覆青黑乏氣者稟質有余此謂五岳無怪氣無枯滯脉浮大而數者順也。

唇舌滋潤順也。唇舌滋潤鮮紅豐滿者面腮與唇俱紅潤神氣清爽音声不濁不滯睡卧安常者順也。

唇舌紅赤煩燥唇舌紅赤發熱煩燥口鼻氣粗面上有潤

者有燥者此皆因火遊行也雖身熱盛神氣清爽者邪
火盛於外此則元氣固于內陰也

唇赤燥裂積粉 唇赤紫燥裂白胎如積粉面上如塗朱
或青黑之氣浮見於印堂山根眼部兩日如火心煩昏
憤身熱如多乍寒乍熱讐語妄言不知人事五神如轉動
者逆也 五神轉動內外有一口訣

發熱唇舌口訣 唇燥裂舌胎 瘡潮熱三四日而後出者血
壯實抵耗毒少難於感動而灼火難燎其痘必微而易愈有
總熱不發透如薰半日一日即出者或唇燥裂舌胎者此皆
氣血虛弱毒多易於感動如裂大易焚其痘必密而難痊

如朱出唇裂舌胎為重初出三五連串而細者必為重單
見形而肥大者必稀一熱一二日而見苗眼脰不脹二便如
常經不軟唇不浮脹兩頰兩觀痘出不摸糊肌肉明亮面
上先不浮脹者吉兆也

唇舌滋潤 唇舌滋潤發熱太甚精神不困者裏內不和
如一熱唇燥舌白胎生刺者身熱虽輕裏內熱實先滋
潤者宜和解陽或加減升麻湯之類如唇燥舌胎者宜敗
毒散加黃芩犀角或加味升麻葛根湯之類用之一發汗
晝一夜微微出者為佳徵

舌紅赤 舌紅赤未熱而先大便解如常然身發大熱心神不

寧睡中微溼或微渴者用敗毒散升麻葛根湯之類。至如二日而唇乾燥舌薄胎通明大便秘腰腹微痛少加清涼若爲痘明矣先放苗現頭額推其部位如過赤者爲熱毒或爲血熱先發汗後煩燥心煩者忌用升麻葛根陽敗毒散之類急宜敗毒和中散主之如三日而發於天庭印堂而三五相連出者急宜調元化毒湯主之如連日便不通者加酒炒大黃微下之。

唇舌紅赤唇舌紅赤身熱如爐先發驚搐者用敗毒散加姜荳天麻鈞藤治之安不可用驚茶痘藥驚爲佳兆唇舌赤紫薄胎通明時發熱煩燥氣急發汗如濶口氣粗大便秘頸。

面放苗赤色者急宜清解散主之。

唇舌淡紅淡白唇舌淡紅或淡白發熱悠悠吐泻輕輕發驚搐先放點見眼部以下淡淡在皮下不見或煩燥昏憊時時妄語呵欠者氣血虛弱遂毒不出者也用加減益氣湯加天麻鈞藤主之或溫中益氣湯宜參考。

唇舌赤色唇舌赤色或帶紫初熱其焰手兩眼如朱鼻燥口氣如爐小便赤濃大便秘結煩悶氣喘身無安放者此表裏俱熱此則毒氣壅遏宜發表通裏急敗毒和中散加酒炒大黃主之如舌無胎或不燥而滋潤者重見急証切忌妄下殺人速也。

唇舌滋潤 唇舌滋潤者初發熱疑似之間不可遽用發汗之
劑如麻黃桂枝之類蓋瘧疹表裏俱熱苟重發汗則腠
理開張表裡益虛藏府陽盛熱氣轉增但以升麻葛根
湯敗毒散差沾陽參蘇飲之類輕發其汗

唇舌紅赤 唇舌紅赤不燥薄胎通明增寒壯熱頭痛咳嗽鼻
流清涕者多因於外感不可妄發汗也當視兒強弱而
用茱萸汗兒體素壯實者用加味升麻葛根湯汗之使
氣素怯弱者宜加味參蘇飲汗之

唇舌滋潤 唇舌滋潤既紅發汗而身熱漸緩兒頗安
常者其痘出必稀少此爲順候一旦分服茱萸以待之宜加

減升麻湯或升麻葛根湯之類如唇舌紅赤而即揚家
外感而非痘疹服之發汗亦無妨

唇舌紅潤 唇舌紅潤口中氣和而發熱者為吉如口燥
唇裂舌上白胎或生芒刺二便秘者裏毒必然急宜解
散如二三日大便秘結煩躁昏悶氣急者微利之四順清
涼飲主之

唇舌燥裂 唇舌燥裂前板齒乾燥生血絲者陽明之壅
甚勿擇白黃灰褐胎急下之如利後唇舌滋潤者生
否則死

唇舌紅赤 唇舌紅赤或乾燥或燥裂發熱一二日鼻衄

者陽明抵極血得熱而妄行上溢于腦故衄血解肺家
膾乃爲吉。癰熱三日中衄血者爲羣自百癰散之義
白胎舌炕一熱而朝生白胎暮舌炕者爲積熱形症
面目浮腫氣喘声啞唇燥裂毛焦皮燥肌膚大熱二
便叔淡身反惡寒者專熱乃解之若失下及竟于升
散三日死矣惡熱者單下以胎減之不可拘在初
當癰之說此百中一二不可執以爲常急宜涼膈散
或黃連解毒湯合白虎湯或清涼攻毒飲之類唇舌
滋潤者雖見急症切忌妄下殺人

發熱二日唇舌滋潤

癰熱一二日而唇舌滋潤者稀發

唇舌紅潤唇舌紅潤潔清滋潤豐滿者渾身壯熱胎
毒乘隙與疫氣相搏起自內外出一二日間自腎骨
髓而出之於肝筋血氣充足者盡送出毒於筋而無
少留於筋三四日盡出於胃肌肉而無少留於筋三
四日盡出於心血脈而無少留於肌肉四五日盡出
於皮毛而無少留於血脉六七日盡出於瘡疹之中

而無少留於皮毛。七八日其膿漸乾。十二日而結痂。放苗三日唇舌口訣。痘欲出不離八舌。痘已出不離八症。此惟辨症痘之輕重。症之陰陽以治之為要矣。
唇舌紅潤。唇舌紅潤身熱二三日至四日。口角面腮之邊一兩點出現。面頰兩觀石磊落。見點大者為稀。勿服茱。如一日熱即出者為重。二日熱出者次之。三日熱出者。又次之。嘗謂候其見點初出之日時。以此為大極之根元。旁文以唇舌照於此治術之規。四節之要在於掌上。而痘之順逆症之陰陽始判然矣。真秘勿妄。勿壅說也。候其見苗。紅白必用茱有口訣。

痘之吉凶。痘出稀疎表裏俱涼。則毒少。輕兼大小石磊落。分明不相粘連者。則驗。唇舌紅不以宜治之。助其起脹。貫繫收結。如出不密。粘連模糊。則全出而其毒猶盛。則宜托裏。或清涼或解毒之劑。隨唇舌紅白。宜多飲之。以防其陷伏。痒塌黑癰之變。若遍体全然。模糊面上。候頸胸背之處。稀疎朗珠者。可治也。凡痘出一色者。若二色三色相雜者。凶也。

諸痘虛証口訣。唇舌紅赤先放苗。自輔觀敷出者審。宣辨。見点紅白如紅赤者。屬熱。宜清涼解毒。如唇舌淡紅出瘡淡白者。為虛。宜補益清補。如身熱末退。煩躁。

氣急唇舌乾燥出瘡深紅密而無縫色者內火太甚宜涼血解毒如身熱如焰煩躁口渴氣喘二便秘結唇乾淡舌三圍赤色中黃白胎如粉者內實也急宜清涼攻下如偏身壯熱出瘡赤色如肌肉潤紅唇舌赤色或燥裂者血熱也宜涼血活血○朱翼曰毒壅血熱同表裏之实血虛氣虛同表裏之虛善治者解其毒壅涼其血熱扶其氣虛滋其血虛疎其表实固其裏虛清其裏实補其裏虛以平為期無傷中和期良医矣唇舌淡紅唇舌淡紅面上㿠白頭溫足冷痘苗隱隱皮下淡紅便溏不渴口食不和驚搐呵欠等証此皆有氣

血虛弱送毒氣不出而狂躁者屬氣虛宜加棗益氣湯或溫中益氣陽主之

唇舌淡紅唇舌淡紅滋潤或青白灰紫面色青㿠白痘瘡已出形如平日正色者不出治則生如帶艷色者後多皮薄易破瘡不可救但見嬌嫩者防七八日瘡塌之變急用保元湯加川芎桔梗治之或入參白芍湯可參考○曼公先生曰嬌紅與血熱其色相類嬌嫩屬氣虛宜補益血熱屬實熱宜清解善治者究其源以宣施治

唇舌淡紅唇舌淡紅或唇淡閑舌淡白癰熱一二日口渴

清冷，神氣困倦，寢食不安，出瘡淡白，窠粒不明，起勢遲緩，根脚不分，虛証無疑。未見點前，用保元湯加輕劑，羌散加紫蘇防風白芷，見點之後，用保元湯加輕劑，加川芎、桔梗四日後，用大保湯或參苓白朮散，加桔梗、白芷治之。

唇舌淡紅 唇舌淡紅或淡白，毫無悠悠，一二日放苗影，淡白模不碍手，或吐或泄，自汗肢冷，神元爲初熱所困，表裏皆虛也。先用人參飯耆陽或參苓白朮散加黃耆，去葛根治之。

唇舌淡白 唇舌淡白或滋潤或青白或灰紫者，身無微微。

痘出二三日，陸續不齊，形色淡白或淡紅或雖起癰，軟而不實，根窠不紅活，心氣靜，手足微冷，此已出既欲虛寒者，先用加減益氣湯加桂治之，四日後宜用人參飯耆陽或大保元湯可參考。

唇舌淡白 唇舌淡白或淡紅或滋潤，毫無精神，昏憊起卧，困倦飲食不進，大便易泄，微熱悠悠，口渴不飲，眼胞虛浮，面色青白，瘡出淡白，顆粒不明者，裏虛也急用保元湯加白朮茯苓治之，或加減益氣湯全之。

唇舌淡白 唇舌淡白或淡紅或青白或灰紫或潔清或唇微渴，方微熱，而自汗，睡中微悸，飲食少進，小便清利。

恐風寒放苗淡紅或淡白而皮薄或窠粒不實或帶嬌
艷肌膚柔嫩汗出不止者此爲表虛不問末出前已出
后先用保元湯加桔梗川芎四日後人參白芍陽重服之
唇舌淡白唇舌淡白或淡灰或潔清滋潤面目青疏息氣靜
睡卧昏沈微熱不煩微渴不躁出瘡淡淡根散或瘡色與
肉色無異者名爲血虛先用十全大補湯去桂加防風桔
梗治之或出瘡後用本方或加減益氣陽保元湯可參考人
○傳曰瘧素屬虛者三四日而漸氣血交會爲不快或
中間之雜症並起者預詳審氣虛血虛表虛裏虛四症
以宜爲治然不同其名狀瘡形遷變雖異其形然成其

色者血也成其窠者氣也故氣衰則出瘡平治不起兒血
衰則根暈淡白不收緊一旦氣無形血有形故有形者以平
素治之無形者應其急治之其功速也蓋至出瘡後而
四症俱皆本於氣虛而宜治之即其功留于千萬矣經
曰緩則治其標急則治其本此之謂也

實痘口訣 唇舌紅赤唇舌紅赤或薄胎透明初覺熱
而偏身頭面有碎小密如芥子者此夾疹有肉色鮮
紅或片或塊者此夾班也皆毒火大盛薰蒸於中
故一晝滑出莫驚惶但用玄參升麻湯又唇舌赤
色白胎透明而夾疹者前方加桔梗黃芩治之

唇乾燥 唇乾燥舌白胎如粉大熱無汗皮毛焦枯喘氣粗面浮腫肌肉疼痛甚風寒外襲者爲表實此症痘末出前重感風寒約束毛竅而腠理閉密疹出不快者當發其汗先用參蘇飲升麻葛根湯之類發其汗重則桂枝葛根湯主之春夏忌用之如瘡出稠密欲出不出大熱煩躁口渴譴語肌膚壅遏者用敗毒和中散發解之

唇紫赤燥裂 唇紫赤燥裂舌三圍赤色如火中央白胎如積粉或出瘡稠密紫赤乾枯欲變焦紫大熱狂亂氣盛煩渴引飲睡卧不安或昏悶譴語如見鬼狀二

便秘結或腹脹不能食者爲內實初發一二日用連翹升麻湯或辰砂益元散或退火回生丹之類其熱不解如舌胎變黃中黃乾黑或焦紫而欲生刺者急宜清涼攻毒飲或十神解毒湯加石膏大黃清之解之如利後身熱漸退唇舌滋潤者生否則六日九日死

唇舌赤紫 唇舌赤紫或三圍赤潤中央薄胎透明身熱如焰一二日即出痘先發於天庭司空印堂等處一齊出根點稠密形不尖翹色帶慘黯隱隱皮膚欲出不出者或乾枯而紫黑者或成片不分顆粒者皆血氣凝滯而

毒氣肆行最爲不憂此毒壅也一二日用敗毒和中散
發解之三日後急宜活血養氣而解毒用調元化毒
湯主之

唇舌赤色 唇舌赤色或紫赤無胎口渴身熱如燔見點
深紅漸出焦紫而夾班疔或乾紅滯色者是血熱也急
宜十神解毒湯主之如大便秘結者加酒炒大黃微利
之或涼血攻毒飲可參考

唇舌赤色 唇舌赤色或赤紫中夾白胎透明者痘出不快
者其症不同最宜分別若百痘色紅紫枯滯或乾紅或
密如蚕種不分顆粒如瘡色赤色或肌肉深紅至出脊

唇紅赤 唇紅赤舌白胎如粉放點熱不退日烈乾地
帶火而出不論稀密或紫艷或嫩紅其他可知此氣毒
烈火及早圖之不致日後發紫黑陷急用清毒活血

陽治之或大便秘結者宜涼血攻毒飲主之

唇舌紅赤 唇舌紅赤或乾燥發熱一二日發汙後瘡出太
盛紅血一片不分地界或稠密顆粒不明氣虛血實者
自出苗四五日間宜神功散主之如壯熱不退者加酒

炒黃芩治之吐泻甚者忌此湯

唇舌紅赤 唇舌紅赤或紫赤無胎乾燥偏身壯熱腮
紅臉赤毛焦色枯已出未出三日已前痘頭煩紅燥
渴欲飲睡卧不寧小便赤洪大便秘結者此血熱也並
皆宜十神解毒湯主之如身熱愈盛形色乾紅滯縮
紫變黑者血熱太甚血毒急宜清毒活血湯主之如

唇燥裂乾黑而不潤澤形色如剥免者九日死

唇赤紫 唇赤紫燥裂灑血如小黑珠舌三圍紫赤冲
央白胎中心焦黑或似黑刺放點赤色如大或面觀深
紅如金朱或乾紅紫赤者痘邪色犯胃中賊濁甚或

唇裂撇腫或唇腫尖嘴口中穢氣不堪者急宜泻黃納
穀散加大黃主之或清涼攻毒飲或涼膈散可參攻
如利後口臭除去唇舌滑潤三圍紅神氣清爽者勿
否則六日九日死

起脹三日唇舌口訣 出痘後不遇解氣虛毒壅內壅
血熱四症

放苗吉痘 凡放苗三日當逐漸起癰最唇舌滋潤者
先出先起後出後起痘肝一分則毒出一分痘肥已
足則毒出明潤紅活腳根項窠紅綻摸碍手面目
漸腫飲食二便無故而無他症者吉此氣盛血家毒

邪癰揚於外，氣血能制之，毒也。

出痘吉凶。凡痘瘡三四日間候，四圍八脚以顯粒解明，則此謂爲氣血交會，總首尾宜痘內暗色。初出血，疮淡紅者爲吉。三日後尖圓紅活，瘡項可放光白者爲吉。其窠外光闊，所謂外陽而內陰也。如燈火者爲美，反之者爲僨。爲逆若唇舌赤色而出痘内外皆光亮，爲純陽無陰，治宜清涼。若唇舌淡紅而出痘内外皆暗晦，爲純陰無陽，治當溫補。

出痘乾枯無水痘，雖起脹乾枯無水，謂之不肥澤，帶紫黑色者，謂之不紅沾。其變爲黑陷，唇舌赤色者爲實淡。

唇舌淡紅。唇舌淡紅身熱漸退，痘出三四日頂陷，灰白不起，或起亦軟，不碍手，根窠不收緊，睡卧安常，起居靜者，氣虛也。如再加塘泄者，欲虛寒之勢也。急用大保元湯，人参白朮，脊陽治之。如唇舌淡灰或淡紫，而氣血滯者，加木香，五日後塘泄不止者，宜堅臍湯治之。如唇帶水色，舌淡白或見淡白点者，急宜木香散異功散。

唇舌淡紅。唇舌淡紅或淡白，滋潤三四日，瘡勢雖有如

胃，竣之力根量不紅活則元陽不充實先可知前症初發爲吐泻所困而爲內虛者多惟痘以元氣爲主一曰實，腠理而固，肌表一曰節飲食保脾土肌表固則外陷之患不足慮，脾土实則下陷之患不足憂更加以參飯補益之功則元氣自然充足痘之出也自易長易癢不生變証而收縛如神先用保元湯加白朮桔梗川芎治之四日後唇舌淡閨痘瘡不得閨澤者宜大保元湯或入參飯香陽主之

唇舌淡紅唇舌淡紅或青白瘡出四五日來壯起肥大中有一小孔項直稍根脚不活或雖活與肉色等者

桂丁子治之

唇舌潔清唇舌潔清或淡紅或灰紫或灰白者至五六日有一等光洁可愛，矯嫩艷色者以手標之破燈照之如琉璃此假脹也急圖之先救其表或幸生否則至七八日爲癰搘舌虛冷唇淡白者膿漿清水根量不活者九日死急用參耆鹿茸湯或回陽反本湯主之如陽氣猶脫者兼與參附湯補其陽

唇舌潔清唇舌潔清或淡紅或灰紫或灰白者至五六日有一等光洁可愛，矯嫩艷色者以手標之破燈照之如琉璃此假脹也急圖之先救其表或幸生否則至七八日爲癰搘舌虛冷唇淡白者膿漿清水根量不活者九日死急用參耆鹿茸湯或回陽反本湯主之如陽氣猶脫者兼與參附湯補其陽

唇舌乾燥

唇舌乾燥或白胎透明三四日瘡色皚紅根

暈紫赤煩紅睡卧不寧煩渴引飲偏身壯熱者此血無毒壅也先用清涼活血解毒之劑熱氣漸散至五六日唇舌滋潤或舌三圍紅潤中央白轉微灰黑滑潤者氣血津液微虛之兆也陰轉頃外標雖衆恩終無妨惟六日後急用保元湯加桂丁香鹿茸鴉參一百粒治之

唇舌滋潤

唇舌滋潤或潔清或薄胎透明出瘡紅赤雖

有起癰之勢或不勇精神爽食不進微渴不飲睡卧不寧四五日大便秘結者元陽素虛弱也其證似虛非虛

似實非實難辨別陰陽矣惟宜膽導法解後偏宜峻補立急投參耆鹿茸湯如唇舌淡白虛冷老垢者無參附湯而後唇舌紅潤則體色勃勃如破竹如大便五六日來不通唇舌滋潤者重見急症切忌妄下殺人

唇舌淡紅

唇舌淡紅或淡白或微灰或微黑此皆純色之象

也痘出五六日期表裏無邪實惟氣虛血弱雖起癰不光暉淡白不經紅眼不封鼻不塞而大孔時下氣或肚腹雷鳴防後表泄深將氣脫之勢也急宜木香散異功散六日後宜回陽反本湯如陽氣下陷者舌虛冷

而帶尤姤者兼與獨參陽或參附陽使痘托腮○傳曰出痘三四日血泡已成色淡紅紫肥大而粗項癰光而白狠脚純紅狠暈收緊光洁明潤根紅項白者此行癰之勢也然痘光明者氣血相旺也氣旺而血得其會氣非爲血滯○閼即不能成膿漿六日而於地閣而腮凹角入中之間顆粒分明光髮成鼎峻之勢七日而仰堂額前輔觀眉發明潤不滯爲妙於此五微五欲具而精神清爽微微得潤髮唇舌或有舌胎者三圍紅潤中央黃者而滑閼或半黃微灰○閼者勿論稀密不服藥自愈矣如至三四日熱毒未解唇舌與瘡色不

得潤髮者急宜清涼解毒

唇舌紅赤唇舌紅赤或滿舌白胎如粉三四日痘瘡雖起癰彼此相串皮腫肉浮或於本痘四傍旋出小痘攢聚漸肿成一塊者此痘最重先用調元化毒湯清熱解毒至五六日唇潤舌胎黃老而滑閼者宜用千金內托散托腮解毒如皮薄干塌不起根暈不收緊者忌之唇舌赤色唇舌赤色如火或燥裂痘出三四日或稠密或乾紅滯色或紅紫而頂陷者紫陷也甚則轉而爲黑陷也此毒火熾盛焰血液故血乾涸也先用清毒活血湯若唇燥裂舌乾紫而生刺大便秘結小便如紅花汁

者宜涼血攻毒飲主之。服之後便利。唇舌滋潤出瘡得綻鬚明潤者吉。如頂陷根暈不活。唇舌淡紅或淡白或灰紫者虛寒也。保元湯溫補能所治。

唇燥裂 唇燥裂舌尖赤色如焰中夾白胎生赤刺出瘡四五日頭面焦紫乾渴手足微熱發如火根暈紫赤大小便秘結狂妄譖語如見鬼狀寢食不寧煩渴者裏內伏火之極也急不圖之則舌乾黑而九日死急用清涼攻毒飲主之如便利後唇舌滑潤三圍赤色標瘡主得僵臘赤色不全退者勿投參耆七日後宜內托散。大參因桂加黃芩大力子治之或用參麥清神湯去參葛加黃連。

蠍蛇治之○如疎滌之利大過則內氣下脫標瘡不能峻癰五六日後唇舌滋潤或淡紅或灰紫或淡白或潔清或灰黑或淡紫或淡白色或老垢或滑潤者急宜溫補。

唇乾燥 唇乾燥舌燥裂赤色如火壯熱口渴出瘡乾紅帶色劇則皮肉深紅如烟火者急宜下神解毒湯主之唇燥裂唇燥裂舌白胎如積粉三圍紅赤身熱口渴出瘡焦紫乾紅或癰紫血瘀不起發者毒壅血熱也如三四日大便秘結小便赤澀者急以前方加石膏大黃治之或兼投辰砂益元散二便快通宜行別儀。

唇舌乾燥 唇舌乾燥或舌尖赤色如火出瘡赤紫乾枯或

癰紫血泡或項陷不起根暈紫赤頰腫將變焦黑而滯縮者血毒血滯也急宜清毒活血陽主之○傳曰毒壅則血熱血熱則毒壅愈血凝滯不行則血毒血滯古人曰一而二二而一故候之以唇舌為準又血泡與紫泡相類紫泡屬熱血泡屬寒宜溫補不可不極矣

唇舌紅赤 唇舌紅赤白胎透明至五六日痘色紅紫乾枯或帶焦黑者熱也毒熾血凝者氣虛也血多熱所燥汽不行毒壅肌肉不洩鬱遏不綻鬆則不能成漿膿急宜清熱涼血活血清毒活血湯主之如唇燥舌燥裂大便秘結瘡色紫滯攀紅徹夜無眠毒火內伏煩渴躁亂身體反祟

者宜涼血攻毒飲主之

唇舌淡紅 唇舌淡紅或灰紫或淡白至四五日期頭面稠密者自然腫脹眼封鼻塞者正候也能食二便如常精神清爽睡卧安寧者陰轉順之也惟宜保元陽加桂治之如腫不腫應閉不閉者有二症毒氣擁遏於內不能起癰急宜托裏解毒參耆內托散主之如唇舌淡白或淡紅痘出稠密皮色慘暗或皮薄灰白根暈不收緊至五六日無膿路平塌不起時欲成挫瘍者屬氣虛急用參耆鹿茸湯主之如腸鳴大孔下氣或咬牙或瘡泄者於本方內加桂丁子附子治之愈虛寒劇

者急兼與參附湯宜溫之

唇舌紅赤 唇舌紅赤或唇乾舌白胎如粉痘出五六日起膿時原稠密毒火既盛然元氣虛血氣弱為熱大津液枯竭不能制火以虛火炎蒸或煩渴咽痛衄血者邪火盛也項循不起失鼎峻之勢滯縮者氣血虛也故難任溫補復唯任清涼治者見其熱多卒用清涼致不和先用參麥清補湯而後待舌胎清潤者或宜參附鹿草陽或回陽反本陽可參考

唇舌乾燥 唇舌乾燥或白胎通明中央帶黃黑至四五月胎滑潤而唇乾澀者謂之不合格裏邪自解矣邪

末解而爲內虛者先欲救裏補益則表毒當去惟爲漿先欲救表清解則胃氣下陷爲溏泄爲氣脫致不救急宜托裏解毒如內托散參麥清補陽之類宜參考至六七月唇舌俱澀潤者表裏俱和偏宜溫補

三禁治方 傳曰初發毒氣虛之証候先須知三禁惟放箒時更宜保元陽加減補中益氣湯加減使痘易長年至七日氣血乃虛正確行漿其治勢宜溫補其原屬虛虛之證明矣又童賴參葛桂附乃可成膿如毒壅火盛之証亦常出脊四五日間投清涼之劑邪火八九退者亦及膿期宜補托大抵治痘之大法其初一二日行升

陽鬪散三四日用清涼解毒，中氣必然耗散，其治在唇舌紅盃。此熱氣是心氣自虛有痘之常候也。至七日又氣血津液外化爲膿漿，五臟必虛不行。補托漿何由滿毒何由化？如虛寒症明者，又宜薑附溫熱之劑以助陽氣也。惟肺者留毒表瘡焦枯木喰錯喉者少辟參香耳。此亦初不行升陽散鬪三四日失清涼解毒之過也。如至七八日，鬪毒未解者便于補托茱萸佐以清涼使漿膿毒化乃爲吉兆。解者亦於補托茱萸佐以清涼使漿膿毒化乃爲吉兆。此七八九日程証通變之妙訣驗唇舌以用茱萸則無餘蘊矣。

灌漿三日唇舌口訣 惟不如辨認復陽虛實以唇舌爲用

茱繩墨

膿漿百無辨
支毒又由膿而化故有膿則生無膿則死。
然膿者氣之所向血之度也是以項肥光潤根窠血聚者則自有膿生之兆也。若見項陷灰白根窠血散者自無膿死之徵也。此即膿百無神彩者生死之門戶也。

唇舌紅潤痘至五六日唇舌紅潤或滋潤或潔淨或三圍紅潤中央帶微灰黑者毒化成漿如神矣且痘之一症不出不出不熱不長不熱不膿不熱不結此始終之候也。

妄以有熱者不可用清涼之劑然驗其形色一熱紅一熱白一熱黃一熱先如蒼蠅者肥滿光沴根窠紅活以手接之其皮堅硬其漿濃軟中項帶黃黑者此謂之蒼蠅更無他症者吉之兆也

根窠紅活 凡根窠紅活者爲陰血得其常則以盈而虧痘項變白者爲陽氣得其正則無形沾動高聳乃氣血交會陰陽通運然氣血毒三者見于外氣成窠毒要不洩血成根脚收緊毒要不敢毒入於窠中一要稠膿黃實兩臂兩膝要膿色豐滿其初陰半有陽其末陽中有陰乃陰陽交泰之象也否則內爲空倉外爲虛

薄陰陽不護氣血俱竭其欲不死也難矣○凡六七八九日要破傷其面上五岳者五藏毒氣所聚經曰邪所聚甚氣必虛故最易擦破凡面頰鼻準額角高突之處如稠密者此部一傷則衆痘盡伏毒即欲內攻如唇舌滋潤或潔淨精神清爽寢食如故者收結後發瘡膿作臭爛而有得生者若瘡痘者宜切爲守護如誤扒破即將牢封仍服內托補養之劑如唇舌無故則隨症施治痘得復起而充灌衆痘如常或於空處增出痘丘雖細小灌易回水是餘痘得以復出矣又爲吉兆

唇舌紅潤 唇舌紅潤或滋潤者至六七八日間無他症用法如常以丸裹行漿爲主如唇舌潔淨有外症雖頑症先用保元湯加桂丁香當歸獨參之如漿色不滿者前方加鹿茸山楂子爲妙

十一治 唇舌淡紅或灰紫而已六日狠瘻淡紅皮薄塌陷不起額前灰白不沾腹脹滑溼飲食虛饑睡卧不寧者宜陳氏木香散主之如唇舌淡白而五六日後漿清虛薄搔痒時作根暈塌潤腸鳴渴泻無度痰喘氣息顙溫足冷咬牙寒戰者急宜陳氏異功散主之如六七八日期唇舌淡白或虛冷或淡白点或微灰黑

或灰紫者若腹脹渴者溏泄渴者鼻不封渴者足指冷渴者驚悸渴者身熱渴者寒戰氣急渴者咬牙喘呼渴者身溫面色㿠白渴者兩頰微赤渴者好飲轉渴者已上十一証悉皆純陰微陽之象也驗唇舌紅否以審詳內外十一証宜施治

唇舌淡紅 唇舌淡紅或滋潤神氣靜鼻氣穩面目脰脹雖有起勢至七日漿色不快或鼻不甚塞時流清涕者表寒欲虛之徵也唇舌淡白者裏寒而虛也未淡白者表寒急宜內化最加丁子熟附鹿茸獨參治之嘗防收齎之虛實

唇舌淡紅 唇舌淡紅或淡白者或舌心微黑痘出七日若膿漿不行根暉不紅活復必易虛寒向來防虛滑急用參耆鹿茸湯加肉桂丁子熟附治之若膿漿不起或清木利無生意矣如至八九日有膿四五方猶可望生

唇淡紅 唇淡紅舌虛冷而見淡白色者六七日期痘水伏不長灰白錫光皮薄有孔流水漏將班爛外剥者後又齷薄無痂疤此表裏俱虛寒宜溫肺胃補氣血爲要用參耆鹿茸湯加桂丁香熟附或回陽反本湯可參考若舌帶老垢者虛寒愈甚則兼與參附湯治之

唇瘡腫裂 唇瘡腫裂帶水色如濺或似破舌中央胎滑潤或灰或紫色三圍紅潤者六七日期頤面模糊或額前癰水泡似虛證間有膿路皮薄血妄根脚不收圍者不能化膿急用參耆鹿茸湯加桂丁子附子好酒治之無興參附陽大劑可峻補氣血服之後唇舌滋潤膿胞與水疱相伴者無妨否則十二日死

唇堆腫 唇堆腫欲破裂濁潤舌白胎如積粉中央黃老而三圍紅潤者七八九日期灰白錫色漿清或漏出清水項陷白光無血沴神情懶倦語詬慵參附湯治之外無治方唇舌淡白或虛冷或老垢者宜峻補之

剗而後垂舌上微燥微渴，曾勿輕重用之。至膿期煩渴者津液虛耗，自渴，自救之也。如唇舌紅潤者，辛熱之劑勿大過，少用平剗治之。

唇舌淡白，唇舌淡白或虛冷或淡白色或滿舌老垢者，六七八九日間腹脹洩泻，喘渴形色平暗，稱垂舌有膿路不實者，非毒必氣虛也急宜峻補。木香異功所不忌。如至八日午後漿膿不滿，根暈不活，滑洩不止，煩渴不飲，睡卧不寧，精神困憊，飲食虛餒時咬牙者，先標瘡不治而宜神養其內氣，向來防內攻之變急宜其氏建中湯，若再加寒戰咬牙者，亦宜兼與參附陽。

唇角大水光，唇角大水光，或唇瘡假爛，如破或唇舌淡白或白胎帶黃，老滑潤者六七日後屬虛寒者，瘡色虛餒空穀或灰白帶水光或項陷根白時，瘡塌咬牙，神氣昏沈，寢食不寧，飲食減少，大便易溏者先用參耆鹿茸湯，加肉桂丁香熟附治之，或用陽反本湯可參考。若前症未除，頻寒戰咬牙利黃青色物者為臟寒，投陳氏異功散，猶不止，如至八日，天午，膿色不滿者急宜建中湯，溫內氣，用此陽陽氣猶脫者，宜兼用參附陽大劑與之，氣脫者他無治法死不治。

唇瘡堆腫，唇瘡堆腫，燥裂舌尖赤色如火中央白胎或

黃黑而焦紫乾枯。或生芒刺煩渴喘嗽。咽痛寢食不寧。大小便秘結。瘡色乾紅。焦枯根暈赤紫。手足如絳者。至六日熱火猶盛者。急清毒活血陽主之。如大便愈秘者。急宜涼血攻毒飲養其陰。如大便初硬後緩。舌胎滑潤外瘡未疎。必變虛勿攻之。惟宜參芪內托散。如至七八日餘炎未解者。本方去桂加酒炒黃芩大刀子一帖。

唇舌紅赤。唇舌紅赤或紫赤或燥乾或舌中央乾紅者。七八日行漿將足而發疔者。

黑痘與疔痘相類。

詳于五家必論。○發紫赤疮或癰大。

紫疮末曾解毒者。仍以神攻散。加雄黃芩連大黃。治之。或清毒活血湯可參考。如疔明手剔破疔頭。四聖膏塗之。

唇口燥裂。唇燥裂舌尖紫赤。滿舌白胎。如積粉中央生芒刺。其色黑焦七八日期。有裏毒烈火血熱之極。痘症以日則療。故非不極其清解。遍身皚紅帶色。赤紫疮根暈赤或頂陷不起。曾無潤色。然大渴引飲。氣盛。寢食不安。大便秘結。小便赤。洪脈。大熱表裏俱實。急宜清涼攻毒飲利大便。後唇舌滑潤。瘡色癟綻。翳者峻分攻之。凡至腮期。用清毒活血陽清。

涼攻毒飲之症候甚鮮但百中不過一二施治者詳之
唇舌是準惟餘邪未盡者以十神解毒湯加酒炒黃芩
治之若舌上紅閼而胎減去者參麥清補陽或千金內
托散宜參考

唇舌紅赤 唇舌紅赤薄胎透明七八日日漿雖灌而色
大紅根脚散漫者血熱未甚解及九日當有搔痒
之患急宜參芪內托散加蟬退木通荆芥山甲治之
唇舌紅赤 唇舌紅赤或乾燥者血熱未悉解瘡色乾
紅紫赤根蕈掀發至六七日不能化漿作痒者宜清
毒活血湯主之如唇燥裂舌乾紅而大便秘者加酒炒
清補氣血參麥清補陽主之

大黃微下古人曰重便秘下之不過六日餘仰之

唇舌淡紅 唇舌淡紅或唇瘡堆腫燥裂不見閼色至七八
日稍有漿色不充實或紅乾或項陷或滯縮或作黃硬
抓癢時作者表實裏虛也雅專任補難專任清涼惟宜
清補氣血參麥清補陽主之

唇舌淡紅 唇舌淡紅或滋閼或潔淨至六日內外無阻塞
膿色半足至七八日忽大孔灑血五七滴乍痘色淡白
根暉散漫神氣靜寢食無故雖然不早圖則及危篤
矣俗醫不知之用犀角地黃之類殺人速也急宜十全
大補湯加鹿茸熟附子治之如唇舌赤色痘色嫩腫根

暉煩紅者復宜清涼。

唇舌淡白 唇舌淡白或淡紅或滋潤在八九日期一等土黃而硬者不可成正漿 板牢則死塞而不活動乾蠟而不明以手指抵之凝結板定五經痛而二氣截矣此謂之板黃 參脊內托散加丁子蝮蛇治之如唇舌赤色手足根暉嫩赤乾紅者參芩清補陽加王連蝮蛇治之○唇舌淡白或虛冷或舌胎滑潤者瘡色淡白或灰白或皮薄水庖清淡膿色虛餒或項脰不起痏而易破渴仍不禁喘氣時起六七日後爲癰痒者氣虛也內虛也如寒戰咬牙者虛寒也急用參脊鹿茸湯或

田陽反本陽之類如唇赤不紅膿色不實者兼與參附陽若至八日午後虛寒猶不除陽氣不宣者宜其氏建中陽主之已上有証候用此法陽氣猶脫者他無治法

唇舌滋潤 唇舌滋潤潔淨紅潤者八九日期痘瘡膿熟潰爛者痘之常候也若六七日期未成膿先即潰者此名班爛屬實故唇舌赤色或白胎或黃黑胎者初發失表之過也急參脊內托散去桂加黃芩荊芥大力子治之又有表虛潰爛者其初素氣虛誤發散太過則陽氣隨汗洩故易出難收如瘡出水庖清

淡皮薄，易破，而潰爛者，屬氣虛，或屬表虛也。唇舌淡紅，淡白虛冷，清白灰紫淡黑者，証之常也。宜十全大補湯，加防風荆芥。

唇舌淡白。唇舌淡白虛冷，瘡出六七日漸作漿之初，諸瘡末盡成漿，鼻準瘡先乾，如黃硬者，眉心瘡自乾黑者，或唇上瘡焦黑者，或兩耳上瘡自收者，兩頰瘡如餅，中間乾陷者，額前瘡平陷乾枯者，此名陷例，乃死之徵也。不可認作正收對人，妄言六七日期，而有此症者，急宜參耆內托散，加附子托裏少加解表，治之如氣虛者，表虛夾寒者急宜參白鹿茸湯，可起其痘，一如唇舌赤色。

痘根嫩赤者，急清涼，不可熱，一治二

唇舌淡白。唇舌淡白或淡紅，或唇虛冷，瘡班爛，而如濁舌，尖淡白，而黃黑胎如熟似湿润者，八九日期，而面顏灰白，錫色平陷皮薄，漿清，手足水疱漏水如漬者，脾胃虛也，漿清者，脾虛不解也，用千金內托散，加丁香附子鹿茸，糯米，治之如稠膿不滿者，十二日死。○傳曰：痘瘡，一症始終不離，肺脾受傷之由，肺主皮毛，脾主肌肉，然至八九日，期漿色勃勃，飽滿，高聳，根暈一絲，周匝緊緊，神情爽快，寢食無故，微熱，渴唇舌紅潤，或滋潤中央，微煩者，痘之常候也。凡八九日舌墨微

頃內外無故者非乾燥又鼻塞不通則發口而呼吸故舌乾也曾莫怪也若或唇舌淡紅稍雜乾燥漿膿充實神氣清能食二便秘渴睡卧安常渴而不煩者爲膿漿氣血津液既干外便然也勿怪且膿充足者勿用參芪又唇舌紅潤者不除桂附有後必發眼疾及癰毒者治之過也惟至九日膿足諸症平而渴者痘之常候也用補中益氣陽加五味子麥門冬調養脾元滋補肺氣九十日與之驗唇舌滋潤者以於補脾滲濕之中微兼解毒治之則家秘小連竟飲主之嘗謂百千法論不越神禹兩途百千形狀不離氣虛毒壅而項其候驗唇

舌以爲準

收瘡三日唇舌口訣不如論氣虛血虛表虛裏虛体

虛血熱毒壅餘毒八証

痘八九日治法

痘八九日期成膿之後鮮明肥沃飽滿堅實以手搾之而瘡頭微焦硬者此欲膿之勢也然精神清爽寢食無故二便溲快唇舌滋潤或紅潤潔清如膏舌胎者滑潤胎淳如爛砍除去者三圍紅潤柔和者生之微也如九日後唇舌淡紅而滋潤者膿後之常候也候之有訣故淡白者屬虛寒赤色者屬熱胎厚燥者爲毒壅濕潤者爲胃泄三圍紅舌上滑

潤者生之徵也然大小前後最宜漸以收齧既不失於急又不失於緩其已齧者痂殼周圍而無凹凸及乾淨黃黑而潤者陽外而陰內也無淫濕破敗者此爲正齧其先天之毒已侵於外先天之元仍販於中是否極柔之象也

齧之可症 凡欲齧故宜於人中上下左右口唇兩傍先出先齧者爲吉蓋以其陰陽相消之理自頭面而及手足者爲頑自手足而及頭面者爲逆

齧頑症 凡七八日頭面膿色豐滿充足九十日兩手

漿色充灌十一十二日兩足濃膿充實者是稠密者爲

頑之驗也

齧清涼之法 凡九日後諸症可推悉盡于筆端于大都惟有於前期而此得膿豈約何如果豈也則諸症屬虛舌淡紅或虛冷或淡白或潔淨者宜補益溫補果約也則諸症屬實舌紅赤或乾燥或白胎或燥裂有急宜清涼解毒如虛實不詳驗内外十証以辨之

九日期微頑 瘡出已九日期至血化毒解如蒼蠅色膿頭乾燥帶黃黑色者謂之蒼蠅也從口鼻兩傍人中收結兩頰與胸前俱收者爲頑頭項與脚背俱收者能

食神爽，寢安，身輕，起居如常，唇舌滋潤潔淨者為吉，重則反之。如八九日期微渴者，瘧之常候也。如九日而煩渴者，宜補中益氣陽加五味麥門治之。

厥面後餘毒 凡瘧係危險，氣血大虛多服補劑漸見膚色，而將收厥全有抵者當於補劑中加涼藥若謂將厥去補劑而竟與冷藥更用，下利藥令其速厥是其速斃也。蓋虛者復虛，毒反內攻，此必然之理也。又已然之驗也。又十日後唇舌總淡白者為虛寒，不可妄用辛熱之劑，多為肝氣血逆外，神氣困倦精氣薄劣致然。九十日用補中益氣，唇舌滋潤者宜小連羌飲解。

餘毒 之妙劑也。如餘毒甚，夾虛者加味連翹飲治之。
唇舌淡紅 唇舌淡紅或濶闊或潔淨者九十日後若覺熱稍緩，顏熱面不甚熱，手心腳心俱熱，手背腳背不熱，精神困倦大小便清利者虛熱也。宜補中益氣陽主。

三

唇舌淡紅 唇舌淡紅或唇乾舌淡白九日期膿色飽滿將收此則定期也。氣血有強弱，瘧有稀密，故以日則不可論，惟膿以豐約驗之。如味稠密者津液于外化為膿漿，不能滋養氣血，故自渴，自救如唇舌淡白或淡紅而燥者急宜補中益氣陽加五味麥門如唇舌乾燥舌

尖赤色而大渴者宜清涼。

唇舌淡白 唇舌淡白或虛冷或唇瘡帶木色如燬舌胎
渭閨者九十日期當齶不齶勃然變動灰白塌潤瘡
泄頻頻腹脹喘急或寒戰咬牙頭溫足冷時身熱煩渴
者裏寒而虛也急宜建中陽主之如虛寒益甚則兼與
獨參陽或參附陽陽氣猶脫者不治

唇舌潔淨 唇舌潔淨或微閨八九日後當結不結忽然失潤鬆之勢痒搘非時心煩氣促身涼而手足冷大便不硬睡卧不寧飲食減少鼻孔緩欲開發甚則鼻流清涕唇舌味淡者外感襲于外也表寒而虛也急宜溫表調中陽

主之

唇舌淡紅 唇舌淡紅或淡白或本有白胎至齶期舌滑閨者邪火自解有變虛寒者或過服清涼之劑謬變虛寒者爲重或因宿泄氣虛或素脾胃弱津液少肌肉虛脫而不能
回水至十日後潰爛不收結者頸倒齶先用建中陽治之如瘡不乾收者敗草散薺麥粉撲之如或因渴飲冷水過多以致水漬脾胃濕溼肌肉不收者內宜五苓散如或因食虛而不收者入參白朮散去葛根加肉桂

主之

唇瘡乾澀舌淡白 唇瘡乾澀舌淡白或唇瘡破裂舌

胎渭閨如膚熱三圍紅閨者九十日後不能結痂成
膚爛和皮脫去者此倒齶也係中氣不足急用保元
陽加當歸牛蒡連羌肉桂木香治之如虛寒甚者建
中湯主之其頭面腫退瘡色破眼闔鼻塞者又再加腫
灌眼封鼻塞頭額無瘡處又小瘡出者謂之補空唇舌
紅潤者生矣否則死

唇舌紅潤 唇舌紅潤潔淨滋潤者九十日後舌新生白
胎有風寒鬱於皮標此屬氣虛急用補中益氣陽加桂
治之如唇舌淡白或虛冷身熱不渴小便清利時惡寒者
溫表調中陽主之早不圖則癰瘍必死

唇舌淡紅 唇舌淡紅或淡白或潔淨或清白或虛冷者十日後
發驚搐目閉無魂而兼吐泻時吊白時角弓反張四肢冷
等証也諸書云莫救如瘧熱內甚小便閉淡或素有驚疾
又屬可治亦龍丹鎮驚丸安神丸俱可服釣藤湯加減
與之或宜清神散大陽如茱萸者可治若連發不已者
死症也

唇舌紅赤 唇舌紅赤或乾燥者九日後發搐瘻則癥痕赤
色痂皮或血不出或血不出仍後灌漿如瘡者此血熱氣
虛也宜八物湯加紅花紫草根牛蒡子治之

唇舌滋潤唇舌滋潤或潔淨或淡潤者痘出已十日齶紅

痂厚，蒼蠅色而微微有臭氣者此痘子成熟之氣也邪氣自內而出于外為吉兆候之有訣如雖有微毒未盡解身休遂日輕快精神清爽寢食無故睡卧安常大小便清利者小連羌飲主之如唇舌紅赤或唇乾燥舌胎末除去遍身時壯熱正坐齶結痂薄面目膚末消手足根暈帶火色濃膿不能乾收者加味連羌飲主之

唇舌淡紅 唇舌淡紅或唇瘡末收舌胎滑潤者十一二日若當齶不齶及痂落無托齶或又當乾收不乾淨手足膿水淋漓難收結者汪氏解毒飲主之

唇舌紅赤 唇舌紅赤或唇乾淡舌尖如火膿實結痂厚實身

熱煩渴身體胸腹手足頭面俱熱大便秘結小便赤澀此餘毒大盛如十一二日後有此諸症者急宜清涼解毒遲則落痂後必發癰毒大連羌飲主之如大便秘者酒炒大黃不可朽如痂落還元後或痂落一年後忽然遍身大熱唇燥舌白胎如粉口渴大小便秘澀者餘毒欲癰瘍也或手足四肢頸項胸背有一二處更甚者即癰之結聚處也此在膿漿不滿而結痂浮薄者連收速落者有急宜大連羌飲加酒炒大黃治之如熱毒不解十一二日後為諸症宜此湯

唇舌淡紅 唇舌淡紅或淡白舌中央微煩渴而不煩者神中

益氣陽加五味麥門之如唇燥裂舌尖赤色如火中央白胎如霜膿充實瘡根煩紅齷齪痂厚結手足根暈如火能食便實睡中呴喃大渴者內熱盛也肺熱也經日心移熱於肺傳爲膈消治在上焦人參白虎湯加黃連治之如唇舌淡白或乾燥自利而渴者屬少陰虛治在下焦宜溫之陳氏異功散其氏建中湯治之如唇舌淡白虛冷不能食而渴者脾胃虛也治在中焦參苓白朮散主之唇燥舌赤色唇燥舌赤色中央白胎乾燥或變黃黑者梟毒烈火熱之餘炎內伏未解身體根暈大赤如火燎燈手足根暈赤色焮腫大渴引飲熊食大便秘者九日後猶不

止者急不防火褐則以成倒麝急以清涼攻毒飲治之。

傳曰此症因山嵐瘴氣感之患痘者間有此症治者驗之

唇舌淡紅唇舌淡紅或淡白虛冷或滑潤或潔淨或先脣脣或蜂窠者十二三日後瘡脚散爛瘻痕白色皮破敷薄似齧此因津液枯竭血虛氣少內症未除之故也此痘之撫陰也急用四君子湯加麥門牛蒡荆芥連翹桔梗救之遲則不及矣

唇舌淡白唇舌淡白或淡紅或滑潤者久痘瘻十一二日後過期不癰渾身潰爛以致粘席粘衣治法用白龍散

敗草散赤小豆末蕎麥粉柏觀鋪散最佳七十全大補湯加防風荆芥治之如唇舌赤色者宜清涼方同上○傳曰十一二日三日瘧瘧收後將稀密順逆辨之其瘧有自脫者有未脫者其瘧有先後遲速其瘧亦有遂漸自脫者必以日則概不可看惟其瘧鮮明光澤平整無火色赤黑高聳凸凹者五岳分明五竅四肢並無傷殘者此則爲平順反之則其形有如大燒烟燻者生死最难次若音声哑食不入破處乾枯肉黑手足生火刺躁亂不寐或唇燥裂或乾淡舌胎如腐熟或烽窠湿润者死症也如音声清亮俱食無故睡眠安寧爬破肉紅血水淋漓神靜氣

爽呼吸與天氣等而唇舌滋潤潔淨舌胎滑潤三圍紅潤者生症也如唇舌淡白虛冷淡紅潔淨者溫補兼解毒如唇舌赤色乾燥或舌胎乾枯者大便秘罩宜清涼解毒如唇舌紅潤或滋潤者惟用和平之劑治之

唇舌滋潤唇舌滋潤或潔淨或紅潤者九十四日後忽然泄泻者膾血痂皮之物也此脾強腎弱爲順候痢自愈不可強治此倒醫症利下膾血痂皮隨利而心氣爽者吉如唇舌淡白虛冷者泄利水穀不化或滑泄不止者此脾弱腎弱急用建中湯或豆蔻丸兼與利止則吉不止則凶唇舌紅赤唇舌紅赤者十二日後面腫全消唇獨腫不消

者胃热所致必癰口痈或有輕者有重者有死者其症
滿口白糜或紅點簇簇輕症也唇舌腫硬牙齦黑爛爛
血者重症也如唇腫面腫穿鼻破頰潰喉有腐肉飲
食不入死俗呼走馬痈是也虛弱者甘露飲與之金
不換塗之或當取便通竟陽加石膏大黃犀角治之訣曰
痘瘡至漿期虛寒甚則用峻補之剤漸得膿刃然收
癰落痂癰走馬痈者辛熱過甚誤也急宜前方如
灑血者全不換散之不可緩甚則宜清涼攻毒飲主之
唇舌赤色唇舌赤色或乾燥或白胎透明者十二日後爲目
疾者毒留肝經則爲目翳蓋自眞藏而達于標治法

但宜峻涼涼膈散主之外忌指掌損瞳睛作盲目慎之
慎之又曰痘後向暗則閉兩目不赤向明則閉又不流
淚此肝絏大邪未退也此曰差明涼肝明日散主之總
生目翳者用涼膈散翳膜半退者清上防風陽加木
賊石決明治之或兒糞丸亦可也

唇燥舌赤色唇燥舌赤色者痘後數日後浮腫裏大如鉢
毒畜皮膚也大便竟飲加大腹皮茵陳治之如大便泄一
二行數日身體腫滿能食精神爽者實症也大便竟飲加
酒炒大黃利之如唇舌淡紅者胃苓湯加滑石治之如

唇舌淡白者胃苓湯加高麗附子治之

唇舌淡紅 唇舌淡紅或淡紫或青白痘後氣血兩傷陰虛則內熱陽虛則外寒。乍寒乍熱微然似瘧狀功不可以爲瘧治但以補中益氣陽升舉之其病自愈。

唇舌紅赤 唇舌紅赤或白胎如粉者痘後經數十日餘毒未除者忽然壯熱癰癰或癰丹或癰班或癰瘡者急宜大連翹飲主之。

鷙舌淡白唇舌淡白或青白或灰白者瘡物既落中氣暴虛癰痕白色不能食者脾胃虛也參苓白朮散去葛根加陳皮木香以調養之○曼公先生曰痘後逐日平復者不須用藥如生諸症者或陰而加逆或順而加陰又

雖自痘末來以四節症之為則以十二日為改元於此診脈詳證以難病急則治之痘症急則治之必先服何陽劑啖何飲食或感冒風寒暑濕忌犯何遂以由所犯之症辨認以宜施治此痘家之常法也

