


郷食庭秘説

虚症補助

十七

武  
245  
16



門中武9  
號 24  
卷 16

九折堂饒庭家秘說山田氏圖書之記

目錄 卷之二十五

虛痘補劑之一 元本十七卷



保元湯初下 寒伏痘乙リ 水伏痘ニウ 痘放苗時唇舌淡紅加桂各參芪飲

內外十証



人參歸芪湯四ウ 唇舌淡白裏虛四ウ 唇舌淡白表虛五ウ

托裏行漿治方六ウ 唇舌紅潤同上

倒靨腐爛九ウ 唇瘡乾澀舌色淡白同上 補空痘同上

大保元湯十ウ 參一分 芪一分 甘一分 芍一分 桂五分 白朮炒 姜末

頂陷根窠雖紅而皮薄血有餘而氣不足者

腸鳴轉矢氣之并十三  
根暈不腫炊之并十三

四日後虛痘治方十三

建中湯十四 治裏寒虛耗寒戰咬熱毒咬牙牙溇泄猶不止者

參二耆 乾橘二 附子八分 肉 散各 仔姜五分

十日虛寒之症治十六

虛寒二症之解同上

雖紅虛冷者之解十六

發熱薰蒸之解同上

八日午後虛症十七

九日十日虛痘同上

倒靨潰爛十八

倒靨腐爛補空痘十九

膿血下利十九

木香散十九 楮 腰皮 參 樵 龍 蘇 訶 半夏

仔 西各 姜三

異功散同上 楮 桂枝 當參 茯 酥 陳 朴各

仔 附子 半夏各 肉 姜 朮

三四日虛寒泄浮二

渴泄咬牙二

十一渴兼症二

八日前渴泄二

寒戰咬牙二

自利渴二

參酌鹿茸湯二

六日後托膿之妙劑也

麟 芪 當 參 炙 甘 姜 好 龍 眼 肉 好 酒

經水出痘二出痘胎墮二

漏痘治方二 假脹主方二

四五日便秘二

腸鳴下氣二 咬牙泄浮下氣二

元氣虛邪火盛二

七日膿漿不行二 冰伏痘班爛外剝二

唇瘡腫裂額前水疱二

痒搨咬牙二 六七日寒戰咬牙二

回陽反本湯二 參 芪 麟 芎 飯 桂 附 甘 查 朮

妊婦墮胎二 六日後五氣肚腹雷鳴二

七八九日灰白錫色三九

十全大補湯

七八九日灌漿主方三 第八日為灌漿中日同上

頓蛇之傳九 前詳之 七八九日內空虛同上

痘中崩漏主方九 痘中經水暴痛同上 血虛痘主方同上

七八日大孔灑血九 表虛潰爛痘同上

渾身潰爛九

千金內托散九 參苓當芍芎桂甘查木防芷朴姜龍眼

參考內托散方九 參苓芍芎飯朴防桔芷桂香十味 加糯米

托裏輕症三 調元化毒 清熱解毒

托裏解毒四 內托散 參麥清補湯 不合格

七日漿色不快五 內托散加丁子熟附子

大便初頭鞭後緩五 參麥內托散

膿期血熱七 同方加味

板實痘之秘事七

班爛痘八 參麥內托 十全大補

脾虛漿清八 千金內托加丁子附子鹿茸

靨痘主方八 參麥內托加附子

忌參茸症九

加減托裏湯九 參耆甘桂當芍芷密陳預 拾味

加減桃膿湯九 當芍芍參甘陳芷查通桔

獨參湯四 宦棟人參去芦 生薑五片 大棗五枚 水二鐘煎八分

參附湯同上

參麥清補湯

利後餘炎全不退四

清補峻補區別四

不合格四

表實裏虛四

溫中益氣湯同上

見點頭溫足冷四

加減益氣湯四

見点身熱微々同上

微熱悠悠四

氣弱不能出四

補中益氣湯四

九日十日補脾滲濕四

膿漿之辨四上

九日渴症四上九日煩渴同上

十日後神氣困倦五上九日十日精神困倦同上

九日期口渴五上九日十日後新生白胎同上

九日十日之後微渴五上九日十日之後似瘡同上

四君子湯同上

十一二日津液枯竭五上

溫表調中湯同上

當壓不壓虛寒也 八九十日當結不結瘡痒同上

八九日後表虛惡寒五上

八物湯五上

女子出痘經水四上

妊婦墮胎五上

參苓白朮散同上

癍痕白色同上

當飯桂枝湯五上

保元神聖湯同上

回陽湯同上



九証湯

平

堅腸湯

日

神功散

平

御食庭家秘說卷之二十五

痘瘡處方全歸

○保元湯

治痘弱痘症不同發熱已出未出諸証皆治之

人參一錢 黃芪一錢 甘草五分

初發宜生 出後宜灸

石三味水鐘姜一片

四五分煎不拘時服。活如加肉桂五分名參芪飲の思

按スルニ此活如心法之參香飲ハ痘之証ガ七八分ニシテ寒ガ

三四分ナル者ニ用ル方ニト知ルベシ痘ト痘瘡トノ二証大キ

ニ區別ノ首モノニ其見分ハ段々此末ニ記セバ併セ見ベシ

此方ヲ實熱ノ者ニ誤テ用ル寸ハ其害假深ノ一ニ水不能ク

重寶ヲ明ニナ此方ヲ用ルベシ。○水伏痘

氷伏瘧 瘧瘧至五六日而身不微熱 雖未至于氷  
 伏而瘧漸然不寧 至方保元湯加肉桂 枯梗 丁香 温其理  
 而内外十証和平 唇舌紅潤 舌胎滋潤 者邪氣盡解之象  
 也。或人問曰瘧ノ氷伏ト云ハ如何ナル形ヲ云ヤ 對曰氷ハコヲ  
 リト訓字シ伏ハカクル、氷伏トハ瘧ガ虛寒ニテ氷ノ如ク  
 冷テカクルト云意ニテ氷伏ト云シ然ハ此氷伏瘧ハ熱ガ少シ  
 モナク或甚キ者ハ手足モ冷ハ口好熱湯其外種ノ虛寒ノ症ヲ備  
 テ瘧瘧ガ出テシニ少シモツタ、コヲ氷伏瘧ト云シ此虛寒ニ故  
 其至方ニハ保元湯ニ肉桂 枯梗 生地黄 ヲ加テ其虛寒ヲ温テ  
 治スルヨリニ至方ニ故ニ本書ニモ瘧漸然不長 身微熱

モ熱ナクメ瘧瘧ガ出タナリニツタ、コナレバ此方加減共ニ宜シト知  
 べし但此是ハ外ニ何ノ言カモナク惟氷伏カ、リノ時ニ用ル至方  
 ト知ルべし本ノ氷伏ト云ニ至テハ附子ヲ用ヒガレハ却テ是ハ其前  
 カタニ氷伏ニテラヲ標ニ防ク処ノ至方ト知ルべし又曰復寒キ年ニ  
 ハ豆ハ元ヨリ其外ノ五穀モ寒シカシケシホミテソダツトナシ今  
 瘧瘧ノ熱ナクメソダ、ガルモ此理ニヒトシ是ニテ氷伏瘧ト云シ保元  
 湯ノ此加味ハ此氷伏瘧ノ前ナル証ヲ治スル案ニト知ルべし是ヲ  
 スギテハ附子ニテヤケレバナラタシ。○總テ瘧瘧ハ五六日ニ至  
 テハ漸ヤコヲ舉ル日數ハ其ヤコヲアゲルニハ熱ノハリヤイニテヤ  
 マヲ舉ルニ假令ハ復豆ノ三層ツガ如ク天ノ陽氣ヲカリテ三層ツ

ナリ疱瘡七其通リ熱ガナレバヤハアゲガルニ故ニ五日ノ  
期ニ至テハ必ス少シク熱アルヲヨシトスルニ熱ナキ寸ハ必ス後水  
伏ノ患有テ内攻スルニ此所心得也

痘放苗時唇舌淡紅 唇舌淡紅滋潤或青白灰紫面  
色青靛白痘瘡已出形如平日正色者不失治則生如帶艷  
色者後多皮薄易破瘡不可收但見嬌嫩者防七八日瘡  
塌之變急用保元湯加川芎桔梗治之或人參芪飯湯可參  
考 ○愚按スル疱瘡見点三日ノ内唇ト舌トノ色ヲヨク見ル  
べし其色淡紅トテ平日ノ唇舌ノ色ヨリ引クラベテ見ルニ餘症  
ウヌミラケテ見ルヲ淡紅ト云又唇舌常ノ如ク潤ヒテ少シ乾

氣ナク見ユル是ヲ潤滋ト云又唇舌ノ色其淡紅潤滋ノ如ク  
コニテ血ノ色青ニラケ或灰紫トテドクムラサキニ見ユル  
是ヲ清白灰紫ト云也但是ハ唇ト舌トノ色ニ而其ヨリ顔色  
ヲ能ク付テ見ルべし顔色モ青クトニラケテ見ユル是ヲ面  
色清紅白ト云ニ而其ヨリ疱瘡ノ色ト形トヲ氣ヲ付テ見ルニ  
見点三日之内段々出ツベキ疱瘡ガ丈程イソイデ出モセズ  
而疱瘡ノ色ハト云ニヤハリ平日ノ身色ノ通りニテ血ノ氣甚薄  
ク赤ク少キヲ平日正氣ノ如シトハ云色如様ノ疱瘡ハ皆是  
元氣ノ不足ヨリ起ル証ニ然レ惟唇ト云身ニテ虚寒ト云ニハ  
二日間ノ有疱瘡ニ此時トク早ク医看ガ見付テ療治シテマ

フス時ハ必救アル者多シト是ヲ不~~実~~治則生クト云々如様艶  
 色トテトリシヨリナク色ノ薄赤ク瘡症ヲ見ス者ハ後癩瘡カ  
 ソダチテモ甚皮薄クシテ敗レ安ク又痒リテ大難瘡ノ症ト云々  
 左様ノ証ヲ防クタメニ爰テ保元湯ニ川芎枯梗ニ味ヲ加テ  
 治スル者力或入參酌者陽ヲ用テ其變ヲ防ク者カスレ免  
 角前ビの三七八日ノ后變ヲ見点三日ノ内ニ防クヨリニ心ガケベシ  
 トノ指圖シ故ニ惟保元湯氣ヲ補ヒ川芎枯梗ニテマコヲアケサ  
 スル心得ニテ是ヲ治スベシトノ加味ノ方ニ此治方未伏瘡ヲ治ス  
 保元湯ノ用ヒヨリハ又一等年輕キアミライシ是ハ何故ヤト  
 事ヲ前ビのニハカル故ニ又日白嬌紅ト與血熱其色相類嬌嫩

屬氣虛宜補益血熱屬實熱宜清解善治者究其源  
 宣施治ト云ヘリ白嬌紅トハ癩瘡ノ根ノククノ血ガ癩瘡類  
 ハ舉リ共ニ薄赤クナルヲ白嬌紅ト云々而血熱ノ深キ實証  
 又癩瘡ノ類ヲ追通シテ赤クナル是乃虛ト實ト一應ニ見ル  
 共ニ赤クシテマギレ安シ此所見誤ルモノヤレバ能ク愈實ヨク  
 ケテ療治ノ取マキガワヲヨリ心得トシ

○人參酌菴陽之方

人參 五分 黃耆 五分 甘草 一分 當歸 一分 川芎 一分 官桂 三分 山查 一分 紅花 一分  
 白朮 一分 糯米水 浸 右加生姜一片水煎溫服○此方ハ保赤全  
 書ニ出タル方ニ本書ニ曰瘡頂不起血不紅活或難成漿

水而皮軟色白乃氣血不足之証。保元湯ト人參飯芪湯  
トノ便ニ區別ハ保元湯ハ氣虛ヲ重ニ治メ血虛ヲ次トス人參飯芪  
湯ハ氣虚ヲ治メ兼テ血ヲ養ヒ是ニ方ノ區別ナル者シ猶又藥品  
ヲ考テ見ル寸ハ其用ル所ノ至治自然ニ明ナル也

唇舌淡白 紅或淡白而皮薄或窠粒不實或帶嬌艷肌膚  
柔嫩汗出不止者此為表虛不固未出前已先用保元湯加桔  
梗川芎四日後人參飯芪湯重服之

唇舌淡白裏虛 ユノ條下見一ス

此ニ云唇舌ノ淡白ハ淡紅ト云ヨリ余症ニラケノ強キ色ヲ云淡  
紅ハ前ニモ云通りウスジラケタル色ヲ云滋潤ハ唇舌ノ

日ノ通り潤ノ又ケガルヲ云精神コニクワイハツカレタルテ  
起臥コシケシモツカレタルヨラスヲ云大便易泄脾胃ハ虚ニ微  
熱慙ハモチツト熱ガ有ハヨイニテ思ニ熱至テヌクナキヲ微熱  
悠ト云是木伏瘧ノ熱ナキト思ヒ合スベキ所ニ口渴不飲熱  
ガヌクナキヨリ惟口渴計ニテ水ヲ飲マサルニ眼眶虚浮トハマ  
フタカウソバレルニ面色清白ハ熱ガ有ハ面色ガ赤ク寒ガ有  
ハ青クカ白クカナル是常シ今面色ガ清白ニナルハ裏虚ナルヲ  
ト知ルベシ是カラ後ガ胞瘧ノ形ヲ見テ裏虚ナルヲ知ル口訣  
ニ瘧出テ、淡白モ窠粒明ナラサルモ皆裏虚ナル故ニ胞瘧  
ノ色モ淡トアワク白トミラケテ見ルニ而胞瘧ノツラモマハ

り同シ様ニテ育タテ改ニニツカリト區別レタヨウニ明ナラザ  
 ルニ是皆裏虚ノ証ニ急ニ保元湯ニ白朮茯苓ヲ加テ是ヲ治  
 スルカ或加減益氣湯ヲ用ルカ此二方ノ中ヲ撰ビ用ヒヨトシ  
 本文ノ凶急ノ字ニ眼ヲ付テ見ルニ是モ此方ニ案モ用ズ捨テ  
 コク寸ハ後必痒ヲ發シ大難瘡トナル故是モ前ビ口ニ後難ヲ防  
 手的ノ療治シト知ベシ放苗三日ノ内見合此所ニ有シ

唇舌淡白表虚

唇舌淡白或淡紅或青白或灰紫或

潔渣或唇微渴方微熱而自汗睡中微悸飲食少進小  
 便清利恐風寒放苗淡紅或淡白而皮薄或粟粒不實或  
 帶嬌艷肌層柔嫩汗出不止者此爲表虚不同未前已云之

後先用保元湯加桔梗川芎四日後人參飯菖湯重服之

○前ノ條ハ放苗三日ノ内ノ裏虚ヲ治スルノ主方ヲ言ヒ此條ハ  
 表虚ノ主方ヲ示ス淡白淡紅清白等ハヤハリ唇舌ノ色ヲ  
 云フ灰紫モ亦唇舌ノ色ヲ云ニ唇舌ガ灰色ニトク口ク見ユル  
 ヲ灰紫ト云ニ潔渣トハ舌ノ上唇ノ邊ニ白キホクトニタケ  
 カスヲ云唇少シ渴スルトハ唇ノ少シ乾クヲ云裏熱有テ自汗  
 ストハ熱ガサミラクルト少シ汗有ヲ云睡悸トハ睡テ居ル内ビク  
 くと驚ク氣味有ヲ云小便清利トハ小便ノヌミタケヲ云風寒  
 ヲ恐ルトハサムガルヲ云是迄ハ病証ニ是カラハ胞瘻ノ形ニツ  
 イテ様スヲ云放苗トハ見血ト同ク胞瘻ガ出ルウチニ一日ノ

内ヲ云淡紅淡白ヤハリ唇舌ノ淡白淡紅ニツレテ疱瘡ノマタ  
 淡白ニ見スルヲ云窓程不實トハツブ其ツブヲナテ見ル  
 ニヤワラカナルヲ云嬌艶モ同ク疱瘡ノツヤダチテフヨクト  
 ヤワラカナルヲ云肌層柔嫩ハ毛ノ冗シクヲヨリ汗出ルヲ云  
 是皆春唇ノ証先保元湯ニ桔梗川芎ヲ加テ其春ヲ實  
 スル時ハ右ノ患ナク疱瘡ガ頃ヨクナル也但此在方ハ見点  
 三日ノ内ニ右ノ諸証見ル時ハ此在方ニテヨシ四日ノ内ニ至リテ  
 ハ保元湯ニテハ藥力不足ナレバ人參散葛湯ヲニキリニ用テ其  
 表ヲカタメヨトシ

○托裏行漿治方

唇舌紅潤或滋潤者至六七日間無

他症用法如常以托裏行漿為主如唇舌潔淨者以証雖  
 爲煩症先用保元湯加桂丁香藟散糯米治之如將水色不  
 滿者前方加鹿茸山查子爲妙 ○唇舌カ紅潤ト滋潤ナル  
 ト潔淨ナルト此三ノ唇舌ニ於テ見様甚ワチアリ先紅潤ハ常  
 ノ唇舌ノ色ヨリ見レバサシ赤ニテモ干テ潤ノアルヲ紅潤ト云  
 又滋潤トハ是モ唇舌カ黄色ニシテ潤カ沢山有リ滋潤ト云左ス  
 レハ紅潤モ滋潤モヤガテ似ヨリタル者ニテ同色ト言ハシモ苦方  
 ラズ同ク大吉ノ唇舌ト此唇舌カ六日七日八日ノ間ニ當リテ此  
 唇舌ヲ見シ外ニ先言分ナキ症ナレバ此時勢ヲ托裏之劑  
 行漿ノ劑ヲ調合スルガ疱瘡治方ト托裏トハ裏ヨリ毒氣ヲ

気ヲ送り出ヌ補益ノ劑ヲ云行漿トハ漿ヲ行スト訓テ漿ハ本ノ  
 膿ニナリカハル時ガ漿膿ニ俗ニ云ミツモリノ一ニ乃チ藥品取  
 リテハ黄芩自芷ノ類是レ是等ヲ托裏行漿ノ劑トハ云ハレ托裏  
 行漿ハ六日七日八日ノ間薬ヲ用テ托裏行漿ヌレバ内ニ毒氣カノ  
 コリナク外ニ出テ結痂收靨モ滞リナク速ニ痊ノ如ク効ヲ得ル  
 故ニ本文モ無他症用テ如常以托裏行漿ヲ為主トハ云タル者  
 也而唇舌ノ潔淨ナルハ紅潤滋潤ノ二色ヨリ大キニワケノ有  
 也紅潤ト滋潤トハ先ト口ニ云ハ言ニ方ノナキ唇舌也潔淨至  
 テハ大キニ唇ヲ含ミタル唇舌ト心得べし其謂ハ潔ハキヨニ  
 訓淨モ清淨ノ淨ニテキヨニト訓字ニ此色ハ紅潤滋潤ト云

リ黄色ノサテテ少シ薄キ氣味合ノ有ト云位ノ唇舌之色ニ救  
 一應ニ見テハトレカ紅潤ヤラ滋潤ヤラ潔淨ヤラ知レヌ唇舌  
 シヨク氣ヲ付テ見ルト是ガ潔淨ニヤトワカレシ紅潤滋潤ハ  
 氣血内ニ充滿ニテ虧ナキ色ニ潔淨ハ少唇ヲ含ミタル色ナリ  
 假令バ月ノ光ヲ以テ假令フルニ紅潤滋潤ハ八月十五夜ノ明月  
 ノ光リノ如シ又潔淨ノ唇舌ハ九月十三夜ノ明月ノ光ノ如シ何レ  
 月ノ形ニ圓クニテカワリハナケレバ光ニ於テハ少シ増減ノナキト  
 云ニテハナリニ潔淨ノ唇舌ハ九月十三夜ノ月ノ色ニ此以テ紅潤滋  
 潤ハ氣血ノ多ツフリト盈テ虧ナキ唇舌トヌルニ潔淨ハ少シ不  
 足ノ氣味合有古トヌルニ其故ニ初潔淨ノ唇舌ヲ見ヌ疱瘡



ハ稍モスレバ終リニ至テ愈証ヲ見<sup>レ</sup>或泄瀉ニ易ク内攻ニ易ク  
其外種ノ愈証ヲ見<sup>レ</sup>難瘡ノ症ヲ含ム油断ノナラマ唇舌トスル  
是等ノ心得ヲ以テ紅潤滋潤潔淨此三ノ唇舌ノ見別ヲ心  
得<sup>ベ</sup>故ニ本書ニモ如唇舌潔淨者外症雖為項症先用保元  
湯加桂<sup>イ</sup>子<sup>雷</sup>飯<sup>糲</sup>米<sup>治</sup>之トハ云タルモノ<sup>ニ</sup>是唇舌ノ潔淨ヲ  
テ早キノ愈証ヲフセガシク用ルル保元湯加味セト知ル<sup>ベ</sup>  
シ如此前<sup>ニ</sup>日<sup>ニ</sup>年ヲマワセハ世末ノ變滯リナク知<sup>ラ</sup>得ル<sup>ニ</sup>而六  
日七日八日ノ間<sup>ニ</sup>中<sup>リ</sup>テ漿色不足ト見ル<sup>レ</sup>バ早<sup>ク</sup>保元湯ニ  
鹿茸山查子ヲ加<sup>テ</sup>其不足ノ漿膿ヲ托裏スル時ハ乃チ瘡  
毒表<sup>ニ</sup>浮<sup>キ</sup>テ膿漿タツフリト盈テ全知<sup>ラ</sup>得ル<sup>ニ</sup>是潔淨  
唇舌ノ症ニ見<sup>レ</sup>タル者<sup>ニ</sup>惟潔淨<sup>ニ</sup>瘡<sup>ニ</sup>見<sup>レ</sup>ガル<sup>ニ</sup>此<sup>ノ</sup>瘡<sup>ノ</sup>  
ヲヨク<sup>ク</sup>切<sup>者</sup>ニ見<sup>ラ</sup>トル<sup>レ</sup>ヲ<sup>ハ</sup>行<sup>ス</sup>ベ<sup>キ</sup>ト<sup>シ</sup>總<sup>テ</sup>瘡<sup>瘡</sup>ハ外<sup>ニ</sup>  
一方<sup>ニ</sup>愈<sup>証</sup>見<sup>レ</sup>バ内<sup>ニ</sup>ハ一寸ノ瘡方有<sup>ト</sup>知<sup>ル</sup>ト教<sup>ル</sup>モ是等ノ  
諸方唇舌ノ見ヨリヲ以テ合点ス<sup>ベ</sup>シ

○倒靨腐爛

唇瘡乾澁舌淡白或唇瘡破裂舌胎滑潤  
如腐熟三圍紅潤者凡<sup>日</sup>日後不能結痂或腐爛皮脫<sup>去</sup>者  
此倒靨也係中氣不足急用保元湯加雷<sup>飯</sup>米<sup>子</sup>連<sup>翹</sup>肉  
桂<sup>木</sup>香<sup>治</sup>之如<sup>愈</sup>寒<sup>甚</sup>者建中湯主<sup>之</sup>其<sup>頭</sup>面<sup>腫</sup>退<sup>瘡</sup>色  
破<sup>眼</sup>劇<sup>鼻</sup>發<sup>者</sup>又<sup>再</sup>加<sup>腫</sup>灌<sup>眼</sup>封<sup>鼻</sup>塞<sup>額</sup>額<sup>無</sup>瘡<sup>處</sup>又<sup>小</sup>  
神空症瘡出者謂<sup>之</sup>神空唇舌紅潤者至<sup>矣</sup>不<sup>則</sup>死

唇瘡乾洗トハ唇ニ出来ル疱瘡ガニルケヤクカラクトナリテ  
 乾クヲ云舌淡白トハ舌ガニラケテ見ユルヲ云唇瘡不腫唇  
 ニ出来ル瘡ガヤブレサケルヲ云舌胎滑潤如腐熟トハ舌ニ胎  
 ガシロクカ、リテ其ガヲラツキ潤し假令ハ豆腐トドラスリ  
 ツブシテ舌ニヌリタル様ニ見ユルヲ云三圍紅潤トハ三圍ハ舌ノ  
 クルリノヘリ通りヲ云紅潤ハ赤ク潤フノ舌ノ満中ハ滑潤腐熟  
 ニテグルリハ赤ク潤フ是ヲ三圍紅潤ト云加橋ナル疱瘡  
 ハ此日イ日ノ后ニ首尾ヨク痂ヲ結ブリハオラズ周身ノ疱瘡  
 クチタレ疱瘡ノ皮ガムケルモノニ是ヲ倒靨瘡ト云是皆脾  
 胃ノ不足ヨリ起ル疱瘡ニ是ニハ名ニ保元湯ニ當版牛蒡

連翹肉桂木香ノ五味ヲ加テ用ヒヨトシ〇右云処ノ症ハ難  
 胃ガ虚スルト云方ニテ瘳ハナキニ如ニ此諸症ノ上ニ更ニ瘳ガ  
 備テ虚寒甚キモノハ建中湯ヲ用ヨトシ瘳ト虚寒トノ見  
 分ケハ前ニ已ニ辨アレバ此ニ略ス而此症ハ顔面ノ腫モ退キ疱瘡  
 モ破レガチニシ目モ開キ鼻モ開ク者今建中湯ヲ用テ又再  
 ビモトノ如ク顔面モ腫脹モチカシ目モ塞リ鼻モ塞リ額額ニ  
 元疱瘡ノナキ処ニモ又新ニ小ク疱瘡出ルモノハ是ヲ補空瘡  
 ト云此時ヨクク唇舌ヲ見ベシ唇舌ヲ見ルニ其色紅潤ニシ  
 赤キ者ハタスカル如ニ諸症ヲシト云ハ唇舌ガヤ分前ノ  
 通りナラズ淡白腐熟ノ見ユル者ハ是必死ノ症ト知シ

トシ是唇舌ノ見操中ニモ肝心ノ場

○大保元陽 此方ハ灌漿三日ノ内ニ用ル方シ 治頂陷根窠

雖紅而皮軟且薄血有餘而氣不足者○傳曰至五七日期

元氣不足者飲食減少易泄出瘡平陷失綻鬆之勢者用

此湯脾胃強徒則元氣自然充實易成膿切

人參多五分 黃耆二分 甘草一分 川芎一分 肉桂五分 白朮二分

右加姜棗水煎温服如氣不行在桂加木香若人乳半鐘○傳

曰六日後瘡為不伏漿色遲滯或腸鳴轉失氣者内急也急

本方加丁子附子鹿茸糯米一百粒其妙如神可秘○又曰

出瘡淡白根暈不收緊四日後失起勢者原脾胃氣虛弱必

易泄瘡難長先與本方六日後加丁子附子鹿茸糯米

之○唇舌有口訣○愚按スルニ此方立方ノ本旨ハ血有餘ニテ

氣不足スル者ニ用ルト云カ此方ノ本旨シ或人曰血有餘ト

云ハ何ヲ以テ血有餘ノ症トスルヤ答テ曰血有餘ノ症ト云ハ根血

ガ紅活ノ其紅活ノ勢ガ庖瘡ノ頂迄モ升リテ薄赤ク或紅活

ルモノ是血有餘シ或人又問テ曰氣不足ノ症ハ何ヲ以テ是ヲ知ラニヤ

答テ曰氣不足ノ者ハ飲食ヲカヲカムガ如ク味ナクメ減少シ腹下リ

易ク四肢倦怠シ而庖瘡ヲ見ルニ庖瘡ノ頂ガクボク陷リテ庖瘡

ニシテリナク皮ヤワラカシ薄クフヨクスルガ皆氣ノ不足ノ症シ是ヲ

以テ血有餘ニテ氣不足スルト云症ヲ知ルベキシ此症キワタテ灌

漿三日の内ニ多ク有症ニ是火保元陽真向ノ症ト知ルベシ  
血有餘氣不足辨 痲瘡ノウニテ氣血ヲ別ルニ痲瘡ノ

頂ハ氣ニ屬シ痲瘡ノ根ハ血ニ屬ス是天地陰陽合体ノ割府ニ

故ニ天地ニ有テハ天ハ高キニ有テ血ハヒキニ位ニ痲瘡ノ頂ハ高

クメ天ニ屬シ氣ニ屬ス血ハヒキニ位ニ故ニ痲瘡ノ根ハ地ニカタト

テヒキニ有テ地ニ屬ス是天地陰陽消長ノ理ヲ痲瘡ノ上ニ

備タル者ニ故ニ瘡兒元氣充實スル時ハ痲瘡モ又能マコソ

率ケテカカク實シ血ハ瘡根ニツイテ赤キ又糸ヲ見ルガ如ク瘡

根ヲマトイカクメテ陰陽氣血ノ方ヲミタカスメ痲瘡ノ効ヲ成

就スルモノニ此陰陽消長ノ理ヲ人ノ夫婦ノトニワツクニ

ハ夫トハ陽ニ婦ハ陰ニ陰ハ下ニ屬メ婦トハ夫トハ上ニ有テ婦

ハ是陰陽ノ常數ニ然ニ其天ニ屬シ氣ニ屬スル所ノ夫トニ何テ

言方有テ不足スル時ハ其婦タルベキモノ倣ニワガマニテ働キ身

持放持トナリテヤ、モスレバ其夫トノ製ヲ受ズノ獨リクルハ

今痲瘡氣不足スル時ハ其血ヲ製封スル力ヲナキ故自然ト血

ガ不足ノ氣ヲアナドクテ氣方ニ屬スル痲瘡ノ頂近カ赤クニテ

氣ノ方ヲ犯スモノニ是ニ因テ見ル時ハ血有餘ト云ハ氣ノ有餘ニ

ハ派ズ氣ノ不足スルヨリ血ノ有餘スルニ是ヲ治スル方惟其不

足スル処ノ氣ヲ補益ニテ斂ヲツクレバ自然ト血ヲ制封ノ

ワカマニテ働ラカセザルニ然レバ血ノ有餘ト云ハ氣ノ不足ニ

り起レ心症之故ニ此方方中ニ參茸甘桂木等ノ気薬在テ血  
 薬ト云フハ惟川芎一品耳此ヲ以テ立方ノ本旨ヲ知テ此方ヲ用  
 ル時ハ其要方アラダト云(代遠)カラズ故ニ血有餘ニ目ヲ付ス  
 惟気ノ不足ニ目ヲ付テ薬ヲ用ヒヨト云教專ラ此血有餘而気  
 不足ナル者ト云ハ字此方立方ノ本旨ト云一此ニ於テ其有増ヲ  
 合点スベキモノ也又醫書ニ嬌紅ト云一アリ嬌紅ト云ハ乃今此  
 ニ云処ノ気不足ニテ血有餘ノ痘色ニ嬌紅ハ痘ノ全体ヲヨクト  
 ヤワラカニノ疱瘡ガ頂迄ウツスリト赤クナルヲ嬌紅ト云ニ及  
 是ガ血有餘ニテ気ノ不足スル所ヨリ起レル色ニ乃大保元  
 湯ノ場ニ此嬌紅ト十神解毒湯トノ紅紫焦紫ナド

ニ違一ノ十神解毒湯ハ邪實ヨリ起リテ疱瘡ガ赤ト云  
 故ニ焦紫黒紫ニ要スルニ嬌紅ハ右ニモ云如ク気ガ不足スルヨリ  
 血ガワガマノヲ働ヒテ假リニ有餘ノ体ニ見セタル赤ニ故ニ嬌  
 紅ト云ヲ以テ其赤ニテ形容スルニ十神解毒湯ノ赤色ト同  
 日ノ跋ニハ此ハ此所心得テ治ヲ誤ル不可若シ誤テ治ヲ施ス時  
 ハ又ナクノ人ヲ冥暗ノ中ニ殺ス耳

○腸鳴轉失気之年 轉失気トハ俗ニ云ヲナラノ一ト腸鳴ト

ハ腹ガグリトスル一ト腹ガグリトトニテヲナラヌルヲ  
 是腸鳴轉失気ト云ニ此症極テ脾胃ノ元気不足スルヨリ起  
 ル症ニ是乃内気ノ不足ニ此症極テ之日ノ後ニ多キ症ニ其

シサイハ五六日ノ後ハ痘毒表ニ浮テ内空名スル日數下レガ  
極メテ此症多キ者ハ漿色遲滯トハ凡テ胞癢噴痘ノ方ハ五  
六日ニ至テハ漿膿モ沢山ニヤマヲ擧ケル時方ナルニ多キニヒカ  
一テママヲ擧ケサルヲ漿色遲滯ト云ハ腸鳴轉矢氣ハ内空  
ヲ知ル目的ハ漿色遲滯ハ外空ヲ知ル目的ハ内外其目的  
ヲ得テ此方ヲ施メ時ハ誠ニ百發百中ニ妙訣ト知ルべシ  
秘中ニ秘ナル者ハ

○根暈不腫嫩之年 根暈ハ乃根血也 不腫嫩トハ根血ガマ  
トワヌメ散乱スルヲ云乃嬌紅ノ前兆ハ

○四日後痘瘡治方 唇舌淡紅或唇淡潤舌淡白蕞散

一二日吐瀉清冷神氣困倦寢食不安出痘淡白或紫粒  
不明起勢遲緩根脚不令痘証無疑未見點前用保元湯  
加輕劑蕞散加紫蕞防風白芷見點之後用保元湯加輕  
劑加川芎桔梗四日後用大保元湯或參苓白朮散加桔梗  
白芷治之 唇淡潤トハ淡ハアワイト訓字潤ハワルホウハ唇  
色ヲ見ルニ常ノ唇ノ色ヨリハサシミラケテ潤有ラ淡潤ト云ハ唇  
舌淡紅保元湯ノ條下ニ解アリ舌淡白トハ舌ノ色是モ常ノ舌  
ノ赤ニヨリクラブレバ餘程赤ニミラケタル舌ヲ淡白ト云ハ  
○四日前ニハ保元湯ヲ用四日後ニハ大保元湯ヲ用ル此方  
ツモリ合セ養一ノ心得ハ四日後ニハソコノ貫膿ノ手アテナ

レハ是冰ヲ下子ハ故ニ四日ノ後ニハ大保元ヲ至方トスルハ此段ニ  
得ベシ。○家法煎法大保元湯ヲ調合ニ其調合ニタル方ヲ好  
酒ヲ以テヒタクニ浸ス。一斗時計ニシテ乾ニ炒濃煎ノ是ニ與  
水一鐘半一鐘ニ煎ス。頻ニ温服ニ是。大保元湯煎法ノ傳  
○貫漿三日ノ内用ル方

○建中湯

治裏寒虛耗寒戰咬牙者。○傳曰出齊後ハ  
日以前寒戰咬牙者木香散異功散宜參考至八日午後  
而寒戰咬牙漉泄指不止者建中湯至之

人參二支 黃耆蜜炒 乾姜炮碎 木香五分 川芎五分 附子製 肉桂  
炙甘草各一分 丁香五分 生姜一片 同煎服一服立止

陽症 咬牙

陰症 咬牙

傳曰寒戰咬牙之二証有寒有熱概不可論六日以前鼻  
炎形狀甚而戰動咬牙如痘色赤紫乾紅者屬熱必大  
小便秘煩渴引飲者是陽症也如六日以後大便漉泄小  
便清利寒戰咬牙痘色淡白皮薄頂陷根暈不紅結者  
屬寒必煩渴好熱陽時腸鳴下氣者是陰症也建中湯至  
之唇舌有紋。○傳曰文中出齊之後八日以前ノ七字木香  
散異功散ヲ用ル所心ノ目的ハ八日午後ノ四字建中湯ヲ用  
ル所心ノ目的ハ此三方ノ目的ハ惟日數ヲ以テ目的トスル故曰  
數ヲ誤ル時ハ其藥効ナキ耳ニ冰ニ返テ害ヲトルハ慎ム  
午後トハ八日ノ晝過ニ至テ寒戰咬牙ヌクノ至方トナリ

出奔ノ後トハ出ソロシノ後八日ノ午前迄ノ寒戰咬牙ハ木香散  
 異攻散ニ方ノ内ヲ撰用セヨトシ。○痲瘡ノ出ソロシ見ル  
 法足ノ裏ヲ見セシ足ノ土ヲマスト云処ニ痲瘡ガ一二粒モ見ユラ  
 バ是痲毒ノ出ソロシタルシ是ヲ出奔ト云。○寒戰咬牙寒  
 熱ノ區別有リ此ニ云通り少シモ相違ナキ。其診察巖然  
 トノ明ナレバ指南ニ及ハズ見ユル症ニヨク猶又診察肝要  
 好熱湯時ニ腸鳴下気ストハ是熱湯ヲ好シ腹ガグワラクト鳴  
 テ時々ヨナラノ出ル者ハ是必内虚寒ノカクキ目的ニ猶腸鳴  
 下気ノ一ハ大保元湯ノ條ニモ有ナレバ併セ見テ其主カラ  
 處ヌヘシ

○十日虚寒之症治。九日十日期膿漿足而黄紅者必發熱  
 薰蒸此回水之候也蓋真陽運化其水自然消燥而收壓  
 也其元氣不足者則不能及時回水而當壓不壓者此虚  
 寒之証也必身凉而手足冷唇舌淡白或雖紅虚冷者須大  
 補気血而助之收結宜温表調中湯如前証加寒戰咬牙  
 者宜建中湯主之

○虚寒二症之解。惟寒ナクハ虚ナル計ノ痲瘡ハ人參黄耆白  
 芷ノ類ニテヌム。其トニ寒ガソハ是冰系ニモ寒ノ午アテガナケ  
 レバナラズ是薬品トナリテハイ香附子肉桂ノ三味是是虚ト  
 虚寒トノ薬品辨等ノ定法ナルモノ。猶虚ト虚寒トノ區別



二見ヘタリ

○雖紅唇冷者之解 雖紅トハ唇舌ガ淡白テナク朝夕通リ

赤ク見ユルヒ夫ハアテニナラヌ程ニ唇ト舌トヲ午ヲ以テナテ、見ヨ

若シ唇ト舌トガヒマツク氣味有ハ是ハ淡白ト同ク唇寒ノ症ナレバ

○溫表調中湯ヲ用ヒ若シ調中湯ノ症ノ上ニ寒ニ戰咬牙ノニツガシ

ハ建中湯宜シト

○發熱薑蕪之解 凡テ痲疹凡日十日ノ頃ニ至テハ熱氣ガ有

カナキカヲ能ク心ヲ付テ候ニ見ルベシ此時熱ガナケレバ甚大

難痘ト知ルベシ其シヤハ此熱ハ乃チ真陽ノ溫和ニシテ邪熱ト

ハ大キニ違ヒ假令バ甚日ノ熱氣ニテ物ノツダツ如ク痲疹モ此

真陽ノ熱氣ニ因テオ方ニ膿漿タリテ知ヲ得ルニ夫ヲ知ラズ此

熱氣ヲ鍼ノ邪熱ト思ヒ涼藥ヲ用ル時ハ真陽忽チ亡ビテ唇寒

ノ難痘トシ温表調中湯ノ症ト変シ或建中湯ノ症ト変スル

能ク心得テ慎ミキリ此薑蕪ノ熱ヲ誤不可凡日十日ノ間ノ大

事ノ心得

○八日午後唇証 唇舌淡白或唇冷或舌胎滑潤者瘡色淡白

或灰白或皮薄水疱清淡膿色唇皸或頂陷不起嫩而易破渴

瀉不禁喘氣時起六七日後為搔痒者氣虛也内唇也如寒戰咬

牙者唇寒也急用參耆庚茸湯或回陽返本湯之類如唇赤不

紅膿色不實者兼與參附湯若至八日之午後唇寒猶不除

陽氣不宜者宜蘇氏建中湯主之。已上有証候用此方陽氣猶脫者他無治法。○愚按スル建中湯ハ八日ノ午後ニ前証有者ニ建中湯ヲ用エ前ノ處方ハ八日ノ前右ノ諸症アル者ニ右ノ處方ヲ用エ是其建中湯ト諸方トノ區別ナル者也

○舌胎滑潤トハ舌ニ白胎ヲ生シ其上又ラツキ有リ滑潤ト云ニ其舌ヲキテテ、見ルニ潤テ又ラツキ有リ滑潤也

○九日十日瘧症

唇舌淡白或唇冷或唇瘡帶水色如麩

舌胎滑潤者九日十日期當醫不醫勃然變動灰白塌潤澀泄頻頻腹脹喘急或寒戰咬牙頸溫足冷時身熱煩渴者裏寒而瘧也急宜建中湯主之如瘧寒益甚則兼與獨參湯

或參附湯陽氣脫者不治。○愚按スル九日十日ナレバ建中湯ヲ用ル若日數八日前ナレバヤハリ前條ノ治方ニヨリ

○倒靨潰爛

唇舌淡紅或淡白或本有白胎至靨期舌

滑潤者邪火自解有復瘧寒者或過服清涼之劑謬變瘧寒者爲重或因澀泄氣虛或素脾胃弱津液少肌肉虛脫而不能回水至十日後潰爛不收結者屬倒靨先用建中湯治之此瘧不乾收者敗草散蒼朮粉撲之如或因渴飲冷水過多以致水漬脾胃濕淫肌肉不收者內宜五苓散如或因食瘧而不收者人參白朮散去葛根加因桂主之。○愚按スル有白胎乾燥スル者ハ邪火實熱ノ症ニ白胎有テ潤有者ハ邪火

自然ニ解スルノ目的トナスニ同ニ白胎ニシテ此ニツ見様有白胎  
有バトテアサカチニ執トナスヘカラズ惟此口訣ヲ以テ其証ヲ訣  
可シ今世ニ云症ハ白胎ノトニ潤有故邪火自然ト退キ其退ヒタ  
ルカミラニテ急ニ虚寒スル一有トノ意シ

○倒靨腐爛神空痘 唇瘡乾澁舌淡白或唇瘡破裂舌

胎滑潤如腐熟三圍紅潤者九十日後不能結痂成腐爛和皮  
脫者此倒靨也係中氣不足急用保元湯加當歸牛蒡子  
連翹肉桂木香治之如虚寒甚者建中湯主之其頭面腫退  
瘡色破眼爛鼻發者又再加腫灌眼封鼻塞額額無瘡處  
又小瘡出者謂之神空唇舌紅潤者生矣不則死○補空丸

本胞瘡ノナキ処ニ新ニ粟ノ如ク生スル故補空痘ト云ニ是毒氣  
中ヨリ托送スルガ故ニ補劑ノ力ヲ

○膿血下利 唇舌滋潤或潔淨或紅潤者九十日後忽然泄瀉者

膿血痂皮之物此脾強腎弱為項候痢自愈不可強治此倒靨  
症利下膿血痂皮隨利而心氣爽者吉如唇舌淡白唇冷者泄  
利木穀不化或滑泄不止者此脾弱腎強急用建中湯或豆蔻  
丸兼與利止則吉不止則凶○木香散異功散ヲ用ル症ニアフ

建中湯ト回陽湯ト論ヲツキ合テ其上ニテ方ヲ付ベシ回陽湯ノ  
條下ニ猶クワミキ論有合モ見ベシ兼テ心得ラクシ回陽湯ノ意ヲ  
知ラサレバ木香散異功散建中湯ノ調場夢テ暗キ一有基

心得ヲ以テ兼テソラヨミニスル程覺テ居ベシ假令回陽湯ヲ用定  
此回陽湯ノ意ヲトリテ方ヲトリマワシ療治ヲスルニ是肝心ノ  
心得シ〇八日午後ノ至劑也

木香散并異功散

○木香散

泄瀉等症勿用

木香 腹皮

人參 桂心

青皮 赤茯苓

訶子 半夏 雞舌

一四分

每服五匙 姜三片 水一大鐘 煎六分 服三日 後夾氣寒証候者

此湯至之若泄瀉甚者 半夏加黃芩 白朮 治之 唇舌有訣

○異功散

治痘毒者 搗碎內氣 洩瀉 腹脹 喘嗽 心亂 煩渴 寒

○戰咬牙頰溫 足冷者 急宜服之

木香 桂枝

當歸 人參

茯苓

白朮

陳皮

厚朴

雞舌

附子 半夏

右五

每服五匙 生姜三片 棗三枚 水一大鐘 煎

六分 溫服 〇傳曰 自四五日至漿期 而氣密 或名寒症候 明木

香異功亦可用 〇又曰 去厚朴 半夏 加黃耆 如四五日至七八日

下利不止者 先投木香散 兼與豆蔻丸 更他利甚者 異功散主

之 如八日午後 而澀泄 猶不止 加寒戰 戰咬牙者 建中湯主之 〇

木香散ハ 出痘三日ノ内 看利トシ 異功散ハ 出痘四五日ヨリ 六七

日ノ内ヲ 目的トシ 建中湯ハ 八日以上ノ至方トス 是等ハ 日數ヲ

以テ 目的トスルニ 其則多クハ タガフモノ也

○三四日虛寒泄瀉 唇舌淡紅身熱漸退痘出三四日頂陷

一灰白不起或起亦嫩不碍手根窠不收緊睡卧安常起居靜者氣虛也如再加瀉泄者欲虛寒之勢也急用大保元湯人參酌耆陽治之如唇舌淡灰或淡紫而氣血滯者加木香五日後瀉泄猶不止者宜堅腸湯治之如唇帶水色舌淡白或見淡白點者急宜木香散異功散。愚按スルニ此口訣ノ内欲虛寒ノ勢シテ六字味ベキ也又スベテ痲瘡ハ前方ニ變証ノ様ヲ早ク見テトルヲ肝要シ今虛寒モナキニヤカテ虛寒ノ末ヲ一ヲ前ニ知ルハ其術ニ明ナレバ此大保元湯ヲ用テ其前徴ヲ防ク時ハ木香散異功散ノ場ヲノガルニキツト虛寒ニ至ラズルハ

醫ノトガシ此所ヨクシ味フベキモノ

○下氣腸鳴脫氣之前徴 唇舌淡紅或淡白或微灰或微黑

此皆純色之象也痘出五六日期毒裏無邪實惟氣虛血弱難起發不光鬆淡白不綻紅眼不封鼻不塞而大孔時下氣或肚腹雷鳴防後表泄瀉將氣脫之勢也急宜木香散異功散六日後宜回陽反本湯如陽氣下陷者古倉冷而帶垢者兼與鴉多湯或參附湯使痘托膿。愚按スルニ是モ又虛寒ノ症候ヲ其前方ニ見テトリ早ク其前兆ヲ治スル処ノ口訣ニ其見テ取所ハ大孔既ニ下氣ノ肚腹雷鳴防後表泄瀉將氣脫之勢也三十字是其前徴也能ク味ハ知ルベシ

○ 渴泄咬牙

唇舌淡紅或灰紫而已六日根窠淡紅皮薄塌

陷不起額前灰白不陷腹脹渴飲食不寐睡臥不安者

宜陳氏木香散至之如唇舌淡白而五六日後漿清唇落

痒時作根暈塌腹鳴渴渴無度痰喘氣息額溫足冷咬

牙寒戰者急宜陳氏異功散至之如六七日期唇舌淡白或

唇冷或淡白点或微灰黑或灰紫者若腹脹渴者瀉泄

渴者鼻不對渴者足指冷渴者驚悸渴者身熱渴者寒

戰氣急渴者咬牙喘呼渴者身溫面色皖白渴者兩頰頰

赤渴者好飲轉渴者已上十一証悉皆純陰微陽之象

驗唇舌紅否以審詳內外十証宜絕治

○ 十一渴兼症

此症此條中自有故牝略入

○ 八日前渴泄

唇舌淡白或唇冷或淡白点或滿舌老垢者

六七八九日間腹脹洩渴形色平陷稍雖有服踏

不實者非毒必氣氣也急宜峻補木香異功所不忌如至

八日午後將漿脹不滿根暈不活滑洩不止煩渴不飲睡

臥不寧精神困憤飲食不飽時咬牙者先標瘡不治而宜

補表其內氣向來防內攻之變急宜聶氏建中湯若再加寒

戰咬牙者宜兼與參附湯

○ 寒戰咬牙

唇角大水光或唇瘡濺爛如破或唇舌淡白或白

胎帶黃色老滑潤者六七日後屬虛寒者瘡色唇空教或

灰白帶木光或項陷根白時癢塌咬牙神氣沉昏寢食不寧  
飲食減少大便易瀉者先用參飯鹿茸湯加肉桂丁香熱附  
治之或回陽反本湯可參考若前証未除頻寒戰咬牙利黃  
青色物為臟寒投陳氏異功散猶不止如至八日天牛膠色  
不滿者急宜建中湯可溫內氣用此湯陽氣猶脫者宜兼用  
參附湯大劑與之氣脫者他無治法也

○自利渴

唇舌淡紅或淡白舌中央微煩渴而不煩者補  
中益氣湯加五味麥門治之如唇燥裂舌尖赤色如火中央白  
胎如霜膿亮實痘根煩紅靨痂厚結牛足根暈如火能食  
便實睡中呓喃大渴者內熱盛也肺熱也經曰心移熱於肺

傳為膈消治有上焦人參白虎湯加連實治之如唇舌淡白或  
乾燥自利而渴者屬少陰風治有下焦宜溫之陳氏異功散  
聶氏建中湯治之如唇舌淡白者冷不能食而渴者脾胃氣  
也治有中焦參苓白朮散主之。木香散異功散ヲ用ル症  
ニアワ、建中湯ト回陽酒ト論ヲツキアワセテ其上ニテ方ヲ  
付べし回陽酒ノ條下ニ猶クワ、辛論アリ合セ見テ兼テ心得ヲ  
クべし回陽酒ノ意ヲ知ラザレハ木香散建中湯ノ調場ニ反  
テ暗キアリ其心得ヲ以テ兼テ記讀ニスル程ニ覺テ居シ  
ハ假令回陽酒ヲ用ス凡回陽酒ノ意ヲトリテ方ヲ取マワ  
シ療治ヲスルト是肝心ノ心得也

○參酌鹿茸湯

六日後托膿之妙劑也

鹿茸

酒塗灸，毫勿用酥灸，恐其羶也。三匙。

嫩綿黃耆

蜜炙，一匙五分。

當歸身

酒洗，一匙五分。

炙甘草

六分，人參二分。

生薑一片，好龍眼肉三個，同煎去渣入好

酒一杯，溫服。

○見有能飲酒者，濃煎茶汁與酒相半，和服亦

好。虛弱未甚者，服此茶一二劑，其痘即轉紅，結行漿，固倦，手

足冷，飲食少者，加木香五分，丁香五分，官桂五分，寒戰咬牙者，再加官

桂二匙，製附子八分，地陽去齒，飯加麴炒白朮，酒炒白芍，素自茯苓各

分，木香，丁香，各三分，別用參末散，止瀉托膿之劑，莫妙於此方，以鹿

茸補血力峻，與草木諸補藥不同。○傳曰：六、七、八、九日之主劑，

也。凡五六期而痘原稠密者，其色淡紅或淡白，根暈為微蔓。

之勢失，縱鬆之勢，則必為以爲陷也。血虛寒也。若或痘色

頂陷而不紅，活根無紅，暈者，氣虛而血縮也。二症俱至，將水

期不能運化毒氣，以爲漿，故漿色遲滯，爲不快者，參酌

鹿茸湯主之。唇舌有款。○參木散方：活心法。見八、九、

○經水出痘

傳曰：痘出四五日，經水不止，身熱未退，精神

虛耗，痘不脹，氣虛則食自減，痘必陷伏，宜十全大補湯主

之。如虛甚者，加熟附鹿茸治之。至六日，猶不起脹者，千金

內托散，參酌鹿茸湯，回陽反本湯，可參考。

○出痘胎墮

胎墮，行漿之期，則峻補之。參酌鹿茸湯，或

回陽反本湯，獨參湯，或參附濃煎，宜兼與矣。



○漏痘治方

唇舌淡紅或青白。痘出四五日來壯起肥。中有一小孔頂直。陷根脚不活。或雜結與肉色等者。此名漏痘。表層由腠理不密。若早不治。則大洩。元氣不能發起。灌漿急。用保元湯加川芎肉桂。糯米治之。如便不實者。大保元湯主之。六日後宜用參飯鹿茸湯。肉桂丁子加治之。○四五日來。十六日後。主方ノカワリ。フニヨク。心ヲ用ベシ。

○假脹生方

唇舌潔清或淡紅或灰紫或灰白者。至五六日有一等光活。可愛嬌艷色者。以觀字捺之。破燈照之。如琉璃此假脹也。急圖之。先救其表。或牽生。不則至七八日為瘡塌。唇唇冷唇淡白者。膿漿清水根暈不活。者九日死。急用參飯鹿茸湯或回陽及本湯主之。如陽氣猶脫者。兼與參附湯補之。

○四五日便秘

唇舌滋潤或潔清或薄胎通明。出瘡紅赤。雖起發之勢。或不勇精神爽。食不進。微渴不飲。睡卧不寧。四五日大便秘結者。元陽素弱也。其証似虛。似實。似實。實難辨別。陰陽矣。惟宜膽導法。解後偏宜峻補之急。投參飯鹿茸湯如唇舌淡白。唇冷老垢者。兼與參附湯而後唇舌紅潤。則膿色勃。如破竹如大便五六日來不通。唇舌滋潤者。雖見急症。切忌毒下殺人。○愚按。凡膽導之法。ハ猪胆汁ノ法ヲ云シ。又更ニ一法アリ。油導ト云。其法。新ラシキ烟管ヲ以テ管トスベシ。其烟管ノ吸口ノ方ヲ小兒ノ肛門ニ指入。而口ニ油ヲ含

ガシクビヲロニクワテ一ト息ニズツト肛門燥糞ニアタル程ニ  
込シシバラク有テ其吹込タク油燥糞ニシナリハ九寸ハ程ハ大  
便快通スル物ニ是蜜導腸導ノ法ヨリ理ヲ得ル一多ニ心得

下シ〇凡テ胞癭似虛非虛似實非實虛實アキラメカタクハ  
愈ヲ以テ是ヲ治スベシ實ヲ以テ柔種ヲ投ス不可是慎ノ至ニ

〇腸鳴下氣咬牙澹泄下氣

唇舌淡白或淡紅瘡出稠密皮  
色慘暗或皮薄灰白根暈不收緊至五六日無膿路平塌不  
起時欲成瘡痒者屬氣虛急用參耆鹿茸湯主之如腸鳴  
大孔下氣或咬牙或澹泄者於本方內桂丁子附子治之愈愈  
寒劇者急煎與參附湯宜溫之

〇元氣虛邪火盛

唇舌紅赤或唇乾舌白胎如粉瘡出  
六日起脹時原稠密毒大既盛然元氣虛血氣弱為熱火  
津液枯竭不能制火以虛火炎蒸或煩渴咽痛衄血者邪火盛  
也頂陷不起失鼎盛之勢滯縮者氣血虛故難任溫補復  
難任清涼治者見其熱多卒用清涼致多不救先用參耆清  
補湯而後待舌胎滑潤者或宜參耆鹿茸湯或回陽反本湯  
可參考〇或問テ曰此條ノ參耆鹿茸湯用ル意如何答テ曰此  
處ノ主意ハ唇乾舌白胎如粉ト有ト又舌胎滑潤ヲ待ト此處  
ヲヨクク考ル寸ハ初ノ參耆清補湯ヲ用後ニ參耆鹿茸湯  
ヲ用ル意明白ニ別ルハ唇乾舌白胎如粉是毒火ノ盛ナリ

參麥清補湯ヲ用テ後ノ舌胎滑潤ナルモノハ是毒火退ク  
 故ニ舌胎ガ滑潤ニナルニ毒火ガ退ク時ハ後是惡名ヲツリクテ  
 子バナラヌ道理ニ故ニ本文ニ舌胎滑潤ナルモノヲ待テ后ニ參  
 飯庚茸湯カ或田陽反本湯ヲ用ヨト云意明ニ知ルシ又本文難  
 仕温補難任清涼ト云ハ温補スレバ邪火ヲタヌケ清涼ノ劑ヲ與  
 レバ元氣ニサワリ有故ニ元氣ニモサワラズ邪火ヲモタヌケザル極ニ  
 其間ヲグ、リテ參麥清補湯ヲ用テ邪火ヲス、ニノヤガラ元氣  
 ヲトリクツル至較ヲ見ルシ疱瘡ニ此調場甚多ク此意ヲ心得テ  
 ヨクノ療治ノ調場カクニキヲ失不可見所曰ノ療治ノニ此  
 小知ルシ

○七日膿漿不行

唇舌淡紅或淡白点或舌心微黑痘出  
 日若膿漿不行根暈不紅此復必易虛寒向末防虛腎急  
 用參耆庚茸湯加肉桂丁子熟附片若膿漿不起或清水  
 利無生意矣如至ハ此日有膿四五分猶可望生○凡テ  
 疱瘡ハ前ニモ云通り是ハ末名實ニ轉スルカト云フヲ前ハ  
 見テトルノ所要ニ夫テヤレバ疱瘡ノ療治ハ安ノ上ナニ  
 小出束ヲ一ト知ルベシ此條ヲ見テヨクノ其理ヲ考ベシ

○水伏痘班爛外剝

唇淡紅舌虛冷而見淡白點者六七  
 日期痘水伏不長灰白錫光皮薄有孔流水漏將班爛外  
 剝者後必屬薄無之痂此毒裏俱虛寒宜温脾胃補氣

血為要、用參飯鹿茸湯加桂丁香熟附或回陽及本湯可  
參考若舌帶老垢者名寒愈是則兼與參附湯治之。  
是モ前條ト同ク瘡水伏ノ内ヨリ末ノ班爛外剥見ヲキテカ  
ムル処ノ療治ノ一法ニ加攝ニトク早ク其証ヲ前ニ見テトル  
一瘡瘻治療ノ肝心ナルモノ

唇瘡腫裂額前水疱

唇瘡腫裂帶水色如濺或似破  
舌中央胎滑潤或灰或紫色三圍紅潤者六七日期額面模  
糊或額前發水疱似鼠証有膿踏皮薄血少根脚不收圍  
者不能化膿急用參耆鹿茸湯加桂丁香附子好酒治之  
兼與參附湯大劑可峻補氣血服之後唇舌滋潤膿血

水疱相半者無妨不則十二日死。○額面模糊トハ牛一瘡瘻  
ヲナツレハ甚子ハルヲ云水色ヲ帶トハ其唇瘡ノ腫裂タル処  
ガ水ノ如ク白クタレテ光リ有ラ云三圍紅潤ハ舌ノケルリ  
リ通りヲ三圍ト云フ

痒撮咬牙

唇角大水光或唇瘡俄爛如破或唇舌淡白或白  
胎帶老黃滑潤者六七日後屬鼠寒者瘡色愈餒空穀或灰  
白帶水光或頂陷根白時瘡塌咬牙神氣昏沉寢食不寧  
飲食減少大便易澀者先用參耆鹿茸湯加回桂丁香熟  
附治之或回陽及本湯可參考

六七日寒戰咬牙

唇舌淡白或鼠冷或舌胎滑潤者瘡

色淡白或灰白或皮薄水疱清。淡膿色。唇齒或頂陷不起。嫩而易破。渴瀉不禁。喘氣時起。六七日後。為極。痺者。氣唇也。內唇也。如寒。戰咬牙者。唇寒也。急。用參者。鹿茸湯。或回陽。在本湯之類。如唇赤不紅。膿色不實者。兼與參附湯。若至八日。午後。唇寒猶不除。陽氣不宣者。宜聶氏建中湯。主之。已上。有証候。用此法。陽氣猶脫者。他無治法。○六日後。托膿劑。

○回陽及本湯

治痘氣血。唇裂皮薄。將漿清。錫灰白。痘場寒。戰。

者。此湯主之。○傳曰。自六。七。日。至八。九。日。之。至。劑。也。

人參黃耆鹿茸

酒炙。切片。用酒煎。膏配茶。

當飯。川芎。肉桂。甘草。山。

查子。熟附子。

外加大棗二枚。水煎服。○傳曰。回陽。及。本。湯。

諸症如前証。皮薄平塌不起。或將漿清。水疱連。因。錫。色。灰。白。或。戰。咬牙。表。裏。俱。寒。甚。者。此。湯。主。之。唇。舌。有。訣。

○妊婦墮胎

胎墮于行漿之時。則峻補之。參耆鹿茸湯。或。

回陽及本湯。獨參湯。或參附濃煎。宜兼與矣。

六日後。下氣。肚腹雷鳴。

唇舌淡紅。或淡白。或微灰。或微黑。此。

皆純色之象也。痘出五。六。日。期。表。裏。無。邪。實。氣。唇。血。弱。雖。起。其。未。完。鬆。淡。白。不。綻。紅。眼。不。封。鼻。不。塞。而。大。孔。時。下。氣。或。肚。腹。雷。鳴。

防後泄瀉。將氣脫之勢也。急宜未香散。異功散。六日後。宜回陽及本湯。如陽氣下陷者。舌唇冷而帶光垢者。兼與獨參湯。或參附湯。使痘托膿。

○

七八九日灰白錫色

唇堆腫欲破裂濁潤舌白胎如積粉

中央黃老而三圍紅潤者七八日期灰白錫色漿清漏出清木  
頂陷白光無血沃神情懶倦語訕慵氣虛之症繁多總無烈

如層皮急宜回陽反本湯主之或兼投參附湯治之外無治法

○唇舌淡白或唇冷或老垢者宜峻補之劑而後雜舌上微燥

微渴曾勿怪重用之至膿期煩渴者津液虧耗自渴自救之

也如唇舌紅潤者辛熱之劑勿大過少用以平劑治之○或人

曰曰凡疔瘡癰膿期至疔煩渴スル者回陽反本湯ノ熱

劑ヲ用反疔煩渴解スルノ理如何答曰煩渴ハ惟白虎湯ノ症

ノ如キ熱症ニ有ト思ヨリ熱劑ヲ用テ煩渴ヲ治ス

晴ニ凡疔煩渴ニツノ別有内津液ノ不足ヨリ煩渴

ヲ愈湯ト云雜病ニ有テハ參苓白朮散錢氏白朮散ノ如キ

神劑ヲ用テ其脾胃ヲ調養スル寸ハ津液自然ニ生ニテ

煩渴治スル今瘡癰膿期ニ至テ煩渴スルモ皆是津液ノ

不足ヨリ煩渴スル也白虎湯ノ如キ實湯ト大キニ其理同ニ

カラズ故ニ本文ニモ膿期ニ至テ煩渴スルモノ津液虧耗ニテ自

渴自救也ト云リ若唇舌紅潤ナルモノ反本湯ノ如キ熱劑ヲ

多服スルヲ忌其サイハ瘡癰ハ元毒也毒ハ火也辛熱ノ劑ヲ

過服スル時又及テ熱毒ヲ夕スケテ桂附ノ害ヲ見スハ唇

舌ノ紅潤ナル者ハ辛熱ノ劑大過スルヲ勿レト戒有ハ是ガ夕

之活知心法參看鹿茸湯一條一服茶ヲヤメヨト有毛  
是等ノワケ有カ故ニ此処ヨク々肝弁有ルシ〇八九日ノ至  
劑ナリ

○十全大補湯 作氣血虛弱痘症加加姜水煎温服〇傳曰至  
漿期下血者如誤与犀角地黄湯之類則死惟宜温補氣  
血急用十全大補湯加熟附子治之痘色与唇舌有訣  
七八九日灌漿至方 七八九日以貫漿爲至治當温氣血  
氣血流行而成膿自易也至方保元湯内托散十全大補湯  
回陽反本湯參耆鹿茸湯獨步湯參附湯可參考

○第九日爲灌漿中日 自大極第九日爲灌漿之中日痘

○症之秘驗次生死在此日蓋痘雖有遲速凡順者自見  
至六日裏毒悉發洩於皮毛因症平和隱者至七八日漸發  
越於肌肉皮膚之間内外夾諸症逆者至九十日裏毒未解  
或留因裡骨空未達於皮毛者生死難次多十二日死隱者  
毒在肌肉之内外元氣壯實能食者在十二日後發癰腫有得生  
者

○摸蛇之傳 前詳

○七八九日內空虛 蓋七八九日期而五臟精氣穢毒俱隨  
氣血盡發洩於皮毛稠膿欲收結而漿色豐滿充足則臟  
氣自存而內空虛也譬如錫瓶空虛則內靜也靜則生寒

是也故古人用溫補之意明也

○

痘中崩漏至方

正值崩漏不止氣血俱虛之後適逢出痘

此必不能勝任宜大補其氣血以十全大補湯八物湯加木香

黃耆官桂至使裏氣充旺毒無留滯更能飲食則可保

全否則倒塌不治矣 ○心切方見于前 ○飛而段日如前証

用十全大補湯而後出痘灰白平陷難發難膿者加熟附子

一錢治

痘中經水暴痛 詳婦人治痘論八物湯同夕

血虛痘至方 唇舌淡白或淡灰或潔清滋潤面目青皖

白心氣靜睡卧昏沉微熱不煩微渴不躁出瘡淡白根散

或痘色與肉色無異者名為血虛先用十全大補湯去桂加

防風枳椇治之或出疹後用本方或加減益氣湯保元湯可

參考

七八日大孔灑血 唇舌淡紅或滋潤或潔淨至六日內外

無阻塞膿色半足至七八日忽大孔灑血五七滴乍痘色淡

白根暈散蔓神氣靜寢食無故雖然不早圖則及危篤矣

俗醫不知之用犀角地黄之類殺入速也急宜十全大補湯

加鹿茸熟附子治之如唇舌赤色痘色嫩腫根暈煩紅者復

宜清涼

春痘潰爛痘 有春痘潰爛者其初素氣虛誤發散



太過則陽氣隨汗洩故易出難收如瘡出水疱清談皮薄  
易破而潰爛者屬氣虛或屬表虛也唇舌淡紅淡白唇冷清  
白灰紫淡黑者証之常也宜十全大補湯加防風荆芥

渾身潰爛

唇舌淡白或淡紅或滑潤者凡痘瘡十一二日後  
過期不靨渾身潰爛以致粘席粘衣治法用白龍散敗草  
散赤小豆末蕎麥粉粘襯鋪散最佳也十全大補湯加  
防風荆芥治之如唇舌赤色者宜清涼方同上

千金內托散

傳曰此方痘出素稠密諸証和平五六日期  
裏氣弱肌表未盡解者托裏以宜解其毒惟有膿期內外無  
諸証者避風寒防穢氣宜此湯托裏易靨○傳曰此湯忌用

毒者痘症勝理愈開泄而必為班爛

人參一匙 當歸各一匙五 芍藥酒炒 川芎各六 桂枝各五

木香 防風 白芷 厚朴各三 生薑 一片 龍眼肉三筒 同煎入好酒

和服○按スルニ如表虛痘症起發不暢或灰白平塌起發遲

皮薄清漿及水泡錫光嬌嫩者忌用此湯即托裏藥中加

發解之方也嘗保元湯參耆鹿茸陽用陽反本陽之類大

且語治者意會宜施治矣○傳曰七八日間毒未盡解于補

托之中微無解毒即內托散加午芎荆芥酒芩老人參肉桂唇舌

有誤○蓋錢孔曰痘瘡六七日膿雖灌甚不滿足中間又有

不能灌者此氣血不和也終必變為虛寒痛痒之証宜參耆

内托散加木香因桂在之  
参考内托散方

人參黃耆 當歸川芎厚朴防風桔梗白芷官桂木香共  
一味加糯米水煎温服。此方ハ貫膿ノ時用ル方ニ至極托膿  
ノ輕キ方ニシテ知ルベシイサカモ瘡ト瘡寒ト其症夕三カニ  
極ム寸ハ此方用テ可薬ガ微ナレバハ参考者鹿茸湯大保  
元湯ノ類アラビ用テ

托裏輕症 唇舌紅赤或滿舌白胎如粉三四日瘡瘡  
雖起發彼此相串皮腫因浮或於本瘡四傍旋出小瘡攢  
聚漸腫成一塊者此瘡最重先用調元化毒湯清熱解毒

至五六日唇潤舌胎黃老而滑潤者宜用千金内托散托膿  
解毒如皮薄平塌不起根暈不收緊者忌之。四傍旋出小  
瘡トハ瘡ノクルリノ粟粒ノ如キ者ヲボクト吹出スヲ云甚レ  
カ后ニ一塊ト成テカタムルニ故ニ此瘡ヲ重トヌ先調元化毒湯  
ヲ用テ毒ヲ解メテイテ后ニ千金内托散ニテ膿ヲ催ニ毒ヲ  
解スベシ是又内膿<sup>托子</sup>ノ輕キ者ニ参考者鹿茸湯大保元ノ如  
ク瘡ト瘡寒トキツト極リタル托膿ノ意ト輕重淺深大ニ  
不同有処此ニテ能ク合点スベシ末之皮薄平塌不起根  
暈不收緊者是キツト瘡ト瘡寒ト極リタル症ニ支故千金  
内托之如キ輕キ托裏ニテハイカス重キ托膿ノ方薬ヲアヒ

用べし故ニ本文ニ千金内托散ヲ用ルルヲ忌ムト云ニ  
 托裏解毒 唇舌乾燥或白胎通明中央帶黃黑至四五日  
 胎滑潤而唇乾澀者謂之不合格裏邪自解表邪未解而為  
 霍者先欲救裏補益則表毒鬱畜難為漿先欲救表清  
 解則胃氣下陷為瀉泄為氣脫致不救急宜托裏解毒如內  
 托散參麥清補湯之類宜參考至五六七日唇舌俱滋潤者  
 表裡俱和偏宜溫補。○不合格トハ格ニアワスト訓テ常格  
 ニアワスト云フニ胎滑潤唇乾澀ト是ヒキアワトニ胎モ乾澀  
 ニ唇モ乾澀スレバ定格ニアリハ唇滑潤モ舌モ滑潤ナレ是  
 モ定格ニアフテ疑ナシ今舌ハ滑潤ニシテ唇ハ乾澀スル是

唇舌ハダクニシテ定格ニアワトニ是ハ何故ナレバ裏邪ハ自  
 解ニツキテ表邪カマダ解セズ内ニ霍ヲ夾ム故ニ裏邪自解  
 シタル証候ハ胎ハ滑潤ニナルニ表邪ガ未ダ解セサル証候唇  
 ガ乾澀ニナルニ夫ニ加ルニ内霍ヲナス者ナレバ是症ガ三ツニ列ト  
 云者ニ其ニツテ一時ニ救ニハスルハ大キニ難キトシ裏ノ霍ヲ救ニ  
 トノ補益スル寸ハ表毒ヲ包テ補澆スル故ニ貫漿セヌシ又表ノ  
 毒氣ヲ清解セントスル寸ハ裏ノ霍ニヤワリテ瀉泄ヲナシ氣脫ヲ  
 ナス加ヨリニ補益モ清解一方ツケテナラヌ症ニ其時ハ裏  
 ヲ托ノ膿ヲ催ニ毒ヲ解ニ表毒ノ患ヲノガルヨウニセ子ハ  
 ナラヌ症ニ其時内托散參麥清補ノ如キ函ガケノ方ヲ

先用テ六七日至リ其案功見テ唇ノ乾澁ヲ潤ハバ是唇舌俱  
ニ滋潤ニテ表裏俱ニ和スルト云者其持偏ニフミコシテ温  
神ヲ用ル時ハ療治ノ前後首尾ノ大知ヲ得ルニ是又療治  
氣味合甚加者ノイル也

七日漿色不快 唇舌淡紅或滋潤神氣靜鼻氣穩面  
目腫脹雖有起勢至七日漿色不快或鼻不甚塞時  
流清涕者表寒欲愈之徵也唇舌淡白者裏寒而愈也未  
淡白者表寒急宜內托散加丁子熟附鹿茸糯米治之  
嘗防收靨之裏寒

大便初頭軟後緩 大便初頭硬後緩舌胎滑潤外

瘡未鬆必復愈勿攻之惟宜參耆肉桂散如至七八日餘矣  
未解者本方在桂加酒炒黃芩大丁子治之 全文ハ前ノ

膿期用瀉下一方 唇乾裂舌尖紫赤滿舌白胎如積

粉中央生芫刺七八日期有鼻毒烈火血熱之極是表裏俱  
實也急宜清涼攻毒飲大便利後唇舌滑潤瘡色發癩  
瘡者峻勿攻之惟餘邪未盡者以十神解毒湯加酒炒黃芩  
治之若舌上紅潤而胎減者參耆清補湯或千金內托散  
可參考 ○凡テ瘡瘻貫膿ノ寸ニ至テ治療ノ法托膿スヘキ  
ト專一ニメナカク手アラキト先ハナラヌトシ然レ加ヨウ  
ニ唇舌片ニ大實症ヲ見ヌオハ貫膿ノ節ト云レ反テ補劑

ヲ用ル時ハ其毒火ヲ包テ人ヲ救スノ旨有故ニ唇舌ノ實症見  
 テハ膿期ト云ヒ午アラキ療治又サケザル処有故ニ清涼攻毒  
 飲ヲ用テ其大便ヲ導スル時ハ毒火大便ヨリモレ在リテ唇  
 舌モ滑潤トナメラカニ潤ヒ痘色モ癢癢トホウヤギテ見  
 スルヤラバ攻毒飲ノ如キ午アラキ至方ヲヤメテ惟十神  
 解毒湯ニ酒苓ヲ加テ其餘毒ヲ去ルヨクニスベシ夫ヨリ一  
 等又クツロイテ唇舌ヲ見ルニ紅潤ニシテ舌胎モダシク  
 薄クニ減シ在ル者ハ參朮清補湯力或又千金内托散  
 カ世二方ノ中テ擇ビ用ヒヨトハ世二方ヲ用ル意ハ加ヨウ  
 ニ實証ヲ備ヘタル症ノ后ハ極ホト和カタルト見テモ

少シハ中ニ伏シ有シ其時ニ其見ルモオク保元湯ノ如キ補ニ偏ナ  
 ル葉ヲ用ル時ハ又熱毒ヲアツメテ害ヲナス故ニ其用心ヲ  
 テ參朮清補湯千金内托散等ノ如キ補劑トツカス涼劑  
 トツカス両ガケノ方ヲ用テ托膿ノ意モ有清涼ノ意モ有  
 ル方ヲ用テ托膿ノカワリニ用ル世所療治ノ專一ノ心得  
 シト知ル故ニ先ニハ清涼攻毒飲中頃ニ十神解毒湯終  
 リニハ參朮清補千金内托トソロト方ヲクツワケルヤニバ  
 イヲ能合点スベキ者

膿期血熱 唇舌紅赤薄胎通明七八九日漿雖灌而  
 色大紅根脚散蔓者血熱未甚解及九十日當有握痺

之患急宜參茵內托散加蟬退木通荆芥山甲治之。是六  
解毒ノ血熱ヲ去ルシカケノ方ニ參麥清補湯又合考べし

板實痘之秘事

痘出而稠密至六七日期諸瘡欲膿

而唇上瘡先黃硬者脾絕也不治。方廣天庭板黃而他處

潤活者癰毒必結干腦。腮臉板黃而四體潤美者痘癰

必發于眉鼻。肚腹板實者癰啓於曲池三里背脊板

黃者癰結于兩軸尻骨遍身板黃者死項頰前後板黃者

死頭面板黃者死眼眶唇上板黃者死兩脇湯球板黃者

死。板黃トハ其色トノ如ク黃ニシテ板ノ如ク硬キ疱瘡ヲ板黃

ト云シ至方ハ參耆內托散ニテ子搜蛇ヲ加テ治之若唇舌赤

色手足ノ根暈嫩赤乾紅ナル者ハ參麥清補湯ニ黃連搜

蛇ヲ加テ治之。搜蛇説アリ

班爛痘

唇舌滋潤潔淨紅潤者八九日期痘瘡膿熟

潰爛者痘之常候也若六七日期未成膿先即潰者此名班

爛屬實故唇舌赤色或白胎或黃黑胎者初發失表之過

也急參耆內托散去桂加黃芩荆芥大力子治之又有表氣

潰爛者其初素氣虛誤發散太過則陽氣隨汗洩故易出

難收如瘡出水疱清淡皮薄易破而潰爛者屬氣虛或廉

表虛也唇舌淡紅淡白唇冷清白灰紫淡黑者証之常也

宜十全大補湯加防風荆芥

肝名漿清

唇舌淡白或淡紅或唇唇冷班瘡爛而如澀古

尖淡白而黃黑胎如熟似濕潤者八九日期面顏灰白錫色

平陷皮薄漿清手足水疱漏木如澀者脾胃虛也漿清者脾

虛不解也用千金內托散加丁子附子鹿茸糯米治之如稠膿五端

者十二日死。千金內托散參麥清補湯二方。如キハ純補純涼

ノ劑ニ汎又其間ヲクバリテ行方ニ然ル丁子附子鹿茸糯米ヲ加テ

ハ其加味ノ純補ニヒカレテ純補ノ劑トモナルニ加味ノ摸ヨウニ因テ

何レ氏ナル方ニ一抵ニ思フ可

醫痘至方

唇舌淡白唇冷瘡出六七日漸作漿之初諸

瘡未盡成漿鼻津瘡先乾如黃硬者眉心瘡自乾黑者或

唇上瘡焦黑者或兩耳上瘡自收者兩頰瘡如餅中間乾陷

者額前瘡平陷乾枯者此名陷倒乃死之徵也不可認作正

收對人妄言六七日期而有此症者急宜參者因托散加附子

托裏少加解表治之如氣虛者毒氣夾寒者急宜參者鹿茸

湯可起其瘡如唇舌赤色瘡根嫩赤者急宜清涼不可執一以

治之

忌參耆症

膿元足者勿參耆又唇舌紅潤者不除桂附

後必有眼疾及發癰毒者是參耆桂附ヲ用ル心得シ

貫漿三日ノ内用ル

加減托裏湯

治實熱之症過服寒涼而變冰硬或吧泻

或皮薄漿清或塌陷無神血色不活搔痒煩渴者凡有此則唇  
舌必淡白潔淨大便必不牢固延綿不治而腹脹寒戰齒牙死  
不旋踵

者 參 甘 桂 當 芍 芷 密 陳 頰 石 水 煎 一 鐘 半 糯 米  
一撮煎熟臨服時加入乳半盃酒娘數匙同煎服。是乃實  
熱之症更須症變不几處之症。是此方立方之本旨也。貫漿  
三日內用此方

加 減 抽 膿 湯 治 血 熱 痘 症 服 藥 後 熱 症 悉 退 內 外 和  
平 惟 不 易 長 大 者 用 之 然 此 雖 保 和 元 氣 活 血 行 血 以 助 成 功  
如 前 症 未 除 還 當 服 十 神 解 毒 不 拘 日 程 而 用 之 也 慎 之 也

當 飯 川 芎 芍 藥 人 參 有 缺 耳 莫 陳 皮 白 芷 山 查 木 通 桔 梗

水煎一鐘半黃豆二十一粒筆嘴五箇煎服不拘時至六日後  
當 易 糯 米 為 引 〇 貫 漿 三 日 內 用 此 方

獨 參 湯 治 陽 虛 弱 痘 瘡 至 出 存 期 不 起 發 不 紅 活 其 勢  
遲 或 膿 清 嫩 軟 或 當 屬 不 收 或 痘 痕 白 色 膿 水 淋 瀝 或  
痒 或 畏 風 寒 等 証

宦 棟 人 參 生 姜 棗 水 煎 二 鐘 煎 八 分 徐 溫 服

嬰 兒 乳 母 亦 服 〇 唇 舌 百 訣

參 附 湯 治 瘡 痘 純 陰 無 陽 痘 色 淡 白 根 暈 散 蔓 咬 牙 寒  
戰 手 足 微 冷 頰 溫 或 洩 瀉 吐 不 食 睡 卧 不 寧 眼 鼻 不 塞



等証。○傳曰口唇帶木色舌淡冷老垢胎滑潤者悉治又曰  
至七日舌上微灰色或滋潤者其變易寒急宜溫補。

官棟人參 一兩 真熟附子 一錢 如法濃煎與之煎法有訣如或

以排膿補托之劑兼與之以其陰運其陽氣為可如加糖世已

陽氣脫者不治唇舌有訣如未醫至二錢更不應加至四五

錢或等分亦無妨。○朱翼曰人參補元氣生津液定喘喘喘

在此雖良藥然用之不當殺人用之必舌無黃胎痘無焦

色方可每用三分五分以至五錢八錢一兩止舌色如常止

用三五七分淡白者二錢三錢淡白大極須五錢或一兩膠漿

將足舌色漸紅即可減至一錢五分三分勢在隨唇舌之

色轉之用附至其年。○傳曰六日後唇寒証候悉具而投

補三劑陽氣猶脫者不治他無治法矣。○獨參湯參附

湯ノ二方ノ區別ハ獨參湯ハ惟唇候ヲ備テ寒証ナキ者專

用ノ劑ト知ルニ參附湯ハ唇ノ上ニ寒ガ指添バ乃チ參附

湯ノ症ト心得ニ是獨參參附所用ノ區別ノ所ト或人問

曰唇症ハ何ヲ以テ其証ヲ別クニヤ答テ曰先胞瘡ニテハ皮薄世

馮咬牙瘡色淡白等ノ症是氣唇耳ニテ寒ナキモノ或人又問

曰唇寒ノ已別ハ如何答テ曰唇舌冷手足冷口好執湯皂角

寒証ヲ見ヌ者是唇寒也。○凡テ氣唇ノ証ヲ知ルニ唇舌色

ヲ以テ知ル一至テ手迄テ目酌ナレバマク其上ニ手迄テ教

有秘スベシ其教ト云ハ鬼角病人ノ口ノ息ト鼻ノ息トヲ知ル是肝  
 心ノ目的ニ先医者ノ手ノヒラハ病人ノ口鼻ノ息ヲ受テ見ルベシ  
 一應ノ症ノ証ハ息ツキ夕ヨク短クナル者ハ其ナレバ惟鬼ノ寒ナリ  
 ト知ルベシ又夕ノヒラハ病人ノ息ガ少シ治ル氣味有テ夕ヨク  
 クル是鬼寒ニミテ參附ノ行処ニ獨參陽ハ氣窟ヲ治ニ參附  
 陽ハ窟寒ヲ治スルニ是其區別ナルモノハ○凡テ唇舌或癆瘵  
 ノ色ヤドヲ以テ鬼ト窟寒トノニツツ別テ治スルハ何ヨリタミカナ  
 ルトナレバ惟參附ニテハ療治ノキマテニ遲キトモ有シ其ニ  
 サイハキツト鬼ト見レ窟寒ト見レテカラ病ニ獨參ヲ用參多  
 附ヲ用ヒルトハ誰モコト知リ寄キトナレバ此ニ上キモナレバ

下手モナシ者モナレハ不切者モナキト云程ノトハ口鼻  
 ノ息ハ諸症ノ見レテ前ニトク早ク息ニハ見ル者ハ其時  
 早ク窟カ窟寒カヲ見テ取テ右ノニ方ヲ用テ理ヲ得ル  
 トモ又多ク有トハ鬼角一途ニ心得テハ不自由ニ且又心  
 得テ居ベシ益有トハ凡テ医書ニ短氣ト云ト有短氣トハ  
 息ノ力ヲナク短クナルヲ短氣ト云ハ此短氣諸症ノ見ラワレタ  
 前ニ短氣ニナルモノハ此短氣ヲマスト息ガ夕キ夕ノヒラハ受テ居  
 ル内ヒヤツク氣味有テハ是乃窟寒ハ是夕ニカナル同病ハ  
 然レバ喘急ナドヲ此短氣ト誤ル不可逆氣ナドモ皆實症ヨ  
 リ出ル息ハ是等長又間違各モ能ク其診察ニ熟ヌベキト

勿論此口鼻ノ息ヲ以テ虚ト虚寒トノ區別ニ熟サント思ハ  
 補中益氣湯ノ條下ニ詳ニ論有ハヨクク讀ニテ其謂ヲ知ルベ  
 其謂ヲ知ルノ其症ニ熟シルト云フハ要ノチキ道理ノ其症ニ  
 熟セシトナラバ先其謂ヲ知ニ有耳補中益氣湯詳論ハ三  
 卷目ニ有○本文曰或以補腦補托之劑兼與之以其陰運其  
 陽氣為可是乃此二方ノ取アツカイノ兼用ノ劑ト定メ用ケ  
 至テ良方ニ然レモ一方ニテ理ヲ得ルコト有レモ先ハ其本劑  
 ノ外ニ兼用ノ劑トナスコト至テノ良法ト知ルベシ○下氣腸  
 鳴ヲ以テ内虚ト知リ唇舌ノ濡淨ヲ以テ唇寒ノ前徵ト知ルノ  
 類且皆其前ビロニ見テ取ルノ目的トスルコト今呼吸ヲ以テ其症

ト虚寒トヲ知ルモ乃其類也忽ニス可

參麥清補湯 如氣血虛弱毒氣熾盛瘡色淡白唇火炎  
 蒸者偏難任補益偏難任清涼者加陽全之

- 參 八分 麥門 去心酒蒸晒 乾一匙二分 白花粉 酒蒸晒乾 生耆 若一 西洋方 若五 炙甘草
- 名三 酒炒白芍藥 生白朮 名四 當歸 酒洗 紅花 酒洗 川芎 生地
- 酒洗 名三方 桔梗 三分 同煎温服過此症者此藥當頓之服○傳

曰七八日期而欲漿面瘡為黃板色者參麥清補湯加黃連  
 瓊瑰杏仁參黃者與之根草與唇舌有缺

年長痘瘡火炎甚 有一種痘出稠密毒火既盛然元氣  
 虛血氣津液枯竭不能制火以虛火炎甚或煩或渴或咽喉

痛或鼻痔出血難任溫補痘必不能成漿結痂大凡年長之男  
女嗜飲久用血氣既耗者多有此利症參麥清補湯主之

利後餘痰全不退 大便利後唇舌滑潤三圍赤色標瘡

雖得潤澤赤色不全退者勿投參耆七日後分內托散去

入參因桂加黃芩大凡子治之或用參耆隔補湯去參耆黃

連腹蛇治之○據蛇前二已是ヲ年ニ併也見テ

清補峻補區別 唇舌紅赤或唇乾舌白胎如粉痘出五

六日起勝時原稠密毒火既盛然元氣虛血氣弱為熱火津液

枯竭不能制火以虛火炎蓋或煩渴咽痛衄血者邪火盛也頂陷

不起失出峻之勢滯縮者氣血虛也故難任溫補復難任

清涼治者見其執多<sup>テ</sup>年<sup>ニ</sup>用清涼致多<sup>ク</sup>不<sup>レ</sup>救<sup>ル</sup>先用參麥清補湯  
而後待舌胎滑潤者或宜參飯鹿茸湯或回陽反本湯可

考考○本文ニ云煩渴咽痛衄血等ノ諸症ハ虛火炎蓋ヨリ出

症シ又頂陷不起失出峻之勢如キノ症ハ是氣血ノ虛ニ難

任清涼難任溫補知<sup>ル</sup>レ<sup>テ</sup>而<sup>テ</sup>舌胎滑潤ヲ待者ハ參麥清補

ヲ用テ虛火炎蓋退<sup>ク</sup>故ニ舌胎ガ滑潤ニ<sup>テ</sup>キ<sup>ル</sup>其時療治ヲ少

ト<sup>シ</sup>ト<sup>シ</sup>フ<sup>ニ</sup>ミ<sup>コ</sup>シ<sup>テ</sup>一筋ニ峻補ヲ用<sup>ス</sup>キ時<sup>ニ</sup>此所療治ノ具合

ニテ點方ノ効ヲ能ク熟スベシ

不合格 唇舌乾燥或白胎通明中央帶黃黑至四五日胎

滑潤而唇乾淡者謂之不合格裏邪自解毒邪未解而為

內虛者失欲救裏補益則表毒解高難為漿先欲救表  
清解則胃氣下陷為泄泄為氣脫致不救急宜托裏解  
毒如內托散參麥清補陽之類宜參考至六七日唇舌  
俱滋潤者表裡俱和偏宜溫補

表實裏虛 唇舌淡紅或唇瘡堆腫燥裂不見潤色至  
七八日稍有漿色不充實或紅乾或陷頂或滯縮或作黃  
硬抓癢時作者表實裏虛也難專任補難專任清涼惟  
宜清補氣血參麥清補湯主之  
溫中益氣湯 治血氣虛弱送毒氣不出而驚搐狂躁  
等唇舌有訣

人參用伍 白朮名五 黃耆生用 飯身酒洗 白茯苓名六 冬井川芎名四

白芷三分 防風三分 南木香 桂名二 查肉 生姜 一片 大棗 二枚 去核

同煎一服中病即止

見魚頭溫足冷 唇舌淡紅面上觥自頸溫足冷痘苗隱隱

皮下淡紅便澀不渴吧食不和驚搐呵欠等証此皆有氣血虛  
弱送毒氣不出而狂燥者屬氣虛宜加減益氣湯或溫中益氣  
湯至三日內藥方也一服之病中レバ即止此意深  
キ意味有前已レ是ヲ弁ス

加減益氣湯 凡一發熱遂頸溫足冷不渴便澀面色觥白或  
瀉利青穀吧食不化兼身熱呵欠等証及氣虛也。傳日初

熱見息起脹之期而見氣虛症候者宜此湯治之

黃芪生人參甘草當歸川芎白朮陳皮升麻桂枝姜三片

水一鐘半煎服取緩為度。傳曰加減益氣湯專治虛弱症証

妙劑也一冬發熱不同已出未出之諸症自始五六日間悉皆治

之如至起發滯漿期為不快者宜行溫補。唇舌有訣。賦

益氣湯ト温中益氣湯ト其用ヒ方頗テ似ヨリタル者ト心得

テ用ニシ猶又二方ノ藥品ヲ以テ考テ其酌症如何ト方ヲツケテ

散テ其餘口訣有リナリ

見息身熱微々 唇舌淡白或滋潤或青白或反紫者身熱

微々瘧出二三日陸續不齊形色淡白或淡紅或雜起發軟

而不實根窠不紅活心氣靜手足微冷此已出既欲虛寒

者先用加減益氣湯加桂治之四日後宜入參飯者湯或

大保元湯可參考。○先加減益氣湯ヲ用ルト四日ノ後ニ入參

飯者湯大保元湯ヲ用ルマニバイ熱ト合息スレテ初ニハ虚ヲ

補ヒ次ニハ虚寒ノカ、スレテ方終リニハ大保元湯ヲ以テ峻補シ

テ虚寒ヲ治スル処ノ手段ナシニ副ヲ重クスル処ノ方ノツケマニ

バイ大事ノ処ニ書外ニクフウ有レシ中ニモ四日ノ後ト云ニ目ヲ付テ

見ヨ其意明ナラニ但見息三日ノ中ノ療治ノ手段也

微熱悠悠 唇舌淡白或淡紅或滋潤發熱精神昏憤起

卧困倦飲食不進大便易泄微熱悠悠口渴不飲眼胞虛

腫困倦飲食不進大便易泄微熱悠悠口渴不飲眼胞虛

浮面色青白瘡出淡白顆粒不明者裏虛也急用保元湯加  
 白朮茯苓治之或加減益氣湯主之。○此症初ヨリ終リ迄  
 諸症皆裏虛ノミニシテ寒ナシ故ニ保元湯加減益氣湯宜シ  
 此内寒ノ氣味有ルナレバ大保元ニ非ラサレバ其症の難シ  
 ○微熱悠悠ト云ニ氣ヲ付ヨ是ハ具息三日ノ内ナレバ微熱反  
 テ息ニ餘症ノ熱氣ノ有ルニ微熱悠悠ト云ハ一ヨレバ裏寒  
 ノ症ニ変スルニ夕夕ニ此場ニテ裏寒ノ一ヨリ妄レテ瘵治スルハ  
 午ヲケノ一ツノ謂所ニ治世ニ乱ツ安ルベカラサルノ場ニ  
 氣弱不能出 亦有氣弱而不能出者當微補其氣氣  
 和則出快加減益氣湯温中益氣湯或用參耆飲加此參

蘇防風白芷等輕揚之初不可妄用參耆恐騰理一密則  
 瘵難出如吐瀉之後元氣下陷飲食減少面上脫自唇舌淡  
 白者亦所不忌也

補中益氣湯 八九日漿膿充實諸症悉退津液虛耗口渴  
 者此陽生之

人參黃耆蜜炒 白朮蜜炒 柴胡炒 升麻炒 陳皮各四分 甘草五分  
 口渴者加五味子麥門冬生薑一片 同煎服活効有 ○傳日至八九  
 日膿漿飽足充實而微渴者瘵之常候也勿治之如雖身熱  
 必勿清涼至只至九日午後而與此湯但渴半減者至十日而於補  
 脾滲濕之藥中微煎解毒可治之唇舌有訣。○本文雖身

熱必勿用清涼之劑身熱ニハ非ヌ天元熱也此熱ニ非レバ痘熱ス  
ル一不能故ニ此熱ハ痘ノ常候トナス薬ヲ用テ此熱ヲ醒サントス  
ルハ大キニ癖ガ一し故ニ勿清涼トハ云ニ然レ氏九日ノ午後ニ  
至テハ此湯ヲ用テ中氣ヲ建ニ津液廻テ渴自減ヌ九日ノ午  
後ト云ニ目ヲ付ヨ見收靨三日ノ至方ニ

九日十日補脾滲湿 九日十日以補脾滲湿為主則自然  
結靨稠膿豐滿紅色而中真帶黑氣者膿糊突起為堆此曰  
收結然飽滿充足則內氣自虛也膿色不足則內症自實也實  
邪氣之實也虛者津液耗散氣血困倦虛火炎蒸身熱煩渴  
唇舌淡白者補中益氣湯合生脈散主之痘症凡九日期而

渴者津液虛耗故也前方如實者餘邪未盡內外發熱煩躁  
氣急粗口渴大小便秘澀唇舌赤色或舌胎乾燥者主方解  
毒飲加苓連治之 ○九日十日補脾滲湿ヲ以テ至トスル  
謂ハ九日十日ニ至テハ内ニ残ル毒氣ナク氣血モ津液モ皆表ニ透  
ビ出テ脾胃モ自然ニ空虚ニナルハ脾胃空虚スレバ水飲  
ヲ剋製スルカラガナキ故其水飲ノミナリ瘡癢ニシバキテ結  
靨モ自然ト遲滯ニテ甚キ時ハ臭爛外剝等ノ患ヲナスモノ  
ニ故ニ補中益氣湯ヲ用テ脾胃ヲ補フ寸ハ脾胃ノカラ自強クナリ  
テ水飲ヲ剋製スル故水飲ノ湿氣疱癢ニヒバカスノ自然ト結痂ニ  
各中者ニ故ニ九日十日ニ必補脾滲湿ヲ定法ノ至劑トスルナリ



故ニ本文ニモ豊満充足則内氣自虚スト云ハ此謂ニ又膿色不足  
 則内症自實スルトハ外ニ出ヘキ膿カ内ニヒク故ニ膿色不足  
 スルハ膿ハ乃邪ノ故ニ内症實スルトハ云ハ内症虚スルモノハ津液  
 耗散ストハ胞癰九日十日ニ及テハ皆津液氣血耗ニ表ニ發シ内  
 空虚トナリテ津液モ不足ニテ氣血モ乏クナリ夫ヨリ手足困倦  
 ニ虚火モ炎蒸ニ自ラ熱モ煩渴モ有ニ是皆中氣ノ不足トナリテ  
 起レルトハ故ニ八九日之期ニ渴スル者ハ津液ノ不足トナリテ  
 補中益氣湯ヲ用テ其脾胃ヲ取建レバ自然ニ津液氣血モ  
 自然ニ調ヒテ渴モヤムニ是諸病吐瀉ノ後ニ大渴有者ハ錢氏  
 白朮散ヲ用テ脾胃ヲ調和シ吐瀉後ノ渴ヲヤムニ理尚

生脈散ヲ合スル者ハ虚火ヲ清補セシカ爲ニ○若ク又膿色不足  
 ニテ内氣實ノ渴ヲナシ身熱ヲナス者ハ其症亦ニ云外ノ諸証  
 如ク大キニ別ニ諸症別ニレバ其至方モ亦別ニ是解毒飲ニ  
 至連ヲ加テ治スル至方有ハ是ガ爲ニ此虚ト實トノ二ヲ考  
 テ九日十日ノ至方ヲタツルニ熱ト考ハ知ルニキ外ノモノ  
 煩瀆症候 夫瀆者從入中上行天庭者為佳痲者高突  
 膿糊為堆吐珠稠厚者為吉  
 膿漿之辨 至七日氣血津液外化為膿漿五藏必虚不行  
 補托漿何由滿毒何由化如虚寒症明者又宜姜附温熱之  
 劑以助陽氣也 ○凡テ胞癰補托劑ノ心得ハ七日ニ至ル

気血津液瘧毒ヲ外ニ送り出ス膿漿ト成内必空虚スレハ一々  
ト出タル毒気其内ノ空虚ニツケコシテ又内攻セテトヲ恐ル故ニ  
七日以上ノ治方ハトメテ其空虚ノ中ヲ補テ瘧表カ又内ノ  
内攻セ又コリニ補托スルニ托ハ手ヲツテ外ノ押出スヲ托ト云  
此心得ヲ以テ七日以上ノ治方ヲ行フ時ハアタラズト云一也遠カラ  
ガルニシ空虚ノ治方モ此理ヲ以テ推スニシ

九日渴症 至九日膿足諸症平而渴者瘧之常候也 用補中  
益気湯加五味子麥門冬 調養脾元滋補肺気  
九日煩渴 如八九日期微渴者瘧之常候也如九日而煩渴  
者宜補中益気湯加五味子 治之 煩渴ニ盛實ノ因別有

是ハ虚火ノ煩渴若此方ヲ以テ邪實ノ煩渴ニ用ルナハ必バナクメ  
人ヲ殺スニ異ナラズ

十日後神気困倦 十日後脾気血泄于外神気困倦精  
気薄劣者用補中益気湯

九十日精神困倦 唇舌淡紅或淡白或潔淨者九廿日  
後若發熱稍緩顔熱面不甚熱手心脚心俱熱手背脚  
背不熱精神困倦大小便清利者虚熱也宜補中益気湯  
至之 〇 本文ニ手心脚心俱熱手背脚背不熱ヲ以テ益気湯  
ノ目的トナス是大夏ノ目的ニ能ク病人ニ對ヒテアラタズニキ  
症ニ手足ノ心ノ熱氣ヲ以テ補中益気湯ノ目的トナスニ東

垣先生ノ脾胃論辨惑論并其方御家庭家秘說ノ二十五卷目

ニ其說詳ナレバ爰ニ略ス

九日期口渴 唇舌淡紅或唇乾舌淡白九日期膿色飽滿

將收此則定期也氣血有強弱瘡有稀密故以日則不可論

惟膿以豐約驗之如未調密者津液干外化爲膿漿不能滋

養氣血故自腐自救如唇舌淡白或淡紅而燥者急宜補甘

益氣湯加五味麥門如唇舌乾燥舌尖赤色而大渴者宜清

涼

九十日後新生白胎 唇舌紅潤潔淨滋潤者九十日後

舌新生白胎者風寒龍耳<sup>ノ</sup>於皮標此屬氣虛急用補中益

氣湯加桂治之如唇舌淡白或虛冷身熱不渴小便清利時惡寒

者溫表調中湯主之早不圖則蕪<sup>ヲ</sup>搖必死

九十日之後微渴 唇舌淡紅或淡白舌中央微煩渴而不煩

者補中益氣湯加五味麥門

九十日之後似瘡 唇舌淡紅或淡紫或青白瘡後氣血兩傷

陰虛則內熱陽虛則外寒乍寒乍熱儼然似瘡狀切不可以爲

瘡治俱以補中益氣湯升舉之其病自愈○八九日(至初)

四君子湯 凡瘡出一二日氣虛証候明而先用保元湯則

反復氣粗皮厚肌燥失潤鬆者以此湯加沙參川芎桔梗腹

皮至<sup>レ</sup>之○此方ハ惟一應ノ美虛ト云ニ用ル方也氣虛ニモ服

輕重有り氣カ一分虚ノモ二也虚ノモ五分六分虚ノモ氣虚氣  
 虚シ其内輕重ヲ以テ方ヲ付ル時ハ保元湯ハキツト三四分四五分  
 モ氣虚ヲ備ヘタル寸ハ茶ト症ト相叶テナツシモナク切ラナス  
 シ若ワツカ一二分ノ虚ニ保元湯ヲ用ル寸ハ虚ト方トツリ合ハス  
 シテナツミ反テ氣粗ク肌燥等ノ症ヲ生メ用ヒサルヨリハサワルモ  
 ノシ故ニ輕ク神処ノ四君子湯ヲ以テスル寸ハ虚モトリタテテ  
 シモナク茶切ヲ見スシ其上マダ人參ヲ用ル寸ハ猶ナツミ有ニテ  
 恐ル故ニ沙參ヲ加テ人參ノ功能ヲヨキホドニ調和ス是一二日ノ  
 氣虚ニ世方ヲ用ル謂如此然レハ本文ノ内一二百氣虚ノ候明ニ  
 テト云八字眼目ノ十知ル也

十一二日津液枯竭

唇舌淡紅或淡白虚冷或滑潤或潔  
 淨或老垢或腐熟或蜂窠者十一二日後瘡脚散涸瘡痕  
 白色皮破皴如薄似鱗非鱗此因津液枯竭血虚氣少内  
 症未除之故也此症之極險者也急用四君子湯加秀川牛  
 旁荆芥連堯桔梗救之遲則不及矣

温表調中湯

此湯治表之寒虚者唇舌有缺

者案炒參朮茯苓芍飯灸并乾麩防八分芷下附生薑同

煎温服○傳曰六日已後一大便澹泄小便清利寒戰咬牙  
 痘色平陷虚薄清淡根暈為散曼之勢煩渴藏氣下脫  
 者属寒急宜建中湯如痘至十日不能回水者元陽在

陷故當屬不屬此內証無效此則表虛寒也溫表調中湯  
主之唇舌有訣

當屬不屬虛寒也

九十日期膿漿足而黃紅者必發熱

薰蒸此回水之候也蓋真陽運化其水自然消燂而收屬也

其元氣不足者則不能及時回水而當屬不屬者此虛寒之

証也必身涼而手足冷唇舌淡白或雖紅虛冷者須大補氣

血而即之收結宜溫表調中湯如前証加寒戰咬牙者宜建

中湯至之如當屬不屬發熱唇舌紅赤者解毒飲如發熱

口渴大便秘小便澀唇舌赤紫者大連竟飲黃連

八九十日當結不結瘡痒

唇舌潔淨或滋潤八九十日之後

當結不結忽然失瀉鬆之勢痒塌非時心煩氣促身涼而牛

足冷大便硬睡卧不寧飲食減少鼻孔緩軟閉發甚則鼻

流清涕唇舌未淡者外感龍襲于外也表寒而虛也急宜溫表

調中湯至之

九十日後表虛惡寒 唇舌淡白或虛冷身熱不渴小便清

利時惡寒者溫表調中湯至之早不圍則發驚搐必死○

此症表虛之新風寒ヲ犯不故時一惡寒スル補中益氣湯

溫表調中湯二方撰ヒ用ス但唇舌ヲ以テ二方ノツケ方ヲ

別ル時ハ唇舌紅潤或潔淨或滋潤ナルモハ補中益氣湯ニ

桂ヲ加テ宜シ唇舌淡白或虛冷スル者ハ溫表調中湯宜シ

是二方ノ位ツケシ益氣ハ氣虛ニカ、リテ用温表調中湯ハ  
表虚ニカ、リテ用之此処ニ方ヲ用ル大事ノ医別也。○十日主劑

八物湯 即四物湯合四君子湯。傳曰出昏後氣血兩虛瘧

症精神昏憤瘧色淡紅根暈不紅活四圍平陷而大便不秘不

泄者此湯主之即加黃耆內桂名十全大補湯唇舌有訣。○本文

ニ大便不秘不泄者ヲ以テ目的ノ内ニスルハ泄スルナレバ四物

湯惡ニ秘スル症ニ此方ヲ用ル寸ハ其邪ヲ補塞スル故ニ不秘補

塞ノ患ナシ不泄四物ニサワリナシ故ニ不秘不泄ヲ以テ目的ノ内ニ

ル此湯惟出奇之後氣血兩虛ト見ルナラバ此湯ヨシ氣血兩虛

上ニ虚寒ノ氣味有ハ十全大補ヨシ又モキツト虚寒ト云ナツテハ

外ニ種々方有十全大補湯一方盡スルニハ  
女子出瘧經水 正當起瘧灌漿之時適遇行過三日不止

者瘧必應起瘧而不起瘧應灌漿而不灌漿項平形塌或灰白

色或黑陷此為經水去多陰氣虧耗為陷伏壞症矣宜八物

湯太地黄加黃耆木香熟附以調元氣或胡荽酒噴之便瘧

起瘧灌漿或出增者為吉如寒戰咬牙喘急腫消手足厥冷

者為内脫不治。○八物湯ニ地黄ヲ入ル者ハ地黄ハ陰物ナル故ニ

血ヲ生ズルニハ故ニ入ルハテ血脫ニハ地黄ナドノ如キ陰

劑ヨリハ反テ四君子ナドノ如キ補氣ノ劑ニテナケレバ血ハ生ヤ

又者ハ地黄ナドヲ用ル寸ハ道ヲナメラカニメ反テ血下

多

故云云之此辨ハ五卷目也子陽ノ條下ニ有合セ見ル方  
考ニ曰失血家禁ノ四物ヲ与ルレト有テ乃此ニ云地黄ヲ去ノ  
意ニ熟ト考レ

妊婦墮胎 妊婦墮胎墮下小長之時則補而清之八物湯

加黃耆防風連莖或當歸散合保元湯之類

參苓白朮散 治痘後發渴者。傳曰誤下之後煌燭

者宜此湯主之

人參 白朮 茯苓 木香 藿香 葛根 甘草 水煎溫服

癰痕白色 唇舌淡白或青白或灰白者瘡癩既落中氣暴

虛癰痕白色不能食者脾胃虛也參苓白朮散葛根加

陳皮木香以調養之

當歸桂枝湯 凡痘收後手足忽然拘攣不能屈伸運轉

者此因血少不能養筋又或感風濕之氣使之不可轉用發散

恐反乾其血惟補血

當歸 酒炒 川芎 芍藥 甘草 桂枝 黃耆 右水煎服

加減感寒骨節痛加羌防如氣虛少加川烏引經再入參

保元神聖湯 治痘六七八九日漿不充滿或水泡吸因連

皮不起者用此方主之

人參 三錢 黃耆 三錢 當歸 洗三錢 防風 一錢 甘草 五分 薄桂 五分

肉桂 五分 酒炒 真姜 去絲 炒二錢 木一鐘半 加糯米三十粒 灯草一

十根蓮心二十根煎至一二小盞不拘時服或痘灰白咬牙者加  
童便者火過附子一二片為妙寒戰加丁香無戰不加無咬  
不和加白朮或瀉散炒 ○此方異功散下木香散下建中湯  
下此方下石四方用別レノ処ハ木香散異功散ハ日數ニカリテ  
用レシ建中湯ハ其内寒戰咬牙ト云ニ重ニカリテ用レシ此方ハ  
六七日八九日漿不充滿ト云ニカリテ用レシ是四方ノ便也  
也○六七八九日ノ全劑

回陽酒 治痘屬虛寒八九日色光白如水泡頂陷根白

癢塌咬牙寒戰者

鹿茸酥炒 附子麵裹 煨耆炒 當歸酒洗 右判前煎法

無用異功散 ○傳曰末香散異功散八日以前宜虛証  
寒者建中湯八日以後宜虛証夾寒者參耆鹿茸湯六七  
八九日當漿期不灌者妙劑也治者誤勿笑 ○又曰内托散  
自五六日至痘期唇舌是為準 ○八九日痘症和平諸症  
無故惟中間避風寒防穢氣調養氣血托膿也治者驗以  
知之 ○内托散ヨリ下ノ評ハ皆内托散ヲ用ル評語建中湯ハ  
八日以後ノ一字カ、リテ用レシ是内托散ハ托膿ト通りノ平劑  
症無故ト云ニカ、リテ用レシ是内托散ハ托膿ト通りノ平劑  
ニテムツカニキ調場ナキ平和ノ藥方ナレバ也但内托散ト痘  
科鑣ニ出タル百補湯ト輕重ナキニ非ズ其心得有ズ



百補湯ノ方ハ未見出ス  
 凡証口渴 傳曰瘧至七八九日若腹脹渴者或溼泄渴者  
 或手足指冷渴者或身温渴者或身熱面光白渴者或寒戰渴  
 不止者或急咬牙渴者或飲食轉渴不止者或渴好熱渴者  
 已上凡証即非熱乃脾胃肌因虛津液虛耗故也急以滋補  
 之劑治之木香散異功散建中湯主之但丁香温裏宜桂  
 藿香其香裏俱實而瘧不致於瘡塌如瘡敗壞渴不止者死  
 矣唇舌 ○八九日ノ主劑也

堅腸湯 治瘧中間作泄瀉不止者

黃耆灸 白朮炒黃若 山查七分 川芎五分 陳皮留白 升麻酒炒

肉果麴裏煨去油 右加牙連三枚水煎服 ○堅腸湯ヲ用

トナラバ木香散異功散建中湯合セ見ル此堅腸湯惟  
 虛ノニニシテ寒ヲ夾マサル者ニ用ル至方ナリ云迄モナ  
 此症ニハモ寒ヲ夾メタル者ニハ此方ノ治スル処ニハ亦不

神功散 此方初出而稠密紅紫或帶焦黑色者可用不拘  
 時服之 ○傳曰見血四五日間專宜此湯

黃耆生 人參有款 赤芍有款 紫根有款 生地 紅花 大力子各等 西井前胡

右剉水煎温服熱甚者去參耆加黃芩黃連有驚加蟬退  
 毒實者去耆加防荊 ○傳曰收斂面之後疔毒拔出血爛  
 膿水淋漓者神功散加酒炒芩連治之

