





• 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 JAPAN TAIIWA



門七
號245
卷17





九折堂山氏圖書陶記

九折堂山氏圖書陶記

九折堂山氏圖書陶記

熱力陷ル時ハ結胸ニ症ト名付ルニ心石
時ハ痞ト名付ルニ胸ヘ高ク心下ハニクニ此結胸ト痞ト邪
熱之陷ル高下之分ニ故ニ胸中ニ陷ル熱邪ノ症ヲ結胸ト
云ニ其蒸之名ヲ陷胸陽ト云ニ陷ハヨナイルト訓字ニ
大陷胸陽トハ裏ノ弱ヘツケコニテ表邪ガ大胸ニ陷
ルト云意テ大陷胸トハ名付タル者ニ

次結胸之辨 結胸ラシキ病人ヲ受取ル時此ハ結胸
力外之症カ其症別レバ疑ノ有病人ヲ次スニハ傷寒疫
病ノ兼ナラ矣先医カ兼氣ノ美ラソテ下ノ后ニ此病發ソニ
ヤト用ヘシ若下シタクト有テ丈カラノ痛ナリト云(此

結胸ニ相違ナシ又難病ニテモ食傷ノ吐凶ナト強クニシタガ
トニテ心胸痛アキモツケラレヲ程ナラバ此傷寒腹痛
誤ク下ノ致ス处ノ結胸ニハアラ子凡吐泻ニ因テ中ラツカ
ラシ其ゾカレノ弱ニ細腰ナトガ付コニテ胸ヘ陷ユムア
ハイハ傷寒腹痛誤下ノ薦ル處ノ結胸ノ裏ニカツルコ
シヤウ其時ハ結胸ノ薦ラ用アヨシ又心胸ノ邊ヨリ小
腹ニ至リ痛ニ甚ノキモツケラレヲ程痛ニ症ニアニ結胸
痛ク惟腹滿ノ痛カ此モツキラワミクニテ別ノ氣久モア
ルニ其ナレハ心胸ノ痛ガ腹ニヒロカリテ痛分又腹ノ痛ガ
心胸ヘ升ラテ痛カト聞ニ心胸ノ痛ハ腹ニヒロカリテ
方セ

之ハ此結胸ノ痛ニ相違ナシ此結胸疑似ソ極ムノ一
結胸又兼痰飲辨 劉心山曰結胸痞滿身由痰飲疑結
心胸故陷胸凹心用甘遂半夏桔梗枳實旋覆之類皆爲
痰飲而設也云云此至確說也邪熱ノ痰ヤ飲ヲ心胸ニキ
キ集テ痞トナル結胸トナルニ或人曰結胸ニ痰ト飲トヲ集
理ハ如何各古語無形之邪類有形之物而凝結云々有是
物類テ集ニラ子ニ集ラレヌ物ニ其證據ニハ奇怪ナトノ書
ハケル怪物ハシヨリ夜ハケルニ此ドウニク謂ナレバ

夜ハ陰ハ陰ハシメヨセテ形ヲナス者、冬ノ冰ガハルモ是ニ而
怪物ハ形ノ無キ處ヘ形ヲナスハ此形ノ無ニ其形ノナキ者ハ陰ノ
力ヲカラサレハ形ヲナストガ出来ニシ故ニ夜バケルニ又靈ナ
トノ人ニ取リツイテ宗ノラナスモ靈トニ者ハ氣計ニテ形ハナ
キ者、故ニ形ノ有人ニ取フイテウラミヲ云ニ此無形ノ氣ハ
有形ノ者ニ肉ニ凝結ストハ此ラニシ今無形ノ氣邪カ心胸隔
テ結胸ト成テ痛ラナスモ右ノ理ト同シトニ痰ト飲トハ有
形ノ者ニ無、無形ノ氣ニ無形ノ氣心胸ニ凝ハ有形ノ痰ト飲トニ
モタレテ凝結フルニ此剉心山ニ云ハレし處ノ說ハ是ニ故ニ結胸
ノ葉ニ必瘻ト留飲トヲ治スル葉丸有ハ此故ニト知リてし痰

ト飲トヲ治スレバ瘻ト飲トカラニク處ノ無形ノ氣ニ凝血
ヲナスノ能ズ凝血ヲナスノナラ子バ痛ニハ乞ル道理ニ猶此
辨腹診并瘡積ノ條ニ詳ナレハ併セ見テ其理ヲサトルべし
而又大兼氣陽ノ症モ此理ニハヅル、一ハナシ無形ノ無形
ノ燥糞、燥屎ニ因テタ、リヲナノ大兼氣陽ノ症トナクモ是
無形ニ邪、賴有形之物ニ而凝結ストニ理トヤハリ品ハカラム
同じニ是ノ理ヲ推メ心下痞硬ノ道理モヤハク無形ノ邪か
有形ノ物ニモタレテ痞硬トナル理此又推メ知ルヘキ處ニ其
中心下痞硬ト結胸トノ區別ハ痞ハ軽ク結胸ハ重ニ重キガ
故ニ大黃芒硝ニ甘遂ヲ組合セテ大陷胸湯トハナシタク

者へ輕キガ故ニ黃連半夏瓜蒌ノ三味ヲ組合セラ小陷胸陽
トハナシタル者、其葉品ヲ見テモ邪氣ノ輕重ヲ知ルべ

大陷胸陽藥品之辨、或人曰大陷胸陽ノ葉品大黃
芒硝ノ有ハ何ノクナゾヤ吾日大黃芒硝ハ大兼氣陽ノ枳實
厚朴ヲ卷タリ者、結胸ノ無形ノ邪ガ有形ノ痰ト飲トニモタ
レテ結胸トナル結胸ハ其邪胸中ニ有極レバ大黃芒硝ヲ
用テトガモナキ胃ノ府ヲセムルニハ及ヌ道理、此之大黃芒
硝ニ疑有逃ニ結胸ハ痰ト飲トガ胸中ニ凝結スルナレバ一
味ノ日逐留飲ヲ逐ニ驅痰スルクノ後ヲ大兼氣陽
中ノ大黃芒硝ヲ此ニ用リ心畢境ノ處トガナキ胃ノ府ヲ

伐テ無益ノ葉品ト云佐ノ者、然ラ此方ニ大黃芒硝ヲ加ヘ
ル意知ル不可如何若日此時胃中ニトガナキト見ルハ大
キニ誤ヘトガナキニ何ゾ大黃芒硝ヲ用シヤ或人又曰
胃中ニトガ有ト云耳謂如何若日トガト云ハ胃中ノ燥糞
燥屎ニトウテキス耳遂ノカラシテスケテ疾飲ヲトウテ
キス此其立方ノ本旨ナル者、或人又曰結胸ハ誤下
因テ痰飲ヲ膈ニ結ア症、此時腸胃何ゾ燥糞燥屎ア
ルヤ昔日丸ニ冰傷瘻傳經ノ治方ハ凡テ兼氣之藥ヲ以
下ントスノ時ハ又大毒症ノ有ヤヲ盡ク診察ヲトド

若シ少ニテモ表邪ノゾカサル時ハ下ス不可盡ク除ニテ其
熱理ニ陷ルオハソユテ大兼氣ヲ用テ塞ク下ス者小兼
氣ヲ用テ輕ク下ス者ノ何レ其輕重ヲ見合テ下スヘシト云
カ傷寒治方ノラキテニ今此大陷胸ノ結胸ハ熱邪か七八
分通リハ胃中ニ落込モハヤ燥薑燥屎ハ解裡腸胃ノ間
畜一積タル症ニ並ニ三分ハ表邪ノ患有其時医者此ヲ
見テ而ルイ早くニニテモハヤ毒熱ハナシト対テ大兼氣
陽ヲ以テ誤下シタル者ニ坐レバ大結胸ノ症ハ七八分ノ燥
薑ニ三分ハノ療飲ヲ凝結シテ患ヲ胸膈ニ止メテ大結胸ノ
症トニ又無形ノ熱邪ガ胃中ニ入テ燥薑燥屎ト成テ熱

毒ヲ胸膈ノ下ニ凝結シタル者ニ並バ療飲計遂テモスズ
腸胃ノ燥薑ヲ逐計ニテモスズ一ノ腸胃ノ燥薑ヲカリ
一ノ胸膈ノ療飲ヲカノ二ノナカラヒサ子ハナラヌ症ニ故ニ
大黄芒硝ヲ用テハ其邊ニ力ヲソシナガラ胸膈ノ熱毒ヲモ
ラシ甘忌ニテハ結胸ノ熱邪リカクニカケノ方也此方ニ
大黄芒硝ノ有處ノ主意ニ故ニ心ヨリ小腹ニ至テ硬滿ニ痛
不可忍ト有モ心胸ヨリ胃中ニ吐ガ有ガ故ニ如此腹一ノ大
痛ニカ有ニ若し胃中吐ガナク惟胸計ニ療飲凝結スルアレ
ハ胸痛區別有ハヅシ如此硬滿痛ノ症次メ有不可此之於
冒中モ亦トガ有ノラ知ルべし此大陷胸湯ニ大黄芒硝有

外ノ主意ニ

虚氣結胸之辨 枳實理中丸之效行功曰傷寒結胸破
絕心膈高起チ不可追用大陷胸湯不瘥者此下后虛逆
氣已不理毒亦上攻當用枳實理中丸先理其氣次調諸疾
用之如神活人云誤下未成結胸者急頻喫理中湯自然
解了^{スル}蓋理中治中焦故也胃中雖和傷寒未退者宜候日
數足却以姜氣再下之蓋前來之下未是也此條熟ト心ヲ
用テ讀へし前ニ云外ノ大結胸ハ無形ノ氣邪か有形ノ痰飲ニモ
タレテ心胸大實痛ラナス症ニ此枳實理中丸ノ症ノ虛氣結
胸^ノ冒ノ氣シニヒレラヨリ惟無形ノ氣カ烟ノ如クキクノ如ク

胸中無形ノ邪ラサソヒツレテ上攻スル症ニ故ニ此ヲ虛氣
結胸ト云之此乃虛氣モ無形ニ邪氣モ無形ニ無形虛氣か
無形邪ラサソフテ胸凝ニ此又一種ノ結胸ニ坐ニ胸が
大痛テ高ク起リ手モツケラレラ病勢ラ見テハ誰モ大陷
胸湯ヲ用テ大結胸ノ症トハ見ヘキトニ坐ニ其通リ療得
シテ知ナキ時ハ是虛氣結胸ノ症ニヤト医按ラキリカアテ
枳實理中丸ヲ用テ其冒ノ虛氣ヲ調理ニシ其効如神速
ニシムアルト云謂ニ又一活人ニルハ若ハヤマリテ下ニテ后ハ
結胸トナラスニト先急^ニ理中湯シ與テ其氣ヲ調理スル
時ハ結胸ノ患モナク病氣を解スル一有熱レバ利丸専ラ

ナス者、燥糞、燥屎耳。有テ表症盡ソムルヲ待テ此ヲ下スべし
是ハ何ノ事ハナク前ノ下し足ラヌ处ヲ下スコトニキ。予此
方ニ因テ經験甚免シ凡テ結胸ノ所方此ヲ面ニシメ仰ナキ時
時ハ又此ヲ裏ニ未メヨ實ニ未ナテ仰ナキ時ハ此ヲ虚ニ未ノヨ
トニ古語ノ教諭ニ氣結胸所方ノ云ニ

胸滿之年、傷寒六書曰蓋表邪傳裏必先胸以至心腹。
入胃是以胸滿ヨリ帶表症宜微所傷寒六書ニ云此語ノ意
ハ先太陽經、邪氣ヲ受テ表症トナリ其表邪が陽明經
傳一正陽明傳テ其カラ段々裏傳一テ頗テ胃口ニ邪ノ
落ヘントスル時、先其邪ガ胸集リ胸ヨリ心下集ノ所下

ヨリ又腹ニ集リ支ヨリ胃中ニ熱ガ入ル此傷寒傳經ノ邪
ハ胸リ經テ胃ニヘルニ此傷寒傳經ノ常ニコウニ謂故胸滿
ヨク表症ヲ兼ル者、故ニ其所方モ少シ汗ヲ取ルケヨシト
云意ニ此心ヲ結胸ノ上ニ移シ見ルニシトガモナキ胃リ下ス時
ハ表邪ガ胸ニ集リテ結胸トナレ道理分明ニ但六書ニテ
胸滿ハ惟無形ノ邪ガ胃ニ落コム處ノ胸滿ナレバ有形ノ者
サソワズノ胸滿スルニ結胸トハ理ハ同シ相違有其相違、
結胸ハ必ず有形ノ痰飲ヲサンニテ胸ニ凝結ス此其相違
所方モ又相違有結胸ノ胸滿ハ痰飲ヲ驅ルヘシ傳經胸
滿ハ微汗ニ宣シ此其區別ニ

枳實理中丸目的之弁 此方ヲ用ルニ口訣有下后ノ症
近トニ心ヲ用テ診察スベし此所要ノ診處也大陷胸ノ痛
ハ痰飲トニ者ガ有テ痛ニ致推ノ猶痛ニ推サレモ硬
痛スルニ此方ノ痛ハ惟物アシ無形ノ熱氣ト胃中ノ虛氣トカ
胸ニシユリテ痛ヲナス假今バ紙ノ袋一息ヲヘタルカ如ク
備痛スルニ故ニ其痛ハ处ヲキヲ以テ推ニ大陷胸湯ノ痛
如ク推ハ推ホド痛ハトハチガウニ此方ノ痛ハキヲ以テ輕ク推
ハ反テ痛ニ一等キヲ重ク下ノ推ス時ハ反テ其痛少し狀キト
ラ竟スル此乃虛氣ノ結胸ノ痛ニアンバイニ此無形ノ熱ト無
形ノ虛氣トノ集ル近ニ物ナキが故ニ

結胸經驗之弁 予一農夫ヲ治シタクト有他一行テ酒食飽
ノ心腹痛ニ甚シ一医食膚メ中焦ニ滯リ有ト見テ大裏氣
陽ヲ以テ此ヲ下ス泻利十八九度計ニシテ腹痛全快ス間モ
ナク心胸硬痛メ小腹モ亦卫ブルガ如ク痛ニ先医謂ゾダ食毒
ガノユク有故ニ痛モ強シト又備急丸ヲ用ヒ吐泻甚シ腹痛亦
弦シニシテ治ラ未ム予病ニ付ノ次第療候ノ次第ラ四盡ツ
皆傷寒結胸ノ理中レリ惟結胸ノ熱ノサクシテ疝痛モ
ヨシクタク様ニ見ニ因テ枳縮ニ陳湯ニ黃連ヲ加ヒテ用ヒ
茱二三行咽ニ下ルトヤレ狀シトニ郁合茱服八九貼ヲ全
狀ヲ告メテ此乃虛氣ノ結胸ノ變ニタル者也此ニ限ラス

結胸ニ痰蒸ヲ用テ治シタル例甚多し是結胸ニハ又疫
兼ノ理甚相合也

清火代疫湯經驗之弁 此方曰春出ナル方ニ治熱疫有
胸膈間不吐不化咯出寒熱氣急滿悶作痛者

黃連 黃芩 猪子 瓜蔞 貝母 枳殼 陳皮 半夏 草荳
蘇子 朴硝 桔梗 甘草 老仁 杏皮 木香別姜水煎入并

瀝姜汁少許

解熱下痰湯經驗之弁 治傷寒結胸有痰有熱有氣
滯并咳嗽失聲

蘋子 白芍 枳實 黃連 桔梗 黃芩 石膏 瓜蔞 杏仁

烏梅 黃柏 甘草 生姜水煎

右二方傷寒溫疫結胸ノ症ニ用テ大効ラ取シ一度くしま
ヨリ以米結胸ニキノ症ニハ傷寒論ノ方ヲハ用ズ此二方ノウ
ヲ卫ラビ用テ十三八九治セズト云々ナシ此ニケガ經驗ノ方ニ
一方經驗之弁 治大熱妄言胸痛痰喘脉有力

桔梗 黃芩 杏仁 來白 蘇子 石膏 枳實 甘草 陳皮
半夏 茯苓 前胡 此方元固本云治翁蒸方口解ニ出
タル方ニ此方モ大熱ノ結胸ヲ治シ能効有方シト予が門人語
入ケリ〇又一医ノ經驗ニ瓜蔞 枳實 陽木香ヲ合テ柴胡ヲ
加（小結胸ノ症ヲ治ス）云々リ此又經驗スベキトニ我が門人

誠見ノ爲此記ニヨク者ニ

木結胸之病 木飲過房水結胸下者胸中痛而引脇下
征忡頭汗出小半夏加茯苓陽合小柴胡湯ト大棗加牡蛎
主之或入問曰水飲過多ナル時ハトウシタ謂ニテ両脇痛
ニヤ答曰木ハ胸下ノ性ナルヲ以テヨリハ両脇ニ流レ安し此ヲ以
痛ムニ又問曰征忡スル謂ハ如何飲和上ヲ犯セバ心君其
メ、ノヲ受テ安シセス故ニ征忡スルニ征忡トハム子ガラトルヲ
云頑汗ハ如何答曰熱毒裏ノ間ニ鬱スル時ハ其雖外ニモルト
ナシ故飲邪ラサソフテ上ニハシリ頑汗トナルニ但し血分ニハシ
リテ上ル時ハ衄トナリ氣分ニ鬱クレハ頑汗トニ木結胸ノ症此

方ヲ用經驗しタル一二三人効ナトレリ

血結胸之病 胸膈痛手不可近嗽水不能嚥喜忘如狂大便
黑小便利犀角地黃湯主之或入問嗽水不能嚥ノ一ヲ以テ
血結胸ノ目的ニ取ル謂ハ如何答曰熱ガ裏ニ有ハ渴ノ水ヲ飲
力常ニ今裏ニ熱ガナキ故水ニ嗽クコト、飲ヌニ而水ヲ嗽
ハドウシタ謂テ嗽クナレバ陽明ハ氣因ヲ主ル唇ハ氣因ノ根
本ニ故熱ガ氣因ノ分ニ有時ハ唇グ燥テ木端ノ如クワキ冬
カラトナルニ是日坐ノ至難ニ今木ヲ嗽クハ此唇ノ燥キヨミ
人サンケ度ニ嗽クニ此陽明ノ經熱ノ府熱ニハ非ズ故ニ木ニ嗽テ
飲ムト不能サルニ又問曰陽明ノ經ニ熱ガ有ハ如何ノ謂ヲ

ノテ血結胸トハナルヤ 番曰陽明ハ多氣多血ノ府也 故=陽明
經熱ガ盛ニニナル時ハ其血ガ妄行逐上メ或血上或胸ニ上逆
血結胸トフニシ又曰喜忘一ノヲ以テ血結胸ノ目的ニトル謂ハ如
何 番曰今瘀血胸中ニ上テ血結胸トナル 胸ハ心ノ臟ノ處ニ當ル
心其血ニ犯サレテ心ノ本識ヲ失フ故ニ物忘レラスルニ又夢人當曰
如狂ト大便黑トノニヲ以テ血結胸ノ目的ニ取ル 謂ハ如何 番曰
其謂桃仁棗氣湯 桃肅陽ノ條下ニ詳シ 今見テ其理ヲ知
ベニ又曰小便利スルノ一ツシ以テ血結胸ノ目的ニ取謂ハ如何
番曰小便ノ利スルハ邪熱ガ血分ニ有テ氣方ニナシ故ニ小便が利ス
久之若熱ノ氣分ニ有ハ必不小便が不利スルニ 小便ノ利ト不利

トノニヲ氣分血分ノ目的ニ取ハ此謂ニト知ルニシ。此血結胸ノ主
方上血アルガ故ニ先其表ヲ治スルガ爲ニ犀角地黃湯ヨシトニ先
者ニ此ハ輕キ寸ノリニ重キ寸ハ桃仁棗氣湯テナケレバ知ナシト知
ルベシ犀角地黃湯ハト上血ノ末ヲ治ス故ニ輕キ症ニハ効有ニ重キ
症ニハ効ナシ桃仁棗氣湯ハ陽明ノ元ニカヽリテ血結胸ノ肉
来ル處ノ其本ヲ治ス故ニ重キ症用テ理有陽明瘀熱ナクシハ
血結胸モナキ道理。故ニ陽明ノ瘀熱ハ血結胸ノ元ニ桃仁棗
氣湯ハ其元ヲ治スル方ニ犀角ハ其瘀血ノ末計ヲ治ム瘀血
人本ハ治セザル方ニ此二方ノ輕重別ルニ處ノ者ニ
寒實結胸之并 寒實ニテ結胸熱症ナキ者ハ三智

散主之○三物自散ハ桔梗貝母巴豆細末し白湯ニテ下ス此
也。寒ニ實ト云ハ中寒ニ寒毒ナドノ症ヲ見ル様ニ寒毒ガ
ソコニ凝リテ夫ヨリ胸痛ナトガ起ト心得ルハ大キニ非ニ寒
實トハ肝瘻カ胸ニ實ノ結胸トナルト云心テ寒ニ實トニ寒
ハ惟無熱ヲ指ノ云乎足歟冷ナドノ寒テハナシ其症熱ナシ
ノ瘻集クテ結胸トナル此が寒ニ實結胸也但熱ナシトハ
ニ一向ニナキテハナシ惟人結胸ノ難力ラ見レバナイト云
モ同然ノ一故サシハ熱モ有ヘ一向ニ熱カナケレハ惟一應雜
病ノ瘻ノ胸痛ト云者ニナムニ結胸ト云ハ下ノ左邪ガ胸ニ陷リ
其ヨリ水ヲ集ニ脈血ヲ集ニ瘻ヲ集メア胸痛スルガ傷

寒ノ結胸也此外邪ノ陷入カナケレバマハリ帝ノ胸ノ痛デ
有ニ此傷寒ノ結胸ト平日ノ胸ノ痛トコニテ別ルニニ左方
ハ三物自散是其主方也傷節庵カ傷寒六書曰結胸乃
下早而成末曾經下者非結胸セトニラ見テモ結胸謂ヲ
知ルヘン石瘻飲ノ結胸ノ外ニ虛氣結胸木結胸血結胸寒
實結胸此四ノ結胸有其理ハ因ニナレ凡病因ハ五フニ
ワケ子ハナラズ其子細ハ大陷胸湯ノ症ノ大結胸ハ其病
因無形熱邪ノ瘻飲ヲサソヒ集メテ結胸トナル此一因ニ
其次ハ惟無形ノ邪氣カ何モサンワズノ無形ノ邪ト氣カ疑
リハ結胸トナル此二因ニ其次ハ病人カ水ヲ飲スキテ折ニ

モ早ク下ス療治ニ遇テ邪氣ガ胸ニ集ルオ其木ニモタレテ凝結シテ
結胸トナル此三ノ因ニ其次ハ熱ガ血分ニ有オ早ク下し合セテ瘀血ヲ
胸ニサソフテ結胸トナル此四ノ因ニ其次ハ寒ニ痰ガ胸ニシユリテ結
胸トナル此五ノ因ニ此五因ハ乃其病人ノ早ク下スオ其胸膈ニ有
合セタル物ニ無形ノ邪ガ取合セテ結胸トナルニたスレバ病人ノ其
心胸ノ有合セノ物次第ニテ或水結胸トナリ或血結胸トナリ或寒
實結胸トナリ或又物ガナケレバ虛氣結胸トナルニ此結胸ニ五
區別有处ノ者ニ是又心得ヘキノ一ツ也

小陷胸湯之口授

黃連二兩
半夏
并

瓜萎一枚

石三味木煎服ス

小結胸區別之并 小結胸ト大結胸トノ區別ハ大陷胸湯
ハ心胸ヨリ下小腹ニ至テ盡ク滿痛スニカモ其痛キビシクニテ
手モ不可近又此小陷胸湯ノ症ノ小結胸ハ傷寒ニ下ノ虚心
下ノ真中ニ有テ少シ滿痛ス惟手ヲノテ推サヘルオハキヤイ
ト痛ムトヲ竟ヘキヲ以テ重ク推スオハ愈痛ニ強キ者是乃
小結胸ノ見様ニ區別ニ切要方義曰若下后胸中滿痛者
因下之太早邪氣乘虛而入也本方合小柴胡湯服之如神乎
此一方是ヲ病人ニ誠ニルニ小陷胸湯ニ合小柴胡湯此ヲ用
久ニ誠ニ此ニ云テ有通リ一脉ニ大効ヲ取シタモ以モ相
還ナシ又一說ニ小柴胡湯ニ小陷胸湯ヲ合ニ更小陷胸

味ヲ加ニ下后ノ小結胸ヲ治スル至テ初有下サヌ前ニテモ胸滿
痛スル者ハ此方至テ宣し下ノ后ト下サヌ前トヨ論セス是ヲ用
テ初ラ取トニシニ有此又誠ニキニ^テ然凡下ノ后ハ是ヲ結胸
トニ下サヌ前ノ胸痛ヘ是ヲ胸痛ト云テ結胸トヘ云ハズ是医
書ノ定板也其子細ハ下后ノ胸滿痛者ハ水ト云者カ血ト云者カ
痰ト云者カ何ノ物ヲサンシニ集ナテ結胸トナルニ又下サヌ前
ニ胸滿痛スル者ハ是傳經ノ邪ニテ惟物ヲサシハサマズノ無形邪
計ガ胸ニ處リ胸ヨリ段々冒口ニ陷入シトメ胸カ滿痛スルニ是
下ノ后ト下サヌ前ト胸中滿痛スル二種ノ區別ナル物ニ下サヌ前
胸中滿痛ハ惟小柴胡湯桔梗枳殼ヲ加用ルケ是又医書

ノ定板ニ下后ノ胸中滿痛ハ物有下前ノ胸中滿痛ハ物尤
物有ト物ナシト此結胸ノ別ル、处ニ其外ノ結胸ノ要論要語
ハ大陷胸陽口投ノ條下ニ於テ是ヲ述レバ是ニ略ス
大陷胸陽由弁 大陷胸陽ノ症上ニモ云通リ裏甚
積ニテ居ナカラ用ニ難キ方ニトニ一ヲ合豆ノライテ其上ニ
テ症ヲ明ニテ用ヘキニ其シサイハ是ヲ下し又其トニ^テ是ヲ下ス
心是用ニクキ处ニ是再弁ノ謂ニ

小陷胸陽由弁 小陷胸陽ハ黄連半夏瓜蒌仁三味ニ半
夏瓜蒌ニテ痰コムリ黄連ニテ膏丸處ノ黄連是ニテ
黄連ハヨシ膏丸ヲ治メ散漫ノ無ハ治セヌ葉ト云トラ此方ノ

組合ヲ見テモ知ルべし黄連ノ役ニ口此黄連ノ組合ヤニテサト
ツベシ

痞結之弁 医方集解曰鞭痛者爲結胸鞭而不痛者爲
痞氣不鞭不痛心下滿心爲支結

三和散口授 大便秘結之弁 王序泰曰秘者氣之秘也
結糞之結セト有此秘ト結トノ區別ニ秘ハ氣ノ秘スルニト
ハ七情之氣が腸胃ノ間ニ候塞スル寸ハ大便モ氏ニシユリテ通
ジラシブラスニ政ニ秘ハ氣ノ秘シト云結ハ糞ノ結スルニトハ腸胃
ニ血液が不足メ潤少キオハ大便モ是ガ爲乾燥シ結少レテ
硬クナリテ通セザルニ政ニ血ハ糞ノ結スルニト云故ニ其後方モ

秘ハ氣ニカ、リテ治し結ハ血厥カトリテ治ス少年ノ者氣
實ス故ニ大便ヨハ秘ス老人ハ血液が燥ク故ニ大便ヨハ結是
其秘ト結ト大概ノ弁ニ秘ハ俗ニ大便ノ通し意ガワルヒト
云カ秘ニ大便ノ硬ニトヤワラカトノニカ、リタル症ニハ
ナシ硬キ中ニモ通し意ガヨケレバ秘ト云不可又ヤワラカ
テモ通し意ガアシケレバ秘ト云不可又モ此ハ
謂テ大便ヲ滯ラエテ通し意ヲワルクヌルソト云凡テ
大小便ヲ心地ヨク通しサスルハ氣ニシノユルメラスルカ故ニ
其證極ニハ疊ノ上ニ行程急ニ二便ノ氣ケ有テモ此ハ疊ノ上
ナムバト氣ヲハル時ハ通ゼヌニ持テ后々ハ是氣ニテミブラヲ

タニニ便ガシナルニハ赤ス又大便所ヘ行テ是ハ苦ニカラズ通
ヒテモヨシト氣ヲエルセバニ便カ通ズルハ是モ亦氣ニ通ズル
ニ便ガ快通スルニハ赤ス氣ガ快通スルニ然レバニ便通
ト秘トハ全ク氣ノシナルモノアンハイニ因ルーラ知ニシ今故
有テ七情ノ氣ガ下部ニシユルハ氣ノ不和ニ此不和が大便ヲ
シナル故ニ通シ意ガアレクナルニ三和教ハ此氣ノ不和ヲト
ク葉ニ故ニ方名モニ三和散ト云ニ大便ヲ通ズル葉テハナヒ
ト心得ヨ方中ノ葉品ヲ見ヨ一味モ大便ヲ推ス葉ハナシ皆
氣ノ不和ヲトク葉計テ有故ニ不渴者乃氣秘耳末可
以施硝黃ト方後ニ云テ有ラ・見テモ其方意ヲ知ルヘシ

氣ノ秘結ヲ治スルニ初有モ是等ノ理ヲ以テ知ルヘシ大抵三
和散ノ便秘ノ模様ハ雪隱ニ長居スルカト聞テ長居ニコマ
リハテコースト云人ハ十一七八三和散ノ便秘ニト知ルヘシ是等
ガ此方ヲ用ル目付處ニ支故我ガ譽庭家ノ口訣ニハ大便秘
院ヲ治スル方ヘト教(テ大便秘結ヲ治スル方ニト)猶ニ
脉沉結之矣此三和散正面ノ脉トニハ沉結ト云ニ心ヲ用テ
得ルトヨリ三和散正面ノ脉トニハ沉結ト云ニ心ヲ用テ
沈ノ沈ニシヅムニ結ハヤハ字ノ如クムヌホクニ脉ケ少
シスル氣味ガ有テ沉ム是カ沈結ニ沉ハロデ云テモ通

スベハ結ハ心ヲノテ得べし辭ヲノテ得不可何ニモセヨム
スボルトニニ氣ヲ付ル時ハ結ノ意自然ト知ラム、ニ和
散ヲ用テ大効有病人ニツイテ等ク其脉伏ヲ取ハ竟ベ
ル、スレハ此脉が乃三和散ノ沈結ヨト意然ト竟ニ知ル
夫ヲキ本ニミテ沈結ノ脉伏ニ熱スベシ二三入モ試タナラバ
沈結ノ脉伏ニ熱スベキツニ氣滯ノ脉ノ沈結ニカツ、雅
此三和散ノ症ニ有計テナシ分心氣飲七氣ノ類皆氣滯
用テ効ノ有病人ニハ脉カシコツテ沈ニクル者ニ在スレバ沈
脉ハ氣滯ノ目的ノ常脉ニト合焉スベキツ勿論也
寧急目的之矣 固本玄端先生曰此方ノ目的ハ一身ノ

中筋ニキツリ、痛或伸ニカドスルヲガナラヌトニ様也
筋ニカドリタル症ヲ見ヒ用テ効ヲ兩ルトヨヘ、夫故脚
氣寸白ナドニ用テヨキトヨヘ、氣ノ滯リニテ大便小便
秘滯スルニ用テヨシ勿メ大便ニテモ小便ニテモ秘滯ス
ルニ急ニ通薬ニテ効ナキニ此方ヲ用テ度く効ヲ得ル
○疝氣洞入テ腹脹リ痛脇苦ク筋ニキヅル様ニ物言ト
ナリ難ク氣息絶ヌル様ニ有者ニ用ノ方ニト知ルべし
○兜ノ疝氣テナク瓦虫積ノ羨ニモ筋ニキヅル様ニ竟ニ
病人ニハ効ヲ得ルトヨヘ、○疝氣トヨヘ傷人ハ陰囊ガ
ハチ手バ疝氣トハ心得フシサレバ疝氣ハ昔ヨリヨリ年症

筋ニキヅク腹内心地惡ク脉ハ弦急ニ外ハ風寒ニアテラ
レヤハ湿熱感メ厥陰ノ筋引バノ痛ミ腰ノツガヒホソ
キ金ヲヒテシノクルガ如クナルハ疝氣トノ療法ラセヨ如此ノ
病症ニハ此方ヨシ熱氣甚シノ餘熱ノ有証ハ入柴胡湯看
皮本爪ヲ加テヨキトモ有シ○疝氣ノ症傷寒ノ症ノ様ヨ
ク似ヨリタルト有能く病証ヲ具ニ尋フニイカサニ疝
氣ノ症ハ惡寒大熱證言ナド有トテモ陰囊腫痛ガ章
門ノ邊、指ユミテ筋引ハルカ或胸先一筋引ハルカスル疝
氣ノ療法ニテ傷寒ラシキ症モスラリト治スルトガ有
此症婦人ニモ有証ハシ○足コラノヤニトモララ包

タル様ニ動カス時ハシリヒト動ハ様ナムニ用テ効ヲ得タレ
ト百此牙モ筋ノヒキヅクノ目的ニ用ルヨリ効ヒテ用タ
者ニヨラクニ枝スレシ○或脛ノ筋引ハリ強ノ内ノ脇(モリ)
ツクツハリ疼痛シフタリヒト眩暈ノ脉ハ弦ニシテモ動
ト云様ナル症ニ此方ヲ用テ極テ効百加様ノ症ハ痰火ノ症
ト誰ニモ見タルシニヨリニテ一人此方ヲ用テ効ヲ取シハ兎角
筋引ヒルト云ノ目的ニ眼暈ナトハ取ラズニ用ヒタルト
石ニモ云通リ此方ハ兎角筋ノヒキヅクノ目的ニテ用
ニセキナル故用タルニ右ノ病証ニ羌活勝湿陽ラ用テ

効ヲ雨リタルモノ有ニ考へし。○疝氣ノ症ト曰テ此方
ヲ用テ効ナキ事ハ七味清脾陽ヲ用テ必ス効ヲ雨ル
セ寸白虫ノ症ト疝氣ノ症ト頗テ同様病ノ一有ニ故ニ
七味清脾陽ヲ用テ効ヲ雨ル。或人曰寸白虫ト並高
ニ能人ノ知リタル症ニ如何様ノ症ヲ云ヤ對テ曰寸白虫
ハ長キ塊虫ノ症ニ對ノノ虫ノ名ニ寸計小キ白キ虫者有
テ腹痛シタリ或腰ヲ痛シタリ腹痛シタリスルニ故ニ是ヲ
寸白虫ノ症ト云ニ能疝氣ノ症トギレテ病ノ一ガヨクニア
ク者ニ史故ニ是ハ三和散ノ疝氣ノ症ト見テ効ナクハ寸
白虫ノ思付有テ七味清脾陽ヲ用ニベキニ是三和散

裏ヲ行方ニ或七味清脾陽。乾藻川棟子ヲ加テ尋ノモ
百ニ川棟子ノ疝氣ヲ治スルノ妙品ニ乾藻ハ虫積血積等
治スルノ品ニ故ニ寸白虫ノ症ニ疝氣モ少しへてシノタルト
見ク寸ハ此加味宣し又七味清脾陽ヲ用テ過半効得
テモ末寒熱往來ナド有者ニハ九味清脾陽。小柴胡
青皮十ドラ加一用ルノモ有又小柴胡陽ニ桂枝十ドラ
加テヨキノモ百ニ凡テ疝氣ノ病症ノ如ク或寸白虫ノ病
症ノ如クニ寒熱往來ナド有病人ニハ三和散七味清脾陽
九味清脾陽小柴胡陽大柴胡陽ヲ前後ニシテ効取
ルト多し心得ベキニ〇右ニモ云通ノ三和散ハ氣ヲ煩行

アセ散ニ氣ノ薦滯ノ人或老人ナド腹痛胸痛或腰背痛
ノ症ニ筋ノ引ツリナクモ此方ヲ用テ効ヲ得ルモノ有但此
時ノ目的ハ脉沉結ニシルト云が目的也○此方小便ガシブ
ルニ用ルト大便秘ニ用エトニヨクノユ技スヘシ。忽ノ無メ
利スルハ湿熱ニ熱ノ小便ミアルハ燥熱ニ能食メ大便秘スル
實秘ニ是ニ秉氣陽ノ美コシ不食メ大便秘スルハ虚秘
ハ氣秘ニ此三和散ヨシ忽メ實秘ニハ三黃湯ニ桃仁紅花
地黃ノ美ヲ加一用ルニ血燥者ニハ潤腸湯ノ美コシ○脚
氣ニ三和散ヲ用ルハ經絡ヲ和スル故ニ旦脚氣モ氣ノ煩行
セザルヨリ起ルトヨシ脚氣ニ似タル病ニハ先此方ヲ莫

用ヘシ忽ノ脚氣腫痛、湿ニ枯痛陽ノ美コシ不腫痛筋
引ツルハ三和散ヨシ脚氣痛風風毒腫ノ病付ヨク似タケモ
ノニ先敗毒散ニ加減ノ様子ヲ見合筋ノ引ツリナト
強クハ直ニ三和散ニ轉ノ如クアリケンヨキ者也○此方五積
散ヲ用ル癆瘍ニ用テ知ヲ取ルトヨシ其色細ハ五積散
條下ニ記ス足ナドノ脾ル時此三和散ニテ効ヲ取ルトヨシ
○木腫脹喘鳴急先此方ニ紫蘇子ヲ加テ氣ヲ下メヨキ
百過メ病后或小瘡ノ美瘡也ニ通クニテ毒氣外モレズ
シテ木腫脹漏ニ度ノニ二便滯停し喘急痰涎呼吸急迫
難治ノ症ニ趣ニ此方効ヲ取ルト時多有或分氣補萬

八正散或木香流氣飲參蘇飲紫蘇子ヲ加用ルトモ有
之或小腹ノ后ナラバ右ノ諸方又ハ赤小豆湯陳醫飲子ノ美
ヲ用ルニ此通り彼モ是モ用ル方ノヤニ何方成凡病人ニ縁
近キヲ吟味メ用ル一肝要ニ石ノ葉方氏同し病人ヲ治スル
トハニビ方ノ本意夫ニ相違ノ輕重ノ指引有又病人同
様ナル病ヲ受ルトニ氏全體ノ虛實生付ノ虛實病因烏
ニ有此心得何病氣ニモ見合肝要ニ○此方ノ大意ハ五臟不
調三焦不和心腹痞悶胸膈張面ニ及手足浮腫ノ大便難
胸背痛食ヲ妨或脚氣胸ヲ攻腹脹滿心メ大便不通專
用テヨキ方ニト知ルシ○此方名ヲ和腹陽ト本朝古哲

方通用ノ呼タツルモ誠ニ故有此三和散ヲ用ルニハ兔角腹
診ニ有腹診詳力ナラガル才ハ此方ノ用ヒソコニヨキ者ニ
其腹ノ見様ハ能キヲ以テ筋ヲ推メ見ルベシ推テ繩ノ如キ
太キ筋或筆ノ軸ノ如ク中位ノ筋又クシジンヨリノ如キ細キ
筋或三味線ノ赤ノ如キ至極細キ筋脇ノワキ或小腹邊
ニ引ハリテ是ヲ推ハ痛ム氣味有腹皆三和散ニテ能キ病
症ニト知ルベシ此目的頭痛ニモ木腫ニモ眼暈ニモ雜病ニモ此
処ヨクノ肝心ノ診所ニ夫ヨリ諸病ヲ兼起ス者一切此目的ニヲ
リテ腹ヲ診スベシ是三和散ノ肝心ノ目的ニ此謂有故ニ本朝
古哲方和腹陽ト別名メ通用シ給ルト見ルニ○此三

和散ハ和剤局方出タル方也故ニ今和剤局方ノ全文ヲキリ取
たニ記ス者也和剤局方曰治五臟不調三焦不知心腹痞悶脇
助膜脹壅滯肢節煩疼頭面並浮手足微腫腸胃燥渴大
便秘難又治背痛腰痛有妨飲食及脚氣上攻胸腹滿悶
大便不通等症以上和剤ニ云处ノ諸症ハ皆是一氣ノ留滯圓
不調トニ不和トニ浮腫トニ或便秘或胸痛或腹滿或肢節
疼痛皆能氣滯ヨリ变化メ來ル处ノ諸症ニ如ル時ハ此方ヲ用
ル肝心ノ心得ハ一ツノ氣ノ字ニ有耳氣ノ字ニ有時ハ氣ノ氣久ル
トヲ知サレバ氣ヨリ出タル諸症ト云トハ知レ難キトニ其ニサ
イハ氣ニ元ヨリ形ナケレバ目的モナシ目的ナケレバ是ハ氣ヨ

リ覆リタルト云ト甚知難矣トニ之肺氣ト云セト口ニ云
氣ノ留滯セル病也故ニ三和散ハ肺氣ニ用テ氣滯ノ大効
ヲナスモ此故ニ然レバ是ハ氣ヨリ蓋ルト云タシカナ目的
ヲ知ラヌバ三和散ハ妙ラ盡カレヌ方也或入曰氣ノ目
的如何メ知ルべしや若曰氣ハ元ヨリ無形ニ外ニタシカナル
モ云通り沉結ノ肺伏ニ熟スル時ハ三和散ヲ用ルノ効應勧
十信カケテ入ヨリ妙ニ用ヒラレベキ道理ニ其上ニテ其人
自體氣ヲ遺入ヘク又喜怒憂思悲喜驚ノ七情相結分
是等ノ處ヲヨクイ回アキラマテ其氣滯有ヤナシヤヨ

知ルべし是一氣ノ留滯ヲ知ル心得ノ一ツニ或人又問曰固
本先生ノ口訣ヲ見ルニ三和散ノ脉ヨリ弦濶弦滑滑數等
ニ似結ノ脉ハ三和散ノ氣脉也ト云々医書ニモ見一ズ諸家
口訣ニモナシ其理引合サレバ似矣如何答曰弦滑弦數
弦濶ナドノ脉ノ上ニモ沈結ノスカタ事ア有ニ弦滑弦
滑ノ上ニモ沈結有ニ弦濶ハ弦濶ノ上ニモ沈結有ニ沈結
計脉ノ來ク症ハ云近モナク三和散正面ノ症アレバ方ヲ處ル
モ散テニ枝ヲコラヌニモ及ブニジ若外ノ脉手傳テ來ル時ニ
或滑ニモ弦ニモ數ニモ代ニモクルトモ有ベシ其上ニモ沈結ノ交り
有ノラ知ル爰ガ肝心ノ熱シ處ニ修行ノ處ト知テ修行スレ
シ

或人又問曰沈結ノ脉ノアリナキハ如何答曰沈ノ指ヲアテ
皮ニ應セザル者是沈ニ結ハ指ノ腹ニ脉がトウテ引シケル氣
味有是ガ結ニ是ヨリ外示サントノモ筆ニ記スア能ズ口ニテ
云トモナラヌニ是カラ先人ノ從行次第ニテ熟スキトニ脉
シブル意有ハ凡テ七情ヲ勞スル時ハ氣ガ引シケルニ是ヨリノ脉
モ結ト引シケル脉ヲ見スニ又物恩ニ居ル人ヲ云テ思ニ沈ムト
云世語ノ如ク兔角氣ヲイラチ物恩ヲアルスハ氣ガ沈ムニ立
カ沈ムバ脉モ沈ム道理ニ是等ノ故ナムテ脉モ沈ニウツニ沈
ト云バトテキット浮中沈ノ沈ニモ非ス結トニバトテ結
代々結ニモ非ス一種氣滞ノ沈結ハ別ナルト書外ニ宣

スニテ兎角三和散ノ大病入ヲ治ニタル上ニツイテ其脉休ニ熱スルヨリ外修行ノニカタハアラス此必能考ヘシ

三和散加味之并 三和散ノ中白朮ヲ左ノ膏金ヲ加ニ
方有是或大医ノ家方ニ是ハ至極也ノ一ニ其シサイ、梶
八中桂ヲ補テ塞ク意ノ有葉ニ故ニ白朮ヲ左ルト見ニ膏金、
氣道ヲ流利メ血分ヲ開ク者ニ故ニ換(葉ト見ニ何レニモ經
驗スベシ

三和散牽急之并 或人曰牽急ハ三和散ヲ用ル肝心首
的ニ其筋引ツリ或フトクナルヲ以テ目的トル其謂如何
蓋日張獻可ガ張氏医貫ニ五臟之論有其論曰ハ五臟心

ノ臟ニモ有竅肺ノ藏ニ有竅其外所腎脾各有竅中モ肝
藏ハ氣ニ屬メ盡ク竅有寸ハ土下ニ竅メ四藏其竅ヲカフニウズ
ト云フナシ故ニ諸竅ノ病証肝竅ノ一ツア舒速ル時ニ諸竅從
テ解ス又四臟有竅時又其竅ヲ肝ニ移シ肝竅有時ハ其竅ヲ
如ク四藏有竅寸ハ直ニ竅ヲ肝ニ移し肝竅有時ハ其竅ヲ
四藏ニ移ス故ニ肝ヲ竅ノキトス肝一度舒寸ハ諸竅從テ
解ス全方ハ逍遙散ヲ用テ肝竅ノ氣ヲ舒ル寸ハ竅ナシト云
ヘリ人身ノ筋ニ肝ニ屬スク故ニ肝竅滯スル寸ハ必ス筋ニシテ
一ト有ニ氣竅滯スル寸ハ直ニ筋ニカラマリテ氣ケシユムニ
段々バ紙ノ袋一具ヲヘル寸ハ其袋フクレハルが如シ氣滯ル

時ニ又人身ノ筋、滯氣集リテ筋ヲフクラカシタリ引ハメ
リスルニ故ニ卒急ヲ以テハニ和散ノ目的トルニ三和散ヲ用
テ一度其氣滯ヲ解すハ筋ニカラズル處ノ滯氣解メ諸証
治スルト得卒急モ亦ユルブル故ニ三和散ノ目的ニ卒急
ヲ旁一ニ取ル

疝氣之年 疝氣モ亦氣ニ無形ノ氣が肝經ニ鬱スル時ノア
疝トナルニ是疝モ亦其元氣滯ヨリ起ク症ニ故ニ疝氣ト云
ニ故ニ此方ヲ疝氣ニ用テモ妙勿ラ兩ル

三和散治ニ噤之年 三和散ヲ總分量一分五分程ニ調合
し紅花七分ヲ加（常ノ如クニ並用）産後ノ噤ノ治スルニ妙

ト砂葉集ニ見タリ此產后ノ噤タク有疝ニロクイツメ夢
中ニナリ甚キ者ハ人事ヲ知ラザルニ至ル者有此時ニ三和散ヲ
用テ効有ユアニヨ考ルニロキリトクイツメルハ是筋ノツコ
ル故ニ乃卒急ノ矣ニ卒急ヲ治スルニハ三和散妙効有方ニ
是何ノ事ハナク三和散ヲ用テ筋ヲユルフルヨリ產後ノ噤ヲ
モ治スルト見タク是等ノ症甫ルナラハ白朮ヲ合テ鬱金
ヲ加ヘ用ケ方ヨシ

羚羊角経驗之弁 本草羚羊角主治之部曰久服筋骨強
云々○又治中風筋痺附骨疼痛爲末蜜伏云々○治小兒
驚癇云々○平肝舒筋定風云々○又治子癇瘲疾云々○

又散產后惡血衝心煩心燒末酒服云云○又因主之條曰治筋骨急強中風云云又治小便不利云云本草綱目叢明條曰時珍曰羊大畜也而羚羊則屬木故其角入厥陰肝經甚捷同氣相求也肝主木用竅于目其病癥也目暗障翳而羚羊角能平之肝主風在合為筋其發病也小兒驚癇婦人子癇大人中風搐搦及筋脉牽急歷節製痛而羚羊角能舒之魂者肝之神也發病則驚駭不寧狂越僻謬驚寐卒死而羚角能安之血者肝之臟也發病則惊滯下注疝痛毒痢瘍腫瘻癰瘍產后血氣而羚角能散之相火寄于肝膽在氣為怒病則煩惱心氣逆噎塞不通寒熱及傷寒疾

難而羚羊能降之羚之性靈而筋骨之精在角故又能辟邪鬼而解諸毒辟佛牙而燒烟走蛇虺也本經別錄甚著其功而近俗罕能發揚惜哉羚羊角之救人之使如何樣能有テ如何様ノ病症ヲ治スルト云政驗天論說モシカトシタルト不見然ニ予羚羊角ノ効能ラ一味ニテヨシクト使ニ寔ヘタリ其使ニ寔ヘタルハ牽急ニ用テ効百十ニシク牽急シ以テノン一載テ見タリ是因テ牽急ニ用テ甚効有カラハ本草ニモ其能有ヤラント吟味シタルニ右ノ通り本草ニモカラニシク牽急シ以テノン一載テ見タリ是因テ愈瘍ノ諸証便ヒ寔ヘタク思ヒ今サカリニ政驗ラナス先羚羊角ヲ用

テ大知ヲ得タル病梅ヲ示カニ一人氣痘ヲ病メリ其症腰ノス
ジズワト引ニマルヲラ竟ニルト腰ガマカル程ニ筋ヲ引ニメテ
腰ガマカル丈ヨクチノ筋モニキミナテクルトキノ指カマガコテ
ノビタ程ニ引ニマルニ足モ其圓リ初ノ程ハ此筋ノ引ニ月ノ
中五六度計獲リケルが近來ニ至リ毎日一度或二度アシ獲ル
様ニナツタリ旦小便不利ノ足ノムクニ餘程有是因テ病家驚
テ治ヲテニタノミケリニヨ思ニケルハ是ハ脚氣ニ相違ナシケレバ
先医數人脚氣ノ療所ア畫セビ知ナキヨし胸人物語リケリ
然モ外ニ主方ノ思ニ付モナケレバ先三和散ヲ五六日モ調合
ニケリ病人諸症カワルヲシ木腫ハ毎日一ミテ皮一倍

腫タリ小便ノ通モ大便ノ通モ甚宣シカラヌ食事モ毎日
減ヌ脉ハ六脉似有力舌ニ黃胎ハ有_火渴ノ氣味丁シ因テ
一方ヲ製_火其方輕粉白桃花芒硝大黃牽牛子趁羊角
赤小豆商陸石八味水煎服此主方ヲ二服興テ翌日ハ小便
五合計通シタリトニワニニテ石ノ主方ヲ興一小便七八合モ
痛甚ク齒ニ餘程ユルギテスト云予輕粉ノ毒ニト恩ニ付是
ヨリメ輕粉ヲ去リ外ノ葉ハ前ノ通リニ增減ナク毎日三貼_火
貼ヲ興タリ小便相次ヒテ一升八合二年或合五ク後モ通
しソレ日モ有難革角ハ一服四分ア加タリ二十日計ノ間

腰モ大方ニキ元氣モヨク筋ノ引シノ大キニウスクニ心持
宣しト云ヤハリ石ノ全方又二十日計モ用タリ又諸症一暨
クニ惟チノ大指筋ノニキツカリ腕或キセク茶碗ナトヲモ
フニ思ハズ取ラトスノ百夫ニモカツワス右ノ全方ヲ興(タ
リ又十四五日ニテ大指ノニキツカリモ過半ヨクナフタリ食
モヨシ元氣モヨシ是ニ因テ右ノ全方ヲ此ノテ方彙ノ脚氣内
ニ有毛澤導滯陽(難羊角二分五リ)ヲ加用タリ都合モセ
トモ用テ病サツバクト治ニタリ后一年ヲ経テ少其氣味有
ト云又毛澤導滯陽ニ難羊角二分許ヲカロテイツ迄モ飲メ
ト差圖ヲシタリ此病入カ難羊角ノ經驗ノ初也后又不

ラ治セリ是モ腰ノ筋チノ筋引ミケテ自由ニキ足ヲ便ト
ナラズ舌ニ黄胎或黒胎又小腹ノ邊カラ火ノ如クナク者胸
邊ニサシ并ルト思バ忽テ筋ヲ引ムテ心持惡クナルト云脉
ハ數ニシカ百飲拿ハヨシ帝三和散ニ大黃難羊角三分ヲ加
用タリ○病人一日予ガ調合スル處ノ全剂ヲ見テ曰是ハ三
和散ト見タリ此方今近多服ナ卯ヒ然ルニ今三和散ヲ
服メ知アリヤ否ヤ寃束ナシト云丈ニモカツワズヤハク本方ヲ
製メ腰サシメタリ然ルニ卯ラ兩ル一右ノ氣し是ニ因テ難羊角
功能ヲ知ルニタレウ○是モ三十貼ヲ服メ二三年ノ病氣十
六分滿リ愈タリ其ヨリ以ニテ服葉ノ全快シタリ又一人ヲ

治セリ其症是モ手足ノ筋引ツクテ坐敷ノ中モ歩行ナラズ外
様又前ノ病人ニ大方同シト。是モ三和散ニ羚羊角二三分モ
加テアルク様ニナツタリ此三人ハ難治ヲ治ニクル經験。此方
輕キ症ニ先年ヨリ試ミタク一何人凡ナク羚羊角ヲ試ミタク
ニ何レモ相應ニ知有基。因テ考ク時ハ本草ニ摩急ヲ治ルト
云說至テ名シカナル。本草ニモ云テ百種ニキカニ茱萸モイク
ラモ百種耳角計ハ其通ノノ茱萸相應ナク辟驟ヲ取りテ
右ノ通リニ向後三和散ニ羚羊角ヲ加ヘ。卒急ヲ治ノ試ムシ
相應有不可是ハ卒急一説ノ證驗。其外羚羊角ヲ用テ
子癇ヲ治ニタル。又有其症發ルト夢中ニ成腹ノ子ガ胸

ツキ升レアリ。サニチニ勧テ知レタリ。諸医種ニ治スレモ知テ
古方家ノ医者チノ術ヲ以テシヅメントフレモ知ナシ予達羊
角大黃各等分ヲ煎薑ト成テ用ヒタリ。十四五服モ用ヒタ
レバ是モ治シタリ。但此姪婦ノ腹脹ケ丁ハ筆ノギノ大
サノ筋ラキタキテ太ク強ハル是ラムテ目的ニ羚羊角ヲ用
ヒ是ハ子癇ヲ治ニタルノ經験也。此病人ニツイテ思ヒアタリ
シテアリ近來行ハル。不邪秘方ト云妙薑集アリ。此書リ中ニ
産后ノ口噤ヲ治スルニ三和散ラ大ニ加ヘ妙。トアリ。予乃其理ヲ
ノテ口噤スルニ治スルニ三和散ハ筋ノニキニノエルミラツケル。

効能アリ此理フシテ産后ノ口噤ニ用テ知アルヲ知レリ今此
病人ニ中風ノ症ニ効アルモ全ク此理ニ外ハ無羊角ハ三和散加テ
一等ノ功名ヲ得ルト有ノ理ヲ知ルべし。又中風ヲ治ミタルヲ有
中風ノ卒倒メ不知人事齒ヨクニシバウテ一熟ノ葉モ咽ヘ通ラズ是
ニモ羚羊角ヲ本剤ニ加テ用ニロユルゴリテ茱萸ニ通ルト得
ナリ其后過半快キニ付テ肺蒸ヲ止メタリ又一人ヲ治ス中風
卒倒ノ后何モカモヨクナリテ惟肩コリ脅ニ至リテ筋拘り痛
足モ腰コリ股引バウテ筋拘り痛、惟此症計ナラズ暁
須氣散ニバニサン砂ヲ加一連ノト服スル中少ハヨキ様ニ思
ビ先ハ効ナシ見ニ因テヤハ前方ニ羚羊角ヲ二方計

八
、加テ十四五服モ用ナリ是モ其ヲ飲ト大キニ肩背ノ痛收ク
腰ヨリ股ノニキツリモ十ノ者ナテ九分通ク治メ惟一分計ノ
コリシト云是中風ノ症ニ羚羊角ヲ用タル經験ニ仁ノ本町鳴
犀圓ト云中風ノ妙薬有中風ハ大キニ効有ト云モ羚羊角ヲ
用テモ効アラシカ此處ニ枝スベシ中風ハ筋骨ニ風毒ノアラ
症多クレバ羚羊角兩方ケ要葉タルベシ又三和散ニ紅花加
ヒ産后ノ口噤リ治スルト前ニ挙ナリ是モ羚羊角ニ筋拘
キニナニユクニヨツケタラニハ猶ヨクラシ道理有考ヘシ是ニ
因テ是ヲ見ルすハ本草ニ舉ル处ノ諸症ニ用テ効有ト有
ヘシ然ニテガ試ニザル處ナレバ誤リニ入ニス、ナラレズ人

是ヲ経験ノ見ルべし。羦羊角ハ予ガ経験右ノ届リ。予
ガ試ミザル处ノ諸症ヲ試ミサセシガタノ本草ノ効能ヲ妙究シ
テ我ガ門入ニ示ス者。○而羨羊角ラ廣ク脚氣ノ症用テ試
タキノニ脚氣ト云ハ前ニモ云通り足ノ毒氣ト云ベキヲ脚氣
トツメテ病名ラナテタク者。脚氣ノ毒ハ星モ筋骨ニ毒ヲ
受タル故ニ皆奪急メ足不遂ニ至ル。○然レバ羨羊角ニ
コノヨミキ葉ナラズヤ能ニユ枝メ其効能ヲタチ見ヨ是ヲ
タクニテ知者バ人ニモ傳テ療ヒノクヌケトナリシム。ヘ星医
ハノ心ガケノ弟一ニ羨羊角ト犀角ト同シ無形ノ毒ヲ解ス
ル葉ナレ。羨羊角ハ無形ノ毒ガ筋ニアシルラ専ラニ解し犀

角無形ノ毒ガ心胸ラカヌヨク解スルト見タリ。是羨羊角
ト犀角トニ葉ノ便ニ別ノ处ナリ。ヘ

羨羊角酉按。一農婦健忘ノ症ヲヤフリ左年ヨリ畜年季リ
テ健忘ノ症既セズ然ルニ一朝紙燃トメ夢中ニテ舌ラ嚙テ
血ラ出ス。彼是スル中氣ガ付ナリ。本症ニナツテモヤハリ健忘
ハ前ノ通リ。予朱砂安神丸ニ羨羊角ヲ沢山ニ加ヘテ丸薬ト
ナシ清ニ益胆陽ラ飲けトナシ毎日八九十九ラ飲屋シメタリ。二十日以外ラ經テ大方快しトテ休薬ミタリ。此
病人ナドハ本草ニ云驚癇ヲ治スルト云經験ニ近キ者。又
男子ラ治ス其症ナ例レテ人事ヲ知ラヌミバラクニ

ヨクナル全ク世ニ云癲癪ニ此者キテ貧窮ニ服茶力ニ及ズ因
テ朱砂安神丸ニ羚羊角ヲ以山ニ加テ丸薬ニメ遺ス是モ全快ス
ルヤ否ヤハ未知レザレモ是モ愚極ノ一ツナレバ知ノ有ヤフニヤ
ヲ向エ寔ニ假リニ記シシク者ニ〇又テクハ人森玄壽ト云者
一人ヲニセリ其症全ク世ニ云狂亂ニ乃是ニ朱砂安神丸ニ羚羊角
ヲ以山ニ加ヘヨ服ノ全快ヲ得タリト告ロソヒト幸ル處ノ經験ノ
諸症サニジアレヒ畢境メニヘバ無形ノ毒氣ヨリ起ル諸症故
ニ羚羊角ヲ用テ知アリトミユ我カ從此處ニユホラ下サバ大ヒニ
治療ヲ補歸スル所マラシ

