


郷
庭
秘
説
防
風
通
聖
散
麻
疹
二
十

武
245
19



試
第 245
卷 19





九折堂山田
氏圖書之記



汗之并

い方を用心の上熱深々目赤腫痛或ハ頭面



小瘡出来瘡火有等ノ症ニ細子用ル上熱深キ人

ナラハ一切ノ病ニ渡リテい方を用心上熱深症ヲ見様

之事 或一月ニ有月ニ赤筋ハリテ頭痛ニ眩暈強ク

タチクワミナト有テ大便閉結シ或ハ癩凡ノ如ク或ハ

ハン毒ノ如ク身ニタラミナリテ中ニモ腰ヨリ以上甚キ

者ノ類是皆上焦ニ熱毒深キカ左ニ此方正面ノ

症ト知レシ此方ノ脈ハ脈モ赤カミソリニカラノ強キ

者シ是上熱深キヲ見ル心得シ涼膈散モ上部ノ熱

毒深キヲ治ス方ニ付テモ上部ノ熱毒深キヲ治スル方
之類々茶湯ヲアウタメ其甲乙ヲ知ルヘシ涼膈ハ加フス
ルトキ方ニ通聖散ハ多味ナル茶煎茶カカ彼ニヒ
カレモニヒカレテ茶カカユルキ方ニ是等ノ処方理ヲ
考テ治ヲ施スヘシ

酒炒製法之年 防風通聖
散ヲ稠合一服キリニ酒ニ浸シ炒テ用ユル方有リ製
丹溪纂要ニ出タリ一人鬢瘡ヲ患フ医防風通
聖散ヲ用ルル者數日ニメ効ナシ因テ丹溪先生ヲ
迎テ是ヲ見テ曰是全ク防風通聖散ノ症ナリ

何ソ防風通聖散ヲ服セサルヤト云リモ医者答テ曰
防風通聖散ハ數日ノ間用ヒタリ然レモ効ナシ是
依テ先生ヲ迎ヘタリト云フ先生又曰何ソ是ヲ酒製
ニセサルヤト云フ医者之曰予之ニ吞コシテ右云フ
通り通聖散ヲ酒ニテ炒用ヒタレハ乃チ其鬢瘡直
ニ愈タリト云フ丹溪纂要ニ用ニ見ヘタリ予付方ニ
從テ防風通聖散ヲ酒製ニシテ用テ効ヲ取シ事
是ニテ何十人ニ數ヲ知ルヘカラス此理ヲ考フルニ防
風通聖散ヲ酒ニテ炒ラサル時ハ是ヲ茶煎上下ニハシ

つて上部ニ薬カヲ考ラニ升スルカナラソコテ酒ニ
テ炒ル寸ハ薬カテトツテ上部ニ升ル上部ニ升ル時ハ上
熱ノ深キヲ治スル速ナルノ理ニ是防風通聖散
ヲ酒製ニシテ用ルノ心得也又之癩病々如ク見苦キ
癩ヲ癩或ハ周身ニ癩ノ如ク癩班々如ク身カ此等
色ニニタラフニソテ班ノ如ク煩フ者ニハ紫葳落萍
一味ヲ加ヘテ甚効有是又予カ経験シ

麻痺之辨

麻痺ハ心府ヨリ發テ陽ニ屬ス瘧瘧ハ五臟ヨリ
發シテ陰ニ屬スト云フカ麻痺ト瘧瘧トノ區別

ノ処ニ在ニ麻痺ノ治法惟々毒ヲ解シ去テ教スル様ニ
治スルカ麻痺ノ治方ニ麻痺ハ心府ニ在リ惟陽汁
ニテ陰ト云フニ一向ナキ病ニ在ニ毒ヲ解シ去テ教スル
ヨリ外サツハリト外ニ治方ハナキ者トトフニ合點ス
ヘシ初ノ治法惟々癩ヲ癩セシカ爲ニ癩ヲ癩セシカ爲
ル様ニ癩ヲ癩セシカ爲ニ癩ヲ癩セシカ爲ニ癩ヲ癩セシカ爲
ワサハイヲ後ニノコスニ此處麻痺ニアツカル大限ノ心
ナリ防風通聖散ハ古來ノ医ニ麻痺ノ后ニ用
ル方ト教ル医々多シ然レハ御食ニ度取ニ於テ麻

疹ノ序病ニ用テ甚効有方ト教ルニ其論ハ此
方他方ヲ教シ毒ヲ解スルモノ茶品ヲ見テ之ルニ
此処肝心ノ方ニ茶方防凡川芎當歸白芍甘草
薄荷各一々黄芩白朮桔梗山梔子各五分天花粉
連翹^{薄荷}荊芥滑石各五分其性^薄甘^辛右十五
味^辛煎^湯服ス方ノ名ハ防凡通聖散ナレト方
彙ノ方トハ茶品ニ餘程ノ相違有必ス^方テ^方序^地
ノ考方ト定メテ用ユ^トシ加^減ノ方ハ^熱有^子又^惡
寒ヲソユルニ^紫蘇^葉ヲ加フ^性強^辛ニ^牛黃^末ヲ加フ

疹乾テ如^子葉ニ^生地^黃ヲ加フ^熱ユル^ガ成^り登^し兼
ハ^陳皮^ヲ加フ^火薑^ニ有^ト見^ルニ^ハ木^通ヲ加フ^火
盛ニ^メ色^赤ス^ルモノ^有ハ^黃連^ヲ加フ^又色^紫ニ^シテ
麻^疹乾ニ^ハ連^翹ヲ^倍メ^用ユ^〇扱^テ方^中ノ^白朮
是^ハ心^乃々^々シ^ムト^云フ^ハ白^朮ハ^大キ^ニ其^ハ性
乾^クモノ^ニ麻^疹ノ^病ニ^乾ス^茶ハ^大キ^ニ惡^シ然^レモ
脾胃^ヲガ^シ補^フモ^又一^術ナ^レハ^カリ^ニザ^ク如^ル様
ニス^ヘシ^深山^ニ綱^合ス^ルハ^好テ^シカ^ラ又^クハ^蒼朮^ナト
モ^モ通^リナ^リ蒼^朮ハ^濕熱^ヲ燥^ス茶^ナリ^是又

麻疹ニハ何方ニテモ多忌ハシ是又心切ナリ故其
澤深モ小便ヲ通スル薬ナレハ過劑スルト多クハ麻
疹燥ス理甚是ニ依テ此薬品モヤムヲ好ムハ是ヲ
用ヒヨ灰ナクハ用ルルナカレ和漢氏ニ此疹ニモ升
麻葛根湯ヲ用テ表ヲ
發スル様ニスル是是ツ疹疹ヲ治スル定務
ノ治方ナレ氏病ニヨリ品ニ依テ相應多ク其意ヲ
足ハルル意勝之防凡通聖散ハ疹疹ノ序扱ヨ
リ如チワロフマテ甚ヨキ方ニ依テ石膏湯モヨキ

方ナレ氏中ニ半量扱ノ燥ス者其灰大キニ思ヒ何レニモ
疹疹ハ火ヲ散シ扱ヲ解スルト云フ四字ハ麻疹ノ序
扱ヨリ扱扱フ也治スルノ眼目ニト知ヒ防凡通聖
散是是之方ニ而テ疹疹ノ序扱ニ石膏ヲ使フ
心切アルル云フハ扱カ強クテウハコトヲ云
消之有者ニ石膏ヲ用ユハ是外ハ假令序扱ト
云氏云ハ去ハシ又防凡通聖散ニ依テ石膏ヲ加
テ大扱ノ方ニ用ルル是ハ石膏ヲ用テ若モカラス
ニ疹疹出齊后之方 疹疹ノ如毎トハ扱扱ワロフ

ナリニ皮膚ノむっろフ前ノ法トむっろウノ后ニ法ヲ
トハ又大キニ心持ノチカフ事ナリモチカウ程左ノ如シ
テ皮膚ハ是等モ云フ如ク六腑ヨリ出テ湯ニ属スル出来物
ニ在リモむっろウテテノ陽中ノぬこ血モムサレ津液モムサ
レテ乾クニ然レハむっろフテノ后ハ血ニモ津液ニモ潤シテ
骨子ハナラヌナリ又血ト津液トニ潤シテ骨子ハナラヌ
テスレテテ々熱毒モ盛ナレハ熱毒モ去ラ子ハナラヌ
ナリ然レハむっろフテノ后ノ療治ノ法ハ血ト津液ト
ニ潤シテ骨子ハナラヌ熱毒モ破ス様ニ骨子ハナラヌナリ是ヲ

ヲ滋陰ノ法ト云フナリ是ハむっろウテ后ニ療治ノ法ハ
之ニ至リ加味四物湯是レ其方ハ當歸芍薬白芍薬
陳皮芍薬の各牡丹皮右七味各等分脂ハむっろフテ后ノ
法ニ至リ此加味四物湯ヲトタイト定メ極々テトナシテモ
時々ノ様子ニ從ヒ熱毒ノ多クナリ別テ此薬ハ加減指
引ヲシテ用ユヘシ是ニテ大極ハむっろフテノ后ノ極ニ
テ治メるにチフ事ナリ加減ノ法アラク左ニ記ス若シ
テ皮膚ノ色乾クツヤナリ紫色ニ見ユルナラハ芍薬各
門々ヲ倍スヘシ若シ後凡ニ閉ル時ハ當歸芍薬連ヲ

加(之)申小便之閉強クハ本通地膚子車前子ヲモ
上ニ加(若連)ヲ去(レ)シ痔強キハ貝母丸裏仁ヲ加(ヨ)若
血目鼻口耳等ヨリ也ルニ有(一)角犀角ヲ足合(フ)ハ
火瀉同丸大熱有(二)石膏知母黄柏黄連ヲ加(ヨ)若
此是(ニ)テ胸乳ト(ニ)ラサル者ハ上(ニ)連翹赤通ヲ加(ヨ)痔
盛ナル者ハ白芥子薊苳犀角ヲ加(若)大熱盛(ニ)メ
衣ヲステ乳乳スルニ苦參龍胆草知母黄柏ヲ加(レ
ヨ)又日殺又六日モ(ニ)テ如(レ)け乳病有(ラ)ハ連翹苦茶
山梔子黄連升(レ)菴根芍薬赤色知母芍药耳(レ)

行(ニ)系(シ)十二味ヲ(レ)黄(シ)テ右四物湯(ノ)外別劑ト(シ)テ
頻(ニ)是(ヲ)用(ス)一(レ)是(レ)疔疔中(レ)乳(ノ)物(ヲ)以(ス)ル(ニ)也(ト)シ
疔疔咽喉腫痛之方 中(レ)地(ノ)黄(ノ)犀(ノ)角(ノ)茵(ノ)陈(ノ)者
は(ニ)本(ノ)通(ノ)升(ノ)黄(ノ)柏(ノ)芍(ノ)药(ノ)知(ノ)母(ノ)黄(ノ)連(ノ)ヲ(レ)用(ス)ル
何(レ)加入(ス)右(ノ)水(ノ)黄(ノ)之(ノ)服(ス)け(レ)方(ハ)疔(ノ)疔(ノ)序(ノ)也(ヨ)リ(メ)カ
セ(テ)之(レ)后(ニ)テ(レ)之(ノ)中(ニ)黨(ノ)痛(ノ)之(ノ)咽(ノ)腫(ノ)痛(ノ)者(レ)也(ト)是
ヲ(レ)之(ル) **吐(ノ)法(ノ)方** 瘦(ノ)牙 音(ノ)反(ノ)拉(ノ)搗(ノ)子(ノ)苦(ノ)茶(ノ)水(ノ)
花(ノ)名(ノ)等(ノ)ハ(レ)右(ノ)法(ノ)煉(ノ)水(ノ)黄(ノ)之(ノ)服(ス)け(レ)方(ハ)疔(ノ)疔(ノ)序(ノ)也(ヨ)リ(メ)カ
吐(レ)テ(レ)治(ス)或(ハ)黄(ノ)水(ヲ)吐(ク)者(ハ)烏(ノ)梅(ノ)山(ノ)梔(ノ)子(ノ)山(ノ)椒(ノ)也(ト)

多し水煎用之 疔瘡腰痛腹痛頭痛之方

紫葳大葛根大防風大浮萍炒火白芷中蟬退小
升麻小本白小大カ子小耳竹小以方ハ疔瘡熱一若後ニ
カハス腰痛腹痛頭痛之方以方ヲ用之ハ

疔瘡咳嗽之方 疔瘡凡寒ヲ強ク感咳喘スルヲ

治ス瘧人ニハ人多ク加フ瘧強キニハ半夏最妙栝枝
陳皮茯苓ヲ倍シ用之熱性兼有ニハ前胡ヲ加フ
之方紫葳陳皮半夏最妙葛根栝枝各一合

耳竹小 疔瘡之乾ヲ潤ス方 犀角地黄湯是ヲ也

馬車發

疔瘡之乾キ強キニ必ス以方ヲ用ルニ方紫葳葛根生地
黃犀角大浮萍馬薊鉉黃芩急母陳皮耳竹右レ
十味ハ前書ニ載ス煩熱強クハ石膏ヲ加フ或ハ差門
之方玄參ヲ加フルモ可シ

班疹頭痛之方之方獨
活絡紫葳最妙栝枝川芎茯苓栝榔子耳竹薑
蘇右九味ハ前書ニ載ス以方 班疹熱ト如キヲ
サル中ニ玄參頭痛冒節疼痛之者ヲ是ヲ用之
不食之者ニハ白朮一匕ヲ入ルモ以方 腹之方及在
熱之効ヨリ疔瘡疑似之方化毒ヲ用ルト云一也

そ効ナキニ時薬ヲ与フヘシ乃チ疔疹ナシハ疔疹ヲア
ラハス事速ニ

疔疹茶煎之方 防风 羌活 独活 川芎 白芷 荆芥 防风 羌活 独活 川芎 白芷 荆芥

芥知母 桔梗 大カ子 本通 独活 子 連翹 牛黄 甘草 木丹

強干人ニハ石膏ヲ加フ瘡人ニハ是ヲ去ルハ疔疹ニ瘡

熱之時是ハ疔疹ニ相違ナシト見ルハ即チ

疔疹ヲ用ユヘシ若クハ疔疹ニ通聖散ヨリ心用意ヲ穩ニ

そ効又奇ニ

疔疹色紅紫之方 疔疹色紅紫之方 疔疹色紅紫之方

極山 梔子 大カ子 荆芥 知母 石膏 桔梗 玄參 木丹

右九味水煎之 服ス 疔疹ハ疔疹ハ疔疹ハ疔疹ハ疔疹ハ

疔疹ニハ色カキ潤ナリ火ニ盛蓋モ又盛ナルモノニ用ユモ

比黄 紅花 三味ヲ加ヘテ用ルモ可シ大キニ効有リナリ

疔疹腫痛之方 疔疹腫痛之方 疔疹腫痛之方

各ニ分チ麦門冬ニ一各 右水煎之 服ス 疔疹ハ疔疹ハ疔疹ハ

疔疹腫痛之方 疔疹腫痛之方 疔疹腫痛之方

ト飲スル時咽喉痛不能食治ス

喉痛之方 喉痛之方 喉痛之方

七味 桔梗 七味 防风 羌活 独活 川芎 白芷 荆芥

布ニ包テ食ムニ付疔疹ニ瘡者ハ疔疹ニ瘡者ハ疔疹ニ瘡者ハ

カハワルニ有基ナリニ付サニ疔疹ニ瘡者ハ疔疹ニ瘡者ハ疔疹ニ瘡者ハ

出スレハ血出しハ恙ナシ滅ク神妙ニ効有 レ疹カセ

ルヲ牽キテ之方 レ疹カセ 薑蕪大牡丹皮甲午玄参小

犀角一角小升テ小右六味水煎之脂スレ方ハテ

疹既ニ出テ二日ヲスキテカセル能ハサル者ニ是

ヲ用之中ニ虚熱有付ハ必スカセ口延引スル者ニ

矢血之方 レ疹カセ 犀角大犀角中茵

蘇小升テ小若及小若枳椇小右水煎之脂スレ

方ハ疹カセ口ニ^臨テ矢血之症候ニ付方ヲ用ヒ

其効如神 レ疹吐浮之方 レ疹カセ 又ニ熱有テ泄浮強

症ニ^候氏カ白本散ヲ用ルヲ家傳トス又吐浮トモニ有

ニ^ハ藜蘆香正気散ヲ用テヨシ食傷ニハ不換金正氣散

ニ山查神曲ヲ加^ハ或ハ炒仁并ヲ入レ煎之服メモヨシ

レ疹痢病之方 レ疹カセ 藜蘆香正気散香附子茶

本厚朴山查川芎羌活砂仁青皮白芷陈皮

耳竹右十三味水煎之脂スレ方ハ痢ヲ兼ル疹ニ

用ル方ナリ又一方有青皮厚朴枳殼藜蘆香白

本蒼朮砂仁芍薬右水煎之^レ方モ又疹之

痢ヲ治スル方ナリ レ疹舌瘰之方 レ疹瘰

之毒ノ舌ニ集リ舌癢トナル者有邪言錢氏白
本散金銀花一味ヲ加ヘテモ効神如又方蒲黃
一味舌ニ又ル神効有又方烏賊骨炒紫萸石二
味細末ニメ舌ニツケル
舌癢浮腫之方 陳皮猪
苓澤瀉茯苓白朮各一匁木仇厚朴神曲枳櫛
子各七匁香附子八匁大腹皮六匁蒼朮一匁牡丹
之右十二味長流ルヲ用テ茶漿服ス舌癢後ニ
ハ浮腫ク疔多ク有者ハ湯洗ニ付茶ヲ用テ毎夜
大効ヲ得ル信テ此ニ是ヲ記ス
舌癢後耳膿水

ヲ出ス方 之方防凡滑石之右山梔子酒炒之右
香茅葉連之右牡丹之甘草葉之右牡丹一匁之右
七味細末サニテ用ユ又茶漿湯ニテモヨシ
舌癢後
吐虫之方 之方茯苓砂仁薑苳仁枇杷葉
白皮各三五沈香杜中木大腹皮陳皮一匁之右石
斛酒炒一匁神曲枳櫛子白豆蔻各八匁白朮
丁子各六匁耳科一匁五味子七匁青皮六匁藿香
之右各一匁右十九味各等分用酒上俾シテ右嘉加木
散ヨリカタル方ニ嘉加木散ハ膈噎反胃之様ナル

病ニ用テ能効を方ナリけ心ゆ以テ方ヲ用ニ
弱キ人ニハ人多ク入レ用ヒヨ

疔疹後腫年トナリシニハ孫氏白本散ヲ用テイカニ

モ能年ヲ通スルナリ又外治を方 蛇蛻虫ヲ取リ

麝香ヲカミ入レクタノ中へこ茶ヲ入レ強ク耳ニ吹

入レテ之妙有甚後香油ヲサシサシ入レテヲクヘシ

疔疹後声啞を方 こを方 路已大地骨皮中苦蕒

中 枳殼中 荊芥大カ子之小 右七味多 煎シ服ス

疔疹後ニ口閉啞ニタリタルニハ汁方ヲ用ニ一医学子

細目ニ出タルナリ 疔疹後浮腫之方 疔疹後胸腫

シテ小便通セサルニ藿香正気散ニ赤小豆ヲ加テ

服ス必更ニ又加減胃苓湯モヨシモ方 陈皮猪苓澤

泻木乳白木厚朴山查子各七分 蒼木甘草各二分

右二分ハ半井先生之他ニ一透眼ニモ亦是ヲ出ス

燈心十本入テ多煎シ服ス 疔疹後之浮腫ヲ治メ

神効有方ナリ 疔疹後咳嗽喘急之方

之方 黄芩玄参貝母麦門冬 木花粉 黄連 桔

梗 白芍 紫各二分 且竹小付方 疔疹後声啞

して不出或は咳嗽喘急して苦む者ば是は
之レ 妊娠ノ疹之方 是方 前出如ノ加味四物
湯ニ升テ黄連砂仁ヲ加ヘテ多量ニ服ス若シ妊娠
胎氣ヲ干シト欲スルト是レ時ハ猪テ根搗搗散
ヲ加ヘ甘草ヲモサシ加ヘテ服ス右ハ妊娠中ノ疹ヲ
出スノ主方也 ノ疹後不食之方 是方 四物湯ニ神
曲砂仁陳皮升テ杏仁カクヲ加ヘ茶葉ニ服ス右ハ疹
後食不進者ニ是ヲ用ル時ハ能食ヲ進ルナリ妙方
ナリ ノ疹カビ之方 疹後スレニ出テ二兩日ヲスキ

テカスルヲ能ハサル者ハ内蔵ニ熱有ニ依テ之前ニ如ス
処ノ加味四物湯ニ疹之妙方也 ノ疹日殺ノ定法
古書曰麻痺之日殺七日ニメ熱退キテ疹ヲノ
ツカラ没メ氣ス定殺也 瘰癧之肝心ハ五日六日
ノ兩日ヲ以テ大事ノ日トス ノ疹吉凶目的 疹
疹先ニ如テ熱後成ルハ不順ナリ是熱メ后テ
疹如ル者ハ順ナリ 疹疹瘰癧之方メ疹如ル
クテ疹如ル者ハ順ナリ 有是吉神也又ハ疹濕
有テ多浮吐虫便閉スル者ハ大事ヲナス又始メ

ヨリ大熱有之七日に至テ其熱おぬセサル者ハ十二日
十三日ハ西日ノ中カナラス死スル也又疹後熱ハ疹
大便秘スル者ハ大事ナリ三黄丸を投テ之ヲ下スヘシ○
疹後熱ハ多ク小便閉塞スル者至テ難症也
○疹後出テ黒クカワイテ大渴引飲ヲ者ハ大熱也
又疹後出テ飽食之者大熱也又疹後之右根症
ハ難症ナリ又疹後熱ハ多ク小便ヨリ血ヲ出シ或ハ
下血或ハ衄血有者大熱也疹後出テ忽チ内攻胸
乱喘急スルハ胃タレシ大難症ナリ疹後五六日メ

ニテニハカニ飽食スルハ害ナシニ疹六日メニおテソロイ
七八日メニテ没シ熱ヲナス又何れ疹ス疹凡ソ日
致八月ニテカセル者ハ疹後之首尾トシテナル者ハ

疹後咳嗽咽喉痛之方 疹後ニハ多ク熱

毒上部ニノコリテ咳嗽或ハ咽喉之痛病人多ク
多キ者ナリ早ク治セスハ一生ノ病ト成ヘシ左ノ方ヲ
服スヘシ 疹後咳嗽神方 芍薬五味子
桑白皮 芩芩 桔梗 干生薑 枳實 白朮 甘草 貝母
右九味蜜子リ生薑ノ汁子汁ヲサシ加ヘ白湯ニテ

是ヲ用ユ **二** 痲兒難疹 **一** 小兒常ニ血ヲ喰土ヲ喰

ケキノ 硫黄ナトヲ喰症ニテ疹ニカレハ難疹ト成ル

病多シ此症心ヲ(シ)キヨ兒ニハ冬多難飲ニ人々ヲ

去リ多病ノ者ト加用ヒ(シ)又冬多難飲ニフク

ワイオヲ(シ)テ、醋ニテ煮シメシ(シ)ヤイテ是ヲ加テ

用テヨシ **二** 疹後咳嗽浮腫之方 **一** 其方陳皮及前

胡素白皮各大落苧小凡搗仁小蘇子中桔梗中

右八味蜜ヲ以テ子リ用ユ又右ノ方ニ前胡ヲ去リ、

五味子ヲ加テ用ル方有クシタイ玉搗ニ出タリ右家

方ニ疹之後咳嗽浮腫有者皆能治スル大神方ナリ

二 疹諸症之方 **一** 二ノ疹之病付ハ癰腫惡寒痛

身痛咳嗽噴嚏鼻流清テイヤアクヒ咽痛腫

中驚悸目淚ヲソク右ノ如キハ皆ノ疹ノ病付ニ

有症ナリノ瘡瘡ノ症ト多クハ異ナル者ナシ

但シ咽痛ノ一ツノ疹ニハ有テ瘡瘡ニハ無シ是ラノ

処ホウソウトノ區別ニテ餘ハ替ル者ナシ **二** 疹禁忌之方 **一**

ノ疹ハ凡寧ヲ嫌フ者ナリ一度ノ疹ノ邪ノ疹ニ加ハ、

ル時ハ忽チノ疹毒内攻シテ大變ヲ生スル者ニ故ニ

...

之疹ニハ風をテ避ルヲ第一ノイニシメトナス（レ）〇次
魚肉一切クナクサキ者ヲ禁ス（レ）魚肉ヲ喰フコト
早キ時ハ疹后ノ餘熱忽々集リテ目ニサワリ咽
集リ咽喉痛ト成走馬下疳ト成眼病ト成或ハ
腫物ト成ル甚キ者ハ舌ヲ舌ヲ喰フコト大病ト成
事甚多シ故ニ魚肉ヲ喰フヲ亦ニ禁ス（レ）

疔疹薰方 クシロクシヲウ 爵金茵蔯神代松カ
ノフシ右各等々 細末シ蜜ニ子リ 塩ヲザシ入レタク
（レ）能邪ヲシラソクル也 疹毒ヲ瘡之年 疔疹ハ

天地ノ間ノ一之邪氣ニシテ天行温エキ之類ノ一種
ナリ其邪毒口鼻ヨリメウチニ入ル如キ半表半裏ノ
有リト云ハ表ニ発シ七八日ヲ経テ中腸胃ニ入り裏
症ト成ル浮下ヨリメ毒ヲ瘡ノ一年中諸國ニ
行ハレテ不斷ニ有ト其氣異ナリ大抵二十年二十三
三年とテ一度行ハル、毒氣ハ是地中ノ毒氣ニ
ト云ハレタリニ不斷ハレサル毒氣ハ亦細ハ赤ク若
瘡門ニ於テ地中毒氣ノ説ハ詳ニ是ヲ示スハ併
セ見テ之理ヲ明（レ）也此ニ疔疹之毒ハ熱ニ偏シメ

空ナル者ナシ其餘毒トナル者ハ表ニ発スルヲサク
七八日或ハ八九日に至テ浮下セサル者必ス餘毒有テ発
スルヲサクシテモミテ終ラシ能浮下ル者ハ疹毒浮下
ヨリ毒ニ云ルハ浮下有疹ハ餘毒ハナキ事ナリモ
発スルヲサクシテ浮下セサルハ必ス餘毒有テリモ発
スルヲノサキ者ハ疹ノ輕兆ス中氣弱クシテ発
スルヲノサキ者ハ浮下セサルモ中氣弱クシテ元
氣を邪毒ヲ製スルヲ能ハスニ疹毒力中ノコ
リテノコリメナリニミテ疹ノ膏癩ハスルナリ也ト云

疹ト云フ場処ハ一時ソレナリニスメレ或ハ年々或ハ一
年或ハ三年ノ後ニ疹毒腸胃ノ中ニ發動シテ上
心肺ニ至ルニムスホレ遂ニ咳嗽潮熱ヲ發シ必ス疹ニ
發スル者有此疹トナラサルノ前兎角氣ムツカシク
人ニ面射ヲ好テス一空ノ中ニ靜坐シテモ獨^愁シ^キ或ハ
思多クフニハツ取コシニ物ヲ苦クシ或ハ泣ニモ笑ニモ皆チ
ヨウシハワレニクレセワメキテムラモミ其ヨリ疹^毒ノ
瘦カワキテ遂骨蒸ヲ熱ヲカモシナスナリ也
疹毒ノ瘡ト云フニ潤燥湯ニ角犀角

ノ類ヲ用テ療治忽ルハカラス麻痺ノ病古ニナク後
世ニ出ツル毒古ニナク後世ニ生ルル瘧疾ノ
古ニハ重クメ後世ニ輕キカ如シ是天地ノ氣古ニ依テ
其變ヲ異ニスルコト瘧疾瘰癧外國ヨリメ其氣傳
セシム絶者ト異ナル処ニ治方亦瘰癧門ト併セ見テ
考フベシ

瘧疾瘰癧微汗衄血吐浮之并 疔瘡
瘰癧之中吐浮微汗衄血此四ツ之瘰癧熱中亦有ハ
至テヨキ事ナリ必ス衄モ吐浮モ汗モ出ルベシ此カ也
疔瘡ナクハ瘰癧ナトナリ以テトメントスルハ至テ惡キコト

其ニサイハ痲毒カ吐浮ニ依テ上下ヨリ毒ヲモラスハ
其通リナリ毒血中ヨリモラシ去ナリ至極ヨキ事ナリ
必ス瘰癧治タテスハカラス微汗モ亦モ通リ微汗有耐
ハ疔瘡瘰癧ニ發シ安ク毒ヲノコラス二兩日ノ中ニ發シテ
シコウ吉症ナリ是モトメタテスレハ甚惡シ必ス出ルハ
出ルニカセテ其候ニステナク事有治ク治ナリ是ノ四
症ハ瘰癧ヲ治スル心ナリ者ニ瘰癧毒ニ時ニモレ
去ラスメ腹内ニノコルハ每々生ヌル如ク生ヌル患トナル
コトニテ思キ

瘰癧衄血湯之方
衄血ハ今モ

云フ通り序熱之血ハ苦カラス至ニ厥而テ之后
 至テモ度ク血スル者ハ是ハ葉ヲ以テ血ヲトムシ血
 血湯之ヲ主ル犀角一匁當故若葉之也 **阿膠** 三匁
 生地黄 四匁 右五味ハ葉ニ温服ス **偏身大熱湯** 下
 疹屬之后忽チ偏身大熱スル者ハ是餘毒ナリ
 此方是ヲ主ル當故連翹若葉各一兩半柴胡若葉若
 之也 牛蒡子一匁 甘草 右八味ハ葉
温服ス **序熱咳嗽湯** 全冬 牛蒡子 茯苓 荊芥
 貝母 瓜蒌 桔梗 陳皮 厚朴 芍藥 各一匁 右十味

此方温服ス序熱之内咳嗽至テ是者ハ此方
 ヲ主ル厥之后咳嗽スル者ハ食物辛温醋漬ル者
 忌シ是ハ皆毒ヲ引シメテ咳嗽有者ニ宜シカラ
 ナル食物ハ宜シク忌ム○下疹序熱之中又再ヒ
 同症ニナカサレテ咳嗽スル者ハ咽喉腫痛スル者モ又
 此方是ヲ主ル **咽喉腫痛湯** 桔梗 七匁 牛蒡子 一匁
 黃芩 一匁 竹葉 一匁 甘草 一匁 右六味ハ葉ニ服ス若
 序熱咳嗽湯ハ序熱初起之方ニ此方ハ疹毒
 カレニ升リセメテ **咽喉腫痛** 之口舌瘡ヲ生スル

者ニ此方ヲ用ユ(キ)ソウハケカシラフニ湯

犀角一匁 牡丹皮一匁 紫石英一匁 雄黄一匁

犀角一匁 荆芥連翹各一匁 且炒一匁 右九味

多量ニ服スフコトニ者ハ石膏四匁ヲ加フ

テ瘡之毒口舌丹毒ヲレメテ毒動キハクキ

タシコトキ者ハ丹毒忽チ又ケ去ルコトソウハ

ケカント云フコト是テ瘡之熱毒カ陽的ニトコウ

テ毒系升リ瘡之レ方是ヲ至ル牙

血散 雄黄一匁 文蛤一匁 溺白濁一匁 枯礬一匁

薄片ハ右五味極細末トナシテモ牙齦黒爛之處ニ

是ヲ又ルコト是ソウハ下疳之又リ也

素白皮 荆芥 地骨皮 落萐 牛亭子 玄参 各一匁

其外ハ生薬ニ右八味ハ蒸シ温服スルコト瘡

見点之時服コウコト如クニメ涙多ク或ハ眼中

赤シ赤キ者ハ是テ瘡ノ定レルニ極ニ弱キニ症ニ

相ク多ク瘡腐后眼中赤キ者ハ凡熱之升

改シ時方是ヲ至ル又眼閉テ開クコト欲セサルモ

又レ方是ヲ至ル眼閉ル者ハ更ニ連翹本通

加^フ眼目腫痛湯 生地黃 芍薬 木通 牛黄

右七味 芍薬 芍薬 芍薬 芍薬 芍薬 芍薬

右七味 芍薬 芍薬 芍薬 芍薬 芍薬 芍薬

小便赤ク澁ル者ハ下焦之熱也

小便不通湯 芍薬 芍薬 芍薬 芍薬

大黃 芍薬 芍薬 芍薬 芍薬

十九味 芍薬 芍薬 芍薬 芍薬

ヲ用テモ通セサル時必ク大便ヲ通ス

スル時ハ小便モ亦從テ通スルノ理有

眼胞赤爛湯 芍薬 紫胡 生地 芍薬 芍薬 芍薬 芍薬

荆芥 羌活 芍薬 芍薬 芍薬 芍薬

一箇后眼胞赤爛スル者

湯 芍薬 芍薬 芍薬 芍薬

半量 芍薬 芍薬 芍薬 芍薬

下痢膿血湯 芍薬 芍薬 芍薬 芍薬

芍薬 芍薬 芍薬 芍薬

泄瀉湯 芍薬 芍薬 芍薬 芍薬

芍薬 芍薬 芍薬 芍薬

蒸之温服之 于疹厥而后泄泻痢下ナル者は

是ヲ宜ル 妊婦安胎湯 之方 玄参 一钱 石膏 一钱

牛蒡子 荆芥 防风 羌活 独活 杏仁 各一钱 且 44

之右九味 水煎之 温胎之 妊婦 于疹初起リル

トシテ 凡ハ 痒熱 煩悶 等 者 皆 是 方 宜ル 胎初

不安湯 之方 玄参 一钱 黄芩 一钱 芍药 一钱 川

芎二钱 白朮 一钱 右五味 細末 方寸匕 水服 于疹

中 妊婦 胎動 不安 者 皆 是 方 宜ル 細末 煎

之 妊婦 安胎湯 トシテ 一服 妊婦 于疹 焦黑

湯 于方 中 地黃 一钱 麻角 セントカリ 大子 鎊 一钱

黄連 一钱 黄芩 荆芥 之方 玄参 一钱 芍药 一钱

之ハ 紅花 一钱 右九味 水煎之 温服之 妊婦 于

疹 初起 乾枯 焦黑 スル 者 皆 是 方 宜ル 妊婦

胎初 不安湯 之方 枳椇子 細末 トナシ 芍药 根

女用 之 二味 湯 之 煎 之 水 宜ル 之 凡ソ

一切 燥熱 之 薬 宜ル 于 疹 二モ サワリ 又 胎ヲモ

傷ルナリ 亦 是 方 宜ル 細末 之 薬 宜ル 用 之

宜 如 癰 湯 婦人 于 疹 初 起 欲 之 亦 出

寒熱往來瘧ノ形之如ハケイスイ適々ツ者
 是ヲ熱血室ニ入ルトステ疹必起瘧之類ニ氣ノ
 干疹乾枯焦黑湯ヲ用ヒ后小柴胡湯ヲ用テ
 是ヲ和ス **血毒行湯** ス(テ干疹汗出ル者ハ
 毒汗ヨリ起シ又血スル者ハ毒血ニ從テ解ス
 之ヲハ舌微ナリアワテ、是ヲ止ムルハ惡シ毒汗之
 多血モ多キ時ハ是ヲ別ニけテ之ヲ至ルモ
 多キ者ハ **右七味** 水煎之 **凡疹丹毒**
 熱地黃多シ **右七味** 水煎之 **凡疹丹毒**

湯 之方牛亭子妙之義 荊芥天羅麻升干防凡各
 一或甘草芍藥 右七味 水煎之 凡疹丹毒 下 熱
 未タ不愈或ハ已ニ出、熱未タ不解毒在臍成陰カ
 ク不利疹嗽眼赤或ハ凡疹丹毒ヲサシハサムモノ
 けテ是ヲ至ル **凡疹丹毒湯** 干疹初テ出唇色
 淡白ニ便赤之如ク起瘧之難キ者ハ中氣之
 弱ナリけテ人參多シ善ヲ加シ是ヲ至ル **凡疹丹**
毒湯 干疹已出外凡疹ニサシラレ疹邪内攻
 之ヲ早クカセル者又けテ方ニ用テ少シ葱白ヲ加フ

熱腹之毒トナル者ハ吉ナリニ云キ者ハ
ク黄寧山甲ヲ加フ急ニ治セザル時ハ必ス内攻
喘脹シテ死ス **凡疹丹毒湯** 凡疹瘡癩ヲ
サシハサム者ハ湯(主灸)ヲ加用之於腹ニ時
ハ凡疹之毒ヲ起スルヲ起スルヲ起スルヲ起スル
凡疹丹毒湯 之ヲ桂枝ニ或ク黄一錢ニ芍藥
凡荆芥牛蒡子川芎桔梗玄參升麻
各ハ五分丹之ヲ生薑五分右ニ味ハ急ニ腹
ク疹癩トボウスル時次右ニ爲ニ閉塞セラシ

如葉ル者ハ方ヲ主ニ **爲根解肌湯** 方爲根前
胡荽荻連翹牛蒡子芍藥蟬退赤通玄參右
九味之ヲ湯ニ入テ之疹癩癩癩ニハヒテ癩
熱シク熱カサテ又写テ入テ熱スル者或ハ朝ハ醒
テ暮ニ熱シ暮ハ醒テ朝ハ熱スル者或ハ初癩之熱邪
カ始終ホカトト醒者如此症ニハ爲根解肌湯
宜トス○凡疹癩スル時ハ節ノ風寒ニサエラ
レ疹癩之色白如肌ノ膚粟起スル者爲根解
肌湯之ヲ主ル凡疹癩スル之寫テハ微汗有テ

コレトス 微汗スル時ハ邪ノ氣色ノ宜ヨリモシ去テ
解シ安シ恙ニ凡 熱無汗皮膚膏乾燥スルモノハ
必ス凡寒ノ為ニサエラシテ疹出難ク多ク内
攻ヲナス者ニ葛根湯肌湯ニテ至ル〇ニ疹之
初起吐瀉交起ル者ハ順之ニ吐不吐乾咽スル者ハ
逆ニ是ノ胃中ノ熱邪外ニモルニテ以テカカ
葛根解肌湯ニテ至ルニ疹多キ者ハ貝母瓜
蒌根ヲ加フ
清熱透肌湯之方 玄參一匁 犀
膏一匁半 牛蒡子 荆芥 防風 薄荷 葛根 杏仁 各一

其料ニテ 右九味各煎シ脂ヌ細テ疹初熱之時
ニハ必ス面赤目赤淚多ク咳嗽不絶咽痛者ハ
是ニ疹ノ持来ナレハ苦ニカラス者ニ始テ熱
テ疹ステニ也 熱サシモ不醒者ハ是ニ病必重ニ
清熱透肌湯ニテ至ル〇テ疹順症ハ是色紅
潤ヲ貴フニ形トカワテツヒユルヲコレトス 若色紅潤ト
云ヘイタキ不起ニ便秘スル者 清熱透肌湯
ニテ至ル〇テ疹已也 煩熱強甚ク急喘息ス
ル者邪熱不除内攻セントスル之症ナリ 清熱

透肌湯是ヲ至ル〇テ疹癢極ニ七日に至テ必
或ハ十五日ニメ出或ハ忽チ涼ク忽チ熱シ或ハソウ極
日ヲ過テ不退者清熱透肌湯是ヲ至ル

煩燥喘脹湯之并 之黄桂枝其芍杏仁生

姜大枣之膏右七味水煎之温服ス之疹出
トスル時折シモ凡塞ハケシク或ハ病人ハ夕カニサリテ
身ニ定メテウケ塞邪色ノ穴塞クヨリ熱外
モル、夕サレズモシヨリ喘息脹鼻息ア
煩躁スル者ハ是ヲ至ル此症煩躁喘脹鼻

息アラキ者惟ニ黄杏仁石膏其芍四味ヲ以テ煎
湯トナシ服スルモ可之但此ニ方ヲ用ル目的ハ塞
邪色ノ穴ヲ開ルト云フ病因ヲタシカニ見ト、ケタ
ル上ニテ鼻息アラク煩躁喘息スル者ハ是ヲ用
テ若シカラズ必ズ鼻息常ノ通りニカヨウ者此
症ニアラス〇然レモ此症ヲ見定メテ用ユヘシテ
鼻ノアタルヲ鼻扇ト云フイキレノ強キ症ハ肩テ
息ヲツキ鼻ヲヒコトアチラス者有乃チ是ヲ用
症之ハ是ヲ終ク得ラヌ様見ト、ケテ是ヲ用

事肝心ノ心切シ

白虎湯方

知母二錢石膏

二錢甘草四錢粳米一握右四味各煎之温服之

テ疹ステニ出ント欲シテ不化皮膚乾燥大
ニ煩渴熱不退者此方是ヲ用ル
心切大熱有テ大渴スル者此方用ル目的トナ
スシテ又白虎湯口変ヲ以テ是ヲ決ス
疹赤雲ノクナヒクカ如ク肌膚片紅ヲナス者
皆是大熱ノイタス処ナリ煩渴スル者ハ白虎
湯ニ玄參ヲ加ヘ是ヲ用ユシテ疹大

熱ニ倍テ毒腐メモレス肌膚乾燥ニテ出難ク唇舌
燥キサケニ便秘結スル者白虎湯ニ玄參牛蒡子
山梔子各等分ヲ加ヘ是ヲ至ル〇疹出ル時班癩
綿紋之如ク或ハ膿血ヲ出シ心煩胸悶清血ヲ吐
吐スル者白虎湯ニ茅根白朮ヲ加ヘ是ヲ至ル〇疹
疹出ントスル時皮下隠クトメ紅紫表ニ出難ク
見ユル者ハ熱毒ノ盛ナルニ或ハ疹ノ色黒ク
シテイタキ起或ハ大便秘結ニ或ハ唇舌大
キニ赤キ者ハ熱邪内鬱ノ候トス白虎湯ニ

至多^ク荊芥ヲ加^ヘ之^クナ^ク〇^ク疹出^レトスルノ
時熱毒^ノハ煩躁服^レ脹^レ不知^ル者白虎湯ニ
テ黄^ニ玄^ニ參^ニ升^ニ麻^ニ黄^ニ芍^ニ加^ヘ之^ク是^レヲ至^ル〇^ク疹^ノ序^ノ熱
ノ時證^諸多^ク者ハ熱邪ノ内伏ナリ白虎湯
ニ^テ黄^ニ荊^ニ芥^ニ牛^ニ膏^ニ子^ニ子^ニ加^ヘ之^ク是^レヲ至^ル〇^ク疹^ノ序^ノ熱
ノ方^猪苓^ニ澤^ニ浮^ニ白^ニ朮^ニ茯苓^ニ加^ヘ之^ク是^レヲ至^ル〇^ク疹^ノ序^ノ熱
右四味^ハ疹^ノ熱^ノ腹^ノス^ステ泄^レ浮^ル者ハ疹^ノ序^ノ熱
常^上便^ナレハ苦^シカラ^ス疹^ノ序^ノ熱^ノ時^車
便^至テ^赤ク^至テ^赤ク^見點^モ多^ク見^ユル^ナラハ

常候トテステ^クヘキ^ニ非^ス四^各散^是ヲ至^ル或^ハ滑
石^ヲ加^{フル}ニ可^シ加^味平^胃散^ノ方^蒼朮^ニ
厚朴^一皮^陳皮^連翹^着根^各一^錢半^母炒^ハ
生姜^半疹^出テ^后自^利止^テラ^カル^者ハ惡^候ト
久^シレ^ハ疹^序熱^ノ遍^身稠^滿或^ハ紫^紅色^{ナル}者
ハ毒^腸胃^ノ中^ニ有^リ自^利スト^云ニ^ハ多^クハサ^テ
タ^ケナ^キ者^ニ加^味平^胃散^ニテ^アシ^ライ^ヲク^ヘ
〇^ク疹^ノ序^ノ熱^ノ之後^ニ至^リ泄^浮止^テラ^カル^者ハ毒
ヲ^キサル^カ者^ニ加^味平^胃散^ニテ^アシ^ライ^ヲク^ヘ澤^浮

ヲ加ヘテ冷シテ是ヲ自利スルニ必ス訶子肉豆蔻
等ノ滋養ヲ用之(カラス) **理中湯之方** 人参

耳科白朮乾姜各五分 右四味水煎服之
疹出后自利ト、之ヲス等之ニ属スル者ハ理

中湯是ヲ至ル **泄瀉之方** 診法ス(テテ)

疹之泄瀉者実ヲ知法泄瀉之時肚門ニ熱キ
多味ヲ是ク或ハ肛門痛ム者ハ是必ス実之症

ナリ熱症又痛モナリ熱キ者味ナキ者是
ハ虚症ナリ之ヲ引解セ考フル時ハ是也

実ノカルヘキニ非ズ **大青湯之方** 知母五分 石膏二兩

耳科ニ至 山梔子 大青各五分 通荆芥 牛膝

各五分 右十味水煎服之 凡チ疹發

秀ク時頂程ハ赤赤ニシテ乾燥之感ハアノ黒潤

クナリ煩燥喘急スル者ハ是危キ症ナリ

是ヲ至ル **班龍湯之方** 生地黃一兩 鹿角尖スリ

一匁 黃連五分 芍薬 荆芥 各五分 右五味水

煎服之 凡チ疹發之時頂程ハ赤赤ニシテ乾燥之感ハア

こころにユニタクナキ者こそ毒ヲ活スルニ宜シキ者ナリ
至ル涼膈散之方 薄荷 甘草 山梔子 苦杏仁
大黃 芒硝 枳椇 山梔子 苦杏仁
右八味を煎服スル者熱毒塞テ血液乾
時ニ至ルテ大便秘結スル者熱毒塞テ血液乾
潤流シ安シ是テ疹ノ大ニ忌ム処ニ付テ
至ルス(テ疹ノ疹點ヲ見ニテヨリ 癩癩ノ時
至テテ偏身青腫ソウ熱腫滿脹喘急
スル者ハ是毒滯リテ血凝子毒カクレテ甚

危キ症ニ涼膈散ニ芒硝ヲ去リテ黃石膏ヲ
加フス(テ疹點ヲ見ニテヨリ 癩癩ノ時ニ至テ疹
脹喘急小便澁リ臍突出スル者ハ甚々危キ症
ナリ涼膈散テ壓テ加フ是ヲ至ル〇ス(テ疹
初起ヨリ 癩癩ノ時ニ至ルテ汗下甚々虚煩津
液枯涸ニ心煩氣逆スル者ハ竹葉石膏湯ニ
至ル 竹葉石膏湯ニ至ル 竹葉石膏湯ニ至ル
軍實 人參 麥門冬 日杓 梗米
一更 右七味を煎服ス〇ス(テ疹熱ニヨ

り一箇に時ハ至テ喘多キ者ハ熱邪胸中ニ塞ル
至るに時天志定テテ存定と云々の中ニ
甚^カル者ハ純ハスシテ喘スル者ハ竹葉石膏湯
黄^クヲ加^フ之ヲ至ル^ル〇スベテテテ存イタ^キ起^リヒト
シク^ク至^レト大熱ハ退者ハ竹葉石膏湯
半夏ヲ去テ^テ荊芥^ノ玄^ノ免^ヲ加^フ之ヲ至ル^ル 半夏
条^ノ竹葉石膏湯^ノ半夏多クハ去^ルニ宜^シ其
シ^イハ半夏^ハ性^ノ乾^ヒテ血液^ヲ乾^シテ瘕^ヲ
乾^スノウ^レイ有^ルニ多クハ去^ルニ宜^シ白朮^ノ蒼朮

湿平

扶^モ補^テ温^ヲモ^ラシ血液^ヲ乾^シテ毒^ヲ塞^ノウ^レイ
有^ル茶^ヲレハ多クハ去^ルニ宜^シ又^ハ一ツノ心^ハ也^シ
芍^ノ胶^ヲ艾^ヲ湯^ノ方^ノ 川^ノ芎^ノ阿^ノ膠^ノ其^ノ方^ノ 艾^ノ
芍^ノ女^ノ解^ノ之^ノ方^ノ 芍^ノ茶^ノハ^ハ乾^シテ瘕^ヲ一^ニ右^ニ也^シ
味^ハ苦^シ胎^ノ娠^ノ婦^ノ人^ノ胎^中之^ノ痛^或ハ瘕^ヲ
熱^ハ也^シニセ^メラ^レテ^テ帶^ノ漏^崩下^スル者^ハけ^テ方^ノ之^ノ至^ル
紫^ノ蘂^ノ和^テ之^ノ方^ノ 芍^ノ女^ノ解^ノ川^ノ芎^ノ芍^ノ茶^ノ人^ノ參^ノ等^ノ
菴^ノ陳^ノ皮^ノ大^ノ腹^ノ皮^ノ之^ノ方^ノ 母^ノ科^ノ之^ノ生^ノ姜^ノ之^ノ方^ノ 右^ノ九^ノ味^ノ
之^ノ方^ノ 胎^ノ前^ノハ^スベ^テ

先ツけりヲ用テ加減指引スベシ **胎氣上衝之方**

枳椇子一味ヲ細末トナシ茶根艾葉之類蒸湯ヲ

以テシキリニ是ヲ進ムヘシ○胎氣上衝トハ妊婦

之ノ人疹熱毒ニ依テ胎力上リ衝テサワクヲ云フコ

熱入血室之方 スベテ婦人ノ疹ニハ經氣ニナル

カナラハルカケニツク同フベシ○經氣之時疹ヲ

患ル時必ス熱入血室ニ入テ室熱淫毒癰之形ノ

如ク病ム者こそ時ハ小柴胡湯ニ加減指引シテ

是ヲ用ヒヨ熱入血室ニ條ヲ保セ是ヲ治施スヘシ

榮毒外入湯之方 升テ三錢 葛根芍藥甘草

生姜一錢 右五味水煎服ススベテ疹之序

熱一過ク者ハ晝夜ツケテ依テ加減指引シテ

是ヲ用ヒヨ **蟬退散之方** 升テ蟬退之類

皆用テ拮楸之類葛根芍藥甘草

活耳炒各三錢 右十味水煎服ススベテ疹之

欠喘咳咽乾眼澁或煩躁鼻息粗眩中

數疹ヲ傳四肢懈惰者此方ニテ **榮毒湯**

之方 葛根升テ各八分 活耳 拮楸 各三錢

時ハ荊防敗毒散ニテ是ヲスヘク又大便秘
結ト見ル時ハ桑葉ニ合シ上部ニ毒ヲ
解サレトスル時ニハ涼膈散ニ合シ如此
種ノ様ニ加減ヲシテ一方ヲ以テハタラカス
ト人々ニ考テ其耳免角此一方ヲ以テハシラタ
テトナシテ随分十二八九間ニ逢事也ソレニテモ
難治ク症ニテハ間ニテハサル事モ有シ其時
右二部ニ考テ其考テハハセテ療治スヘシ是テ
疹ヲ治スル大段ニ心付シ今テ疹ニ治療補

蓋之為ニ右二部ニ書ヲ折中和合シテテ疹
治療ニタスケトナサシムル者也

時の新語... 結ト見... 涼腸... 種く様... 難治... 心... 右川...

