





九折堂山田
氏圖書之記

水腫口授并治方

凡水腫ラ治スル方初発ノ時水腫ノ氣味ヲ観ヘ夫グタレクニツノル時ノ療治ノ鳴方ハ小便ヲ通ス方ヲハ先治ヘテニ一ズ其水腫ラ十方ニツノラセテラヒテ而易水腫ノ勢ノエルケル時ラ候テ后利水ノ方ヲ用エヘサテ其水腫モヤ十分ニ腫ルカ末十分シナラザルカラシテシト思ハ、先毎日く小便ヲ量ベシ驚ハ而日通し次ノ日ハ一合通し今日ハ僅ヒ五合計通シタクト云ニ段ヒ、小便ノ數減ウスルハ毎日く水氣ノ勢カノ重ナルニ此時モニタ利水ノ薬ヲ用ルハ惡し前日一合通し次ノ日ハ又一合今日モ又一合通スルト云フ三日計モヤハリ一合カ、分量ノ時ヲ其腫ス十方ト知ルベシ此弊キニレク

壇ラ戒メ病癥ニ從テ利水ノ刷ラ乍ニル時、三日ヲ出スメ
小便ヨク通し連ニ効ラ得ル者ニ如此、症卒時ニ利水
ノ茱ヲ用不可、惟十分ノ、腫ノ勢ヲ待テ后利水ヲ行
フト云フガ所要ノ秘要之是詳書所謂英氣不_レ討物
氣討一法也スベテ水腫ヲ治スルノ上キハ惟此一支有
耳ヨクく病狀ヲ察シヨク病勢ヲ候ラ以テ本トし
方ヲ付ケ茱ヲ施スミ至テハ左耳ノツヒト思ヘシ方ト瘡相
應スルト云ニ此理明カラザレハ瘡古ノ半ニ至テ
色く、疑ツ生し又病ヲ除スルトハ出来ヌ之此術ヲ知
ラヌ者ハ惟水腫トサヘ云ヘト小便ヲ通利スルノ外術
ナレトニ得中壇ニ通利ノ刷ヲ枝スル時ハ及テ水
腫ハ勢ニ乘ル有ニ茱ハ通ニアトヘ托シノ理有テ水氣

水腫病因

水腫ハスヘテ脾胃ノ虚極ニモトブヒテ摩

ハ上ヘ進ムノ理有水氣ハ上ヘ進ニ茱ハ下ヘサゲリ相丑茱
ト水氣ト相争ニ大キ、病狀ニサカラニ反テ諸症ヲ引越後
ニ難病トナル有多し茲カモ其甚キ、至テハ世ノ常ノ利
水ノ方ハワリ遠シトテサ遂桃花幸年子巴豆ノ類ヲ
以テ大ニ水ヲ泻下スル療法計スル医有有見ハ甚謬
和漢モニ此誤リナカズ又一種有甚キ水腫、達ア
ハ葉ヲ破リテ針ヲタテ水、有ノ人モ有是ハ誤リノ又誤ナ
ル有ニ其證據ニハ水ヲ取ヌ以而ヨリハ一倍益シ、水腫
ノ勢ケツル有之在其當坐ハ少ニ腫モ減ナスル慢ニ見
ユレハ遂ニハ水腫一重前ヨリモ大キニ重リテノル有ニ
麦ラ以テ其治疗方法ノ非ナルツク知ルべし

治ノ大本トスベキト立し其證據ニ解胃ノ虛損ニモトツキ
小便ノ不利、ヨル有之元ヨリ大便ノ平通ヨリナスニ非不故、
下刷ヲ与フル時ハ其病ノ治セサル耳ニ非ス及テ解胃ヲ破リ
大ヒ・害ラナス之其故ニ余病ニテモ或無病ノ人ニテモ數く水泻
スル時ハ必ス小便ノ不利、スル有之如何ナル愚昧ナル人ニテモ此
道理ハ知レベキトナル、大医ト呼ルノ人モ攻利擊刷ヲ用
テ太ヒ・水ヲ除スル時ハ一度即効ヲ得ル、知テ其葉努フ、
キヌレハ其腫モ亦え、培メツノルト知ラズ猶葉刃ノ足
ラサルニトテ遂ニ攻撃ノ刷ヲ投ニ其手ニ死スル有數ラ
知ナシ

急腫治方 前論スル通り水腫ノ治方ハ其一堵、腫滿
ル時ヲ待テ利水ノ方ヲ行フト教ル有ハ急腫テ治スル方ハ非

ス漸腫ヲ治スルノ方之急腫ハ此例ニ非ス若し急腫ヲ
治スルニ徒ラミ水腫ノ滿ルヲ待ツ時ハ水氣心下ニセキテ
遂ニ大病ニ至ル故ニ急腫ヲ治スルノ方ハ早來、堵タチニ
シ急ニ症ニ従テ利水ノ刷ヲ用テ治スベシ堵ヲタツ時多
クハ心下ノ水氣ユルニル有之惟漸腫ノ者ハ其水氣心下ニ
集ラズ故ニ何往水氣充溢スルに恐ル、ニ足ス前ニ云
リ是ハ漸腫ノ症アレバ急度滿腫ノ時ヲ待ヘシ次メ疑
ヘキ更ニ非ス

急腫漸腫之弁 スベテ水腫ニ急腫漸腫ノニ有
此ニワラ見分ナベキト水腫ヲ除スルノ肝要ノ秘要ニ漸
腫トハワロリクト腫レ出メ通、大病トアル是ヲ漸腫ノ
症ト云、又急腫ノ症ニ急ニ腫レテ四五リノ用ニ大病トアル

是急腫之急腫、後方へ壅味ラ禁ス利木ノ削モ与テ急
後スベシ漸腫ノ後方ハ前ノ通りト水ノ不足スルヲ待病
勢ノ昂リキツタル处ヲ候テ利水ノ削ヲ施し壅味ニ禁
ス是漸腫ヲ後スルノ方ニ詳ニ前ニ至テ有ル通り此

略ス

水氣急變 スベテ水腫ノ病人ヲ受取ニ心得有先心下店
塞ノ巨厚ノ動ハゲレクナシ身ヲ動セハ大キニ息ラキテレニ医
者ケ指ヲ以テ鳩尾サヤラ椎ス、甚息、サワツテ苦ム且
不食ナル有有是之水氣ケ心下ニ集ル症ニ此症其腫少シ
ト云ヘモ輕くレクニ得平可タクハ急變ヲ告ル有ニ若此
症ヲ過ヘ不啻急變有ベシト病家ヘモ其趣ラ告ケ知ラマ
其上ニテ革ヲモ与ヘシ然ラザレハ太ヒノアガケルヲ受

ルト有心得ベシ。○スベテ水腫ハ水ノ心下ニ集ルヲ大惡症
スルニ心下ニ水ノ集ルハ鬼角鳩尾サキ告ク息ツキア
ラキ筋ニ次メ油断不可有有是ヲ除テ鳩尾サキニ子細
ナキ症ハ乃漸腫ノ症ナレハ瘡也、半段隨分盡スベキ
間ニ有トニ是又心得有ベシ

脚氣腫治方

脚氣腫ハ急腫ノ一種ニ急腫ハ鬼角
水氣ケ心下ニ集リ易キ者ニ其症小便赤澁心下痞硬巨
便、動甚ク不欲飲食ナシ身動シメモ息キレ強ク坐卧不
安有是脚氣腫ノアシ脚氣腫人治療ラナスベシ
心下痞堅水腫 水腫體見レタル處僅ニ見ユレモ胸
先リ苦ムトハ又テ強ク心下痞堅し如磐肩背拘急シ喘喘
甚ク小便亦澁メ不欲飲食頭暉及巨腫ノ動是ノ時有

テ上り衝キ氣息息迫四肢微冷頭汗甚或因身冷
汗出ラ脈沉微々面色モ唇モ汎ニ青ク成テ急、死セント鬼ヘ
サウスル内ニ又諸症自ラ靜ル如キ此極ニ一日、一発スル
1モ有或二三発スルトモ有甚キ有ハ四五発、至ル有
モ有此症腹或平足へ僅ニ體ヲ見エ有之格好ヨリハ
心下ノ苦ニ甚キ有此治法先達、惶味ヲ禁シ症
従テ治ラ祝ノ時ハ同、快復スル有之是ト水腫、一症
ニ其水氣肌肉ニ見レズ惟心胸、水氣ケ阜ル故、右ノ如
ク鴟尾ノ苦ニ甚キ之故ニ庄ニト鴟尾ノ水氣ケ固身、散ズ
腫滿トナル時ハ反テ氣急促迫等ノ如キ苦シハ及テ告し
者ニ是脚氣衝心ノ症ニ治方同此症急メ又緩ナル
者之狀レモ大病ノ后此症ヲ發スル有ハ愈度有是格

別ラ沙浴ニ油断ス平可

水腫下利治方

水腫ニ下利ヲ兼ル有ハ先其下利ヲ治シ
后利水ノ葉ヲキベシ是療法ト法別ニ

水腫惡寒無熱治方

水腫惡寒無熱數スル有先其
汗ノ利ヲキベシ表ヨク解スル時ハ小便及テヨク利スル有
之行出ラト便キタ利セサル有ハソコテ導水ノ善方ソ
キヘシ竟表ノ用ル内ニ利水ノ加味ラヌベカラズ是ハ是療
法ニツニナクテ効少キ有也。漸腫ノ症咳逆甚スル卧ス
1統ハサル有ハ利水ノ方牛膝ヲ斯ルノ茱加半メ可シ千
金趙脾陽、五味章白ヲ加一或十青龍陽加石膏是等
有見合、用ユヘシ

絶壇味法

スペテ漸腫ノ症ニ壇味ヲタフ一症法ニ

急腫 モニサリ夫ニ心得有理味ラサキノ以後五日ヲ待テト
便支ダテニ利セサル有ハ理味ラタツベカラズ病人ワクムえ
氣反テ脫スル者ニ是トト理味ロ完スヘシ理味ラユルス時
如クスベレ兔角此症多クハ難治ニ其心得有ベシスベテ水腫食
ノウキ有理味ラタツベシ合スベシ但し理味ラタフルトアモ甚アレ
ハイシ薄クメニベシ是止ムトシ得サルノ時ニ○理味ラタチテト
水狀利レ水腫段々耗ルト云ヘ胸腹ノ動並リ經脈ヰタ
靜カナラザル有理味ラ食時ハ其腫レ再弁スルト肇ラ
及スヨリモ達ニスベテ水腫ノ症障ニ因ラ誦症全狀后
モ飲食スル角ニ三十日或五十日計モキニシノ理味ラタツシ
一し經脈及胸腹ノ動ヨク靜ナルラ候ニ理味ラ食ヤム
ルト如法スベレ

急腫見筋額上 急腫、症発上一筋ラ見ニ者病勢甚
重ニ候ニ水腫治ニタクト云ヘ其節未盡キナシ有ハ理
味ラ委リ、完ス不可

水腫脉狀

スヘテ水腫ノ脈、沈实ヲ以テ吉トニ序數微

平素積氣腫痛 平素積氣ノ病人或曰久ク疾飲過
細ラ以テ古トス是其大弊ニ其勢密ニ至テト是ラニ得テ
手ニ應エ口授エトニ一氏盡ス不可故、其大概ヲ章ラ此ニ略
ル人因身微腫近脛僅ニ拘ラ没シ或時有テ腫消し行步ス
ハスト足腔微腫ラ完シ飲食平素ノ如ク喰逆甚ク喰ル矣、
痰津ヲ出ス有ヌシ是直ニ小病、非ニ本病ヲ治スルノ方中喉
嗽ノ加味又可之坐して夕咳嗽シ老ル人痰血ヲ吐レ勤モス
レハ無事、寢尤有ヌシ滋津過食スル才ハ度ノ腫トナ

ル有モ亦アリ飲食ヲ節シ房事ヲ慎ニ文柱數萬壯ヲ施
スオハ虛勞水腫ノ患ラ免レテ快愈ス心氣夾成ヲ以テ輕忽
スクラズ肺疾數或序大ナル有ハ山沈実或緩メカラ有ツ吉
トス其鋒脈訖腹候諸症ヨク精審ニスベシ

水腫後氣急 法如ク塙土味ヲト便快利シ固身水腫
全快ノ后モ猶氣急喘息止ス虛腫ノ動甚キ有其急變油ダレ
ス不可水腫治スルソヘテ免ヤン思不可忍ヒキモ是ナ有
○第一人タ後シタルト有端形氏ノ内人水腫ノ患フ張氏医
通ノ中漏分消陽ヲ用テ十八九日不トヲ得タリ坐ヒモ虚
里ノ動甚クタシ一二回モ步行ハ息キレ甚又鳩尾ケキヲ推メ
見ハタレ松ノモ痛ノ氣味有テ息、サワリ難キスル氣味有ニ
于是、因テ漏第一辯リ緊シ塙タナリサセ又行水リ戒ケル

一百日可限此ニツノ禁物ヲ侵入時ハ必ス再水腫ヲ病テ治スガ
ラスト辟クテ体革レケリ後アマリ體ノムサキヨリイト
ヒテ行水ラシケリ又煌昧し喰ケリ四十五日ノ后經ナク
又水腫起リテ元ノ如ク病ケリ又後二十日全ラ經テ死ケ
リ〇又一人水腫ヲ病ナシ是モ中漏分消陽ヲテ十八
九治シタリニ更先ニ血塊用度有トテ川ラ趣シテ行ケリ
其後水腫ワ又病テ是モ四十日計ヲ經テ死ケリ如此
水腫后ニ塙味ヲ食ト水ヲ便アトハ大キニ寒ムトシ何種狀
氣シケリ此ニツノ禁物ヲ侵ス病人医者全快ラユルス不可
早ク其趣ラ辟リテ療院スベカラズ是水腫ヲ治スル心得
ノ有一ナル有也

一急腫咳嗽

急腫咳嗽ノ算に免ノ數タシ其腫漏

ニ至ラズ瘧喘咳逆甚リ、或吐血し氣急促迫メ因一候。下居寒飲食ヲ欲ズ肺疾數或浮虛而大ナル病不治至ル者多シ又漸脰喫逆甚キ同テ卧不一寐分んアリ此例、非ス

急脰并 又ヘテ中脰急脰ノ症有其症心下痞堅メ不欲飲食。脉沈々疾數或少レ浮シ帝心下大ニ動氣塞里ノ動烈ク氣急嘔息メ不能卧十便半夜十九有半急脰トニフニ脚氣脰諸瘧内攻ノ中脰皆急脰也。

漸脰并 漸脰ノ症、脰滿スト云一尺氣急不促迫。飲食半減或停、やク食不減心下僅動氣有テ胸腹ノ動キ烈しカラス脈又緩或沉細メカラ有十便赤色不能安卧云一尺枕ヲ高スル時ハ脈ル一尺得ル有是漸脰也。

虚脰并

又虚脰ハ脰滿スト云一尺ヨク安卧し飲食ハ常如ク或食ヲ食ハヌ病人モ有十便不利スル并甚シカラズ面色モ青白或赤色モアリ梢ノ頭ヲ以テ手近ツ椎ハ輪テ手起脉微細或浮虛メ其ノ虛里ノ動微メ心下急迫ナラザル有是虚脰ノ形状ニ益し小脰ノ病尤ヨリ脾胃ノ虚摸ニヨルト云一尺見症此三等、過ス此三等ヲ明ニタル時ハ後ヲ施ス、於テ其首リ得一し

水脰死症 水脰ヨク食スル者ハ辛ニ不食者ハニニ漸脰ト云一尺不食スル者ハ多クハ不候、至ル以迄小脰死生リ次スルノ大割トナスレ申脰ハ脾胃ノ病シヨリ憩ルト云フト是ヲ以テ知ル一し〇其脰上へ計リ脰レテ下元ヒヒナソノ下モ計脰テ上へ脰ナクキ半計脰テ脰

背に腫ナレシ如此ハレニムテ有病ハ后多クハ不治ヒ至ル。之ル
胸以下腫強クヒ胸以上肩背面部少シセ腫ナク肉瘦
テ背ヲ見ス有ハ必无ノ候シ。辛生腫強ク胸腹背
ナレモ腫ナキ有ハ是又必死シ。先人或大病后人
小腫ヲ先ニ胸突出レシ心下ニ皮膚石綱子ノ如ク寒
微有テ核乞ハ筋レタル爪ノ如クメ不透脛甚堅キ水腫ハ
尤有ハ必死ノ候シ。虚腫又辛生計甚堅キ水腫ハ
又必死シ。スベテ虚腫ノ水腫古ヒラ見ルニ甚死焼シ黄而
胎室クカル有ハ多クハ不治ヒ至ル或又舌上白脂膚ニ水
コウルケタルガ如ク赤色ナキ有ハ數々附子剤ヲ与テ其
舌赤色出ラザル有ハ其終リ不治ヒ至ル。スベテ小脛腰
痛スル有ヘ恐症し皆桂附、宜キ在之桂附ヲ役メ効キ

者ニ是又平治ニ至ル有豆シ。小腫譜語フ差スル有ハ其死二
三日或四五日ラ出ズ。虚腫初ハ喘ナク日久火微喘ラ差ス
凡病ハ其死近キニアリ。小腫小便燥ノ如ク或黒色ナリ。如或
未上シホグタル如ク濃ノ子バリ有テドロクトシタル有アリ
是又多クハ不治ニ至ル有シ。スベテ小腫俄ト便快利水器
ヨリカタムルカ如クニ通し腫忍チ引有ハ是虛脫ノ至極ニ此
症十人。九人死スル有心得コ世医此腫引タルニ迷ニ真
快氣ト心得若ラケカス近有有スヘテ腫ハ初ノ一月過レ
タル有グニ合ニアリニ合ケ三合。フニ三合ヨリ五合。一八
合。ソロクトフヘテ行ノ加コク。杖スカルヒ。水腫望タ
モラメナ便通行ラ得フ。ノクト帝復し五十四日戒而ヨリ
經テ后再竟大有有有是多ク心下ノ木氣未ツサル内

滋味ヲ嘗ニ或房事ヲ起シ或洗湯れ以海ナト入リ因テ
其腫再充スルニ先キ、効有シ以テ病家又童子テ摩ハリ
賴ム凡カタノ辞メ革ヲチ平ケ必死、症ニ〇ス(テ小脣ハ
全快ノ后心下ニ小氣アルクナキカラヨク例ス)し其小氣有
カ無キウリタメスニ先逐有キ、病先ツヒテ病人、胸先ツ殿
く強ク痒大見ル(シ梅ノ見テ此位ニ梅大息ニ)ニクク息本
レニモスルクト同フ(シ其時病人差テ成種息ガヤレミト
ク痛ムトカ苦ノゴサルトカ陶、何ゾ苦キ处有ト云ハリ
キタ心下ノ巾氣熱ト盡キラヌ故ニ夫ナレハ病家一且謂云
ヘシ何徑體ノ小氣ハ引テ全快ノ後見ユルニ一ダ行ま、
シ如何有レアニテ、於テ貴重なしト云リ病家ニモ辟リ
エアテ末モ止サヤベシ是れ脛袂一快氣ノ后リ障堵スル心得

ノ第一ニス(テ水腫ハ房事ト水八呂ト極ト此三色シテ
ノ子バ全快、次メナキ有之ト心得キ〇水腫ノ症下利シ
或崩病ナドノ候、アトヘハツテ難夷シ或膿血ヲ下ヒ或
鵝子白ノ如キ肩ヲ下スハ多クハ不治、至ルノ急腫ノ症死
ヒテ加(虚里ノ動脉ノ付近ク食支食、ヘル、フリ欲ヤズ
脈沉微或浮虛是ラ接セハ絶スルカ如ク四肢微冷頭汗
出テ喘急煩燥スル者又死ノ候ニ脚氣腫謁瘡内攻木
フル人又ハ大病ノ后、人水腫ヲ発し滿腫、モ至ラバ喘急モ
腫格ノ硬ラヒテ是ラ根メ見ルニ達ニ起テカル病甚等ノ
症漸ヒニ食減或泄泻シ或來急后重シ或鵝子白ノ

如キ病ウ下ニ右ハ皆不以ノ候。此の鹽タナリメ一身腫引クトニモ
息キレ止ス。虚里ノ効甚キ病ハ其死息ニトリツメル病ニシテ水腫
引タルヲ見テ安堵ノ息シナスエア。急腫ノ症候數ラ無ル
者遂ニ多クハ死ニ至ル。左十九ノ箇條經驗ノ症ニ病人對
メヨリく同セ明テ又方ラ處スヘシ是心得ノ先一ナル右也。

水腫食物

塩ラ葦ズン同ノ食物ハ異布ソヨク有シナリ。
テ水氣シ去リ。鰹節ヲ入酢ラカケラ。革トナスヘシ。常ノ大
根ナニスニ塩ヲ不角鰹節ヲ入テ喰スヘシ。白瓜黄瓜ル
ヒク塩ニテモニ塩氣ノ残ラヌ様、ヨリく洗ニ淳ニテアヘ石
メ革トナスモヨシ。黃瓜ノナニス白瓜ノナニス琉球等、
密柑柿梨ルイ。醤革トナスヘシ。常ノ飯ハ二度後飯喰
ヘシ。左母革ニカケラ。喰フヨシ。塩ラ葦セサル。水腫モ是ラ喰

シムヘシヨリ食スル病人モ食物ニ常ノ半分程ヲ減メ喰シム
ヘシ必飽テ。食ハシム不可赤ト至。瓣里豆ノ瓣、吳甚ヨシ
○水腫ノ症全快メソロク塩ラ食ハメモヨク見ユル病人ハ塩
シ免スヘシ其法有初メ一日ニ。矮塩三升シ食ハシメ其次
ノ日ハ六升ラ食ハシメ又其次ノ日ハ九升ラ食ハシメ如此三
日計ソロリクト培メ喰セ或革大根ノ薑、物一ト元或
ニ元三升ラ水ニ浸シ塩ラ出メ食ハシメヘシスア。如斯スド
十四五日計メ夫カラ味憎付。醬油ナドニアリツケタリ
クト食ハシムヘシ漸ク三十日計メ常ノ食アリソカレム
一し鬼角鐵タル人ニ食物ヲ与ルケ如ク一度、鹽氣ヲ足
山シタル時人詣症再ヒ竟メ難候。症トアル此戒ラ用ヒケル
病人ハ療治ラ辞リテ革ラ与フ不可ト辟ルヘシ

急腫用方

越婢加朮湯

水腫熱有大便祕口渴

粳糊麻膚スル有テ後ス舌上白脂更寢スル有ハ附子ヲ加少々心下脅硬スル有ハ生薑更ヲ加フ

大抵御湯

水氣心下、雜リ久寒喘息是キ有リ治ス

十抵御湯 小氣心ヲ攻メ氣上リ衝ク名ヲ後ス○但シ嘔嗽喘急強クト脅硬スル有ハ生薑蔓草白はツ加フ舌上白脂滑石有ハ附子ヲ加フ或童便ヲ加ヘ或里至ツ外ヘ或一角耳角ヲ加フ心得有外、口停有白脂滑是附子ヲ用ル肝心ノ目的し心ヲ用ヘシ

黑革更湯

水毒心下、集リ嘔吐甚キ有リ治ス

升麻散

水毒心胸、集リ欲吐有リ治ス

萍萍湯

詬瘧內攻、水腫ヲ快ス

漸腫用方

麻黃湯

水腫惡寒、發熱脈數或喘咳ノ有リ治ス

小青龍湯

水腫咳喘甚キ有リ治ス

麻黃附子細辛湯

水腫心下脅硬メ咳嗽喘急スル有

附子散

水腫口渴スル有リ治ス

桂苓朮甘湯

胸腹及一身腫滿ノ有リ治ス

立芩散

水腫口渴スル有リ治ス

猪苓湯

小便淋瀝スル有リ治ス

腎氣丸

水腫小腹麻痺スル有リ治ス

虛腫用方

真武湯

水腫舌上白脂滑小便清白或下

和ノ者ノ後ス

水腫六診秘説

世ノ医者水腫、病人ヲ見テ是ヲ虚腫ト

ト云フテ、瘡也メ、勁ナキ者有是存ノ外虚腫ニ矣メ、其実ハ
实腫ナル者有故ニ、某勁ナキ者有又实腫ト思ヒ、是ヲ虚
以メ、即ナキ者有是存ノ外虚腫、メ、实腫ト思ヒ、少々故ニ勁ナ
キ者有左又レバ、世ノ医者、虚腫ト見タテ、实腫ト見タテ
ル、存ノ外同達フ、一有其達、謂ハ此大診ニ達セザルケ
故ニ虚ト云フモアテニテラズ、实ト云フモアテニラズ、此大診
ヲ以テ、其症シ極ルニ虚腫ト云ハトコ近モ虚又相達ナレ、实
ト見レバ、トコ近モ实、メ達ヒナレ故ニ虚実ノ明カル、
ラ得レト思フ時ハ先此大診ヲ明ムベキ、ト云フハ先
第一、眼中ヲ診テ、虚実ヲ知リ、勁氣ヲ候テ、虚実ヲ知リ

脉ヲ診テ、虚実ヲ知リ、皮膚ヲ診テ、虚実ヲ知リ、水腫ヲ診テ
虚実ヲ知リ、腹ヲ診テ、虚実ヲ知リ、是ヲ大診ト云フ、此六
診ヲ六ツナガラ、虚症ヲ見ヤハ、是ドコガトコ近モ達ヒナキ虚
症、又六ツナガラ、診テ、实症ナレバ、トコ近モ達ヒナク、实症
ニ又此六ツラ、診、ニ三ツ、实症有ラ、三ツ、虚症ヲ見セバ、是虚实
格年メ、文ル處、水腫、加様、次定スルラ、虚实ヲ知ル、勇祕
談ト云フヘ、先眼中ヲ診テ、虚实ヲ知ル、眼中、援子瞳
子ノ見張クイナク、何トアク、眼中、虚症ヲ見ス者、是虚眼
又眼中ヲ見ルラ、眼中死メ思ノ、外眼半、引タテ、死
見ユル是眼半ノ、实ノスベテ、動氣ヲ診テ、虚实ヲ知ル法
水方ノ、勁氣ヲ初メトメ、其外頭ノ、勁氣、虚里ノ、勁氣、腎間ノ
勁氣ヲ、診テ、其勁氣トリシメナク、ツワクトシニリナク、高

シ指ニアタルハ是動氣ノ虛ニ又シニリテフワツカズ皮肉ノ意ニ
隠レ緩ルカラズ疾カラズフワクリトシナリ有動氣是實動
之是動ノ虛實ナル者ニ〇又脉ヲ以テ虛實ヲ知ルトハ六脈ケ
推メカラル是脉ノ實之推メカラナキ是脉ノ虛ノ虛實ト
ハ皆人ニ豫メ知ルトナレハ其虛實ヲ委ソ云フニ及ズ見脉虚
實之〇次ニ皮膚ヲ診テ虛實ヲ知ルハ其皮膚レヨリヨク充
実メツヤフ夫ハサルハ皮膚ノ實之是、反毛者ハ皮膚ノ虛之
〇又水腫ヲ診フニ其実腫ハ其腫レワカリトメ堅ク勢有テ平
テ推バ凹ニメリラハナセハ丘元ノ如ク肉起ル是实腫ノ形狀ナク
虚腫ハ是ニ反メ其腫、勢ナクフワクトヤワラカ、是ヲ推ビ其
アト急、起リ難ク甚キ者ハ推メアトニ微有テ伸張ク脛レヅル
爪ヲ推ス如クニトフクトコタヘノ土キ腫ハ是虚腫也〇又腫ヲ

診フニ腹ニ三味線ノ糸ラワリタル妙ク中ニミヅクチタル腹ノ虚
ニ又腹部充実ノ其皮ラツカメト肉トニニアカリ皮肉一體メ
ハナレサル肩ハ是腹ノ實ニ是ニ是ラ六診ノ虛實ト云フ此
外ニ見ラ以テ虛實ヲ知ル法有吉胎ヲ以テ虛實ヲ知ル法
有吉胎ノ虛實ハ別、說有鬼ノ虛實シ知ル、モ又說有
此說ハ誘書ニ云フテ有其大障^{ゲイ}ヲ知ルニ足ヒリ加板^イモ
引合ヤ見ル時ハ其虚腫實腫ヲ次スルニ其違有不可
猶^シ此心得ラ以テ虛實ヲ次セト其診察十全^シ十人虚
實ヲ誤ルトニ非ズヨク^シ候行スベキト也

極虚水腫之形狀

其水腫、形ラ見ルニ腫甚ク有リナガラ
は膚ニハヨリテ不^ル伸^ム病ハ大虚腫^シト知ルベシ腫多キ肩
ハ弓キナリテヨリタル皺モ伸^ムルが常^シ此症ハ腫十分ニ

有ナガラ皺ノヨルト云フハ水毒ケ衰ヘノコリ有テ表ニ浮カヌ
故ニシワ有ルニ是元氣ノ弱ヨリ水氣ヲ表ニ送ルカラカナキ故ニ
シワカノビヌ之假乞ハ疤痕ノ虛症ニ内攻スル理ト同シトニ
又一ツノ虛腫有其症沒ヘバハイニ腫テ見ユル症腹腫ヨリ
下ニ夥シ腫有ナガラ臂肩胸背ナトニ見ルニ甚度コケテ甚
キ有ハ骨ノ見ユル程、瘦ル有是又大虛ノ水腫ニ右ノニ症多
ク不治ニ至ルニ且病人元氣ヲモ輕くシク摩ニシテ後合フモ
脾胃虛腫水腫病因　スベテ水腫ノ症虚症ハ元ヨリ脾胃
胃虚瘦メ水腫トナリトナレ実腫ト云ヘニ脾胃虛ヨ
リ安ナ水腫トナルトナレハ攻擊キノ則ハ用テ益ナシ止ムアラ
得ス用ルモ惟少便ナ利スル中ノ佳ノ中ノ計算ニ此心得ニシテ
革ヲ調合スヘシ是水腫ヲ治スルト肝心ノ心得ニ予此病ヨ

深ク考ス皮一つハイニ腫タル偏腫ノ症アヘ必ス巴乞可取也
辛キノ差ラ以テ泻下ヲトリ過し惟一時ノ狀キヲ取耳ニメ
其全効シ治ムルト甚稀ニターサカニ効ラ得ルト有ト云ヘモ
ヨクハ遠カラサル内ニ再水腫ノ病ニ及シ遂ニ死病ト在ル
數多シ此時ニ當テ泻水ノ術ヨリ外一向ニ主段ナケレ
水腫ハ古ス不可ル病ト耳心得テ水腫ノ療法辛極ハナキ者ト
心得テ后タル久シ其后大診人法ヲ以テ治メ見ルニ相應
ニ効ク取シトニ是予が経験也

附下痢取害說

水腫ノ症十便ヨリ通セズメ大便ヨリ泻
下ヲ取ハ一向ニ益ナキ者ニ假乞五十日益有トテモ大便ヨリ
ヌキタル水ハ社ナクえノ一塙カケテヨク腫ル者ニ是數度
手ニカケテ費ノ有トニ是水腫ノ一大禁也

木腫正脉

十五

水腫ノ症種、虚症ヲナラヘカラ、虛腫トナル
病人其肺シ見レバ及テ弦緊洪大メ是ラ椎セル其肺勢愈
盛ニヘツヤナク病リハシク根ニ有ハ是極メラ必死ノ肺之毒
痔近ラ施ス不可

水腫舌胎吉凶

スベテ水腫、舌胎甚薄ク白胎又圓ノ有
ハ實腫ノ輕症シ○又厚ク白胎黃胎ナル有アリ水腫ノ形
ト脉ノ形トテ参考スベシ其虚矣ラ年スベシ○又白胎又如
枯肯、乾燥スル有ヨクハ大虚ノ舌也○黑胎、虛寒ノ舌別有
此舌に換、非シハキナ難シ○又白胎厚クカリ或黃色、又
舌、胎ナク燥、如リメ圓アル有皆虛腫シ○又舌胎ナク少
火ノ如ク乾燥甚ク或白灰色又乾燥甚キ有ハ共ニ極虚不
名ノ舌之○白胎者胎或胎ナク赤色ナル舌ミテモ左ノ左
1ノ舌之○白胎者胎或胎ナク赤色ナル舌ミテモ左ノ左

右ノヘリ通リ、紫黑色ナル班有モ是虛症、水腫、血毒
有ノ舌ノ此病人先年瘡毒ニテモ病ハセスク、又ハ若モ知レヌ
出來物ナトニテモ煩ハセヌクト間、レヌヘテ詭病共ニ古ノゲ
ルリニ紫黑色ノ丘ラ生スルハ皆瘡毒血毒ノ目的シト知ル
シ此外舌ノ見候ニ數多有レニ形色似ヨリアニキレ安レ
故此ニ戴ズスベテ脉ト舌ト共ニ水腫計ノ一、卦ス万病
皆此心得ラ以テ痔近ラナスベシ

木腫大使秘結

スベテ水腫大使秘結ナルラ寔トス下利スル
者ラ虚トス西トス○又大便下利モセズ秘結モセズ通レ竟平
日ノ通リニテ一日ニ五大度モ通スル者アリ又裏急ノニ侍有ラ
晝夜ニト五六度モ通スル度無ニ大便シ倦ス症有此症皆大
虚ノ水腫シト知ルヘシ假令ハ癥瘡下氣ノ症、虛症有ト

曰し此條口授有

十六

水腫血症

水腫ニ吐血下血スルハヨリハ不治ノ症トナリ安し
無元ナノ内一二ハ秋ノベレヨクく診候ヲ詳ニスベシ此症有テ
后水腫ヲ完スル有シ云フニハ非大水腫ノ内ニ血症ヲ帶ルラニ
水腫降中 水腫ニモヨク食スル有、降中ノ症有油断スベケ
ラズ食ノ進メバトテアナガチニ吉症モ定ム雅キト有心得ヘ
シ是等ハ脾胃腫症ノ至極也

水腫禁鹽味

スペテ水腫ヲ病ム人ニハ堅ク鹽ヲ葉スベシ
飯ヲヤワラカニタキ昆布ヲ水煮ニメ其煮汁ヲ麦飯ニカケテ
喰ハスベキ計ノ内ニヨロシ大根浅草海苔ナトヲカケテ喰モ
ヨレ又或ハ昆布ノ鹽ヲ冬瓜赤小豆ナトヲ煮テ食ハスケモ
甚宜ニ鳥魚類ハ云及ズ且外膏梁ノ有ラ嚴ク禁スベシ

惟前ニエフ通リイ至極淡薄ナル食ヲ年足シ而病人食進
テ三椀ヲ食シテ云ハレ僅ニ一椀半ヲ年々シ必ス病人ノ望
ニ任セ大食サスルハ興用シ大食スレバ脾胃ノ氣不轉脾胃
ノ氣ケ不轉時ハ水道不通故ニ淡薄ノ有ラ食セシメ鹽ヲ
禁スルハ水道ヲ利セシカ爲ニ是水腫ヲ療スルノ手ダニ
○ステ水腫癒治ノ后五十日計ミ鹽ヲ禁シ愈々再発ノ矣
サシナク見ユルナラハ其時初テソロシト塩ヲ喰ハシムベシ或
人曰水腫ノ症、鹽ヲキニシク葉スル其謂如何善ラ鹽
ニツケテ置シト其形状タグレズメ久シク持テ居ルニ是塩
ハヨク物ヲ引シムル能有者之假令ハ鳥魚ヲ持シト思フニ塩
物ヲカタムル能ノ有故ニ今水腫ニ鹽ノカラキ物ヲ喰ス
ル時ハ水氣限内ニカタマリテト便ヨリ出ルヲ至テ次ノ

ナル故ニキビシク壇ヲ禁スル也

水腫禁浴湯

スペテ水腫ノ病人カタク洗湯水凡て行水

等ハ先ヨリ納タゞ平気トテモ堅ク葉メ戒ムベシ若此禁シ犯ス時ハ其腰愈々ツノリテ水氣盡ルトナシ全般ノ后モ百日或ハ半年ヲ限リテ戒ムベシ若此禁ラ犯ス時ハ再発ノカル不可葉必シモ軽くシクスベカラズ若病人信セサル才ハ療法ヲ辟リテ葉ナキア不可

水腫禁房事

スペテ水腫ノ病人房事ヲ慎ムベシ呼吸促迫

等ノ苦惱モナキ病人不寃寃度ヲ侵ス者ニインギンニ是ヲ守スベシ是ヲ告テ侵シ安キ人へ是又療法ヲ辟リ革ラニ不可水腫全快ノ後一年半年ナイシニ年ヲ限リテ是ヲ侵ニ勿レトキニ同スベシ是又水腫ノ大禁也

水腫實症治法

スペテ水腫心下痞硬小木瘤タゞ大便秘結其腫ニ勢アリテシワカリト硬ク皮ユルニス精ラ以フ是ヲ推ニシバラクノ間隔ノキナツハナセバ血：元ノ如ク持アガリ其腹沈实、メカクノ有者ハ是實腫之是ニ方消陽ヲ用ベシ毎服一蓋白湯ヲ以テ連り下ス一日ニ三度若し腹脹減難キ有ハ増メ三五キニ至ル

實腫分消湯方

舊本茯苓橘皮澤泻腹皮大枳实
宿砂杏附桔梗甘草桔梗生姜中右水ニ合シテ一
合立取リ帰ツヨリカナ便メテ服ス昼夜一二剂ヲ用若腹中
微欬有テ微喘スルモノニハ瘦子ヲ加フ水氣胸中ヨリ上衝至元
ノニハ薑茱萸ヲ加フ

水腫胞瘡甚脉沉結

スペテ水腫心下ノ痞硬大抵方病

湯、症、麦メ惟心胸ノ症回是ノ服即衝帳メ不思飲食志
氣鬱絶し骨々トメ不樂或物ニ對メ退屈シ安ク肺ハ陰絶
シ呵吹多キ有兮心氣飲ヲ与フベシ

兮心氣飲方

肉桂、茯苓、半夏、通草、白芷、大腹皮
紫蘇葉、桔梗、右七味水煎症、從ア出入加減スベシ。此方ヲ用
ル目的ハ肺沉絶ト呵吹ト胸膈痞悶ト此三つ之肺沉絶三和
散ノ條下ニ詳ナレバ此、略ス

總言勤身氣急甚

スペラ水腫ノ形狀脉狀共、大椎方情
陽ノ症、麦大心下、覆盆ノ如クニコダワリ唐硬トリワケ強
健ニ身ヲ勤ヤハ氣急息迫スル有星水氣專ラ心下ニ結聚ス、
尤第之他ノ藥ニテ散ベキ方ナレ外臺秘要ノ黑豆湯ヲ用ベシ
此症心下ノ証法口授有若腹滿減レケタモ有ハ三聖丸

刺ヲ用ベシ

黑豆汁作法

新黑豆一合半鍋入レ水一升二合ヲ以テ大
合ヲ煮取リ黒豆ヲ去リケテ用エ六合ヲ以テ前茱三副ノ並水ト
スベシ

三聖丸

水氣專腹部ニ集リ腹脹強々息ナレ強ク小木
不利スル有此方大キト効有坐レモ虛腫腹脹ノ有ハ効ナシ
ヨソク虚寒ヲ詳ニメ用ヒ誤ル不可

鉄粉禹鉢糧、蛇含石、右三味各等分糊、テ丸梧桐

子ノ大サニ丸ス

水腫手足十方腫脹

スベテ実腫ノ症四肢十方ニ腫レ心

下痞スルニ硬キニ至ラズ腹部滿スニ脹、至ラズキニ以テ

腹シ推スニ空軟ナルガ如ノメ脹ノ底ニカニ有有ハ疏水湯ノ証
也

疏水湯方

卉十豆

妙年大麦妙九精米灰厚荷苔妙地薦子

膏

妙年牛子妙三右七味水煎服若心下痞メ不思飲食モ

氣不舒長者ハ端砂本青皮各ニ少少

水腫氣鬼如帶腫以下滿腫

スヘテ水腫周身併々腫レキテ

以テ推スニシツクリトカラ有リテ其アト忽々起リ水腫ノ勢甚シ

ケレモカモ呼吸ニサワラズ氣鬼ヤリ带ノ如クナル右ハ精苔
湯ノ症ニテ又一種水努前ノ如クメ脹ヨリ下ハ患ク腫レ強ク

レニ辟肩胸背次ニ腫ナリ呼吸平日ノ如クナル有是又精苔
湯ヲ用ベシ如此症ハ必ス此方ヲ用テ先其下ハ腫ラスカスベシ
大ヒニ奇効有矣レニ此ニ症虛腫ニキレ安しヨクニ虚实ヲ
詳ニメ其末腫タルニ相違ナクハ次メ用テ効有。又水腫形狀
前症ノ如ク心下ノ痞滿強ク志氣干澀氣急タシ有テ嘆息ス
ル者ハ大橘皮加膠陽シ用テ其上ヲ和シ旦其下シスクスベレ
精苔湯方 楠仁澤厚葵苔阿膠滑石鷄石右四味水煎
腹ス。

大橘皮加膠陽方

青皮茯苓阿膠滑石猪苓沢泻桂枝

木香蒼朮甘草枳榔子生姜右十二味水煎服ス

虛實間腫治法

腫滿核シ以テ是ニ推スニ硬ト軟ト其

キノ得テ帆表ヒククトワヤ有其脉实メ火シは數ヲ帶ル

者是矣、メ虚シ兼ル症ニ此論ニ校有溫系ニテ是ニ尊オクベシ大蒜並ニ宜シ若シ病人蒜シ恐ム有ニハ鰹臭陽ヲ以テ是ニ代テ用ベシ若又鰹臭、腥シ惡公有ト鰹臭ノ霜ニ用ユベレ

大蒜並方

赤十豆蒜生姜主高陞根右四味先小豆ト水トラ以テ土鍋ニ入レ火上ニ安レ次ニ三味ラ以テ布袋内レ赤豆ノ内ニ着メ是ヲ並シルトニ時計赤豆熟燶ノ如キヲ保テ布袋ヲ去リ小豆ニ食セシメ一日ニ二三副若其叱氣ライトフ有ハ一副ノ半ヲ減セヨ惟病人ノ食料ニ從テ増減スベレ

鰹魚湯方

鰹魚長七八寸一頭去鱗不去腸ヲ昆布四方三寸元蜀椒一升右木一

日一副

鰹魚霜

鰹魚鱗腸不去冬瓜

左ニ味入土器、塗泥ニ固封シ

暖火ヲ以テ燒テ性ヲ存シキトナシ白陽ニテ逐リ下ス每服一平

日ニ三次

辰口乾燥皮膚桔梗

スベテ水氣久々去び辰口乾燥シ其皮膚堅硬テ桔梗シ假令ハ槁木ノ潤澤ナキガ如クニ下唇

硬胸中不利シタリ喘氣有ル有是虛ト寒トシ兼ル症ニ本防已加灰荳湯生之

本防已加灰荳湯方

牛防已辛石膏

桂枝

人参

灰荳各大石五味水重版ス

水氣積癰集心下

其水腫ノ形狀大極大蒜並ノ症ニ寒火心下不和築々トメ動律スル石ハ高水ト持病、積ト係、心下ニ集ル、妄桂加灰荳湯ヲ用ベシ總メ寒腫虛腫共ニ多クハ

勤キナキ有之惟此同腫ニハ必ス勤氣有然モ早くニ訪寧ス
レバ脚氣ノ勤氣、紛レ有ベシ脚氣ノ症此治方ト大ニニ殊必
シモ台シ難ル不可

姜桂加茯苓湯方

紫胡黃芩桂枝干姜牡蛎瓜萎根

石八味木豆苦附下上リ衝ノ有アラハ生薑萸シ加若脉一等
虚候ヲ見シ稚和有ハ附子ヲ加肺症大極大蒜五ノ症ノ候ヲ
呼吸嘔吐喘咳スル有ハ千金越脾陽ヲ用ヘシ

千金越脾陽方

麻黃(六兩)石膏(半升)生姜(三兩)

大棗(十五枚)甘草

^二 茯苓白朮附子是乃傷寒論、越脾陽ニ茯苓白朮
附子ノ三味ヲ加ヘタル方也。○此千金越脾陽ハ虛モツクズ、
实脾反ナク虚实ノ間ノ病也一種ノ水腫有右之同腫ノ症ト云、
此間腫ノ症喘咳ヲ加ル有ハ此千金越脾陽ヨシト知ルベシ

虛腫治方

虛腫ノ形ハ少ク心下痞硬シ或少ク氣急或
腹脹スル有是虛腫ノ末至極ノ虛ト云フミハ間ノ有症
是ニ清世金書ノ實脾飲ヲ用ベシ此症更ニ下利ナド
塞く有テ木瓜枳榔草藥ノ矣ヲ用ニ稚ヤ症有夫ミハ
四味散、附子青皮ナドヲ加ヘ用ル者カ或又真武湯
ニ用ル場合也有又真武湯ニ理中湯ヲ合メ用テヨキ場
モ有之坐レヒ心下ノ診カタ虛腫ト寒腫ト診カタ心得
有ベシ

清世實脾飲方

厚朴蒼朮本瓜木香乾姜甘草

右大味水煎服

虛症濡腫

壯原湯ノ腫ノスカタハ全體腫ノスカタヤ

ワテカニメ泥土ヲ推シガ如キノ意有或又腹以下ニ腫有

ナ脅肩胸背ハ脾ノ外瘦セ其脉沉細或ニ浮虛、大心下
房回強ク飲食不微有ハ壯原陽ノ症也

壯原陽方

人參葛根芩芩附子桂支乾姜

竊破搗皮硝糊紙右九味水煎服

脇下不仁腫

共腫脈狀壯原陽、症ノ如クノメ腰脚ノ
トリツテ力ナキ板ニ更ヘ或脇下不仁スル有是八味丸

科ノ症也

八味丸料ヲ

乾地黃山茱萸薯蕷澤泻茯苓
牡丹皮桂枝支附子左ハ味中左○諸家、テハ乾地
黃ヲ用ヒシテ有不テハ此時ハ乾地黃ヲ用ヒト教ル
坐六謂方丁之謹テ此方。從ヘシ

皮水虛腫

皮水ノ形ハ腫滿堅硬メ是ヲナツルに因

ノク假令バ皮ノ袋ニ水ヲセリテ其ロツク、ルケ如クキアタリカ
サクトメ破ク腫ルハ湯氣ノ脫セル。○或水氣十分、有ナ
カラ底ニヨク水ヲ含テ其含惟肌表ニほゞ肌膚ニ皺有モ
ニ症共ニ陽脫、症ニメヨクハ死スル有ニ止ムテラ得ズンバ
防己夜苓加附子湯ヲ用ヘシ

防己夜苓加附子湯方

防己夜苓各四兩
葛根一兩
黃耆一兩

十瘡內攻水腫

小瘡頭瘡內攻メ腫ソ発スル有是ニ示

虚ト寒トノニワ有其内ニ虛腫ハタク寒腫ハ多キ石ノヨ
クク診察所要ニ利木ノ利ヲ專ニ用ヘシ必シモ瘡ノ
ワム不可元來小瘡ハ内陷ヨリメ起ル一トナシ坐レシ當
時腫滿メ腹脹スルハ皆利木ノ一レ故ニ先尾アタリ

附子各右五味水煎服

スル其水ヲ利スルヲ以テ信トス其水一度快利スレバ先下腹ス
ル處ノ瘡癰表ノ創ヲメ悉ク皆癰表ノ是皆經驗ノ要方ニ若
腹脹氣急至テ甚ク小便タレシモ通スルトナリ若罔メ死ヤン
ト欲スル有ハ可逆桃花ノ末、テ下リ取ルベシ然レモ同クト
下創ニ用ヒスメ効シ全フスベシ是實ニ止ムトヲ得ザルノ後方耳
其後驗ヲ見テ知ルベシ〇一壯年二十八小腹内攻メ逆水脹
ラナス医者二三人是ヲ下し脹益く甚シツヽニテ癰表利木ノ
創ヲ投ズレキ初アレ根若此ニ於テ極レリ而ヘシ五シ賴ム
廻身殊外脹滿シ其腹大説ノ如ク疾逆短氣喘喝鋸リテ
引如ク序越脾陽、白朮茯苓ヲ加ヘ一服、重サ十錢計、
調合シ氣テ三聖丸ヲ慢サシムタ方ヨリ翌朝至正前葉
五版丸革四枚ニ用エ翌朝ノ左腹中鳴動レ小便ヲ通ス

ルト一年計喘喝半ヲ減ス前症ノ如ク呼吸息迫脹脹強
ク実脹、相違ナクハ甘遂桃花野蕎薇ノ末、ナ一度下
ラ取ヘレ下リ取テ后勢ニルニテバ降氣ノ創、轉々レ前症
ノ如クナルニ虛症ヲ見サバ犀角ヲ用ル症有真武ヲ用ル症
有又是若く見計ヒ

水腫喘急足冷經驗

水腫ノ症喘急足冷大危キニ至ル
者、蘇子降氣湯、附子ニ加一ヶ即効ク取ルトヨリ心工
ベシ。蘆子降氣湯ハ喘急有テ足冷ヲ兼ルミハ必入蘆子
降氣湯ヲ用ベシ足冷ナクハ用テモ効ナシト教ルカ當家
蘆子降氣湯ヲ用ル口傳ノツコノ予一病人ヲ治シタル
ト有懶ノ口付右衝門ト云フ有水腫ニ患フ其腫一ハイ
滿テ身ヲ効ス、ナホズ因モ腫レ塞リテ困ク、ナラズ

喘息甚メ惟今蔭命セレトスルニ似タリ葦ヲ用テ効セ
ト。トシク頓ニ是ヲ診スル、足冷ノ氣味有息キレノ様子
セ、帝ナラズ薦子障氣陽ノ喘息ヨソカナーリ因テ何レ
症ヨリ起リ何レノ革ヲ用テ効ナレト云フ。問フ、障レ共
眼筋ノ足冷ト喘急トノ模擬ノミツイテ脉モ取アヘズ先
薦子降氣陽ニ附子ヲ加ヘテ一服ヲ用ユ一服用ヒ既ルト
便通スル。一六七合計ノ明銅、至テニ二版ヲ用ヒ又カ便
通スル。一并全ラ得タリ夫ヨリ續テ毎日一并全ニ外
計四五日モト便便利メ遂ニ全狀ヲ得タリ葦ヲ用ヒ初ル
ヨリ休革ノ日迄始終薦子障氣陽ニ附子ヲ加ヘテ革効
ヨ、サム体革シタリ是虛水ヲ治スル口傳真秘ノ處也。

薦子障氣陽方

薦子五錢陳皮 厚朴 利肺 四桂枝各二錢白芍三錢

牛蒡五錢甘草 一錢 姜半水並服

脚氣腫處方

脚氣腫處方、スベテ脚氣ノ水腫食物ニキビシク禁シ行水
ノ葉シ塩ヲ葉シ此三葉ヲ守ラザレハ何往ノ神丹靈藥ヲ、
服スト云ヘモ効ナシヨリく革ヲ調合スル前ノ病人ニ戎メ聞ス
ベレ若此三葉ヲ守ズハ革ヲニヘレド云フ、經戒々ビシ期アラ
サレハ諸證効ナシト知ルベレ。スベテ脚氣腫水革ロ入レバ
乃チ吐スル者是大病ニメ多クハ寢アリ。又病勢末烈シカラ
サルニ時々クツトコニアケノ氣味ニ寢エル者是モ亦多クハ
大病、至ル者ニ〇脚氣ノ初発半足ニタク麻痺ヲ寢一或ハ
腨腸硬物シ或ナク氣急シ或半足タク腫レ其脉實スル者
ハ換薦子障氣陽ヲ用ベシ其効歟テ小換腳湯ニサレリ。

換薦子障氣陽方

紫蘇半錢杏附三錢陳皮 三錢甘草 杏木瓜

桔柳子 穴活 木香 右八味木並服

下枳榔陽方

半夏 生姜 桂枝 桔柳子 末右四味木

並服○此方ハ外暎 秘要ニ出タル方也

脚氣膝骨弛緩腫

スベテ脚氣腫寒 脚氣溫脚氣

ニ症ヲ問ス惟十便短治メ氣急シキ足麻痺是ク或膝骨弛緩スル有越脾湯、蒼朮茯苓ヲ加ヘテ用ベシ

越脾加朮苓湯方

麻黃、石膏右大 大棗、甘草、蒼朮

茯苓 生姜半夏

右七味水煎服○若心下ユタワリテ氣

急スル有ニハ本瓜桔柳ヲ加ヘ或本革芍藥用スルト宣祀向三四支ニ至ルベし若麻症虛火心下ニコタワリ有者ニヘ附テナク加フ或人問テ曰膝骨弛緩ト如何ナル症ヲヤ答テ曰ク膝骨がカクシトカナク覚ヘル症ヲ云フニ是ヲ目的ニ用テ効ク

取ルト有

脚氣腫心下痞硬丸甚

スベテ脚氣腫寒 脚氣溫脚氣

ニ症ヲ論ジスト木不利 取方心下痞硬甚ソ其形並ラフヤノル如ク胸中に下コダフリテ呼吸促迫嘆息ニ脉ト症ト寢症ニ属スル有外暎秘要ノ黑豆湯ヲ用ベレ大ニ

ニ奇効有此症心下ノ診ニ口傳有

外暎黑豆湯方

前ニ有

胸滿氣急

スベテ脚氣胸滿氣急シ上衝ヤント欲スルモ

大枳榔陽方

桔柳子 大生姜 中薑皮 紫蘇 本川

生柴梗右水並服

脚氣衝心似結胸

スベテ脚氣衝心脅回大死セレ

ト歎スル方へ外茎ノ桑白皮湯ヲ用ヘシ

二二

桑白皮湯方

桑白皮、吳茱萸、桂枝等右水煎服

桑白皮湯經驗医按 六七年以前ヨリ急症ニ病流行
メ人ラリコナウテ久ナカラズ其症心腹脹痛或胸内隠
痛ニ刺ケ如クニ寔ニ或順卒急し呻吸嘆息ニ其形全傷
寒ニ結胸ニ症ニサモ似タリ夫故医有多クハ大陷胸湯ヲ
用エルヨリ外別ノ主段ナレ版事ノ后ニシハ病勢エム極ハ
見エレモ裡ナク又刺ノ如ク病勢盛ニシ其后又大陷胸湯ヲ
用レバ刺ナキ耳。水エ吐ノ氣味有テ並陽ヲ受ス次第
ニ胸中ニ衝キ上リ其危キヲ云フ計ナレ病ル处ノ病ニ其
様子多クハ如此或三日或六七日ニ過ズメ死スル有ハ死ニ生
ル有ハ生クトニラ様ナルヒドキ病ニ是ニ因テ医按ラメダラ

スニ其病症結胸ニ似シレニ脉ノ結胸ノ脉ニ非ク皆浮虛或
浮弱或沉微細ニメ無力因テ鬼ノ此症大症ハ非ス虚ニ下利
ノ宜ナ處ニ非スト鬼ニ付脚氣門ノ此方ヲ標リ出シ専一ニ
是ヲ五六人ニ施シコヽロムルノ其内大便秘結メ若ム有レモ脚
丈ミセトンヤクナク一味ノ下葉ヲ年一ス始終此方ヲ用テ人
ヲ救フトヲ得タリ其后又右ノ症ニテ虛候多キ有五六人有リ
ソコテ此方ニ附子ヲ加一テ服サシム皆全ク安シ此症經驗ヲ備
ヘテ療治ノ参考ニ備ル所也

脚氣衝心

スヘテ脚氣衝心ノ症ニ桑白皮湯或吳茱萸橘

皮湯ナトク用レバ苦味ヲ忍ニテ吐出スル有ハ沉香降氣湯
ヲ用エビ能シニ沈香ハ支那ノ産ノ上品ニシハ効ナシ
沉香降氣湯方

沉香半兩砂硝半兩杏仁附子一錢甘草三分

右水並溫服或症ニヨリテ舞子在巻ヲ加フ此症病勢を甚
キ者ハ此方ニ一角ノ末ヲ兼用入へし大抵昼夜ニ三度計
ニ用ヘシ〇又水氣心胸ニ高積メ利レ難ク其華英擣皮ナ
トヲ用テ通利セザル有ハ牛夏厚朴湯・犀角ヲ大ニ加ラ
用ベシ又十瘡頭瘡内攻ノ腫格別・全燭スル程ニモ至テ大
惟腹脹メ通シ難キ有ニ用テ妙也

牛夏厚朴湯加犀角

小瘡頭瘡内攻ノ腹脹甚キ者

此方主之〇牛夏厚朴湯ハ全速ノ牛夏厚朴湯也

牛夏厚朴湯方

牛夏一升厚朴二兩茯苓四兩生姜五兩

乾薑葉二兩右半升水煎服入

脚氣衝心竒方

脚氣衝心欲死有此方主之

桔榔子生姜童便右三味細末拌煖服劑/大小

臨ニテ脚氣スヘシ

脚氣胸腹飽脹并瘦弱

又ベア脚氣瘦弱/症ニ附子ヲ用

ハニ症ニ同テ附子陽ナトヲ用ヒ兔角胸中ニコタワリアリ.
胸腹飽脹メ及テ附子ナド不相應ニ覓ル有ハ千金一趙
脾陽ニ本臥桔榔子ヲ加ヘテ用ルカ而ハ犀角麻黃湯
ニ用ヘシ此症ニハニ方先ニ熟附子ヲ用ヘシ

犀角麻黃湯方

犀角三兩麻黃一兩甘草一兩茯苓三兩

防己二兩黃芩一兩石膏三兩附子一兩白朮一兩川芎一兩防風

附子當歸二兩生姜二兩細辛一兩桂枝一兩右十五味水煎服

脚氣麻痺瘦弱

スニテ脚氣上衝シ氣急等ノ症退テ

后麻痺瘦弱スル者ハ千金附子湯ヲ用ヘシ若氣急
全ク去ラスニハ桔榔子本瓜旦茱萸/麦子加一テ用ヘシ

若心下ノコタワリスシ去リ雅久弊甲シ加ヘテ用ヘシ

千金附子湯方

桂枝芍藥大甘草附子薑木在差中

生姜右七味水煎服

脚氣衝心瘦弱

ス一テ脚氣衝心瘦弱最強七十水不

利：或腫滿、熱勢次ク十腹カラシ麻脾スル有ハ金匱八味丸

ヲ用エ並陽トナレテ用ヒ又可）方ハ前、出ス方中、地黃六乾

地黃：宜し

脚氣寒流

千金八處丸

凡市膝眼瘡鼻三里上廉下廉絕骨三隕爻

右八處、後瘡弱等症、大キ、効有条數ハ一九、五十枚で。毎日茶ニシテ然此腫滿上衝ノ氣味有名ニハ立シカラズ是等ノ症去テ后惟延弱ク力ナワザル有ニ効多キ矣也

凡毒脚氣脚痛治方

ス一テ凡毒脚氣、實ハ寒症ヨリ

虛症少シ其証脚痛或極腫スル有輕キ症ハ抵禦散ヲ用ヘシ。熱氣甚メ痛ニ甚キ有ハ越脾湯、牛瓜根脚工カガマテ用ヘシ此革ニテ痛ニヨリ兼ル有ハ大黃一爻里至一爻廿通至此三味ヲ鞠丸、大每夜一必ツ、兼用之。若虛症有病ハ千金遊脾湯、牛瓜根脚工加テ用ヘシ。但此証ハ三味ノ下劑但用之或桂支芍藥附子湯大ト用テヨキ丁モ有之

凡毒大痛治方

ス一テ寒症、凡毒硬腫ノ屈伸スカラズ其痛ニカムが如ニメ難忍日夜呻吟スル有ハ禹功散

禹功散方

黑牽子

妙細末
五十日

十面香

年麻

右二味細末

熱酒リ以テ若送ル一交毎日五六次頻ニ快ノ下利ヲ得ル
時ハ筋ニ凡ノ脛夜ニ五六次ニ用ヘシ然ラサレハ効モロ
此方姿々驟ニ汎毒ノ腫痛ハ章牛子ナシテ下スラヨシ
トス他革ニテモ快利ヲ取ルアレ其効率キニノ如ク
連ナラス元ヨリ用毒ノ脚氣ノ來タリト云ニモ惟汎毒ノ木
氣ケキ迄關節、肌肉、向々縫織メ痛ニラス計ニテ脚
氣如キ衡心ハナキ有之故ニ汎毒ハ病ニ淺メ法シナ
シ安シ生氏往々脚氣ニ汎毒ヲ兼ル症有此症偏・汎毒
治ラズ絕シ及テ人ニ誤ケトモ有之シ用テ診察スヘシ
脚氣腫實症經驗 脚氣腫ハ年生麻痺ノ氣味フ更テ
筋ラツ又腹章急レ手足、微腫有有乃テ脚氣初癥ノ症也
六十便グ牧利メ右ノ通り起ルモ有又秘スルモ有一体セズ

此初癥、症ニ十極脚陽大極脚陽極蘇厥院赤降氣陽
越脾陽ナドヲ用ルト先直例メ仕方、是ラホ越テハ誰
モ諸方、序ニテアゲムト此時、最初ヨリ三和敷ニ經年角
ツカヘテ効ラ吸ルト如神是祕スキ之但、經年角易力
テザレバ効ナシト又一種外ニ最初ヨリ腫滿ナル有有夫、
ハ三和敷ノ革カニテハ弱シ是ハ年老アラキ革ラ外五角セ子ハ
ナラヌト此其時、經年角白桃花野薔薇甘遂章牛芒硝
大黃ノ葉ク兼用スシ是常ノ水腫ハ如クキアラキ浮水ノ廁ヲ用テハ
其効一旦有トスレモ又アトカ反シタリ或日一培シ之乘
カキタリメ碍リニカルト見シ脚氣腫ハ先多クハ左股ノ害
ナリ者之走ハ如何、謂ナレハ脚氣腫ハ虚症ハ至アナク

寒症ハ至テ多ナシ少是從東ノ經驗也

三十



