


郷食庭秘説

雜奇方

二十
二十三

城 9
245
21





九折堂山田
氏圖書之記



溺水奇方

明鑿 燒右吹入口鼻耳前後二陟

未開及胸腹有動者用之有動與動者死

山ガヲ 黑燒右一味以崔吹鼻中其人屍穴

船醉奇方

櫻花 年開浸梅漿用

救溺奇方

服一角餘諸穴出

蜂螫奇方

蜂蜜塗之痛立止

河豚巢解毒奇方

櫻皮 燒並服

水腫脹滿奇方

沈香 大桃仁 杏仁 大生地 小艾葉 甘草

五八霜 赤小豆

右八味細末白湯送下

水腫燈草目的

生燈草屢効世人用熟草故不効

効ヲ

水腫黃耆目的 水腫皮薄而有光澤者及皮皺而水不浮者皆宜黃耆

水腫死候目的 水腫ヨリ水洩テ手ヲ潤シ又二陰腫肩ハ瘦セ臂ヨリ手ニ至ラ大ニ腫ルモノ又肩瘦テ下部大ニ腫ル者ハ皆死候也

水腫奇方 ヲクリカンキリ五文 赤小豆十文 澤泻五文 車前子五文

麥芽五文 宿砂五文 右二藥七服一分一日二服以服不腹
羊ノ内大麦一合 赤豆二合 引ワリ粥トナシ食ス塩ノ辛キモノ
行水ヲ禁ス塩ヲタツオハ獨ヨシ

鼓脹神方 綿実二兩 胡椒二錢 番椒皮二錢 紅花一錢 燂一錢

黑丑一錢 牛膝二錢 右七味糊丸梧子大十 每服五六十九
煎湯ハ其症ニ從テ調合ス

諸失血奇方 蒿雀燒存性 白湯三 送下 治吐血衄血下血

崩漏血暈二 兼二 虫一 螫二 シクル二 付テ妙也

衄血奇方 及鼻霜一 味白湯二 以テ送下 校摺一

下血奇方 黃連解毒湯二 加班桂一 花一 未詳疑班投

或於四物湯方内加鷓鴣菜二 亦妙也

瘡毒眼疾奇方 瘡毒入眼中二 失明者及諸眼目不

明者 雀子羽毛未生者 右酒一合 不死者取酒中浸二 置則

自然二 如泥一 十少二 度一 用

瘡癩脫落奇方 木ケノ二 黑燒酸一 付凡

喘急奇方 鷓鴣 黑燒一 白湯三 服二 奇効有

中風偏枯治方 中風偏枯當又服烏某類氣無不効左

瘰癧左腹結聚者多由胃火也宜白虎湯左右瘰癧者

由三焦火也宜防風通聖散

脉遲數吉凶

九難病脉數為凶脉遲為吉

瘡疾治方

瘡疾初起桂枝加附子湯類七八卷後以常

山截之

溫瘡治方

小柴胡加附子丸時入丸時入丸愈

裏入丸七次安之盡試効有

諸病死候目的

凡病者以柎指摸食指中節者死候

古胎附子目的

古黑胎乾燥破裂血流者附子功

之○又香白胎又三圍紅如クナル者附子功之○又眼

中亦莫アル者附子功也

黃連解毒湯里胎目的

古上黑胎如深者黃連解毒症

也嘗久下利古胎如黑漆者用之効

傷寒心下痞硬治驗

傷寒心下痞硬直視不語口禁木葉

不入者是肝氣鬱之灸中腕微暖天樞三日而諸証減因

身四逆散全愈灸大壯為不所經鬱閉則熱亦隨解灸

時頸面膏液如汗流者及灸迎皮肉突起者死候也灸

迎水起者活

瘡癩麻疹內攻治方

瘡癩麻疹內攻以紫圓下之

麻疹後下劑治方

麻疹後可下劑如不與者恙為

痢病

腸癰部位

腸癰診法左臍右旁而痛輕手摩之痛

處突起皮上潤澤如猶瀉器狀小便淋瀝右足拘攣

又有摩之而瘡形能鹿手者小兒多此病治宜挑核

養氣湯

虚勞氣急肋痛

虚勞氣急者死期近肋痛者必見血

虚勞不治

虚勞指頭火者不治

病人死候

凡病人氣漿冷者不治及鼻冷者死

熱病脚氣不治

熱病及脚氣爪甲無潤沃如蠟色或黑者

不治

腎間動氣死候

腎間之動以膈中候之其動不定者

虚候也又膈動者虚候也居中央不動不足

腹痛反胃頭痛癩痢吐方

積年腹痛反胃用吐劑及頭

痛癩痢宜吐方惠美三伯試効

反胃吐水灸治

反胃吐水自七椎至十一椎每椎灸之積

日而効

舌胎附子目的

舌上無胎者用附子後生胎為吉

勞虫有虫目的

候勞虫結脊每椎以指按之而痛者有虫

不痛者無虫又婦人良方以安息香薰之咳出者傳尸病也

諸痛秘茶

一推二推之間五十壯灸之

口中痛

足踝上三寸有處中一縱ヨリ手一束上テ灸ス

胞衣不下

右脚ノ小指ノ先ニ三壯灸ス

白帶下

膈下三寸兩旁一三寸同テ灸ス

小便閉

膈中ニ塩ヲ填テ灸三壯

帶下

病人ノ口ノ寸ヲ取尾ノ骨ナキヨリ上一當ル處ト左右一

口ノ長サ兩分百壯ヲ灸ス


竹本刺

三ツル上下一寸ヲ灸テ灸ス

婦人積氣灸法

五花灸治婦人積氣百病効有〇身正性

セシメ尺ヲ大椎骨上ノ端ニテ灸、因ニ隨テ、症レ尾龍骨ノ
端ニ至テ、截斷其尺ヲ半分、截半分ヲ捨去、余ノ半分ヲ又大
椎骨上ノ端ニテ灸、因ニ隨ニ下シ、尺ニ處ニ灸ス、其尺此尺ヲ
ニツ、折ニ分ヲ捨テ、残り一ウヲニツニツリ、中ノ折ノヲ初ノ点ニテ
上下ニ假点ヲナシ、又此尺ノ折、同ウ上下ノ假点ニテ、左右ノ端
ニ灸ス、上下ノ假点ハ、兩降スベシ



五花灸穴圖

毒氣上衝動氣

心痛ハ動氣心ニアリ、動氣乳ヨリ上、アル皆
毒氣上衝也、或飲食カ又酒毒ノ上衝モ有、三味湯ノ羹ヲ吐ス

方ハ藿香木香益智、右三味水煎服、一名益智飲

卒倒生死診察

凡卒倒スルモノ、足ノ裏ニキリカケ、大指ト、
次指ノ同リ強ク、按スベシ、痛愈メ、目ヲ轉ル、処ノモノハ治スル、若口

開不覺痛者必死スル、不可与藥也

反胃妙方

石斛、大黃、西部根、甘草、及胃吐逆試テ効

アリ、大同類聚方ニ見ヘタリ

反胃噎食奇方

固揚、按日、旋覆花、代赭石、湯治、反胃、噎

食、食逆、不降者、神効

湯火傷奇方

黃丹、山芋、生、右研、合、傅、之

又湯火傷奇方

大黃、石炭、右細末、以鉄漿水、調、傅、之

骨癭奇方

橘皮、一味、水煎服

癩癩奇方

胡朮、飛肉、甘草、右糊丸

痢病實痢

痢病初起同以紫丹也

痢病主利

陳皮大蒼朮中桃仁中黃芩中芍藥大甘草小枳榔子十

右七味水煎

久浮痢病奇方

茯苓散 治久浮或赤白痢大人小兒俱

用之

厚朴 枳榔子 茯苓 葛根右五 甘草右 細末以羊腸下之

小兒馬脾凡奇方

治小兒痰癖及馬脾凡

山綱 紅花

龍葵實右煨性 等方 輕粉少 右極細末白

湯逐下 輕キ 症ハ 七日或十日用テ効有リ ○按本草酸漿水

集解 同龍葵酸漿ト 一種ニ 龍葵ニ 與痰癖之主治酸

漿主治痰癖然則龍葵代 酸漿又 可也

厚朴瘰癧奇方

地黃煎一味錫入 微火ヲ 以テ 是ヲ 煨黒 入

患ル処ニ傳ル妙也

蛔虫治方

蛭虫ノ症ニ諸ノ殺虫ノ菜ヲ用テ相應ニ虫下リテ

モ其症不相應メ諸患ヲナスモノ間多シ是蛔虫下リ尽スメ残ル

故ノ一ニ其時ニ殺虫ノ劑ヲ用ントスル寸黒大豆ヲ炒リ香ク 粉

ニメ一大匙ヲ食シ直ニ初カラ用ヒシ 煎劑ヲ販スベシ 蛭下ル

甚速ニ是殺虫ノ劑ニ甘草ヲ多ク入ルト同意ナルベシ 是妙

術也

酸漿咳軟神方

酸漿草 右一味根葉實共ニ黒燒メ 咳軟

久不愈者ニ其症ニ隨テ煎湯ニ用スベシ

小兒赤遊丹毒治驗

小兒赤遊丹毒者熱瘡スル一傷寒

ナト瘡瘡序起ナトノ 如ク瘡起シ 又往來寒熱スルモノニ 而

一身中ニ錢ノナトノ位カ又ハ一寸一二分位ノ廻リニ赤ク色付

于其赤肉或腹或背ト処ヲ定メス傳深スルモノハ多ハ背ニ出
ルモノ之而ハ腹ハ傳深スルヲ惡候トス是ヲ治スルノ法手ノ大指
次指ノ間ノ臍際右谷ヲ唐胡麻ノ油ニテヒタスル寸ハ丹毒
ナレバ其所ハ精筋ヲ見スモノ之其時年又ヲ以テ刺メ血ヲ取リ
サテ鹿茸ヲ細末メ夫ヲ冷服スベシ叔亦右ノ一種ニハ小兒丹毒ト
云症有序熱ハ前症ノ如クメ而ハ腫ヨリ頬ハカケテ内ニ赤ク色付
者之且類痛吐吐ナトモ有モノ之此症早ク治ヤサレバ死ニ至ルモ
ノ之是ヲ治スルノ法男子ハ左女子ハ右ノカヲ瘤ノ上ヲ刺力ノ葉
ヲサシキリ其血ヨリ血ヲ吸イトルベシ凡四五日メ大抵腫赤
色トレルヲ度トス是妙術也

小兒初生胸中出血 十兒初生十日許ノ内ニ胸ヨリ血ヲ出
ス一有麝香蒼朮各等分右細末葱ル処ニ塗ル

瘰癧洗菜

馬鞭草 胡黃連 紅花 益母草 牡丹皮
右五味調合布袋ニ入テ 服ハ加減ニ隨テ水ヲ積リ煎シ度ニ可
洗〇扱此方末トナシ 藥縷自然汁ニ和シ鳥羽ヲ **打撲** 美
スベテ手足頭ノ強ク痛ニ付テ為妙ト

一身腫滿針術奇方 一身面目老ク腫レ目モアカガ
者アリ清泉ニ針ヲメ即効有

隨胎奇方 鹿角霜 麝香 延胡索 桃仁
右一劑ノ分量ニ細末白湯ニテ送下 經水通スルヲナス止
テ后服ス

諸病虛熱方瘰癧奇方 瘰癧并ニ諸病虛熱者皆

大已明目丹主治勞瘵を妙也
雄黃 木香 雄黃 天南星 雄黃 輕粉 一分 鼈甲 兔屎

右六味細末即良方明目丹也。○先酒一合ハ入大黃ノ末ヲ入方
入レテ煎ツメ以テ煉リテ丸トナシテ朱砂ヲ衣トスルニ○款
野氏ハ此方ヲ以テ虛勞ノ蛔虫ヲトスル秘方トスニ童便ニテ煎
服スルニ病人ヲメ固ク知テラシムルニ勿ク奇ニ妙ニ、

下血治方 婦脾陽ニ姜蘇ヲ加ヘ用

小兒赤白痢奇方 小兒赤白下利數十行ノ者ニ錢氏ケ白

朮散ニ附子ヲ加ヘテ用

虛脫血暈 四逆加入參湯ノ童便ヲサレテ用ヒヨ某ケ五合

童便五ツヲ入レベレ某ケ煮成テ午ル時童便ヲ桿テ用

落痂ハ奇術 落痂ハ頤ノハツレタルヲハ先ニ匠者ノ兩ノ大

指ニ麻ノ切カ木綿ノ切カヲ卷キ病人ノ口中ニ兩ノ大指ヲ入レテ

頤ヲツサシ手前ヲ揚テ大指ノ先ニカキカキ入レテ推シ下ル意

ニメサゲ入ニワト下勢ニ推入レベシ 指ヲ口中ニ入テ指先ハカキサ
入レテ指ノ頤ヲ推シサグルニハ臂ヲ揚クベシ

又落痂ハ奇方 猪茅皂夾細末ヲ鼻ノ中ニ吹入レテ多ク噴嚏

ヲサスベシ 雄黃ヲ量メ烟ヲカグテハ多ク噴嚏ヲナスト

又落痂ハ治方 妙也

妙也 妙也

妙也 妙也

妙也 妙也

妙也 妙也

妙也 妙也

妙也 妙也

妙也 妙也

妙也 妙也

妙也 妙也

妙也 妙也

大毒治方

十棗湯ニ下之

又大毒治方

四國糸 右細末用ニ五味子ニ似タリ又味ニ
モ似タル者ニ傍扱ヲヨク治スル者也

又大毒治方

馬錢 甘草 倍等 右二味煎服

又大毒治方

鉄漿大 生姜小 右鉄漿ト生姜ト攪服

又大毒治方

馬錢 三方ヨリ四分ニ至ル 右一味剉水ニ合經
一馬錢ヲツケ一宿ヲ經テ其汁ヲ吞服ス其應如神 一説ニ甘草
ヲ加シ如シ効ナクハ四処目モ用ベシ

痔疾奇方

金匱ノ黄土湯宜シ又痔疾ニ下血スル者ニヨシ

黄土ハ伏龍肝ノ下ニ

婦人患阻奇方

伏龍肝ヲスリ水ニ煎シ出シヨクくスニシテ
其伏龍肝ノ煎シ汁ヲ以テ菓ヲ煎ベシ是婦人ノ患阻ニ用ル時ノ

爲方ニ但シ伏龍肝ハ別ニ土計ヲ煎シ其汁ヲ濁リ氣ウモナキ
様ニ清ク其汁ニケ菓ヲ煎ル定法ニ然ル其煎シ菓ハアトヨリ
指テモヨシ

瓜蒂代菓馬醉木

瓜蒂ノ代リニ馬醉木ヲ用テ妙ニ苦ニナ
シニ吐スル者ニ末トナシ白湯ニテ送下ス宿食ナトノ菓ニテ吐サ
ント欲メ吐之兼ル者ニ用テ甚妙ニ吐スル者ニ瓜蒂ヨリ苦ニナ
シニ吐スルニ連也

齒痛奇方

平胃散ニ玄參升麻ニ味ヲ加ハ服ス

馬醉木効能

大根ノ葉ハ虫ノツキタルニハ馬醉木ノ葉ヲ濃ク
煎シ冷メカケル甚妙也

耳中虫入治方

耳ノ中ハ虫ガ入テ出テザルニ猫ノ小便ヲサス
妙ニ右ノ耳ハ入タルハ右ノ耳ヲ下ニナシ左ノ耳ヲ上ニメツギコム

甚妙く〇而猫ノ小便ヲ取ル爲方ハ塗リ桶カ塗リ鉢中ハ
猫ヲ入テ鼻ハ生姜汁ヲスリツケレバ小便ヲスル也

膈噎高方 河豚魚腸胃皮氏ニルデ黒燒ニス右一味細
末白湯ニテ送下ス一度五分ヅ用ユ一日三度位七日間
是ヲ用栗原幸庵家方也

癩狂高方 辰砂雄黃乳香芒硝雲母金砂石膏
礬石 水銀 黑銀 右九味細末蜜丸〇方中金砂
ハ乃チ黃芩ヲ粉ニスルニ黑砂ハ乃チ水銀也寶算山ト付

禁口痢高方 吳茱萸湯妙也又一本堂方有
直根人參黃連芍藥枳實右四味煎服ス此二方見合
ニ用ユヘシ

蛔虫高方 蛔虫ハユブタツテ痛ム且時々痛ム是其目的ニ

鷓鴣菜湯ヲ用ユ大黃ヲ加ヘシ病勢從テ紫田ニテ下ス妙也
犀角主治 犀角ヲ細末ニスルニ堅実ニテ急用ニ合ニ難ク
其時ハスリバチニ水ヲ少シ入レ直ニ犀角ヲスルベシ而大概入用
程ノ目方ヲ積リ於テスリヨキ程ヲ取リ右ノ水ヲ煎菜ノ内ニ
ハレテ用ユヘシ

咽中刺高方 咽ノ中ニ刺アリ飲食ヲ妨有者ハ
鬼箭羽 右一味煎服妙也

口瘡腫痛 口中瘡ヲ生シ甚腫痛ム者ハ野薔薇花右
蜜ニ浸シテキ巻ル処ニ傳之効有

大麻川高方 白蛇 烏蛇 右二味首尾ヲ去リ皮
骨ヲ連子割ニ酒一升ノ内ニ浸シ壺ノ内ニ治メ油紙ヲ用テ口
ヲ封シ土中ニ埋ニ白蛇烏蛇共ニ造物ヲ捕ハテ酒ノ内ニ於

此其酒ヲ吞シムル又ヨシ若シ乾ク者ヲ用ルオハ分量ヲ五倍メ酒ノ中ニ浸スベキスベテ七八十日ヲ経テ取り出し温メ服ス心ニ恐クハ瞑眩アラシム○又此酒ヨク瘀血ヲ去ルノ効甚妙也

療疽奇方

平池木 細末糊 和シ患處ニ塗ル

牛馬大猫解馬錢奇方

石膏 大甘草 煎吞シムベシ

小兒瘡疾奇方

煖蛇胆 炙日ノ末明ニ白湯ニテ送下

ス大人モ瘡スル者ニ用テヨシ

浮腫内攻方

浮腫内攻者癸散劑ニ吉益家ノ神祐丸ヲ

兼用シ水氣ヲ下スヲ優レリトス○即京河原所備前屋ノ室ニ通聖散ニ神祐丸ヲ兼用メ効ヲ得タリ

道中草

鞋ノ中ニ蔵瘡ヲ生スル者蘇ノヒゲヲ細末ニ患處ニ傳ス琉

璃疽 又是傳ス○蘇ノヒゲハ乃今ノ細工ニ用ルジテヲ用テヨシ

瘡奇方

山椒 巴豆 大汎子 牡蠣 右四味

研和シ膏ノ如クニメ直ス紙ヲ以テ其上ニ覆フ時ハ大抵煩固ヲ棄ス終ニ愈ルイラ得ル

疥癬奇方

泥鰌ヲ黒燒ニメ水ニ和白糖處傳ス○按スルニ

浮テ淺キモノヲ疥ト云深ク沈ムモノヲ癬ト云ニ癬ハ俗ニ云タムニ○又乾癬ト云フナハ錢カサニ錢癬ト名ク入門ニ五癬

ハ濕癬頑癬川癬馬癬牛癬也ト云ヘリ

隔噎奇方

隔噎ニ鶴鷓屎 為細末味噌汁調和服

又隔噎方

薤白 白砂糖 等分搗和シ湯ニ煎可用

小兒疳癆奇方

一切虫証者 野薺 兩 一 紅花 一 大黃

小兒五疳奇方

青黛 甘草 以上煎服 杜鵑 青黛 二味等分粉丸

彭脹奇方

大戟 甘遂 茵陳 陳皮 大腹皮 枳榔

木香 昆布 煎服如神

赤白帶下奇方

當歸 大川芎 芍藥 地榆 紅花 茶葉

右等 右煎服

痿痺奇方

痿痺者虎潛丸加附子煎服其効如神虎

潛丸方出于回春

口瘡奇方

治上氣熱毒口中生瘡者

礬石 甘草 右以水二合半先煮甘草減半后內礬石

焯消存嚼之數日而愈

走馬牙疳奇方

蘆薈消疳飲 ○ 治走馬牙疳身熱

氣瘕牙齦腐爛氣味作臭以及穿腮破唇者煎服之

蘆薈 柴胡 黃連 午房子 玄參 桔梗 山梔子 石膏

薄荷 羚羊 犀角 甘草 升麻 右十二味水二鐘淡煎葉

十觔並六分食右服

久癩截藥

諸菜無勁猪胆一味煎服妙也

久痢奇方

久痢才治スルニ後藤家

蒼朮 礬石 右等分糊丸服之

犀角湯

治妊娠口中生瘡者

犀角 當歸 芍藥 川芎 生地 以水二合煎取一

合日二服

瘡毒入眼奇方

于麻子子或同日巴豆等分 研勻敷百會 ○ 瘡毒

酒釀鼻奇方

二限不尋常眼腐爛用テ口口し 凌霄花 密陀僧 二味等分為末唾

熱眼腫痛奇方

黃連五分

天師粟五分

括石一分

存一分 薑一分 燻心一分

梅肉三分 別為二服並洗也

代寫口瘡奇方

青黛一分 胭脂一分

二味和勻塗之

亦氣絞痛奇方

一升薑蜀椒散治氣絞腹痛而絞痛及衝心

者附子一枚 乾姜半 夏半 粳米一升 甘草大 蜀椒九 煎服

雀目奇方

五苓散一 唐菖蒲一分

又雀目奇方

適遠散一 夏枯草一分

痔漏奇方

痔ノ痛ヲ止 昆布一分 並布一分 包一 患處頻

々温 ぬれ ぬれ ぬれ

痔漏奇方

痔漏三年の經テ 平前 有 適三家方

蘆薈一分 里五分 當歸一分

以上三味為一 每服二升温酒送下

脫肛奇方

薄荷一分 桃葉一分 珊瑚葉一分 三味以水一升煮

並之洗定 温之 而後 香附子五分 五倍子五分 明礬一分 為細 末一

傳患處

候痔奇方

一升 草一 一味為末 管吹入 患處奇 之如 神一

突目奇方

若荷白根搗汁一 絹包絞入眼中瘡毒入目 葉

坦研取汁酸漿汁 勻和入眼中

伴條家難產催生極秘方

伴條家一 子死 胎橫產逆 產一

身是一 日ヲ 神効有本味一 紅花大 蘇一 瓜一 較一 皮一 之一 口一 口一

一版一 三分一 程一 以一 某一 並一 ツ一 之一 リ一 タ一 ル一 項一 之一 用一 外一 牡丹皮一 大黃一 之一

加一 用一 ル一 之一 日一 之一 是一 伴條家極秘方也

狂犬毒治方

先一 犬一 毒一 ハ一 狂一 犬一 ハ一 勿一 論一 ハ一 一一 又一 夏一 月一 ノ一 狂一 犬一 甚一 暑一

之一 苦一 之一 用一 テ一 日一 ク一 人一 之一 咬一 ム一 若一 咬一 ル一 時一 其一 毒一 有一 狂一 犬一 之一 用一 之一 故一 之一

治法一 又一 同一 之一 凡一 咬一 傷一 ノ一 處一 ハ一 先一 人一 毒一 ヲ一 塗一 リ一 テ一 其一 上一 之一 灸一 之一 人一

アツカラサル程ニスベシ灸ハ二日程スルニ其患処愈安キ故ニ灸ス
ルニ患處愈ルハ甚悪シ凡十五六壯程ヨシ其疵大十深淺
拘ルニナク右ノ真ノ在犬及妊大ナレハ是亦毒有之忽ニス不可
患處腰以上ハ夫大ニ敷トス其中頸面ハ痛更凶シ故テ可ルニハ非
サレ凡先難治ノ候也足ハ安シトス〇凡咬レテ早速ナレ凡先
其日に割防敗毒散或升麻若根湯ヲ白桃皮ヲ大ニ加三匙下
ト用テテ置其當日ヨリ本割ヲ擲テ水ニ浸シテキ其明〇飯前
ニ冷飯ス必温飯ス不可〇本割ヲ番本覺或大ナルモノ一斗年
或二ツ或一ツ其人ノ老少強弱ヨルベシ在到水ニ浸ス白桃皮白
花ノ咲ク桃ノ木ノ幹ノ皮或中ノ或一介到同ク水ニ浸ス在二
味水茶碗ニハル一日一夜浸シテキ刺日ニ至リ借テ去リ
一度、頰版ス行モ出ス下リモセヌ吐モセヌ唯小便常ヨリヨ

ケニ、通シ其色薄茶色ナル是ヨリ黒トス凡葉ヲ用テ後ヨク睡ル
トケ葉スベシ睡レハ葉毒発スルヲ強ク去リ、凡一時計スルハ
葉毒發メ口引キ肩章キ耳動キスベテ周身寒ク動揺ス此時
芒驢^{ワトビ}ク下^{ワトビ}凡如此^{ワトビ}一時計メ自ラ治リ定ニル時食ヲ与ヘ
之後ハ睡ヲ禁セズ〇又葉ヲ用テ葉毒発メ先ニ其毒ノ淺深ヲ知
ル法物ヲ以テ枕上ニ堅メ不圖其枕ヲ打ニビツクリスルハ淺キ
之又耳ノ痒ケニ動キ身モ動キ強キハ深キ之〇又右ノ如
ク明日ニ至リ睡リサメ又其日ノ後トテモ睡サムレト常ノ如
キ之〇又毒ノ深キ者ハ一日二日ヲ隔テ再ニ此葉ヲ用ハ前
ヨリハサク強クスベシ下地ノ葉ニテ病人合^ハ手^ヲ覺テ居ル故ニ
少シ強ク用テモ驢カス毒深シト云ヘ凡再用ハ過ニ三用スベ
カラズ後ハ物ニ用ル處ノ並湯ヲ四五〇用テ止メ充其人

病ナト奏レバ症ニ從テ是ヲ治メ日限ナシ○禁忌赤

川鱗○左川鼻ノ中河ノス、キヲ忌養麦○又常ニ大ニ

喰レタルニハ○馬錢ニテ 檳榔子日 甘草右三味水ニ浸シテ

キ用テ横前ニ同シ此方甚毒ヲカキメ多クハ起テ又者之を毒

淫ニハ本方ヲ用テ之○白朮皮ハ様ニ時ナシ○凡医ハ馬錢ニ非

テ常ニ懐中シ不具ニ備ヨ○病人大小便ノ時獨立セシムル

勿顛倒メ即死スルイアリ甚慎ムベシ○毒ハコウ 向ヨリ棄セザレ

中ハ十四五日モ治スベシ已ニ奏スレバ日少キモ次メ不活也

一灸腹痛吐此灸法 最初痞根ニ穴ト兩乳下肋背端

ニ穴ト各々四穴ヲ灸スルイ三日其内ニ病激動堪ケルイアリ

其時灸壯ヲ減テヤハリ四穴ヲアレライ鼻ノ或腹痛拘急

或三日程ニ痛一尋ヲ減スルイモアリ然レ依同ノ病者ハ

激動堪カクケレハ其候ニテ灸ヲ廢スルイアリ此ニケム 用カク時ニ必

灸大ヲ廢ス不尙又年ヲ此時、灸スルイモアリ脊骨

十四椎此痞根ノ穴法ハ尋常ニ異ニメ十四椎脊大槪三寸位其

肉衰ヲ平ニ接排スルニ皮肉分ル、処有此穴処ニ其索ツツ 搜ニ手

輕忽ニメハ得難シヨクハ熟按メ穴処ヲ得ベシ西 肋背端肋背端 此二

穴ト痞根ト各々四穴此穴ヲ取ルニ捻子ヲ兩乳上ヨリ下レ脊

端ルル處此穴処右四穴ヲ灸スルイ三日若三十壯或五十壯其痛

者氣力尚健ニカセ灸スベシ四日ヨリ后ノ五穴ヲ各々九穴灸ス

○五穴十一推ノ兩旁二行通リ例ヨリセニクニ穴ヲ取ル又十一推ノ

脊骨ヨリ左ノ脊端ノ前ノ二行ノ二穴ト中如此三穴ト又十

六推ノ二行通セニク是赤圓ヲ按メ皮肉兩旁ノ方排處是穴

處ニ十一推一行十六推穴處モ二行通セニキ計ニテハ十二

兔角年柄。テ梅メ因ノ掛ク処ヲ真トス右五先ト前ノ四先
 トヲ合メ九先之四日メヨリ激動ナケレバ九先合メ或三十五
 壯或五十壯見計ヒ。灸スベシ初ヨリ五日ニメ灸ラ体元
 一二月メ又灸し前ニ合メ七日ヲ一週トス此一週メ大抵
 ハ痛減スル之也凡病患深固年久ク痛疾ハ一週位ニテ治スル
 一ニテハナキ之日數、約リナク病愈ラ度スベキ一之此有痛
 者、初ヨリ告テ知ラバ納得サヤクハキハ初四先ヲ灸メ助
 背下ノ灸。テ心下大ニクツロク之或心下クツロギテモ中腹辺ニテ
 ナヤムリ也有其時ハ中腹ノ旁見計ヒ一二寸間キニ先スル
 一有或其下ニテナヤハ遠里下腹ノ旁脘下ナレハ氣海ニ灸ス
 一之是其時ノマシラヒニメ真ノ穴法、非以テ先久年腹
 痛或吐諸治効ナキモノニ屢効ヲ得タリト云野三人ニ灸

又三人凡何ノ年モナク病愈タリ

一疝氣灸法 十四椎ヨリ十六椎迄ノ二行通リセマク梅掛ノ
 六穴或十四椎ノ旁二穴ト十六椎ノ旁二穴ト十五椎ノ脊
 骨ノ左ノ端一穴ト右ノ五穴カ六穴ヲ見合灸し又小腹ノ二穴ヲ合シテ
 ル一多し右五穴カ六穴ヲ見合灸し又小腹ノ二穴ヲ合シテ
 灸スルニ小腹二穴ハ病者ヲメ正堅マシメ濟ノ腹ヲ屈スレハ
 陰毛上ニ皺紋ヲ生ス其横紋尽ル処横骨ノ旁手ニ梅スニ
 クリメトメ痛ニ徹スル処是穴処右腰ノ灸処ト小腹ノ灸
 処ト相合メ灸スベシ灸數ハ三十五壯ヨリ五十壯迄スベシ
 痺眼雀目膏方 鷄肝此病眼傷目又治雀目膏効
 車前子炒蘆薈膏黃連糖一椀柳子平鷄肝三錢右糊丸
 或鷄肝生ニ煉タテ丸スルモヨシ此方經驗數ヲ知ス

又小兒疳眼膏方

小兒疳眼眼睛見翳紋者用之効

緋知字用

八目鯢鱧乾板肉

經三年者

赤蝦蟇

鷄膽 各半

虛勞勞瘵秘方

天石新麥門冬 陳沈香 葶藶 黃連 陳

本青 陳紫胡 陳犀角 厚朴 陳牛砂 砂參 陳

麝香 陳水莎 陳 右十九味煉蜜 丸 九トナレ 用 五一日

下ニ度ヨリ加ヘテ一タト 兩度 至ル病ノ輕重ヲ計リ増減

ニ革動有サハ脈ノ細數モ符口ト緩ニナリ瘦劣リ汗止

熱候モ此方ニ少クナルニ此方實ニ勞瘵ヲ治スルニ於テハ

損骨脫體ノ神方也

惠善家吐方次第

此方ヲ用レトスル前ニ七八日モ千金

方ノ胸膈腸ヲヤハリ常ノ煎薬ノ通り、用ルニ千金方ノ胸膈

腸ハヤハリ傷寒論ノ胸膈腸、大黃ヲ加ヘタリ方ニ〇其後

吐劑ヲシカケル次方ハ朝飯ヲ啖スニ吐劑ノ用ルニ目ニ

病ノ輕重ヲ違有ル一ニ其方先ニ三分ヨリ四五分或七八分

或一包目ニモ至ルニ然レ一包目用ルハ至テ稀ナル一之四五

分ヲ用ル一一定法ニト知ルベシ〇用ル薬ハ豆豉 一モ水一杯并

入一杯位ニ煎フメ此薬ヲ吐劑ノ飲けニメ用ル之〇右ノ通り吐

劑ヲ服メ後少シ抗ツ高クメ臥サシムベシ睡リヲトラスル極ニ

兎角吐ノ氣味瘴キヲ妙トスルニ一時二時年モ程ヲ経テソロク

ト吐ノ氣味出テ苦レカルヲヨレトス以ノ勢ヲ見合吐ノ勢ハ又ル

クハ鳥ノ羽或又樵子ナトニテ咽ニ無理ニ楕入ル、時ハ心ヨク吐キ

一俸モ二升モ候ノ極ナル者ヲ吐クナリ是宜キ一之又色ノ

有ラ相交ヘテ吐ク一モ有是モ空キリ^{十七}。又本草に出タル方。
ハ吐劑ヲ定メノ通り用ヒテ冰糖糖一塊ヲ口中ニ含セラタ
ベシ其冰糖糖口中ニテ解シニイタル頃吐ノ氣味至テ早催
ス之是又一ツノ至要也。而吐ノ内殊外若シ強キ者ハ汗モ大キ
ク出厚モ輝経ツク者若シカラス古書モ吐方ノ内ハ汗
下ノ二コモ九ト云フモ此場ノ要也。一方一吐止、強キ者ハ弱キ者
一ト計白湯或水ミテ服スル時ハ吐モ止之左候ノ一ハ掃、有
一ニテ常ハナキ一〇而吐后調養ノ一所要也。免前食ヲバ
急ニ用エ暫ク間ヲ於テ薄キ粥ハ湯ヲ少シク用ヘシ急ニ食マ
リツケル一宜シカラズ翌日モヤリ薄キ粥宜シ惠養ノ吐方
此一方ニテ他方ヲ用ズ〇吐劑ハ瓜蒂赤小豆ニ味細末等々
也

呃逆治方

吐ノ上ニ火ヲ禁燦ノ度ヲ掃除シ熱ノ棄メ其上ニ山
椒ヲ權ケ水ニ治ヘル楠ヲ用テ蓋シ一暫時楠ヲ固テ山椒ヲ搗
固ノ内ノ白ヲ去ルニ完テ易ニ悉ク白ヲ去テ若シ末糊丸服
虚勞死候目的 凡病人天庭、白色見ル、者ハ必死之候也

腹診死候目的

凡腹ヲ按シ任脈ノ正中^{三ツカ}脘下ヨリ鳩尾至
リ大筋ノ如キモノ乎、觸ルモノハ平人ハ三年ノ内ニ死病人ハ死
期遠カラズ任脈ノ正中ヲ離ル、者ハ此例ニ非ス

小兒驚風奇方

治小兒驚風熱毒衝胸插柳煩不
止者

白木茯苓桂枝半夏枳榔^{湯等}煎服此方ハ快

小兒驚風奇方

治小兒驚風熱毒衝胸插柳煩不
止者

積雪草 截菜 治等 搗什入青黛 八分 服之 是者加
午黃二分 是也

療疽奇方 治療疽痛劇難忍者

雄鼠糞 一味 為末 以糊和調 貼患處

頭上白屑奇方 頭上白屑 去之 以浮萍薄荷 為末 搽之

以煎湯 午巾 濡蒸 其上 又雄黃 粘若 未可 搽之

黃疽奇方 黃疽 小便不利者 茵陳 五苓散 加薄荷

黑白癩川奇方 生々乳 燒渣 酢和 傳之

試癩有無法 癩ノ有無ヲ 試ルニ 皂莢ヲ 燒爛ヲ 以テ 手頸
ヲ 薑ルニ 疾アルモノハ 手頸ノ 皮上 忽色ヲ 變ス

麻疹煩躁氣急死候 煩躁心煩氣促由是者死候也急益元

散 淡竹葉ヲ 加用ス

打撲疼痛奇方 山椒ヲ 其際 煮テ 用ルモ 可シ 山椒ヲ 星燒ニ 細末トシ 酒ニ 送リ下ス

截斷不覺痛奇方 身體ニ 患ル處 有テ 其處ヲ 截斷セシト 欲

セハ 露蜂房 五倍子 甘草 各等分 水煎 患處ニ 洗フ 一七 而後 截
ル時ハ 少モ 不痛

誤嚙舌出血奇方 誤テ 舌ヲ 嚙血出テ 不止者ハ 青竹 內紙

ヲ 捺リ 是ヲ 貼ス 又 舌ノ 痕ニ 粉菓ヲ 以テ 流レ 落ル 故菓ノ 上ニ 貼之
モ 又 佳也

婦人血分彭脹 桃奴凡 治婦人 室女 月經 不通 漸成 脹

滿 及 男子 墜馬 撲傷 以致 瘀血 停成 血蟲 痛

桃奴 假鼠屎 看雄 玄胡 桂支 五灵脂 桃仁 各等

創症者 加 白石 大黃 為末 蜜丸 湯酒 下 或為散 服亦可

吐吐奇方

白梅花ヲ取主刺ニ加フ奇効有十九

痢服奇方

烏鴉ハシトカラス一羽 土用ニ捕嘴足ヲ去リ腸ヲ割テ腸ヲ

去リ車前子二兩ヲ填メ忍冬藤ヲ用テ丸縛シ薑坑中ニ埋ル
ル一七日取出シ流水中ニ於テ洗淨シ車前子ヲ去テ用ク烏
鴉ヲ瓦器内ニ收メ墮泥ヲロソ固封シ燒テ灰トナシ別ニ饅饅魚
ヲ焙リ此里燒クツケ病人ニ与ヘ食シム幼雅ノモノニハ饅饅魚ニ
此菓一トク用三歳ノ兒ハ饅饅魚方寸ニ此菓ヲ傍ラ喉ニ
小兒腥ヲ忌ンテ饅饅魚ヲ食ハサル者ハ此菓ヲ糊丸版セシム具
乳母ヲメ饅饅魚ヲ多ク食シメテ自ニ又此方大人小兒ノ在日ニ治ス
ル一妙也

大人小兒癩癩奇方

鉄朱板 治大人小兒癩癩

鉄砂五斗辰砂二斗煨一斗 鷓鴣菜霜相本霜硫黃二斗 巴豆二斗 用四斗

右七味為未盡四梧子大十一丸或十五丸鷓鴣白湯送
下一月三度病深者五度隨証增損平常以五丸調之
鷓鴣頭去羽 韶丹去粗 糊丸梧子大一日二度二十五丸或三
十九白湯送下

治竹本刺不效者奇方

野鷄足

併皮骨 右臨時刮為末

糊和貼患處經宿即出

水氣衝心呼吸息迫奇方

治木氣衝心呼吸息迫喘

鐵粉斤 大黃 黃柏 欬粉各十 松脂如 甘草如 右糊
丸湯酒或白湯送下日一或或一或早
水腫利水奇方 不潤虛寒而用之
琥珀大 通草 茯苓三 以上三味糊丸每服三或兩

香湯送下一匙但尚香无効

痢病裏急后重奇方 如神 經治痢疾裏急后重者

沒藥 阿膠 麩子 大黃 為末 糊和 為錠 梧子 大一片 每用

二片 白湯送下

吐血下血奇方 吐血下血止二八

搜根毛 燒灰 亂髮 灰 各等 白湯送下 自五分至一錢

吐血奇方 吐血治二八

芥子 一匙 日乾 炒半粒 入研末 又 乾薑 小糊丸

諸淋新久奇方 諸淋新久不同 諸藥無効者

當歸 酒浸 大黃 日午 藤木香 海金砂 蜈蚣 亂髮 灰 水蛭 灰

為麥粉 紅花 以上為半 熱湯送下 草薢 湯亦得 草薢 湯

見于微瘡秘錄

淋瀝濃穢奇方

治淋瀝濃穢 痛苦 疝疝 不愈者

大黃 未 以鷄卵 為餅 炙 任意 燒 以 酒 送下

癩病奇方

癩疾者 白列 散 以 暖 蛇 酒 送下

赤白帶下奇方

治赤白帶下 不 腹 痛 連 綿 歷 年 諸 藥

不効者

白朮 蒼朮 黃連 當歸 川芎 羌活 獨活 大 日 草 王 瓜 根

以上糊丸 煎湯 服用 此症 又 瘡 毒 有 許 許 許 許 不可 其 目

的 八 小 腹 有 口 傳

橫產送產奇方

橫產送產 難分 挽者

龍眼 三分 或 一匙 右水 送下 桂 龍 必 附 方

小兒腹脹奇方

治小兒腹脹 羸瘦 下利 煩渴 及 嗜食

之証

蟾蜍 斥 黃連 佐等 糊丸

小兒咳嗽奇方

治小兒咳嗽 惠弄方

白刀豆 鷓鴣菜 忍冬 甘中 右先煮 三味内刀豆 搗

用之 聖妙也

婦人赤白帶下奇方

婦人赤白下 或燂水 如之者 下

腰冷等症 方治之

黃花 甘中 為半版 若不愈 看川芎 末酒 服之

麻疹下初治方

麻疹 小早 下初 可身 腸胃 批毒 多

少當 故 初發 升麻 葛根 湯 敗毒 散 藥 用 之 藥 散 少 批 疹 見 熱 增 批 疹 見 涼 膈 散 用 之 俾

下 入 早 七 惠 之 遲 効 効 効 妊 娠 此 批 因 之 墜 胎

スルモノ多し見又下証 有 察 得 之 涼 膈 散 之 投 之 寸 八 墜

胎ノ患ヲ可免頻 用 之 得 下 批 之 控 之 上 策 ト 又 盛 暑

ノ寸ニ當テ患之モノハ邪也 又 強 之 痰 喘 之 氣 輒 之 内 故 至 之 可

多シ其時ニ臨ニテ涼膈散ノカヨク及也 非 之 故 紫 田 之 兼 用

し速ニ下スヲ良トス 然 氏 氣 虛 弱 之 兼 用 之 可 輕 重 隨

テ涼膈紫田 撰 之 用 べし

麻疹内攻治按

一婦人年十八麻疹之患初起 強 之 批 散 之

初 之 投 之 疹 因 中 見 之 氏 升 發 也 不 熱 矣 之 音 乾 燥 之 吐

メ水菜 共 咽 之 下 之 一 條 不 見 熱 内 結 寒 之 疹 毒 内 攻 之 故 之

治療 スト云 之 氏 某 劑 皆 吐 出 之 如 何 氏 不 可 手 之 東 之 藥 之 之

持 之 如 之 然 之 一 途 酒 湯 之 用 之 治 之 之 蒸 之 汗 之 取 之 涼 膈 之

用 之 之 吐 止 水 牽 咽 之 下 之 一 之 得 疹 之 發 出 之 不 日 之 治 之 之

用 之 之 吐 止 水 牽 咽 之 下 之 一 之 得 疹 之 發 出 之 不 日 之 治 之 之

用 之 之 吐 止 水 牽 咽 之 下 之 一 之 得 疹 之 發 出 之 不 日 之 治 之 之

用 之 之 吐 止 水 牽 咽 之 下 之 一 之 得 疹 之 發 出 之 不 日 之 治 之 之

用 之 之 吐 止 水 牽 咽 之 下 之 一 之 得 疹 之 發 出 之 不 日 之 治 之 之

19 得タリ

酒湯法 桶中、蒸湯ヲ湛ヘ酒ヲ加ヘ口鼻ニ酒氣ノ微スル加
減ニシ病者ヲメ其中ニ安坐セシメ頸上ニ手巾ヲ厚ク蓋ヒ痛
胸腹背腹上ト等ク柄打ヲ用テ酒湯ヲ灌クテ緩ニス不可
暫メ起シ身体ノ濡ルヲヨク拭ヒ平卧セシメ被覆メ蓋ヒ汗ヲ
取リ吐止ニ随テ原腸散ヲ与フ

破傷風奇方 治破傷風角弓反張直視口禁橋樑折者入
車ヲ及脚氣上テ衝心等証ヲ

水尿 石菖蒲 黃芩 二味攪和頓服

中風妙方 芎藭 一兩 其後黑燒ニ酒ヲ七日ニ服以解為度

蜂螫奇方 蜂螫ニ干ノ莖ノ自然汁妙也

蝮蛇咬傷 烏毛干ニ黑砂糖ヲ加ヘ棟付テ妙也

狐憑診方

狐憑人者身他病混ニ易シ先才口ヲ診ニ脈種
々ニ変スルニ烟草一吸ノ間ヲ阻テ脈スルニ毎度脈狀異ニ是ニ
徴也愈々狐ト見タル才ハ医眼ヲ張テ其人ノ面ノ腫子ヲ以テ
ト見ツマテ居ルべシ然ル才ハ病人必ス忌畏ルモノ

乳癰初発奇方 乳癰未成膿者

土龍 灰以梅肉煉貼痛立止此諸癰有痛者皆効

癩癩狂治方并論

癩癩倒ノ義癩ハ簡ニ此症起タ
ル間ハ氣旺常ナラス簡略疎暴ニ人事ヲ知ス又間ニ此証
度ハ不覺間有ルニ狂ハ狂乱ニ〇三症其因皆積氣心
ヲ衝テ然テシム癩スル処ノ形ニ因テ若異ニ三症氏ニ不知人事
少ク異ル処ハ癩ハ寐テ不見夢ト同ニ癩ハウツラトト夢
ヲ見ルガ如シ狂ハ夢ヲアリト見ト同シ凡此症癩ス

レバ積気鳩尾、サレコト腹引ハリテ、扱ノ如ニナル。其中顛癩ニ証
ハ不発時ハ心下ニルヤカ之。在ハ静ニ見ユル寸モ積気ノ勢甚シ
静ナル寸常人ノ候ニナル者有レモ夫々希ニ顛ハ顛倒ノ不知人事
吹^チ泡^ハ速^ニ戦^ス声^ヲ、癩ハワツト位出し或笑ヲナシ不知人事手足震
掉^ス畢竟不倒ノ顛症之扱暫ク有テ積気收ト希ノ通りニナ
ル癩ハ甚レケレバ毎日幾度モ発モ有又一月ニ一度モアリ一年
一二度モ発スル有二症凡ハ脈弦ノ小兒ノ驚風^{ツレ}癩付テ凡人ノ
癩症ニナルアリ顛ヨリ在、成モアリ又三症互ニ相兼モ有ルイ之
狂ハ今云乱気之乱心ト云フハ是、非ス乱心ハフツト心乱ノ又^カ害
シ身ヲ撼スモノ之是ハ積気ヨリナスト云フ者、非ス心病之狂ハ積
気ノ勢強メ鬱^ス熱^ス衰^ス盛ナル之弱クシク見ユレモ女モ弱キ方
ハナク實症之方書是ヲ心血不足ト云ルハ誤ナラシウツラク

ト目寐ヒリ難ク或寐テモ恐ロシ中夢ナトヲ見テ驚テフツ
ト起恐怖メ人ノ抱付ナトスル之顛ス処ノ形狀サレクアル之発
セントスル前ニハ必ス静ナル処ヲ好ミ人ト應對スルイナトラ厭ヒ
心端多トリシメ但ヤウシメ何トナク物悲シク見ユレモノノ婦人思
慮^ス憂^ス鬱^スシ氣此ガ為ニ閉塞シ積^ス病^ス之故ニ男子ヨリ
モ婦人ニ多シ経閉メ瘀血心ヲ攻テ狂ヲナスイモ有此等ハヨク定
テ瘀血ヲ除リヤウニスレハ愈ルイヲ得ル之産后血暈ニテ狂ヲ
発スル有又積気血暈ニサソワレテゴツキ狂ヲ発スルモノ此証
強ク発スレバ治シ易シ緩ヤカニ強カラズ或發リ或静ナルハ愈カ
タシ積気腹底、汎有時ハ静シ浮ハ発者ニ多ハ初発ハ強ク
騒^ス又后ニハ静ニナルモノ之故、初発痛勢盛ナル寸、治ルカヨキ
居スハリ、神ニ成テハ治シ難シ脈數倍ナルアリ沈伏スルアリ

リ敷供ナルハヨシ沈伏ナルハ患シ陽病陰脈の見セハ此
當時ノ積氣ニテ在ラズルハ多陽脈之故多クハ難治シ治方
三在共ニ能胆白虎湯ニ花蒼年夏ヲ加フ又大便秘セハ氣氣陽
○又此症飛泉ニウクヤ上部ノ氣ヲキシ疎ヌケヨシ一旦快クテ
モ年ヲ歴レハ又奏スル一有心長ク責ベシ急ニ責ルハ患キコテ
コワク時ハ其氣カヲ見合テ責ルヤウニヒタモノクスル一ハ快
復スルモノ多シ

願齋在新校

丹溪語曰痰迷心竅云証有此語ノ意ハ
痰カ心竅ヲヌリカクセハ種々ウツクノ症ヲナシ謹言妄語ナト
有テ全ク傷寒ノ謹語ナト美スルモノニ夫ニハ加味導痰湯
ヲ用テ其心ノ臟ヲ唾リ隱スルノ痰ヲ治スルハ治スルニト云フ語
ノ意ニ然ルニ香川氏此用願齋ノ語ヲ駁メ云フハ是ハ大キニ

心ノ藏ヲ知ラヌ殊説ト云フベシ心ノ藏ニ膈膜ト云フ物カヘテ
アリテ無形ノ氣ハ心ノ藏ニ通スル一有レハ痰マ瘀血ノ積ナ形
ノ有者ガ心ノ藏ニ入ルト云フ一ハ決メナキ一ハ譬バ四維ニ張
タル障子ノ様ナ者ニ日ノ影或烟或風或土煙リナトノ様ナ形
ノナヒ者ハ皆障子ノ内ニ入ルニ而塵一ツ物一ツ形ハ有者ハ羅
ノ障子ノ内ニ入ル一ハナラヌニ心ノ藏ニ亦其通りニ痰瘀血如
キモノハ形ノキツト有者ハ其形ノ有者カドウメ心ノ藏ニ入ル若
ハナヒ然ルニ丹溪ノ痰迷心竅ト云フタル皆推量ノ説ニ取
足ラヌ妄語ト云フ是香川氏ガ行解ニ言ニ云フテ有説ニ
○今後藤氏ノ説ニ願齋ノ三症ハ皆積ガ心ノ藏ヲ攻侵
スヨリ発ル症ト云フ一固ニ丹溪ノ痰迷心竅ト云フタル
誤説ト其意同シカルベシ其臣細ノ積ト云フ者ハ氣積ニモ

セ日血積ニモセ日其外種々ノ積氣ハ皆物ヲ積テ形ヲナスヨリ是
シ積ト名外タルニ然レバ積ニキワト形ノ有者之其形ノ有積カ心ノ
藏ニ攻入ルト云フ理ハナキ一ノ顔面在ノ三証ノ病同ラ左様ニ
見ラハ大キニ療治ヲ誤ル一ノ顔面在ノ三ツハ皆心ノ藏ニ形
ノナキ毒氣ガ煙ノ如ク飛霧ノ如ククテノホリテ心ノ藏ニ何時モナク
攻入時ハソコテ心ノ藏ガ真暗ニナリテ或乱心トシテ顔トナリ
痛トナリテ右夢中ニナリテ性ヲ失フニサスレバ顔面在ノ三ツハ
痛ハ皆心疾之是ラ治スルニ其魚形ノ毒ヲ降サ子ハナラヌ一
是當然ノ理一〇或人同テ曰顔面在ノ三ツハ魚形ノ毒カ心ニツ
イテ夢中ニナル謂ハ知レタリ而右ノ三証ニ奔リ醒ノ有一ハ如何
答テ曰右ノ三証ニ奔リ醒ノ有一ハ譬ハ朝露路ノ振ナ者之朝
露ト云フ者ハ朝ニツクラニナリテ大木ヤ山ヲ隠ス者之夫ガ

五ツ年四ニモナレバ口ト痛テナクナリ其隠ナレタル処ノ木モ
山モ元ノ通りニアリト見レル今魚形ノ毒カ心ノ藏ヲ覆
ニ隠スモ其通りニ魚形ノ毒カ何時モナクスツト非テ心ノ藏
入り暗ニスオハ真暗ニ成テ無性ニナル一ソウカト見ル内ニ
其魚形ノ毒氣カ消テナクナルオハ又本症ニ成テ平日ノ人ニナリ
一是顔面在ノ三証ニ奔リ醒ル謂一〇或人同テ曰魚形
ノ毒氣トハ何ヲ指テ云フヤ其病同如何答テ曰此魚形ノ毒氣一
定ニテ云ニ難シ人ニヨリ病ニ因テ其毒氣ニ違ニ譬ハ瘀血カア
レバ瘀血ノ毒氣アリ瘀カアレバ瘀ノ毒氣アリ食アレバ食
ノ毒氣アリ瘡毒カアレバ瘡毒ノ毒氣アリ水カアレバ水
ノ毒氣アリ脚氣カアレバ脚氣ノ毒氣アリ胎毒カアレバ
胎毒ノ毒氣カアリ右ノ通り種々物ニヨリ品ニヨリテ病同

ハカハリ有レ心ノ藏一攻入りテ夢中ニナルニ及テハ皆カハレ
トナシ其因テ論スレハ右ノ外無量ノ病同ハ有之曰陶節庵ハ
傷寒六書ニ導赤在羊湯ト云フ方アリ又ノ右ノ導赤赤散
ト云フ此方中ニ犀角アリ此犀角ヲ此方中ニ組入タル至意誰
モ知ラヌ一之此犀角ヲ組入タル至意ヲヨク右魚エル時ハ願
痛狂三ツノ療法ニ於テ深ク其理ヲ得難クスクナカレハレ
心導赤赤散條下曰冷傷寒心下不痛腹中不滿大便如常
身無寒熱漸變神昏不語或夢中獨語一二句目赤
神昏將水與之則燕不與則不覺形如醉人匠者不
識便呼為死症若以針灸慢久多矣殊不知熱邪傳
入少陰心經因火上而迫肺所以神昏故右越經症
抱子 黃芩 茯苓 滑石 人參 犀角 知母 麥門冬

黃連 甘草 生薑 大棗 燈心草 水煎服

是陶節庵傷寒六書ノ全文也此條中ニ云漸變神昏不語
或夢中獨語一二句ト云フ形如醉人ト云フモ心昏ト云フ
モ皆是無形ノ熱氣カ少陰心ニ侵し入りタル症ニ夫故此通リ少
陰ノ症ハナサヌ一之夫故抱子黃芩知母麥門滑石黃連等
子熱ヲ驅リ醒シ犀角アリ心ニ入ル處ノ無形ノ熱毒ノ氣ヲ降下
スルニ是ニテ此方中ノ犀角面白ク解スルニ左様ナケレバ何
為ニ加ヘタル犀角ナルコトヲ知ル不可又黃連犀角湯ト云フ
リ是ハ回春ニ見ヘタル方ニテ傷寒ノ孤感心ヲ治スル方ニ此方中
ニモ犀角アリ是ニ前ノ導赤赤散羊湯ノ犀角ト同じ至意ニ此
ニ方ノ犀角ノ便ニレバ犀角地黄湯ノ便ニ口トハ大キ

運ヒタル者ニ先一應ノ犀角ノ使ヒ口ハ上焦ノ瘀血ヲ消スルト
云ノカ先並ノ使ヒ口ニ此犀角ノ使ヒ口ハ皆ク心ノ藏ノ血形ノ
毒氣ヲ降下スル為ニ使フタル犀角ニ其使ヒ口格別ナルト此二
方ノ犀角ヲ加ヘタル極バイウ考テ知ルベシ癩癩在ノ三ツノ犀角
ヲ使フテ此心得ヲ推メ知ルベシ○或人問テ曰心疾トハ如何
答テ曰心疾ハ右ニモ云通り鬼角心ノ藏ニ毒氣ガ入りテニツク
テニナリ支ヨリ常ノ性ヲ失ヒテ或卒倒ヲナシ或笑ヒ或悲シ
譫言ニ安語ヲナス病症凡ハ有トアラエル病症皆心疾ト云フベシ
○或人又問テ曰然ラハ傷寒ノ譫言安語其常ヲ失フモ又心疾
ト云フベキク答テ曰心疾ト云フベシ然レ凡其治方ニ至テハ輕重トハ
差別ナキニ非ス○或人問テ曰傷寒ノ譫言安語カ心疾ナラハ
皆一等ニ大氣氣ニモ小氣氣黃連解毒湯ニモ白虎湯ニモ小柴

胡湯ニモ竹葉石膏湯ニモ疎瀉散ニモ各犀角ノ如キ血形ノ毒
氣ノ追フ品ヲ用ヒベキニ其治法ナキハ如何答テ曰成程在ノフニ
シニ傷寒ノ熱毒ガ胃ノ府ニ集リ充満スルナハ熱ハ元ヨリ血
形ナレバ其毒氣ガ心ヲ侵ス心ノ藏カ暗クナルヨリ常ヲ失フテ譫
言安語ヲスルニ此治方其熱毒ノ集ル胃ノ府ノ熱ヲ醒ヤバ心ハ
入ルベキ熱ヲし熱ナケレバ心ハ無變ニ居ルニ故ニ取分テ心ノ藏ニ無
形ノ毒氣ヲ降下スル犀角ノ使ヒ口ナキニ若又心ノ藏ニツキ入ル毒
氣ガ有テ熱ヲ消ソバ是ハ犀角ヲナケレバ治セ又ニ是道守者各半
湯犀角ノ心得ニ○或人問テ曰毒氣ノ謂ハ如何答テ曰毒ハ体
ニテ氣ハ用ニ假令ハ夏月スニタル魚肉ヲ食シ其魚肉ノ中ヨリ毒
ヲ生シ其アサレタル魚肉ヨリ惡キ香ガ立升ル人足ヲカケハ
臭ヲ衝テ胸悶クナル見染ハ体ニテ形アリ惡臭ハ氣ニテ形ナシ

形又附子下ドラ多ク積ミ重子テ置ク時ハ其附子毒其内ニ
 生メ目ニ當ルト目赤ク成テ病ム一アリ是附子ハ体ニテ形アリ
 目ニ當ル処ノ者ハ氣ニテ形ハナキ也又毒隱ナト息臭ノスルハ人
 毒ハ形アリテ其臭臭ニハ氣ナレバ形ナキ也又狐ツキナトモ狐
 ノ体ガ人體ニ入ルニ非ス狐ノ氣ガ心ニ衝シ是狐ハ体ニテ形アリ
 人ニツク者ハ氣ニテ形ハナキ也是等ノ理ヲ以テ体ト毒ト一ツニメニニ
 メナナル一ヲ知ルベシ氣ハ元形ヨリ出ル者ニ此理ノ願痴狂ノ上ニ
 移メ考ル寸ハ其理自然ニ明ラナルベシ人ノ腹中ニ瘀血ト云フ者
 ガ瘰ト云フ者ク食ト云フ者カ其外何ゾ積聚スル処ノ者カ
 又ク腹内ニ畜ヘアル寸ハ此体アル畜積ノ者ヨリメ血形ノ毒氣
 生ズルニ此氣ニ形ナシ形ナケレバ輕シ輕キ者ハ上一等ハ是
 血形ノ毒氣心ヲ侵シ安キ処ニ脚氣ノ心ヲ衝ナドモ有形

ノ毒ハ非ス血形ノ氣ニ故ニ其生意モ多ク犀角ヲ用ルニ爰
 ニ於テ犀角ノ用ニ按脈ナレトモ工使々知ルベシ也或人問テ曰
 癩癩狂ノ治法ハ如何答曰癩癩狂ノ三ツハ右ニモ云フ通りテ
 畢境メ云ハバ心疾ニ心疾ハ毒氣ガナケレバ心疾トハナラ
 又ニ其謂ハ何ノ毒氣ニモヤ心ノ藏ニ毒氣ガ入ルト常ニ失
 テ心疾トナルニ此毒氣ヲ夾ニザル寸ハ心疾トナル一ナシ
 其謂ハ假令バ乱世ノ時男ハ皆軍場ニ出テ戦ヲスル其女
 房子ハ内ニ居具苦勞筆舌ノ尽ヌ処ニ非ス苦勞ヲナシ氣
 ヲ使フテ心疾トナル者ナラバ乱世ノ時ハ百人ノ者九十九
 人ハ心疾ヲ病ムベシ惟乱世耳ニ非ス今日ト云ヘ氏此理ヲ以
 テ考ヘ見ルベシ或親ヲ失ヒ子ヲ失ヒ或資産ヲ失ヒ其外
 死ニツ生キツメウキナクモ心疾ニナラヌ者イクラモアリ

又多ク金ヲ持浮世ノ一ニ苦勞ノナキ人ニモ何タラモ狂ヒ乱心ト
成テ心疾ヲ止ム人アリ是理ニ於テ云フ所ト苦勞ノ人ニ乱心モアラ
シ心疾モアラン苦勞ノナキ人ニ乱心アリ心疾アルハ如何ナル謂
ゾヤ論此ニ至テ一向通ヤヌトナルハ是他人ノ謂ナシ其人ノ
腹内ニ毒氣ナキ人ハ千辛苦勞ス氏狂ヒモ乱心ニモ心疾ニ
モテラヌ之腹中何ダ毒氣有ル人ハ少シノ辛苦ニ合テモ其毒
氣ニ指合テ直ニ心疾トナルハ又サワハリト辛苦ナキ人ニテ氏
其毒氣ガ指合バ乃テ心疾ト成テ其本心ヲ失フハ是癩痴狂病
同中ノ又病同ニ此處深ク思フベシ浅ク思フテハ其理ヲ得ラズ
○右ニ同テ見ル時ハ癩痴狂ノ如キ者ハ皆心疾ニ心疾ハ必ス
毒アリ毒アル者ハ先其毒ヲ去テ子バ治セ又道理ニ其毒ヲ
去ルハ 羶羊角ヲ第一 神仙ノ良薬トナス其次ヲ羶羊角トナス

三九

キチカニ

其次ヲ一角トナス此三味ハ誠ニ心ニ衝タル処ハ無形ノ毒氣ヲ降
下スル最上ノ靈薬ト是秘スベシ○此理ヲ知ラヌハ後藤先生
能膽ヲ以テ癩痴狂ノ心疾ヲ治セント思フハ甚誤リ之是蓋
子所謂録木得魚ト頼テ養ナルベシ是等誤リ何ニ因テス
ルト云フハ癩痴狂ノ三ツヲ有形ノ積ヨリ養ルト見ル故ニ治積
ノ能胆ヲ以テ治セント思フハ其誤リ此ニ於テ見ツベシ○
予一人ヲ治シタル一アリ其症俗ニ云フ癩痴之朱砂安神丸
羶羊角ヲ加ヘテ治ス金ク愈タリ如此治方ヲ以テ其効ヲ得
ルト推其一人ノ治例ヲ奉テ其便ヒロク知ラスルニ餘ハ考ヘ
テ治ヲ施スベシ○此無形ノ毒氣前ノ中風門ノ内ニ於テ有
増ハ弁シタル未言ニ足ラヌ処有故ニ再其本定ニ論ス我が
門ニ至ス者也

靈天蓋之并

或人問曰虛勞房瘵。其天蓋ヲ用ル謂如
何答テ曰饗庭家秘說論ノ牙類論角類ハヨク無形ノ毒ヲ
降下スル能アリ此心得ヲ以テ諸牙諸骨ヲ便ベシト云フが實
庭家ノ口傳ノ一ツ也此ヲ我ハ實庭家計。限ラズ香川氏
ノ果原幸庵ガ說モ見ヘタリ其天蓋ハ諸骨ノ毒ヲ降下スル
ノ最良ノ故。方瘵ノ症ニ用ル寸ハヨク心肺ノ毒氣ヲ降下スル
心肺ノ毒氣ヲ降下スルノ說ハ前ニ虛勞門ニ詳ニ保セ見
ルベシ今復。其并ヲ略ス

乳汁膏山診法

乳汁ヲ絞ル。夕干シト落テ淡ク清潔ニ余
味ナキヲ上トス向ハ水ハギキノ口ヨリ出ル如キハ惡シ又乳
汁濃厚ナルハ惡シ

十次疳驚丸膏方

千金子指秘方 小兒疳驚丸者効アリ

甘草三錢 青皮六錢 天麻三錢 羌活三錢 辰砂辰砂此中ヲ取テ衣トス

右止味細末糊丸

馬脾丸膏方

甘遂ノ末。輕朴少加。妙也此証急喘促

重下注死モノ急。可下。遲キ時ハ死ス

取海虫膏方

赤花陰干 柳絮合觀花 麻仁右一兩 甘草一分

右細末麻油。煉末明。眼胞及手足瓜際。又リ日出ノ時。
拭去リ朝日ニ向ヒスカシ見レバ糸ノ如キ虫出テ瓜ノ先ニ
ラクスルニ針ニカケテ取ベシ

賊風說語

真品七戸當夏秋之間有賊風其氣甚溫
眩土人因。為火風。過定看身体微腫往來寒熱手足酸
痛治之方

茵蔯 桃仁 荊藿

右一虎口 右細剉濃煎治之方

或以某摩^新四体三日而愈若不早治则關節痠痛手足痿痺身不遂云云 南部候侍医高野貞俊註

穀食不下咽奇方 治穀食不下咽者

鷄子一枚 挽茶^{半合} 右和熱湯服奇効

乳痛奇方 柴堯湯 治乳痛

柴胡連芩^新 銀花 右水煎服

淋疾奇方 乱髮^燒 附石^一 右水酒煎送下

婦人血積腹痛奇方 漆膝丸 治婦人血積腹痛

牛膝乾漆^{蕎麥} 右為末丸酒酒或白湯送下

下瘀血丸 附子^三 山椒^一 巴豆^一 桃仁^一 蟅水^一 蟄^一 大黃

川芎^三 右七味丸一日服五上

漏下不止奇方 鹿茸^一 治漏下不止者

鹿茸 阿膠 烏賊骨 當歸^燒 蒲黃 酒^三 服

痢病止某 如神丸 止痢

黃連^五 黃柏 沉香 辰砂^五 阿片^一 沒藥^一 麝香

三 右八味糊丸

五疳鷄肝丸 治小兒疳

山茱萸^三 山茱^三 地黃^三 茯苓^三 神曲^三 麥芽^三 鷄肝

テリヤ^一 ア^一 カ^一 方 百葉^一 並^一 晒^一 玉乳香^一 丁香^一 香^一 及^一 鼻^一 目

木香^四 破^一 百合^一 沒藥^一 右蜜中^一 入^一 燒^一 諸^一 藥^一 煉^一 丸

梅瘡瘡痛奇方 洗梅瘡瘡痛甚方 鶴量先生

蒲黃^一 茵陳^一 右二味以水三合煎取一合^一 服^一 是^一 處^一

養黃奇方 梔子^一 犀^一 皮^一 湯^一 之^一 証^一 帶^一 虛^一 有^一 痰^一 者^一 細^一 目^一 摩^一 南

湯至定

犀角 茵陳 茯苓 麥門冬 蛇子 爵金 生地 竹茹

綱目犀角湯

方八前

臣執病病方

黃連 枳殼 湯 治利後初作多由濕

熱但下之後即服此湯二三劑並無再作百發百効

黃連 枳殼 當歸 白芍 芍 茯苓 厚 青皮

檳榔子 薄荷 本香 甘草 厚 右咀作一版水二升生

姜三片並一升食前溫服○濕熱作熾迫者宜下之

加之與朴硝者二錢

癩痢方

前出之鐵朱散考考スレシ也シ醫固有之此

方ヲ優レリトス

辰砂 相本霜 麝 鴉 唐蟻 巴豆 牛兩 麝香

一棟皮霜 三本 虎肉 輕 味合 調蜜 凡 梧子 大病

重者自一才至二才病輕者自一分至八分穢物烟虫下

為知服後凡方

葛頭 辰砂 鐵粉 龍腦 右四味糊丸梧子

大自二十粒至三四十粒白湯送下愈后三四日重者

知佐舌方 葯 蕪 皂角子 芋 莖 右三味陰乾火重

之病瘥セサルモノハ全ク愈又知凡葉ヲ用ト歎メ是ヲ

頻々發スル者ハ某効速ニ瘥セサル者ハ愈難シ又此病三四年

一葉ノ者ハ愈難シ毎歲或月々瘥者ハ却テ愈易シ

小兒初生驚風方 小兒初生三四十日若五六歲直視

搐啼聲不出世所謂急慢驚風者 乾桑魚 細針

布 泡漬酢中取出頻々紙口中至三四時則瘥啼聲得

愈或曰婦人血症瘥用有効

婦人血症 婦人血症 養血 功有

海眼法方 棟葉散 治海眼

棟葉 土中取 陰干大 杜鵑 灰或以土竟 茯苓 薏苡仁 乾漆 焙
以上為末 拌於醬油中 黑雌鷄 固 薩 之 微火 灸 之 日 食 方
寸許六七片

眼眶赤爛方

白梅 水浸 以竹篾 去薄皮 取肉敷於銅

版版置器中密封三四日 官親梅肉帶綠青 取出 絹包 磨

爛處

白屑膏方

訶子 七粒 胡椒 七粒 梨尖 三片 側柏葉 三片


右口味同精爛 絹包 摩 患 處

眼疾照草

正明教 慈前眼科秘方

滑石 三十日 爐 寸石 六十日 龍腦 以上極細末加辰

砂如桃花色為度 白蜜和煉 宜時 一法 諸眼疾兼治 後方



Faint, illegible text or markings running vertically down the center crease of the book.

Small, faint markings or characters located on the right edge of the right-hand page.

