




148  
82

饗庭家秘說

二十四之卷

作方  
風邪  
臨

紅印





九折堂山田  
氏圖書之記



小兒餘熱奇方

此方ハ小兒何ノ熱ト云フヲ知テ  
諸熱ニ用テ奇効有方ニ饗庭家傳來ノ方也

青波厚朴 香附子 白芍薬 柴胡 葛根 黄芩

甘草 右八味水煎服

和鮮湯方

此方ハ世ノ賣茶ニ在ル処ノ和鮮湯即此方也

人参 桂枝 芍薬 半夏 茯苓 蒼朮 乾姜

甘草 右八味水煎服。名古屋玄医翁製

作方ニ乃多傷寒論桂枝湯ヨリ思付タル方ニ我カ門ニ

風邪ノ惡風清涕ヲ目的ニ用ル方トスル也

臨産催生奇方

當飯川芍薬腹皮枳壳紫蘇

香附子 甘草 右七味水煎服此方ハ催生ニ用





予効有方心外二言五分ノナキ産婦ノ催生ニ此方一  
ニテ大抵スム方也 是我門ニテ坐右ノ方トス

**頭痛奇方** 草薢 防風 天麻 玄參 川芎 忍冬花

辛黃仁 黑豆 下茶 右九味水煎服是乃山牛湯

之瘡毒ノ頭痛往々効有方中ノ草薢ハ山飯未也

**眼病頭痛方** 馬嶋白芷湯

白芷 當歸 川芎 防風 薄荷 細辛 蔓荊子 柴胡

甘草 荊芥 右十味水煎服頭痛甚者菊花ヲ

加風眼ニテ頭痛ヲ目的ニ用ル方也

**小兒百日咳奇方** 消中餅子

藟根 枳壳 葛根 甘草 厚朴 枳榔 陳皮 茜維蔞子

紫藟子 旋覆花 右十味水煎服

**又方** 錢氏白朮散ニホウツキ菜木實凡ニ黑燒ニノ  
加へ用奇効有

**中風奇方** 人參少妙 沈香 紫檀 胡椒 爵金 阿朮

甘草少妙 右細末ノ大廿二丸ト温酒ニテ用工。

中風ノ病因多シト云ヘ凡ニ七八必不肝血ノ爵滯ニヨル  
今此方ヲ用テ其爵滯ヲ開ク時ハ中風ノ諸症自然ニ治  
スル也

**癩癩奇方** 前ノ中風ノ方癩癩ニ用テ効有

**湿瘡内攻水腫方** 赤小豆一 高陸一 麻黃七分 連壳

五桂枝三分 大黃五分 生姜一 右水煎温服

**産後水腫奇方** 琥珀湯

琥珀一 高陸一 桂枝一 猪苓一分 反鼻五分



右五味水煎服

蛔虫下穢物奇方

鷓鴣菜

二錢乃方

大黃

二方或三方

蒲黃 二方

苦楝皮 三方 右四味以水一合半煎取一合空心頓服日一度夜一度小兒ハ心ヲ用テ減之大便泻スル者ハ大黃ヲ去ル○此方ヲ用ルニ空心頓服ノ四字 肝要也此服法ヲ守ラザレハ茶効タチ難シ病人ニ其趣ヲ教ヘテ服サシムヘシ

男女治瘀血血塊方

香附子

年炒

阿膠

炒

反鼻

大黃 分等

右四味每服白湯一棧送下茶ノ多少ハ病ノ輕重ニ從ヘシ

中風語言澀滯奇方

空青ヲ細末シ少シク常ニ用テ語言

自流偏ス

癩風梅毒奇方

再造散 大風及癩毒不拘新痼服之

藜蘆 五錢

皂刺 一錢

大黃 十錢

白牽 六錢

反鼻 六錢

右五味為末溫酒下

狂犬毒奇方

華產班猫 五枚

鹽ヲ為衣炒以塩色變為

度以三茶盞煎至一茶碗腹如此七日除尽宿毒

瘡母奇方

反鼻

常山

大黃鼈甲

始一右細末用

產後冷熱痢奇方

黃連 乾姜 烏梅

右細末用

疔瘡疼痛奇方

水蛭 霜 烏梅

右二味瘡上傳

癰疔便毒奇方

烏賊 一錢

大黃 五方

反鼻 考

右細末用

虫齒奇方

山椒煎汁服○又方取蚯蚓腸置痛齒

凹外

又家方

桔梗 良姜 麻黃 山椒 櫻皮 塩 文字ノ



錢ヲ以テ鹽ヲスクヒ茶中ニ入ル各等分右水一杯羊入七分目  
煎レ口中ニ含之醒ル時吹出ス如此スルヲ數遍

治咳奇方

九每服五分一日三次服

地骨皮 鼈甲各二分 五味子一分 右細末蜜

治疔瘡方

針疔項熊胆水蛭巴豆末塗針口則黃水

大出

治中蠟毒方

蠟倍登刺毛知曰 右即時傳痛處

治蝮蛇毒方

塗蝮蛇於患處

治痔瘡方

蝸牛四五十箇以胡麻油煮以至膏為度

疳眼奇方

備中思好菴味增菜方 佛味增汁於土鍋中  
味增菜 緋知字肝 八目鱧 乾抄肉 雜增三年赤燬和用 雜增 雞膽各一分 右小兒疳眼、睛見絢紋者用之有

奇効

小便不利奇方

茯苓大 白朮大 沈香 乾姜 右四味煎服

吐血奇方

赤石脂 柘榴皮 右細末

又方

赤石脂三分 柘榴皮三分 於久利加字幾理 鹿角霜三分

阿片三分 柘榴皮三分 右為末取新汲水一盞內

醋少許送下其症劇者刺尺澤筋推之無動脈者

取血

癰瘰結核奇方

絲凡黑燒酒送一盞三四度

治便毒方

大黃三分 枯礬一分 木鼈子二分 穿山甲一分 巴豆一粒

右糊丸酒送下

胞衣不下奇方

反鼻霜一分 角石霜一分 麝香三分

右為末酒送下



乳癰乳不出奇方

鯉魚頭黑燒 右一味白湯送下

鯉喉急痺奇方

雄黃解毒丸

雄黃一兩 爵金一錢 巴豆十四粒

浮石丸

右酢糊丸津嚥下

血塊奇方

浮石各等 右糊丸

桃仁 大黃

治久痢方

白木礬石各等 右粳米丸梧桐大丸

頑癬奇方

輕粉一錢 綠豆 白附子 硫黃 牡蛎各等

右為末以唾傳獨嘯曰濕瘡頑癬傳藥愈之毒氣內

攻者不少故外傳藥則內必下之。此一條獨嘯別見

謹此方ヲ見ベシ

蜈蚣咬傷奇方

採藜葉與青葙若手裏揉和傳

又方

牽牛子花

或實

蠅頭十頭

蒲黃

右細末煉膏

藥ノ如ノ傳患處

大人小兒喘急奇方

灸巨里動脈上若十五壯若二十

壯。乾牛丸

乾牛十頭

合歡皮霜

桂枝一錢

右三味

為丸用

下血奇方

地榆大

宿砂大

甘草小

右以水二盞煮取一盞

服

脚氣上冲奇方

黑豆湯

黑豆五錢

大黃三分

柘柳一分

右以水三合先煮黑豆

取二合去滓入諸藥再煎取一合服

濕家頭痛奇方

口含水半盞凡蒂末少許貯小竹管

中吹入鼻中



中烏頭附子毒奇方 冷服味噌汁 和邦製一盞

癩毒痼疾治方 癩毒痼疾若面部若胸腹若腰

背若四肢窳陷見因四邊隱起若奇石恆宮其色紫黑者尤為難治後方主之俱腹氣不堅實則不可服

大黃末<sup>五錢</sup> 辰砂<sup>二錢</sup> 天蓋末<sup>老錢</sup> 麵粉<sup>老錢</sup> 別貯鉛<sup>五錢</sup>

於土器中安火上待鉛融去屑再加水鉛三錢鎔化下火待凝定未之合勻諸藥煎山飯末十錢取其汁每朝以

一茶盞腹散藥若五合若一錢後自且至卧時吞尽所餘煎汁若受毒於母胎者雖壯實之人不治假令治後老慎不可與

癩毒痼疾鼻梁破奇方 治癩毒痼疾鼻梁欲絕乾

粉諸藥不効方

百草霜<sup>二合</sup> 光明丹<sup>二錢</sup> 右二味細末攪勻厚紙

作袋如烟管大約長二三寸取藥末實袋中春于下緘定其口臨服置香爐中焚以竹管嚥之作蓋被爐使烟氣不洩七日而服盡以口內爛穢物下為知

治鼠毒奇方 打碎生蟹數是患處灸五七壯以解

毒之方下其宿毒知則患處四邊發紫斑

一切治吐逆方 治一切吐逆急迫者 二氣丸

硫黃<sup>二錢</sup> 水銀<sup>一分</sup> 右摺合以生姜湯送下

產后百日間不乳者治方 木通葉<sup>六錢</sup> 牡蛎<sup>四錢</sup> 麥門

冬<sup>二錢</sup> 右末糊丸大豆大蒲黃為衣一服早午五九日



夜三服忌五辛青菜他煎湯

乳腫奇方 蛇紫丁子 右末好酒解之烏羽塗乳

房

乳不出奇方 括萋根九錢青黛六錢 右末白湯送下

產後腹痛奇方 貯陳艾於瓦罍中焙熱帛包熨

脘上艾氣微口中則止

血淋奇方 海金沙末白砂糖送下

打撲折傷奇方 大黃二錢杏仁二錢 右以水二合煮取

一合臥時服後飲好酒醉為度至鷄鳴死血盡下

喉痺奇方 丹礬 烏頭皂角各等 以竹管吹之約壹方

五厘

諸毒停食奇方 金屑丸

礞石 百草霜各對 硫黃好真砂一錢 金箔一枚

右細末糊丸

痘瘡暴惡治方 刺尺澤委中取血

咽喉腫痛奇方 鼯鼠霜白湯送下

衄血奇方 及鼻霜白湯送下又方衄血輕証土龍霜塗

鼻頭劇者紙包實鼻中

喘息奇方 三灵散 喘息瀾咽喉墜疼方

茶末二錢 黃菜子 麩粉各二錢 右三味合調每服一錢 日二

夜二空心白湯送下

喘急救急奇方 茶實丸  茶實生熟 百合根

礞石各分 右三味研勻為丸每服一錢 空心白湯送下

血塊腹痛奇方 赤丸



牛膝 大黃 麩粉分 右三味蜜和調為丸每服五分  
白湯送下日二夜一 桑赤疹為知

**實腫奇方** 鯉魚湯 療水腫上氣引湯脉大者方

生鯉魚 一尺者去腸洗淨 右以水六合煮至三合去鯉服一合

日二夜一丸服用漆罌生抽獨活牙山椒等隨暗好入之為避腥臭故也

**諸結毒內攻腫滿奇方** 赤小豆湯

赤小豆 五分 鷄舌 三分 大黃 二分或三分 麻黃 一分 反鼻 細切 猪苓

七分 高陸根 二生用 右七味以水三合先煮赤豆減二合

內諸藥煮取一合去渣溫服日二劑或三劑

**產後水腫并毒腫奇方** 琥珀湯 治產後水腫或諸毒

生腫者方

琥珀 五分 高陸根 二生用 鷄舌 三分 反鼻 細切 猪苓 七分

右五味以水二合煎取一合去渣溫服日二劑或三劑

**疔瘡奇方** 南極散

鹿角霜 黃柏 瓜蒌根 南星 餘小 右四味為末以

水和調敷患處

**厲痛風癢瘡久淋治方** 再造散 治厲風攻諸血毒

爛瘡久淋方

反鼻 六分 爵金 二分 白牽子 六分 皂角子 大黃

右五味為末每服一錢空心白湯送下隨性多少

**頭痛腹痛咳嗽奇方** 抽刀散 治諸血氣頭暈

頭痛心胸脹腹刺痛咳嗽不止等方

五灵脂 古度りマニテト馬毛ノ佳 右一味細末白湯飲下日數



次甚者童便送下產後血暈昏狂惡露不下者大驢

赤眼奇方

洗塵散

礬石 黃柏各一分

右二味盛絳囊漬湯中俟眼中日

數次

淋疾疼痛奇方

合歡木錢 大黃五分

右二味以水半合

煎取一合日三劑

排膿奇方

排膿散

合歡 滑石 虎杖 甘草各一分

右四味為末每服一錢

空心白湯送下晝二夜一

轉胞奇方

巴豆膏

巴豆炒 田螺肉炙 右二味共搗成膏和勻攤一寸半圓

形紙貼臍下一寸五分別作三寸圓形紙貼膏邊覆之氣

安貼痛劇者最驗了

結毒下疳骨疼奇方

輕粉丸 治諸結毒下疳骨

痛淹不愈者方

牽牛子二錢 大黃 輕粉錢 鹽梅肉一箇 右四味為末

糊丸茶末為衣每服三分日三空心白湯飲下不須嚼

以六日為一劑七日平且空心服備急因三分穢物

當大下凡施劑不必盡劑隨病者強弱輕重斟酌之

後方亦從之此藥尤峻烈慎勿過用服後口中爛者

銀花煎方嚼之

癩痢奇方

藜蘆散

馬藜陰干 水蛭餘 燒存性 右二味每服六分空心白

湯飲下日二夜一以穢物下為知大人小兒多少從權



病愈後試與菟蓐食之後發者作劑如前

諸結毒奇方 玉蕊丹

水銀五分 朴硝 綠礬分二 戎塩五分 枣肉五分

右五味合搗和調一九一方以蜜蠟為衣日服五九空  
心白湯飲下

諸結毒奇方 金花丹

絳礬五分 枯礬 水銀 滑石分十 枣肉五分

清塩五分 右六味先極研枣肉內青塩少許令相得  
甞之以味差鹹為度次內絳礬研和入水銀細研不  
見星枯礬滑石次牙相和此藥極鍊益佳一九重一分  
密蠟為衣每服一九空心白湯送下晝夜五次以大便  
如斯烟泥為知尽止

脚氣衝心水腫治方

黑豆湯治脚氣衝心周身俱腫者

黑豆八錢 桑根白皮一錢 楮柳一錢 都李一錢 右四味以  
水四合先煮黑豆減二合內諸藥煎取一合日三劑○都李

仁代リニ野薔薇ヲ用テ可也

諸結毒漏疾奇方 治諸結毒漏疾不愈者

銀花一錢 遠志一錢 右二味以水五合煎取三合洗患處日

數

中魚肉毒奇方

玉穗湯 治歎魚肉毒頭痛寒熱面紅臉  
或遍身發赤斑者方

荆芥一錢 橘皮一錢 右二味以水二合煎取一合日三劑○或

櫻ノ皮ヲ加ル又可也

狂癩奇方

白龍散



白豆刀 禾粉十 反鼻三 右三味細末每服一匙日二度  
夜一度空心白湯送下不得入咽者冷水亦得二三日後喜  
唾者為驗凡初發四五日間狂躁者用經驗數年者  
弗効

**黃胖病奇方**

鎮神丸

治黃胖病氣上動胞短息

不得行步小便不利者方

鐵砂七 蕎麥三

右二味糊丸每服八分日三空

心白湯送下兼療下血家腹裏生塊動氣不得行步手足爪甲反裂者

**鶴口瘡奇方**

天南星

右一味為末水餅令如泥以薄紙

貼湧泉乾燥

**水腫奇方**

寒丸子湯

寒少 血子三

猪白皮一

商陸三

小麦二

右四味

以水二合煎取一合日三劑

**水腫奇方**

僊芝散

冬凡

鐘三

開頭填滿小麦四合燒為霜極節每

服一匙日三空心白湯送下并飲食中內之益妙

**諸結毒奇方**

芎黃散

川芎

大黃各小

右二味為散每服一匙日二或三空

心温酒或白湯飲下為丸亦佳

**氣疾衝心吐血奇方**

葶連湯 治諸氣疾衝心直視

煩悶或吐血不止者

人葶

黃連各五分

右二味以水二合煎取一合少加熊

胆汁亦妙



結毒咽喉腐爛奇方

伍寶散 治諸結毒咽喉腐爛

爛目赤耳鳴頭眩不能行步者

鐘乳石六分 虎珀三分 龍腦一分 辰砂三分 飛白麵三分

右五味極細末土茯苓二十錢以水一升二合煎取六合去滓三分取二合內散一分空心頓服日服三忌鹽酢辛臭小物

惡阻嘔逆奇方

伏龍散 治惡阻嘔逆不已者方

伏龍肝 右一味細末每服五分日數次白湯送下

產后嘔逆亦佳

水腫逆滿奇方

桃花湯

桃花二錢未開者佳 大黃二分 右二味以水二合煎取一合日

二劑或三劑瀉水如注

下停飲奇方

桃花散

桃花未開白者佳 右一味為末空心白湯頓服六錢後溫酒

併性用頃刻當瀉水患宿酒者立驗

諸結毒奇方

五物解毒湯

椒蘇各五分 金銀花七分 川芎三分 散姜五分 將軍二分 右五味以水二合煎取一合淹毒者加草薢一錢甚良

產後下利奇方

芍藥湯 治產後下利及經閉滯下上

氣足冷時發熱乾噫食臭心腹妨脹雷鳴切痛下利不止者方

芍藥二錢 香附子二錢 乾姜五分 丁香四分 甘草三分

宿砂五分 右六味以水二合煎取一合不過五日下利

漸減



火傷湯傷奇方

黑砂糖十兩辰砂一錢右二味煉調塗患

處隨手愈

又方 柿淡敷患處立驗

又方 黃雲散

黃柏 鷄子黃白脍 右二味研勻為餅子烈日曝乾

研為末平日貯之臨時水和令如泥塗之痛立已明日不

見痕神驗

打撲奇方

生鯽魚 砂糖

遺尿奇方

香龍散

反鼻

并反

丁香

二分

右二味細末臨臥白湯送下後

溫酒任性凡自七歲至十歲每服五分自十歲至十

五歲隨性每增至一錢十五以上每服一錢溫酒送

下惡酒者白湯亦佳不過二十日而愈

痘瘡貫膿治方

參耆湯 療痘瘡無險惡證而

難貫膿者

當飯黃耆

參

人參 生薑

各七

右四味水以二合煮

取一合日三劑小兒以意減之

誠姪娘方

欬麻指

以麻カラ

右一味為霜每服五

分日二白湯送下七日後不見月經者是姪也否者非

一方作火麻稍

小兒胎毒虫積咳嗽奇方

蒼之散

治小兒胎毒虫積咳

嗽不已者

蛤粉 青黛

各一分

右二味盛結袋白湯漬敷嚙之劇

者加秋海棠或積雪草之生研少許又絲瓜木重湯漬亦



良  
大便燥結奇方 寬中湯 治腹裡拘急大便燥結或秘難者

贊豆 シラ 糖霜 コウロク 鷄子黃 一枚 右三味先取鷄子

黃溶化內糖霜和令相得拌勻別以水一合煮鷄豆取八勺去滓入煎茶中拌勻臨臥空心頓服數日後氣降腹緩大便快通老人患便秘者常服大佳

癰疔潰膿奇方 排毒散

石蟹 燒為霜 反鼻 生掃燒為霜 好沈香 各一 右四味各為末每

服五錢或一錢日三 白湯送下溫酒亦佳

奇癖狂癡奇方

清中飲 療男女奇癖上氣爵冒 睛下無力怔忡眩暈羞明怕眩細慮纖憂悲怒無常

時為狂癡態或借世不已者

戴菜 草三稜 各一 右二味水以二合煮取一合日二劑

服後小便利者大驗

諸瘡奇方 發假膏 療諸瘡淹不差者

茶昆處煤 鹿油 右二味合者一時許傳瘡上神驗

痢疾奇方 神祐丸

阿片 一錢 黃連 沉香 縮砂 黃柏 各五 木香 甘草 各五

右七味細末小麦麩丸如綠豆大辰砂為衣冷水飲一九日三丸毒盛者初二三日量其輕重施三黃承氣之輩候毒稍退而后再用此藥若方其毒盛施之雖當時痢已熱解恐後發塊癖瘕墮脹等症病慎不可用也

便毒奇方

消核散 療便毒合口后核不消者



虎杖 右一味為末每服一錢日一夜一白湯送下溫酒亦佳

**水腫奇方** 禹功湯

赤小豆 羅商陸 木通 猪苓 冬葵子 右五味漿二合煎取一合日二劑或三劑氣急者別與甘遂丸備急因數而後用此方

**癰瘡奇方** 梅荊湯 楊梅皮 荊芥 右二味以

水二合年煮取一合日二劑數日後毒氣脹乾水出瘡乾而愈

**男女癰塊奇方** 鱉甲湯

鱉甲 桃仁 虎杖 大黃 右四味以水二合煮取二合二劑數日後從大便去異物香膠散毒用甚良

**噤口痢奇方** 寬中膏 療禁口利裏急后重甚者

三年酒 水糖 右二味入土鍋中以緩火煮令如飴數服之半日許行減穢物大下數日而痊大驗○陶按凡此病熱甚行數者初用三黃湯過二三日或四五日復方有此証則宜用此藥不然則恐後有他患矣或其初發時其人體弱氣乏腹裡拘急方其用得毒劑攻擊難堪禁口益甚諸藥不驗者甚佳大抵此藥主寬中醫者宜精審明辨以不失其機關也

**癰疽奇方** 雄鼠屎 右一味為末糊丸勻傳患處

隨手愈

**骨鯁奇方** 鸕鷀霜 用管吹咽喉立去

**又方** 人瓜 右一味以水一合煮取五勺頓服自然失



之

小兒驚風痰毒衝胸奇方

急搆飲療小兒驚風痰

毒衝胸上竄搐搦不已者

積雪草 生用 戴菜 生用 青黛 極研 右三味先拌積雪

草戴菜絞取汁各半合入青黛五分拌勻數次灌之加

牛黃亦良

輕粉毒口中腐爛奇方

銀花煎療服輕粉劑後口

中腐爛者方

銀花 三錢 黃栢 甘草各一 拓榴皮 此方恐脫青黛右

五味以水八合煮取五合去渣數次冷噲之日晝一劑

婦人血積腹痛奇方

漆膝丸治婦人血積腹痛方

牛膝 乾漆 蕎麥 餘亦 右三味細末用齧杵和為

丸每服一錢日三空心白湯送下溫酒亦得

眼疾奇方

鉛丹膏 療一切赤眼及障翳不多日

者方

巴豆 極研 鉛丹 各半 右二味以麻油及蜜少許和勻

塗額會乾換之二三日稍覺燥痒隨茶細泡是其

候不過七日効。陶按痘毒入眼七十日內極妙。

婦人血氣頭痛耳鳴眩暈奇方

五灵脂湯 治婦人

血氣頭痛耳鳴眩暈不得起心腹逆滿者方

水莎 一錢 昌陽 六分 紅花 五分 鷄舌 三分 五灵脂 碎三分

便燥結者加大黃隨輕重

癰毒凝聚奇方

紫雲條 治癰毒凝聚上部者吸



烟方

火麻楷去燒辰砂 右二味研勻以紙為管長八寸  
 以芥末納其中捻其兩端○作紙管法以紙為條博一  
 寸糊其一邊平鋪地上糊處向外擇竹管圍二分許頭  
 未因輾管燒令起紙邊糊處逐管轉自貼合而起此法  
 甚妙○以紙管植於爐中火於管頭以紙方幅  
 五寸者卷之令上稍孔窄下稍孔寬如筒形以寬  
 處冒覆於紙管上病人口中含水以卷紙窄處插  
 入鼻孔以氣吸其爛數吐其水更含新水日一夜一左右  
 皆上管

上部結毒奇方  
 及咽喉腐爛者

用霞條 治上部結毒頭痛癭瘤

鉛母八錢水銀二錢朱砂一錢沉香一錢參五分右五味先  
 盛鉛蓋上火鎔化內水銀拊著拌令相得傾住于紙  
 上研候如泥入朱砂沉香人參等之藥三味和調二十  
 四分填貯紙管燃火吸煙晝夜二次一如紫雲條法  
 以十日為一劑此方甚安驗與粉劑頭眩甚者大異

癩毒奇方

咸亨丸

薰陸細研胡桃肉炒令焦塊花炒令黑大棗各二十錢  
細輕粉五錢右五味別炒胡桃塊花大棗等次炒  
 薰陸候其鎔沸變黑內槐花拌勻取出與大棗同搗  
 篩胡桃肉細研與輕粉并諸藥合調糊丸服以後方  
 送下土茯苓七錢葶藶二錢以水五合煎取三合午前  
 空服以陽一合送下丸藥五分餘陽二次服盡病



重者服八分或一钱数日后若口中欲腐爛者即減服  
從前法○陶按此藥不必拘常法用解毒劑送下亦  
佳量其輕重表裏強弱以左右收功也

**癰毒偏枯治方** 化毒丸療癰毒沉痾兼治偏枯及一切痼毒腹痛等者

薰陸一钱 大黃 鷄冠雄黃 亂髮霜各三 生乳 右五味糊  
丸辰砂為衣每服一方日二夜一食遠稍冷湯服病重者  
日用至五六方服法依前法後寒熱如感風寒一身發  
赤疹者大良蓋此藥酷毒最甚得熱猛得冷飲緩若服  
覺由体發熱懈惰無力者煮綠豆冷飲立定或服冷  
飲立定或服冷水亦佳宜察其虛實深淺慎勿漫  
用功忌房勞怒悲酒醉及熱飲生冷等物若犯此者不

止不得効其害亦不淺鮮矣

**結毒漏瘡奇方** 白虎膏療一切結毒漏瘡淹久

不愈者

輕粉一钱極炒 人油二钱 白蠟三兩 烏賊骨一钱五分 天花粉  
二 麻油一合 右六味先極煮麻油試水中成珠子  
即入蠟拌令相得下火條成白色入餘藥和勻煉成貼  
瘡處

**下痢奇方** 獨行丸療下痢不已者

黃柏右一味糊丸每服一钱空心白湯送下日二夜一

**妬乳腫痛奇方** 甘草炒末 右一味蜜調塗痛處

又方一生栗子 右一味薄片焙乾為末水研勻塗之

**黃疽奇方** 槐露飲



鼠莽三 傷干石昌 陽絡七 右二味以水二合煎取一合去渣日

二劑

產婦口中腐爛治方

班竟丸療產前后口中腐爛者

鹿胎子一具燒

右一味糊丸空心白湯送下五日服盡

風眼奇方 排雲湯

車前子三 黃連 黃芩 細辛 大黃 甘草各三 右六味以水

二合者取一合日二劑小便快利為知

婦人乳腫痛奇方

好茶末 松脂各小 右二味以煎茶

解之塗腫痛

風火毒奇方 救急湯

杏仁三 桃根皮三 右二味以水二合煎取一合日二劑別

杏仁葱白俱杵成泥敷瘡口灸數十壯令口不合甚妙

又方 奪命散

班蝥三枚去頭翅足同

番木鱉二 右二味為末令調空

心白湯或溫酒送下日三劑或吐毒物或小便去瘀血及

白脂等物毒盡服之乃不吐利小便清白者為定不

再發矣若服藥不吐小便不出毒物或小便通後腹

痛者青黛黃連末冷水調服二物能解班蝥毒病愈

後百日内忌小豆麻子葑蒜等物此方響庭氏傳數

試神驗

結毒凝腫奇方

龍鱗膏 散結毒凝腫

百草霜 松脂各小

右二味和勻攤紙貼患處口陶

按乳腫痛類用妙

婦人血積帶下奇方

丁香飲 治婦人血積或帶下吐沫



上氣腰冷時寒熱咳嗽者

水莎一錢 乾草一錢 當歸一錢 川芎一錢 昌陽一錢 丁香一錢 紅花  
分三 右七味以水二合煮取一合日二劑或三劑服後熱  
倍前者為知

疝勞勞瘵奇方

義順丸 療疝勞 初發咳嗽發熱

盜汗黃瘦者

茶昆虛煤一錢 甘草一錢 麝香二分 右三味糊丸空心  
黃耆湯送下十五以上每服七分日二夜一已下用意  
減之

疝勞勞瘵初發方

墜狗丸 療勞瘵初諸証未見者

水豹 去腸胃 燒存性 右一味細末糊丸每服三分日二夜一  
空心黃耆湯送下。陶按疝勞諸症數用大驗自四五

歲十二三歲每服二分日二夜一劑者以意增之

下血奇方 烏龍散

百草霜 伏竜肝 焙不 右二味白湯送下日數次

血積痛奇方 香脂丸 治血積結痛者

阿魏一錢 乳香一錢 沒藥一錢 丁香一錢 右四味為末糊丸  
每服一錢日三空心白湯或溫酒送下

小兒疳証奇方 新榮丸 治小兒疳証黃瘦者

蟾頭 一枚 灸令黃色 鱉頭 灸令焦黃 蘆薈 會焙 胡黃連  
五倍子 苦棟皮 夜明砂 雀糞 各五分 一名天漿子 雀糞  
小便多者 不名天漿子 雀糞 熊胆 一錢 雄黃 一錢 麝香 一錢 青黛 一錢 右十二味細末以  
糯米飲丸麻子大一歲兒每服七丸日三茶飲送下隨年  
用意增之



日用良方惣論

又ベテ療治ヲ廣クセント思フニ先桂建トナルヘキ良方二三十方ヲヨク撰ラキ夫ニ加減差引ヲ療治スル様ニ心カゲヘキトシ夫ニテ療治ノカタハナモツトシ假令ハ香川家ニハ四劑ト云ト有テ是ハ加減差引ヲメテ十ノ者ハ四五方通りハスムトシ又去ル大家ニハ秋陽湯ト云一方ヲ製夫ハ加減差引ヲメテ十二八九スルトシ又仲條家ニ清氣散ト云一方ヲ製此方ハ種々加減差引ヲメテ産前産後ヲ初其外ハ切婦人ノ諸病療治ノハシラタテトシ是モ十二八九トスマズト右ノ如ク多ク桂建トナルヘキ方ヲ多クイテ夫ニ加減差引ヲメテ更ニテモ効ナキ時ハ乃思付ノ方ヲモ轉ズベキトシ固本玄治翁ノ云ハレシ通り療治ニイキスギタルトハ療治ノ大禁ニ先ツ持道ニ手ナレタル方ニテアシロウテ見テ乃テ効ナクハイキ

スキタル療治ヲスルモヨシ始ヨリイキスギタルトハ決ノ惡キトシ故上手ノ辞リタル病人ハアトノ療治ニ効ナキト多ク云ハレシト最ナルトシ江戸ノ原雲庵ハ不換金正氣散ニ種々ノ加味ヲナシ五十六方ノ口傳トテ家ニ秘メ有ト思ヒ合スベシ不換金ヲ万病療治ノ桂建トシタルト是世ノ知レル処ヲ後世ニ良医ノ名ヲ得タル処見ルベシ又張介賓ハ万病皆陰有餘ヲ陽不足ヨリ起ル病多シト云フヲ療治ノ桂建トシタル者又丹溪ハ張介賓ト相及メ陽有餘陰不足ト云フヲ療治ノ桂建トシタル各医又東垣ハ脾胃不足ヨリ起ル病多シト云フテキリテ補中益氣湯ヲ製シ是ヲ療治ノ桂建トシタル者又劉河澗ハ万病火ヨリ起ルト云フヲ療治ノ桂建トシタル者其外ノ各医良医ニ至迄療治ノ桂建トシタル者



云フ下非ズ今左ニ挙ル処ノ八方今日治療ノ桂建トナルベキ  
良方ニ是ヲ吐右ニ於テ數年試ムベキ一ニ故ニ其主治ヲ挙  
テ我徒ニ示ス是ヲ朝夕ニ熟シ試ル時ハ無量ノ大益有テ治  
療ノ桂建トナルベキ良方ニ我徒試之

**瘀血之劑**

桂枝中桃仁大茯苓大芍藥大甘草中

右六味以水一合半煮取一合分服○按婦人不屬外因者  
悉手之凡婦人經閉腰背攣引脚蕩腹痛帶下寒熱  
皆屬瘀血并中風偏枯歷節癱瘓鼓脹不問男女  
運用腸癰加薏苡大黃中為塊者加鼈甲麻木冷痛  
加附子○外因ニ屬セズトハ外因ハ風寒暑濕ノ類外  
邪ヲ指メ云シ外邪ヨリ生ズル処ノ諸証ニハ此方知  
ナレ内ヨリ生ズル処ノ右ノ諸病ノ方ニハ此方ヲ悉ク用テ

桂建トセヨト云フ一

**瘡疥毒氣上逆主方**

柴胡大升麻中黃芩大大黃中甘草

大棗中一本參少許 右六味照常煎服○主治曰

治痔疾脫肛痛楚難忍或前陰痒痛者方無痛者  
無効○外用荊芥外麻煎湯洗之而後塗熊膽○  
一本曰寒疝寒熱往來腰痛囊痛甚者加牛膝延  
胡○按下部癰瘡疥頭愈後上罨如氣癰織夏細  
慮或如神氣不足者多係痔疾之因悉手之○此文  
中ニ頓ニ愈ノ後ノ三字ノ外イニ有一ニ考ベシスベテ痔  
疾ニ限ズ下疳瘡楊梅瘡インキンタムシ瘡瘡其外下  
部ニ有ル惡瘡ノ類傳恙ナドヲ傳テ早ク愈ル病ハ油  
断スベカラス上カラ早ク愈サレテ其毒ガ行処ナキ故ニ



不ト升テ上ニ心ノ臟へ攻入ル時ハ下ニ云処ノ氣癖織  
 憂細慮神氣不足等ノ諸症ヲ患フル之氣癖トハ氣ニクセノ  
 付テニテ何ノヲモナキニ物ヲクヨクト按シスゴシ夫ヨリ色  
 くノヲトリコシニ按シスゴシ腹ヲタチタリ笑フタリ皆常ノ  
 調子ヲハツノ虚勞ノ如ク痼症ヲ如クウツラクト棄リ醒有テ  
 ナガビク病証或常ノ時ハ氣ナガニ有シガ病氣以未殊  
 外短慮ニナリ或白痴<sup>アネウ</sup>ノ如ク愚ノ如ニナリウツラクト煩  
 症皆下部ノ毒氣ガズツト升テ上ニ心ノ藏ヲ犯シツク故ク  
 テ心ノ藏ガ鬱塞ノ如此症トナル者有或此症健妄ナド  
 モスル一有者此道理ヲ考テスベテ下部ニ毒氣蓄  
 有者必ず此心得ヲ以テ療治スベキ一是不傳ノ秘也。猶  
 此條一角犀角羚羊角ノ發明ノ條ト并ニ癰瘡毒勞疝

毒勞梅瘡毒勞等ノ條下ト此処ヲヨク考ヘ併テ書外  
 ニ其理ヲ考ヘキ処ト此症ナドモ此方ニ羚羊角ヲ加サ  
 レバ効ナシ是モ勞瘵門ニ於テ詳ニ有保見ルヘシ。○  
 而方中ノ大黃ニ付テ弁アリ此処ノ大黃ハ必ず酒製ヲ用  
 生ニ用ル時ハ存ノ外効少シ其謂ハ酒製ノ大黃ノ功能熱  
 セサレハ其理ヲ難得故ニ今酒製ノ大黃ノ意ヲ述ル。ト云  
 昔羅兼甫一人ノ鬚疽ヲ治セリ防風通聖散ヲ与ルト多  
 服テ効ナシ因テ羅兼甫丹溪先生ノ診ヲ頼テ其主方ヲ  
 相訖ニ及ビケル丹溪先生ノ曰是ハ防風通聖散ノ症ト云  
 羅兼甫答テ曰防風通聖散ハモハヤ數十劑ヲ与ヘテ然  
 也効ナシ故ニ先生ヲ求テ處方ヲ決セシテ願フ。ト云  
 丹溪先生曰然ラハ防風通聖散ヲ酒製ヲ用ヒラ



ヨト云フ羅藤甫其辞ノ如ク防風通聖散ヲ酒製ニテ用口  
 タレバヌラクト余快ニ及タリト云フ一丹溪心法ニ見ヘタリ  
 予此辞ニ從テ數年来經驗スルニ大キニ効ヲ得ル一多シ大黃  
 ヲ酒製ニスルト生ニテ用ルトノ區別如此區別ノツク一是肝  
 心ノ心得也○又李時珍曰酒製ノ大黃ヲ許ノ云タル語アリ  
 其語曰烏巢阜天射落親ト云テアリ此意ハ大  
 黃ヲ酒製ニスレバズツト升ル勢ニ假令ハ阜天ニ飛鳥下  
 ヲ射落ス勢備リテ上部ノ邪氣ヲ驅落スニ大黃ヲ酒  
 製ニセザレハ其力薄シト云フ也○大承氣湯大黃  
 ノ酒製ニスルトセザルト涼膈散ノ大黃ヲ酒製ニスル  
 トセザルト大キニ區別ノ有リ此心得ヲ万病ニ推シテ  
 タリテ入用ノ一之故ニ其略ヲ述テ我門ニ知ラスル者ニ

○文中ニ云フ織憂トハ糸スシノ如ク憂ト云フ字之何ノヤ迄モ  
 ナキ一ヲ殊ノ外大造ニ苦勞ニシタリスル等ノ症ヲ織憂  
 ト云フ細慮モ其通りニテクダクシキ一ヲ氣ニカケタリナ  
 ゲキタリメ色ト下常ニ異ナリテ氣ヲモム症ノ如キヲ細慮ト  
 云フ心氣不定トハ右ノ通り物ゴトヲトリコシニ苦勞ニス  
 ルヨリ心氣モ自然ト落ツカズ彼是下物グルク見ユル症  
 ヲ心氣不定ト云フ是等ノ症ハ皆是下部ノ毒氣カ心ヲ衝  
 故ニ然ラザレバ瘡疥ノ症ニカハル心疾ハナキ道理ニ此處  
 ク考ベシ予心疾論ヲ別ニ論セリ卷ノ見ヘタリ

**諸淋疾奇方**

甘少梅當地黃滑芩沢○一本大黃  
 右七味照常煎服或加阿膠○按不急痛者無効服  
 茶後 隱白 大鐘 完三日內灸之者各六七壯



**吐宿水奇方**

治舊腹痛吐宿水得食痛劇受氣酸

真移時吐者。一本朝食夕吐夕食朝吐者

吳茱萸大 茯苓本大 橘皮中 實中 參少 甘草少 生姜右八

味照常煎服。一本曰加大黃益可。按不吐者無驗

食已乃吐病如閉格者不中與之。此方ノ目的兎角

急症ノ吐二八知一トシ多年ノ吐症ニ用テ効有方ト知ル二

**心痛奇方**

一本作治心痛徹背痛者

當飯黃耆 甘草 人參 厚朴 半夏 黃芩一本 芍藥山椒

乾姜 川芎 右十味水煎。一本曰痛甚者兼与金

匱赤石脂烏頭丸功如神

**痢病下重奇方**

治利病下重者泄瀉亦主之

大黃中 芍藥大 枳實中 厚朴大 黃芩大 甘草少 粳米 右七味水

煎服。一本條下曰治利疾裡急后重者及五更瀉泄瀉等

症。按凡諸下利后重者以疎滌其毒為妙不必可收

斂也先用此湯宜窺利減毒尽而漸下也五更瀉或呼

脾腎瀉者以其難治必溫補之遂無寸効每々上鬼簿

驅其毒而後斂之猶可臨生路治下血漏下者亦与此一般

泄瀉亦得此湯乃斷者多々宜沈思之。此文中小公如

五更瀉脾腎瀉ト云フ症虛証ト心得テ四神丸二神丸

ヲ始トノ其外溫補ノ劑ヲ用テ是ヲ治スルガ古ヨリ今ニ至ルマ

テ定リノ治方ト心得テ皆溫補ノ為ニ死スル者其數ヲ知カ

ニ突然ニ今此ニ云フ處ノ其定リノ溫補ノ劑ヲサシライテ大

黃枳實厚朴黃芩ノ藥ヲ用テ五更瀉脾腎瀉ヲ治スル

ノ一方是甚高見ノ主段ニヨク々此條ヲ覺テ後用ニ



備<sup>レ</sup>テ試之。○然<sup>レ</sup>此<sup>レ</sup>後<sup>ニ</sup>一ツノ口訣有スベテ世<sup>ニ</sup>傳<sup>レ</sup>痢病証  
 虛<sup>ニ</sup>實<sup>ヲ</sup>誤<sup>ル</sup>バカラス虚<sup>ニ</sup>症<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>實<sup>ニ</sup>利<sup>ト</sup>ナシテカ、<sup>ル</sup>瀉  
 劑<sup>ヲ</sup>用<sup>ル</sup>モ誤<sup>リ</sup>也又<sup>レ</sup>實<sup>ニ</sup>利<sup>ノ</sup>虚<sup>ニ</sup>似<sup>タル</sup>症<sup>ヲ</sup>誤<sup>リ</sup>テ虚<sup>ニ</sup>利  
 ト思<sup>テ</sup>温<sup>補</sup>ノ劑<sup>ヲ</sup>投<sup>ズル</sup>モ亦<sup>レ</sup>誤<sup>也</sup>然<sup>レ</sup>時<sup>ハ</sup>痢<sup>病</sup>世<sup>ニ</sup>傳  
 ノ治<sup>方</sup>ハ全<sup>ク</sup>是<sup>ハ</sup>虚<sup>ニ</sup>利<sup>カ</sup>實<sup>ニ</sup>利<sup>カ</sup>ヲヨク<sup>ク</sup>見<sup>定</sup>ル<sup>ト</sup>  
 肝<sup>心</sup>ノ心<sup>得</sup>也其<sup>レ</sup>虚<sup>ニ</sup>實<sup>ヲ</sup>熟<sup>ト</sup>問<sup>違</sup>テ<sup>ク</sup>見<sup>定</sup>ル<sup>ト</sup>余<sup>ク</sup>  
 裏<sup>急</sup>后<sup>重</sup>ノ一ツ<sup>ニ</sup>有<sup>レ</sup>其<sup>レ</sup>裏<sup>急</sup>后<sup>重</sup>ニ虚<sup>ニ</sup>實<sup>ノ</sup>區別<sup>有</sup>實<sup>、</sup>  
 症<sup>ノ</sup>后<sup>重</sup>ハ何<sup>迄</sup>モ除<sup>カズ</sup>アト<sup>ハ</sup>ハル<sup>ト</sup>甚<sup>強</sup>シ又<sup>レ</sup>虚<sup>ニ</sup>症<sup>ノ</sup>后  
 重<sup>ハ</sup>大<sup>便</sup>下<sup>ル</sup>時<sup>ハ</sup>后<sup>重</sup>ノ氣<sup>味</sup>忽<sup>チ</sup>除<sup>ヒテ</sup>速<sup>ニ</sup>ナ<sup>リ</sup>タル<sup>也</sup>  
 此<sup>レ</sup>后<sup>重</sup>ノ一ツ<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>虚<sup>ニ</sup>實<sup>ヲ</sup>ヨク<sup>ク</sup>見<sup>定</sup>ル<sup>ト</sup>ハ惟<sup>此</sup>裏<sup>急</sup>  
 后<sup>重</sup>ノ輕<sup>重</sup>ヲ見<sup>ル</sup>ニ有<sup>耳</sup>脈<sup>ヨリ</sup>モ<sup>タ</sup>シ<sup>カ</sup>ナル<sup>也</sup>此<sup>レ</sup>段  
 裏<sup>急</sup>后<sup>重</sup>目<sup>的</sup>亦<sup>レ</sup>虚<sup>ニ</sup>實<sup>ノ</sup>利<sup>目</sup>的<sup>ノ</sup>并<sup>ハ</sup>卷<sup>目</sup>補<sup>中</sup>

益<sup>氣</sup>湯ノ條<sup>下</sup>ニ詳<sup>ニ</sup>余<sup>之</sup>條<sup>也</sup>見<sup>テ</sup>其<sup>理</sup>ヲ考<sup>フ</sup>キ<sup>也</sup>爰<sup>ニ</sup>  
 云<sup>フ</sup>五<sup>更</sup>瀉<sup>脾</sup>腎<sup>瀉</sup>ヲ實<sup>症</sup>ト<sup>ナ</sup>シ<sup>テ</sup>治<sup>スル</sup>ト<sup>モ</sup>猶<sup>此</sup>裏<sup>急</sup>  
 后<sup>重</sup>ノ目<sup>的</sup>ニ熟<sup>スル</sup>ニ非<sup>レ</sup>バ療<sup>治</sup>ノ<sup>レ</sup>ソコ<sup>ナ</sup>イ<sup>ナ</sup>キ<sup>ニ</sup>モ  
 非<sup>ス</sup>ヨク<sup>ク</sup>其<sup>目</sup>的<sup>ニ</sup>熟<sup>ノ</sup>此<sup>方</sup>ヲ用<sup>ル</sup>時<sup>ハ</sup>又<sup>レ</sup>高<sup>一</sup>等<sup>妙</sup>  
 至<sup>段</sup>有<sup>レ</sup>ベシ我<sup>門</sup>思<sup>之</sup>○又<sup>レ</sup>此<sup>方</sup>ニ黃<sup>柏</sup>一<sup>味</sup>ヲ加<sup>ヘテ</sup>更<sup>ニ</sup>  
 一<sup>等</sup>ノ妙<sup>効</sup>アリ

久病調理劑 桂枝加苓朮湯

茯苓 白朮 甘草 桂枝 芍藥 生姜 右六味水  
 煎○按<sup>男子</sup>不<sup>屬</sup>外<sup>因</sup>腹<sup>中</sup>冷<sup>痛</sup>舊<sup>腹</sup>痛<sup>心</sup>中<sup>煩</sup>熱  
 不能<sup>食</sup>或<sup>奔</sup>豚<sup>氣</sup>上<sup>逼</sup>心<sup>眩</sup>暈<sup>男子</sup>中<sup>風</sup>偏<sup>枯</sup>脚  
 攣<sup>急</sup>腎<sup>虛</sup>火<sup>動</sup>者<sup>通</sup>理<sup>久</sup>息<sup>痢</sup>百<sup>病</sup>不<sup>驗</sup>者<sup>久</sup>病<sup>後</sup>  
 服<sup>之</sup>大<sup>佳</sup>也如<sup>脚</sup>攣<sup>急</sup>中<sup>風</sup>加<sup>附</sup>子<sup>鼈</sup>甲<sup>如</sup>久<sup>息</sup>痢



加附子黃柏大驗○張氏醫通曰諸病難明者從脾胃  
治ト云下有予此語ノ意ニ從テ暫ク諸症ヲ捨テ參苓  
白朮散錢氏白朮散ノ如キ脾胃ノ主方ヲ與ヘテ理ヲ得シ  
ト甚多之今此方ノ如キモ又其一端ナル者之腹中冷痛  
奔豚上氣中風偏枯久息痢等ノ如キ諸症ヲ治スルモ皆  
是脾胃ノ治ニ從フナリ知ラ見ス者之此段深ク考ベシ○  
久息痢ニ附子黃柏ノ加味甚妙知有附子ト黃柏ト組合  
スル寸ハ一寒一熱相尋テ効ヲナスト予從來ノ經驗之中  
ニ毛黃柏ハ痢病ノ良藥ナルヲヤ

**肺癰創**

治咳嗽腥臭口吐膿或如米粒胸助間  
隱痛或徹背声枯氣急不得臥者

甘草六分 貝母五分 桔梗六分 丸蕪根五分 杏仁五分 白芥三分

姜二分 右七味水煎○按連日咳嗽者或為肺癰  
多數勞瘵其人微寒熱不欲飲食欬逆倚息胸間  
引痛多吐痰沫臭粘試令病者唾水中浮者是痰  
沫忽沈沒溶解必有如米粥粒者是膿也新產婦  
婦停食者最多矣腸癰亦多發羊產乳後之人於  
有宿食者 宜常識之

**癩風奇方**

**萬藏丸**

大風子三百錢 去皮 九十日 苦辛牛膝 升麻 防風各六分 白蛇  
烏蛇各一分 射香二分 童 大黃六錢 乳香二分 童 麒麟血五分  
一本熊胆一分 金箔十五枚 竜腦一分 人參一分 一本有川芎  
右十五味杵大風子二千下內諸藥合煉更杵之內竜  
射令相得丸彈丸大服之二十日盡服其毒輕重



緩急以意消息不必日數拍○一本曰大風子炮雷益  
子日少研殘入粉菜入為丸以金箔十五枚為衣經驗云  
○按毒瘡面部者非多服無効一身肉脫者難治其  
毒腫痞癰者易療消澤生光眉毛退落者多不復  
者○一本曰癩瘡面色腐爛沸然者治之  
擊急者或曲者不治也 所謂萬藏寺癩菜卜云  
者是也

產後寒熱劑

知母湯 治產後乍寒乍熱通身暈壯胸

心煩悶者

知母 為美 黃芩 七分 桂枝 五分 甘草 少 右水煎服

產後腹痛劑

獨活湯 治產後腹痛引腰背拘急痛者

獨活 當歸 桂枝 為美 生姜 七分 甘草 二分 芍藥 七分 右水煎

產後煩熱劑

甘竹茹湯 治產後內虛煩熱短氣者

甘竹茹 一分 黃芩 二分 茯苓 二分 隱君子 六分 甘草 二分 右五味

水煎服

小兒虛症劑

弄玉湯 治小兒寒熱黃瘦腹痛或下利

者大人亦可用○一本作小兒一切虛証

桂枝 中白朮 茯苓 大橘皮 一本二青皮 黃連 少 木香 粉草 少

○一本加甘草右七味水煎○一本曰加鷓鴣菜益可

小兒疳癆劑

令壽丸 治積塊氣逆欲絕小兒急慢驚

風兼疳疔主之

鷓鴣 杏 枳 柳 子 莢 木 桂 枝 香 附 子 青 皮 當 歸 芍

地 骨 皮 甘 草 熊 胆 黃 連 茯 苓 木 香 粉 草 右 十 三

味糊丸辰砂為衣



雞肝丸

小兒治疳眼方

雞肝

一具

胡黃連

五分

肉豆蔻

五分

芙蓉花

六月花者佳二分

右三味咀咀以水一合無灰酒半合煮用肝切之日三四次以茶查及煮汁和寒制米粉至可丸為度梧子大每服二三十丸

小兒驚口疔奇方

一極散治小兒驚口方

糞出散

土旺中者佳燒為霜

右一味白湯送下并處足心

舌上傷爛奇方

尚足飲療舌上傷爛或生瘡牙痛者

出牙痛含之亦佳

石膏

五分

黃芩

五分

玄參

大黃

五分

甘草

二分

黃連

五分

右七味水煎分服

諸失血奇方

桃花散治諸失血方

隱君子

一錢子懷曰未之

葛粉

辰砂

右三味合治撮少許

參患人舌上閉目斂氣即止神驗

毒蛇咬傷奇

豆刺膏治毒蛇咬人者

乾柿

漬酢數日以柿爛成膏為度

右一味塗傷處汁出毒潰乃愈

仙驗

舌疳奇方

崑崙散治舌疳口中生瘡者

昆布

未經製造者佳燒為霜二錢

鹽梅

連核為霜二錢

巴豆

為霜

梅丸

二錢

右四味研末搽瘡上甚良

黃胖病奇方

針砂湯

茯苓

白朮

炙甘草

桂枝

人參

鐵粉

牡蛎

各一分

右七味煎服兼與黃胖丸

黃胖丸方

鐵粉羊角蕎麥粉三兩黃連一兩右三味糊丸



產後諸症方

五苓散

治產後諸証

舌疽奇方

烏羽菜

混布

一枚

梅乾

三箇

巴豆一枚去皮

右黑燒傳患處

慢驚急驚奇方

百鳳散

石膏十枚

輕粉一錢

右細末白湯送下煎湯黃連解毒

湯灸治大推身柱天樞神闕各三十壯百會五壯

脚氣腫滿奇方

九味栝柳湯治脚氣腫滿微短氣者

栝柳大

大黃中

厚朴大

桂枝

甘草

木香

陳皮

紫蘇

姜

右九味水煎服

脚氣衝心奇方

唐侍中方治脚氣逼心短氣甚者

栝柳大

大黃中

吳茱萸大

枳實中

右四味煎服可兼与紫

四錫桂丸

口中齋爛奇方

芒硝一錢

辰砂一錢

右研末傳患處隨手

愈

小兒五疳奇方

黑童散

治小兒五疳方

俗ニウチギツケ

烏

一羽去腸胃侵襲中三十日寒中在佳

右取出以清水洗而后車前

子十枚

紅花十枚

合入壺中

黑燒

右與鰾鱧合食

神驗

又方白童散

治小兒五疳方

俗ニタマゴツケ云即是方

使君子二兩

木鼈子兩

右與鷄子合食

痰疝家方

陳皮 半夏 柴胡 青皮 厚朴 木香 茴香

川棟子

甘草

吳茱萸

乾姜

木瓜

右十二味水煎服

此方、饗庭家傳、家方也、疝氣ノ疝ニ瘵ヲ兼ル者此方

辛之

又方、白朮 蒼朮 厚朴 青皮 半夏 茴香 香附子 枳實



紫蘇 木香 吳茱萸 桂枝 右十二味水煎服。此方  
毛饗庭家家方。前症ヲ治ス。并ニ疾風邪ヲ兼ル者又  
治之。

疝秘家方

枳殼 木香 枳榔子 大茴香 川棟子 青皮  
吳茱萸 右七味水煎服。此方饗庭家家方。疝氣ヲ  
大便秘結スル者ヲ治ス。又俗ニ疝ヲト云。疝有共症。泄瀉  
ノ疝氣ヲ兼ル。是乃疝瀉。疝瀉ニ此疝瀉。疝利ニ木樨子ヲ  
加テ妙知有。

婦人帶下秘方

禹餘糧 赤石脂 伏竜肝 烏賊 桂枝  
當歸 白龍骨 右七味水煎服。此方ハ帶下ノ寒  
ニ屬スル者最効有。一貼ノ重ニ女位ニ調合シテベシ。

小兒一切雜病奇方

真珠 射香 龍腦 全蝎 蝮

辰砂

ニ女内  
一外不

右五味糊丸。是程ニ凡ス。此方ハ亮  
大寺ノ家方。小兒一切諸病ニヨシ。中ニ慢驚風急驚風  
其外小兒ノ五疳急病ニ用テ甚効有。此藥一粒六  
文ツ。ニテ賣奇藥ニ去ル寺ノ代々調法トス。中ニモ西國邊  
ノ武家江戸ノ交代ノ時求メタル人夥シ。是ヲ傳フ。甚  
故有故。今此ニ此方ヲ記メ。我門ノ經驗ニ備フ。兼名ヲ龍杏  
丸ト云フ。

小兒餘熱奇方

青皮 厚朴 香附子 芍藥 柴胡 葛根  
黃芩 甘草 右八味水煎服。此方饗庭家家方。秘方。  
小兒一切熱症ニ先此方ヲ用。是ヲ八味餘熱ノ方ト云フ。

截癰奇方

艾葉 常山 枳榔子 甘草 右四味水

煎服。一日或三日用テ癰落ル。



虫症嘔吐唾水奇方

金梅丸 治虫症吐唾口水者

烏梅<sup>大</sup> 山椒<sup>大</sup> 黄柏<sup>大</sup> 細辛<sup>中</sup> 鶴鴉菜<sup>大</sup> 桂<sup>大</sup> 連<sup>中</sup> 乾姜<sup>中</sup>  
右八味糊丸。此方傷寒論三有烏梅丸變方。故烏梅丸ノ代リニ此方ヲ用テヨク効ヲ取ル<sup>レ</sup>有。此方ヲ用ル<sup>ル</sup>目的ハ唇赤<sup>少</sup>如<sup>ク</sup>赤<sup>シ</sup>ナルニ用テ効非ズト云フ<sup>レ</sup>ナシ

氣疾痲症奇方

寧心湯 治氣疾家或痲症癡狂者

石膏 知母<sup>各</sup> 枳實 厚朴 芍藥 茯苓 木大黃<sup>各</sup> 黃連 甘草<sup>各</sup> 生姜。此方ハ癡狂者煎湯ヲ用テヨシ。又此急不眠ノ症折續テ發リ其人物クル<sup>ク</sup>シク頓テ狂乱<sup>ニ</sup>モナラシカト見<sup>ル</sup>症ニ此方ヲ用テ奇効有<sup>ル</sup>此ニ云フ氣疾家ト云フハ此症ヲ云<sup>フ</sup>

亡血浮腫奇方

安心湯 治亡血家心氣不足手足或面

部浮腫者

遠志 甘草 酸<sup>二</sup>人參 茯苓 當歸 芍藥 酸<sup>三</sup> 麥門 丹 赤<sup>二</sup>

右八味水煎服。此方ヲ用ル<sup>ル</sup>心得ハ產后產前或金瘡瘡血多<sup>ク</sup>血<sup>ヲ</sup>下<sup>ノ</sup>夫ヨリ胸ニ動氣<sup>ナ</sup>ドメ水氣有<sup>ル</sup>者此方奇効有<sup>ル</sup>。此方ヲ用ル<sup>ル</sup>目<sup>的</sup>ハ唇<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>目的トス<sup>ベ</sup>シ唇<sup>ノ</sup>色ガ薄<sup>シ</sup>テ<sup>テ</sup>動氣有<sup>ル</sup>者此方ニ宜<sup>キ</sup>症ト知<sup>ル</sup>ル<sup>ハ</sup>云

婦人通乳方

黃耆 本通 天花粉 當歸 川芎 生地黃

白芍藥 干朮 王不留行 右九味水煎服

膈噎奇方

治膈噎初起者有効

三禮草

倍本藥 各箱根<sup>中</sup>

半夏 香附子 青皮 硃砂 糖<sup>三分</sup> 水<sup>五分</sup>

右五味水煎服

疫眼奇方

川芎<sup>二分</sup> 大黃<sup>二分</sup> 蕎麥<sup>二分</sup> 右三味細末ト



十三テ酒ヲ以テ送下。但此方大黃ヲ酒製ニシ炒ラザレハ効ナシ

久ムシ奇方

唐大黃 和大黃 鹽 煤 右四味酢ニ解患処ヲスル一毎目一二度スベシ黃汁出ルヲ吉トス

脚氣腫滿奇方

急衝心者

旋覆花湯 治脚氣腫滿小瘡内攻喘

旋覆花 茯苓 蘇梗 陳皮 犀角 黑豆 大棗 原方有柴芩 雖然因虛証者多 癰腫滿喘急故去柴芩 加木香

桂已

麻疹奇方

葛根連翹湯

葛根 連翹 升麻 白芍藥 柴胡 酒製黃芩 當歸 桔梗 山查子 蘇梗 山梔子 甘草 減半 右十二味水

煎服。加減法紅点雜出者加防芎 他利者加扁砂通車咳嗽甚倍甘桔加前葉熱甚者加酒栢酒連少許或加淡竹葉口渴甚加麦門石膏血乾大便秘加芎生地紅將少許此方百發百中奇々妙々不可言也

眼病奇方

局方羌活散

羌活 葛根 茯苓 菊花 川芎 前胡 黃芩 細辛 枳壳 蔓荊子 麻黃 防風 石膏 甘草 此方久眼

膜ヲ全ス者ヲ倍ス

馬嶋白芷湯

眼病頭痛甚者此方主之

白芷 大當歸 小川芎 防風 薄荷 細辛 蔓荊子 柴胡 菊花 甘草 右十味水煎服

小兒百日咳奇方

消中飲子



枳殼 桔梗 葛根 陳皮 甘草 紫蘇 枳柳子 厚朴  
旋覆花 紫蘇子 十味水煎服。此方ニホウツキ  
ノ黒焼ヲ大ニ加ヘテ愈ル効有

面腫咳嗽奇方

紫蘇 五味子 大腹皮 烏梅 桔梗 陳皮  
杏仁 麻黃 桑白皮 阿膠 紫苑 甘草 右十二味水煎  
服。此方ヲ用ル心得ハ咳嗽久クツキ咳ラスレバ面ムクテ  
生スル者ニ用テ必効有。但此症ニ胡桃仁ヲ加ヘテ猶ヨシ

痘毒入眼奇方

川芎 當歸 白芍 羊生 地黃 熟地黄 白菊 花  
兩 蟬退 兩 防風 錢 穀精 草 兩 羌活 錢 草 決明 兩  
蔓荊子 錢 木賊 兩 羚羊角 錢 蜜蒙花 兩 犀角 錢  
旋覆花 錢 荆芥穗 兩 鬼糞 兩 綠豆 一合 黑豆 一合  
右二十味蜜丸。眼赤キ者ハ連黃ヲ加右此方一大家ノ

極秘方

瘡毒眼家方

此方散薬ニテ用テモ亦煎湯ヲ用テモ良  
土茯苓 大黃 芩 黃連 木通 白鮮皮  
白芷 丁子 茯苓 連翹 防風 大黃 酒製 枳殼 沈香 上品  
生地黄 乳香 木香 升麻 薰陸 各中 甘草 少 右十九  
味水煎服。瘡毒ノ眼ハ目ノ色清其上物ヲ見ルニ赤キ結  
系ヲ見ル如キノ者目前ニクツク氣味有此目必瘡毒ノ  
目ニ入リテ者。此心得ヲ以テ瘡毒眼ヲ見方ナシ

截瘡奇方

九味清脾湯ニルザラシテ加フ。ルザラシ虫  
品。此品一味ヲ清脾湯ニ加ヘテ用ル妙効有

脾健奇方

陳皮 半夏 茯苓 當歸 白芍 羊生 香附子  
黃連 白朮 木香 縮砂 神曲 山楂子 甘草  
右十三味水煎服。此方ハ京都ノ五雲子ノ家方也。



此方ヲ諸病ニ用ル心得ハ兎角脾胃ノコナレ悪ク食ノモ  
 タレモアリ少シ脾胃ニクダビレノ付タル病人中腕ニツ  
 カヘルアソバイ有テ兎角飲食ノコナレ悪キアソバイ有病  
 人病前病后病中ヲ問ズ一切雜病ニ本藥ノ外ニ丸藥  
 此散藥此散藥ノ宜キニ從ヒ用ル方也目方ハ時ノ宜キニ從  
 ヒ心下ノ痞ハ強クハ黃連ヲ倍シ食支ノコナレ悪ク腹ノ  
 ブツクトメ悪キ氣味有テ宿砂神曲ヲ倍シ咳嗽痰ナド  
 有テ陳皮半夏茯苓ナドヲ倍スルノ藥是此方ヲ雜病用  
 目方ノ心得也○兎角此方ハ大病ノ后脾胃ニシマリヲツケ  
 クキ時用ル方也ト合点スベシ丸藥散藥煎藥此見合  
 ハ時從フベシ

婦人調經奇方

蘇參散 婦人一切ノ良方也產前產

後血ノ道滯滯スル者經水ヲ潤流メ子ヲ生ズルノ妙劑  
 此方ニ勝ル者ナシ誠ニ婦人調經ノ各方也

當歸 二兩 酒炙 川芎 二兩 白朮 二兩 白芍藥 二兩 黃芩 一兩 木香  
 如甘草 五分 右細末以溫湯送下但次ノ正氣散ト見

正氣散方

枳實 三錢 莪朮 一兩 丁香 五分 右細末白湯

三用エ○傳曰此二方當ハ別クニ調ヒテ持ヒ右蘇參散  
 ナ用ル時ニ痞積有婦人ニ蘇參散ニ正氣散ヲ三分一加  
 (用エベシ痞ハ強キニ各半マゼラ用ヒシ甚痞積強キヲ  
 正氣散ノ煎湯ニ半合セノ粉藥ヲ用ベシ婦人一切血痞  
 ハトノ妙方也)用ル法ハ始ハ薄茶一服程用ヒ其後一服  
 半程用ヒ三度ニ及ブテハ二服程用ベシ始ヨリ強角用ヒ



バ争テノ薬効ナシ此方悪血ヲ遂ニ血ヲ行ラス一甚妙也

乳癰奇方

浸菜一另研末

凡薑大醋當歸酒浸甘草各五乳香研右作二劑用酒三碗煎至二碗分三次

飲之更以植敷患處○一切癰疽腫毒便毒皆有神効○或加青皮可○此方婦人良方ニ出菜各ヲ神効凡薑散ト各ク予ガ経験數十人ト

淋疾奇方

秋脂 松脂 右二味蜜丸或煉リ菜ニシテ

用ルモヨシ此方殊ノ外神効有予是ヲ二奇丸ト各ヲ廣ク用之○淋病ニニツノ區別アリ一ツハ瘡毒ノ淋病ニハ常ノ淋病是也此方ハ常ノ淋病ニ用ハ効有瘡毒ノ淋病ニ用ヒテハ効ナシ○予ガ川人是ヲ瘡毒ノ淋ニ用ヒタリト云フ

即此方ニ上品ノ山飯菜五分ヲ此丸菜ノ吞汁トナシテ用ヒタレバ瘡毒ノ淋疾治シタリト云フ然レモ予未此方ヲ瘡毒ノ淋病ニ用ヒタルナシ我カ川是ヲ試ベキ○瘡毒ノ淋病ヲ見分ル法ハ瘡毒ヨリ出タル淋病ハ小便ノ鈴口必々レ破レル気味アリ是ハ瘡毒ヨリ出ル淋病ト心得テ瘡毒ノ治方ヲ施スベシ又常ノ淋病ハスハ口ノ破タル気味ナシ此ニツテ常ノ淋病ト瘡毒ノ淋病トヲ見分ベシ○又瘡毒ヨリ起ル淋病ハ舌ヲヨク見ルベシ若舌ノ一リ通りニ紫色ノ点ホテト星ノ如クナル者カ又ハ米ツフヲ水ニ浸メヒラメタル如クニ舌ノクルリニ有者カ又舌ノ色リ何トナクキメナク赤色ニタレレル気味アル者ハ是必ス内ニ毒気ヲ含ミタル舌也是瘡毒ノ有カ無カヲ知ルツ



目的也

痔疾奇方

丁子<sup>方</sup> 茯苓<sup>方</sup> 青木香<sup>方</sup> 土茯苓<sup>方</sup> 甘草

对肉桂<sup>方</sup> 陳皮<sup>方</sup> 右七味細末ノ赤小豆ノ煎汁ニ吞

ベシ○土茯苓ハ上品ノ物ヨレ品悪ケレバ効ナレ○多此方

ヲ以テ煎湯トナシテ効ヲ得ル一有然トモ此通りニ云

ハ其効猶更ニ速也

瘰癧奇方

蝦蛇 鹿角 蟹<sup>トモクサウガニ</sup> 茯苓<sup>トモクサウガニ</sup> 藜子 沈香

右五味各等分蒸焼ヲ酒ニテ下ス○此粉菜ヲ其本劑ニ加入

シテ用ルモヨシ

勞瘵如癰

十一味附子湯 治勞瘵癰寒如癰先寒後

熱氣血衰極者

當飯 山茱 白朮 陳皮 白芍 熟地 黃柏<sup>妙</sup> 知母<sup>妙</sup> 肉桂

川芎 熟附子 姜枣 右十三味水煎服

瘰癧奇方

天南星 黃柏 葛粉 右三味各等分細末○

此粉菜ヲ指ノ痛處ニフリカケ其上ヲ蠅取モクニテ卷其上

ヨリ灸スベシ灸ノアタムルヲ度トメ止如此スル一毎日二三

度宛

虫齒奇方

四物湯ニ蒼朮 黃連 黃芩ヲ加フ但熟地黄

ヲ生地黃ニ代ヘテ用ユ如常煎ノ虫齒ニシキ且ツ右ベシ

打撲奇方

雲母 黃精<sup>妙</sup> 右二味細末飯糊ニ煉

膏菜ヲハル如ク痛處ニ傳

癰風奇方

硫黃 細末ノ云

痛風奇方

當飯 川芎 白芍 生地黃 獨活 羌活

右六味酒水各半煎服



骨經奇方

泊豆 一味細末ヲ吞又ツケル

去水奇方

四苓散ニ西瓜仁燈心草ヲ加シ小便不利

ハツミ有ラ治ス

呃逆奇方

參蘇飲ニ紫蘇ヲ倍シ用紫蘇惡ケレバ効ナ

シ〇又霍香天氣散呃逆ヲ治メ甚効有〇長門在左門

隱居年八十餘歳八九日ノ間呃逆ツイテ出諸藥効ナ

シ藿香正氣散ヲ用テ一服ニメ大効ヲ得タリ其外經驗ノ

方也

落茄風奇方

桂心 細末膠ニアタメ其上ニハル冷レハ又

取代(三珍タルハ効ナシ)

癩病奇方

大風子

一斤ヲ碎キ煮皮白ニテ拌キ油ヲトリ其渣ヲバ  
丸藥ヲ吞丸藥大キサ●一日ニ六十粒ツヅ

用其油ニハ樟腦ヲ少シ  
加シ破レタル處ヘツケベシ

一切積治方

莪朮散

莪朮 當歸 白芍藥 吳茱萸 丁香 乾姜 白朮 茯苓

牛膝 三稜 枳實 甘草 川芎 右十三味水煎

泄痢奇方

益智 青葉藿香 唐木香 吳茱萸 肉桂

甘草 茯苓 右七味水煎服〇此方一切泄痢ノ症

寒熱虛寒ヲ問ズ先此方ヲ用ヒヨ用テ后實熱アル症少

サワルニ其時速ニ實痢ノ主方ニ点スベシ余少療治ノ手ヲ

クレトナル一ナシ至テ奇効有方也

瘰癧氣急

紙ノ摺子ニテ頭ノ鉢ヲマワシ額ニテ止メ其繩

ヲ病人ノ手一束ヲキリテ去ルニ切殘リノ繩ニテハ人指ニ

ノ中ノ節ヲ寸ヲ取リテキリ切其餘リノ繩ヲ以テ病人ノ咽

笛ノ上ニ加ケ后ノ方ヘタシ下ニ繩ノツキタル處ヘ点ヲス



シ扱以前ニキリタルキノ中指ノ繩ヲハ中ヨリニツ折中ヲ  
其假点ヘアテ兩方ヘ開キ骨ヲ挾ニテ点ヲツケ中ノ假リ  
点ヲ消ス兩方五百壯位ヅヤクベシ

**截瘡符**

符

此位ニ紙ヲ三枚キリ此紙ヘ鬼頼二字  
ヲ又物ヲ書扱粒辛子ヲ粘ヲ以テ額ニ一枚兩ノ足裏  
ヘ一枚ヅハルベシ

**鼠毒奇方**

千屈菜

根莖葉凡

當飯川芎白芍藥

炮黃 白檀

紫檀

和人参一

右八味水煎温服

○若此藥テ効ナクハ更ニ連房黑豆甘草ヲ加フベシ

**河豚魚中毒奇方**

眼兒草

右一味極細末ニシテ白湯

ニテ服ス俄ニ吐瀉ノ其効如神

**産后血暈狂氣秘方**

五鼠黑燒

莪朮酢炒

乾漆炒熊胆

分ホ

右細末丸トナシ又煎茶トナスモ可シ大經験ノ方也

**風眼奇方**

黃柏

燒明礬

文錢一文

竹葉二寸ニ切五枚

右水

一杯羊入一杯ニ煎シ明ヨリ七ツ時迄洗フ残りハ捨ベシ

**内咳奇方**

瓜蒌仁

茯苓

知母黃芩芍藥羊夏枳實

甘草 生姜

右十味水煎服○阿膠貝母桑白皮

ノ類其症ニ從テ加減スベシ○肺ノ藏ニ潤ヒナク乾キツクホ

ハ胡桃仁阿膠ヲ加フ此ニ品肺ノ藏ニ潤シラツケル者

妙品ニスベテ久咳ノ症ハ肺ノ藏津液カワヒテ咳嗽モ治

セヌ者ニ其時ニ阿膠胡桃仁ノ如キ潤ノ有品ヲ加ヘテ

肺ニ潤シラツケル様ニ治スベシ是秘傳也阿膠ハ肺ノ血

分ニ潤シラツケル胡桃仁ハ肺ノ氣分ニ潤シラツケル妙品

也○此方ハ香川先生ノ傳方也内咳ト云フ外邪ニ



ヨラス内ヨリ起ル咳ヲ内咳ト云フ内咳ニ此方ヲ以テ  
桂建トナメ加減指引メ治スベシ是久咳ヲ治スル心得ニ  
方也

外咳奇方

瓜蒌仁茯苓芍药半夏枳实甘草生姜

桂枝升麻厚朴

右十味水煎服○外咳ト云フハ

感冒外邪退テ后惟咳許リ残リテ何ト出テ止ヌヲ外

咳トモ邪咳ト云フ其時ハ此方ヲ桂建トメ加減差引メ

治スベシ是又香川先生坐右ノ方也

咳嗽煉系

生津丹

香附子茯苓乾姜

右三味各ホ分細末或蜜丸或糊

丸トナシ或蜜ヲ以テ煉系トナスモ亦可也○此方咳嗽咽ガ

ワヒテ痰出聲啞等ノ症ヲ治ス此方久咳ニ胡桃仁ヲ加フニ

肺ニ潤ヒラツケレハ自然ニ咳ハ止ム者也

打撲神方

芭蕉肉桂甘草 右三味細剉水煎大便

秘スル者ハ大黄ヲ加芭蕉ハ其俣剉ニ用芭蕉ハ殊ノ外水

氣ヲ小便ヨリ利スル奇方也此方度々大効ヲ取レ方也

痔漏奇方

槐角子二兩阿膠二兩生地黄二兩川芎五兩白芷

延胡散二錢黃芩二錢黃連二錢枳殼二錢地榆二錢秦艽二錢

黃耆二錢防風二錢枳二錢升麻二錢連二錢 右十六

味水煎服○此方ハ或大家秘傳ノ方也予故有テ傳之

癩風奇方

肉桂膽礬硫黃輕粉 右四味各等

方酢ニ解ツル也

刺殺奇方

鳳仙花青木松葉 右等分果燒テ刺ノ

口ニツケル也若其刺々々タル人遠方ナラバ其人ノ名ヲ記シ



ノ其名ノ上ニツケテモキク妙方ト云フ

**病犬奇方**

枯礬 一味水ニ解其咬レタル処ヲツツケル  
其アトへ此一味ヲツケル也

**眼病翳膜奇方**

黑精草 防風 右二味各ホ方細末  
米飲ニテ服之甚効有リ

**上焦邪氣下降奇方**

沈香 大黃湯

當歸中

川芎中

桂枝中

大黃中

沈香大

右五味水煎

服〇スベテ上焦ノ邪氣ヲ下モへ引降ス一  
至テ妙也或頭痛或耳鳴或頭瘡或眼病或鼻痔或逆上強キ人其外  
何ニテモ上部ノ邪氣ヲ下へ引サゲタキ寸ニ此方ヲ用ル也  
甚大効ヲ得ル方也 一大家ノ秘方也

**一切腫物奇方**

輕粉 硫黃 唐土 石灰 大黃

右五味各等分 細末〇此藥一切腫物ヲ治スル一妙也硬  
腫物ハ糊ニ和テ膏養ノ如クツケル屎カナル腫物ハ鳥  
ノ羽ニテヒクベシ丈ハ時ノ見合ニヨルベシ

**一切惡瘡奇方**

加味五香湯 五香連堯湯 此二方ノ  
内擇ヒ用ベシ名モ知レヌ惡瘡又ハ體ノ内ニ何ニナクシ  
コリテ右ノ如ク硬キ症ナドヲ治メ効ヲ取ル一此方妙  
也

**虫下奇方**

昆布 一味炒用〇予カ門人虚勞ニ似ル  
症ヲ患フ或ル医者診之曰足下ノ病ハ虚勞ニ非ズ虫下  
虫ヲ下サバ病速ニ愈ント云門人其方ヲ願乃昆布ヲ細ニ  
剉ニ炒 一服二三分ニ調合シ常ノ如ク煎シ空心ニ每  
日一服 二服ニ用ヒラルベシ遂ニ細虫ヲ下メ其病愈



ヘシト傳授シケリ 予ガ門人謹テ其面リ 服業ニタリ 服業  
スルヲ十四五日余ヲ細虫ヲ下ス下テ數ヲ知ラズ夫ヨリ  
勞瘵ノ如キ症ヲ治メ達者ニナリ 予カ門ニ入テ医者トナリテ  
舊年ノ如ク達ニ医業惟今勢ヲ居ルニ予是ニ悔ヒテ烏  
梅丸ニ了子昆布トヲ加味メ用ルニ相應ノ効アリ 鷓鴣菜  
等ハ諸家虫下シニ用ル下テ皆是諸人ノ知レル処ニ昆布ヲ  
以テ細虫ヲ下シ細虫ヲ下ス下ハ予且テ不聞之然モ昆布鷓  
鴣菜モ同ク海草ノ一種ナレバ虫ヲ下ス下テモ有シ我ガ徒是  
ヲ試ヨ

治瘤瘰奇方

紫葛ス エビツルノ根皮了子肉桂  
草薺ナ 爵金中 右五味細末蕎麥ノ粉ヲ大入レ湯ニテ  
煉リ 瘤瘰ノ上ニツケ紙ヲハリサク一日ニ三度ツツケル

一兩月ノ内治ス但シ其上ヨリ灸ヲスルモ可シ

又方

ナベツル小豆 右一味細末シ水ヲ解厚クツケ  
其上ニヨキ 程ニ灸ヲスヘルニ如此ヒタモノスル時ハ瘤ノ内  
ヨリ水ヲ出シ自然ニ愈ル

一切結毒奇方

牛皮黑燒四 山飯末四 右二味  
細末七日ニ温酒ニテ用ヒ盡ス

面部如癩經驗

予一ツノ經驗アリ 其症一應ニ見テハ  
全ク癩病ノ様ニ見ヘテ口モユガミ目モハダカリ 牛ノ皮ノ  
如ク皮アツクナリ口ナドハ大キハ喙斜ヲ見グルシキ病人  
アリ是ヲ病癩病カト思ヒヨクク 診察スレバ左ニモ非ス大  
キニ癩病ニマカヒテ年久ク治セザル病人ヲ見ル下テ是  
迄三人ノ何レモ其症同シ下テ是ニ因テ或癩病ノ瘵



治ラナレ或面部ヨリ血ナドヲ取リテ療治スレモ一向ニ効  
ナレ予此症ニ防風通聖散ニ薄荷ヲ加ヘ芍黄散ヲ合シ  
用ル一二人之甚大効ヲ取リ全快ニ及ベリ蜈蚣ヲモ加テ  
益可也○但レ芍黄散ハ川芎大黃蕎麥也此三味ヲ別  
ニ散葉トナシ共散葉ヲ防風通聖散ニ加味スルハ大黃  
ハ上品ノ物ヲ酒製トナシ用ヘシ然ラサレバ効ナレ二人大  
効ヲ得タリ因テ我カ門ノ經驗ニ備フ

中風病因考

方書云中風師門是ヲ中氣ト云或氣  
中ト云氣ヘアタル氣ノアタルト云意ニ風ノミアタルト云ニ  
非ス○其因本積氣ヲ経絡ノ行悪クナリテ風寒湿或ハ  
滯食諸ノ邪氣當テナス所ニ於此中氣ト云フ風カ手傳  
ヘバ中風ト云フヘケレモ元来積氣ヨリ壅塞サセテ氣外

へ運ル一ウトキ故ニ患之寒以下ノ諸邪悉ク風ヨリサソ  
ト来ル者ナル故角弓反張手足拘攣等ノ如キ皆風ノ状ナル  
故中風ト名ク然レモ是古ノ名ニ非ズ後世ノ説ニモ外無六  
経之傳變内無便溺之阻隔ト云ヘリ今所有之中風ハ  
皆一定ノ病ニテ積氣ヨリ生シ外ニ變ト云一ナレ後世ノ中  
風ノ條ニ素問百病ノ長也ノ語ヲ引テ論スルナド牽合附  
會ナリ老人ノ老毛モウ一俗ニラヒボレワズルト云是ニスルナドモ皆中氣ニ偏枯モス  
ノ中氣スルモ亦多シ素問風論千金方病源論皆云フ  
風名誤也卒中是急症也多食滯ヨリナル食滯ノ時先  
食毒ヲ解スベシ卒中食滯ト云ヒニ似タリヨク辨スベシ偏  
枯共ニ氣血凝澁スルハ本ヨリノ一也其中ニモ中氣ノ脉進ハ  
油断ナラヌ者也積氣有方右ニテモ左ニテモ偏枯スル也



口眼喎斜スルハ氣血ノ流行悪キ方ヲヨク流行ス方ヲ引  
 マゲテ然リ或痺ヲナシ或痿ヲナスモ此ニ同シ左リ喎斜スレ  
 ハ右ノ病ヲ知リ右喎斜スレハ左ノ病ヲ知ル此症多クハ  
 疝ヨリ生ス此病前ノ兆ニテ脈ノ亢者多シ此虛火ノ亢ニ非ズ  
 塞テ行ラヌ処有故激ノナス処ニ故亢ル中ニ洪氣味有癰  
 瘕瘰癧ハ風壯シ風モ添ナレト類中風ト云フ不可此風  
 症ナラバ風薬ヲ用テ愈スベキナレト今此症大方為  
 一代病シ積氣故ニ年々経絡ノ行悪クナリ陽氣流行拙  
 クナリテ然リ是モ其発所多ク食傷ヨリ生ズ古来風ヨリ  
 生ト耳云フ一此腹中ニ積氣有ヨリ然リト云々心付又  
 ト見ヘタリ言舌行リ兼ルガ六ヶレキニ故ニ引シヨラ一也

**中風偏枯治方** 温泉或腹蛇酒 卒中之時大劑

參附或人參早夏湯 食滯者枳實厚朴湯加木香山  
 查或小養氣湯加山查

**卒中灸** 丹田 氣海 神闕 蘇命后建理湯

**中風病因新按** 以上挙ル処ノ全文ハ後藤先生ノ説ニ中

風ノ一症古ヨリ今ニ至ル迄病因ヲ論ズル一ニ至テ多ク取リシ  
 メナキ一也予ガ知レル処ノ病因モ十因余モ有ベシ又後藤  
 香川ノ説ヲ足シ加寸ハ其病因ドレガトレマラ一歸スル一  
 甚固シ是迄未中風ヲ病人ノ不幸ト云フベレ因之中風ノ  
 病因病症ヲ考ル一別ニ 卷目ニ并之ニ併見テ熟ト其  
 病因ヲ決スル様ニスベレ兎角素問靈柩中風ノ病名イ  
 ツ外ナクスタリモノニナリヌクニ後藤氏此論中風ヲ積氣ヨ  
 リ生ト云フ一論ノ全體ニ於テハ如何ニモ尤ラシク聞レビ



然レ此方ニ因テ治ラ施メ見ルニ論ノ通りニ効有テ  
甚少シ及テ犀角圓ナドヲ用テ効ヲ取ルテ有療  
治ト論ト兎角引合ヌ様ニ思ハル、此處熟ト考ス  
シ委細 卷目ニ弁有バ讓リテ此ニ略ス

神聖復氣湯

治復氣乘冬足太陽寒水足

少陰腎水子能令母實乎太陰肺實反未侮土  
火木受邪腹背胸膈因塞疼痛善噎口中涎目  
中位鼻流濁涕不止或息肉不聞香臭咳嗽痰沫  
上熱如火下寒如水頭作陣痛目中流火視物暈  
々耳鳴耳聾頭并口鼻或惡風寒喜日陽夜卧不  
安常覺疼塞膈咽不通口失味兩脇縮急而痛  
牙齒動搖不能嚼物陰汗出前陰冷行步欹側起

居艱難掌中熱風痺麻木小便數而晝多夜頻而  
欠氣短喘喝少氣不足以息卒遺失無度婦人白  
帶陰戶中大痛掌心而痛面如赭色食少大便不  
調心煩霍亂逆氣裏急而腹痛皮色白後出餘氣  
復不能努或腸鳴膝下筋急肩胛大痛此寒水未  
復火土之讐也

- 乾姜 炮為末一分 柴胡 剉如豆大 羌活 剉各一分 甘草 剉 藁本 剉
- 升麻 剉 羊夏 湯洗各七分 當歸身 酒浸剉 防風 剉 人參 剉
- 都李仁 湯浸去皮研如泥 附子 炮去皮 白葵花 去心
- 細剪 右件藥都作一服水五盞煎至二盞入草
- 豆蔻仁 剉 熟去皮乾 黃耆 剉 橘皮 剉 在內再煎至
- 一盞再入下項藥 枳殼 剉 黃蘗 酒洗 黃連 酒洗各三分



生地黄酒洗二分 已上四味預一日別用新水浸又以川芎細切  
蔓荊子焙三分 華細辛二分 ○預一日用新水羊大盞

方作二處浸此三味并黃蘗等煎正羔作一大盞去  
查入此浸者羔再上火煎至一大盞去查稍熱服空  
心○又能治噤頰噤唇噤舌舌根強硬等證如神宜  
食羊肉及厚滋味大抵腎併膀胱經中有寒元氣不  
足者皆宜服之神驗於月生月滿時隔三五日一服  
如病急不拘時分服○此方東垣辨惑論ニ出タル方也  
腰背胸膈閉塞疼痛スト云フヨリ方後ノ舌根強硬等  
ノ證下云フニ至是ヲ數フルニ四十一証也此四十一証皆腎  
膀胱經ノ内ニ寒邪ヲ復シ元氣不足スル人大羊如此ノ証  
ヲ患フル也予此方ヲ用テ効ヲ得シ一往一アリ今其医

按一二ヲ舉テ經驗ヲ示ス一左ノ如シ一老婦七十餘歲噤  
頰噤唇噤舌舌根強リテ難言一中風ノ如ク手足不遂  
齒動搖シテ或痛ク一有如此症三年ヲ陟リテ治セズ先  
医皆中風ノ症トテ中風ノ羔方ヲ施セ凡治セズ予  
治ヲ請予診之曰此症全ク東垣先生ノ云ハレタル腎  
膀胱經ノ中ニ寒有ヨリ右ノ証ヲ見スト思ヒ乃病家ニ  
此方ヲ記ノ詳ニ教ヘ用ヒシム病家方ノ如ク調合メ是ヲ  
用ル一三月計シテ舌根強硬等ノ症十ノモノ七八治セ  
ノ云々夫ニ頃ノ大キニ治シタリ然レ凡極老衰故全快ニテラ  
ズ后十五年ヲ経テ天壽ヲ盡メ死シタリ又一婦人白帶  
下ヲ患フ陰戸ノ内大ニ痛心ニ引テ痛症全ク此方ノ條下ニ  
云フテ有通リ也是又神聖復氣湯ノ症ト思ヒ付テ



此方ヲ調合ノ与ラフ二月余ヲ白帶下ヲ初心痛并ニ治シ  
 たり又一婦人上熱ノ火ノ多ク下寒如水ノ症ヲ患諸恙凡  
 効ナシ持病ノ如クニナリテ是モ三年ヲ歩リテ治セズ予  
 思ヘラク是又東垣ノ云ハレシ腎膀胱經ノ寒症タルト明  
 ト思ヒ此方ヲ製メ与ルニ其効如神治シタリ又一男子ヲ  
 治セリ鼻塞テ不聞香臭耳鳴耳聾目常ニ淚ヲ出ノ物  
 ヲ見ルト能ズ此病人又衆医ノ業ヲ服スレモ効ナシ予思  
 ヘラク是又神聖復氣湯ノ症トト思ヒ此方ヲ製メ用ルト半  
 年許諸症ナシ七八ヲ治メ体柔シタリ其后余快シタルヤ  
 吾ヤヲ知ズ右病人神聖復氣湯ヲ以テ効ヲ取シ之惜哉  
 此方世ノ人用ルルヲ知ズ我カ徒是ヲ試ヨ。此方ノ方後ノ  
 服法甚ク敷如此ニノハ久服スルトヲ得ズ予ノ常ノ如ク

此方ヲ用ヒズ大服ヲ用ヒタリ煎服法服ニ辨惑論ニ  
 弁スル処ニ法ヲ用ヒサル也此諸症老年或性質虛症  
 ノ人或中風久キヲ經テ治セザル病人ニ往ク此神聖  
 復氣湯ノ症往クアリヨク診察ノ彼是ヲ考ヘ併セ  
 復氣湯ノ病状ニ達スベシ是ヲ修行也











