


門下武9
隨 245
卷 23



九折堂山田氏圖書之記

痘瘡照點診法



一發熱而候之究^矣痘瘡之是非先用紅紙以
興油^{而沾}燃子大如筆管者使房內爲黑暗即
燃子令照火先看從人中地閣候之有何部
何色點在左觀何色點有^天右觀何色點而又觀
天庭印堂曉星日月角山根年上壽上下相隨如法
照之則看其皮下歷々而是亦是紫是點是塊^天
於肉中照入火光則曉然一點血明白也然又而耳
頂頸胸前乃手腕臂中肛門腰腿兩膝而跟足心

平照候之緊要也於此痘苗則在肉中根極深者是正痘也如麻疹則浮肉外而肉中無根如正照則點而不見故照撲紙覆手掌斜候之則照入肉內分明也若書日以天日之光觀之則不見矣

曉星報点稠密各部雖稀難治
曉星西眉中間也



疱瘡死症之弁

凡テ痘瘡虛陷ニ屬スル者ハ多九日ノ后症^ヲ変ニテ死告者多^ニ或^ハ症^{ヨリ}様子ヨリリテ數日ヲ経テ死スル者有又實熱難痘ハ其死六日^ヲ過ガル耳如此虛寒者其死遲^シ實熱者其死至速^シ治療中此心得以テ病家ヘカケヒキヲナスベシ

○發熱死症

一日發熱何部何絡發一塊紅腫^シ者大凶也先天庭印堂兩耳為連珠竇窠接歪^シ者或宮手足之心三五

村仁方娘上二十六
或腫子費血脉
及口鼻有黑氣

為叢者或面上覆青黑之氣者或腫子貫血脉及
口鼻有黑氣者或當印堂山根中心生黑痘及破
損或疵者此皆死之候也

發熱三日之死症

發熱三日內妄見妄語遺尿

不知人事如見鬼神者暴浮諸症不止死三日若四肢
彊直不舉動肌肉紫黑色小便如血者三日死

失血死症

發熱三日之內衄血死者無妨外從

七竅安血者其死速也

紅塊死症

發熱面色慘暗轉頰發紫紅塊或

作片堅破者血熱毒壅也到五六日不能起發失眠
路者九日死稍見顏色者延十二日死

青黑闊亂之死症

發熱忽退面上覆青黑氣

煩躁悶亂坐臥不寧皮膚雖清涼內反大熱煩渴唇
裂舌胎為坑赤點隱於皮下如珍珠板齒生血絲
口氣臭穢唇腫大者六日死若加悶亂腹脹手足動搖
者三日決死

痘母死症

發熱痘點將出面上未報先胸背手足

為山聚為腫塊堅硬者似瘤非瘤似癰非癰此名痘母

不治決死莫治

發熱腰痛声啞死症

癰熱腰痛太甚而後見点在皮下未出者毒隔伏也舌白胎乾燥或為坑音声啞嘔者死略癰起少有膿路者九日死

癰熱黑色死候

癰熱用撲紙照火光候之則面上心窩及遍身皮肉或紫紅塊乍變黑色者三日死

癰熱面頰赤唇腫大死候

癰熱面頰赤如朱丹者亦死

紫黑腫大及口鼻者死或頭面赤如朱丹者亦死

癰熱兩耳熱如火死候

癰熱兩耳灼熱如火者死之候也

癰熱面上赤色不治

癰熱三日內面上肌肉帶赤色者猶是血色未曾化水至四五日起癰失膿路者甚

凶也必卷不成漿至收齷期潰爛而死

發熱頭溫足冷死候

癰熱面上青脫白頭溫足冷唇淡紫舌白胎滑潤不見痘苗神氣困倦煩躁心煩嘔洟者三日死

發熱驚搐死候

癰熱忽發驚搐天庭眼脣帶青氣者必死

四絕死候

目上竄者心之絕也直視不轉者腎

之絕也非泣而泪自出者肝之絕也微瞑者氣絕也

血貫瞳子死候

血貫瞳子者火勝水竭此皆死候也

見點三日死候

血脈貫瞳子利水等十日

見點一脊死候

**癰熱見點偏身一脊如湧或赤色
如橘皮色及十種逆痘此皆死之候也摸之不得穿
者多六日死**

血點黑痣死候

**癰熱一二日痘點頭焦變
紫黑色者此毒自血中出惡熱惡寒乍面色变
改乾嘔飲食不入血點如黑痣者六日死**

見點皮薄錫色死候

**癰熱一日出點太赤色根窠
皮肉俱爛紅者血熱也陰血為熱被煎熬而不能榮
養故氣壅遏不解到三四日起癰一大驟皮薄易破
損嬌艷如錫者至六七日必癰瘡不可救十二日必死
見點心腹痛死候**

**臭氣勃々出唇乾裂舌作坑出瘡過赤轉
紫黑色加煩躁者六日死稍起癰稍見膿血者
九日死**

紅色嬌嫩死候

出瘡雖紅色嬌嫩者皮膚通

紅色嬌嫩者皮膚通

名嬌艷痘

紅脣舌淡紅滋潤至六日雖有起勢痘頂嬌艷者必不成漿至七八日發痒塌九日死此名嬌艷痘

見點舌上黑痘死候

癰熱舌上先塊黑一二粒

如癰者雖外痘癰期至七八日痰嗽唾血十日死

五心出痘死候

癰熱他處未見痘先五心出遍身後見者必稠密膿毒不池至四五日焦紫

痘者大凶也謂五心心寓及兩手掌兩足心是也黑陷不能起癰者九日死

見點叢痘死候

癰熱三日見點粘聚成叢

模糊作塊不分顆粒欲出不出欲盡不盡者此謂之伏痘如後者出先者或沒後者陷或癰俱潰成壞症二便無故雖能食至養膿期煩躁氣急者九日十二日死

見點面觀堆聚

癰熱出痘稠密面觀堆聚成

紫紅塊至出齊期變黑色者九日死勿治

根暈枯燥死候

痘出頂紫亦或帶焦黑根暈

枯燥肌肉枯斂者後變黑色不能起癰精神困憊不寢時譁語雖能食心煩不安者必亡九日死

見點陽疏死候

痘出頭不起至四晉如陽潑

燒黑及燈火燒者氣絕也決六日死

見點偏身黑氣死候

痘出面上遍身黑氣慘曠

目無神光必紫血泡後變黑陷者血迫妄行出奇後尿血或血自口鼻出不能起癰者六日死稍起癰者乾枯焦而六日死

見點陰痘死候

痘出二三日不快隱皮下為

水伏之形者血至而氣不至也四五日而變紫黑色者乾枯焦而六日死

出痘挾雜症死候

痘出挾雜症者悉皆藏毒

停滯肌肉其變難許十種逆痘亦其本皆同矣

出痘水珠死候

痘出稠密頭面遍身如水珠純

紫黑鍼痘死候

痘出紫黑点如針頭者勢甚劇也不待起癰先肉腫脰臥不寧唇腫爛舌

胎黃灰紫者大小便不利者雖投下法不爲効必六日死

逆痘

十種逆兆
八ウ

逆痘見点三五叢痘

癰熱輕，面上胸前三五

爲叢顆粒分明而腫硬者至四五熱不退又一齊湧出如瑣屑針頭作塊者先疎後密也此謂之逆痘必後焦枯不能成膿者九日死微見漿路者十二日延至十五日而死

出痘陷伏死候

痘出如蚕種如蛇脫者氣至而血不榮謂之乾枯如蚕咬如嘬者血至而氣不充也

乾枯 謂之陷伏若唇舌乾燥者至四五日不能起發加煩躁氣急者六日死

二日延至十五日而死

出痘赤浮萍痘死候

痘出赤稠密或如赤浮萍

微高起如爬破有血水者急於解毒之中兼升散治之能食爲破爛者無妨如痘起發之時變紫灰黑色而不起或陷伏不成漿乾枯者貼皮肉上如紫黑浮萍者死

出痘煩躁悶亂死症

出痘期而未解面色㿠白而面眼覆青氣者啼哭不休日夜呻吟煩躁悶亂心氣不安者雖稀痘不治如加浮渴者必死

出痘無縫色死候

出痘稠密無縫色者正氣

不勝邪。其氣乘其勢逆也。必至六七日爲溏泄內攻者氣傷也。或脾濕不洩者爲外利即形敗也。

十二日死

出脊永伏痘死候

出脊期熱不退吐浮不止衄血

不休飲食不進腰腹痛不止煩渴小便不利睡臥不寧痘永伏不起痘色變灰紫黑色者或變白胎黑滿血陷者此十証一有之者逆之徵也如腹脹煩躁悶亂氣喘者此欲內攻之勢也必死

見点此角唇高腫死候

痘出之時齷唇高起

十証

文化十成三月
大發熱弓九日
至足是多出

熱如火脉數絕食
止始撓醒唇

腫出痘多黑

齒根黑為渴不寢
食日一度

清涼攻毒飲三貼
子二熱少解余

田上之十証三証
在外眼中亦筋

貫瞳子在一証

見点無名腫毒死候

痘前先發無名腫毒未復

於平時而出痘者十有九死如能食神氣爽睡臥安

寧者得生

十二日死

見点初痘過赤死候

痘苗初出自過赤始照燈候

面上轉觀如橘皮色空地不方者九日十二日死

內潰

見點頭面不起死候 痘出頭面不起脹遍身手足痘勢雖光壯至山脊期吐浮不止痘色淡白或灰白唇舌虛冷或變純白者不治言白至唇者謂內潰必死

見点脣中有瘡死候

栗此腎藏膚毒不解也又肛門爲堆聚者腸胃

間膚毒不解也二症俱至七八日加寒戰咬牙者

九日十日必死百無一生

○起脹死候

天庭兩頰水泡死候

起發期天庭兩頰先發水泡

漸大如棗豆者至七八日期雖成膿悉清水銀色帶冷艷尚手足發水泡如湯火疱者大凶也十二日死如加池浮者九日死

○面瘡驟大死候

起脹而面上瘡起勢驟進長大

而光亮如燈火或嬌紅而漸轉梅花色者皮薄清淡清水也古人曰苗而秀而實者順也苗而实者知大逆此謂之不至而至也二三歲之兒九日死四五歲以上到大人者十二日死

○起脹腫塊堅硬死候

起脹後卒面上虛腫爲死

村にちう十三
痘患ノ此

或肩膊腰背腿臙皆癰腫塊堅硬者不成膿者亮死

起脹痘点過赤死候

起脹之期痘点素過赤如根暈

大紅面上微腫不分窠粒如瓠瓜之狀或如橘皮者亮死

起脹黑陷死候

起脹期變黑陷漸及遍身俱

乾黑者六日死若天庭輔觀面頰十窠中二三窠灌
充

膿豐滿能食者至十二日後發癰毒充或爲臭爛

有得生者十中五六

起脹黑如針死候

起脹時頭面痘平陷而皮下連窠

之真中帶黑氣或有黑孔者如針孔是氣血虛耗

脾胃虛弱故也用溫補之藥標瘡不實者至九日
十日發橙痒充臭爛悶絕十二日死

起脹頭面如皰死候

起脹之時頭面痘平陷而皮

薄窠之真中帶黑氣或加泄浮者九日死

痘起脹後灰白死候

出痘後出痘頂陷灰白

紋路雖出部遍身根窠血散更加泄浮煩渴唇舌淡白痰喘氣急不思飲食者是氣血俱敗
也不治必十二日死

起脹平陷死候

起脹之時吐利不止乳食不化

出瘡平陷不起二便下血者九日死トトト

起脹咽喉腫痛死候

起脹時卒失音飲食不

入咽喉腫痛口氣臭者必潰爛也寒戰咬牙者邪傳腎也悶亂者神氣喪也体寒者曉陽也或嘔或浮者腸胃俱敗也經曰五臟氣絕於內者利不止六腑氣絕於外者手足厥凡皆必死之候也

起脹血泡死候

起脹時發水泡者此毒伏於心

也不治又發水泡者此毒伏於肝必旋見癰瘍而死

出齊後不起脹死候

痘瘡而後全不起脹變

成灰陷者或紫陷不起而成乾冠陷伏慘黯不明者或癰如水泡痒塌者此血離氣背致毒下陷而外剥トトト也必九日死

起脹陷伏紫黑死候

起脹時啼哭不止夜

呻吟煩躁不寧狂言悶亂如見鬼神者瘡苗陷伏變紫轉黑或沒者六日死

起脹出沒死候

起脹時先手足處見而復隱

復起而復塌紅而變黑者此根本已壞枝葉先萎トトト之象也必六日死

母貪瞶死候

六日期倒陷死候

六日期而欲灌漿其痘平
陷根暈紅潤瞶色枯淡或皮薄破損有孔深者
此名倒陷多九日十二日死

倒陷

貪漿清淡水泡死候

貪漿出痘稠密天庭印

堂雖有瞶反清淡或水泡飲食減少小腹雷鳴或
轉矢氣者唇淡紅帶水光舌雖滋潤必爲溏
泄五六日期有此症者急用峻神之劑尚不止者
至八九日發痒搔命宮破損者决十二日死

貪漿平陷死候

出齊期而凝伏不長起脹期
而平陷不起養瞶期而乾涸不灌收膚期而皮薄
不痂者雖能食急煩躁氣喘者十二日必死

貪漿皮薄淡白死候

出痘淡白皮薄光亮根

窠枯皺至四五日如赤小豆大虛脹嬌艷者不成瞶
清水也俗医呼謂好痘進歡喜唇舌滋潤者失
溫補則至八九日一泄則抓破痒塌十二日死

貪漿清水嬌嫩死候

出痘四日而氣血不充

根脚紅潤頂含清水嬌嫩

スギトヨル

玉瓏面色不腫手足先

腫者爲逆其痘至六七日失膿路者必痒塉而九日死

貫漿水遲滯死候

素氣血衰弱之痘五六日期諸症無故當灌漿期遲滯不灌忽灰白平陷飲食良減少根窠乾枯漿色不滿足遍身雖漿或滴水泡相半者尚天庭輔觀不起癰者至十二日不成痂必喘渴而死或十五日十八日及延二十日必死

貫漿平隔瘡痒死候

灌漿期根窠淡白平隔爲

瘙痒正氣虛也爬搔不定破爛皮脫肉黑無血水乍乾枯者十二日死

貫漿瘡痒無時死候

若至膿期搔痒無

時神識昏沉孤破亂

舞搖頭扭頂者決死急則

九日死或延十二日死

貫漿項陷下痢死候

六七日期出痘項陷者

內元陽下陷也故氣虛則發自減不食則內虛如內虛則虛寒虛寒下利下利則痘平陷不成

膿故內攻九日十二日決死

貫漿大便初硬後實死候

大人之痘症素

稠密起癰灌漿膿半足惟至九日而大便解則初頭軟後實者雖無妨多屬氣虛忽然目開發者欲氣脫之勢也急不峻補則至十二日煩躁氣喘其死速也

貫漿乾黑焦紫死候

六七日期皮肉不化痘平

村仁吉著

陷根脚浮腫不活乾黑焦紫者九日死

貫漿瘡痒悶亂死候

七八日期而瘡痒無時

抓破之外膿水淋漓復腫灌精神安靜能食熟睡

者生如瘻痒無時悶亂倒抓破無血水者能雖食九日十晉死

七八日瘻痒不常死候

七八日期而膿色過半

天庭印堂山根年壽部信中心或抓搔或破損或疵者內元陽下脫之勢也故額前屬心火毒妄行來君位也心爲君主之官君危則十二官俱危能食多半死半生如隨症治之前破處再不腫灌或坑窪處乾黑而他處此者至九日半足乾水泡皮脫如豆殼者十二日必死

七八日倒陷死候

七八日期而眉心皇冕准

唇口及面耳先焦枯黑陷者此名倒陷必死

十二日延十三日死

質漿清淡水泡死候

至漿期皮薄清淡水泡

者至八九日痒癰孤破者十二日死如膿色過三四分
者孤破濁水淋漓血肉不乾黑能食神氣靜睡臥
寧、膿痴血色不去者到十二日後身熱肌肉紅色者
必死燒毒得生

七八日擦破無休死候

痘七八日之期而擦破無休

者毒氣內攻、腹脹聲啞、煩躁痰喘氣急者九日死

七八日水泡清淡癰痒死候

七八日期痘色灰白乾

枯無膿漿手足水泡或清淡或平塌空殼者自手足
發癰瘍及遍身穿皮肉紫黑血乾枯者十二日死

七八日膿色不滿死候

至七八日期諸痘膿色不滿足

不奏其功手足水泡如銀色根暈^{江加}潤平陷天庭尚不起不繫者急用峻補之藥加煩躁氣急者十二日死

七日瘡庠目開死候

七日期面部痘色不紅活不起

疎曬路過半忽然作痒搔目開唇淡舌胎涎如膠或

瘍喘如鎬鋸遍身皮脫純白者九日死

七八日泄浮死候

七八日期而寢食無故乍泄浮日

夜兩三行痘色平暗根暉離散者氣血離本之兆也
手足冷過肘膝者脾胃之氣絕也古人是謂之氣脫
心煩氣喘急九日死

貫漿出血死候

養膿之時寢食無故忽然唾血又
從大小便失血者九日死古人曰七竅失血者不治訣曰出
血上焦者陽絶敗也血出下焦者陰絶敗也故陰陽俱
敗者血從上下走必死之候也

七八日嬌嫩皮薄死候

七八日期而痘素稠密起癰

雖快反嬌嫩皮薄以手摸之軟而皮根皺限已毒雖
化漿多清水不稠膿不足者陽虛也後必變滑利
而十二日十五日決死

八九日天庭灰白死候

八九日期而諸痘雖有漿

天庭灰白失膿路者必死如精神爽寢食無故者於頭
項癰癤毒得生

七八日額上水腫膿清水死候

七八日期額上膿半足

如洗水清水淋漓者其痘必皮薄易破漸延到兩頰兩

腮水乾赤黑色而似齧非齧者十二日死如至十二日爲此症者是謂之水齧無妨

養膿期惡臭衝人死候

養膿之期頭面腫大諸瘡

灌而壞瘡盡孤破惡臭衝人穿鼻而肌肉紫黑色

乾涸者十二日死

八日期面乍腫乍退目閉死候

八日期而面乍腫乍退根

竅淡紅目閉急反諸人歡躍者氣虛也不煩不躁神氣靜而不寢此痘必似有膿漿竅裏或清淡或空殼或瘡白如枯骨一泄即氣脫如腸鳴下氣者必溏泄

仁集

頰脣寒戰咬牙心煩氣急者九日死如緩者十日死

八日期水泡鼻孔烟煤死候

八日期而面上膿色

半足或眼瞼水泡大如桃核或發淡紫泡雖睡臥安常能食鼻孔中如塗煤唇嘴乾黑而離格者必至十二日急煩躁氣急死

七八日期皮薄如水晶死候

七八日期痘灰白皮薄擦

破無膿血肌肉白如水晶者九日死

八日期痘色乾枯死候

八日期痘色乾枯面上七

竅俱乾黑者决十二日死

七八日瘡痒死候

七八日期而瘡痒無時孤破之處
膿水淋漓復腫灌精神安靜能食熟睡者生如瘡痒
無時悶亂顛倒孤破無血水者雖能食九日十二日死

七八日天庭孤破死候

七八日期而膿色過半天庭卯堂
山根年壽部位中心或孤墜或破損或疵者內元陽下
脫之勢也故額前屬心火毒妄行乘君位也心爲
君主之官君危則十二官俱危能食多半死半生
若隨症治之則破處再不腫灌或坑窟乾黑而他處復疵
者至九日手足癰水泡皮脫如豆如痘粒者十二日決死

七八日痘瘡死候

七八日期而眉心鼻准唇口及兩頰兩
耳先焦枯黑漏者此名倒瘡必三日延十三日死

脣膿期而水泡清淡發癰得生候

至漿期皮薄清淡
水泡者至八九日痒癰孤破者十二日死如膿色過四五分
者孤破濁水淋漓血肉不乾黑能食神氣靜睡臥寧
癰爛爛血色不赤者到十二日後身熱肌肉紅色者必
癰盡徑生

七八日擦破無休死候

痘七八日期而擦破無休
者毒氣內攻腹脹聲嚙煥躁痰喘氣急者九日死

七八日手足癰痒死候

七八日期痘色灰白乾枯無膿

漿手足水泡或清淡或平塌空殼者自手足至毫髮及遍身穿皮肉紫黑血乾枯者十二日死

七八日天庭不起不漿死候

至七八九日期諸瘡膜

色不滿足根暉塌潤瘡平陷天庭尚不起不漿者急用峻補之藥不奏其効手足水泡如銀色加煩躁氣喘者十日必死

八九日腹脹煩躁手足戰動死候

八九日期而大渴腹

脹煩躁手足戰動悶亂音啞昏冒呻吟舌延者十二日死

古人曰木陳者葉必落絃絕者聲必嘶病深者聲必啞由之觀之爲死症明矣

七日後滑泄不止死候 七日後滑泄不止食不入腹脹手足冷痘色灰白此犯五虛者或加唇舌淡白虛冷則決死勿治

七八日空瘡死候

七八日期而痘雖有綻鬆之勢窠中

空軟者此名空瘡痘極危險症也急用峻補之劑天庭不起不成漿雖然如額觀軸官十粒之內一二窠腫起灌漿潤紅活而空地又生小痘乍腫灌者復死中

得生矣不然則當膿不膿勿忽內攻十二日死

收膿死候

九日唇舌痘黃色死候

痘至九日而當膿而遍身未見稠濃惟口唇上下痘先黃熟者是毒氣內攻於脾也死

八九日口唇膚爛死候

痘至八九日未諸痘膿而脣先腐爛如敗皮唇上下口中純白者死

九日足膿死候

九日面部肚腹未膿而腳先

膿者不治蓋陰勝於陽也

膿時乍發癰瘡死候

膿時遍身忽然痒瘡抓破

脫赤紫色口外乾黑鼻孔涕中帶血色隨呼吸而出入者

快死

膿時兩耳爲瘻痕死候

膿時先兩耳爲瘻痕

唇更爛黃而腮乾硬按之如石者必死

痘未膿口唇先腐爛死候

痘未膿口唇先腐

爛黃水淋漓或過十二日唇獨腫硬不消者必死

走馬痘口臭肉黑濺血水穿牙頰鼻者死或三七日

後死

手心先齧者之死候

面上未齧手心先齧者

必痘后有怪疾

八九日兩脚先齧死候

八九日痘爲不快齧遲滯

而脚先收齧不食而常如嚼物口唇動不止者三日死

九日十日口唇硬腫死候

九日十日期而口唇硬腫上

下不合者欲登走馬痘之勢也急不治則一夜齧硬

齧唇崩落者死不治

當齧咬牙泄浮死候

當齧不齧忽然寒戰咬

牙泄浮不止手足動搖五心敷無神者十二日十五日必死

齧後聲啞者癩痕如霜死候

齧後聲音卒啞者

氣虛也瘢痕如霜雪之白者氣血俱虛二症並起而

不食者雖過三日必死

當齧失音不乾死候

當齧皮脫如皴肌肉湿

淫不乾者脾虛不解也至十二日溏泄十四五日死

齧後大渴泄浮死候

齧後大渴不止大便泄者

必爲白肺後驚風者

十日無一生

當齧喰水失音死候

當齧喰水錯候不止或失音或

乾嘔或弄舌或腹脫或不食或卒大食者急煩躁悶亂死

欲厭諸惡候死候

欲厭痘皮薄而軟色白者

花片子_行、厭薄易治，疮白血枯者此爲假厭必十二日毒氣內攻而死急。溫補氣血尚勝鳴下氣塘

泄寒戰咬牙不止者必死

厭後瘦脫死候

厭後腸風傷食而即瘦脫者不治益脾主肌肉是土崩脾敗也

瘡後死候

瘡後瘢痕粉白死候

瘡落後瘢痕白如枯骨或粉白者是氣血盡也如大補氣血轉色者生

不則經數十日必死

瘡後發驚搐死候

瘡後發驚搐者是心氣已絕在驚即爲陰癇神氣無所依故不治

瘡後嚥物作噎死候

瘡後嚥物作噎喉中如鋸腹

張虛鳴痰喘頭汗者死

瘡後泄浮死候

瘡後泄浮不止舌虛冷而渴不止

少陰之虛也目中無神面色青白者死

瘡烏落呵欠死候

瘡欲落雖能食呵欠氣息

眼中微喘面眼不宜唇舌淡白或紫黑色而滑潤者死

痘後餘毒加一病死候

痘後餘毒未解而一病復生

飲食減少者五行勝復相乘也故多死

除中死候

除中死症

出痘不能食向能食則生不食則死
今能謂食者一向不食而今思食自少加多者胃氣自然和也今忽大食者乃胃敗火盛邪火殺穀此名除中
如油之將滅必大咽而後滅死在旦夕

除中秘傳

傳曰能食穀氣不至痘色赤此謂

除中其候在七日後

痘疹初中後死候

發熱湧出死候

發熱一時如湧出舌胎乍黑者必死

死

發熱煩躁死候

發熱煩躁痘出現而又加煩躁氣急者死之候也

痘一二日而出死候

痘出現三日內變紫黑色而

不碍手者六日死

出痘四日驚搐死候

出痘四日驚搐不止者死之候也

出痘觀額爲叢死候

出痘摸糊者觀額五七連串

齋馬叢者多死

陷伏倒陷死候

陷伏倒陷屬諸症。毒入於骨
髓。变黑者。毒火入於腎也。故死。

蚊迹蚤班死候

蚊迹蚤班。速於彈指。至殺蛇皮

易於返掌必死之候也

發熱直視死候

發熱目直視手尋衣領亂捻物此

毒發於肝為亡魂

發熱悶亂喘急死候

發熱悶亂喘促手眉目

鼻面此毒發於肺為亡魂

魄乎

發熱悶亂舌頭眉目

發熱上竄咬牙死候

發熱上竄咬牙多呼哭驚惶

或不能言此毒發於心為喪神

發熱昏睡手足瘓癰死候

發熱昏睡手足瘓癰

不思飲食此毒發於脾為失意

發熱目無精光死候

發熱目無精光眼明欲墜

下而縮身此毒發於胃為失志故真臟見者必不治

五症死候

蒙頭鎖頂不治。胸突起者不治

鼻開發者不治。口中臭氣者此大毒。薰煎於肺

胃敗之候也

失音死候

不欲食失音者此咽喉腫爛之候也

寒戰咬牙

寒戰咬牙者邪傳於腎之候也

悶亂

悶亂者神亡之候也

體寒

體寒者陽脫之候也

嘔吐泄浮

嘔吐泄浮者腸因俱敗之候也

天柱折

天柱折頭軟者陽燄死之候也

聲音啞喎死候

聲音啞喎如破如硬者咽喉潰爛至九

日十日不清者死之候也

瘡痒痘點隱見死候

瘡痒者正氣此欲下而未見

乍隱者此瘡欲陷伏也二証俱具而目閉妄言謂之喪神必死之候也

出瘡耳後灼熱死候

出瘡稠密寒戰身冷汗

出耳后反灼熱者死

痘未厭面口唇膚爛者陽明

齒不解也或至十一日唇獨腫大而不消二便秘或雖

無故十五日後必癰走馬痘早不圓則濺紫黑血竈齦

膚爛死或實者經數十日穿鼻孔者亦死

出痘必死之諸候

出痘首尾頭為元首之尊故

兜蒙頭頂爲關津之要，偏嫌鎖頂、鼻准先出者，淫毒犯於天根，耳輪先現者，鼻毒侵乎王堂，皆是必死之候也。

怪痘逆痘必死形状

痘點初出時先面胸半足已見紅點，却伏不起，變紫色或黑爾至四日，熱蒸多不退，加悶亂氣喘者六日死。若前症而起發不快者至七日不成膿漿，平塌窠殼空軟，雖稍有膿色，却清水皮薄如漿，統得二三分者，延十二日內攻死。

無根痘死候

諸痘俱養候而地閣四圍陷伏枯

地字別立

涸或灰白而不起陷黑者，腎水已絕也。不治此名無根痘。

大空痘死候

諸痘壯起而天庭曉星印，當山根不起者乃血不灌頂，此氣至而血不至之類也。故名之謂大空痘，十無一生。

猪頸痘死候

凡出痘喉頸心窩大，多者此名謂

急氣 猪頸痘急服玄參桔梗生地牛房子山豆根耳炒之類。

遲則其毒結咽喉，飲水不利而當厭面期必死。

血庖水庖爛痘死候

發熱痘出便成血庖，或面上

眼瞼癰水庖乍破壞，膿水淋漓皮脫者，此名爛痘不治。

加悶亂者六日死

蛇皮痘死候

蛇皮痘出痘稠密而頭面遍身無空地平塌而白色或紫赤色至七八日而不能出漿乾枯如有鱗者九日十二日決死

空痘死候

痘出遍身帶紅紫色瘡不潤澤至三日身熱不退口渴唇燥者毒火鬱結於臟腑不解至七八日必空殼而不作膿此名空痘至九日十日癢塌十二日死若神氣爽睡臥寧能食者發癰體有生者

鬼痘死候

痘出現三四日痘頂乾黑而頂如刺尖

者此名鬼痘以手掌撫之一顆血色凝滯不變也必當

膿不膿當厭面不厭乍起乍塌以番次引頸延日久死

治法臘脂水塗其瘡轉紅活者生射按敗鬼痘而拔疔之傳藥可也

血痘死候 血痘其痘初出血熱紫色如朱筆點於

遍身者是也肉中根已腐外苗必萎六日之中決死

血泡死候

血泡痘初出過赤一二日而帶紫色丘

膿期一卷血漿也刺疮血黑者不治血紅者急清毒活血湯

加犀角子之外金蠟脂血化者有生

疔痘死候

痘出之時正痘之間如黑痘火刺螺蓋

ヒテシタシシタシ

者此疔也。押之不知痛，堅硬而有核也。若癰耳前後，胸背結喉大陽者，必死之候也。

乾痘死候

痘出起癰之時，痘頭焦紫枯燥，不肥澤，或平陷不起皮膚，乾紅皺紋枯萎者。元此名乾痘，唇裂舌干，煩躁氣急者六日死。

九焦痘死候

九焦痘當額、鼻頭、頰地閣、胸背、耳後手足一二箇黑陷者是也。多死。

嫩瘡死候

出痘起癰之期，瘡色嬌艷，皮肉桃紅至痘頂通紅者，此名嫩瘡。至七八日不能成膿，痳塌而死。

破黃痘死候

破黃痘初出之時，先人中大痘現他處痘象雖稀少，六日以下傳經時必然發泄浮此，脾已虧敗也。急死。

隱血痘死候

隱血痘其痘形如豆殼，色灰白全無紅暈及擦破，而後血出，反無膿漿者，決十二日死。

濕痘死候

痘出起癰之時，唇尖腫大或爲雀斑，身出瘡皮嫩，易破模之，濕手者，此名濕痘。至七八日，痒塌。ス二歲三歲兒九日死，四五歲以上之兒十二日死。

漏痘死候

出瘡起癰養膜之期，瘡頭有小孔漿。

水漏出者必非稠膿必清淡清水也此名漏痘急用燙
補之割ノ不治則至六日七日必發癰瘡ヲ三歲以前兒子
死

赤萍痘死候

赤萍痘其痘平陷而如浮萍者是
也能食者生如紫萍痘痘及白萍痘者死証也

垂珠痘死候

垂珠痘其痘兩耳紅紫色如灼木腎
之外候也故伏毒鬱於腎者必死矣如兩耳輪之上下
連綿ノ串珠此毒氣傷腎也百無一生

四痘治術

報痘試痘賊痘痘之四症其治術

