



武口  
245  
卷24

鄉食庭家秘說卷之二十六目錄

元折堂山田氏圖書之記

升麻葛根湯

メラ

和解湯

メラ

加減升麻湯

メラ

加味升麻葛根湯

メラ

敗毒散

メテシ

參耆飲

メテウ

加味參耆飲

メテウ

桂枝葛根湯

六丁ヲ

參連湯

七丁ヲ

安神丸

八丁ヲ

羌活湯

九丁ヲ  
是序熱發汗解熱之方

調元化毒湯

十丁ヲ

出痘額前說

十一丁ヲ

痘癰天庭印堂說

月

毒壅血熱說

日

清毒活血湯方類方口早

出痘不分顆粒說

十二丁ヲ

滿舌白胎如積粉說

十三丁ヲ

十神解毒湯

十四丁ヲ

出痘後血熱壯說

口ウ

本方加石膏大黃說

十五丁ヲ

夾班夾疔說

十六丁ヲ

腮紅臉赤說

口ウ

唇舌燥裂說

十七丁ヲ

清涼攻毒飲

十七

有九穴敷失血者說

日

熱毒內壅說

日

鄉食庭家秘說二十六

升麻葛根湯

此方一二日用之，即傷寒而

寒

誤丁數  
脱相合  
此痘一服之，癰平毛亦無妨，升麻葛根

布用一錢半，生葛三錢，葛根五分

和解湯

三日節後專用之方，升麻葛

芩防風桑白皮咸半夏用葛根一錢，生葛三錢，葛根一錢，本方有二人參一錢。

加減升麻湯

無毒痘，膿少，痘但見，嬰兒身

熱呵欠，煩悶，中發驚，雙睛噴眼，鼻孔出氣，粗汗，足酸軟，而宣嘔，服有，葛根再，兼，葛根，半，升葛，甘而水，白，葛根，桔，火，鐘，半，葛根，白，寸，葛根，服，微汗，為度，如有汗，當以小剝，陳之，今不可用，葛根，○ステ危瘡，力，疑。

似ニワタテ知レ難キ右有モト時ハ腰ノスケルトヌケル  
トヲ以テタスノ法有シ若シ腰力又テナラバ夜瘡ノ  
席施三千ガイナシ今此ニ云フ年足酸軟モヨシガス  
ケルノ更來、於比診に方針已ニ是ラ年セリ併セ見

**ルゴ加味升麻芍根湯**

曾家壯丸

傷寒

感

不可不參

散

也當視

視

強弱

而用

茶

桑

汗

兜

体

多

素

ヨリ

吐

實

春

用

此

湯

汗

之

ラ

白粉

芍

一束

升分

甘二方桔三方防去蟲去土半毫子

糠淨炒研碎用

五分桂無五分小川芎四方山楂淨肉八分生薑三片

**同**

**藥**

**丸**

**微**

**汗**

**之**

**微**

**汗**

**之**

**之**

熱壯、膿瘍、齒隱、之等平皮一下、有欲出之形者專用之、桑之如汗出、表者勿攻、之出現定後又宜行別儀、汗出微、乞一畫一夜、當、  
**ニシテ**

**敗毒散**

**初起**

**桑**

**熱**

**疑**

**似**

**乏**

**時**

**此**

紫西羌桔有頭天骨薄甘

本方

血甘竹今

加之加萬一片、右少益溫服之。一方去此紫桔壳、加蜜蠟、○饗食庭家三用之處、敗毒散、ハハリせる通角、敗毒散二防丸荆芥、ハ加、テ是ノ用比腰ノスケルカ又ケルカヲ

タメトシ○口白鼻、熱氣有时ハ必ス比方ラ  
用ニ此物力少々、口傳て口白鼻丸ヲ珍フロ  
但前已、乞ラ年セリ併セルゴシ 冬参蘿飲  
有ノ白鼻、寒、声重、喉嚨、零、宿之而  
痘出、不快者風寒敵也。宜參散之。  
蘿參 有法 陳小川芎各三分羌防荆  
各二分桔芷甘各三克冬加五分麻子仁同参丸服但  
不可多服 忌加減 蘿飲

兒、体無素、口吐痰、丸服、用ニ加味升麻葛根湯、汗之、  
体無素、桂枝湯、弱、服、用ニ加味參蘿飲

味參蘿飲 用

川芎、桔去芦、西各二分、陳甘各二分、白芍、五分、皮  
粉葛分半 剝 三分、年童子 剝 四分、直二分、生

姜三片同煎、加一服、微汗之。本無微寒、

赤芍、葛桂芍升防甘各一钱、加姜三片、淡豆豉一  
瓣、煎服、月加三麻豆、或桂枝麻黃湯、  
亦用之。適參連湯、參連湯、

之際參元散、擣者先宣、此湯一砂參二分、  
玄連五分、感於本一丸、間以熱湯一振、

山、斂ニトシテ之ヲ父ス然肥計氣子與フ亦可  
而失方レニ無<sub>元</sub>其處一則致驚<sub>ヲ</sub>自止ム **安神丸**  
治<sub>ス</sub>痘中日一回<sub>言</sub>妄神多<sub>レ</sub>後者<sub>ヲ</sub>  
大辰<sub>ノ</sub>破一粒<sub>ノ</sub>熟肉<sub>五</sub>重<sub>午</sub>寅<sub>五</sub>重<sub>共</sub>而<sub>ノ</sub>  
久ぬ未<sub>ニ</sub>不<sub>ニ</sub>積精心<sub>中</sub>血<sub>ト</sub>小精<sub>一</sub>尾<sub>失</sub>血<sub>ト</sub>  
和<sub>ナ</sub>如<sub>ク</sub>豆<sub>大</sub>一每服<sub>一</sub>丸新<sub>波</sub>治<sub>テ</sub>代<sub>下</sub>  
燈心<sub>並</sub>陽又可<sub>用</sub>法○傳曰如<sub>ニ</sub>痘起<sub>至</sub>  
為<sub>ニ</sub>順差<sub>ト</sub>已<sub>ニ</sub>散<sub>ハ</sub>麻<sub>セ</sub>之<sub>付</sub>勿<sub>ト</sub>神<sub>冒</sub>懷<sub>ト</sub>  
舊<sub>ノ</sub>語如<sub>見</sub>鬼<sub>カ</sub>一壯<sub>者</sub>此<sub>出</sub>痘本稠密<sub>ノ</sub>而  
精<sub>ニ</sub>毒俱<sub>ニ</sub>外<sub>ニ</sub>出<sub>ト</sub>鴉<sub>ノ</sub>而<sub>ハ</sub>此<sub>ニ</sub>毒<sub>ニ</sub>通<sub>ニ</sub>養<sub>ト</sub>

血<sub>鴉</sub>ニ大<sub>シ</sub>安神<sub>一</sub>丸<sub>ニ</sub>之<sub>シ</sub>○け方<sub>ヲ</sub>用<sub>出</sub>口<sub>神</sub>有<sub>リ</sub>  
至<sub>テ</sub>痘瘡<sub>ノ</sub>不<sub>ニ</sub>アヤマチ<sub>ト</sub>物<sub>諸</sub>ラ席<sub>机</sub>ノ内<sub>ニ</sub>  
見<sub>ニ</sub>或<sub>ハ</sub>目<sub>ニ</sub>來<sub>タ</sub>見<sub>サ</sub>ル處<sub>ノ</sub>物<sub>ヲ</sub>見<sub>ル</sub>模<sub>シ</sub>言<sub>ハ</sub>シ<sub>カ</sub>  
車<sub>玉</sub>ダ聞<sub>カ</sub>サ<sub>ル</sub>處<sub>ノ</sub>多<sub>シ</sub>國<sub>ノ</sub>模<sub>シ</sub>言<sub>ハ</sub>シ<sub>カ</sub>有<sub>是</sub>ア  
俗<sub>ニ</sub>痘瘡<sub>ノ</sub>無<sub>レ</sub>移<sub>リ</sub>テ<sub>言</sub>ロハスルト<sub>ニ</sub>叶<sub>ハ</sub>シ<sub>カ</sub>  
け葉<sub>ヲ</sub>用<sub>テ</sub>理<sub>ラ</sub>ノ<sub>ハ</sub>多<sub>シ</sub>然<sub>ニ</sub>順<sub>ニ</sub>差<sub>シ</sub>シ<sub>カ</sub>有<sub>是</sub>ア  
云<sub>ニ</sub>何<sub>龍</sub>アヤ<sub>ニ</sub>キ<sub>モ</sub>ラ<sub>シ</sub>言<sub>フ</sub>ニモ恩<sub>ノ</sub>外<sub>サ</sub>ワリナキ  
者<sub>ヤ</sub>物<sub>ノ</sub>多<sub>モ</sub>也<sub>ト</sub>シ<sub>カ</sub>相<sub>密</sub>毒<sub>瘡</sub>ノ<sub>ニ</sub>夜<sub>ニ</sub>  
け方<sub>ヲ</sub>用<sub>ユ</sub>ゴ<sub>ミ</sub> **恙活湯** 競解痘瘡氣  
治<sub>ス</sub>解<sub>ヒ</sub>痘瘡飯<sub>各</sub>半<sub>合</sub>甘<sub>右</sub>細

是三才之序  
熱發汗解  
熱之苦也

剉加テ芩ホウキ生イモ竹チク桑シラカバ一  
溫服スル者スル 加ハシメテ胡ヌリ葛カズラ芩ホウキ○右升二肩膏  
根湯ヨリ羌活陽ニ至ル三丁ノ方○痘瘡癰ツケ  
序ナシ一方ニメ見ル三日ノ方二人那ス批ス汗解  
熱スル東ト心乃テ用スごロ 調元化マサニ陽ヨウ 痘ツケ  
出ス而稠密スル者スル或ハ乾スル枯スル而此紫黑シマヘタ有  
或ハ成スル片スル方ハ額カブト粒スル有スル皆ハ血スル氣凝スル帶スル  
而毒スル解スル肆スル行スル最スル可レ憂スル急スル宜スル治スル血スル憂スル  
事ハ而解毒スル用スル此ハ湯スル神スル石スル苔スル八方參スル  
用法ハ白スル生用スル當スル飯スル同上各年常スル竟スル竟スル方ハ  
新スル方ハ

方痘ツケ額カブト末スル

酒スル芩ホウキ連スル防スル荆スル桂スル通スル五スル此紫黑シマヘタ過スル之ハ每ハ  
銀スル地保保スル洗スル甘スル三スル方ハ蠅スル蠅スル查肉スル生熟スル一并スル同益  
溫服スル大便スル痛スル者スル去スル參スル老スル加ハシメテ火スル大便スル一并スル五分スル微  
利スル大便スル通スル仍除スル○  
痘スル一出スル而如スル赤スル直徑スル額スル前スル敷スル出スル向スル  
始スル者スル調元化毒スル陽スル如スル毒スル雍スル盛スル卷スル  
驚スル搞スル者スル湯解救スル重スル○  
圍スル痘スル三日スル而參スル於天庭印堂スル而三五  
相連スル出スル者スル急スル宣スル調元化毒スル湯毛スル毛スル

如連日便不通者，加酒炒大黃二錢下之○

**壅血熱**

唇舌赤色或赤紫中央白胎通明者，痘出不快者其症不同。最宜一方，別若下痘色紅此紫枯滯或乾紅或紫，如蚕種，不方顯粒，粒如廈角，色或肌肉深紅至出骨頭，壯熱不退，大便秘，後赤紫上毒，壅血熱也。以毒氣鬱滯，氣血不流行者，急宣、禡元化毒陽，更之如瘡色紫者，乾枯帶一焦黑者，宜清毒治血湯，更之。

○**痘不方顯粒** 唇舌赤紫，東三圍

未潤中央白胎通明，身熱如火，口渴，天庭同室仰堂，毒多一齊出，根點稠密，形不尖，影松，乾枯而紫，黑以隱，皮膚欲出不出者，或乾枯而紫，黑者或皮膚不方顯粒者，皆血氣凝滯而毒氣肆行，最土而可憂，此毒壅也。二日用敗毒和中散，解毒，用禡元化毒陽，更之。○**滿舌白胎如積粉** 唇舌紅赤或滿舌白胎如粉三四日痘發起，毫不被此相串，皮膚肉浮，或乾

本瘡四傍一旋引出小瘡一撮一裏漬解アマス肝一塊  
 者此瘡最重先用調元化毒湯清解アマシ解  
 除至五六日唇潤舌胎老而滑一润丸者  
 宜用千金內托散托體解毒アマシ如皮膚  
 塌不起根骨不收第一者忌之○三日  
 右亦見之依禱丸化毒陽用ヒ血流  
 毒解又段ヒ銅元化毒陽アマシ効アマシ見之五  
 六日ニ至半唇毛潤ヒ舌胎毛更老  
 滋潤十日亦能潤元化毒陽アマシ無  
 失者之其次千金內托散用

腫之托之貴腫ノ又毒解  
 肉及セ又積ニ充也付ニ疤痕アマシナテ見  
 ルニ以爲ヨコニヒロカリテワタリ根血ナ  
 ドモ序ノ散ル者ハ千金內托散十ド如輕  
 刺ニテハカノ不足サハ是ハ別ニ大保元湯  
 ハ參白鹿草如ヒ方用ヒ托腫スニ石色  
 ハ忌トミリ是ヲ局トハ千金內托散ハ用ル  
 ハ向レトハアマシ十神解毒湯專治下血熱  
 如火毒寒症性一腮紅脣赤毛焦  
 瘡已來出三日已一瘡一頬一紅

燥渴，欲飲時，卧石室中，小便赤黃，青上七色。  
 鹽也，並皆治之。當飯稍生地紅洗，牛舌  
 大腹（淡淨萬通）竟蒸破碎，小川芎、桔各三方  
 ○心印（有二）甘草已上共用一燭，十四根益。○傳  
 曰毒火鹽者，加芩，速如梟，炭內伏而大小便  
 秘，尤者加石膏，太炎之派之微利，後勿用。唇舌  
 色，草○又曰，急，一二十日不出，一苗，赤色，肌肉  
 深紅漸變，此紫黑，夜，衣，珊瑚，至三兩，身無  
 痛，壯而加乾紅藤，色，血熱也，急，治十神解  
 毒湯（淡之）痘，色，与唇舌有，疾○

### 熱症

也，亦稱後溫，則，勝理闡，通易出，腰，  
 也，如於此際，出瘡，赤色，不分，地，累，身，熱，不  
 退，口渴，睡，固，不安，唇，爛，舌，赤，紫，無，胎，赤，  
 热也，急，宣，十神解，毒，湯，如，鉢，見，熱，一，舌，不  
 可，妄，技，空，涼，解，毒，烹，火，燒，血，凝，不，行，則  
 血，歸，重，用，貨，之，則，瘻，血，毒，不，破，成，矣，也○  
 热，血，多，熱，多，子，一，熱，區，別，有，血，多，二，熱，一，布  
 者，八，及，不，周，多，大，熱，一，有，上，云，一，尾，舌，赤，此，紫，二，火  
 脂，八，丈，之，七十，千，者，也，是，乃，干，血，熱，之，十，神，解  
 毒，湯，熱，一，也，若，之，氣，少，二，和，熱，七，千，古，八，舌

胎ラ生ル者也是大邪不寢、寒涼ノ利宣  
丸也舌胎十年者ラ以ニ十神解毒  
陽血熱ノ症ト定ル是肝心ノ見心也○本  
方加石膏大豆ニ唇紫赤燥裂舌三圍赤  
色如火中央白胎如積粉或出瘡稠密紫  
赤乾枯欲變焦紫大热狂亂多濁頭渴  
引飲睡固不安或日間諳語如見鬼狀二  
便秘結或腹脹不能食者內室初參  
一二日用連翫升六湯或辰砂益元散或  
退火四生丹之类其根不可解如舌胎不變紫  
舌

中央乾黑或焦此革而故生刺者多清涼  
攻毒飲或十神解毒陽加石膏太黃清  
之解之如利後身而漸退唇舌盡同  
有生不則六日九日死○十神解毒湯八  
血熱大渴舌燥而渴之テ血熱ノ目的ハ舌  
脈ナシ赤紫ニシテ身壯熱不リ目的ト充也  
ノ用ルコニ疑有共目的トソムクニ似テ如何  
答テ曰十神解毒湯ノ目的之身壯熱大  
汗舌脉十キノ目的ト充也ハ干ガノイナニ

今コニニエフニシハ血熱也ノロニタニキモホリナヒ  
モニキ者也五三十秒解毒湯ニ石膏大  
豆ノニ味ヲ加味エラ見テ乞レゴト何ブニ同  
的タガフムラソニヤ○火班夜疗居古赤  
色或紫赤無口渴身熱如火焰見點  
深紅漸出集此紫而赤班疔寒乾紅滿毛者  
是血熱也急宣三十秒解毒湯一匙如大便  
秘結者加酒放火豆微刺之取涼血攻  
毒飲可參考也○或人問テ曰血熱ノ云云之  
目的ニ舌ニ脂ノ十キルニテ目的ニトルニテ謂如傳

舌子曰血熱之疾ニテ潤ノ者也平氣ニ來  
又潤ノ處血熱ニ知在カ入ル處舌ニ脂十キ  
斤熟之又卒ニ陽ニ屬ス陽火ノ疾也瘧  
丸ニテ侵スハ舌ニ生脂ノ生白也瘧  
以白之而二身ハ壯熱ニテ舌ニ脂ナラ以テ  
血熱ノ目的ニ取ル也○腮紅臉赤唇舌紅赤  
或紫赤無口渴乾燥偏於壯熱腮紅臉赤  
毛焦レ毛枯已出未出三日已前痘丘頬  
紅燥渴欲以飲睡一卧不寢小便赤尿大便  
秘結者此血熱也並皆宣三十秒解毒一湯

主之如身抱一愈。瘡形色乾紅澤而紫燭  
變而黑者，宜抱一大寸急宣清毒治血湯。  
主之如石蠟，裂衣乾黑而不潤澤，形色如  
漆兔者，大死。○大便秘結不赤，以少  
水多加十神解毒湯定例，加

味也。○唇古燥

列衣

唇乾燥，舌燥，則

色如中，壯熱口渴出瘡乾紅帶色，則

古子

皮肉深紅如炬火者，急宜計神解毒湯。  
○本文云皮肉深紅如炬火者，乃包瘡之色。  
故此計此不皮肉二字，亦可謂之包瘡。

如ノテラムト赤キラニフセ

也。色血少抱在瘡

清涼攻毒飲

治下瘡瘻大熱如火，紫艷深紅。

煩渴顛狂者，此陽主之，石膏

三兩至一兩連一兩至

得六兩

通紅荊絳大力

五分犀角

磨汁

青七分

知母五兩至

地丁一兩

右加燈州一方，芍藥一

錢

傳曰：瘡，病原，氣虛，血寒，有多蟲，白鳥炎

煥盛，証候亦有多端，用清涼解毒，不過六

日，若至，必有創，有用之証，候詳審，良

施，後矣。○又曰：有九穴

失血者

在初，灸四五

日之際，一者，氣突內傷，則血溢，焦爛，血迫，支窄

也。

窮敵致死急立涼血攻毒飲清涼攻毒飲之  
 二法。○又曰當而熱而津不營原火極之症候而  
 用清涼之劑以清而安順成之體功十日後  
 復身熱大陽或曰唇參支馬大便和者此  
 清之。○朱氏曰見積熱形慄者用攻毒之  
 刺三日肉死生解毒解毒則表參自和也  
 清涼攻毒飲主之傳曰十神解毒湯加力石  
 膏大黃下宜唇舌有缺○十神解毒湯方  
 云膏大黃加附子說亦十神解毒湯方  
 後係中二年并有八條七日見于後口誤  
 亂了句如身熱如火燒口  
 烦躁顛狂亂瘧喘急大小便秘出  
 瘡焦紫乾滯寒紫赤危矣起參之  
 第唇燥裂舌白胎中央生黃刺者熱一束  
 內壅也急宣清涼攻毒飲主之如見此刑私  
 急立活之及五六日有不治○声哑積熱  
 一熱而朝生白胎並生舌知者為積熱形症  
 而目浮腫多喘声嘶唇燥裂毛焦皮燥  
 肌膚大熱二夜和法身及腰寒不者一熱  
 又解之者失下及竟一千升散三日止矣

要熱者單下以胎減為度不可拘  
在初當可參之說此百中一二不可執以常  
急宜涼隔散或竟連解毒湯合白虎  
湯或清涼攻毒飲之類○唇舌滋潤者  
更急切忌下殺人○唇舌滋潤尤  
者急而見不下切忌下殺人下十  
自能也唇舌發不以有謹口  
言ノカナハ實ニ茶二十人殺不以有謹口  
○休火積熱唇燥裂舌尖赤色如始中  
滯半是掀斧如火根暉紫赤大小破  
結狂妄譖語如見鬼祟一寢食不寧煩渴  
者裏內伤火之極也急不圖之則舌乾  
里而九日死急用清涼攻毒飲三五之如  
便利後唇舌滑潤三圍赤色標唇鉗  
得潤澤赤色不全退者旬投參耆七日  
後涼內托散去入參肉桂加芩大力子  
治之或用參芩清神湯去參芩加黃連  
蝮蛇治之○如踰條之劑大過則內下  
脫擇瘡不絕峻參五日後唇舌滋潤或  
淡紅或灰紫或淡白或潔清寒微灰黑

十九 或淡紫或深白丘老始頭清潤者急宜  
 温補○疎滌ノ刷大過不す内氣下脫不  
 十一少秋く味フベニ剉房ト云、凡疎滌 大過  
 不時ハ其害有足ニヤ瘡瘍ハ格別ニキ害  
 有灰ニ度也 一服ニメ東ラ止ムモニ乞カムニ性  
 跡滌耳形六桂附ト云、凡又參引桂附大過  
 不時ハ從ナシ虛寒爻丁大過 未トナリ害ヲ取  
 ル有之ニビシ○瘡瘍雙蛇ラカフルノ并不  
 二詳ハ傷セ考フベニ○**袁襄家** 治方  
 唇燥裂舌尖此草赤滿舌向脂粉種稀半  
 央生赤刺乾焦七八日期ノ鳥毒烈火血甚  
 極痘瘡以口刷ノ療之故雖不レ極甚流解遍身  
 乾紅帶毛叢者紫疮一根單做一者或曰原中隔  
 不齒、曾無一腫色然大過引飲多至數十寢  
 食不安大便秘結小便赤滑烏丸丸燒鹽丸  
 裏俱空急宜清涼攻毒飲利大便後唇  
 口滑潤、膚毛叢緩鬆松者峻ク而攻之元  
 王腰期風清毒活血湯清涼攻毒飲之良候  
 艳鮮但百中不遇一二施治者詳之唇舌  
 艳、准十惟餘邪未去者赤以二十种解毒湯

加黃芩妙一派レ之、若舌上紅潤而胎滅去者、  
參麥源補湯或一千金內托散、迄無考。  
○此方レケ一方ヲ能レシ考レバ、清涼、利尿、  
用テ後如レバ東郭ラ點ジ行クトレバ、摩  
法則トナスレシ。○血熱除矣、居燥ヤ古而色  
中央白胎乾燥ヤ變レバ害ニ毒ニ、鳥木毒烈大  
血熱ニ餘炎内伏未解、身體、根暉大ニ如  
火、燒身半足根暉赤色、煩脹大渴、引飲  
不能食、大便秘ル、春九日後稍止リ、者急ニ防ヤ  
火褐ニ倒レバ、急ニ清涼攻毒散レバ、醫シ之

○傳曰此病因山嵐瘴氣感之、患山瘧者  
同有此症、治者驗之、○山嵐瘴氣感之、  
春又一症、其名有二、一人治之久而不愈、  
病大熱不退、日加三處、瘡語十有餘日、  
三處熱退、加清涼攻毒散ラ、初人モ外  
疮瘡涼熱ノ、痛劇方、用之ト云、已少しモモ  
熱退、カズ尋因ニ、二カラ与ラ、方存苦  
山梔子荊芥細辛地骨皮、天竺花、葛玄  
參、右七味、左ノ如ク、此七味ニ用ニ加味ハ  
膏モ一味ヲ加ウ、一服ニ人モ熱十三ト、七日ラ

主減二三服更手熱矣不加ニサメタリ乞乃

子山嵐ノ瘡久病極ノ所不レ處ニ比夜同乞シ有瘡瘻ノ瘡治テハ所セ又熱也或八

針ヲ从ニ髮際又ハ高大之穴ヨリ血ヲ取テ右ニ至ニカラ用ニ添充スモ有何レニモ危急候ノ如ク別ナルモノ缺ク於宋スバ別

候下於テ乞ラ年不レ以ニ照ス○

不隨走馬病也

唐古紅赤尤赤十二日後而面

腫全消唇口腫不消者胃熱所致

唐腫

口脣或輕土有有重者有死不春其一舌滿口白糜或紅點竹簇之輕者也唐古腫硬牙齒里爛而渺血者重者也如唇腫而腫穿鼻破頰潰喉脣肉飮食不入死俗呼走馬病一足也虛症尤者甘而謁飲与之金不換塗之或當飯連竟湯加石膏多者則用峻補之利一津得腰切外收屬唐名<sub>加子</sub>走馬病者辛而過毫之證也急宣之可如瀉血不者余不換敷塗之不

可緩其急則立涼涼攻毒飲主之

**涼血攻毒飲**

治痘毒大內伏煩躁亂

身体反涼內熱如火口氣如火

痘色紫滯鬱紅微夜無眠

此湯主之

唇舌有熱大黃二兩

荆五分

通口方大力壯

紫牛各一兩

芍七分

蟬足方去地皮

東

紅另加燈心一分煎服○傳曰血熱伏火  
內壅悶亂半是厥大便秘小便赤皆日夜啼  
噦不止者治之候大便解之後別儀

唇舌有熱○

婦人經行遇痘瘡

痘瘡心仰曰順經行之時於子午卯酉之間而  
經氣至春此大內煥逼血妄行之而也  
連竟年烏子使血澤清潔不得解痘  
得正經得正始無他變一遲則內虛痘  
必隔矣○

**白脂如粉似砂**

唇紅赤

舌白脂如粉放點烈瓶一乾炮帶  
火而出不論稀密或紫艷或紅甚他可  
知此痘毒烈火早圓之不致日後多紫  
黑一隅急用清血湯一服或大便和諸  
毒宣涼血攻毒飲主之○

紫隔便秘

唇舌赤色如火或燥裂產出三四日寒稠  
密或乾紅喘脣或紅紫而頂隔者紫隔  
也毫則轉而為黑陷也此毒火燒醫一燙血  
液故血乾涸也先用清毒治血湯若唇燥  
裂舌乾紫而生刺大便秘結小便如紅  
花汁者宜涼血攻毒飲服之後便利  
唇舌滋潤出瘡得綻鬆明潤者吉如頂  
隔根暈不活唇舌淡紅或淡白或灰紫  
者虛寒也保元溫神神所治○唇

**舌乾裂身體反凍**

唇舌紅赤白胎通明

至五六日痘色紅紫乾枯或第二佳里者無  
也毒癰血凝者多虛也血熱者難消燥渴  
不行毒壅肌肉不津潤齒過不綻鬆一則不  
能成痘一則宣清熱涼血治血清毒治血  
渴重之如唇燥舌燥裂大便秘結瘡色  
紫滯攀紅微夜無眠毒穴內佈煩渴躁  
亂身體反涼者宜涼血攻毒飲服之○涼  
**血攻毒噤戒**

唇瘡堆腫燥裂舌苔赤  
色如火中央白胎或黃黑而焦紫乾枯  
或生芒刺煩渴喘嗽咽痛寢食不寧大

小便秘結瘡色乾紅焦枯根  
暈赤此年半  
足加一絳者至二六日一取一火硝鹽者急清毒治  
血瘡色之始大便愈秘者急宜涼血攻毒飲  
養食其陰加一大便初頭硬後緩舌胎滑潤外  
瘡末影松子仁皮以虛血攻之性宜參芩內托  
散如至三七八日一降火更速解者本方去桂加酒  
妙萸芩大力子一指以之清毒治血瘡酒下瘡  
出血毒凝消不行乾紅滞色者或瘡  
色紅紫乾枯或帶黑色毒癰而血  
凝者也又不疼者無之宜此陽

紫中百味當用俱同  
麦桔各五分酒炒芩連各甘草俱同  
言耆三分生薑一片同益頬湯者去參耆老口  
加麦門冬酒炒花粉各人傳曰前十种解毒  
湯專治血熱一此方專治血毒一瘡出乾紅  
肺色紫艷焦黑里者加石膏如大便秘者  
加大豆一撮隨一水自一二三日至五日用之唇  
舌有缺○又曰出唇後便食無不痛肚腹微  
痛不止至流涕者頭痛不止者宜建  
中陽主之○十种解毒湯十方用心大半

ニ一毫ニ見テハ區別ラヌヨリセ十神解毒湯  
ハ血熱トニテラ意ニテ立テ熱ニニムラ寒スレシハ方  
血毒トニテニカ、リテ熱ニニムラ寒スレシ十神解  
毒湯ヲ用ト思フスハ先ツケ清毒活血湯、  
條トラ續は二方ヲ用ニト思フオハ十神解毒湯  
條下ラテイミイソニ續合セテ方ヲ用ズレシ  
然ラサヘニカノツキソコナイトニ有ムモタクレシ  
○疑血不感翁リ す無氣癆瘍廬則血燥而凝  
故不感運化而生瘍而痘色紅紫乾枯或黃  
焦黑者皆毒癆而血凝者也必不感翁津

毒活血湯 ○十神解毒湯  
舌脹十ニハニカ、一衣ハタ吉ニイハクガ直也。十  
神解毒舌ハ舌ノ色ヒラリニクツキリト赤、  
タリ或ハモキ者ハドグロノ紫色シナリノテ  
古ニ胎ハ十キハ治血ノ衣ハ胎ヲ生ヒ芒刺ヲ  
生ズルアモ有ヒ是等ノ白人ワケ肝心ノ如ク  
○瘡色焦里 瘡色也而紫乾枯第焦里  
者宣清毒活血湯 ○ 比條熱ニ續別  
テソラニ受ヘ痘急毒ニ備フゾシ瘡色也  
紫トモあヒ此草トニテ乾枯

乾キ枯ルト續テ抱脣ガ乾ニテツヤナキラモ  
ナデ見レバコソムト云フ多味有第焦里トハ  
モ乾枯ニ及内ニ麻ナドヲ火ニコガエテ里ノク  
ナリタル板ニワヤナシ里ノコガシ色ニナルラ焦里墨下  
ニテ清毒活血湯用ルニヒ 痘色也亦紫  
乾枯ニ集里ラ茅ヒトニラ九筋至ニ所  
心ノ目的マニ是等ノ处十种解毒湯ノ血熱  
目的清毒活血湯ノ血毒ノ目的ト別ル、此  
也意ラハテ續ぐレ〇 **舌白胎如粉** 唐紅赤  
舌白胎如粉放點一目列々乾炮茅瓦火、  
急用清毒活血湯、此之或大便秘諸毛者  
立涼血攻毒飲主之〇 **紫陷里** 陷唇舌

而出不論稀密ニ或紫艷或知紅甚、可  
氣此鳥毒烈歟曰十日後參紫里陷、  
急用清毒活血湯、此之或大便秘諸毛者  
立涼血攻毒飲主之〇 **紫陷里** 陷唇舌  
赤色也大或燥裂痘出三四日或稠密或乾  
红滞色或红紫而頂陷者、紫陷也毫則轉  
而为里陷也此毒大癰瘍也血液故血乾  
而生刺大便秘結小便如紅沉汁者宜涼  
血攻毒飲主之服之後便利唇舌滋潤出瘡

得鏡影明潤者吉如頂陷根暈不活居舌淡紅或深白或灰紫者虛也。保元溫補神所治○傳言未傳家中ト云未有初熱ヨリ起テ未ノ唐突三十而後是未傳家中ト云アヤ危唐突元未傳家中又有ニシスベカラス清毒活血涼血攻毒飲等、如キキヤラキニ秦少川時ハ后唐突ニ轉びキアラシノヨリテ療法ナスベニ是危瘡三涼系泻系シ用レハ、惟は涼系泻系耳。此桂附峻補、剷ラ用ルモ又ハ勿有桂附峻補、此系多々用レ一旦効有ルアヤモトハ過剷スル事有ガト過剷不時ハ痘熱一ラ又ヒキ起ニキツメ、此一トナルド有此又危瘡ニ桂附、如キ峻補ヲ用ヒツノコトアヨ○**血毒血肺** 唐古乾瘡或舌夬赤色如火出瘡赤紫乾枯或之者ニ紫血泡、或頭陷不一起根暈紫赤頰腫將變焦黑ニ而肺縮者、白毒血滯也急宜清毒活血湯主之○傳曰毒壅則血熱血熱則毒壅念血凝治不一行則血毒血滯古人曰一而二二而一故候重以之治舌、み難ナ又血泡ニ紫泡

相类。紫泡屬<sub>ス</sub>温宣。清涼<sub>ス</sub>血庖屬<sub>ス</sub>寒宣。  
温補不可<sub>ス</sub>極矣。○血泡ト此紫泡ヲ分ルニ  
血泡<sub>ス</sub>白カサ<sub>ス</sub>赤オ<sub>ス</sub>紫泡<sub>ス</sub>血カノスニテ  
里<sub>キ</sub>ニシケニツラクシテワケゴシ。○白胎通明居

古紅赤白胎通明五六日痘名紅此紫乾枯  
或第<sub>ニ</sub>焦里<sub>ス</sub>者熱也。毒燒血凝者氣虛也。血  
氣熱所<sub>ス</sub>燥<sub>ス</sub>不行<sub>ス</sub>毒壅<sub>ス</sub>肌肉不<sub>ス</sub>濡<sub>ス</sub>溫灼過  
不<sub>ス</sub>經鬆則不能成<sub>ス</sub>而<sub>ス</sub>體急<sub>ス</sub>宣<sub>ス</sub>清<sub>ス</sub>血涼血  
活血<sub>ス</sub>溫毒活血湯<sub>ス</sub>之如<sub>ス</sub>唇燥熱大便秘結  
瘡色<sub>ス</sub>紫滌林馨紅微夜無眠毒火肉紅頬<sub>ス</sub>

消躁亂身體反<sub>ス</sub>涼<sub>ス</sub>者宣<sub>ス</sub>涼血攻毒飲<sub>ス</sub>之<sub>ス</sub>  
頬燥<sub>ス</sub>而<sub>ス</sub>身體反<sub>ス</sub>涼<sub>ス</sub>者八傷家<sub>ス</sub>成<sub>ス</sub>テハ  
虛頬虛躁<sub>ス</sub>乞波<sub>ス</sub>メ死<sub>ス</sub>モ<sub>ス</sub>一泡瘡<sub>ス</sub>有<sub>ス</sub>ハ  
乞<sub>ス</sub>ハ<sub>ス</sub>千<sub>ス</sub>アフ<sub>ス</sub>ベカラズ虛頬虛躁<sub>ス</sub>別ハ

見<sub>ス</sub>タリ。

牛足如絳唇瘡堆腫

堆腫燥烈裂古<sub>ス</sub>尖赤色如<sub>ス</sub>火中央白胎或  
黃里<sub>ス</sub>而生<sub>ス</sub>紫乾枯或<sub>ス</sub>生<sub>ス</sub>芒刺<sub>ス</sub>頬<sub>ス</sub>  
嚙嗽咽痛寢食不<sub>ス</sub>寧<sub>ス</sub>大小便秘結<sub>ス</sub>瘡色  
乾紅焦枯根暈赤紫牛足如絳者至<sub>ス</sub>六  
日<sub>ス</sub>熱大猶<sub>ス</sub>瘡<sub>ス</sub>者急<sub>ス</sub>清毒活血湯<sub>ス</sub>之<sub>ス</sub>如<sub>ス</sub>大

便愈。極有寒氣，宜涼血攻毒飲。食甚，陰如  
大便初頭硬，後緩，舌胎滑潤，外瘡未發，內  
變以虛，勿攻，之任宣參，桂內托散。始至二十七八日，  
餘寒未解者，本方去桂，加酒妙，重芩大劫，  
子活之。  
**瘡色乾紅者痒**

尼古紅赤或

乾燥者，宜熱米水，解瘡色乾紅紫赤根  
暉，撤參，至二十六七日，不獨化，作以痒者，宜  
清毒活血湯。主之如唇燥裂，舌乾紅而大便硬  
者，加酒妙，大安，微下之。古人曰：無便，無下之。  
不過六日，餘微，之。或人問曰：大便秘者，必

清涼攻毒，如者，下深下，取其性，使之活血  
湯，二汤妙，大安，以微下，下，而利，謂  
如何。大便秘，之攻毒飲，如者，下大，  
是下，下，二三日，四五日，而，之，モハヤ  
トセ，日，ナリテ，ハ，大，キアラキ，アシ、アニ  
ヤハリ活血湯，二汤妙，大安，加，微，之，モハヤ  
下，スハ，是痘，二，瘡，日，敷，以，下，利，後，急，ラ，  
而，厚，破，食，身，熱，煩，渴，除，毒，大，盛，者，此，陽，  
之，荆通車，芥，五，方，竟，大，力，柴，膏，鵝，膏。

抱日既渴甘鱠

生萬毛

同五犬便和者

加

渴大黃味○傳曰瘦為色充滿而實者  
者屬後之福知多屬實膿為不滿平陷  
者屬後之福知多屬空此古人之至論也如  
鳥毒殊盡解在藏者至十二小或十  
五日後而多死如在肌肉間一渾肴，癰腫  
而得生如在皮肉間一者漸久則而得生此  
此湯余毒尚附於肌肉皮毛間一飲已棄未  
盡而身熱口渴二便和緩者治之復利也  
○唇舌有二缺○痘衣充滿大空不者八屬重  
後一宿衣多空虛二屬不空口氣血津液以當  
う表二空二內室虛之有屬後患フル處  
一諸衣多空虛二虛或ハ虛空モラ頬フ  
又膿為不滿王陽氏者屬後諸衣多空虛  
空トノ膿不以滿毒内体メ外ニアテスア属後  
諸衣御寒ノ衣ラ患の古虫ニ曰虛ト云ス  
元氣ノ虛寒ト云ス邪氣ト云スモケス  
○今此ニ云ハ十二月十五ニカギリテ降毒  
え患ハテ死スルト有レバ又一種餘毒癰瘍疾半  
隔休スル者一年二年或五年と年ノ

タキラ碰テ降毒心肺セメ虚勞另喫ト處テ  
 死ル者右痘後餘瘡内膜多不見  
 三ニ屬ニウノ者生ツキ多座ハ庵瘡ラ  
 頭尾被ヒテ反タル極ニ見ニシモ寛ハ後  
 東ニ至ニ多量患ラ生じ或ハ癰痛トナリ  
 或白知トナリ或ハ虛勞外咳トナリ或  
 ハ三毛明腫毒トナリ或ハ吼痰トナリモ外程ニ  
 之奇毒癖病ラ患ニ死ル者皆痘後  
 餘毒ヨリ多スル者又多ニ石臼治癒法一  
 角犀角羚羊角或蝮蛇ノ類斯ニテリヤカ  
 ナド用テ千��麻ニタリアル久降毒ラ  
 療居テ多痘ニ幸アテ有ギキヨシヒノ全  
 多くヒ禍體多細十九筋麻疹毒勞  
 一例ニ於テ洋ニ是ラ年ズルナハ此ニモ大既  
 晴メ死ス併セリルゴ○**痘後治瘡傳**曰痘後  
 徒体浮腫日久不復赤紫或不利先用  
 胃苓湯<sup>ノ</sup>不許則服<sup>ル</sup>大便泄<sup>ト</sup>食<sup>ト</sup>口渴<sup>ト</sup>袁大  
 連麪飲<sup>ト</sup>加大豆<sup>ノ</sup>或之○唇舌有<sup>レ</sup>疾○膚瘡  
 不癰九日十日期<sup>ト</sup>而愈<sup>ト</sup>口渴大便秘小便  
 流唇舌赤紫者大連麦飯色之○**十二**

日後參加十二三日後參加此除毒方

肌肉骨髓之間。欲流養之癰膿之象也。急宜大連翫飲。主之。如便祕者。加酒炒大連。十日

除毒之法

寫舌紅赤或唇乾脣舌尖如芒。膿

突結而厚。實身熱煩渴。身體胸腹牛足頭面俱熱。大便秘結。小便赤澁。此除毒大廈。如十三日後有此諸症者。急宜清涼解毒。遲則為病。後又參加。大連翫飲。主之。始則為秘。者潤炒大黃不可。虧。如二加居還元後或二加居。一年半後。忽熱遍身。大無居。晨

古白胎如粉。口渴大小便秘。喘。驚。毒。筋。脊。心。痘。也。或半足四肢頭項胸背。有二度。熱更甚。者一即。痘之結聚處也。此在體內。不滿而結。加浮薄者。速收速。者。多有之。急宣大連翫飲。加酒炒大黃。服之。如熱毒不解。十二日後。久。諸症。空。此湯。○。痘後數十日。再

奔瘡病

唇舌紅赤或白胎如粉者。痘後經數十日。餘毒未除者。勿然忙熱。急。疹。或。痘。每。或。養。班。或。奔。舌。瘡。病。者。多。宜。大。連。翫。多。空。之。○。痘後浮腫。疊囊大。唇燥舌苦。多。者。

瘡後數日後浮腫囊大如鉢毒高皮膚也大連羹飲加丁大腹皮苜陳酒之如大使泄一二行數日身體腫滿微食糲朴丸者實病也大連羹飲加酒微大黃利之如唇舌淡紅者用冬湯加滑石酒之如唇舌淡白者用芩湯加高陸附子一錢之○走了一病一

五病二大連羹飲以茶匙酒之若之効十キット  
羹飯連羹飲空口重ル詳十人半羹飯連  
羹飲ノ方後ニ口傳有免ノ老スノ○十  
二日後ノ更利ノ

**小連羹飲**

之系中微解毒

十日後於

**神脾湯**

之系中微解毒

收屬諸病加諸病之証利也木物佐膏酒

防荆

之味甘減半右水煎溫服之

虛者加人參

○傳曰十日後瘡色順裏內底無故者性  
可發向未嘗毒遷變如無余底一者先之定  
此湯一神脾湯後利小便解余毒不傷中和  
之妙方也收屬諸病之後無諸病者始終  
宜此湯始作鳥毒者又可行割儀一唇古  
有二種○加味連羹飲

瘡收結後餘毒却火速

盡解

之虛者則宜此湯主之妙方

大毒通荆芥名本大力蟬退甘草等本古

久氣不揚時溫服傳曰痘症中間如不順而發色不屬到三十日後一劑此得生年炎

邪毒未盡解衣虛者皆以宣暑之品小連

毒飲平利也治者酌宜施酒居古有

小連毒飲也治加味連毒飲大連毒飲三

方評大連毒飲又次古者輕辛味毒

方加味連毒飲又次古者輕辛味毒

方小連毒飲如味連毒飲君王輕辛味毒

方居古方外子午之毒飲小連毒飲

差照三方大割芝四味橘子

方但十日之後補脾清溫加瘦

瘡瘍瘻定法此是瘦瘍毛首尾能定

法通小瘦瘍用牛筋草本文教、

久氣、コサノ加減按引、余之處にてじり各

者又松別、すこし差照三方用之ざ

是三方、評之○膏解溼温

二日調小兒脾胃利水以收結為主、連

毒飲主之○餘毒治方此痘係危險氣

血虛多服補利漸者濃色而將收屬

坐者當於補下利中加涼藥者謂之醫去  
補而竟喚冷氣更用下利素急速醫  
是其速斃也至虛氣後虛氣反內攻此必  
然之理也又已然之驗也又十日後唇舌淡  
白者為虛氣不可用辛熱之劑多之氣  
則氣血泄外神氣因倦精多有寒止  
致七十日用補中益氣之唇舌淡固有者  
宜小連翫飲解除毒之妙刺也加除毒  
甚灰蘆者加味連翫飲之○餘壽治方  
唇舌滋潤可潔淨而安固有病出已者  
亦可

紅二物厚著蟬色微之無自氣而生此症  
子成熟之氣也知氣自內而出二十日久  
吉兆候如魚有微毒未盡解也身體發  
輕快精神清爽寢食無故睡卧安常大小  
便清利者小連翫飲主之始唇舌紅赤或唇  
乾燥舌胎來除去一遍身時壯氣正全而醫不  
氣薄而目瞳未消半足根目暉第大口濃  
膿不鮮乾枯者加味連翫飲主之

唇砂益之散治裏熱大盛小便赤而元毒  
唇砂益之散治裏熱大盛小便赤而元毒

下三里○萬氏曰治痘熱毒大瘡、痘言引

飲本方去辰砂カミ龍膽リョウゼン各用之敷

○内实引食

辰砂赤燥裂舌三圍者

如火中央白胎如積粉或出瘡稠密紫赤乾枯欲變焦紫大熱也亂氣上盛煩渴引飲睡卧不安或目同谵語如見鬼怪二夜和結寒腹脹不能食者內实初至二日用連毫升湯或辰砂益之散或退火

生丹之委其一不解如白胎变而生中

央乾黑寒

紫黑而色刺者急宜清涼

攻毒解或汗神解毒湯

石膏大黃大清

之解之始利後身熱漸退唇舌淡紅者

生不則六日九日死

○毒壅血熱

辰砂裂

舌白胎如積粉三圓紅赤身熱

口渴出瘡

焦此紫乾紅或紫

此紫血癥也起者毒

雍塞熱也如三四日大便秘結小便毒先者

急解之十神解毒湯若毫大黃一派以之取者

薰散辰砂益之敷二便快通

急行之別

儀○辰砂益之敷角白朮口渴小

便亦片土一四二月的云行經大抵不實

要也。夜はニツノ目的十ヶハニカラ用エ  
カラズ口渴ハ空飮ラ好ニ大渴ニル乞渴模様  
又小便亦止ハキリテ飲ヌル飲ヌルカラヨリハ  
カサトラツモリマワセテ見ルニシカサヨリハ  
小便ノカサ大キニタクニ小便ガ無キニキ  
味有テ無自是キ秀ガスル者ニ免ム濃  
渴リテ通ズ者ハ渴ルトドロリト渴ルト  
ラあはト云フニは赤はか則ニ壹之教正以  
目的ノ口渴ナシ仁益之教ラ本方ノ外  
無よズ。

寧

以資納穀渴

治下脅脛脚筋肥氣血

唇口渴

列脣

口渴渴

治下脅脛脚筋肥氣血

唇口渴

列脣

後身猶壯體燥而燥熱而不思食者此渴主  
乞膏連失牡通多甘生母大力  
查荆葉者加大豆外加燈心草並服○此  
方ヲ用ル目的ハ唇口燥烈ト云ガ目的シテ  
因ハ節血犯胃ト云ガ因也胃ヲ犯スガ左ニ  
唇口が燥烈至ニ唇口が燥烈至ニ本文ニ云フ  
國端口中ガ要目有テ渴充ラテマニ是又

逐寒散 搗者走氣也此湯一破寒之而寒退  
五方或於本方同以熱湯振出之熟醫

之又腹汗兼而不可而先之宜之逐寒之甚瘦

則放之自止

五苓散

治小便不利口渴者○

瀆爛不收十日後瀆爛不收者者類倒  
蘿生用建中湯治之始或因渴飲令過多  
以致下痢解因溫風上肌肉不收者內宜五  
苓散如或因食虛不能者入參白朮散去

葛根加肉桂

四頭溫涼散

自利水氣主

四五日同大便秘不通者隨服之

○

大便微利之法

唇舌紅潤口中有和

而鼻無者乃舌燥口燥唇裂舌上白胎亦

生芒刺二便秘者

裹毒多急之速解散

如二三日大便秘結煩躁者同前急者微

利之西順涼涼飲之○上方下利輕者

重者上方涼充之服之更之清涼攻毒散如  
重下利行之二三日自數二十日療

佐ナキラクレニスル付ハニキ害ハカルゴガラズ

○唇舌燥列衣

唇舌燥列衣

板

齒

乾燥生血絲著陽明之雍也。擇自  
更灰褐胎氣下之如利後唇舌燥列衣  
生不則死。○是等之多取下數  
竹炭。輕刷。キラクレニスル。以知  
子也。是以大黃芒硝。大黃。芒硝。以  
ナラヌ。而。四順清涼飲。輕刷。及。水  
竹炭。輕刷。キラクレニスル。後。也  
此不。療。而。解。其。遠。カ。ラ。不。亦。本。後。も  
是。白胎。是。實胎。是。灰胎。是。褐胎。是。白  
胎。ノ。口。刷。ル。ニ。及。バ。ス。何。ニ。セ。ヨ。右。ハ  
底。ラ。見。サ。ハ。急。ニ。是。ラ。下。セ。ト。す。ハ。リ。又。ラ。見  
ル。時。ハ。急。ニ。下。ス。ア。ハ。イ。け。處。ニ。テ。知。ル。ジ。下。ス。ニ。モ  
又。輕。ミ。エ。ニ。差。別。す。ノ。外。有。シ。十。ヤ。ヒ。リ。數  
ニ。カ。、リ。テ。ハ。イ。カ。ヌ。ニ。ム。ノ。○涼膈散

生。白。胎。是。暮。舌。燒。者。有。二。種。無。形。衣。而。  
同。涼。腹。氣。喘。聲。而。唇。燥。列。衣。毛。焦。皮。燥。  
肌。膚。大。極。二。便。秘。滑。身。反。而。渴。多。不。者。  
一。多。不。双。解。レ。之。若。失。下。及。竟。三。升。教。三。日。死。

矣。而無者、臘下アラシタ以胎減アラシタ、度アラシタ不アラシタ拘アラシタ在アラシタ。初アラシタ膏アラシタ之說、此百中二三不アラシタ執アラシタ以アラシタ常アラシタ。急アラシタ下アラシタ涼膈散アラシタ、更アラシタ連解毒湯アラシタ食アラシタ白虎湯アラシタ或清涼攻毒飲アラシタ之類アラシタ。唐舌溫アラシタ固有者、虽アラシタ見アラシタ急アラシタ不アラシタ功アラシタ已アラシタ、と下アラシタ殺アラシタ人アラシタ。唐舌溫アラシタ丸者、下アラシタスアラシタギアラシタ衣アラシタトアラシタ云アラシタ、凡アラシタ下アラシタ元アラシタ病アラシタ必アラシタスアラシタ唐アラシタトアラシタ吉アラシタトアラシタ神アラシタ見アラシタリアラシタ、と唐舌アラシタトアラシタニアラシタサイアラシタナアラシタハアラシタ決アラシタキアラシタアラシアラシタ下アラシタスアラシタキアラシタ不アラシタ知アラシタレアラシタシアラシタノアラシタ唐舌アラシタニアラシタサイアラシタ有アラシタハアラシタモアラシタ時アラシタ也アラシタ又アラシタ行アラシタ下アラシタ剣アラシタ薙アラシタ不アラシタ是アラシタ下アラシタ剣アラシタ、用アラシタ也アラシタアラシアラシタ。

目的アラシタ

## 〔一百之後目疾〕

燥アラシタ或アラシタ白脂アラシタ通明者アラシタ十二石後アラシタ之アラシタ同アラシタ疾アラシタ者アラシタ毒アラシタ田肝經アラシタ則アラシタ之アラシタ月酸アラシタ口蓋アラシタ自アラシタ貯藏アラシタ而連アラシタ子標アラシタ治法化宜アラシタ峻アラシタ涼アラシタ涼膈散アラシタ之アラシタ外アラシタ忘アラシタ革アラシタ損アラシタ瞳睛アラシタ作アラシタ色アラシタ目アラシタ腎アラシタ之アラシタ又アラシタ曰アラシタ痘後向アラシタ睛アラシタ則アラシタ開アラシタ兩アラシタ目アラシタ不アラシタ赤アラシタ向アラシタ則アラシタ閉アラシタ、又アラシタ石流アラシタ淚アラシタ此アラシタ肝經アラシタ穴アラシタ未アラシタ退アラシタ也アラシタ此アラシタ曰アラシタ高明涼肝明目散アラシタ之アラシタ總アラシタ生アラシタ月殿アラシタ者アラシタ用アラシタ涼膈散アラシタ堅膜アラシタ退アラシタ者アラシタ之アラシタ防風湯アラシタ加アラシタ木賦アラシタ石决アラシタ以アラシタ活アラシタ之アラシタ或アラシタ兜アラシタ畫アラシタ可アラシタ也アラシタ○治痘後十五日後アラシタ余毒留滞アラシタ肝經アラシタ

生二蟲膜、或目赤痛者○石膏加柴、竹  
有○玄連、玄橘、玄芩、大黃、山梔、芫  
破、連翹、芍、甘○甘艸子、量口傳  
名、食後服○傳曰：出痘、稍忘、而六日  
已後眼不封者十二日後眼疾、膏眼胞、之  
毒不化者也。至十二日用眼者、至十  
六七日而目闭不能開者、必目中絲不早  
固、則為瘧人意、投大連翹飲、加石膏、大  
黃、玄芩之大便通後如不能開者以涼膈散、  
追泻肝經之火毒、大便利、則能開眼也。

四十七

必包用、蓬萊、福去大禁、之○舊方有之。  
以涼膈散、一家、秘方、世、通例、涼膈散、  
服之○此方、用二十、十、大連翹、飲、十、食、之

**清神散、少湯**

**治**

**痘**

**後**

**擣**

**此**

**理**

**解**

菜對者、可以所若、連、桑、止、者、死、也、通  
麥門、部、連、施、甘、右、灯、心、羊、角、無、研、辰、砂、末、  
調、服、大、便、秘、者、加、大、黃、自、利、加、人、參、○  
周利下  
有字有字

白、或、虛、冷、者、十、日、後、齊、  
一、驚、擣、一、月、用、  
一、魏、而、兼、  
一、吐、泻、時、吊、白、時、角、弓、反、張、四肢、

**痘後驚擣**

**治**

**痘**

**後**

**擣**

**此**

四六

冷葉<sup>シキ</sup>也。諸書云莫<sup>ハ</sup>枚<sup>アハ</sup>如<sup>ク</sup>瘧<sup>アハ</sup>內<sup>ハ</sup>甚<sup>シ</sup>小  
便<sup>ハ</sup>閉<sup>ス</sup>。法家<sup>ハ</sup>素<sup>ヨリ</sup>有<sup>ハ</sup>致驚<sup>ス</sup>疾<sup>ハ</sup>。又屬<sup>レ</sup>可<sup>レ</sup>居<sup>ス</sup>  
赤龍丹<sup>ハ</sup>鎮驚<sup>ス</sup>。丸安神丸<sup>ハ</sup>俱<sup>レ</sup>可<sup>レ</sup>服<sup>ス</sup>。鈎藤湯<sup>ハ</sup>  
加減<sup>シ</sup>可<sup>レ</sup>之<sup>ハ</sup>。或<sup>ハ</sup>宜<sup>シ</sup>清神散<sup>ハ</sup>。渴<sup>ハ</sup>如<sup>ク</sup>旱<sup>ス</sup>對<sup>レ</sup>之<sup>ハ</sup>。  
者<sup>ハ</sup>可<sup>レ</sup>居<sup>ス</sup>。若<sup>ハ</sup>連<sup>キ</sup>不<sup>レ</sup>已<sup>ス</sup>者<sup>ハ</sup>死<sup>ム</sup>也。白虎湯<sup>ハ</sup>

至三十一十二日

大渴引<sup>レ</sup>飲

者<sup>ハ</sup>心移<sup>ス</sup>。熱<sup>ハ</sup>於<sup>ク</sup>肺

傳<sup>テ</sup>火

膈<sup>ハ</sup>消<sup>ス</sup>。治在<sup>ハ</sup>上焦<sup>ハ</sup>。本方<sup>ハ</sup>加<sup>テ</sup>玄參<sup>ヲ</sup>

治<sup>ス</sup>之<sup>ヲ</sup>。

初熱<sup>ハ</sup>緩<sup>ハ</sup>也

一熱<sup>ハ</sup>而生<sup>ス</sup>白脂<sup>ヲ</sup>。暑<sup>ハ</sup>舌<sup>ハ</sup>亢<sup>ス</sup>。者<sup>ハ</sup>心移<sup>ス</sup>。

內<sup>ハ</sup>積<sup>ハ</sup>熱<sup>形<sup>ハ</sup></sup>。外<sup>ハ</sup>目<sup>浮</sup>腫<sup>ニ</sup>。喉<sup>ノ</sup>鳴<sup>聲</sup>哑<sup>ニ</sup>。舌<sup>ハ</sup>燥<sup>ニ</sup>。裂<sup>ハ</sup>毛<sup>焦<sup>ニ</sup></sup>。皮<sup>肉</sup>大<sup>熱</sup>。二便<sup>ハ</sup>渴<sup>ニ</sup>。胸<sup>身</sup>及<sup>ハ</sup>寒<sup>ニ</sup>。元<sup>ハ</sup>

春<sup>ハ</sup>一熱<sup>ハ</sup>。双<sup>ハ</sup>解<sup>ス</sup>。若<sup>ハ</sup>失<sup>ハ</sup>下<sup>ハ</sup>及<sup>テ</sup>竟<sup>ニ</sup>于<sup>ク</sup>汗<sup>散<sup>ス</sup></sup>。一三日<sup>ハ</sup>

此<sup>ハ</sup>矣。要<sup>ハ</sup>熱<sup>流<sup>ス</sup></sup>者<sup>ハ</sup>單<sup>ハ</sup>。下<sup>ハ</sup>火<sup>ハ</sup>胎<sup>減<sup>ス</sup></sup>。一度<sup>ハ</sup>不可<sup>レ</sup>補<sup>ハ</sup>。而<sup>ハ</sup>在<sup>ハ</sup>初高<sup>ニ</sup>。亦<sup>ハ</sup>之<sup>ヲ</sup>說<sup>ス</sup>。此<sup>ハ</sup>百中<sup>ハ</sup>一二不可<sup>レ</sup>執<sup>ハ</sup>。以<sup>テ</sup>爲<sup>ハ</sup>

常<sup>ニ</sup>急<sup>ニ</sup>。宜<sup>ニ</sup>涼膈散<sup>ハ</sup>。方<sup>ハ</sup>連<sup>解毒湯<sup>ハ</sup></sup>。合<sup>ハ</sup>白虎

湯<sup>ハ</sup>。或<sup>ハ</sup>清涼攻毒散<sup>ハ</sup>之<sup>類</sup>。居<sup>ハ</sup>舌<sup>ハ</sup>滋<sup>潤<sup>ス</sup></sup>。者<sup>ハ</sup>舌<sup>ハ</sup>干<sup>ス</sup>。

口<sup>ハ</sup>噤<sup>シ</sup>。瘡<sup>ハ</sup>緩<sup>ハ</sup>。

二肺<sup>ハ</sup>脇<sup>ハ</sup>。痛<sup>者</sup>耳聰<sup>ハ</sup>。曰九丸

一生<sup>ハ</sup>也。

鈎紅密<sup>ハ</sup>行<sup>ハ</sup>諒<sup>ハ</sup>。加童連桂

善<sup>ハ</sup>右各<sup>ハ</sup>多<sup>ハ</sup>久<sup>ハ</sup>不<sup>レ</sup>拘<sup>ハ</sup>時<sup>ハ</sup>服<sup>ス</sup>。傳<sup>ハ</sup>痘後<sup>ハ</sup>

癰<sup>ハ</sup>散<sup>ハ</sup>。搗<sup>ハ</sup>者<sup>ハ</sup>多<sup>ハ</sup>服<sup>ス</sup>。急<sup>ニ</sup>致<sup>ス</sup>。而<sup>ハ</sup>慢<sup>ニ</sup>致<sup>ス</sup>。陰<sup>ニ</sup>癰<sup>ハ</sup>也。

四九

故先人謂之九死無一生。虽然，痘輕，故不輕者亦有治者，驗可貞耳。○溫口補脾陽方。白木年葛玄，人參白茯白豆蔻乾姜砂仁官桂陳皮甘草白芍。○溫服數次一服。甘露飲

五

溫服。○見小兒方數次一服。

甘露飲

傳曰：治

虛弱口瘡，要訣曰治下。○瘡疹已癒後余極溫壯，遂龈齦腫牙疼不能嚼，饑而不止，欲食，云云。○周元勳本方無此味。○閔葛蛇苦散。杞子解芩甘，亦益。○傳曰：痘後有五險，可不知。一日疹二日癰三日目疾四日瘡馬瘍，鰥瘡是皆不早圖，則延之過明白也。○十二日後瘡腫者，走馬瘍也。○唇舌紅赤者十二日後而腫全消，唇得利，腫不復者，胃熱所致，必氣口瘡，或輕者有之，重者有之，元者有之，久者牙齦黑爛潰，血者，重者也如瘡，膿而腫穿，白朮破爛潰，喉腐肉，飲食不能下，吞咽，味之，走馬瘍是也。虛弱者，甘露飲，少之，金不換，愈之，或當取庫走馬湯加石膏大，宜

五十一

換：

可不知。一日疹二日癰三日目疾四日瘡馬瘍，鰥瘡是皆不早圖，則延之過明白也。○十二日後瘡腫者，走馬瘍也。○唇舌紅赤者十二日後而腫全消，唇得利，腫不復者，胃熱所致，必氣口瘡，或輕者有之，重者有之，元者有之，久者牙齦黑爛潰，血者，重者也如瘡，膿而腫穿，白朮破爛潰，喉腐肉，飲食不能下，吞咽，味之，走馬瘍是也。虛弱者，甘露飲，少之，金不換，愈之，或當取庫走馬湯加石膏大，宜

犀角酒アシカジロノスヒ之法曰痘瘡至アリ而瘡癰也色  
則用之峻補之剝之陳得體助氣收瘻瘍  
而瘡者馬瘻者辛魚過甚之證也多宣  
氣者如灑血者全不換散之不可後  
甚キナリ則宜清涼攻毒飲一更イチモル之

**當歸連翹飲**

治痘瘡後唇外口牛牙齦灑

血身細者膏芳草連翹防荊芷羌芩  
梔殼甘草生方細淮半或加石膏大黃厚朴角桂  
又散也或涼血攻毒飲之考傳曰痘瘡  
收瘻十一二部而小便清利而腫瘻消者

痘之常候也然他處腫消而上唇揭不復  
腫大如嘴者此謂之馬瘻之兆也多是大  
連翹飲治之如不能則當歸連翹飲  
清涼攻毒飲可收也舊古有二法  
一者兩角牛大庫連翹飲者之二

五二

**涼肝明目散**

痘後目明者

主之青膽蜜蒙丸芎柴防連ヨウセイ各等  
分雄猪肝湯並服先蜜丸治痘瘡者  
入眼兜囊敷之未可練蜜ヨウミ水酒ヨウジ  
送下アゲ三五十丸用蟬退水通甘竹煎一食

後頓服清上防風湯

治下瘧，加偏身寒

瘧而頭面癪散陷入肉中日久不脫者或目瘡者失以涼膈散下之數剂退未全愈者生此湯忌食腥酒酲辛香之物防荊皮連梔芩芍甘桔壳甘草剉一劑並食後服竹瀝一小鐘日服無瀝亦淡竹子起殿臍膜者加木附石决明服之以豕突薰薰用川芎又可

宜不燒

治牙

瘧血者人半白三青鹽梅七个燒枯各二兩白芍燒灰五倍子細辛胡連各一兩雄黃銅錦各三分

右丸細末吹之○傳曰瘧中瘧後口角唇內口中牙齦腫大而潰血或日久不愈者上唇穿牙孔竇孔一處爛流血者是其病也此系以胭脂和之掌掌之則效也

五六

回聖膏

七日内外有疔者其疔頭割破者取血點之有根珍陳五分紫莖燒灰髮灰各一施黄八分紫根一兩冰片三分右共一錢細末一兩脂調點本方無根者紫根一錢加之紫根用法有二種○黑瘡膏唇舌紅赤一

或紫赤或燥乾或舌中央乾紅者七八日行矣

黑瘡膏

將足而棄之者黑瘡。○治之亦瘡。相類。詳。二十五家。外傷。紫赤泡。或紫大紫。泡。味曾解毒者。乃以神功散。加硫黃。芩連。大黃。治之。或清毒活血湯可。更考。如。年。

五十七

明牛蜀。破升頭。四重膏。掌之。放毒散。

雄黃。研細。胭脂濃浸。調點。疔。計和之。疔頭。紅活也。○傳曰。易生疔。頭。口。肺。疔。紅活。又見。辛諸。夷。敗羊散。疔瘡。抓破。作烟。不乾。者。以此。掩之。疔。

夷

鍼曰。經年。蓋屋。草不折。多少。燒脆。之末。捲。薑。此。年鍼。過。霜。雪。者。其性。

甚涼。故用。此。制。少。家曰。元散。薑。麥粉。亦小豆。米。象牙粉。足。指。膿。手。山。散。而。淋。隔。者。捲。白龍散。治。細。瘡。及。抓。破。者。用。下。乾。黃。年。未。在。風。雨。路。中。一。多。久。者。上。少。般。皮。灰。灰。中。白。者。少。朱。豆。綠。囊。裏。於。二。瘡。上。一。捲。之。綿。散。治。瘡。後。痈。蝕。瘡。初。末。每。用。乾。點。府。鵠。瘡。口。內。胡。藥。酒。方。

山出蛾綿。不。白。松。入。爾。內。炭。共。研。極。細。末。每。用。乾。點。府。鵠。瘡。口。內。胡。藥。酒。方。

痘瘡已癰未發者噴之立出。胡荽三兩細切，以酒三大鐘煎之用紙密封不令更出。候冷去滓後頂至頸領微塗之更噴背脅胸腹及兩脚皆遍。再用漏房門戶遍洒之。**辟寒穢之方** 施病人房內或千病室戶外一串以荆芥大束、矮豆、杏烟薰于室內。則一切避寒氣寒穢矣。正防之捨廢祁方。**宜速地黃湯** 痘收後服三七日而大渴者服之。肺膈也此湯五味之連地黃、芍藥、甘草、麥門冬。各事五味去梗當參去芦。苟有寒熱者。

右剉薑一片枣一枚淡竹葉十片水二盞煎去滓溫服。唇舌有破。**四冬解毒湯** 治痘瘡初起大局無膿疮少榮潤拭之清和防。餘毒竊去。此湯金銀花、土貝母、甘菊、荆芥穗、牛蒡子、紅花、甘草連皮地丁外加胡桃。

烹

**汪氏解毒飲** 十一日十二方。每服一盞。不應反加麻子仁半錢一盞。服之歸。多參。杏仁。荳蔻。大丁。砂研。防風。甘草。右外或搗者。用生熟芩。更連錢或銀紫草。或

**利咽解毒湯**

治<sup>ス</sup>瘡中首尾咽喉腫痛者

生薑一尾同並<sup>シ</sup>溫服○家方赤龍丹 治<sup>ス</sup>瘡者

後效<sup>ス</sup>一搗<sup>ス</sup>醒解<sup>ス</sup>鼻毒之妙方也多<sup>シ</sup>桔

茱萸一兩 龍膽<sup>ス</sup>橘瓣<sup>ス</sup>金石<sup>ス</sup>浸<sup>ス</sup>鐵末

年方<sup>ス</sup> 玄犀角<sup>二</sup>雄丹<sup>一</sup>麝香<sup>一</sup>木香<sup>二</sup>杏仁<sup>一</sup>赤

金箔<sup>三</sup>枝銀箔<sup>三</sup>枝右已<sup>ト</sup>十六品<sup>ム</sup>細末<sup>ト</sup>以<sup>テ</sup>丁

白蜜<sup>一</sup>煉金或<sup>ハ</sup>蜜<sup>ハ</sup>和<sup>シ</sup>用<sup>ヒ</sup>甘桔湯

治<sup>ス</sup>瘡瘍首尾咽喉一痛<sup>ツ</sup>首二步桔<sup>一</sup>步加<sup>テ</sup>廣

妙大丸子<sup>東ラ</sup>外<sup>ス</sup>本末<sup>ス</sup>外不<sup>ス</sup>時兼服<sup>ス</sup>之妙

外而效<sup>ス</sup>一搗<sup>ス</sup>桔<sup>ス</sup>燥<sup>ス</sup>者<sup>上</sup>○辰舌<sup>ス</sup>右<sup>ス</sup>缺<sup>ス</sup>防<sup>テ</sup>荆

蟬桔<sup>小</sup>弓<sup>各</sup>半<sup>弓</sup>西<sup>ス</sup>升<sup>ス</sup>各<sup>二</sup>年<sup>ス</sup>火<sup>ス</sup>子<sup>ス</sup>竟<sup>ス</sup>之

赤肉<sup>合</sup>可<sup>三</sup>生薑<sup>一</sup>尾同並<sup>シ</sup>溫服○傳曰

如<sup>ス</sup>治<sup>ス</sup>內毒未<sup>ス</sup>外<sup>ス</sup>外<sup>ス</sup>風邪<sup>ス</sup>所<sup>レ</sup>束<sup>ス</sup>口<sup>ス</sup>守<sup>ス</sup>滯<sup>ス</sup>又<sup>ス</sup>

符<sup>ス</sup>玉<sup>ス</sup>而<sup>ス</sup>桔<sup>ス</sup>燥<sup>ス</sup>致<sup>ス</sup>一搗<sup>ス</sup>者<sup>ス</sup>之<sup>ス</sup>解<sup>ス</sup>散<sup>ス</sup>之<sup>ス</sup>其<sup>ス</sup>連<sup>ス</sup>加<sup>テ</sup>差<sup>ス</sup>之<sup>ス</sup>之<sup>ス</sup>退<sup>ス</sup>火<sup>ス</sup>生<sup>ス</sup>丹<sup>ス</sup>治<sup>ス</sup>瘡中

如<sup>ス</sup>每<sup>ス</sup>神<sup>ス</sup>方<sup>ス</sup>也<sup>ス</sup>原本<sup>ス</sup>治<sup>ス</sup>也<sup>ス</sup>血<sup>ス</sup>熱<sup>ス</sup>桔<sup>ス</sup>燥<sup>ス</sup>火<sup>ス</sup>溫<sup>ス</sup>一<sup>ス</sup>辰<sup>ス</sup>破<sup>ス</sup>永<sup>ス</sup>火<sup>ス</sup>之<sup>ス</sup>重

苦<sup>ス</sup>心<sup>ス</sup>之<sup>ス</sup>銅<sup>ス</sup>車<sup>ス</sup>冷<sup>ス</sup>之<sup>ス</sup>調<sup>ス</sup>一<sup>ス</sup>火<sup>ス</sup>服<sup>ス</sup>得<sup>ス</sup>之<sup>ス</sup>睡<sup>ス</sup>久<sup>ス</sup>時<sup>ス</sup>邪

寧<sup>ス</sup>之<sup>ス</sup>安<sup>ス</sup>之<sup>ス</sup>痘轉<sup>ス</sup>紅活<sup>ス</sup>敗毒和中散

耳以<sup>テ</sup>氏

曰斬汗之後或身無不退而煩躁者有之更峻攻姑可待其熟而安煩躁渴而安者用吸毒和中散酒以之煮去之年膏研碎酒妙速古陳枳殼砂防荆各五分桔皮四分酒七分大便紫山酒治頭去小弓各三升甘草三兩八分大便有殊頭足酒和洗者加酒妙大黃二分微利之有殊不和者血加服此名嘯頸凹解而止血服龍井共產出外則中印安○活幼曰若一痘瘡半發後所用解毒藥多素皆因毒穴蟬之血而用又二血者以涼血活絡者是以玄芩苦蘆山梔子黃柏每粉大七分

烹毒未必不用酒拌溫妙燥大丸子妙者研碎生白子生地紅花紫草牡丹地骨皮素勿以酒臨時洗用此要法也○又曰取毒者甘中黃耆白朮俱生用虛家者甘山藥熟煮者耆蜜妙白朮酒妙宣矣○傳曰解毒者則諸品生用神益不則諸品妙熟用又芩連黃芩茶性引而以始終折立陽氣之後之害者立為山施又大丸五呂牽宜酒妙如蜜涼則芩茶性引而以始終折立陽氣之後之害者立玄參升麻湯治下虛火之參芩茶班者有玄升葛甘人防割大力名之方水氣並溫服有成二麻疹

而出者上宜之前方加三桂枝即萸莖芩名之麻瘡及退痘瘡自愈也○傳曰瘡初瘻處之旁，  
灰丹灰行班出者此陽氣之氣加吉更更  
芩妙也耳氏所論毫忽之當即和解湯

三口井後專用一方升芍藥甘草防羌諱  
甘減半用一錢生姜三片並服○本方有  
人參今去

**當歸丸** 治癰大便堅硬四五日不通者，  
當年西連并半身一兩甘草一錢半生姜一錢半  
生姜以下三味研為細末以蜜丸和之，  
丸如梧胡椒大寸三歲以下更即十七八歲更即十九食丸。

前湯米飲下，漸加以利，少一度。

**七味豆蔻丸**

產瘡四五日後虛滑利而未盡者，白朮、虛寒  
也○傳曰唇舌淡白者，宜此丸。系肉豆蔻  
訶砂、密、白朮、朮各五兩、赤石脂、煅枯白  
朮各七分、麵糊即丸大如豆，每用湯朱  
飲三下，三十丸或二十丸量其大小，喚之，  
見不化能吞丸者研碎入粥用服之亦可也

الله

لهم

