



鄉食庭家秘說

二十八

氣虛淡紅 二ウ

乾紅渣滓 二ウ

肺癰兆

唇四角如火如朱 三ウ

赤朱饒唇

同兩頰赤色如火便祕煩躁急

唇口紫赤前板齒燥六ウ

○舌赤無胎者十神解毒湯

○唇口紅活滋潤 七
吉徵也 △唇口先黃熟 ハウ

○唇紫赤現一粒黑痘 十
黃硬毒氣內潰必死期促

曰單鎖口 曰騰蛇鎖口

唇上人中生一粒十
ラ

○唇紫黑燥裂

唇堆粟腐爛

名曰雙鎖口

唇口黃白或赤紫不

潤澤者山

○清肺解毒 三ラ

唇口崩裂 二ウ

走馬牙疳 ハウ

脾毒大盛九竅走血五日而死

○葵花而死

唇上出痘一二點 三ウ

名曰復出痘 二不治

唇腫赤紫乾燥口臭 五ラ

○双解清涼○又急下之

○唇赤乾燥每語○內寒急微利

○溫清涼飲 六ラ

多唇瘡後水滯錯候 九ウ

名曰繆喉

○清肺利咽

○涼血解毒

唇紫黑色 二ラ

○唇燥裂口中臭氣ナニラ

唇堆腫口中腥臭失聲

唇紫赤口中惡臭潰爛。唇口焦列裂寒戰咬牙。二辰腫嘴痛眼中如火。十四

十五

○唇六候

十五

唇青褐

淡白

赤紫口鼻炎熾盛也

灰褐者逆五內津液竭也。青藍者危。木冠土脾絕也。紫黑者死。水勝火亡也。

黃漿者死。脾胃絕也。

○唇十二候傳

十六

滋潤乾淡燥裂堆腫。濶血水色。

○脾胃虛弱舌

十六

破崩垂下板實

黃硬緊縮格離

唇口勃々衝人

舌色慘暗

○舌黃中帶微黑

十九

過赤舌

口

舌上芒刺

六舌

○過赤舌

十七

三圍淡白傳

十九

○大熱無胎舌

血

十神解毒正面渴石膏

秘大黃

○相類舌診

十八

紫清與紅潤相類

淡紅與淡白相類

紅赤與紫赤相類

灰紫與淡紫相類

乾燥與燥烈衣相類

白赤與芒刺相類

焦赤與舌炕相類

西白胎與根灰西黃胎相類

同上

濕潤與膚熱相類

三積黃三積紫

三積黑三舌俱在初覺

十六

灰胎與淡黑相類

黃黑胎與乾黑胎相類

灰黑與淡紫黑相類

同上

淡白班与班点舌相類

瘦薄与舌尖相類

失榮舌如鳥舌

十九

十九

・舌硬与舌痿相類ナカヲ・紧舌与舒舌相類ナカ・弄舌ロウウ

・堆腫与堆粟相類ナカヲ・青藍与青白相類ナカヲ・褐色与醬褐色相類

○各上黑痘スミダツ矣熱未見餘ミナシ△乾洪褐

△卷縮 △短縮

逆△痘先舌上生黑痘スミダツ逆也

○唇舌十八候秘說ミツガク・唇舌滋潤者スミタツ

・赤色者為內熱トシマツ同上

・乾燥者津液虛耗スミワツコス・白胎者 内火太甚トシマツ

・芒刺者 煎熬氣血スミハツ

・黃胎者 表裏俱火熱トシマツ・黃老而乾燥者攻腸胃スミハツ・濁潤裏熱自解スミハツ

・燥裂者火毒焰血中スミハツ・淡紅者 氣血微虛スミハツ・淡白者 氣血虛寒スミハツ

・灰潤者氣血和津液微虛スミハツ・紫黑者相火為亡スミハツ・灰黑者裏寒而藏火脫スミハツ

同

・已上十八舌辨痘症陰陽スミハツ・舌本之者スミハツ・有故從元本役之者スミハツ

・褐色者 脾腎破敗スミハツ・醬褐色者 肺傷而肌肉脫スミハツ・純黑者 陰門氣乘于陽位スミハツ

・已上十八舌辨痘症陰陽スミハツ・舌本之者スミハツ・有故從元本役之者スミハツ

○舌出唇外紅潤スミハツ・舌出唇外赤色如朱無胎スミハツ

○清涼活血

○舌在唇內不能伸スミハツ・○宜清涼解毒スミハツ・如白胎兼黃中央乾黑者逆也若

逆・舌在唇內紅赤乾燥スミハツ・黃黑而乾燥或生芒刺者逆也・若舌上堆粟如蜂窠者逆也・咽喉腫痛飲食不入者逆也

・声啞嗆水錯喉者逆也・室出齊期稽伏不起者スミハツ・四日後失起綻之勢者逆也

・六日後平陷灰白根暉スミハツ・六日後失血喘呼腹鳴下氣者逆也

・瘡漏者逆也

・主膿面期皮薄破安者逆也

・瘡戰咬牙者逆也

●屬後發驚搐者死。首尾唇舌滋潤而至屬後新生白胎

者風寒龍衣於外也為逆發驚搐者死

右十二逆症也

○舌在齒內不能伸多為山

○舌在齒內如屈

○舌在齒內純色

共四ヶ

共五ヶ

共六ヶ

鄉食庭家秘說卷

唇舌口訣

九折堂山田氏圖書之記

唇淡紅淡白唇淡紅或淡白亦合格者氣虛也如汗多者表裏俱虛也不可用攻發之刺候其放苗紅白宜神托。○懶テ疱瘡ノ唇ト舌トラ候心得ハ免角唇常色有古二ハ常色有其常色能知テ見子ハ淡紅モ淡白モ別ラ又事ハ淡紅常唇ノ色ヨリハサニラケテ見ル位ノ色ヲ淡紅トキハ淡白トハ又シヨリモ一

等ニラケテ見ユル色ヲ淡白ト云く古亦合格トハ格常格ニ唇常格ノ色テ疱瘡カ出ル者ハ氣虛下心得シ其子細疱瘡ハ序熱トキテ兔角熱カアル者ニ熱カ有ハ唇ノ色モ常ノ色ヨリハサヒ赤ニカチニ尤ハ是热有症ノ常丸ニ其カ反テヤハリ不段ノ唇ノ色ノ通リ手サニモ赤クナラヌハ是内ニ氣虛スル處有故ニ唇カ合格スルヘ此症ハ兔角丸至テ虚痘ト成ル事ヲ妄シス攻癰ノ剤下ハ用ヒ又様志カケヘシ是唇ノ色見テ前ヒロニ其氣虛充

夏ヲ知ルノロ訣ナリ

唇紅活乾紅 唇色紅活而不燥烈裂惟乾紅者是热輕而毒ナキ之如唇黃白或赤紫而不潤沃者也○紅活ト乾紅トノ二ツノ區別ハ紅活唇ノ色カ常ノ色ヨリハウツキリトアカイト云位モノ也又乾紅トハ其名キリト赤ヒ内ニモ潤ヒナリカラト乾ノ氣味有テ常ノ唇ノ色ヨリハ赤キ物ヲ乾紅ト云ヘ是ハ畢竟境處カ疱瘡ハ熱ニシタツ者ニ熱カナトハ疱瘡ナシメ又ノ然ハ唇ノ色モ紅活ト

名キリト赤ノ乾紅トサシ乾テアル位ノ熱テナシハナ
又事ニ是體ノ熟ト唇ノ色カ相應スルニ熱カ強ク
モナシハ弱クモナシ正トヨキホトニ准ニ有矣此紅
活ト乾紅トニテ知ルニ故ニ如此唇ノ色ハ必熱也
輕ヒハ毒セ輕シト知ルヘシト教ル之若シカ要シテ
黄白カ赤紫ニナシテ潤沢ノキ色ハ定メテ五症
多キト知ルヘシト

乾紅渣滓 唇口乾紅渣滓頬赤 唇紫
脣癰頬赤者此乃欲成肺癰候也治宜清肺解毒

○唇口トハ唇ハクチヒ口ノ口中夏ニ乾紅ハ前ニセ
云通り潤ナシキリト赤キシ云渣滓トハ渣モ滓
カスト訓字ノ口中ヤ唇ノ乾紅シタル處ハ白ノカスト
吹付タルヤウニホチト白ノ見ユルラ唇口乾紅渣
滓トハ云ニ頬赤シトハ兩頬カヘニラヌリタルヤウニ赤
見タルラニ唇紫トハ唇カヤリ紫色ニ在ラムラ
此通り或ハ唇口カ乾紅ト乾テ赤リ渣滓トガス有リ
或ハ頬カテラクト赤リ唇カ紫色ニ見ルハ是ガテ
肺癰ニ在ヘキニキニキニ故ニ治方モ清肺解毒様ニ

スベレトナリ

先手

唇上出痘一二點 唇上泛現一二點或面部現四五苗，既已如例收厭，然以火照之紅點隱隱千內，藏皮膚之間，其宜散。爵其毒未散而毒反發于痘，則必致成死証，無療矣。此名復出痘。○此條筆硯之畫ス處ニアラス思テ其理ヲ得ヘシ

○唇四角如火如朱 唇之四角赤如火或如漆，而雙唇發紫黑者此乃脾經熱極也此名

赤珠饒唇

曰赤珠饒唇宜清火解毒○唇四角如唇正面云二非八四角八猶四邊ト云程事ニテ唇ノルリ云ソレガ如火朱ヌリニヤウ大キニ赤クナル症ヲ云雙唇トハウハ唇下唇ト云トニ發紫赤魚トハ赤クトクロキ疱瘡ノ唇ホトリニ出来ル云之是ハ脾經熱ノ深キ症ヘシニ清火解毒テナケ六ナラヌト云トナリ

○唇口崩裂唇嘴崩裂或腫大口出臭氣者此胃煙癰此胃煙癰在班也不治○唇嘴ト嘴ハノチニ崩裂ハ

胃煙癰

シレサルナリ唇ガシサニテ膚櫛スル或ハ唇大
腫テ口中ニ惡キ香ヲ出スル者ハ胃櫛卷班ニ不治ト
蓋唇ノ冒ノ主トル處故胃邪熱有時必唇ニ其レ

走馬痺 ルニ見スヘ走馬下牙病牙病年元此類ニ

○唇口崩裂 唇口崩裂九諸痘俱好四肢紅赤
者心脾肺三經熱甚治宜涼血清火解毒主之
○前條ハ惟唇計崩裂穴ニ是ハ唇モ口共二破レ
裂テクニルラ唇口崩裂ト云之而周身出来テ
有疮瘡見ニ顏腹モ背モ能ク見ニキ惟手

足ノ疮瘡見ルニ外疮瘡ヨリハ其色紅火ニ
ニ赤ト赤キ者ハ心脾肺三藏熱甚キ症ニシニ涼
血清火解毒剂宜キトニ

○唇腫赤紫乾燥口臭 唇上先腫大如嘴尖紫
赤乾燥者实热毒盛也先用雙解清凉之剂猶
加口臭者急下之服後口臭不除者不治○
下利ヲ服ノロ臭ノ不治是胃热ノ毒氣尽キナル故
ナリ故不治トス

唇瘡堆粟

○唇瘡堆粟燥裂 唇上瘡出如堆粟兩頰赤色
村仁右衛門ト此症ヲ患清涼攻毒飲ヨウシテ死ニスカル

一觀字

盛

脾毒ノ如火二便祕結煩躁氣急者脾毒大盛必欲九
九數走血竅走血之勢ノ如唇燥裂者五六日而如蘿蔓

蘿蔓死

而死○堆粟火堆俗云ノジタカク丸夏ノ粟火之
名ノジタカクシモ種重子テノジタカク丸ヤウニ脣

疱瘡ノウジタカクアラシノ如クニ、ナリヤウニ出来ルノ

如堆粟ト云ニソシニ兩ノ賴力火ノヤウニ赤ノナリ大小
便不通煩トキタマワク燥ト身モタヘミテ氣
急ト息モセツク丸者ハ脾毒ノ甚キカニ也是ハ
后ニ必目鼻口ナドヨリ血ノ走ル者ニ若其上ニ唇力

乾キ裂テ破レル者ハ五六日ノニ其唇干燥キ裂久ル
形力蘿蔓花如クタマレ破しテ死スルト

○唇赤乾燥妄言 唇赤色乾燥睡中譴語妄
言狂燥大便祕結者内实也急微利ノセヨ○
此症ニ急ニ下ス例ノ以テ涼血攻毒飲ナト用ヒテ
一線ニ下シソウナ症ナヒニシラハ用ヒスサレク是
利スルト云ハ惟四順清涼飲ナト用テ千ト計リ
是ヲ下セト云夏ニ是ハドウ云謂ナシハ唇色テ
知ルニ唇色カ赤ノ乾燥シタメ位テハ一ト線ニ

キアラク下ス更ハ症カ軽シテ藥力大早スギ
故ニ惡シ故ニ是ヲ微利スト云ニ若唇方紫赤ニ
在カ紫黒ニナルカ也ハコニテハ下線ニ下サセハ
ナテ又ニコニ等テ唇ノ赤色トヨニ乾燥トヨニ氣
ヲ付ルト末ノ微利ト云二字カ能スムニ

○唇口紫赤前板齒燥 唇口紫赤如烟火只
氣粗前板齒乾燥者内無毒壅也如烟火
トハ其色ノ毒ミシソ此紫ニナルヲ云ロ氣粗トハ息以
キテラキヲ云前板齒乾燥トハ前板齒トハ前

舌赤血熱

齒ヲ云乾燥ハ潤ナシカラクト乾ソラ云是ハ内無
毒壅ナシハ十神解毒湯ニ石膏大黃ナトヲ加テ
宜キ症ニ但ニニ至テ舌ニ胎有力胎ナキカラ
見テ舌ノ色甚赤クメ胎ナキハ十神解毒症ニ
若胎有八氣分無ヘ其心得有ヘシ

○唇口紅活滋潤 唇口紅活滋潤而不煩燥目
光精神彩神映瞭然此瘡淡紅五神鮮明者充矣
吉徵也○紅活滋潤トハ紅活ハ前ニモ云通朝
夕ノ唇ノ色ヨリハ千ト赤ミハニリテ赤ソナルラ紅

活ト云く滋潤トハ常ノ唇ノ潤ヒノ又ケズヒテ常ノ
如ソニヨキ程ニシメリアルヲ云く滋潤トテ水ナドヘ
ヒタシテヌレキヤウニ見ユルニ非ス不煩燥トハ
唇ノ上ニキラアテ、見ルニ熱キラ云く是モ惟ボ
カトホテル合ニテ逸ト云程六ナク惟アメ、カニ
常ノ如クナラ不煩燥トハ云く而目ヲ見ルニ眼中イ
チクト瞳子モリニトヒキタテ、イサニシク見元ヲ精
彩神映脳然ト云く出瘡淡紅トハウツシリト程ヨリ
赤キラ淡紅ト云くシラケテ赤キラ云ニハ非ス五心

鮮明トハ五藏ノ神色鮮トアザフケン明トアキラ
カニ面色元氣宜キラ云ニ加様ノ症、大上吉、
疮瘡ナリト知ルヘシトヨ或人間テ云唇ロノ紅活
ラシテヨシトスル更ノ如何ノ謂也、善テ曰疮瘡ハ
熱ノリヤイニテソメチモスシハ膿モ熟スルニ然ハ
疮瘡ハヨキ程ニ熱アルヲ尊フ更知ルヘシ今
唇ノ紅活ハヨキ程ニ熱カ有ニヘニ紅活ナル之
然ハ紅活ラシテヨシトスルト是疮瘡ト热ト唇
ノ色トカニナガラ相應ノ過不及逸キモノナリ

大吉症

故ニ唇ノ紅活滋潤ナルハ大吉症トスルヲスル
知ニ允ナリ

△唇痘先黃熟

唇上ノ痘出相連諸痘未
黃硬内潰漿水而此痘先黃熟而黃硬者内潰已成他
脾氣下脫處亦難成漿矣更脾氣下脫氣血下陷
毒攻唇口必死期促○未將水トハ漿水ハ水膿
ノ更有リ黃熟トハ本膿ノヤウニ黃色ニ見エルヲ
云黃硬トハキラヒテ推テ見ルニ其色黃ニシテ
推し心硬ク覺エルヲ内潰已成ト内力潰テ

其潰ノ記カ己^最茂早唇ニ見ニル程ニ由断ガ
ナラヌト云意ナリ他處又難成漿水トハカヤウニ
行リ疱瘡ハ周身皆膿漿ララヌク事^成難キ
者ニトナリ其上ニ脾氣下陷ト腹鳴リ下氣ナ
トカアル彼是スルハ是痘毒カ唇口セキトトク
者ナレハ必死ノ症メ然モ早ク死スヘシトニ唇見
ルニ疱瘡カツラナリ出外ノ疱瘡ハニメ水モリノ
氣色モナキニ此唇ノ疱瘡ハ水モリノ上ヨコ早
本膿貫膿ニカリタルヤウニ其色黃色ニ熟シ

ホウヤキテ見ルニ而其熟レホウヤキタリト思
フ唇ノ瘡瘍ヲ指テ按ノ見ルニイホゾトヘキラ
アテル如クシヤナク硬ク花ラ黄硬トキカヤウ
黄硬難治

大瘡瘍ハ難治ト心得ヘシト
大瘡瘍ハ難治ト心得ヘシト

○多唇瘡後水嗰錯喉 唇口出瘡多者

必咽喉稠密在後腐爛飲水不入周身白

稱者名曰纏喉宜急清肺利咽為主防
八九日間水嗰錯喉^{ミズヌシ}遲^{ミキ}則不治○稠密トハ
俗^{ミタケ}瘡ノ多キラ云腐爛ハタシケサヘル^ミ水嗰錯

纏喉

水嗰喉錯

喉ハ湯水ヲ飲時ムセテ咽ニ下ラサル云唇口ニ瘡
稠密ナルハ後咽喉ノ間クサレタメシテ湯水ヲノミ
ムセテ咽ニ下ラサルノ患ラヌ程ニ急ニ清肺利咽
ノ藥ヲ用テ八九日ノ間ノ水嗰喉錯ノ患ラ前
ヒロニ防ケト云々

○唇青舌乾 唇青、舌乾口苦、面赤、腸肚作
痛者此血实也宜涼血解毒○此條解之難シ
故ニラ略^{ミス}腸肚、肚ソバハト訓字く腸^{ミツ}

○唇紫赤現一粒黑痘 唇赤色或紫赤當

單鎖口

騰蛇鎖口

嘴角現一粒黑痘、黑痘獨虛大者此曰單鎖口若唇上下一周成串者此名曰騰蛇鎖口皆惡候也○獨虛大トハ外疱瘡ハ少シテ惟此黑痘中虛大トブヨクト大ツク見ユル者ヲ單鎖口ト云ト之一周上ハ唇ノグルリニ成串六珠數半キニナルヲテ唇ノ上下ノグルリニ黑痘一ツナビ二珠數半キノ如ククルリトリーハノ出来者ハ騰蛇鎖口_{鎖口}喉トテ皆惡候有トヘ

○唇兩角現一粒 唇之兩皆此角俱現一粒

雙鎖口

者此名曰雙鎖口又名曰虎頭瘡惡候也兩角俱現一粒餘痘未見獨矯大者此鎖只必五多○兩嘴角ハカリ兩角三唇ノ左右ノ角ニ獨矯大トハシリモナク大キリナラ矯大トニシ唇ノ兩角ニツブノ庖瘡_{ニス}見シ外ニ一向見無モナキニ此兩角ノ庖瘡_{ニカニ}メキトソダナブヨクトニラス大キリ在者ヲ鎖口ト云此痘多々凶事多シトナリ

○唇上人中生一粒 唇上人中一粒比竇痘

脾已敗腐

士

独大而痘雖稀朗至六七日或十一日傳經時必然矣渴不飲息喘氣促者蓋脾已敗腐也死ス○人中トハ鼻ノ下ニゾラムニ稀朗トハ瘡モサクヨキ胞瘡ヲ云々矣渴不飲トハ水ヲ飲タキ心有しニロ中ヘ水ヲ入レ又計丁不飲云息喘トハイキレニ氣促ハ息ヲセワシナクツク唇上ト人中ト一粒胞瘡ヲ生シ其胞瘡衆身ノ胞瘡ヲノラベテ見ルニ中モスジ太ナリテ見ルニ周身ノ胞瘡モサク至テヨキ胞瘡ニ尤故ニ

○唇紫黑色唇乾澇或紫黑色而紫縮如魚口者不治○唇乾澇トハ潤ヒ氣ナリカラクトハシヤクニ或ハ唇ガドグロクナリテ唇ガチドリ魚口ノ如ソニナル者ハ不治ヘ

○唇紫黑燥裂唇紫黑燥裂或濶黑

村仁房

同

血、乾黒^{タリ}而如^{ハル}黒珠子者、六日、期^テ乾枯焦黒^{タリ}
者死^ス。九日、期^テ如^{ハシ}薺花者死^ス。○濁黒^{タリ}トハ
唇力紫黒ニメ乾キ燥久ルワレソヨリ黒キ血^ヲ流シ
見スヲ云如^{ハシ}黒珠子トハ癌瘍^カ黒ク乾^テ潤ナク
黒キイイホノ如^{ハシ}丸者六日計夕干^テ乾枯焦黒^{タリ}
死^ス。ト之^ヲ薺花トハ薺花^ノハノ花^ノハノ花^ノ
如^{ハシ}白クナリ丸者又死^ス。ト之^ヲ

○唇堆粟腐櫟
唇先先矣，瘡如堆粟，腐
爛者氣敗敗，死莫
治如唇上牙休先出痘

不覗^ル者死ス○推^シ栗トハアワラ、ウツメカク
ノホルガ如ク唇ニ先痘瘡ヲ登シ腐トクサレ爛ト
タ、レタル者脾藏カヤフシテ死ス若ニハグキニ
疱瘡力出テ他ノ處ニ一向ニ不覗^ヘ者死ストニ
唇燥裂或口中臭氣^ヲ唇嘴崩裂或腫大
口出臭氣^ヲ者此胃癰^ヲ癥理^ヲ也不治○前已是
ナキセリ

唇堆腫口中腥臭
唇堆腫口中腥臭傷人
脾胃敗也必失声氣吐喘

肺絶

促死經曰肺絶者七日死○推ハレテ口中ガナニサク
シテ人ノイヤガルホトニクサキ者ハ疱瘡ノ邪火カ脾
冒ト肺トヲ並熬ト火ニテイリムス如ノセノル故ニ
ヤズルニ此症必壳ガカレテイキジレシテ死尔ト
之經曰ハ内經ニモ肺絶ノ者ハ七日ニ死スルト云ハ
是等ノ症ラムトニ

○唇紫赤口中惡臭潰爛 唇赤色或紫赤口
中惡臭牙床潰爛舌上粟堆黃胎而鼻梁
發紅色者又牙齦唇內色如乾糞其內臭

曰走馬疳・爛或濺溢一日爛一分二日一寸此名曰走馬疳
不治○牙床ハグキニ粟堆ハ舌上方ニ久充ホ
トウシタカソルラニ鼻梁癰紅色ハ鼻粟ハ
鼻柱ナリ紅色ハノミザシカサシノ如ソボウト
赤色ラ癰スルラム一日爛一分トハ毎日クサレタルト
キノチタルラム一日爛一分トハ毎日クサレタルト
早キラム走馬疳トハ元馬ノ如ク潰爛ノ
早キラム

○唇口焦裂寒戰咬牙 唇口焦裂咬牙戰

紫雲佈胸

掉^{タリ}者此乃血凝^リ氣滯^ル毒來攻胸^ヲ也此名曰

古

紫雲佈胸
村仁秀
眼赤如朱

○唇腫喉痛眼中如火 唇腫喉痛眼赤如朱 故也

氣血交會

者此肝肺胃火旺^ル也如瘡色氣血交會者宜急清解治之可愈若色慘暗乾紅^{キナキ}則

鼻孔出血

氣血離散七八日内必至鼻孔出溢不散○

氣血離散

○胞癰^{モハリ}強^ク起^{チヨウメ}見^{ユルヲ}是^ハ是^ハ

張^キ

治^スヘシ^ト氣血離散下^ハ氣血交會^ヲアリ

○胞癰^{モハリ}強^ク起^{チヨウメ}見^{ユルヲ}是^ハ是^ハ

氣血離散下^ハ氣血交會^ヲアリ

○胞癰^{モハリ}強^ク起^{チヨウメ}見^{ユルヲ}是^ハ是^ハ

氣血離散下^ハ氣血交會^ヲアリ

○胞癰^{モハリ}強^ク起^{チヨウメ}見^{ユルヲ}是^ハ是^ハ

氣血離散下^ハ氣血交會^ヲアリ

○唇青褐 唇青褐蛇虫從口鼻及大便而出煩渴飲食不進寒戰咬牙者死^ス○青褐トハ俗云茶色也

○唇六候 自紅而淡 淡轉^{テニスル}紅者生○自淡而白○淡變白者重○氣血虛

自紅而赤 赤轉^{テニスル}紅者生○自赤而紫○赤變

紫者危○鳥炭熾盛也

自紅而灰 厚轉スル紅者生○自灰而褐○灰變

褐者逆○五內津液竭也

自紅而青 青轉スル紅者生○自青而藍○青

變スル藍者危○木尅土脾絕也

自紅而紫 紫轉スル紅者生○自紫而黑○

紫變スル黑者死○水勝火亡也

自紅而黃 黃變紅者生○自黃而醬○

黃轉醬者死○脾胃絕也

○右八唇ノ色ヲ以テ虛實ヲ知ル如火割カツ也此目

的甚久ニ力尤更ナリ是ヨリ諸ノ唇色ヲ割出ノ

考ヘ合セ藥ラ與フル時ハタクハ其カ子ニアヒタガ

ワ又事有○自灰而褐トハ灰ハニ色ニ灰色カ

久ニテ褐ニテ也褐色アサヘる唇カ灰之灰カ久ニハ

イノ色ニ是モ青カクタバ藍ニナルニセ藍ワサエ

ニハ青ニルニサエントクスムトノアハバイニテ青ト

藍トハワカルく○醬トハ俗ニ云フヒシラ色ナリ

是モ右ノ理ヲ以テ考ヘ知ルヘシ○梟炎熾盛トハ
梟炎ノ梟ハ毒トニ変ト同シヤハリ毒矣トハ
熾盛也○五内ハ五藏也

○唇十二候傳○滋潤發熱氣血和暢首尾
不服藥自愈

乾澆發熱裏不和表氣抱毒不能宜發
津液耗虛之

燥烈發熱內火太甚梟炎焰盧含煎
熬氣血

堆腫陽明毒鬱伏脾肺受傷口臭便秘
肌肉壅

敗血毒在血中鬱不出故榮血受傷甚
則上下失血

水色氣虛也血虛也虛寒也氣脫也急
宜補益溫補

破崩虛寒也毒壅也脾土敗壞四藏
皆受傷之兆也

垂下五藏氣下陷不能升提先心脾

腎俱絕也、

板實 裹毒已解、恐毒壅、肌肉故能食
心氣來者作潰爛瘡毒、

黃硬 毒陷脾經、鬱不出、脾胃傷內攻之
微也

緊縮 五藏為毒火所並、熬一腎液竭故、

乾枯馬黑而死、而

格離脾肺失守、土崩相火已亡之兆、

逆之

○滋潤解前見ヘタリ○乾澆前見タリ
但渾キテ以テ唇ヲナテ、見セハ別テ又ニ唇ヲ指
先ニ横ニナテ、見ルニシブル是ガ乾澆ノ證也○
津液耗虛トハ耗俗ニカシノタツト云フ之津液ニ
カニガ立テヘル故ニ唇モシフル是イサカノ事也
○燥裂八唇ガカロヒテヒ、アカギリノキシ如
ホカクト割裂テイル○堆腫ハウタカクシ
モリト腫ル○濺血ハ其ワレメ或ハシタル处
ヨリ血カソギ出ル○水色火水、如ク冬、

シテ見ニルナリ○破崩ハヤハリ字ノ如リヤアレク
ツルルニ○垂下ハボタリト下ヘ落ルヨウニ唇
カハシザカルニ○板實ハヲセバ唇カ板ノ如リカ
タクナルニ○黃硬ハ庖瘡ノ色カ黃色ニイボ
如ク堅タルニ○緊縮ハ唇力繖^{スル}ニ○離
格ハ唇ガイカムニ

○脾冒虛弱舌 脾冒虛弱ノ舌古力薄
ク瘦テホソクトガルヤウニ見ニル者ハ脾冒ノ
虚弱ナル者ト知ルヘシ

○唇口齶^ミ衡人 是ハ内火肺冒^ミ虚^ミ敷^ミ腐
爛スルノ象ナリ

○古色慘暗ハ 烟火内ニ薰蒸スルノカタニ^{ケムリテ}烟^ミ家
内ニクスボル時ハ暗ク^{ケムリテ}物ヲ^ミヒカクニ
慘暗ハ此意ヲ以テ唇舌ヲ候フベシ

○古黃中帶微黑者ハ邪火^ミ焦^ミノ形ニ
等赤キニ過ルラ^ミスベテ庖瘡ノ序熱ハ此
舌ヨリ多クハ半^ミニ者ニ是^ミ熟ノ舌十六其

心得ヲ以テ藥け與フヘシ

○舌上芒刺

芒刺ニ六ツノ見ヤウ有リ○乾刺

○黄刺○赤刺○灰刺○紫刺○黑刺

○此六ツノ是ハ熟毒ノ深キ古く俱ニ大黄芒

硝ノ宜キ古ニト知ルヘシ

○三圍淡白傳

スヘテ舌ヲ見ルニ芒刺ヲ生

スル者黒色ナル者黃胎ヲ生スル者大便秘

結スル時六硝黃ヲ以テ下スヘキ事是定法

然ニ其内下スニ宜カラサル古事記良也

三圍

イ淡白是ニ三圍トハ舌ノ巻リ必リ通

カヨム

淡白ハ血色カザクシラケニア見エルヲ舌ハメトヒ

大便秘結スルト云ヘ硝黃ハ先ツ角ヒラニ又古ニ

ト知ベシ芒刺ヲ生シ黒胎ニ見ルニ是ハ下ヌ夏

ヲ忌ム古ト知ルヘシナルタケルヤワラカニ下ヌヘシ

油導蜜導ノ如キ物ヲ用ヒテユルト下ス

ヤウニスヘシ是美舌ノ内ニ舌ノ三圍ヲ見ル口

傳ノ一法ヘ

○大熱無胎舌ノスヘテ胞瘡ニ身火ノ妙ア

レニ久、古ガ赤ノ紫色ニナリテ胎ハサレモ
 生セ又舌有是ハ血分人熟ニ血潤フ者故胎力
 生セ又く是乃ナ十神解毒湯正面ノ舌ニ是
 大便ノ秘結ヲ加ルトキハ大黃ヲ加ヘ渴ヲ加フ
 石膏ヲ加フ是十神解毒湯ヲ用ル傳授ニ
 ○相類古診 濛清与紅潤相類 紅潤者氣
 血充實、表裏俱和故莫服藥。○清濛者
 氣血表裏俱雖和神え微虛故自中間已
 後必易虛寒不奇厥溫補。○清濛ト紅
 潤ト前已是ヲ并ス自中間已後清濛丸
 唇舌ハ中程ニテ何事ナク行ケ比中程ヨリ未ニ
 至テ虛寒ノ症カ起リ安ヒ程ニ清潔ノ唇ハ溫
 神ラ今ヤクト心ニ待位ニ心卫ニ居シトナリ
 ○清潔ハ紅潤潤字加ヨリ見シハ色ノサヘテ赤キ候者
 有紅潤ハ清潔ノ濃キ者ニ是ヲ以テ清潔ト
 緋トニツノ色シ見テロフヤウ心ガケヘシ
 ○淡紅与淡白相類 淡紅者屬氣微虛
 宜神益淡白者屬氣虛或属血虛

或屬虛寒。始熱宜溫補。○淡紅前モ云
通常ノ唇舌ノ色シラケテ見ニル唇舌ヲ云フ
淡白ハ餘ホトシラケテ見ニル唇舌ヲ云フ治方
淡紅ハ久、虛ヲ補フ耳ニテ宜シ故、補益ト
云フ淡白ハ多ク、虛ノ上寒力添之故其治方
モ温補ニ宜シトイヘリ

○紅赤與紫赤相類。紅赤者、屬熱、宜微涼。
紫赤者、屬火毒。如二症俱無胎身熱者、為
血熱血毒、宜清涼活血解毒。○紅紫ノジ
リ久是其不同ノ處也。治方、紅赤ハ火、熱ニ通
ノ事ナハ、微涼ノ藥ニ宜シトキニ紫ニモハ熱ソ
上ラコシテ火毒ニ屬スル處ノ舌ニ是ニ胎アレハ
氣熱ナリ胎力ナケレハ血熱血毒ノ乃ナ十神解
毒湯ノ症、此并前ニ有并セ見ルヘシ

○灰紫与淡紫相類。純灰紫者、原血熱也中
間變虛寒者多有之。純淡紫者血寒也ニ
症俱屬微虛微寒。在初發、不可攻發出奇、
後宜溫補。○灰紫ハ灰色ニテ紫ナルヲ云フ淡

寒熱疑似

紫八夫ヨリ薄キラム灰紫ハ中程ヨリ多ク虚寒
ニ度シ淡紫ハ多ク血寒ニ度ス温神心得前
ニ口ニ有ヘシ所紫ト淡紫ト早ニ見スゴセハ既ト
トモウ夏有者也其心得アルヘシ

○乾燥與燥裂相類 二証俱屬鼻炎大毒

急宜清涼如ニ便秘治者下之○乾燥ハ舌ガ
只カラトスルニサケル夏ナシ燥裂ハサケルニ
是モトヨリ毒熱ニ但此症モ舌ノ三圍ノ紅白ヲ見
夏肝心ノ其見ヤウノ前ニ是ヲ弁ズ

○白赤與芒刺相類 薄胎通明者難辨

惟以紅不辨之如白胎若粉或如積粉者三圍赤
色如火ノ中央白胎帶黃色微爛者欲起刺之
勢也此內火熾盛已サ加清涼治之如三圍紅
潤胎老濁者到出有期內火自解之兆也忌
投清涼如白胎通明者自乾刺度黃刺者急
宜清涼如自黃刺至赤刺者雖石膏硝黃
又可用勿投參者以末攻寒余微之○

本文中三圍紅潤胎老濁者到出有期內火自

解之兆也。ナニ文字能く讀覓ヘテ舌診角備
ヘシ己ニ硝黃ヲ用ントスル舌診モ古リト潤ガ
キテ舌上ニヌラスル潤カ生スルトク是ハ程ナク
藥ヲ不用トモ内火毒カ自然ニ解スル前兆之
ソレハミタリニ寒剤ヲ用エカラス是大事ノ目
的ノ能ク記誦メ後用ニ矣セヨ

黄脂與老黃相類

黄脂原ト自白脂成矣熟
見魚、期、鳥丸、熾盛表裏俱熟之徵也急
宜清涼解毒如三圍赤色而生芒刺大便

秘結者急下之訣自行下難遲不適六日○
黄老者當出齊前後一黃脂中帶微黑者
此謂黃老ト三圍紅潤而中央滑潤者裏邪
自解之徵也於此有氣虛之証候者急宜
投參耆如唇舌乾燥者忌用參耆○黃
老老少俗ニニ子ルト云コトバニ黃脂カ一段クスニガ
カル時ハ必老黃ニ丸ニ是モ中央滑潤トニ其
老黃ノ上ニカニヌラシテ潤フ氣味乙ハ是必ス以
火、自解スル前兆ニ寒剤ヲ用テ熱ヲ醒スニ

不及大便秘結ストイ尼先見合セテヨシ前條

老濁ト同ニ併セ考フヘシ

○焦紫與古炕相類 焦紫者克生白胎變
黃黃而中央乾燥而赤黑者為熱毒大甚
急宜清涼○古炕者一色發熱一朝生白胎暮
古炕者此為積熱形狀急宜寒涼之剉逐往三日死○古炕未不考後日吟味スベシ
則三日死

○兩白胎與根灰而黃胎相類兩白胎者從根至
中央中央赤色而左右白胎如積粉者雖身

熱裏內無故若雖便祕不可妄下至體期
多虛寒治者知之○根灰而黃胎者痘出
起發雖快毒根于裏乾紅掀腫頂陷不
起如大使祕者當三四日之間宜微利之五日
後急宜溫補

○湿润與腐熟相類 濡潤者初發大便秘結
不通胃中溫毒不解則腸胃之間溫熱薰
蒸至六七日溏泄無度變虛寒者多其右
淡白純白淡紫淡黑灰黑青藍濁潤者是

也○腐熟者原より更熱形狀甚満古胎燥而焦紫或焦黑者過服寒涼之劑或誤失治則卒為藏寒致不治者多精後舌腐熟者用峻補不得紅色則為溫潤此泥生之象之不治乎

○三積黃 三積紫 三積黑 三舌俱在初發乾燥者為熱滑潤者為退熱 三圍赤色者為火毒 三圍淡白者為虛寒 三四日用清五日後用補○三積積胎厚云コトハ之

一色云ニハ非ス久ハ米粉ヲ手リテヘシナリトシケタル如ノ厚シノ有胎積ト云ニ此積ニメ滑潤者退熱目的トナシ乾燥者ヲ恐トニ三圍赤色者ヲ火毒トナシ三圍淡白者ヲ虛寒トス是至ニ半近キ敷ナリ能々熟メ後用二年スヘシ

○灰胎與淡黑相類 灰胎者發熱初紅而薄胎透明至五六日三圍紅潤中央淡火者雖棕色未深鬆必轉順之兆也氣血平和津

液微虛投輕利溫補一則至八九日唇舌滋潤全得生矣○淡黑者發熱二三日少用清涼四日後宜溫補○薄胎透明者白胎云透明舌赤之胎上カラ見ス後白胎丸故ニ透明ト云之

○黃黑胎与乾黑胎相類 黃黑胎者自白胎而轉黃中央變灰黑有及滿舌者又有不及者在初發宜清涼滑潤者宜溫補

○乾黑胎者熱毒燔灼只乾燥中央帶純者死

○黑者為內火太甚惟宜清涼舌胎以厚薄淳沉辨之三圍紅潤者可救如滿舌乾黑者死

○灰黑與淡紫黑相類 二症俱三圍赤色而中央灰黑淡紫黑者在初發屬微熱出齐後三圍淡紅而滋潤者屬氣虛如三圍淡白者屬虛寒宜溫補

○淡白班與班魚舌相類 班魚舌者屬心脾熱淡白班者屬氣虛出齐後將虛寒

之兆也急宜溫補甚則淡白或虛冷者急宜峻補與之舌轉紅者生純白者死訣曰用峻補之藥陽氣猶脫者死無從治○班班ノテラ訓テホチト白ソニタラニ見ユル舌班トテラ其内班白舌赤アリ淡白班赤大キニ薄レ氣微冷ラ覺エル等ノ症ラ云く

○瘦薄與舌尖相類瘦薄者滋潤而淡紅或淡白或薄長者皆屬心虛痘後氣血虛衰

元氣未復者宜補益舌尖者如相腫舌頭尖細小而赤如火者屬內火

○失榮舌失榮者肝氣虛弱榮血失守則難滿舌滋潤不能榮養血舌上滑而如鳥舌者凶也心肝虛極

○舌硬與舌痿相類舌硬者舌強テ不能言舌痿者舌柔弱不能言是皆類聲哑神元不足也

○緊舌與舒舌相類緊舌者脾虛熱則

舌絡微緊勿用冷藥舒舌者時々伸舌津液竭而渴故也勿投涼藥急宜補益○弄舌弄舌者心脾虛耗即如蛇舌是也○堆腫與堆粟相類堆腫者屬心火○堆粟者一發熱舌上口內出瘡如堆粟稠密者亦也五內爵過神氣衰耗則邪火上炎發口舌先瘡出二三日宜清涼解毒必如蟬窠水食不入者死

腐熟與蟬窠相類二症俱屬心脾虛

興補湯則十救二三

○青藍與青白相類二症屬氣血虛

○褐色與膚色相類二症俱無胎成其色者初因血熱血毒成諸症遷變為虛寒者多々也

○名上黑痘發熱未見餘痘先舌上生黑癟点者逆也出奇後沉伏而不見者至六七日唾血或嘔血九日十二日死

○乾渴褐卷縮短縮已上三舌必死之懲也

唇舌十八候秘說

唇舌滋潤者表裏俱平和
赤色者為內熱

乾燥者津液虛耗

白胎者內火太甚

芒刺者煎熬氣血

黃胎者表裏俱火熱

黃老而乾燥者攻腸胃

濁潤者裏丸自解

燥裂者火毒焰血中

淡紅者氣血微虛

淡白者氣血虛寒

灰潤者氣血和津液微虛

紫黑者相火為已亡

灰黑者裏寒而藏氣脫

褐色者脾腎破敗

褐色者脾土傷而肌肉脫

純黑者陰門氣乘平陽位

已上十八舌辨痘症之陰陽虛實之繩墨也
捨之無他法矣

○此十八舌之秘說皆之肝心之門人ニシラ
ヨシヨサセテ賞ニヤウニ指南アリ度更ニ

○舌出唇外紅潤 舌出唇外而紅潤尖圓豐滿
滋潤血榮鮮明者氣血充實初發雖有吐沫
鼻衄諸症反為美矣痘出淡紅明潤磊落
神情清爽寢食二便如故易長易濃易膚
易癒者神元固^古于內故也始終美之徵也初服

藥反之則復也

○舌出唇外紅赤如火 舌出唇外而紅赤如火薄胎
透明一二日而白胎如粉或乾燥非常者復也如皮
膚堅厚肌瘦帶微黑之粉者此骨勝肉也再覓
眼中神光^ヲ聲音清亮者此氣血盛雖其痘隙
至五六日期一臭矣自解轉順^{アリ}也如淡白虛冷
者出布後不可虧溫補^ヲ如六日後瘡色平脂
根暈塌陷不起脹者急宜峻補

○舌出唇外赤色如朱無胎 舌出唇外而赤色

血熱

○如朱無能身熱口煩出瘡赤紫乾紅滯色者
血熱也急宜清涼活血之劑或三圓赤紅中央
白脂透明出瘡赤色欲出不出或出而不快者
氣虛毒壅或氣虛血熱或從外症沙癬之
此皆陰而兼逆者也如誤失治則逆而加逆
致不治者多若錐出唇外吐舌舒舌舌緊弄
舌純白舌上黑痘者火之徵也

臣內不伸

舌有脣內不能伸

舌純白舌上黑痘者火之徵也

心氣也些口赤色如火乾洪燥列石島峻峻，

卷之三

血中宜涼血解毒。羞紅赤面中藥白脂。大便
赤。有大便赤者。宜涼血解毒。羞紅赤面中藥白脂。大便

卷之三

彼不之利而後唇舌得潤色者生矣不則死

如唇舌滋潤者，雖見急症，切忌妄下，致人

而有處內而無外誰能
能神者清氣之體無到不化由一者一氣

病也。清潔而不潤澤，不能伸者，心臂俱虛也。淡

紅而身熱，忽自汗，兼見吐瀉者，不論癟未

忌
切
毒
下

現^セ已^ノ現^{アリ}之間^ノ惟宜升陽神施^ス出府^後宜溫補
如淡白而乾燥者津液下陷^シ如中間現^ス雜症者依
虛之例宜治之如淡白而大便秘秘至四五日猶未通
者妄行^シ下法^ヲ此內虛津液耗虛也至五六日候
自便利者以急宜峻補若誤失溫補則致氣

脫^シ九日十二日死^ス

○舌在唇內紅赤乾燥

古在^シ唇內^シ而紅赤乾燥心

煩口氣粗睡卧不安狂妄譁語^{アリ}火毒內壅
險也如白胎失^シ紋路^ヲ黃黑而乾燥或^シ舌刺

一者逆也急宜清涼解毒如大便秘祕結者急微
利之如白胎透明故茵欲出不出皮膚乾枯無
汗者表實毒壅也急宜解毒發表至三冒大
便祕者少可行下法^ヲ如及^シ出奇之期舌滑潤
者內火自解不宜清涼愈唇乾燥而黃刺
變赤刺^シ赤變紫而乾黑者死^ス若舌上如堆粟
如蜂^蜂窠者逆也咽喉腫痛飲食不入者逆也
声啞嚙水錯喉者逆也至出奇期^ヲ陷伏不起
者逆也四日後失起綻之勢者逆也六日後平

脂灰白根暈塌澗者逆也六日後失血喘呼脇鳴下氣者逆也至屬期皮薄易破者逆也寒戰咬牙者逆也屬後發驚搐者逆者尾唇舌滋潤而至屬後新生白脂者風寒襲於外也為逆發驚搐者死

舌在齒內不能伸

舌在齒內而不能伸者

多為寒臨于痘欲驗舌或用情話或以湯水漱干唇舌不能出者雖標毫無故睡卧安常二便快通此皆神氣微虛也如出齒後

邪火漸退則宜補益如舌紅潤而不能伸者心先受傷也如赤色乾燥而不能伸者腎先受傷也如白胎乾燥而不能伸者肺先受傷也如黃胎焦黑而不能伸者脾先受傷也如黃不能伸者熱毒煎熬藏府至出脊後不解者逆也亦紫黑而乾燥不能伸者火毒焰血中險而兼逆也淡紅或淡白而乾涸不能神智氣血虛耗津液下陷陰而兼逆也在初發不失治則十三枚二三在出脊後原陰而兼逆者

九死一生加逆而加逆者死不治若舌在巣內而雖不能伸柔弱而黑舌故榮血鮮明滋潤上下轉動縱橫無定任意者此謂有舌神之例而不可論

○舌在巣內如屈

古在巣內而如屈者心胆虛耗也故為逆ト如紅潤而如屈者肝火盛多驚搐在初發無妨在癥後必為逆ト古乾燥而如屈者內火熾五液竭逆也舌赤紫而齧出者血熱太甚險而兼逆也舌紅赤而如屈者毒



壅血肉脾氣受傷失表之過也在初發治之則十三救一二一在出齊後險而加逆者不治矣如舌在巣內如屈而不能伸者五臟之精氣下脫之徵也如舌雖轉動不和者舌尖向上對而無紋路中央如平背者舌神已欲竭之徵也死在旦夕

○舌在巣內純色

舌在巣內而純色者亦逆也白赤灰紫黑褐齧青鹽或生芒刺乾黑者或焦紫乾枯而無紋路者潰爛如者熟者

溫潤而全無紅色者亦如离肉者木舌舌硬
裂濺血者卷縮者死候也

