

郷食庭秘説

水腫
小瘡内攻
脚氣
三十

+武
245
27



門中武
卷 245
27

水腫治法只授

水腫病因

急腫治法

急腫漸腫之別

水氣急變

脚氣腫

心下痞堅水腫

水腫下利

水腫惡寒發熱治法

新塩

急腫額上見青筋

水腫脈伏

積氣腫滿

水腫後氣急

急腫咳嗽

急腫并

漸腫并

虛腫并

水腫死症

水腫食物

急腫用方

漸腫治法

水腫治法

極重水腫之形狀


脾胃虛損水腫病因

澤下劑取害

水腫凶脈



水腫舌胎吉凶
水腫大便秘結
水腫除中
水腫血症
水腫禁鹽
水腫林不浴湯
水腫禁房事
水腫實症治法



九折堂
氏圖書之記

癩良辰家秘說卷之三十

水腫口授 ● 水腫治方 凡水腫ヲ治方初

漸腫治法

癩時水腫ノ氣味ヲ覺ヘシガ段ニハ九時ノ療
治方為方ハ小便ヲ通ス方ヲ先ツカヘテ午ヘス

待水勢極

其水腫ヲ十分三ツラセテ置テ而其水腫ノ勢ノ
止ル時ヲ候テ后利水ノ方ヲ用ユヘシセテ其水腫

量便

モハヤ十分ニハルカ未タ十分チカサルカヲ知ラト思フ
先ノ毎日ノ小便ヲ量ヘシ譬ハ前日ニ合通シ次日ハ
壹合通シ今日ハ僅ニ五合通シタリト云段ニ小便ノ



氣相争ヒ大キニ病状ニサカラヒ返テ諸瘕ヲ引起シ
ツイニ難病トナル者多シ然レモ其甚キニ至テハ世ノ
常ノ利水ノ方ハ二ワリ遠シトテ甘遂桃花芍牛子
巴豆ノ類ヲ以テ大ニ水ヲ浮下スル瘕治シスル医者有
是ハ甚キ誤ニ和漢此ニ此誤カラス又一種有甚キ水
腫ニラケテハキシヲヤフリテ針ヲタテ水ヲ取ル人モ有
是ハアヤマリノ又誤カ者ニ其証候ニハ水ヲ取ラ又以前
ヨリニ培益ニ水腫ノ勢ガツル者ニ尤モ其當坐ハ
少シ腫モ減カスルヤウニ見ユレト遂ニハ水腫一重^片

前ヨリモ大キニ重リテクル者ニ復ラ以テ其治方ノ非
在リヲ知ヘシ

水腫病因水腫ハスヘテ脾胃ノ虚損ニモトキニテ
療治ノ大本トスヘキ事宜シ其証候ハ脾胃ノ虚損ニモ
トキキ小便不利ニヨル者ニ元ヨリ大便ノ不通ヨリナシ
非ス故ニ下劑ヲ与フル時其病ノ治セサルニニアラス
返テ脾胃ヲ敗リ大ニ害ヲナス之其二ハ餘病ニモ
或ハ無病ノ人ニ至モ數々水浮スル時ハ必小便カ不利
スル者ニ如何ナク愚昧ノ人ニテモ此道理ハ知ルヘキ

古又九二大医ト呼ル人モ攻利撃手劑ヲ用テ大ヒニ
水ヲ浮スル時ハ一度昂効ヲ得ルヲ知テ其業勢
をスレハ其腫モ亦スニ培ニテウレ事ヲ知ラヌ猶業
カノ足サレトシテ遂ニ攻撃手劑ヲ投シ其手ニ死
者數ヲ知ルハカラズ

急腫治方 前二論スル通り水腫ノ治方ハ其一陪ニ
腫シ満ル時ヲ得テ利水ノ方ヲ行フト効ル者ハ急腫
ヲ治スル方ニ非ズ漸腫ヲ治スル方ニ急腫ハ此例
非ス若シ急腫ヲ治スルニイタツラニ水腫ノ満ルヲ

急腫速断
塩利水

待ツ時ハ水氣心下ニセテリテ遂ニ大病ニ至ルニハ
急腫ヲ治スル方ニ早速ニ塩タチヲ急ニ症ニ從
テ利水ノ劑ヲ用ヒテ治スルニ塩ヲタチ時ハ多ク心
下ノ水氣ニ元元者ニ惟漸腫ノ者ハ其水氣心下ニ
乃チ元元故ニ何程水氣十満スルハ恐レハニ足ス
前ニイフ通り是漸腫ノ症ナレバキツト満腫時
待ヒテ決メ難クハキ事ニ非ス

急腫漸腫ノ弁 スレテ水腫ニ急腫漸腫ノ二アリ
此ニテ見分ケハキ復水腫ヲ治スルノ肝要秘要ニ

急腫漸腫
之別

漸腫ハソコリト腫シ出テ遂ニ大病ト是漸腫
ノ症ト云又急腫ノ症ハ急腫テ四五日ノ内大病ト云
是急腫ノ急腫ノ治方ハ塩味ヲ禁シ利水ノ劑ヲ
ヘテ急ニ治スヘシ漸腫ノ治方ハ前通り小水ノ不足
スルヲ待テ病勢ノウリキツタル処ヲ候テ利水ノ劑ヲ
施シ塩味ヲ禁ス是漸腫ヲ治スルノ方ニ詳ニ前ニ
奉ル通りト此ニ畧ス

治法亦異

水氣急変 スヘテ水腫ノ病人ヲ受取ルニ心得者
先心下痞塞ノ方坐里ノ動ハゲシクサレ身ヲ動カセ

水氣集于
心下之症

大ニ息ヲキラヒ又医者カ指ヲ以テ鳩尾ヲ推テ
甚息ニサツチ苦ム且ソレ不食スル者有是ハ水氣ガ
心下へ集ルノ症ハ此症其腫カシト云ハ凡カウシク
心得ヘカラス多ク急ニ変ラ出スル者有是此症ニ
アハ不量ニ急ニ変有ヘシト病家ハモ其趣ヲ
告ケ知ラセ其上ニテ茶ヲモク又ニ然ラセハ大ニ
人ノアサケリヲ受ル復有心得ヘシ●スヘテ水腫ハ
水ノ心下ニ集ルヲ大患ノ症トスル者ハ心下ニ水集
ルハ兎角鳩尾ヲ推テ苦ク息ツキアラキ者ト決テ

大患症

症候

漸腫

又之有ハカラス是ヲノケテ鳩尾サキニシヤノナキ
症乃チ漸腫ノ症ナリ瘡治ノ主段隨方以テ
ハキ間モ有之是又心得有ヘシ

脚氣腫治方 脚氣腫ノ急腫ノ一種急

腫ハ兎角水氣力心下ニ集リ安キ者ニ其症小
便赤澁心下痞硬虚里ノ動甚ク又不欲飲食
少シ身動レテモ息キレ強ク坐卧不安者
是脚氣腫一ツノ脚氣腫ノ治療ヲスヘシ

心下痞望水腫 水腫ハ體ニ見レタテ知僅

脚氣者急
腫也
心下虚
動短息

腫微而
奈作リ

心下苦甚

見レ氏胸先ヲ苦ク又ハ返テ強ク心下痞望
如番肩背拘急シ咳喘甚ク小便赤澁シ不欲飲
食頭脈及ヒ虚里ノ動甚ク時有テ上衝キ氣
急息迫四肢微令レ頭汗甚ク或ハ周身冷汗出
脈沈微面色モ唇モ共ニ青クテ急ニ死セント見ヘ
ソラスル内ニ又諸症自ラレゾリ如此様子一旦一察
スル莫モ有或ハ二三察スル莫モ有リ甚キ者ハ四五察
至ル者モ有之此症服或手足ハワソシ腫ヲ見ハス
者之格向ヨリ心下ノ苦シ甚キ者之此治法先ス

治方

鳩尾上水
先散則
多腫脹

治同脚氣

大病有息
變

ニヤカニ塩味ヲ禁シ症ニ從テ治ヲ施ス時ハ間快
復ス者有リ是ハ水腫ノ一症ニメ其水氣肌肉
ニ見シス夕、午ニ心胸ニ水氣カ集ルニ若ク如鳩
尾者ニ甚キ之故ニ后ニ鳩尾ノ水氣カ周身ハ
散リ腫滿ト在時ハ返テ氣急息迫等ノ如キ者ハ
返テヤ者ニ是脚氣衝心ノ症ト治方同此症急
ニメ又緩在者ニ然レ大病ノ后此症ヲ發スル者急
變有是ニ格別ノ沙治ニメタニスヘカラス

水腫下利治方 水腫ニ下利ヲ兼ル者ハ先其

先治利

下利ヲ治シ后利水ノ業ヲ与フニ是療治法則

水腫惡寒發熱治方 水腫惡寒發熱脈數

在者先發汗ノ劑ヲ与フヘシ表能ク解ルニキハ

小便返テ能ク利ル者ニ汗出テ小便未タ利セザル

者ハソコテ導水ノ善方ヲ与フヘシ發表ヲ用ル

内ニ利水ノ加味ヲ与ヘカラス是ハ甚療治カニテ亦

効ガキ者ニ

漸腫ノ症咳逆甚ク仗ス莫能ハ

其者ハ利水ノ方中咳ヲ治スル業加味ノ可ク千金

越脾湯ニ五味柴白ヲ加ヘ或ハ小青龍加石膏湯

汗法

漸腫咳逆

是等内見合セニ用スヘシ

急漸禁塩

断塩五日無效可食塩

絶塩味法 スヘテ漸腫ノ症ニ塩味ヲ多ク定法ニ急腫モ亦然リソレニ心得アリ塩味ヲ禁テ後五日ヲ待テ小便ソレガ多ク利セザル者ハ塩味ヲ多クハカラス病人ソレノクニス氣區テ脱ル者ニ是ニハ塩味ヲ元スヘシ塩味ヲ元ス時法ノ如クスヘシ兎角此症多クハ難治ニ其心得有ヘシスヘテ水腫食ホソキ者塩味ヲ多ク又見合スヘシ但シ塩味ヲ多クトモ甚クトモイフ薄クニテ与フヘシ是去夏ヲ得ザル時ナリ

此法食者不行

断塩持長

塩味ヲ多クテ小便快利ニ水腫段々ヘルトイハ索胸腹ノ動甚ク頸脉未ク静ナラザル者塩味ヲ食フ時ハ其腫レ再発スル夏掌ヲ返スヨリモスニヤカクスヘテ水腫ノ症瘡治ニ因テ諸症快全ノ后モ能食スル者ハ三十日或ハ五十日計モキヒシク塩味ヲ多クヘシ頸脉及ヒ胸腹ノ動能ク静ナラフ候ヒ塩味ヲ食セシムル事法ノ如クスヘシ

重症

急腫見筋額上 急腫ノ症額上ハ筋ヲ見ハス者ハ病勢甚重ニ假令ヒ水腫治シタ

吉山

云氏其筋未々々者ハ塩味ヲ安ニ元スハカス
水腫脉状 スレテ水腫ノ脉ハ沈実ヲ以テ吉トス
浮數微細ヲ以テ凶トス是其大概ノ其ヤク
至テハ是ヲ心ニ得テキニ應ス口授ストイハレ盡ク
スハカラス故ニ大概ヲ舉テ此ニ畧ス

平素積氣腫病 平素積氣ヲ病人或ハ日
久シク痰飲ヲ患フ人周身微腫足脛僅ニ
指ヲ没シ或ハ時有テ腫消シ行歩スルキハ足脛
微腫ヲ奈シ飲食平素ノ如ク咳逆甚咳凡

積氣腫病
咳

變虛方

過食身腫

毎ニ痰沫ヲ出ス者多シ是真ノ水病ヲ云
本病ヲ治スルノ方中咳嗽ノ加味シテ可シ然レ
久ク咳嗽ヲ患フ人痰血ヲ吐シ動モスハ虚覺
変スル者多シ滋味過食スルキハ変メ腫凡
者モ亦アリ飲食ヲ節シ房事ヲ慎ミ艾炷
數萬壯ヲ施ストキハ虚方水腫ノ患ヲ免テ快
愈ス心氣爽成ヲ以テ輕息スハカラス脈疾數或
浮大在者ハ凶沈実或ハ緩又有力ヲ吉トス真餘
脉診腹候諸症ヲ能精審ニスヘシ

診候

病危元急不可忽

水腫後氣急

法如少塩味ヲ多ク小便快利

九

周身ノ水腫全快ノ后是猶氣急喘息ヤテ虚里ノ動甚キ者其急変ユタニスヘカラス水腫治スルヲ以テユルカセニ思フヘカラス恐ルヘキノ甚キ者之

●予一人ヲ治シタリ夏有緒形氏内人水腫ヲ

患フ張氏カ医道ノ中満分消湯以テ十二九

治スル夏ヲ得タリ然レ虚里ノ動甚クナリ二三間

モアルケハ息キレ甚ク又鳩尾サキヲ推テ見ルニ

ヤレ按メモ痛ム氣味有テ息ニサワリ難クスル

氣味有テ是ニ依テ病家ヘコトワリテキヒシ塩

分ナクサセ又行水ヲ戒ル事百日ニカキルヘシ此

ニツノ禁物ヲ侵ス時ハ必再ヒ水腫ヲ病ヲ治ス

ヘカラストコトワリテ休業シケリ后アリ體ノム

サ事ヲイトヒテ行水ヲモセリ又塩味モ喰ヒケリ

四五十日ノ后程ナク又水腫起リケレ如クノ病ナリ

又後廿日餘ヲヘテ死ケリ。又一人水腫ヲ病リ是

モ中満分消湯ニテ十二九治シタリ二里先ニ無

枚用事有テ川ヲ越シテ行キ其後水腫ヲ

咳嗽

又病テ是モ四日斗テヘテ死ケリ此水腫后ニ
塩味ヲ喰ト水ヲ遣フトハ大ニ忌ム事何程快
氣ニタリ此ニツノ禁物ヲ侵ス病人医者全
快ヲユルスヘカラス早ク其趣ヲモトリテ瘡治ス
ヘカラス是水腫ヲ治ス心得ノ第一丸者ニ

急腫咳嗽

急腫咳嗽ヲ兼ルモノ居多ク
其腫滿腫ニ至ラス痰喘咳逆甚ク或ハ咳無
氣急息迫テ臥ス莫ク又ツ心下痞塞飲
食ヲ欲セス脈疾數或ハ浮虛而大尤者治

症候

ニ至ル者多ク又漸腫咳逆甚キニ因テ臥ス事
アリツル者アリ此例ニアラス

急腫弁

スヘテ水腫急腫ノ症有其症心下
痞堅ニメ不欲飲食脈沈テ疾數或ハ浮
ツ帯ヒ心下大ヒニ動氣之虛里ノ動ハケニク氣
急嘆息ノ不能卧、小便赤澁尤者是ヲ急腫
ト云之脚氣腫諸瘡内攻ノ水腫皆急腫ニ
漸腫ノ弁 漸腫ノ症、腫滿ス下ニ在氣急
不息迫、飲食半ヲ減之或ハ常如ク食不減

症候

心下僅ニ動氣有テ胸腹ノ動モハゲシカラズ脾又緩
或ハ沈細シテ力有リ小便赤色不能安卧云云凡枕
ヲ高フスルトキハ眠ル莫ク得ル者是漸腫ニ

虚腫弁

又虚腫ハ腫満ス下云凡能安卧ニ飲食

症候

常如ク或ハ食ヲ噎ハ又病人モ有小便不利モ亦甚
シカラズ面色モ青白或ハ赤色モ有リ指ノ頭ヲ以テキ
足ヲ推バクホシテ不起脉微細或ハ浮虚テノ無
力虚里ノ動微テ心下急迫チラセ凡者是虚腫
ノ形状之蓋ニ水腫ノ病云ヨリ脾胃ノ虚損ニ

凡トイヘ凡見症此三等ニスキズ此三等ヲ分明
スルトキハ治ヲ施スニ経テ其旨ヲ得

水腫死症

水腫能ク食スル者ハ吉之不食者

凶之漸腫下云凡不食スル者ハ多クハ不治ニ至ル
是ヲ以テ水腫死生ヲ決スルノ大割トナスニ水
腫ハ脾胃ノイタミヨリ起ルト云夏是以テ知ヘシ

其一

其腫上シハシテ下ニシテ下シテ上ニシテ下

手足ニシハシテ腹背ニシテ如此ハシニムラカクモハ

后多クハ不治ニ至ル●心胸以下腫強ク心胸以

其二

上肩背面部少シモ腫ナク肉瘦テ骨ヲ見ス者

其三

其四

必死候之 ● 手足腫強ク胸腹背少シモ腫ナキ者ハ
是亦必死ナリ ● 老人或ハ大病后ノ人水腫ヲ患ヒ

胎突出シ足心平皮膚層ヒイトロノ如ク光リ皺有
テ是ヲ按ハ腐レル瓜ノ如クシテ不起腫甚ヤワラ

其五

其六

力丸者必死候之 ● 虚腫テ手足少甚カキ水
腫ハ又必死之 ● スベテ虚症ノ水腫舌上ヲ見ルニ

是乾燥シ黄白胎厚クカルモノ多クハ不治ニ
至ル或ハ又舌上白胎滑テ水ニ沈ルカ如ク赤

附子之症

其七

其八

其九

其十

色ナキ者カズク附子劑ヲ与テ其舌赤色出ザル

者ハ其終リ不治ニ至ル ● スベテ水腫腹痛スル者ハ

惡症之皆桂附ニ宜キ症之桂附ヲ投メ効ナキ

者ハ是亦不治ニ至ル者多シ ● 水腫謔語ヲ發

スル者ハ其死ニ三日或ハ四五日ヲ出ス ● 虚腫初ハ

喘ナク日久メ微喘ヲ發スル者ハ其死近キニアリ

● 水腫小便ス、ノ如ク或ハ黑豆ノ汁ノ如ク或ハ赤土ヲ

ホメテ丸ノ如ク濃ク子ハリ有テトロトシタル者ハ是

亦多クハ不治ニ至ル者之 ● スベテ水腫俄カニ小便快

利水ヲ器ヨリカタムルカ如クニ通シ腫忽チ引者是
虚脱ノ至極ニ此症十人ニ九人ハ死スル者ト心得ヨ
世医此腫ノヒキタルニ迷ヒ本ノ快氣下ニ得者ヲ
ケカス医者有スヘテ腫ハ初メ一合通シタル者カ三合
ナリニ合カ三合ニテハ三合ヨリ五合ニモ八合ニモソクト
スヘテ行ノガ多ク助カレク●水腫塩ガチヲシテ小
便通利ヲ得ソクト常ニ復シ五日或ハ百日ヲテ
后再登スル者有リ是多クハ心下ノ水氣未タツキ
ナル内ニ滋味ヲ喰ヒ或ハ房事ヲ侵シ或ハ洗湯水

風呂ナドニ入ルニ依テ其腫再登スルニ先キニ効シ有
クシテ病家又重子テ療治ヲタムルニカタク辞メ
第ヲ与フヘカラス必死ノ症ニ●スヘテ水腫ハ全快ノ
后心下ニ水氣アルカナキカラ能クタメスヘシ其水氣有
カ無カラタメスニテ又ツ医者ノ手ノ指先ヲ以テ病
人ノ胸先ヲタシク強ク按メ見ルニ按メニテ此位ニ
推シテ息ヘヒクカ息切テモカト問フヘシ其時
病人答テナルホト息カキシトカ痛ムトカ苦フコ
カ中カ胸ニ何ソ苦キ処有ト云ハ是未タ心下水

氣熟トツキ、ラ又故クソシテ六病家（其謂シラ
 云ヘシ何ホト體ノ水氣ハ引テ全快ノヤウニ見ユルハ
 一々行末へ如何有ニヤ予ニ疑テコ、ロモトナレト云ラ
 旨ラ病家へモコトナリ云テ某モヤメサスヘシ是水
 腫快氣ノ后ヲ療治スル心得ノ才一ノ水腫ハ房
 夏ト水風呂ト塩ト此三色ヲタ、子ハ全快ハ決メ
 ナキ者ト心得ヘシ ●水腫ノ症下利或ハ痢病ナ
 ドノヤウニアトハハツテ難美、或ハ膿血ヲ下シ或ハ難
 子白ノ如キ者ヲ下スハ多クハ不治ニ至ル

其十三

其十四

脚氣脱症内
 攻腫脚死

●急腫ノ症吐ヲ加ヘ虚里ノ動事ノ外強ク食
 事口ニ入ル、イラ欲セス脉沉微或ハ浮虚是ヲ推ハ
 絶スルカ如ク四肢微冷頭汗出テ喘急煩燥者
 必死ノ候ノ脚氣腫諸瘡内攻ノ水腫ヤレテ死ト下
 スル者皆此症ヲ見ハス ●多年瘡毒ヲ患ル人又
 ハ大病后ノ人水腫ヲ發シ滿腫ニ至ラズ喘急モ
 ナク心下痞塞モナク食モ能ク喰ヒ脉浮弱或ハ
 遲ニテ微其腫指ノ頭ヲ以テ是ヲ推メ見ルニスミ
 ヤカニ起ラサル者是等ノ症セテ、ニ食減シ或ハ泄

梅毒發腫

其十四

其十五

浮し或は重急后重し或は難子白如キ者下
 者ハ皆石治ノ候之 ● 塩多キヲ一テ一身腫引トイハ
 尺息ギレヤマス虚里ノ動甚キ者ハ其死急ニ下リ
 ツル者多シ水腫引タラ見テ安堵息ヲナスハ
 カラス ● 急腫ノ症咳嗽ヲ兼ル者遂ニ多クハ
 死ニ至ル ● 右十九ノ箇條經驗ノ症ノ病人ニ對シ
 能ク同ヒアキラメテ處スヘシ是心得才一丸者ハ
 水腫食物 塩ヲ禁スル間ノ食物ハ昆布ヲ能ク煮
 シボリテ水氣ヲ去リ輕節ヲ入シ酢ヲカケテ菜ト

其十六

ナスヘシ ● 常ノ大根ナニスニ塩ヲ不用輕節ヲ入テ
 喰フヘシ ● 白瓜黄瓜ノ菜ヲ塩ニテモ塩氣強ク
 スヤウニ能ク洗ヒカスニテアヘモノニシテ菜トナスモ
 ヨシ ● 黄瓜ノナニスリウキウ草ニカシカキ梨ノ
 菜皆菜トナスヘシ常ノメシハ二度ヤキメシ喰ヘシ
 尤モヨキ茶ヲカケテ喰フヨシ塩ヲ禁セサル水腫モ是
 ヲ喰ハシムヘシ能ク食スル病人モ食物ハ常ノ半分
 程ヲ減メ喰ハシムヘシ必飽ニテ喰ハシムヘカラス赤小
 豆カニ黒豆ノカユノルイ甚ヨシ ● 水腫ノ症全快メ

復塩法
漸加

ソウク塩ヲ喰ハモ能ク見ユル病人ハ塩ニツケヘシ
其法初メ一日ニヤキ塩三分ヲ喰ハシ其次日六
分ヲ喰ハシ又其次日八九分ヲ喰ハシ如此三日
ソリツト倍ノ喰セ或ハ菜大根ノ香ヲ物一ト片或
ニ片三片ヲ水ニミ冬シ塩ヲ出メ喰ハシムヘシスヘテ
如此スル夏十四五日ヲニシテシカラ味噌汁ヲ湯油
ナトニアリツケワロクト喰ハシムヘシ漸ク三十日ヲニ
シテ常ノ食ニアリツカシムヘシ兎角饑タレ人ニ
食物ヲ食フルカ如ク一度ニ塩氣ヲ沃山ニ食フ時ハ

諸症再ヒ奈メ難治ノ症ト云此戒メヲ用ヒ凡病
人ハ瘡治ラフコトワリテ菜ヲ遣スヘカラストコトルヘシ

急腫用方 越脾加木湯 水腫熱有テ大便秘

口渴煩躁麻痺スル者ヲ治ス舌上白胎惡寒スル
者ハ附子ヲ加フヤク應シ心下ニ痞硬スル者ハ吳茱

萸ヲ加フ

大拱椰湯 水氣心下ニ集リ氣急喘息甚シキ

者ヲ治ス

小拱椰湯 水氣心下セメ氣上リ衝ク者ヲ治ス

越脾

大拱椰

加味法

但咳嗽喘急強ク心下痞硬スル者ニ吳茱萸
桑白皮ヲ加フ古上白胎消アル者ニ附子ヲ加フ或
童便ヲ加ヘ或ハ黑豆ヲ加ヘ或ハ一角犀角ヲ加フ心得
有外ニ口傳アリ白胎消是附子ヲ用ル肝心自的
ナリ心ヲ用ユヘシ

十七

附子

吳茱萸湯

水毒心下ニ集リ嘔吐甚キ者ヲ治ス

川芎散

水毒心下ニ集リ欲吐者ヲ治ス

浮萍湯

諸瘡内攻ノ水腫ヲ治ス

漸腫用方

麻黃湯水腫惡寒ヲ治ス

六黃

喘咳ノ者ヲ治ス

小青龍

水腫喘咳甚キ者ヲ治ス

六附細辛

麻黃附子細辛湯 水腫心下痞硬咳嗽喘急スル者ヲ治ス

治ス

越婢

越婢加木附子湯 或ハ桑白皮吳茱萸更ヲ加フ治症

前ニアリ

大抵温

大抵温湯 胸腹及ヒ一身腫滿者ヲ治ス

桂苓木

桂苓木乾湯 水腫頭眩心下悸スル者ヲ治ス

五苓

五苓散 水腫口渴ノ者ヲ治ス

猪苓

猪苓湯 小便淋瀝スル者ヲ治ス

腎氣

腎氣丸 水腫小腹麻痺スル者ヲ治ス

虚腫用方 眞武湯 水腫舌上白胎消小便清白

或下利ノ者ヲ治ス

眞武

水腫六診秘説 世医者水腫ノ病人ヲ見テ是ハ虚

腫ト云フ療治メ効ナキ者有是存外虚腫矣メ

其实ハ腫ナク者アル故ニ某効ナキ者有又実腫ト思ヒ

是ヲ療治メ効ナキ者有是存外虚腫ト云腫ニ

非ス故ニ効ナキ者有左スハ世医者ノ虚腫ト見タテ

実腫ト見タテハニ存外ナカウ事有其ナカウハ此

六診ニ違セサルカスニ虚ト云フモアテニテラス矣ト云フモ

アテニテラス此六診ヲ以テ其瘳ヲ極ルニ虚ト云ハトコニテ

毛虚ニメ相違ナク実ト見レハトコニテモ其ニメナカヒレ

故ニ虚実ノ明ナルヲ得ト思フ時先ツ此六診ヲ明ム

ヘキ復ニ六診ト云ハ先ツ才ニ眼中ヲ診テ虚実ヲ知リ

動氣ヲ候テ虚実ヲ知リ脉ヲ診テ虚実ヲ知リ

皮膚ヲ診テ虚実ヲ知リ水腫ヲ診テ虚実ヲ知リ

腹ヲ診テ虚実ヲ知是是ヲ六診ト云之此六診テ

眼中虚実

動氣虚実

皮膚虚実

水腫虚実

脉虚実

虛実問

六ナカラ虚瘧ヲ見セハ是トコカトコニテモナカヒキ虚
 瘧又此六ツヲ候テ実瘧ナレハトカトコニテモナカヒナ
 ク言テ瘧之又此六ツヲ診フニ三ツ言テ瘧有テ三ツ虚瘧
 ヲ見セハ是虚実拾半ノニル処ノ水腫ニカヤウ決定
 スルヲ虚実ヲ決スル弟秘説ト云之●先ツ眼中ヲ
 診テ虚実ヲ知ルハ眼中ノ様子腫子ノ見張カイナク
 何トナク眼中ニ虚瘧ヲ見ス者^{アム}是虚眼之又眼中ヲ
 見ルニ眼中サウヤカニメ思ノ外眼中リニトヒキタテサ
 ワヤカニ見ユル是眼中ノ実之●スヘテ動氣ヲ診テ

眼中

動氣

脈

虚実ヲ知ル法水方ノ動氣ヲ初トメ其外頸ノ動氣^{ノヒメテ}
 虚里ノ動氣腎圓ノ動氣ヲ診フニ其動氣トリ
 シメ方フウクトニリナク又カブリ指ニラヌルハ是動氣
 ノ虚也又ニリテフワカス皮肉ノソコニ隠シユルカスソ
 クリトニリ有動氣是言ノ動之是動ノ虚実ナレ
 者之●又脈ヲ以テ与虚実ヲ知ル事ハ六脈カ推メカラ
 凡是脈ノ言ク推メカラサキ是脈ノ与虚脈ノ虚実
 ノ實皆人ノ豫メ知リナレハ其与虚実ヲウシクク
 トク者フニ及ハス是脈ノ虚実ナリ●次ニ皮膚層ヲ

皮腫

實腫
虚腫

診テ虚実ヲ知ルハ其皮層ニミリヨク充実シテ
ツヤヲ失ハサルハ皮層ノ実ニ是ニ反スル者ハ皮層
ノ虚ニ○又水腫ヲ診フニ其實腫ハ其腫ニツヤリト
シテ堅ク勢有テ千ニ推セハ凹ニテ牛ヲハナセハ千
元ノ如ク肉起ル是実腫ノ形状ニ虚腫ハ是ニ反
其腫ニ熱ナクフウクトヤワラカニ是ヲ推セ其ア
ト急ニ起リ難ク甚キ者ハ推メアトニツヤ有テト
難ク腐レタル瓜ヲ推ス如クニトフクトツメハ千キ
ハ六是虚腫ニ○又腹ヲ診フニ腹ニ味線ノ系ヲ

腹診

氣息
古胎

ツリタル如クツヤカニツタケタルハ腹ノ虚ニ又腹部
充実メ其皮ヲツカメハ肉トモニアカリ皮肉一體メ
離レサルモハ是ノ腹ノ實ニ是之ヲ六診ノ虚
実ト云此外ニ息ヲ以テ虚実ヲ知ル法有古胎
ヲ以テ虚実ヲ知ル法アリ古胎ノ虚実ハ別ニ説
有リ息ノ虚実ヲ知ルニモ又説有此説ハ諸書
ニテアリ其大概ヲ知ルニ足レリ加様ニ一々引合セ
見ル時ハ其虚腫実腫ヲ決スルニ其各イアル
ヘカラス猶々此心得ヲ以テ虚実ヲ決セ其診察

十人十人虚多ヲアヤルヘキ事アラズ能ク修
行スヘキ事ナリ

腫甚而
皮膚有皴

極虚水腫之形状 其水腫ノスカタヲ見ルニ腫
甚ク有リナカラ皮膚層ニハヨリテ不伸者大虚腫
ナリト知ルニ腫多キ者ハ多キナリヨリタルニワモ
ハルカ常ニ此症ハ腫ナ分ニ有ナカラシワヨルト云ハ
水毒ガ裏ニケリ有テ表ニ出カ又故ニワ有之是
元氣ノヨリヨリ水氣ヲ表ニ送ルカラガ無キ故ニ
シワガヒヌク多クハ泡瘡ノ虚症モ内攻スル理ト

七倅羸瘦
下体洪腫

同事之又一ノ虚腫有其症皮ハ一ハ二腫テ見ル
症腹腰ヨリ下ニ夥ク腫有ナカラ臂肩胸背ナ
トシ見ルニ甚瘦コケテ甚キ者ハ骨ノ見ユルホトニ
瘦ル者有是又大虚ノ水腫之右ノ二症多クハ不治ニ
至ルナリ其病人元氣能クトモカクニシテ瘡治ヲ
受合ラヘカラス

脾胃虚損水腫病因 スヘテ水腫ノ症虚症
ハ元ヨリ脾胃虚損メ水腫トナリテナガヒテニ其
腫ト云ヘ氏脾胃虚ヨリ奈ノ水腫トナリテハ

攻撃ノ劑ハ用テ益ナシ止ム又ヲ得ヌ用ルモ惟小
 便ヲ利スル中ノ僅カク中ノ計策ニ此心得ヲ以テ某
 ヲ調合スハ是水腫ヲ治スルノ肝心ノ心得ニ予此
 病ヲ深ク不考ヘ皮一ハイニ腫タル満腫ノ症アハ
 必巴豆甘遂花牽牛ノ類ヲ以テ浮下ヲトリ過
 之惟一時ノ快キヲ取ルニニテ其全効ヲ治ス
 事是稀ニメニサカニ効ヲ得ルコト有トイヘ凡多クハ
 遠カラ花内ニ再ビ水腫ヲ病ニ返シ遂ニ死症ト
 尤事數多シ此時ニ中テ多浮水ノ術ヨリ外一向

主段ナケハ水腫ハ治スヘカラ花内症ト心得テ水
 腫ノ療治手カラハナキ者ト心得テ居タル久シ
 其后六診ノ法ヲ以テ治メ見ルニ相應ニ効ヲ取リ
 ナリ是予力経驗ニ

浮下ノ劑取害説 水腫ノ症小便ヨリ通セヌ大
 便ヨリ浮下ヲ取ハ一向ニ益ナキ者ニ假令ヒ五十日益
 有トテモ大便ヨリヌキ凡水ハ程ナク元ノ一培カケテ
 多ク腫ル者ニ是數度手ニカケテ覺ノ有リハ
 是水腫ノ一大概ニ

虚腫脈緊
洪大

水腫凶脉 水腫ノ症種々虚症ヲナラズベク
虚腫下ナル病人其脉ヲ見レハ反テ弦緊洪大ニ
是ヲ推セトモ其脉勢弥盛ニテニツヤナリ指ヲハ
チクヤウニ打者ハ是極テ必死ノ脉之妄ニ瘡治ヲ
設ケ合フヘカラス

- 一 **水腫舌胎吉凶** スヘテ水腫ヲ舌胎甚薄ク白胎ニ潤ノ有ハ実腫ノ輕症也○又厚ク白胎黄胎ナル者アリ水腫ノカタキト脉ノカタキトヲ参考シテ其虚実ヲ辨スヘシ○又白胎ニテ如枯骨ノ乾燥也
- 二
- 三

- 四 者多クハ大虚ノ舌也○黑胎ニ虚実ノ區別有此
- 五 舌口接ニ非レハ分チカタシ○又白胎厚クカ、リ或ハ黄色ニメ舌ニ胎ナクス、ノ如クテ潤凡者皆虚腫ニ○又舌胎ナク火ノ炎ノ如ク乾燥甚ク或ハ白灰色ニテ乾燥甚キ者共ニ極虚不治ノ舌ナリ
- 六
- 七 ○白胎黄胎或ハ胎ナク赤色ナク舌ニテモ舌ノ左右ノリ通りニ紫黑色ナ班点有モ是虚症ノ水腫ニメ血毒有ノ舌之此病人先年瘡毒ニテモ病ハセヌカ又ハ若モ知シ又出来物ナトニテモ煩ハセヌカト

問ス人シスヘテ諸症共ニ舌ノケルリニ紫黑色ノ色ヲ
生スルハ皆瘡毒血毒ノ目的ノト知ルヘシ此外舌ノ
見ヤウニ數多有レ氏色似ヨリテニギシ安キユヘ
此ニセズスヘテ脈ト舌ト共ニ水腫シノクニ非ス
万病皆此心得ヲ以テ瘡治ヲナスヘシ

水腫大便秘結 スヘテ水腫大便秘硬尤ヲ言トス下
利スル者ヲ虚トス云トス○又大便下利モセス秘結モセス
意平日ノ通りニテ一日ニ五六度モ通スル者アリ又裏
急ノ心持有テ晝夜ニ五六度モ通スル度毎ツ二

大便ヲ催ス症有此症皆大虚ノ水腫ニト知ルヘシ又
上ハ瘡瘡下ノ氣ノ症ニ虚症有ト同シ此條口授有

水腫血症 水腫ニ吐血下血スルハ多クハ石治ノ症ナリ
安シ然レ十内ニ一ニ六救フヘシ能ク診候ヲ詳ニスヘシ
此症有テ后水腫ヲ奈スル者ヲ云ニアラス水腫ノ内ニ
症ヲ帯ルヲ云フナリ

水腫除中 水腫ニモ能ク食スル者ニ除中ノ症アリ
ユダシスベカラス食ノスニハトテアチカチニ吉症氏定メ
カタキ又アリ心得ヘシ是等ハ脾胃損症ノ至極ナ

者ナリ

水腫禁塩味 スヘテ水腫ヲ病ム人ニハカタク塩ヲ
 禁スヘシ麦飯ヲヤワラカニタキ昆布ヲ水煮ニシテ
 其煮汁ヲ麦飯ニカケ喰ハスヘシ汁ノ内ハヲロシ大
 根淺草海苔ナトヲカケテ喰モヨシ又或ハ昆布ノ
 塩ニテ冬瓜赤小豆ナトヲ煮テ喰ハスルモ甚宜シ
 鳥獸糞ハ云フニ及ハス其外膏粱ノ者ヲキヒシテ
 禁スヘシ惟前ニ云通りノ至極淡薄ナル食ヲ云フ
 へシ而病人食進ミテセヨヨ食セト云クワツカニ

一碗半ヲ云フヘシ必病人ノ望ミニニカセ食サスルハ無
 用ナリ大食スルハ脾胃ノ氣不轉脾胃ノ氣不
 轉時ハ水道不通故ニ淡薄ノ者ヲ食セシメ塩ヲ
 禁スルハ水道ヲ利セシカ為人是水腫ヲ瘳スルツノ
 辛クテニ○スヘテ水腫病治メ后五百計モ塩ヲ禁
 弥再奈ノ氣サシナク見元ナラハ其時ハシメテソコト
 塩ヲ喰ハシムヘシ或人問テ云水腫ノ症ニ塩ヲ禁スル
 其謂如何答テ云塩ハ能ク物ヲ引シムル能アル者ナリ
 假令ハ鳥者ヲモ冬ト思フニ塩ニツケテヲクト其形

状を^シスシテ久シクモ^テ居ルナリ是塩ハ物ヲカ
タル能^ルノ^ル故ナリ今水腫ニ塩カラキ物^ハ喰スル
トキハ水氣腹内ニカク^テリテ小便ヨリ出ル^ト至テ
少ク^ナル故ニキヒク^ク塩ヲ禁スル^ト

水腫禁浴湯 スヘテ水腫ノ病人カタク洗湯水

風呂行水等ハ元ヨリ乾^ル久ノ長頭トテモカク禁
シテ戒ム^トシ若シ此禁ヲ侵ス時ハ再祭^ルカ^ルハ^カス
此禁必^シモカ^クシ^テスヘカラス若シ病人不^レ神^ハ療
治ヲコトワリテ茶ヲ^テフヘカラス

水腫禁房事 スヘテ水腫ノ病人房事ヲ^シム

ヘシ呼吸息迫等ノ苦惱モナキ病人固カ無事ナ
ルヨリシテ不思^ハ慾事ヲ侵ス者^ハイ^テギ^ニ是ヲ守ラ
スヘシ是ヲ告テ侵^シ安キ人^ハ是又瘡治ヲコトワリ
茶ヲ^テフヘカラス水腫全快ノ後一年半年ナ^リシ
ニ年ヲカキリテ是ヲ侵ス^ト勿^レト云ヒキカスヘシ是又
水腫ノ大禁^ト

水腫実症治法 スヘテ水腫心下痞硬少水短サメ

大便秘結^シ其腫ニ^テ熱アリテ^シツカリト硬ク皮^ハ^ニス

指ヲ以テ是ヲ推セハシバラクノ間クホメ氏手ヲハセハ
シキニスノ如クモチカガリ其脉沈実ニシカラ有者ハ
是実腫之是ニハ分消湯ヲ用スル毎服一盞白湯
ヲ以テ送り下ス一日三度若シ腹脹減シガタキ者ハ
増ノ三五変ニ至ル

実腫分消湯方 蒼朮 茯苓 猪苓 沃浮
腹皮 名大 枳实 宿砂 香附 辛 木香 甘草 焙
生姜 中 右水之合ヲ以テ一合煎シ取リ滓ヲ去リ
分テ温テ二服ス 昼夜三劑ヲ用ス若シ胸中微飲

アツテ微喘スルモノハ蘇子ヲ加フ水氣胸中ヨリ
上衝スルモノハ吳茱萸ヲ加フ

水腫胸痞甚ク脉沈結 スヘテ水腫心下ノ痞硬大
抵分消湯ノ症ニ類メタ心胸ノ痞悶甚ク胸肋飽
脹ノ不思飲食志氣鬱結ニ耐トシ不樂或ハ
物ニ對メタイクシ安ク脉ハ沈結ニアクヒ多キ者
分心氣飲ヲ与フヘシ

志氣鬱結

分心氣足

分心氣飲方 肉桂 茯苓 半夏 通草 名中
桑白皮 大腹皮 紫蘓葉 名大 右七味水煎

脉沈結
欠伸
痞悶

症ニ從テ出入加減スヘシ。此方ヲ用ル目的ハ脉沈結トアルヒト胸膈痞悶ト此ニツ之脉沈結ニ和散ノ條下ニ詳セハ此ニ畧ス

氣急甚

緩動身氣急甚 スベテ水腫ノ形狀脉伏太抵分消湯ノ症ニ類メ心下ニ覆盈ノ如クニコタリ痞硬トリウケ強ク僅カニ身ヲ動セハ氣急息迫スル者是水氣專ラ心下ニ結聚スル者ニ他薬テ救フヘキ方ナシ外臺秘要ノ黑豆湯ヲ用ユヘシ此症心下ノ診法口授アリ若シ腹滿減ジカキ者ハ

黑豆湯

三聖
木菜

三聖丸ヲ兼用ルモヨシ若胸下ヨリ衝上者アラハ木菜丸ヲ兼用スヘシ三四匙ヨリ五六匙ニ至ル方中ニ呉茱萸ヲ加ヘ用ヨ

外臺黑豆湯方 桑白皮大 枳椇子 茯苓各 右三味黑豆汁ニ合ヲ以テ煮テ一合ヲ取リ滓ヲ去リ分チ温メニ服ス晝夜ニ三劑ヲ用ユヘシ

黑豆汁ヲ作法 新黑豆一合半大ニ入シ水一升ニ合ヲ以テ六合ヲ煮取リ黑豆ヲ去リ此ヲ用テ六合ヲ以テ煎茶ニ劑ノ煎シ水トナスヘシ

三聖丸方 水氣專腹^部集^リ腹^脹強^ク息

ギレ強^ク小水不利スル者ニ効ナシ能ク虚寒ヲ詳^シノ

用ヒアヤルルベカラズ ●鉄粉、烏餘糧、蛇含石、右

三味各等分糊ニテ丸シ梧桐子ノ大サニ丸ス

水腫手足十分腫脹 スレテ実腫ノ症四肢十分腫

心下痞スル凡カタキニ至ラス腹部満スレバ腫ニ至ラス

手ヲ以テ腹ヲ推スニ空軟ナカク如クシテ腹ノ底ニカク

有者ハ疏水湯ノ症

疏水湯方 赤豆炒五分 大麦炒九分 猪苓沃洗

手足洪腫 疏水

茯苓炒五分 苧七分 牽牛子炒五分 右七味水煎シ

若シ心下痞ノ不思食志氣不舒長者ハ縮砂木

香青皮各二分ヲ加フ

水腫氣息如常腰以下満腫 スレテ水腫周身供

腫ニ手ヲ以テ推スニシツカリトカラ有テ其アト忽チ二

起リ水腫ノ勢甚ケレバ少シモ呼吸ニサワラス氣息

ヤリ常ノ如ク在者ハ是猪苓湯ノ症也○又一種水

腫前ノ如クシテ腰ヨリ下ハ悉クハ強ケレバ臂肩胸

背少シモ腫ナク呼吸平日ノ如クナル者是又猪苓

一種

氣息平腰 以下洪腫 猪苓

実腫

志氣不樂
気急心歎
息

湯ヲ用之如此症ハ必此方ヲ用テ先其下ノ腫ヲ
スラスベシ大ヒニ奇知有然此二症与虚腫ニギレ
安シ能ハ虚実ヲ詳テ其実腫タルニ相違ナクハ
決メ用テ効有○又水腫形状前症ノ如クニテ

心下ノ痞滿強ク志氣不樂、氣急少シ有テ嘆息

スル者ハ大橘皮加膠湯ヲ用テ其上ヲ和シ且其下

ヲスラスヘシ

猪苓湯方、猪苓、沃浮、茯苓、阿膠、滑石各等分

右四味水煎服ス

大橘皮加膠湯方、生皮、茯苓、阿膠、滑石

猪苓、澤浮、桂枝、木香、蒼朮、甘草、枳榔子

生姜、右十二味水煎シ服ス

虚実間腫治法、腫滿指ヲ以テ是ヲ推スニ硬ト

軟ト其中ヲ得テ肌表ヒカクトツヤ有其脉之疾メ

少シ浮數ヲ帯ル者是実ニ由虚ヲ兼ル症之此論口

授有温茶ニテ是ヲ導クヘシ大蒜セニ宜シ若シ

病人大蒜ヲ患ム者ニ鯉魚セシテ以テ是ニカヘ用ヘシ

若シ又鯉魚ノ腥ヲ患ム者ニ鯉魚ノ霜ヲ用テ

大蒜煎方 赤豈 蒜 生姜 生高陸根

右四味先ッ小豆ト水ト以テ土鍋ニ入シ火上ニ安シ次ニ

三味以テ布袋ノ内ニ入シ赤豆内ニ着メ是ヲ煎シル

事二時計赤豆熟爛ノ如キヲ候テ布袋ヲ去リ

小豆ヲ食セシメテ一日ニ三劑若シ其吐氣ヲイトク

者ハ一劑ノ半ハ減セヨ惟病人ノ食料ニ從テ増

減スベシ

鯉魚湯方 鯉魚 長サ七寸去テ鱗ヲ去テ腸ハツラ昆布

四方寸在者ニヨクヨク一錢 右水一升ハ合ヲ以テ煮テ

二片

四合ヲ取リ其汁ヲ飲シ且ッ鯉魚ヲ食セシム毎日劑

鯉魚霜 魚鱗ノシ鱗腸ヲ去ラズ 冬瓜ニ味入シ土

器ニ塩泥ニテカタク封シ暖火ヲ以テヤイテ性ヲ損シ

末トナシ白湯ニテ送り下ス毎服一錢日三次

唇口乾燥皮者層枯燥 スベテ水氣久ク去ラズ

唇口乾燥シ其皮者層堅硬テ枯燥シ唇ハ高

木ノ潤澤ナキ如ク心下痞硬胸中不利シガク喘

氣有ル者是也虛ト實トヲ兼タル症之木防己加

茯苓湯主之

木防己加茯苓湯方 木防己^五 石膏^二

桂枝^三 人參 茯苓 各六分 右五味水煎服

水氣積癖集心下 其水腫ノ形状大抵大蒜

煎ノ症ニ類メ心下不和等々トノ悸動スル者ハ

畜水ト持病ノ積ト合セテ心下ニ集ルニ姜桂加茯

苓湯ヲ用之ニ總メ其腫虛腫共ニ多クハ動氣

ナキ者ニ惟此間腫ニ必ス動氣有然レ早ニ診

察スルハ脚氣ノ動氣ニギレ有ニ脚氣ノ動氣

ノ症ハ此治方ト大ニ殊レ必シモ治ヲ誤ルヘカラス

姜桂加茯苓湯方 柴胡 黃芩 桂枝 干姜

牡蠣 瓜蒌根 右八味水煎ス若シ脇下上リ

衝者アラハ吳茱萸ヲ加フ若シ脉一等虛候ヨ

見ハシ和シガ多キ者ハ附子ヲ加フ脉症大抵大蒜

煎ノ症ニ似テ呼吸嘆息喘咳スル者ハ千金越

脾湯ヲ用ユヘシ

千金越脾湯方 麻黃^六 石膏^二 羌活^三 生薑^三

大棗^十 甘草^二 茯苓 白朮 附子 是乃傷

寒論越脾湯ニ茯苓白朮附子三味ヲ加

名此方之○此千金越脾湯ハ虚トモツカス実腫トモ
ナシ虚実ノ間ヲ病ム一種ノ水腫有是ヲ名テ間
腫ノ症ト云此間腫ノ症ニ喘咳ヲ加ル者ハ此千金
越脾湯ヨリト知ルヘシ

虚腫治方 虚腫ノスガタハサク心下痞硬シ或ハ
少クハ氣急シ或ハ腹脹スル者是虚腫ニ之タ至
極ノ虚ト云ニ六間ノ凡症之是ニ存世金書ノ十皮
散ヲ用スヘシ此症ニ更ニ下利ナトニハク有テ木瓜
栝椰子 草果ノ类ヲ用ヒ難キ症有之ニ六四苓

散ニ附子青皮ナトヲ加ヘ用ル者カ或又真武湯ヲ
用ル場合モ有又真武湯ニ理中湯ヲ合メ用テモキ
場モ有之然レ心下ノ診ヒカタ虚腫ト実腫ト診方
心得有ヘシ

濟世実脾散方 厚朴 蒼朮 木瓜 木香
干姜 甘草 右六味水煎服
虚症濡腫 牡原湯ノ腫ノスカタハ全體腫ノ
スガタヤウヲカテ泥土ヲ推スカ如キ心地有或ハ又
腹以下ニ腫有臂肩胸背ハ殊外瘦ヲ其瘰

沉細或ハ浮虚又大心下痞悶強ク飲食不化者ハ壯原湯ノ症也

壯原湯方 人参 蒼朮 茯苓 附子 桂枝

干姜 縮砂 橘皮 破胡紙 右九味水煎服

臍下不仁腫 其腫脉伏壯原湯ノ症如ニ腰脚ガ

トリロケカラヤキヤウニ覺ヘ或ハ臍下不仁スル者是ハ

八味丸料ノ症也

八味丸料方 乾地黄 山茱萸 干薑 澤瀉

茯苓 牡丹皮 桂枝 附子 右八味水煎ス

○諸家ニテハ熟地黄ヲ用之凡當家ニテハ此時ハ乾地黄ヲ用之ヘシト教ル之是ニハワケアル丁ニ謹テ此方ニ從フヘシ

皮水虚腫 皮水ノスカタハ腫滿堅硬ニテ是ヲナツ

ルニ潤ナク假令ハ皮ノ袋ニ水ヲ盛リテ其口ヲクルガ

如クキアタリガサクトシテ硬ク腫ルハ陽氣ノ脱也之

○或ハ水氣十分ニ有ナカラソコニ多ク水ヲ含テ其

含メハケノ水氣肌表ニ浮ス肌層ニコト有者ニ症

共ニ陽脱ノ症ヲ多ク死スル者ニ止ム方ヲ得ル也

防己茯苓加附子湯ヲ用ユヘシ

防己茯苓加附子湯方 防己茯苓 芩 甘草 黃耆

附子 芩 右五味水煎服

小瘡内攻水腫 小瘡頭瘡内攻ノ腫ヲ瘡在者是

モ亦虚ト云リニ有其内ニ虚腫ハヤク其腫ハ多キ

者ニ能ク診察肝要ニ利水ノ劑ヲ專ニ用ユヘシモ瘡

在ムヘカラス元來小瘡ハ内陷ヨリメ起ルヘシ然レ當

時腫滿ノ腹脹スル皆水ノ故ニ先ツ指アタリタル其

水ヲ利スルヲ以テ治トス其水一タ上快利スル先下陷

小瘡内攻

スル処ノ瘡瘡表メ劑ヲメ悉ク比瘡在表ス是皆經

驗ノ要方ニ若シ腹脹氣急至テ甚ク小便セシモ通

スル莫ク苦悶メ死セト欲スル者ニ甘遂桃花葉テ

下ヲ取ヘシ然レ同ク下劑ヲ用ヒスニテ効ヲ全フスヘシ

是實ニ止々復ヲ得ル治方耳其治ヲ見テ知ルヘシ

○一壯年二十八小瘡内攻ノ遂ニ水腫ヲナス医者

二三人は是ヲ下シ腫益々甚クヒテ瘡表利水劑ヲ

投スレバ効ナシ根苦此ニ於テ極ニシリテ二治タム

通身殊外腫滿ナ其腹大鼓ノ如ク咳逆氣

喘鳴ノキリヲヒクカ如シ予越脾湯ニ白木茯苓
 ヲ加ヘ一服ノ重サ十錢計ニ調合シ兼テ三聖丸ヲ
 服サシム又方ヨリ聖朝ニ至ルニテ煎茶五服丸
 茶四錢ヲ用テ聖朝ノ后腹中鳴動シ小便ヲ通シ
 又一升計喘鳴半クヲ減ス煎症ノ如ク呼吸息
 迫腹脹強ク又腫ニ相違ナクハ甘遂桃李野心
 ヲウビノ葉ニテ一タビ下ヲ取ヘシ下ヲ取テ后勢ハ
 降氣ノ劑ニ點スヘシ前症如クナルニ虚症ヲ見サハ
 厚角ヲ用ル症有真武ヲ用ル症有之是各見計之

水腫喘急足冷經驗 水腫ノ症喘急足冷ハ危ニ
 至ル者ニ蘓子降氣湯ニ附子ヲ加ヘテ即効ヲ取ル
 夏多シ心得ヘシ蘓子降氣湯ハ喘急有テ足冷
 ヲ兼ルニハ必ス蘓子降氣湯ヲ用テ之足冷ナル用
 テ効ナシト教ルカ當家蘓子降氣湯ヲ用ル口傳ノ
 一ツク〇予一病人ヲ治シタルノ有瀧口村宇右衛門
 ト云者有水腫ヲ患フ其腫皮一ハニ滿テ身ヲ動ス
 了テラズ目モ腫ラガリテ開ク了テラズ喘息甚クテ
 只今落命セシトスルニ似タリ茶ヲ用テ効ナシ予之

治ラタム是ヲ診スルニ足冷ノ氣味有息ギシヤウタ
世ノ常チラス蘓子降氣ノ喘急ニ能クカスリ因テ何
シノ症ヨリ起リ何ノ薬ヲ用テ効セト云フヲ問フニ
ヒナシ其眼前ノ足冷ト喘急トノモヤウノニツイテ
脉モ取アス先ツ蘓子降氣湯ニ附子ヲ加ヘテ一服用ス
一服用ヒ終ルト小便通スル一六七合計ノ明朝ニ至テ
二三服用ヒ又小便通スル一升餘ヲ得タリ夫リ
以ヒテ毎日一升餘ニ升近ク四五日モ小便快利メ
遂ニ全快ヲ得タリ薬ヲ用上始ルヨリ休薬ノ

日ニテ終始蘓子降氣湯ニ附子ヲ加ヘテ薬効ヲ
ヲサメ休薬シタリ是虚水ヲ治スル口傳深秘ノ如シ

蘓子降氣湯方 蘓子五錢 陳皮 厚朴 前胡

肉桂各三錢 當歸三錢 半夏一錢 甘草一錢 姜棗水煎處

脚氣腫方 スヘテ脚氣ノ水腫食物ヲキヒニ夕
禁ニ行水ヲ禁ヒ塩ヲ禁ヒ此三禁ヲ守ラセハ何程
ノ神丹矣薬ヲ服ストイハ氏効ナシ能ク薬ヲ調合ス
前二病人ニ戒メキカスヘシ若シ此三禁ヲ守ラスハ薬
ヲ与ヘニシト云ホトニ戒メヘシカクアラサレハニヨセシ効

脚氣水腫ナシト知ヘシ〇スヘテ脚氣腫水某口ニ入シハ乃チ吐スル者

是大病ニテ多クハ変アリ〇又病勢未ダハケシカラサルニ
時々トクミアケノ氣味ヲ覺ユル者是モ亦多クハ

大病ニ至ル者ニ〇脚氣ノ初發手足ニガシク麻痺ヲ
覺ハ或ハ胸腹硬暢ニ或ハ少ク氣急ニ或ハ手足少

シク腫シ其脉直スル者ハ栝蘓湯ヲ用スヘシ其効速テ
小栝榔湯ニセリ

栝蘓湯方 紫蘓ニ香附ニ陳皮ニ甘草ニ

木瓜 栝榔子 羌活 木香 炙味水煎服

小栝榔湯方 半夏 生姜 桂枝 栝榔子末 右

四味水煎服〇此方ハ外臺秘要ニ出ル方ニ

脚氣膝骨弛緩腫 スヘテ脚氣腫乾脚氣

濕脚氣ノニ症ヲ同ニス惟ハ便短澁ニ氣急ニ

手足麻痺甚ク或ハ膝骨弛緩スル者ハ越脾湯ニ

蒼朮 茯苓ヲ加ヘテ用スヘシ

越脾加朮苓湯方 广黄 石膏各大枣 甘

草 蒼朮 茯苓 生姜各減半 右七味水煎服

〇若シ心下コダハリテ氣急スル者ハ木瓜栝榔

ヲ加ハ或ハ木シニ丸ヲ兼用スルノ晝夜ノ間ニ西多ニ
至ルニ若脈症虚ニ心下ツタワリ有モ六附子ヲ
加ヘ〇或人間テ云膝骨弛緩トハ如何ナル症ヲ云ヤ
答テ曰膝骨ガカクリクトカラナク貴ニル症ヲ云ハ
是ヲ目的ニ用テ効ヲ取ル莫アリ

此症予大誤リ
タルアリ文化ナ
酒五月 未更津
新田所清共僞
妻四十
四月五日頭痛
面浮腫而喘急
不食腹痛心下
痞硬如雷復益
按之而快時々
少藥食食共吐

脚氣腫心下痞硬尤甚 スベテ脚氣腫寒^乾
脚氣湿脚氣ノ二症ヲ論セズ小水不利取
心下痞硬甚ク其カタチ益ラフセ名心胸中心下
コタリテ呼吸息迫歎息ニ脈ト症ト云ニ症屬
少藥食食共吐

大便溼亦便
不利一日二合
不足腰以下之
腫尤多遠山
代大快相湯
無寸効予

スル者外臺秘要ノ黑豆湯ヲ用ニハ大ニ奇効
有此症心下ノ診ヒニ口傳アリ

外臺黑豆湯方 前ニ有

胸滿氣急 スベテ脚氣胸滿氣急ニ上衝

セニト欲スル者ハ大栲櫚湯ノ症ニ

大栲櫚湯方 栲櫚子大 生姜^中 橘皮 紫蘇

木瓜 吳茱萸^{各小} 右水煎服

脚氣衝心似結胸 スベテ脚氣衝心ニ昏倒メ死

亦不應^吐於此
時斷^吐鳥^吐
子烏水湯^吐減而
有効云其方
猪沃栲櫚神曲
麥芽炒黑豆

セニト欲スル者ハ外臺ノ桑白皮湯ヲ用ニ

積山先生傳曰

腫滿心下痞硬

按息心下

者、虛中實也

家方

四十丁

桑白皮湯方 桑白皮 吳茱萸 各等 右水煎服

桑白皮湯經驗 按 六七年以前ヨリ急症ノ

病流行メ人ヨリコナクナクナカラス其症心腹脹痛

或胸内隱痛シ刺カ如ク之覺ヘ或ハ腹攣急ニ

呼吸嘆息シ其カタチ全ク傷寒ノ結胸ノ症ニ

サモ似タリ夫故医者多クハ大陷胸湯ヲ用ユル

外別ノ主殿ナシ服薬ノ后セシハ病勢元々ヨクニ

見ユレ程ナク又前ノ如クノ病勢盛ナリ其后又

大陷胸湯ヲ用シ凡知ナキ耳云ラス吐氣嘔吐メ

煎湯ヲウケズ次第ニ胸中ニ衝キ上リ其危キナ

云計ナシヤル処ノ病人其様子多クハ如此或ハ

三日或ハ六七日ニ過ズシテ死スル者ハ死シ生ル者

生クト云様ナルヒドキニ病ニ是ニ依テ一医按ヲメ

クラスニ其病症結胸ニ似タレ凡脉ハ結胸ノ

脉ニ非ス皆浮虛或浮弱或沈微細ニメ

無力依テ思フ此病症言症ニ非ス者ナリ

下利ノ宜キ処ニ非スト思ヒ付脚氣門ニ此方

ヲクテ出シ專一ニ是ヲ五六人ニ施シコトハル之

其内大便秘結ノ苦ムツ有レ氏イサカ其^レモトシ
ンヤクナク一味ノ下薬ヲ与ヘス始終此方ヲ用テ
人ヲ救フツヲ得タリ其后又右ノ症ニテ虚候
多キ者五六人アリソコテ此方ニ附子ヲ加ヘテ服
サレム皆全ク安シ此症經驗ヲ備ヘテ療治ノ
参考ニ備ル者也

脚氣衝心 スヘテ脚氣衝心ノ症ニ桑白皮
湯或ハ呉茱萸橘皮湯ナドヲ用シ其苦味ヲ
要^惡テ吐吐スル者ニ沈香降氣湯ヲ用ユヘシ

然レ氏沈香ハ文趾ノ産ノ上高ニ非ル知ヤシ

沈香降氣湯方 沈香 五考 縮砂 考 香附子

一考 甘草 三考 右水煎温服或ハ症ニヨリテ蘓

子茯苓ヲ加フ此症ニ病勢尤モ甚キ者ニハ

此方ニ一角ノ末ヲ兼用スヘシ太抵晝夜ニ三

考計ヲ用ユヘシ又水氣心胎ニ畜積メ利シカ

タク呉茱萸橘皮ナドヲ用テ通利セサル者

ニ半夏厚朴湯ニ犀角ヲ大ニ加テ用ユヘシ

又小瘡頭瘡内攻メ腫格別ニ全満スル程ニモ

至ラズ惟腹脹メ通シカキ者ニ用テ妙ニ
半夏厚朴湯加犀角 小瘡頭瘡内攻シテ
腹脹甚キ者此方是ラ主ル○半夏厚朴湯ハ
金匱云ハ半夏厚朴湯ニ

半夏厚朴湯方 半夏一升厚朴三兩茯苓

四兩 生薑五兩乾蘓葉二兩 右五味煎服

脚氣衝心奇方 脚氣衝心欲死者此方

此ヲ主ル栝椰子 生姜 童便 右三味細末カキ

一セテ頓服ス劑大小時ニ望テ肆飲スニ

脚氣胸腹飽脹并痿弱 スニテ脚氣痿弱ノ

症ニ附子ヲ用ユヘキ症ニ依テ附子湯ナトヲ用ヒ

兎角胸中ニコクワリテ胸腹飽脹メ返テ附

子ナト不相應ニ覺ユル者ハ千金越脾湯ニ

木瓜栝椰子ヲ加テ用ルカ而ハ犀角二兩黃湯

ヲ用ヘシ此症ハニ方ハニ懸附子ヲ用ユヘシ

犀角一兩黃湯方 犀角三兩黃三兩甘草

二兩茯苓二兩防己二兩黃芩一兩石膏二兩懸附子

二兩白木一兩川芎一兩防風一兩當歸一兩生

姜高細辛一兩桂枝一兩右五味水煎服

脚氣麻痺痿弱 又へて脚氣上衝之氣

急等ノ症退テ后麻痺痿弱スル者六千

金附子湯ヲ用スヘシ若シ氣急全ク不_六去_六栝

榔子木瓜瓜 吳茱萸更ノ類ヲ加テ用スヘシ若シ

心下ノムタワリ久シク去リ難クハ鼈甲ヲ加テ

用スヘシ

千金附子湯方 桂枝芍藥炙甘草附子

蒼朮茯苓各中生薑右七味水煎服

脚氣衝心痿弱 又へて脚氣衝心ノ痿弱取

口_六強_六少水不利_六或ハ腫滿_六勢_六カク小腹_六カ

ナシノ麻痺スル者ハ金匱八味丸ヲ用ス煎湯下

ナシテ用ス又可_六方_六前_六出_六ツ方中_六地黄乾

地黄ニ宜シ

脚氣灸治 千金八處灸 凡市膝眼 憤鼻

三里上廉下廉 絶骨 三陰交 右八處ノ

灸痿弱等ノ症ニ大キニ知有_六灸_六數_六ハ一穴ニ

五十壯毎日灸スヘシ然レ腫滿上衝ノ氣時有

者六宜之方是等ノ症去テ后惟足ヨリ手
口并者ニ効多キ矣之

風毒脚氣脚痛治方 スヘテ風毒脚氣ノ

類ハ実證多クメ虚證ナシ其證脚痛或ハ

掀腫スル者輕キ症ハ栝蘓ニテ用スヘシ〇熱

氣甚メ痛シ甚キ者ハ越脾湯ニ木瓜栝

榔ヲ加ヘテ用ヘシ此藥ニテ痛シ去リ兼ル者ハ

大黃一匁黑豆一匁甘遂 此三味ヲ糊丸メ

毎夜一匁ヲ兼用スヘシ若シ虚症有者ハ

千金越脾湯ニ木瓜栝榔ヲ加テ用スヘシ但シ此

證ニハ三味ノ下劑無用之或ハ桂枝加附子湯

ナド用テヨキ事モアリ

風毒大痛治方 スヘテ実症ノ風毒硬腫ノ

屈伸スヘカラス其痛シカムカ如クニシテ急ヒカク

日夜號泣スル者ハ禹功散ヲ用スヘシ

禹功散方 黑牽子炒細末 小茴香減 右二味

細末熱酒ヲ以テノミ送ル者又 一匁毎日五六次ニ

キリニ快ク下利ヲ得ル時ハ愈ステ 晝夜ニ五六

久ヲ用スレシ然ラセハ効チシ○此方ヲシバクコト
凡ニ風毒腫痛ハ牽牛子ヲ以テ下スヨシト
他藥ニテモ快利ヲ取ルテアヒ其効牽牛子ノ
如クスレヤカトラス元ヨリ風毒ハ脚氣ノ類ナリトス
凡ニ風毒ハ水氣ガ手足實節肌肉間ニ凝
滯ノ痛ニラトス汁ニテ脚氣ノ如キ衝心ノ患ハ
ナキ者ノ故風毒ハ病後ノ治ヲナシ安シ然レ
往々脚氣ニ風毒ヲ兼ル症有此症ヒトハ風毒ノ
治ヲ施シ返テ人ヲ誤ルテモ有レ心用テ診察スレシ

脚氣腫痛ニ症經驗 脚氣腫ハ手足麻痺ノ
氣味ヲ覺テ筋ヲシメ腹變急ニ手足ニ微腫凡
者是乃々脚氣初發ノ症ニ大小便カ快利ノ右通
起ルモ有又秘スレモ有一體セズ此初發ノ症ハ
小檗榔大檗榔湯檗蘇散沈香降氣湯越
脾湯ト下ラ用ルモ先ツ通例ノシカク之是ヲ打
コシテハ誰シモ諸方ニツキテラグム莫ク此時ニ最初
ヨリ三和散ニ羚羊角ヲ加ヘテ効ヲ取ル莫如神
是秘スヘキ莫ナリ但羚羊角多カラセハ効チ

○又一種外ニ最初ヨリ腫滿ニ丸者有ソレニ和
 散ノ薬カニテハヨクシ是ニハキアラキ茶ヲ外ニ兼
 用セ子ハナラヌ又復ク其時ハ羚羊角白桃花野
 シヨウビ甘遂牽牛芒硝大黄ノ类ヲ兼用スニ
 是常ノ水腫ト脚氣ノ水腫ト療治ノ區別有処ク
 常ノ水腫ハ右如クキアラキ浮水ノ劑ヲ用テ其効
 一旦有トスレバ又アルハ打返シ方リ或ハ日一培ニシニ
 衰ハカ来リシテサワリニ丸復多クシ脚氣腫ニ先
 多クハサウノ害ナキ者ニシハ如何ノ謂ナシハ
 脚氣腫ハ虚症ハ至テヤクノ実症ニ至テ多クハ
 ナリ是往來ノ經驗ニ

