



武
門
245
春
28

溺水奇方 同救方

船醉奇方 諸失血

三方 痘脫落

· 崑偏枯

諸病死候

舌胎 心下石硬

虛勞氣急

同不治 热病脚氣不治

腹痛反胃頭痛癲癇吐方

惠美三伯試効

九折堂山田

氏圖書之記

四

痘麻內攻

腎間動氣

脅癰部位

五

諸病

反胃

十六治

十六治

舌胎

勞瘵有無

六

冬治

積氣

五花灸

高柳角

兵衛

灸四花

取大効

數度

上云

七

毒氣

上衝動氣

卒倒生死

診察

口反胃妙方

八

湯火傷

利病

樹下口刺

九

小兒

馬脾風

酸漿咳嗽神方

赤遊丹毒

九
療疽洗藥

予療疽初發有大妙方 鮑ドウウメ四五疋トリ白砂糖ヲカケテ又火取
朱レ入テ患所塗ル又腫強色惡瘀血毒アル者ハ以管針取黑血

腫滿針奇法

有大効尤有口傳

諸病虛熱

○下血治方 ○虛脫血暈 ○落痂風奇術

胎隨奇力

落痂風奇方

○諸病虛熱

○下血治方 ○虛脫血暈 ○落痂風奇術

打擣疼痛奇方

齒痛

又十三種有

打擣疼痛奇方

齒痛

犬毒六方

婦人惡阻

○瓜蒂代茱馬醉木

痔疾

耳中入虫治方

膈噎奇方

癰狂奇方

又十六種有寶貝笙圓

蛔虫

犀角主治

○咽中刺 ○口瘡腫痛

鶯瘡

○牛馬犬貓解馬錢毒奇方

○浮腫內攻 ○道中箭疮生治奇方

○彭脹奇方

○赤白帶下

臍瘡

○小兒痘癬奇方

○浮腫內攻 ○道中箭疮生治奇方

○彭脹奇方

○赤白帶下

口瘡

○走馬牙疳 久泄利

○瘡○犀角湯

○痘毒入眼奇方

○赤白帶下

○浮腫內攻 ○道中箭疮生治奇方

○彭脹奇方

○赤白帶下

酒蠶鼻奇方

○走馬牙疳 久泄利

○瘡○犀角湯

○痘毒入眼奇方

○赤白帶下

○浮腫內攻 ○道中箭疮生治奇方

○彭脹奇方

○赤白帶下

心氣綆痛

○走馬牙疳 久泄利

○瘡○犀角湯

○痘毒入眼奇方

○赤白帶下

○浮腫內攻 ○道中箭疮生治奇方

○彭脹奇方

○赤白帶下

喉痺

○走馬牙疳 久泄利

○瘡○犀角湯

○痘毒入眼奇方

○赤白帶下

○浮腫內攻 ○道中箭疮生治奇方

○彭脹奇方

○赤白帶下

目突

○走馬牙疳 久泄利

○瘡○犀角湯

○痘毒入眼奇方

○赤白帶下

○浮腫內攻 ○道中箭疮生治奇方

○彭脹奇方

○赤白帶下

久腹痛灸治

○走馬牙疳 久泄利

○瘡○犀角湯

○痘毒入眼奇方

○赤白帶下

○浮腫內攻 ○道中箭疮生治奇方

○彭脹奇方

○赤白帶下

疝氣灸治

○走馬牙疳 久泄利

○瘡○犀角湯

○痘毒入眼奇方

○赤白帶下

○浮腫內攻 ○道中箭疮生治奇方

○彭脹奇方

○赤白帶下

疳眼

○走馬牙疳 久泄利

○瘡○犀角湯

○痘毒入眼奇方

○赤白帶下

○浮腫內攻 ○道中箭疮生治奇方

○彭脹奇方

○赤白帶下

吐方惠美家

呃逆

○走馬牙疳 久泄利

○瘡○犀角湯

○痘毒入眼奇方

○赤白帶下

○浮腫內攻 ○道中箭疮生治奇方

○彭脹奇方

○赤白帶下

虛勞死候

○腹診死候

○驚風

○頭上白屑ケ

○驚風奇方

○黃疽ニシキ
○黑白癰風
○打擗疼痛ハラタク
○血分婦人ハナブシ
○鼓脹カツイ
○吐血ハリハ
○下血ハラハ
○諸麻新久ハラハ

○試癩有無
○麻疹煩躁氣急死候
○截浙不覺痛
○誤嚙舌出血奇方
○養鱉解河豚魚毒
○嘔吐ハラハ
○小兒腰脹ハラハ
○麻疹ハラハ
○黃疽逆產ハラハ
○口喰嗽ハラハ
○麻疹下劑ハラハ

○癩癰奇方
○鐵朱散

○竹木刺不拔者奇方
○水氣衝心呼吸息迫
○痢病裏急後重ハラハ
○淋瀝ハラハ
○癩病ハラハ

○赤白帶下ハラハ

○破傷風
○中風蜂螯ハラハ
○乳癰ハラハ

○癩癰ハラハ
○力攻ハラハ
○獮懸ハラハ

○靈天蓋斧ハラハ

○馬廻風
○疳發鶯風ハラハ

○乳汁吉凶
○賊風說話
○穀氣咽不下奇方

○乳痛
○瘻下不止ハラハ

○瘻病止藥
○梅瘻痒痛洗藥

○癰黃
○梔子蘋皮湯
○濕熱痢病
○黃連枳殼湯
○癰瘤

○兒初生驚風
○眼赤爛ハラハ
○白屑奇方
○眼疾點藥

○四味方
○正明散

鄉食庭家秘說二十一

- 溺水奇方 明礬石炭右吹入鼻耳前後二孔
- 溺水奇方 山ガラ黑砂右一味以管吹鼻中其人尸穴未開及胸腹有動者用之有効無動者死
- 船醉奇方 櫻花半瓣浸梅酒用
- 救溺奇方 照一角水自諸穴出
- 蚌蟹奇方 蚌殻是ラヌル痛立止
- 河豚魚毒奇方 櫻皮燒煎服
- 水腫脹滿奇方 沈香大桃仁小杏仁大黃芩小艾葉

甘牛少々五八霜ツ赤豆小右八味細末白湯ニ送下ス
●水腫燈艸目的 生燈中屢々効世人用熟中ニ故ニ
不羨カシ

●水腫黃耆目的 水腫皮薄而有浮澤者及皮皺
而水不浮者宜黃耆

●水腫死候目的 水腫ヨリ水沸シテキシ潤ニ陰
腫肩痩セ下部大腫ル者ハ皆死候

●水腫奇方 ヨウリヤニキリヨモ赤豆十粒酒五合

車前子ニシキギ麦芽アメイ玄纊研スミ右六味七石シナクナ一日
二服ツ服ス服茅内ハラシナ大麦ヒヨコ赤豆アズキ玄纊スミヒキワリカニニ
モ食ス塩ソ辛キ者行水シテ禁ス塩ソトキ猶ヨレ
●彭腫神方 編索ヘンサク一束胡椒コショウ薑根皮ショウガ紅花
五百黑丑ハマチ牛膝ウツキ大棗タケノコ桔子大オレンジ
毎服五六丸慈湯シヨウハ其症シテ從フテ調合シテス
●諸失血奇方 萩雀アラゲ枝ハラシ存白湯シヨウ送下ス酒吐ス
○下血崩漏血暈ツバキ兼シテ虫ムカシ丸二付ツテ炒アフリ
●衄血奇方 反鼻霜ハラシス白湯シヨウ以テ下ス

○下血奇方 黃連解毒湯 未詳經班葛花之誤乎 二加班桂花 桂樹灰 或
於四物湯方內 加鷓鴣胡菜，亦妙

○痘毒眼疾奇方 痘毒入眼中失明者及諸眼

目不明者 雀子羽毛未生者 右酒一合不死者取

酒中浸置則自然二和如泥丸度用

○痘癰脫落奇方 ガリニ 黑燒酸三テツ元

○喘急奇方 フンロウ鳥墨斗白湯三服ス奇効アリ

○風偏枯治方 中風偏枯當火服烏藥須氣無
不効カナフ 左瘻セキ左腹結聚者多因胃火也宜梶虎

湯、左右瘻弱者ス東三焦火也宜防風通聖散。
○脉運數吉凶 小雜病脉數為凶脉運為吉
○瘧疾治方 瘧疾始ヨリ桂枝加附子湯類七八
分後以常山シラカバ載之シテ

○溫瘧治方 小柴胡加附子シラカバ時ハ裏ヒ不ハシマズ
愈ハシマズ不ハシマズ入ルモ治ヒ安ヒハラ試ハラ二効アリ
○諸病死候目的 九病者以柵指摸食指中節
者死候

○舌胎附子目的 古黑胎乾燥破裂之血クモ流者

附子功之。又舌白胎生圓，如丸者，附子功。

○又眼中赤，莫尼者，八附子功。

○黃連解毒湯黑脂目的。舌上黑脂如涕者，黃連解毒症之。嘗久下利，舌胎如蠟漆者，用之效。傷寒心下石硬，鞭直親不語口禁水，茶不入者，是肝氣鬱之，心中脫微腹痛，三日而諸症減。因之四逆散全愈。至大壯為不軒經薦，則熱亦隨解矣。時頭面膏漏如汗流者，及多，迫皮肉突起者，死後之。

冬刃水起者，活。

○痘瘡麻疹內政治方。痘瘡麻疹內政以紫草，下之。

○麻疹後下創治方。麻疹後可以下創，如不愈者，悉為創病。

○腸癰部位。腸癰，訖法，脇右傍而痛，輕半席午之，痛處突起，皮上潤澤如循，漆器狀，小便淋澀，右足拘急，又有摩之而癌形能應者，少兒多此病，治宜走核承氣湯。

●虛勞氣急腸痛 虛勞氣急者死期近腸痛
者必見血症

●虛勞不治 虛勞指頭大者不治

●病人死候 凡病人承漿冷者不治及鼻冷者死
熱病腳氣不治 热病及腳氣凡甲無潤澤如角
色或黑者不治

●腎間動氣死候 腎間之動以肺中候之其動
不定者虛候也又肺動者虛候也居中央不動不足

●腹痛反胃頭痛癲癇吐方 積年腹痛反胃

用吐劑及頭痛癲癇宜吐方惠美三伯試効
反胃吐水灸治 反胃吐水自七椎至十一椎無權
灸之積日而効アリ

●舌胎附子目的 舌上無胎者用附子後生胎為吉
勞虫有無目的候勞虫法者每權以指按之而
痛出者傳尸病也

●諸病秘灸

口中病一椎二椎之間五十壯灸
足踝上皺三穴處中一ヨリキ一束

上テ赤ス

胞衣不下。右脚，指免三壯筋入

白帶下二
脐下三寸兩旁各三寸開半一炷

少便用二瞬中二塈斗慎テ次三壯

常下二病ノロ才取龜尾ノ骨半ヨリ上卫當ル

又左右、口長サ兩方百壯以參ス

竹木刺 立タルニ上下一寸ヲテ灸ス

婦人積氣多治 五花參法婦人積氣百病安
乃人方平身正坐不動口鼻吸氣勿出鼻孔而二

當テ直肉ニ隨テ下ニ底骸骨、端ニ至テ截断其
尺ヲ半分ニ截半ノ刀ヲ捨去余半ノ又大椎骨上ノ
端ニ當テ直ニ隨ヒ下ニ乞ルトコロニ鳥ス尔後此天
ヲ三ツニ折二方ヲ捨テ残リ一ツヲニヨリ中折メヲ初
乞ニ當テ上下ニ假鳥ヲ為シ文此尺ノ折目ヲ上下ニ假
鳥ニ當テ左右ノ端ニ鳥ス上下ノ假鳥ハ消滅スシ



ヨリ上ニテ凡ハ皆毒氣上衝也或飲食カ又酒毒ノ上衝モアリ三昧湯或ニテ吐スヘシ方藿香木香益智右三味煎服一名益智飲

○卒倒生死診察 凡卒倒スモノ足ノ裏ニキヲカケ大指ト次指ノ間ヲ強クタヌヘシ痛應ノ目ヲ轉スル处ノモノ治スル之若口開キ不覺痛者必死也之不可無策也

○反胃炒方 石斛 大黃 百部根 甘草 反胃吐逆試テ効アリ大同類聚方ニ見ヘタリ

○反胃噎食奇方 周楊俊曰旋覆花代赭石湯治反胃噎食氣逆不降者神効^{ヨリ}
○湯火傷奇方 黃丹 山茱生 右研令傳之^{ヨリ}
○又湯火傷奇方 大黃 石灰 各等分右細末以鈎梁水調^ハ傳之^タ

○胃癪奇方 橘皮一味水煎服

○痢病奇方 胡桃肉 半甘中多 右糊丸

○痢病久痢 痞病初起間以紫圓^{ヨリ}可也

○痢病主劑 陳皮 大蒼朮 中鹿仁^中黃芩^中芍藥^大

草菓 小 桂榔子 小 右七味水煎

久深痢病奇方 茯苓散治久深或赤白痢大人少兒俱用之 厚朴 桂榔子 茯苓 葛粉各五
甘草八分 右細末以米湯一下之

○少兒馬脾風奇方 治少兒瘧癖及馬脾風
山幽 紅花 龍葵各等分

輕粉各一右極細末白湯送下斯輕症へ七日或十日用
郊アリ ○按本中酸梨集解曰龍葵、酸梨、一
类二種、龍葵大無瘧癖之主治、酸梨、主治

瘧癖一然則龍葵代酸梨又可也

○「來瘧奇方 地黃煎一味鍋入、武火、以テ是ヲ

ヤキ黒ノ患凡処ニツル妙之

○蛔虫治方 蛔虫ノ症、諸殺虫ノ葯、用テ相應ニ
出下リテモ其症不愈、ノ諸患ラ為モノ、多レ是
丸出下リテスノ強ルニヘリ其トキハ殺虫ノ剤ヲ
用ニト乞トキ黒大豆ヲ炒リ香ニ粉テ一大ヒヲ食
ワレ直ニ初カラ用ヒ煎剤ヲ服スヘシ、丸下ルヲ甚速
○是殺虫ノ剤ニ甘草ヲ多入ルト同意丸、是妙術也

酸梨水咳嗽神方

酸梨草

右一味根茎葉共二

黑棗テ咳嗽久不愈者其症隨テ煎湯兼用有
之

○小兒赤遊丹毒治驗

○小兒赤遊丹毒者熱登ル

傷寒ト下痘瘡序熱ト如火炎熱シ文徴明
寒熱ルモ之而一身中ニ錢ト位カ又ハ寸二分
位ヨリ赤色附テ其赤肉或ハ腹或ハ背ト處ヲ定
メス轉旋ルモ之多クハ背ニ出ルモ之而腹ハ轉旋
タルヲ思候トス是ヲ治ルノ法半大指次指向魚

除合谷ラ唐胡麻ノ油ニヒタモノスルトキ丹毒

立ハ其所ヘ青筋ラアラスモ之其時乍チ又ラ以
刺メ血ラ取リ備サ鹿草ラ墨ラスルコトクニスリ美ヲ

冷服スレシ又右ノ一種ニ小兒丹毒ト之症アリテ

序熱ハ前症如之テ兩頤ヨリ頰ヘカテ内ニ

赤ク色附シ者之且頭痛呕吐下モルモ之此症

早ク治セセハ死ニ至ルモ之是ヲ治ルノ法男子六

左女子八九力ア痛ノ上ラ刺刀美ニサシキリ

其口ヨリ血ラ吸トルヘシ四五日ニ大抵シ赤色

○當毒

トヘルヲ度トスヘシ是妙術ナリ

○小兒初生肺中出血 小兒初生十日汗内臍ヨリ
血出アリ射麻香蒼木硝等右細末拂ル处ニ塗ル
○瘰疽洗茱 馬鞭草大胡黃連中紅花大益母草大
牡丹皮中右五味調合布袋入テ服ノ加減ニ隨テ水ヲ
積リ煎シ度可洗其○備此方末トヒノ繁縟自然汗テ
和ニ鳥羽手撲手、美スヘテ手足頭強痛附為妙
○一身腫滿針術奇法 一身面目悉ク腫、目モアガサル
者アリ湧泉水ニ針ラニテ即効ラ得ナリ

○墮胎奇方 鹿角霜支麌香支延胡索支
桃仁十粒右一剖ノ少量之細末白湯三斗送リ下ス
經水通スルフラナスト、ニツテ后服ス

○諸病虛熱 劳瘵常逆奇方 官廡并諸病
虛熱者皆大乙明目丹主之方逆む妙ニ雄黃
木香各五分天靈蓋一錢輕粉二錢甲兎屎支
右六味細末乃ナ良方、明目丹中○先酒一合、大黃ノ
末半分入ヒテ煎シテ是ヲ以テ予リテ丸トナミ朱砂ヲ
衣トスル之○荻野氏ハ此方ラ以テ虛勞ノ蛔虫ヲ下ス

秘方トナス童便ニテ煎レ服スルノ病人ヲメカタクセラ
ル更ナカレ奇々妙

○下血治方 歸脾湯 茄蕤子加ヘ用

○少兒赤白痢奇方 少兒赤白下利數十行ノ者ニ
銕火カ白木散附子ヲ加ヘ用ユ

○虛脫血暈 四逆加人參湯、童便ヲサヒテ用ヨ
茱汁五合、童便五升ヲ入ヘルヘシ茱汁煮成テ五升
時童便ヲカキニセテ用ユ

○落痂風奇術 頤ノハレタルヲ失医者ノ両ノ

○大指ニアサノキレカモズニキレラヘキ病人ノ口内、両大
指ヲ入レテ頤ヲサハキ前ラアゲテ大指ノ先キヘヤニカ
ヒテラヒサヘル心地ニシテサゲイニマト一下覺ニラヒ入
ヘシ指ヲロ中ハシテ指先ヘカラサヒテ指ノ頭ギ推シ
サヘルニハ脣ヲアグヘレ

○又落痂風治方 猪牙皂莢夾細末鼻ノ中吹入レ
多ク噴嚏ククサヲサスヘレ

○又落痂風治方 雄黃ヲ薑メ烟ヲカク時ハ多ク
噴嚏ヲ失テ妙

○お撰疼痛奇方　お撰疼痛治ノ后肉食甚
魯ク赤黒ニ丸者ヲ治ス　蠻蛇黒燒　燒酒三トキヘ
ワタリト其處ニスリ其上ニ紙ヲハリ又其上ヲ泥鎧火
シニテノスヘシ陽氣ラヘル、シカタニ又其間ニ手拭ニ
燒酒ラヒタシテ火ニアブリ患ル處ヲアタムヘシお撰
カキラス死均フテアラサル者此方妙

○齒動痛奇方　襟　右ソノマニテ嚙スヘシ正月
カザリニ用ヒタルヨシ

○大毒治方　十車湯ニテ是ヲ下ス

○又大毒治方　四圓米　右細末用五味子ニ似タリ又
味ニ似タル者之方恐ラ能リ治タル者

○又大毒治方　馬錢　甘草　杏仁　右二味煎服ス

○又大毒治方　鉄梨大生姜少右鉄梨ト生姜ト
カキニセキ服ス

○又大毒治方　馬錢三勺ヨリ四勺至ル右一味キザミ
水合裡、馬錢ヲツテ一宿ヲ疊テ其汁ヲシ服ス其應
如神、一說ニ甘ナラ加フ如シ効ナクハ四匁モ用ヒシ

○府疾奇方　金匱ノ黃土湯宜シ又府疾ニテ

下血スル者ニヨシ 黄土ハ 伏龍肝、豆也

婦人鬼阻奇方 伏龍肝ヲスリ水ニ煎シ出し能く
スニシテ其伏龍肝ノ煎レ汁ヲ以テ茱萸ヲ煎スベシ是婦
人ノ鬼阻ニ用ル時ノ為^{シカズ}也但伏龍肝ハ別ニ出汁ヲ
煎シ其汁ヲ濁^ク氣をモキヤウニスニシ其汁ニ茱萸ヲ
煎シル定法也然ニ其煎じ葉ヘアトヨリセシテモヨシ
凡蒂代茱萸醉木 凡蒂ノカツリニ馬醉木ヲ用テ
妙之苦^シニ吐スル者ニ末トナシ自湯ニテ送^フ下^ス宿
食ナドノ矣ニテ吐サシト欲ニテ吐シ兼ル者ニ用ヒテ

甚妙ニ吐スル者ニ凡蒂ヨリ苦^シニ吐充^フ速ニ
齒痛奇方 平曾散ニ玄參升麻味^ヲ加^フ煎服ス
○馬醉木功能 大根ノ葉ヘ虫ノギタル六馬醉木ノ
葉ヲ濃^ク煎シ冷^シテカケル甚妙^ク

○耳中虫入^ル治方 耳ノ中^ヘ虫カ^リリテ出サルニ猫^モ_モ小
便ラ^シ艾妙^シ右耳ヘヘリタル^耳下^ニモ左耳ヲ
上ニメツギコム甚妙^ク而^シ猫^モ少便^シ取ル為方ハ塗リ
桶力塗リハナノ中、猫^ヲ入^ヒテ鼻^ヘ生姜けヨスリ
ツシハ少便^シスル^ク

○膈噎奇方 河豚魚腸胃皮压ニルテ黒燒エス

右一呂細末白湯ミテ送リ下ス一度ニカクマニ日
三度位七日ノ間是ヲ用ユ栗バラ桑鹿家方

○癡狂奇茶 辰砂 雄黃 乳香 芒硝 雲母
金砂各一爻 石膏二爻 卷石一爻半 水銀黑銀二爻
右九味細末蜜丸 ●方中ノ金砂ハ乃チ黃芩ヲ粉ニ
スル之黒砂ハ乃チ水銀ニ

○禁風痢奇方 吳茱萸湯妙ニ又一本堂ノ方
アリ直根人參 黃連 茄子 杞實 右四味煎

服ス此二方見合ニ用ユヘシ

○烟虫奇方 烟虫ハコブダツテ痛ム且つ時々痛ム
是其目的ニ鵝胡菜等ヲ用ユモ大黄ヲ加フヘシ
病勢ニ從テ紫回ミテ下ス妙ニ

○犀角主治 犀角ヲ細末えルニ六堅丸ニ急用ニ
間ニ合ヒ難シ其時ハスリバ十二水ヲテシ入レ直ニ犀角
ヲスルヘシ而大慨入用程自方ヲモリ置テスリ
ヨキホドヲ取り右水ヲ煎茶ノ内ニ入レテ用ユヘシ
○咽中刺元奇方 咽ノ中刺アリ飲食サヌケアル者

鬼箭羽ニシキヤ 右一味煎服ス妙

●口瘡腫痛 口中瘡ヨ生シ甚腫・痛者六野薺ハラノハナ 薤薇丸
右瘡ニヒタレシキ六月日中ニ温患处ニ是傳効アリ
天麻風奇方 白蛇和産物ヨシ烏蛇和産物ヨシ
右二味首尾ヲ去リ皮骨ヲラ子判、酒一杯、内ニヒタレ
壺内ニ治メ油紙ヲ用テ口ヲ封じ中ニウム白蛇烏蛇
共ニ治物ヲトラヘテ酒ノ内ニハナチ其酒ヲノミル又ヨレ
差乾ク者ヲ用ル時ハ分量ヲ五倍メ酒ウ中ニタスキ
スニアセ八百目ヲヘテ取り出シ温ノ服スシ恐然膜脳アラシ
ノトシリヘシ

●又此酒能ク瘀血ヲ去ルノ効甚妙

●癰疽奇方 平地木ハラフジ 細末糊ニ和シ患处ニ塗ル

●牛馬大猫解ハマモモ 馬錢毒ハマシントク 奇方 石膏カイコ 大甘川シロガタツ 煎

ノトシリヘシ

●少兒瘧疾奇方 蟬蛇黒粉ハラフジ ハラクモ

白湯三升送リ下ス大人モ虚スル者ニ用テヨレ

●浮腫内攻方 浮腫内攻者癰散剂ハマシントク 吉益家ノ
神祐丸ヲ兼用シ水氣ヲ下スラ優レリトス ●即京
河原町備前屋室ニ通聖散ハマシントク 神祐丸ヲ兼

用ニテ得効

●道中茶 鞋中ニ箴庖生スル者鱗ノヒゲヲ細キレ
患处ニ硫瑞廻又是ニ乞スヨレ ●鱗ノヒケハ乃今
細ニ用ルクヒララ用テヨレ

●底奇方 山椒ハ美巴豆ハ美大鳳子十三半 牡蛎ナメコ

右四味スリ和シ膏ノ如シテノ患急ス紙シ以テ其上ヲ
テフ時ハ大熱煩惱トヂヨウノ發スソイニ愈ルコト得

●疥癬奇方 泥鰌トヂヨウラ黒燒テ水ニ和勻仔患處

●按凡ニ浮テ済キモトナ疾ト云深ク沈モトナ癬云

●癬ハ俗云ノ久ムシく又乾癬ト云キハ銚ガサニ銖
癬トモ名ソ入門ニ五癬ハ温一頑一風一馬一牛外リ
●癡狂奇方 寶盒ヒツボク四ト名ク乳香芒硝雲母
雲母金砂即黃金粉石羔ニキ岩石一粒水銀ニキ
辰砂雄黃各一錢右九味為末蜜丸

●犀角羚羊角剝衣法口傳 犀角羚羊角ヲ急
卒末ニセント欲セハ擂盆中ニ於テ水ニ研リ即其
汁ヲ取リ煎湯ニ加ヘ用ルヲ便トス

●膈噎奇方 脾噎鷓鴣灰不共毛此角為細末

味增汁之調和可用
カクテ

又鴨羹方
蕷白
白砂糖
等搗和し湯煎之

可用

●小兒疳癩奇方 一切虫症者 野葛銀蘭一束
紅花五分 大黃三分 青黛半分 甘草三分 以上煎服

醉奇方 一切虫之症者 野葛銀蘭
大黃 亨青黛 參甘草 三分以上煎服

● 胃氣玉琳奇方 杜鵑皮 青黛 二味等分糊為丸用
彭脹奇方 大戟 甘遂 南陸 陳皮 大腹皮 桂枝
橘子 木香 昆布 前服 如神

椰子木喬日比布
剪股如神

赤白帶下奇方
當歸大川芎大
大芍藥大
地黃大

地榆
紅花
桑葉
各大
右煎服

病癥奇方 痘癥者虎潛丸 加附子煎服
其効如神 虎潛丸出一千回春

口瘡奇方 治上氣熱毒口中生瘡者

卷石甘草右以水一合半先煮甘牛減半口
内卷石羊消之噙噙之數日愈

走馬牙府奇方 蘆薈消癰飲 治走馬
牙府身熱氣急鹿牙 齒腐爛味作臭以及穿
腮破者一並服之 蘆薈 柴胡 黃連

午常子 玄參 桔梗 山梔子 石羔 薄荷
 羚羊角 銀五 甘牛 升麻各方 右十二味水二鐘
 淡竹葉十觔煎 六方 一食后服
 久瘧截茶 諸茶無効猪胆一味煎服妙之
 久痢奇方 久痢治之二後藤家 蒼朮卷石
 右等分糊丸服之

● 壓角湯 治妊娠口中瘧，生瘧者 壓角十六當
 吃芍藥名木有川芎芳 生地名以水合煎取 一分 日二服
トウキ代用ルモヨ

● 瘟毒入眼奇方 巴豆 辰砂 考研 研勻數百會

● 瘟毒限ラス尋常眼腐爛 ニ用テヨロレ
 ● 酒釀ガクロハナ 鼻奇方 凌霄花 蜜佗僧 二味等分
 為末唾和傳患處

● 热眼腫痛奇方 黃連名天師宋名 枯瓦 日
 苦葉名燈心 名梅肉 別為二貯前洗之
 ● 鵝口瘡奇方 青黛 胭脂 二味和匀塗之
 ● 疝氣後痛奇方 外臺寫椒散治 疝氣腹滿
 而絞痛及衝心者 附子 乾姜 半夏各半
 糜米同 甘牛 大車 蜀椒 水煎

● 崔目奇方 五苓散 唐ノ舊本ノ加フ

● 又崔目奇方 逍遙散 夏枯草ヲ加フ

● 痘痛奇方 痘瘍 ラ上ルニ昆布ヲ煎シ布包ミ
患處ヲ頻々温ヒニ宜シ

● 疽漏奇方 疽漏三年ヲ既テ不愈者 道三家方
蓮葉 黑豆 二味當取以上三味為末每服二錢

溫酒 ヲ送下ス

● 脫肛奇方

薄荷 姜夷葉 珊瑚葉 二味以

水一升半、煎之洗之溫之而後 香附子 姜夷

● 五倍子 姜夷 明若 ノ方 為細末傳

患處

● 喉痺奇方 赤卒 ノヨリ 一味為末管 ヲ吹入 患處 奇ニ

如神

● 実目奇方 茄荷自根搗汁 ニ 蘭 ヲ 包後入眼中

痘毒入目糞蛆研取汁酸漿汁勾和眼中

● 仲條家難產催生極秘方 仲條家 ノ 死胎橫

產逆產專 ラ 是用ニ神妙アリ本味 ニ 紅花 大

熊爪 ヲサメニテラロシ 一服、三分ホドツ芽ノ煎シツ

可リ各比入用エ外牡丹皮大黃 ヲ加ヘ 用ルモニシ

是仲條家極秘方

○狂犬毒治方 先大毒ハ狂犬ハ勿論アラテ夏月ノ狂犬甚暑ニ苦ニヨリテ能人ヲ咬ム若ヒ咬ル時ハ甚毒アリ狂犬同シ故治法モ又狂犬同シ ○凡咬傷處先人糞ヲ塗リテ其上ニ糞ヲアリカラフ花程テスヘシ糞三日ホトスルニ其患处愈ヤスキ故ニ糞スルニ患处イヒハ甚恩シ凡十九六壯ホトヨシ其キズ大小薄深二均ルアーナク右真ノ狂犬及狂犬也是非ニ毒アリ忽セニスヘカラス ○患处脛以上先六ヶ鍤トス其中頭面ハ

猶更凶ニ放ヘカラスニハ非セレ凡先難治ノ候ニ足ハ易シトス ○凡咬シテ早速ナハ先其日ハ荆防散敗毒或ハ升麻葛根湯ニ白桃皮ヲ大加ハ三貼ホト用置テ其當日ヨリ本剤ヲ擦テ水ニヒタシキ其明日飯前ニ冷服ス必温服スカラス ○本剤方
番木鼈 ○或犬者一ツ半或ニ二或ニ其人老少強弱ニ見ル尤刻ニ水ニヒタス白桃皮 ○シロキ花サク桃木幹皮或ニ五分或ニ一分キサシ同ク水ニヒタス右二味水盃碗ニ八分目入一夜ヒタシキ明日ニ至リ

漬ヲあり一度ニ頓服ス汗モ出ズ下リモセス吐モセス
 唯少便常ヨリヨケイニ通シ其色薄茶色ニト是ヲ
 異トス凡茅モ用テ後ヨク腫ルヲ禁スヘシ子ウハ茅
 毒菴スルヲヨクヒテアシ、凡一時ガリスハサム毒菴
 ヒテロ引キ眉牽キ耳動キス^ノテ惣身參^ノ勤換ス
 此時甚騒^トヘカラス凡如此ト一時ハカリテ^ノ自^ラ治リ
 定ニルトキ食ヲ与フ後^ノ腫ヲ禁セス^ノ又茅ヲ用
 チキノサキ其毒ノ淺深ヲ知ル法物ヲ以テ枕上ニ
 坪シテ不圖其枕ヲオニビツクリ凡ハ淺キナリ又

耳ノ金計ニウニキ身勲ツヨキハ深キ^ノ又右如クメ
 常ノ如キナリ^ノ又毒深キ者ハ一日ニ日隔テ再ヒ
 此葉ハ前ヨリハサレ^ク強クスヘシ下地^ノ葉ニテ病人
 合^ニキ^ヲ覺テ居^ニユヘニサ^ク強用ヒテモドロカス
 龙毒済シトイ^ヘ再用ニスキスニ用ス^ノヤス後ハ
 初用ル处煎湯ヲ四五日用テ止ム尤其人持病
 下起^ハ症^ニ從テ是^ヲ治^ム日限^モ^シ禁忌^シ壹
 川鱗^ノ尤川魚中河^ノ鱸^{スルキ}魚^ヲイムソハモイム^ノ
 又常大ニ喰^シタルニハ^ノ馬錢^ヲ枳榔子^{甘草}

右三味水ニミメヒシキ用ヒヤウ前二同シ此方甚ヤウ
 ラカニメ多クハ発セヌモノ尤毒深キ六本清用
 ●白桃皮ハ採ニ時ナシ●凡医ハ馬錢ノ末ラ堂
 懐中シ不具ニ備ヘヨ●病人大小便時獨立セシ
 ハルナカレ顛例ヒテ死スルトアリ甚慎ヘシ●毒
 白ヨリニモセナル中ハ十五日モ治スヘシニ発ス六日
 ハキモ決シテ不治ナリ

●久腹痛吐舌炎治 最初痞根ニ穴ト両乳下脇
 端ニ穴ト合メ四穴ヲ穴スルト三四日其内ニ病激甚

サルフアリ其時灸はシ減ヒテヤハリ四穴ヲアヒライ
 置ク或、腹滿拘急或三日ホトニニテ痛一等ラ
 減毛フセアリ然ニ俗間ノ病者ハ激動甚カタモ
 其伎ニテ希ナラ靡スナリ此用力ノ時ニ必灸大
 ヲ靡スヘカラス又争テ此時ニ多灸スルモアヒ脊骨
 ●古雅此瘡根ノ穴法尋常ニ異ニテ十四
 推ノ旁大概三寸位其肉理ヲ手ニテ按排スルニ
 皮肉令ル、處アリ此穴处ニ其瘡根スルトキ輕
 忽ニ大ハ得カタシ能ヒ熟按ノ穴处ヲ得ヘシ

兩一！肺骨端

ヨヨリ

此二穴ト瘡根ト合シ四穴此穴ヲ取ルニ保
子ヲ兩乳上ヨリ下シ骨端ニル处此夷穴右四穴
灸之テ三日各三十壯或ハ五十壯其病者氣力
方健ニカセ希スヘシ四日目ヨリ後ノ五穴ヲ合メ
九穴矣ス。○五穴十一椎ノ兩旁二行通リ例ヨリセ
ク穴ヲトル又十一椎ノ脊骨ヨリ左ノ骨端ト前ノニ
行ニ穴ト。如三穴トル又六椎ノ二行通セテ
是亦肉ヲ按メ皮肉兩旁ヘ分排ノ處是穴也
土推二行十六椎穴處モ二行通ニセキハカリミ

ナク兔角手指ニテ按メ肉ヒラク処ヲ真トス右五
穴ト前ノ四穴トラ合メ九穴ナリ四日メヨリ激動ナ
ケハ九穴合ノ或ハ三十五壯或ハ五十壯見計ヒ矣ス
ヘシ尤初ヨリ五日ニテ灸ヲ休ムルト二日ニテ又灸ニ前
合メ七日ヲ一回トス此一回テ大抵ノ病減スル然て
病患深固年久ノ痼疾ハ一回位ニ治スルコトス
キニ日數ニ拘リナク病愈ラ度トスギナリ此
旨病者ニ初ヨリ告知ヲセ納得サセラキナリ
初四穴ヲ取シテ肺骨下ノ多ニ心下大穴口之

或心下ノ口ロキテモ中脘邊ニナシトモアリ其時
中脘ノ旁見ハカライニ一寸ヒラキニ二穴スアフアリ
或其下ニテナシナムハ建里下脘ノ旁暎下セハ氣
海ニカスヘシ是ハ其時ノアライニノ真ノ穴法ニ
アラス以上九穴久年腹痛或呕吐諸治効ナキ
モノニ屢々知得タリト云予三人ニカムノミトモニ
何ノ手モナク病愈ナリ

●疝氣多治法 十四ヨリ十六推ニテノ二行通り
セテソノ按排メハ穴或十四推ノ旁ニ穴ト十六推ノ

旁ニ穴ト十五推ノ脊骨ノ左ノ端一穴ト合メ五穴
此五穴却テ前ノ六穴ヨリ切勝ナツ多ヒ右五穴カ穴カ
見合矣ニ又小腹ニ穴ヲ合メキスルニ小腹ニ穴ハ病
者ヲソ正坐セシテ俯ノ腹ヲ屈セハ陰毛上ニ横後ヲ
生ス其横後ニル处横骨ノ旁半ニテ按孔ニグリ
クトノ痛ニ徹スル處是穴處右腰ノ夾处ト腹
夾处ト相合カカスヘシ度數ハ三十五はヨリ五十壯位
スヘシ

●府眼雀目奇方 雜肝丸 府眼傷目又治雀

目奇効アリ 車前子炒蘆薈 黃連各一钱 椰子壳雞肝三錢 右糊丸或ハ雞肝生ニテ子リ
冬ニテ丸スルモヨシ此方經驗數ヲ知ラス

○又少兒疳眼奇方 少兒疳眼眼睛見縮絞者用
之奇効アリ 肉桂知母肝八目鰻鱺乾杼肉經三年
赤蝦蟆 雜膽各五分黑燒

○虛勞癥秘方 天石三分麦門冬三錢沈香一錢
黃柏四分上陳皮四分上黃芩三錢知母四分生地黃四分
芍藥一錢川芎四分上黃連四分上木香四分紫胡四分上

犀角羹 厚朴一錢朱砂一钱砂參一錢麝香四分
水莎夷 石十九味棟寄二丸トヒ用ヒ一日三分
二度ヨリ加テ一錢五分兩度ニ至ル病輕重ラ
計リ增減ス茱萸アルトキハ脉ノ細數モ徐々緩
古リ瘦トドリ汗止ミ既候モ此方ニカクナム此方
美ニ勞癥ラ治スルニ於テハ換骨脫體神方
○惠美家吐方ノ次第 吐方ヲ用ヒトスル前二七八日モ午
金方ノ陷胸湯ヲハリ常ノ煎第ノ通リニ用ヒ千金
方ノ陷胸湯ハヤハリ傷寒之論ノ陷胸湯ニ黃ヲ加ヘ

丸方ニ●其后吐剤ヲカクル治水ハ朝飯ヲ喰至
吐剤ヲ用ル之日アハ病輕重ニテナガイ有ルトヘ
其方先ツ三分四五分或ハ七八分或ハ一夕月ニモ至ル
ヘシカシ一昼夜用ルツハ至テ稀也ト之胃若アラ
用ルツ是定法ニト知ルヘシ●用ル茱八豆豉一タラ水
一杯半入一杯位ニ煎ヒ此茱ラ吐剤ノ飲汁ニ角
○右通リ吐剤ヲ服メ后サミ枕ヲ高クア臥サシムヘシ
睡リラトラスルヤウニスヘシ更角吐ノ氣味遙キラ妙ト
スル之一時ニ時餘モ程ヲヘテソロト吐氣味岸テ苦レ

ガルヲヨシトス吐ノ聲ヲ見合セ吐ノ聲モスル久鳥ノ羽
或ハ桃子ナヨリテ咽ヘ無理ニ指入ル時ハ心ヨリ吐ツキ
一升モニ升モ度ヤウナル者ラ吐クツ有リ是宜キ
又色々ノ者ヨリ相ニシテ吐クツモアリ是モ宜キ●又
本中ニ出丸方ハ吐剤ヲ定メノ通ノ用ヒテ氷砂糖一
塊ヲロ中ニ含セラクヘシ其氷砂糖コ中ニトケニシテ
丸比吐ノ氣味至テ早ク催ス之是又一つ主殿ナリ
●而吐ノ内事ノ外若ニ強キ者ハ汗モ大キニ出汗モ
ヨホトツク者ニ苦シカラス古書ニモ吐方ノ内ニ汗下ノ

ニコモルト云モ此場ノニ○万一吐止ミガタキ者ハ麝
香一分計白湯或ハ水三斗服乞トキハ吐モヤシ左立
トハ稀ニ有ルトニテ常六無キト○而吐后調養
ノ更肝心ナリ兔角食ヲハ急ニ用ヒスハラク向ヲ
置テ薄キ粥ノ湯ヲサレツ用ユヘ急ニ食アリ
ワケルトヨロシカラヌ翌日モヤリ薄粥宜シ惠美
吐方此一方ニテ他法ヲ用ヒス○吐刹ハ瓦葦亦小
豆ニ味細末等乞之

●呃逆治方 壮上ニ大ヲ焚キ柴灰ヲ掃除シ熱ニ

乘ノ其上ニ山椒ヲヒロゲ水二沽ヘル桶ヲ用テ蓋フト
暫時桶ヲ開テ山椒ヲヒロヒ肉内ノ白ヲ起ニ空ニテ
易シ悉ク白ヲ起テ為末糊丸服

●虚勞死候目的 凡病人天庭ニ白色見ルモノ
必死ノ候也虛勞ノ症ニ多シ

●腹診死候目的 凡腹ヲ按シ任脉正中脇下ヨリ
鳩尾ニ至リ大著ノ如キモノキニ觸ルモノハ平人三年
内死シ病人ハ死期遠カニス任脉正中ヲ離ル、
モノハ此例ニアラス

●洞深奇方 白朮 茯苓 桂枝 半夏 桔梗子各
煎服 此方只換桔子白朮散ト名ク不知何方號
屢用屢効

●少兒驚風奇方 治小兒驚風獨毒衝胸搘搗
煩不正者 積雪中藥 古方搗汁入青黛六
分一服、甚者加牛黃三分良

●癰疽奇方 治癰疽劇難忍者 雄氣
薰^{スミテル}者一味為末以糊和調敷患所

●頭上白屑奇方 頭上白屑^{ハカルニ}淡萍屑

荷為末捲之以熱湯牛巾溫其上又雄枯若
石末捲

●黃疽奇方 黃疽小便不利者 茵陳五卷散加薄
萍末

●黑白癱風奇方 生乳燒渣酢和傳之

●試癲有無法 癲有無法試之皂莢子^{サキヅメ}
以半牛頭^{ヒツ}薑^{ガラ}三味アモハ牛頭皮上急ナ色^{ヨシ}

●麻疹煩躁氣急死候 煩躁心煩氣息迫者死
候也急益元散ニ淡竹葉ヲ入用ヘシ

- 手撲痕痛奇方 山椒ラ黒棊ラ細末トナ酒ニテ
送リ下ス ○ 山椒ラソノト、煮テ並ヒ用ルモヨレ
- 截断不覺痛奇方 身体患ル處アツテ其刃
截断セント欲セハ露辟序五倍子甘ナ右等分水
煎、患所ヲ洗フフセ後截ルトキハサモ不痛
- 誤嚙舌出血奇方 誤テ舌ヲ噬血出テ不止モノ
青竹内ノ紙ヲ捺リコレ貼ス又舌麻ニ粉末アラシケ
流シ落ルニベ茱萸ニ是ヲ貼スルモ佳也
- 烹解阿豚魚 河豚魚ノ毒ニアタリ尤ニ養ラ
- 煎レ服メ奇効アリ ○ 又河豚魚ラ喰フニ薦ト同
喰フトキハ決メ毒ニアタリズ
- 婦人血少彭脹 桃奴丸婦人室女月經不通漸
成脹滿及男子墮馬撲傷以テ致瘀血停成
血盛病 桃奴猿臘丸屎頭突玄胡桂枝五吳
脂赤人名等劇症者加消石大黃為末蜜
丸温酒下或為散服亦可也
- 吻吐奇方 白梅花ヲ取主創加丸奇効アリ
- 府眼奇方 乌鵲ヒナトカラス丽土用押嘴足共リ腹割

腸ヲ去リ車前子ニ兩ヲ填メ恐モ藤ヲ用テ
傳シ糞坑中ニ埋ムトセ七日取出シ流水中に於テ洗
淨シ車前子ヲ去テ用ヒス烏鵲ヲ瓦器内ニ收メ塗
泥ニテ口ヲ封シ焼テ灰トセ別ニ鱠鱠魚ヲ各
此黒校ヲソケ、病人ニ与ヘ食シム幼稚ノモノハ 魚
鱠ニキ此葉一方ヲワテ三歳ノ兒ハ鱠鱠方寸ニ
此葉ヲ搗テ喰ハシムヘシ少少腥ヲ要テ鱠鱠ヲ喰
ガルモノ此葉ヲ糊丸服セシテ其乳母シテ鱠鱠ヲ
タク喰フニテ佳ニ又此方大人小兒ノ雀目ヲ治ムト

妙之

○大人小兒癲癇奇方 鐵朱散 治大人小兒癲癇
鐵研五錢辰砂二錢蠶墨鵝鴨菜霜桐木霜
硫黃各四錢巴豆二錢右七味為末密固梧子
大廿十九或二十五丸鵝鳴白湯ニ送下ス一月三度
病深者五度隨症增損平常以左丸調之鵝
頭一顆鉛丹粒糊丸梧子大サ一日二度二十五丸或
三丸白湯ニ送下ス

○治竹木刺不拔者奇方 野鵝足ナシノアシ保皮骨保皮骨右臨右臨

時刮為末糊和貼患處經宿即出。

●水氣衝心呼吸急迫奇方 治水氣搶心呼吸急迫咳嗽癰黃者 鐵粉一錢大黃黃柏礬粉各半錢松脂二錢甘草一錢右糊丸溫酒或白湯送下日一丸或一丸五分水腫利水不問虛實而用之琥珀通中花苓三分以上三味糊丸每服三錢即茴香一味茴香湯送下無茴香丸勿

●痢病裏急后重奇方 如神錠 治痢疾裏急後重者 没藥阿膠各一錢大黃三錢為末糊和為

錠梧子大半片每用二片白湯送下

●吐血下血奇方 吐衄下血止止六棱枳壳灰亂髮灰各等分白湯送下自五分至一錢

●吐血奇方 吐血治些 苓子錢日數加米粒粳米並糊丸

●諸麻新久奇方 諸麻新久不問諸藥効者當飯酒浸大黃四兩木香海金砂搜蛇大亂髮灰水蛭灰蕎麥粉紅花以上為末熱湯送下草薢湯亦得草薢湯見千微瘧秘錄

●淋瀝穢奇方 治淋瀝濃穢無苦痛在再不

愈者、大黃末以鷄卵^ヲ爲餅子ト熱黄^ニ住^ミ意^ヲ啖^ム之^ヲ
以^テ熟酒送下ス。此症瘧毒ヨリ起ル者多シ^ニ説^ヲ誤ル^ハ力
ラス其見様古ニアリ口傳

●癩病奇方 癩疾者白別散以^テ復蛇^ヲ酒^ヲ送下ス

●赤白帶下奇方 治^ハ赤白帶下不腹痛^ハ連綿歷年^ニ
諸藥不如者^ハ白朮 黃芩 黃連 當歸 川芎^等
萍蓬^{大甘中小王}根以上糊丸煎湯^ヲ副用^ス此症
又瘧毒アリ^ハ診^ラ誤ル^{ヘカラス}其目的^ハ小腹アリ口傳

●橫產逆產奇方 橫逆產惟^ニ有婦^シ者 龍腦^{吾^ノ}丸

冷水送下ス 本綱龍腦附方

●少兒腹脹奇方 治^ハ少兒腹脹羸瘦下利煩渴反嗜^ハ
食^ハ之^ニ症^ハ 蟻蝶灰 黃連 杏^ヲ糊丸

●少兒喉嗽奇方 治^ハ少兒咳嗽^ハ 惠美^ノ方^{ヒメノ}白刀豆^{ヒタチノ} 鵝鴨

采^ハ足冬甘中右先者三味^ヲ内刀豆未擅用之至妙
婦人赤白帶下奇方 婦人赤白帶下^ニ或^ハ燶水如^モノ
コ下^ニ腰冷等^ノ症^ヲ治^ハ元^ニ茅花^ハ大甘中小^ニ為^ハ抹^ム服^ス
若^ニ不愈者川芎^ヲ末酒^ヲ服^ス

●麻疹下利治方 麻疹八早ク下利^ヲ可^リ腸胃

熱毒ヲ多ク貯ムヘシ初發升テ葛根湯或葛根
湯敗毒散ノ类ヲ用テ發散レバ之し疹見ヘ熱增漸
疹出ルト見ハ涼膈散ヲ用テ深下スヘシ早キモ要ツ連
キハ効ナシ妊娠ハ此熱ヨツテ墮胎モノ多ニ是亦
下症ノ旨榮ヲ得テ涼膈散ヲ投スルトキハ墮胎患
ヲ可免ル頻々ニ之ヲ用テ下ラ得熱ヲ挫ク上策トス
又盛暑ノトキニ當テ之ヲ患ルモノハ邪熱亦強而喘トリミ
兼輸内攻ニ至ルト多シ其時ニ臨テ涼膈散力能及
所ニテラス故ニ紫口ヲ兼用シ速ニスラ良トス然ニ

氣虛弱ノ兼モノハ手スカラス輕重ニ隨テ涼膈紫口
擇ミ用ヘシ

●麻疹內政治按一婦人年十八麻疹ノ患ラ初甚強
發散ノ制ヲ投メ疹肉中見ニヒ外發セス熱対メ
舌乾燥シ嘔吐ノ本末俱ニ咽ニ下ルアタハヌ是瘧肉ニ
結ニシ疹毒内攻ニス方治療スリニ葉前皆
吐出ス如何凡ス(キヤウナクキラ東テ難スル特ガ如)
治湯奇法然ニニ医酒湯ヲ用テ治セシテ蒸ノ汗ヲ取リ無涼膈
散ヲ用ニ呕吐止ミ水糞咽ニレルヲ得疹發出シ

否日ニテ治スル事ヲ得ナリ

●酒湯法 桶中ニ熱湯ヲ湛テ酒ヲ加ヘ口鼻酒氣
ノ微スル加減ニシテ病者ヲノ其中ニ安坐セシム頭上半身ヲ
ニ厚クラニシ肩胸腹背頭上ト等ソヒヤグラ用テ酒湯
ヲ灌タテ緩ニスヘアラス暫ソメ起シソ身体ノ濡ルヲ能
拭ニ平臥セシソ被覆ノ上シ汗ヲ取リ吐止隨テ
涼膈散ヲキフ

●破傷風奇方 治破傷風角弓反張直視口禁
搐搦不省人事及ヒ脚氣上衝心等症水煎合

蒲黃末三錢二味攬セ和頓服ス

●中風妙方 莖丽其便黑燒ニ酒三斗七日服以醉為度

●躄蟹奇方 蟄蟹二辛ノ莖ノ自然汁妙

●蝮蛇咬傷 鳥モ午二黑砂糖ヲ加ヘ棟甘テ妙

●帶下奇方 四物湯地偷紅花芍藥水煎服

●狐憑神方 狐憑人者与他病混ニ易シ先寸口ヲ

按ルニ脉種ニニ変化之烟中一吸向ヲ隔テ脉又ルニ
毎度脉狀異ニ是一ノ徵ニ殊、狐ト見尤キハ医

眼ヲ張テ其人ノ瞳子ヲニカト見ツメテ尾火レ然ル

時八病人必ス忌畏ルモノ

●乳癰初發奇方 乳癰未成膿者、土龍性以梅肉棟貼之痛立止諸瘡有痛者皆効アリ

●癲癇狂治方並論 癲ハ癲例ノ義癇、簡此症起於人間ノ氣性常ナラズ簡畧疎暴ニ人事不知又間く此症度々不發間有ルク狂亂ニ●三症其内皆積氣心ヲ衝テ然ラシム發元所ハ譬ハ癲ハ寐テ三症凡ニ不知人事サク異た所ハ譬ハ癲ハ寐テ不見寢ト同シ癇ハウツラクト夢ヲ見ルガ如有狂ハ

夢ラアリト見ト同ニ凡此症發し積氣鳩尾ニサレコニ腹引アリテ板ノ如ニ在其中癲癇ニ症不發時心下元ヤカナ狂ハ靜カニ見元寸モ積氣ノ勢甚シ静尤時常人ニヤウニナル者乙トモノシハ希ニ癲例ノ不知人事ヲ吹泡沫ヲ成戰声ヲ痛ハウツト泣出或笑ヲテ積氣收ルト常ノ通リテ癇ハ甚シテハ毎日幾度モ發ルモアリ又一月二度モアリ一年ニ一度モ發ルアリニ症若ニ脉弦ナリ小兒ノ驚風曲角ニテ大人ナリ癇症

在アリ顛ヨリ狂ニ成モアリ又三症互ニ相兼モ有ツナリ
 狂今云乱氣之亂心ト云フ是非久乱心ハツツ心乱メ
 人ヲ害シ身ヲ滅スモノ是ハ積氣ヨリナエト云者非久
 心病之狂積氣ノ勢強クメ鬱熱裏ニ盛在ト弱々
 ノ負ニシキサモ弱キ方ナク實病ノ方書是ラ心血
 不足ト云ルハ誤ナシウラクト日寢タク或ニ寐モ
 猶ロ半夢ナトラ見テ驚イテフロ起恐怖ノ人抱骨
 下元ニ顯ス所ノ形狀サマカルニ參セント在前後
 静カ在所ヲ知人ト應對スルヲナドシ歎ヒ心端多ク

トリレノ無ヤウニノ何トナノ物ナシク見ルモノ婦人恩
 慮夏憂鬱ニ氣此カ為ニ閉塞し積ニテ是ヲ病ム
 故ニ男子ヨリモ婦人ニ多ニ經用ノ瘀血也責メテ狂ラ
 支ツモアリ此等ハ能定ナシ瘀血ヲ除ケヤウニモナリ
 ナ得ルニ産后血暈ニテ狂ニ參スルモノ此症強ク參ニハ治レ
 易シ緩ヤカニ強カラス或ニ參リ或ニ静ルハ愈ガタシ
 積氣腹ニ沈有時ハ静ニ浮ハ參者ニ多ク初參ニ強
 騰フメ後六靜ニ在モノ故ニ初參病勢盛在トキニ

治ル力ヨキニ居スリ静ニ成テ、治シカタニ脉數洪亢
アリ沈伏スルアリ數洪亢ハヨレ沈伏亢ハアレ、陽病ニ
陰脉ヲ見セハニ然ニ當時ノ積氣ニテ在ラ奉スルハ
多、陰脈之故ニ多クハ難治。
○治方 三症共ニ熊胆
白虎湯ニ茯苓半夏ヲ加フ又大便秘セハ承氣湯。
又此症飛泉^{タキ}ニウタセ上部ノ氣ヲ下シ疎^スカヨシ一旦
快テモ年ヲ歷ヘ又卷スルアリ心長リ責ヘニ急ニ
責ヒヤミキニツコソク時ハ其氣力ヲ見合セテ責花^{タニ}
ニテニタモノクスルトキハ快復モノ多ナリ

●癲癇狂新按

丹溪^{タケイ}語、瘧迷^{マニ}心竅^{ハニ}、云語アリ此語ノ

意ハ瘧カ心竅ラスリカクセハ種々ウマノ症ラモヒテ謹
言妄語ナアリテ全ク傷寒、謹語ナリ、妄語モノ
シニ加味導瘧湯^{タニ}用テ其心^{ハニ}藏ラ満リ隱ス处ノ
瘧ヲ治セハ治スナリト云語、意ナリ然ニ香川氏此
丹溪ノ語^{タニ}駁チ云フ六是火キニ心^{ハニ}藏ラ知ラヌ疎^{タキ}
云フヘニ心^{ハニ}藏六腑膜ト云物カヘタナリテ無形ノ氣
ト云フハ受ノキ^{タニ}假令ハ羅^{タニ}ハリ各障子ヤウ
十者之日影或^ハ烟或^ハ風或^ハ土ケナリナリヤウ形ノ

ナイ者ハ皆障子内入ルニ而塵一ツ物一つ形五者ハ
羅ノ障子内入ルトナラニ心藏モ亦其通之疾ヤ
瘀血如キモノ形キコトアル者其形有者カドウニテ
心藏入ルハナヒ然ル丹溪ノ疾迷心竅ト云タハ
皆推量ア説ニテ専ニ足ラス妄設ト云是杏川氏カ
行餘医言ニ云テ有ル説ヘ●今後藤氏ノ説ニ癲痼
狂ノ三症ハ皆積ガ心藏ヲ侵ヨリ起ル症ト云ト
聞ス丹溪ノ疾迷心竅ト云タル謬説ト其意同
カルヘシ其子細ハ積ト云者ハ氣積ニモセヨ血積モセヨ

其外種々ノ積ノ氣ハ皆物ヲ積テ形ヲナスヨリ是ラ
積ト名付タル然レハ積ハキコト形ノアル者其形ノ
有ル積カ心藏へ攻入ルト云理ハキツニ癲痼狂ノ
三症ノ病因ヲサヤウニ見テ大キニ療治ヲ誤ルト
●癲痼狂ニツハ皆心藏ニ形ナキ毒氣カ烟ノ
如ク霧ノ如ク立升リテ心藏ニ何時凡ク攻入時ハ
ソニテ心藏カ立ツ暗ニリテ或ハ忘心トナリ癲トナ
痛トナリテ各々夢中ナリテ性ヲ失フニサヌレハ
癲痼狂ニツノ病ハ皆心疾く是ヲ治スルニハ其無形

虚不昧

毒ヲ除サニナラズト是當然ノ理○或問フテ云
 癲癇狂狂ノニツハ無形、毒カ心ニツイテ夢中モルヲハ
 知キ而右ノ三症ニ起リ醒ノ有度ハ如何、若テ自リ
 左ノ三症ニ發リ醒ノ有ルヲハ譬へ朝霧モ山モ之
 朝霧トモ人朝テツクラニテ大木ヤ山ヲ隱ス者之
 ソニカ五ツ半四ツモトハソクト消テナクナリ其隱サレ
 久知ノ木モ山モえノ通りアリムト見ハシル之無形
 毒カ心ノ藏ヲ覆ヒ隠スモ其通り之無形毒カ何時足
 ナグツトボツテ心ノ藏ニリクラヌ時ハツクラヌ

無性ニ左ニソウカト見ル内其無形ノ毒氣カ消テナク
 在時ハ又本症ニリテ平日ノ人ニ左ニ是癲癇狂ノ
 三症ニ發リ醒アルワケ○或人問テ曰無形、毒氣
 何ヲ指メ云々ヤ其病因如何、答テ自此無形、毒氣
 定キ云カタニ人ニヨリ病ニ因テ其毒氣ハチガニ
 譬ヘ瘀血カシハ瘀血ノ毒氣アリ、痰毒カシハ痰
 毒ノ毒氣アリ、水氣カシハ水氣ノ毒氣アリ脚氣
 乙ハ脚氣ノ毒氣アリ、胎毒カシハ胎毒ノ毒氣アリ

有通リ種々物ヨリ呈ヨリテ病因ハカリ有モ心藏へ
攻入りテ夢中ニ丸ニ及テハ皆カ允トサシ其因ヲ論ズ
六石ノ外無量ノ病因ハ凡ニ●陶節薑力傷寒六
書ニ導赤名半湯ト云方アリ又名ヲ浮心導赤散ト
云此方中ニ犀角アリ此犀角ヲ組入キ主意ヲ能ク合
意誰モ知ラスナヘ此犀角ヲ組入キ主意ヲ能ク合
意ス凡時ハ癲癇狂ニノ療治ニ於テ深ク其理ヲ得
スクナカルヘシ浮心導赤散條下曰治傷寒心下不痛
腹中不滿大便如常身無寒熱漸ク神昏不語

或夢中獨語二句一日亦神焦し將水呑之則噫不至
則不憲如醉人ノ齶者不知便チ呼チ為死症一苦以針
灸一悞人多矣殊不知熟邪傳入ニカ墮心經也因
火上而逼肺所以心神昏故名越經症一梔子
黃芩茯苓滑石人參犀角知母麦門冬
黃連甘草生姜大棗燈心中水煎服是陶節
荅傷寒六書ノ全文也此條中云漸ク寢神昏不語
獨語二句ト云モ形チ如醉人ト云心昏ト云モ皆是
無形ノ怨毒ノ氣ガサ陰心侵に入キ症夫ニ此通
中
或夢

ウラノトレモ夢中、庭元ニ恐心入ラセハ此如キ
夢中ノ癒ナヌニシニヘ梶子黄芩知母素門滑石
黄連等ニテ熱ヲ驅、醒ニ摩角ニテ心入ル、無形ノ
熱毒氣ヲ降下スルニ是ニテ此方中ニ摩角面白ソ解
スルニサザナケハ何ニ為ニ加^一モモ角ナリテ知ルヘ
カラス又黄連摩角湯ト云方アリ是、見ヘモ角ニテ
傷寒ノ狐惑ヲ治スル如ニテ此方中ニモ角アリ
是モ前ノ導赤名半湯ノ摩角ト同ニ主意^ニ此二方ノ
摩角ヲ遣イアレハモ角地黃湯モヒロトノ大キ

チガイ尤者、先一應ノ摩角、使ヒ只上焦ノ瘀血ヲ
治メルト云カ先ナシツカヒロニ此摩角、使ヒ只下焦ミ
心藏ノ無形、毒氣ヲ降下スルニ為ニ使モ角摩角
其使ヒ口括別ナリテ此二方ノ摩角ヲ加^一モモ角排ラ
考ヘテ知ルヘシ●或人向テ曰心疾ト^ク如何、若心疾、心右モ
主通^ク、兔角心^ニ藏ニ毒氣アリテマツクニナリとす
常ノ性ラ失ヒテ或ハ卒倒ヲ^ク或ハ笑ヒ或悲^ク、讐言
妄語ラ^ク、^ク不^ク斯^ク病症^ニ有^クアラニ^ク病症^ニ皆心疾ト云ヘシ

○或人又曰自然ハ傷寒ノ讒言安諾其常ヲ失フニ
心病ト云キカ咎テ曰心疾ト云ニ然ニ其治方ニ至テ
輕重ノ差別キニ非ス。○或人曰傷寒ノ讒言安諾ガ
心病ナハ皆一等ニ大承氣ヘモ小承氣ヘモ黃連解毒
湯ニモ白虎湯ニモ少紫胡湯ニモ竹葉石膏湯ニモ涼
膈散ニ名ニ摩角ノ如キ無形ノ毒氣ヲ追フ呂用ヘキニ
其沙汰ナキハ如何咎テ曰成キトナノ不審、傷寒、熱毒
カ胃ノ府ニ集リ充満スル時ハ熱ヒえヨリ無形ナシハ
毒氣カ心ヲ侵メ心ノ藏カ暗クナヨリ常ニ失テ讒言

安諾ラスルベ此治方其热毒ノ集ル胃ノ府ノ熱ヲ醒ヘ
心入ルキ熱ナシ熱ナシハ心ノ無事ニテ居ルニ取リテ心ノ
藏ノ無形ノ毒氣ヲ降下スル摩角所濟キ若シ
又心藏ニキ入ル毒氣有テ熱ラサム、是ハ摩角
ナキハ治セヌ、是尊赤名半湯摩角ノ心得。○或人
又聞曰毒氣ノ謂ハ如何咎テ曰毒ヲ体ニテ氣ノ用ノ
假令ミハ夏月スヘタリ魚肉アラニ其魚肉内ヨリ生
生其アザレ魚肉内ヨリ惡キ香氣立升ル人是モガ
鼻ラツイテ胸惡クル是魚ハ体ニ奥氣形アリ惡

臭ハ氣ニテ形ナキ又附子ドラ多ク積ニ重ニテ
ラク時ハ其附子毒其内ニ生メ目ニアカルト目赤クリテ
病ムフアリ是附子ノ体ニテ形アリ目ニアカルト目赤クリテ
形ハキニ又雪隠ナト更莫ノスル人糞ハ形アリテ其邊
臭ニテ氣ナハ形ナキ之流罕ナトモ狐ノ体カ人體ニ
入ルニ非ス狐ノ氣が心衡クニ是狐ノ体ニテ形アリ人ニ
アリハ氣ニテ形ナキニ是等ノ理ヲ以テ体ト毒ト一フ
テニシゾ一丸ヲラ知ルヘシ氣ハ元形ヨリ出ル者此理ヲ
癱瘓狂上ニ移メ考ルトキハ其理自然ニ明ルヘシ

人腹中ニ瘀血ト署力瘦ト云者カ食ト云者カ其外
何ソ積聚危處ノ者腹内ニ久ク畜ヘ冗時ハ此体冗
畜積ノ者ヨリノ無形ノ毒氣生スニ此氣ニ形ナヒ形
ナヒ輕シ輕キ者ハ上ニ差ニ是無形ノ毒氣心侵シ
安キ处心脚氣ノ心ヲ衝ナトモ有形ノ毒ニ非ノ無形
ノ氣ニ故ニ其主方モ多ク庫角用テ用ナヒ止於テ
庫角角ヒ按排倉急スヘシ毒ト氣トノ按排ナトモニ夫ニテ知ヘシ
是エテ炮瘻ノ毒ト氣トノ按排ナトモニ夫ニテ知ヘシ
●或人曰癱瘓狂治法ハ如何答曰癱瘓狂

ノ三ハ右ニモ云々畢竟ノイヘ心疾心疾、毒氣
ナシハ心疾トハナラヌ、其謂ハ何、毒氣ニセヨ心藏へ
毒氣カ入ルト常ヲ失ツテ心疾ト丸く此毒氣ヲ夾ミ
ガル時ハ心疾ト丸トナシ其謂ハ假令ハ乱世時男皆
師場^{イケバ}出テ戰ラスル其女房子ハ内ニ居其苦勞筆
舌ノ書^{エヌ}處ニ非ス苦勞ヨサセ氣ヲ使フテ心疾ト丸
者ナラハ乱世ノ時ハ百人ノ者九十九人ハ心疾ヲ病ムヘシ惟
乱世耳ニ非ス今日トクニ此理ラ以テ考ヘ見ルヘ或ハ
ノ親ヲ失ニ子ヲ失ヒ或ハ資產^{ヒニタク}ヲ失ヒ其外死ニ^ハ生ワ

心疾ニナラヌ者イクモアリ又多ク金ヲ持浮セキニ
苦勞^{ウキ}ナシ人ニモイクモ狂亂心トナリ心疾ヲヤム人
アリ是理ニ於テ云時ハ苦勞ノ人ニ乱心モアラン心
疾モアラン苦勞ノ世人ニ乱心アリ心疾凡ハ如何在
謂^シヤ諭此ニ至テ一向通セヌフニ丸く是他ノ謂也
其人ノ腹内ニ毒氣辛人ハ千辛万苦ストモ狂人モ
乱心ニモ心疾モナラヌニ腹中ニ何ソ毒氣有ル人ハ丸
辛苦ニアラテモ其毒氣ニ指合セテ直ニ心疾ト丸く又
セリト辛苦ナキニモ其毒氣カ指合ハ乃チ心疾ナシ

羚羊犀角
一角

其左心ヲ失フニ是癲癇狂病因中之又病因之深
ク思フニ序ノ急フテハ其理ヲ得ラシス○右ニ依テ見ル
時ハ癲癇狂ノ如キ者ハ皆心疾く心疾ニ必毒アリ
毒アル者ハ先其毒ヲ去ラ子ハ治セヌ道理ニ其毒ヲ
去ルニ若羊角ヲ第一神仙良薦トナス其次犀角
トナス其次ヲ一角トナス此三味ハ誠ニツキ入處ノ無
形ノ毒氣ヲ降下スル最上ノ靈藥也是秘スヘシ○此
理ヲ知ラスノ後藤先生熊胆以テ癲癇狂心疾
ヲ治セント思フハ甚誤リ之是孟子所謂縁木魚得
トナム

願フ美丸ヘニ是等誤リ何依テスルトニ癲癇
狂ニコト有形ノ積ヨリ発ルト見ル故ニ治積ノ熊胆ヲ
以テ治セント思フ其誤リ此ニ於テ見ラヘシ○予人ヲ治
タルフマリ其症俗ニ云癲癇ニ朱砂安神丸ニ羚羊
角ヲ加ヘ治ス全ク愈ヘタリ如此治方ヲ以テ其効ヲ
得テ惟其一人ノ台例ヲ舉テ其使ヒロヲ知ラスルニ
餘考ヘテ治ラ施スヘシ○此無形毒氣前ノ風門ノ
内ニ於テ有增ハ弁シタレヒテ又言ヒ足ラヌ如有ルニヘニ
再ニ其不足ヲ論メ我カ門ニ示ス者也

朱安加味

○靈天蓋之弁
寢向白虛勞勞療ニ靈天蓋用ル
謂如何善テ曰饗庭家秘設諸牙类諸角類
能ク無形ノ毒ヲ陛下凡能アリ此心得ヲ以テ諸牙諸
骨ヲ使フヘレト云フカ饗庭家ノ口傳ノツコ此莫我力
饗庭家計ニモ限ラス香川氏モ栗原幸菴力
說ニモ見ヘタリ靈天蓋ハ諸骨ノ类ニテ靈アル者ニ
故ニ方脉ノ症ニ用ル時ハ能ク心肺ノ毒氣ヲ陛下凡
心肺ノ毒氣ヲ陛下凡ノ說ハ前ニ虚勞門詳ニ
併セ見ルヘシ今此ニ其弁ヲ署ス

- 乳汁吉凶診法 乳汁ヲ绞ルニタダクト落ナシ清潔茶
味キラ上火向水半キヨリ出ル如キハ惡ニ文乳汁濃厚ナリ
- 少兒府驚風奇方 千金子細小兒府驚風者効アリ
甘中姜青皮蜜天麻蜜牛黃蜜大辰砂四更此中右五味為丸
- 馬脾風奇方 甘遂末輕粉ケ加ヘ妙ニ此症急喘
促ソ無死モノ急ニ可下ス疊キトキハ死ヌ
- 取膚虫奇方 虫花附干柳紫口含歡花麻仁各一
甘中一方右細末麻油二棟末明ニ眼胞及手足汎隆
アリ日出トキ械あり耽日ニ向ヒスアニシハ弟ノ如キ細虫

出テ丸ノ先ニ三ツハリ之針ニカケテ取ヘシ

○賊風設話 売加七戸當夏秋之間有賊風其氣甚溫暄土人因名火風遇之者身體微腫徃來寒熱手足酸痛治之ノ茵陳夷人菊瞿口各一虎右細剉濃煮浴之或以茱萸四付二日而愈若不早治則閏節疼痛手足瘻終身不差云云

南部候侍医高野貞順話

○穀氣不下咽奇方 治穀氣不下咽者 雞子一枚挽糸半升右和熟湯服一服奇効アリ

○乳痛奇方 紫草湯 治乳痛 紫草連荊芥銀花 右水煎

○淋疾奇方 亂髮燒姜滑石一錢右末溫酒送下

○婦人血積腹痛奇方 漆膝丸 治婦人血積腹痛，矢膝乾漆 蒜薑末右為丸溫酒或白湯送下

○下瘀血丸 附子三分山椒若干巴豆夷人考水蛭

大黃川芎各等份右七味丸一日服五方

○漏下不止奇方 庡草散 治漏下不止 鹿茸

阿膠烏賊骨 當歸各三錢蒲黃 酒服

● 咳病止茶 如神丸 荀利一名順有丸 黃連 黃柏
沈香辰砂各五分 阿片一錢 没藥 麵粉各四分
乳香右八味糊丸

● 五府雞肝丸 治小兒痘 山茱萸 三 紫朮 黃芩
茯苓 淡厚各三錢 神曲 麦芽 炙半 雞肝
テリヤアカ方 百葉煎 辛目玉乳香矮 丁香矮
反鼻四目木香黑燒 百合 三 没藥 百 右密中入テ
瀉之諸藥ヲ煉ル

● 梅瘡痒痛奇方 淡梅瘡痒痛甚方 鶴膝姜生

蒲黃 茵陳 右二味以冰糖煎取一拿 没患處
● 癰黃奇方 柑子瓣皮湯之症最惡有疾者八
綱目 鹿角湯主之 鹿角 茵陳大 茯苓 麦門冬
危子爵金火生芩 竹茹

綱目犀角湯方前アリ

● 温熱痢病奇方 黃連枳穀湯 治利恢初作多
由濕熱但下之後即服此湯三劑並無再作百
全百効 黃連 炙枳壳各當分 白芍藥 三 茯苓
淡薄青皮 柏榔碎 木香五分 甘草四分右咀作一服

水二升姜三片煎一升食前温服。湿热作熾迫

者宜下之加大黄朴硝各二钱。

○癲痫奇方前出ス鐵朱散参考スヘシサニ矣同アリテ
此方ヲ優シリトス辰砂ミツカク桐木霜ミツカク鷓古菜霜ミツカク
唐蠅ミツカク巴豆ミツカク而或半兩棟皮霜ミツカク广香ミツカク虎骨粉ミツカク
右一味合調、蜜丸梧子ミツカク大サ病重者自一钱至三钱、病
輕者自四分至六分、穢物蛔蟲下ル為知服後丸

鷄頭ミツカク辰砂ミツカク

鐵粉ミツカク

龍腦ミツカク

右一味糊

丸梧子ミツカク大ナ自二千粒至三千粒

白湯

手送下愈后

三年禁コニニヤク蒟蒻

○知治召コロブ一方 蒺蒻 皂角子 苦荳莖 三味蔭ミツカク乾
火薑ミツカク之ミツカク病發セサモノ全愈又初丸茶ホラ
用下欲ソ之ミツカク鷄頭ミツカク蜜丸スルモノ茶効速之發
甚モノ愈難シ又此病三年一發者八愈タゞニ毎
歲或月ミツカク發者八却テ愈易レ

○少兒初生驚風奇方 少兒初生三四十日若五六歲
直視驚搐啼声不出世所謂急慢驚風者乾
桑魚ルノ歸ミツカク細判布泡漬ミツカク酢中取出生頻々紙口中

至三四時則發喉声不得愈或曰婦人血症養

テ用テ有効

●婦人血症 婦人血症養ヲ用テ効アリ

●府眼治方 棉葉散 治府眼土用中取杜鵑灰或以土龍代之 茄苓 玄妙散乾漆裡以上爲末拌於醬油中黑雄雞肉蘸之微火炙之日食方寸許六七片

●眼眶赤爛奇方 白梅水燒以竹篋去薄皮取肉數於銅版置器中密封三四日窺梅肉帶

綠青取出絳包摩爾爛处

●白眉奇方 訶子荳胡椒七粒梨冥側柏葉右四味同搗爛絳包摩爾患處

●眼疾點茶 正明散藥前眼科秘方滑石加飛火甘石左目水广香考龍腦茶以上極末加辰砂如花色為度白蜜和煉急眼中治諸眼疾兼治後方

大明成化丙午年
歲次己未夏月
吳中瑞書於家
中瑞

