



帶下 秘方。小兒疳奇方。小兒驚熱奇方。瘧疾奇方。虫証嘔吐水奇方。

氣癆 寧心湯。亡血浮腫奇方。安心湯。通乳方。○金梅丸

癩症 疳疔奇方。疫眼奇方。脚氣腫滿。○旋覆花湯。麻疹奇方。○葛根蓮翹。

眼病 局方羌活散。○馬鳩白芷湯。百咳。○消中飲子。面腫咳嗽。痘毒入眼。大瘡毒眼奇方。

切瘧 九味清脾湯。加ルガラシ。○五雲寺健脾。調經奇方。○蘇人散。○正氣散。

乳癰 五味方。痲疾 二脂丸。痔疾 七味奇方。勞瘵如瘧。○土味附子湯。瘰疽奇方。○毛千スリ。

瘰癧 加味白散。虫齒 四物湯加味。打撲奇方。癩風奇方。痛風奇方。骨結去水奇方。

呃逆 參蘇飲。藿香正氣散。落伽風。癩病。一切治癩。○蘇木散。十三味。

泄痢 瘰癧。瘧截瘵。鼠毒。河豚魚中毒。

血暈 狂氣大秘。回味奇方。内眼奇方。内咳奇方。外咳奇方。咳嗽煉甘米。○生津丹。

打撲 瘡漏。癩風奇方。眼病翳膜奇方。足衝下降。○沈香大黃湯。

癩癧 加味五香湯。口虫下奇方。疰疔奇方。○二方。結毒。面部如癩。○甘黃散。

一切惡瘡 中風偏枯。口病因新按。○神聖復氣湯。辨并方。

因 神聖復氣湯。辨并方。

○神聖復氣湯。辨并方。

○神聖復氣湯。辨并方。

○神聖復氣湯。辨并方。

○神聖復氣湯。辨并方。

○神聖復氣湯。辨并方。

○神聖復氣湯。辨并方。

御食庭家秘說卷之三十三

○小兒夜熱奇方 此方ハ小兒何ノ熱ト云フヲ知ズ諸藥ニ用テ尋常奇効有ル方ニ御食庭家傳來ノ方ニ

青皮厚朴 香附 白芍藥 柴胡 葛根 黃芩 甘草
右ハ味水煎服

○和解湯ノ方 人參 桂枝 芍藥 半夏 茯苓 蒼朮 乾姜

甘草 ○此方ハ世ノ賣藥ニスル處ノ和解湯ハ乃此方ニ名古堂
玄匠翁製作ノ方ニ乃傷寒論桂枝湯ヨリ思付タル方ニ我カ門
風邪ノ息風清涕ヲ目的ニ用ル方トスル也

○臨産催生奇方 當歸 川芎 大腹皮 枳壳 紫蘇 香附

甘草 右水煎服。此方ハ催生ニ用テ知有ル方ニ外ニ言
方ニナキ産婦ノ催生ニ此方一方ニテ大抵スル方ニ是れカ門ニ
テ坐右ノ方トス

○頭痛奇方 草薢 防風 天麻 玄參 川芎 忍冬花 辛夷仁
黑豆 下茶 右九味水煎服是乃山牛湯之瘧毒ノ頭痛
往ニ知アリ方中ノ草薢ハ山白朮ヤ

○眼病頭痛 馬嶋白芷湯

白芷 當歸 川芎 防風 薄荷 細辛 蔓荊子 柴胡 甘草 荆芥
右十味水煎服頭痛甚者ハ菊花ヲ加風眼ニ頭痛ヲ目的ニ用ル

○小兒百日咳奇方 消中飲子

藶梗 枳壳 葛根 耳草 厚朴 枳榔 陳皮 蘿菔子 紫蘘子
旋覆花 右十味水煎服

○小兒百日咳方 錢氏白朮散ニホウツキヲ葉木實ニ黑炭ニ
テ加用ニ奇効有

中風奇方 人參 炒研香 紫檀 胡椒 爵金 阿仙茶 甘草 芍藥
右細末ノ○ノ大キサニ丸温酒ニテ用ユ○中風ノ病因ヨリトイ

時ハ中風ノ諸症自然ニ治スル

○癩癩奇方 前ノ中風ノ方癩癩ニ用テ効アリ
濕癩内攻水腫方 赤小豆 高粱 麻黃 連壳 桂枝

分三 大黃 五分 生姜 一錢 右木煎服

○產後水腫奇方 琥珀湯

琥珀 一錢 商陸 一錢 桂枝 一錢 猪苓 八分 反鼻 五分 右五味水煎用

○蛔虫下穢物奇方

鷓鴣菜 二錢 乃 海人草 二錢 大黃 三分 蒲黃 二分 苦棟皮 三分

右四味以水一合半煎取一合空心頓服日一度夜一度小兒空心
ヲ用テ是ヲ減ヌ大便汚スル者ハ大黃ヲ去ルニ○此方ヲ用ルニ空心

頓服四字所要ニ此服法ヲ守ラザレハ藥効タチ難シ病人ニ其趣

シ教ヘテ服サシム

○男女治瘀血塊方

香附子 半兩 阿膠 一兩 反鼻 大黃 各等

右四味細末每服一錢白湯送下又茶ノ少ハ病ノ輕重ニ從フヘシ

中風語言澁滯奇方 空青ヲ細末ノ以シテ常ニ用語言ヲ自流瀆

○癩瘋梅毒奇方 再造散 大風及癩毒不拘新病服之可ヤ

蜀金 五錢 皂刺 一錢 大黃 十錢 白牽 六錢 反鼻 六錢 右細末温酒下

○狂犬毒奇方 華產班猫 五枚 鹽ヲ衣炒以塩色變爲度以三茶

盪水煎至一茶盞服如此七日除尽宿毒

○瘰癧奇方 反鼻 常山大黃 鼈甲 各一 右細末用

○產後冷熱痢奇方 黃連 乾姜 烏梅 右細末用

○疔瘡疼痛奇方 水蛭 霜 烏梅 右二味瘡上傅

○癰腸便毒奇方 烏賊 一錢 大黃 五分 反鼻 五分 右細末用

○虫齒奇方 山椒ノ煎汁ヲ服○又方取乾明腸置痛齒凹處

○又虫齒家方 桔梗 良姜 麻黃 山椒 櫻皮 塩 文ノ字錢ヲ以テ
塩ヲ一スクヒ菜中ニ八九之各等方左水一坏半入七分ニ煎口中ニ含醒
ル時吹出ス如此致遍

○治咳奇方 地骨皮 鼈甲各五分 五味子一匙 右細末壘凡每服五方
一日三次服

○治疔瘡方 針疔頂末熊胆水蛭巴豆塗針口則黃水大出

○治中蝎毒方 續俗曰登利毛知 右即將傳痛處

○治瓊扼毒方 塗蛇蟻於患處

○治痔瘡方 蝸牛四五十箇以胡麻油煮以至膏月為度

○疳眼奇方 備中思好菴味噌菜方 味噌汁於土鍋中入黑炭
相和用故稱味噌菜

緋知字肝 ヒシノキミ 八目鰻鱺 ヤツノウナギ 乾柳肉 經三
年者 赤瑕癖 雞膽 各五分
黑炭

右小兒疳眼眼睛見絢紋者用之有奇効

○小便不利奇方 茯苓大 白朮大 沉香中 乾姜中 右四味煎服

○吐血奇方 赤石脂 柘榴皮 石細末用

○又吐血奇方 赤石脂三分 柘榴皮五分 於久利加字木利鹿角霜 阿片五厘

柘榴皮五分 右為末取新汲水一盞內醋少許送下其症劇者

刺尺澤筋推之無新脉者取血

○瘰癧結核奇方 絲瓜黑燒 酒送下一匙四五度

○便毒治方 大黃 柘蟄 木鼈子 穿山甲 巴豆三粒 右糊丸酒送下

○胞衣不下奇方 及鼻霜 角石霜 麝香三分 右為末酒送下

○乳癰乳不出奇方 鯉魚頭黑燒 右一味白湯送下

○纏喉急痺奇方 雄黃解毒丸

雄黃二兩 爵金一錢 巴豆十四粒 右酢糊丸津下

○血塊奇方 浮石丸 桃仁 大黃 浮石各等 右糊丸

○治久痢方 白木 礬石各等 右粳米丸梧桐子火

○頑癬奇方 輕粉 綠豆 白附子 硫黃 牡蛎各一 右為末以唾

傳獨嘯日濕瘡頑癬傳菜愈之毒氣內攻者不少故外傳藥

則內必下之。此一條獨嘯別見謹于此方見之

○瘰癧攻傷奇方 採藜葉與青良若手裏揉和傳患所

○又瘰癧攻傷奇方 牽牛子花 或實 蠅頭十箇 蒲黃 右細末煉

膏菜如クニノ傳患處

○大人小兒喘急奇方 灸巨里動脈上若十五壯若二十壯。

乾牛凡 乾牛一錢 合歡皮霜六錢 桂枝一錢 右三味為丸用

○下血奇方 地榆大 縮砂大 甘草小 右以水二盞煮取一盞服

○脚氣上冲奇方 黑豆湯

黑豆五錢 大黃八分 檳榔一 右以水三合先煮黑豆取二合去滓

入諸菜再煎取一合服

○濕家頭痛奇方 口含水半盞瓜蒂末少許貯小竹管中吹入

鼻中

○中烏頭附子毒奇方 冷服味嚼汁一盞 和邦製

○癰毒痼疾治方 癰毒痼疾若面部若胸腹若腰背若四肢窵陷見因四邊隱起若奇石佐高其色紫黑者為難治後方主之但腹氣不堅實則不可服

大黃五錢 辰砂二錢 天蓋末五錢 麵粉五錢 別貯鉛五錢於土器中安火上待鉛融去屑再加水銀三錢鎔化下火待凝定末之合勻諸菜煎山飯來拾錢取其汁每朝以一茶碗服散菜若五分若一錢後自且至卧時吞盡所餘煎汁若受毒於母胎者雖壯實之人不治假令治復發慎不可與

○癰毒母痼疾鼻梁破奇方 治癰毒痼疾鼻梁欲絕輕粉諸菜不効方

百草霜二合 光明丹二錢 石二味細末攪勻厚紙作袋如烟管大約長二三寸取菜末實袋中吞千下緘定其口臨服置香爐中焚以竹管嚙之作蓋被爐使烟氣不洩七日而服盡以口內爛穢物下為知

○治鼠毒奇方 打碎生蟹敷是患處灸五七壯以解毒之方下其宿毒知則即患處四邊發紫班

○一切治吐逆方 治一切吐逆急迫者 二氣丸 硫黃二錢 水銀一分 右摺合以生姜湯送下

○乳腫奇方 蛇紫大雅骨 下子 右末好酒解之鳥羽塗之乳房 ○產後百日不乳者治方 木通葉六錢 牡蛎四錢 麥門二錢

○末細末糊丸大豆大蒲黃為衣一服四十五丸日夜三度服忌五辛

○青菜他煎湯

○乳不出奇方 括萎根九支 青黛六支 右末白湯送下

○產後腹痛奇方 貯陳艾於瓦器中焙熱帛包熨臍上艾氣口中徹則止

○血淋奇方 海金沙末白砂糖送下

○打撲打傷奇方 大黃二支 杏仁一 右以水二合煮取一合即時服后

飲好酒醉為度至鷄鳴死血盡下

○喉痹奇方 丹礬 烏頭 皂角各等 以竹管吹之約壹分五厘

○諸毒停食奇方 金屑丸

○礞石 百草霜各十 硫黃五支 真砂半支 金箔十二枚 細末糊丸

○痘瘡暴惡治方 刺尺澤委中取血

○咽喉腫痛奇方 鼠氣霜白湯送下

○衄血奇方 及鼻霜白湯送下又方衄血輕証土龍霜塗鼻

頭割者紙包實鼻中

○喘息奇方 三靈散 喘息爛咽喉墜疼方

茶末五支 黃菜子五支 麵粉各二 右三味合調每服一錢日夜二度宜

心白湯送下

○喘息救急方 茶寶

茶寶生熟 茶寶丸

百合根 礬石各等 右三味研勻為丸每服一錢空心白湯送下

○

○

○^七血塊腹痛奇方 赤凡 生藤^{牛并} 大黃 麵粉^{石等} 右三味蜜

和調為丸每服五分白湯送下日二度夜一度發赤班為知

○實腫奇方 鯉魚湯 療水腫上氣引湯脈大者方

生鯉魚^{一尺公腸} 洗淨 右以水六合煮至三合去鯉服一合日二度

夜一度凡服用漆器生柚皮獨活芽山椒等隨嗜好入之為

避腥臭故也

○諸結毒內攻腫滿奇方 赤小豆湯

赤小豆^{五支} 鷄舌^{三分} 大黃^{二分或三分} 麻黃^{八分} 反鼻^{五分} 猪苓^{七分} 商陸

^{二支} 右七味以水三合先煮豆減二合內諸菜煮取一合公

渣溫服日二劑或三劑

○產後水腫并毒腫奇方 琥珀湯 治產後水腫或諸毒生腫

者方 琥珀^{一支} 商陸根^{二支} 用生 鷄舌^{三分} 反鼻^{五分} 猪苓^{七分}

右五味以水二合煎取一合去渣溫服日二劑或三劑

○麻瘡奇方 南極散 南星 鹿角霜 黃柏 瓜蒌根^{各等}

右四味為末以水和調敷患處

○厲風癩瘡久淋治方 再造散 治厲風及諸血毒癩瘡久淋

反鼻^{六支} 爵金^錢 白牽子^{六支} 皂角子 大黃 右五味為末每服

一錢空心白湯送下隨性易也

○頭痛腹痛咳嗽奇方 抽刀散 治諸血氣頭暈頭痛心腹胸

膈刺痛欬嗽不止等方

五靈脂 古ワタリヤミナ
ト云モノ也

右一味細末白湯飲下日數次甚者童便送下產後血暈發狂惡露不下者大驗

○赤眼奇方 洗塵散 黃柏 礬石 各等分

右二味盛絳囊漬湯中淋眼中日數次

○淋疾疼痛奇方 合歡木 半錢 大黃 五分 右二味以水二合煎取一

合日三劑

○排膿奇方 排膿散 合歡滑石 不効 甘草 各等分

右四味為末每服一錢空心白湯送下晝二度夜一度

○轉胞奇方 巴豆湯 巴豆 五分 田螺因 一匙 右二味共搗成膏和

勻攤一寸半圓形紙貼臍下一寸五分別作三寸圓形紙貼膏邊

覆之合安貼痛劇者最驗

○結毒下疳骨疼奇方 輕粉凡化諸結毒下疳骨疼淹不愈者

牽牛 二匙 大黃 輕粉 各一匙 梅肉 一箇

右四味為末糊丸茶末為丸每服三分日三空心白湯送下不須嚼

以六日為一劑七日平且空心服備急山三分穢物當大下

凡施劑不必忌劑隨病者強弱輕重斟酌之後方亦從之此

藥在峻烈慎勿過用服後口中爛者銀花煎方嚼之

○癩癩奇方 蓼莪散 馬蓼 陰干 水蛭 各等分燒存性

右二味每服六分空心白湯飲下日二夜一以穢物下為知大人小兒

多少從權病愈後試與甚弱會之後發者作劑如前

○諸結毒奇方 玉蘗丹 水銀五分 朴硝 綠礬各二分 戎塩 棗肉各五分
右五味合搗和調一丸一方以蜜蠟為衣日服五丸空心白湯飲下

○諸結毒奇方 金花丹 絳礬五分 枯礬 水銀滑石各一分 棗肉 青塩各一分

右六味先極研棗肉內青塩少許令相得當之以味差鹹為度次內絳礬研和入水銀細研不見星枯礬滑石次牙相和此藥極鍊益佳一丸重一方蜜蠟為衣每服一丸空心白湯送下晝夜五次以大便如蚯蚓泥為知盡止

○脚氣衝心水腫治方 黑豆湯 治脚氣衝心周身洪腫者

黑豆八錢 棗根白皮一分 枳柳一分 都李一分 右四味以水四合先煮

黑豆減二合內諸藥煎取一合日三劑○都李仁代野薔薇

用于可也

○諸結毒偏疾奇方 治諸結毒偏疾不愈者

銀花五錢 遠志一錢 右二味以水五合煎取三合洗患處日數

○中與因毒奇方 玉穗湯 治獸魚因毒頭痛寒熱面紅臉或

○偏身發赤班者方 荆羊橘各一分 右二味以水二合煎取一合日

三劑○或櫻皮一分加一分又可

○狂癲奇方 白龍散 白刀豆 米粉各十分 反鼻二分 右三味細

末每服一錢日二夜一空心白湯送下含不得入咽者冷水亦得三日後喜唾者為驗凡初發四五日間狂躁者用經驗有數年者弗効

○^十 黃肝病奇方 鎮神丸 治黃肝病氣上衝胞短息不得行步小

○ 便不利者方 鐵砂七支 蒼麥三支 石二味糊丸每服八分日三

空心白湯送下兼療下血家腹裏生塊動氣不得行步手足爪

甲反列衣者

○ 鵝口瘡奇方 天南星 石一味為末水解令如泥以薄紙貼瘡臬

乾換

○ 水腫奇方 零瓜子陽 零瓜子トウクワミ 猪白皮一匙 高陸三匙 小麥二匙

右四味以水二合煎取一合日三劑

○ 水腫奇方 僂芝散 冬瓜重三升者 開頸填滿小麥四合煖為

霜極節每服一錢日三空心白湯送下并飲食中因之益妙

○ 諸結毒奇方 芎黃散 川芎 大黃各等 右二味為散每服一錢

日二或三空心溫酒或白湯飲下凡亦佳

○ 氣疾衝心吐血奇方 浸連湯 治諸氣疾衝心直視煩心或吐血不

止者 人浸黃連各五分 右二味以水二合煎取一合少加熊膽

汁亦妙

○ 結毒咽喉腐爛奇方 伍寶散 治諸結毒咽喉腐爛日赤

耳鳴頭眩不能行步者

鐘乳石六分 虎珀三分 龍腦一分 辰砂三分 飛白麵三匙 右五味極細末土

茯苓二十錢以水一升二合煎取六分去滓三分取二合內散茶一分

空心頓服日服三次忌塩酢辛臭等物

○惡阻嘔逆奇方 伏龍散 治惡阻嘔逆不止者方
伏龍所 右一味極末每服五分日數次白湯送下產後吧
逆亦佳

○水腫逆滿奇方 桃花湯 桃花二支末 大黃二分

右二味以水二合煎取一合日二劑或三劑以水如注

○下停飲奇方 桃花散 桃花末用者 左一味為末空心

白湯頓服二錢後溫酒任性用頃刻當消水是宿酒者立驗

○諸結毒奇方 任物解毒湯

假蘇五分 金銀花七分 川芎三分 葳蕤五分 將軍二分

右五味以水二合煎取一合淹香毒加葶藶毒一錢甚良

○產後下痢奇方 芍藥湯 治產後下利及經閉滯下上氣足冷時

發熱乾噎食臭心腹妨脹雷鳴切痛下利不止者

芍藥二支 香附子二支 乾姜五分 丁香四分 甘草三分 宿砂五分

右六味以水二合煎取一合不過五日下利漸減

○火傷湯傷奇方 黑砂糖十兩 辰砂一匙 右二味煉調塗患處

隨手愈

○火傷湯傷奇方 柿葉カキ 敷患處立驗

○火傷湯傷奇方 黃雲散 黃柏 雞子黃 白并用

右二味研勻為餅子烈日曝乾研為末平日貯之臨時水和令

如泥塗之痛立已明日不見痕神驗

○打撲奇方 生卿臭 砂糖

○遺尿奇方 香龍散 反鼻其丁香其 右二味細末隨臥白湯送

下後溫酒任性凡自七歲至十歲每服五分自十歲至十五歲隨性每增至一錢十五以上每服一錢溫酒送下惡酒者白湯亦佳
不過二十日而痊

○痘瘡貫膿治方 參耆湯 療痘瘡無險惡証而難貫膿者

當取黃耆各一又參各一生薑各七 右四味水以二合煮取一合日

三劑小兒以意減之

○試姪娘方 大麻指又六麻カラ 右一味為霜每服五分日二白湯

送下七日後不見月經者是姪也否者非○一方作大麻指

○小兒胎毒虫積咳嗽奇方 蒼々散 治小兒胎毒虫積咳嗽不

已者 蛤粉 青黛各等 右二味盛絹袋白湯漬數燕之劇

者加秋海棠或積雪草之生汁少許又絲瓜水重湯漬亦良

○大便燥結奇方 寬中湯 治腹裏拘急大便燥結或秘難者

蘇ソラ豆豆 糴糴霜糴 鷄子黃一枚 右三味先取鷄子黃溶化

○內糖霜和合相得拌勻別以水一合煮蘇豆取八勺入前

菜中拌勻臨臥空心頓服數日後氣降腹緩大便快通老人

患便秘者常服大佳

○癰疔潰膿奇方 抹毒散 石蟹燒為 反鼻生補燒 好沉香

右三味各為末每服五分或一錢日三白湯送下溫酒亦佳

○奇癖狂癡奇方 清中飲 療男女奇癖上氣鬱冒臍下無力怔忡眩暈差明怕眩細慮穢憂悲怒無常時為狂癡態或滑泄不已者 葳蕤 草三積右一

右二味以水二合煮取一合日二劑服後小便快利者大驗

○諸瘡奇方 葶散膏 療諸瘡淹不差者

茶昆ボウヤ處煤 麻油 右二味合煮一時計傳瘡上神驗

○痢疾奇方 神祐丸 阿片一錢 黃連 沉香 縮砂 黃柏各五分

木香 甘草各三 右七味細末小麥麴丸如绿豆大辰砂

為衣冷水飲一丸日三丸毒盛者初二三日量其輕重施三黃

兼氣之輩候毒稍退而後用此藥若方其毒盛施之雖當

○時痢已熱解必後發塊癰瘰腫脹等之病慎不可用也

○便毒奇方 消核散 療便毒合口後核不消者

虎杖 右一味為末每服一錢日一夜一白湯送下溫酒良

○水腫奇方 禹切湯 赤小豆四錢 商陸三錢 木通 猪苓 冬葵子

者一 右五味以水二合煎取一合日二劑或三劑氣急者別與

甘遂凡備急凶數而後用此方

○癰瘡奇方 梅荆湯 楊梅皮一匙 荆芥五分 右二味以水合煮取

一合日二劑數日後毒氣脹發水出瘡乾而愈

○男女癖塊奇方 鼈甲湯 鼈甲 桃仁各一 虎杖七分 大黃三分

石四味以水二合煮取一合二劑數日後從大便去黑物香日膠散

兼用甚良

○禁口痢奇方 寬中膏 療禁口利裏急后重甚者

三年酒_{三合} 冰糖_{六錢} 右二味入土鍋中以緩火煮令如飴數服之

平日計行減穢物大下數日而痊大驗○陶按凡此病執甚行數者初用三黃湯過二三日或四五日復方有此証則宜用此藥不然則恐後有他患矣或其初發時其人體弱氣乏腹裡拘急方其用瀉毒劑攻擊難堪禁口益甚諸藥不驗者甚在大抵此系至寬中醫者宜精審明辨以不失其機闕也

○療疽奇方 雄鼠屎_{尖者} 右一味為末糊丸勻得患處隨手愈

○骨鯁奇方 鷓鴣霜 用管吹咽喉立愈

○又骨鯁奇方 人瓜_{一撮} 右一味以一合煮取五勺頓服自然失之

小兒驚風痰毒衝胸奇方 急搗飲 療小兒驚風痰毒衝胸

上竄搐搦不已者方 積雪草_{生用} 蕞菜_{生用} 青黛_{極所}

右三味先將積雪草蕞菜絞取汁各半合入青黛五分拌勻數

之灌之加牛黃亦良

○輕粉毒口中腐爛奇方 療服輕粉劑後口中腐爛者方

銀花煎 銀花_{三錢} 黃柏 甘草_{各半} 石榴皮_{各一} 此方恐脫青_{在之}

黛石五味以水八合煮取五合分置數々冷會之日晝一劑

○婦人血積腹痛奇方 傑藤丸 治婦人血積腹痛方

午藤 乾傑 蒼麥粉 磁石 右三味細末用齧枰和為丸每

服一錢日三空心白湯送下温酒亦得

○眼疾奇方 鉛丹膏 療一切赤眼及障翳不多日者方

巴豆極所 鉛丹各等 右二味以麻油及蜜少許和勻壺頭會乾

換之三日稍覺熾痒隨殺細泡是其候不過七日知。陶

按痘毒入眼七十日內極快

○婦人血氣頭痛耳鳴眩暈奇方 五灵脂陽 治婦人血氣頭

痛耳鳴眩暈不得起心腹逆滿方

水莎一匙 昌陽一分 紅花五分 麝香二分 五灵脂碎三方 或四方 マニテ上品

石五味以水二合煮取一合去渣日二劑或三劑若大便燥結者加

大黃隨輕重

○癩毒凝聚奇方 紫雲條 治癩毒凝聚上部者吸烟方

大麻稍五支 辰砂 右二味研勻以紙為管長八寸以葉末

細其中捻其兩端○作紙管法以紙為條博一寸翻其一邊平

鋪地上糊處向外擇竹管圍一方許頭末因輾管令燒起紙

邊處逐管轉自貼合而起此法甚妙○以紙管植於爐灰

○中大於管頭以紙方幅五寸者卷之令稍孔窄下稍孔寬如筍

形以寬處置覆於紙管上病人口中含水以卷紙窄處挿入

鼻孔以氣吸其烟數吐其水更含新水日一夜一左右各一管

○上部結毒奇方 丹霞條 治上部結毒頭痛癭瘻及咽喉腐爛方

鉛一匙 水銀二匙 朱砂一匙 沉香二匙 參五分 右五味先盛鉛蓋

上火鎔化內水銀柳著并合相得傾住于紙上研候如泥入朱砂
沉香入參等之末三味和調二十四分填貯紙管燃火吸煙晝夜
二次一如紫雲條法以十日為一劑此方甚安驗與粉劑顯眩
甚者大異

○癰毒奇方

咸亨丸

黃陸

胡桃肉

炒全焦黑
細研

槐花

炒全
微黑

大棗

各二枚
炒全焦黑
細末

輕粉

五枚

右五味別炒胡桃槐花大棗等

次炒薑陸候其鎔沸變黑內槐花并取出與大棗同搗節糊
挑細研與輕粉并諸藥合調糊丸服以後方送下土茯苓
七錢葶藶二錢以水五合煎取三合午前空服以湯一合送
下凡藥五方餘湯二次服盡病重者服八分或一錢數日後

○若口中欲腐爛者即減服從前法○陶按此藥不必拘常法用

解毒劑送下亦佳宜量其輕重表裏強弱以左右收功也

○癰毒偏枯治方

化毒丸

療癰毒沉痾兼理偏枯及一切痼

毒腹痛等者方

黃陸

大黃 鷄冠雄黃

鷄冠雄黃疑可一
物之名也

亂髮霜

名三
生之乳

右五味糊丸辰砂為衣每服一分日

二夜一食遠稍冷湯服病重者日用至五六分服法依前法後寒
熱如感風寒一身發赤疹者大良蓋此藥醋毒最甚得熱猛得
冷飲後若服竟日休發熱懈惰無力者煮綠豆冷飲立定或
服左飲立定或服冷水亦佳宜審察其虛實深淺慎勿漫用
切忌房勞怒悲酒醉及熱飲生冷等物若犯此者不止不得効

其害亦不淺鮮矣

○結毒漏瘡奇方 白虎膏 療一切結毒漏瘡淹久不愈方

輕粉一匙 煨炒人油二匙 白燭三兩 烏賊骨一匙 天花粉二匙

麻油一合 右六味先極煮麻油減水中成珠子即入蠟拌令相得

下大條成白色入蘇葉和勻練成貼瘡處

○下痢奇方 獨行丸 療下痢不止者

黃柏 石一味糊丸每服一錢空心白湯送下日二夜一

○妬乳腫痛奇方 甘草炒末 石一味蜜調塗痛處

又妬乳腫痛奇方 生栗子 石一味薄片焙乾為末水研勻塗之

○黃疸奇方 僂露飲 鼠莽陰干 昌陽石

○石二味以水二合煎取一合吞渣日劑

○產婦口中腐爛治方 班龜丸 療產前後口中腐爛者方

鹿脂子一具 煨 石一味糊丸空心白湯飲下五日服尽

○風眼奇方 排雲湯 車前子二匙 黃連 黃芩 細辛 大黃 甘草

各二 石六味以水二合煮取一合日二劑小便快利為知

○婦人乳腫奇方 好茶末 松脂各等 石二味以煎茶解之塗痛

處

○風火毒奇方 救急湯 杏仁三匙 桃根皮二匙 石二味以水二合煎

取一合日二劑別杏仁葱白俱杵成泥敷瘡口灸數十壯令口不

合甚妙

○又風火毒奇方 奪命散 斑蝥三枚去頭翅足同 香木鬘二枚

右二味為末令調空心白湯或溫酒送下日三或吐毒物或小便

不利及白脂等物毒尽服之乃不利小便清白者為定不

再發矣若服藥不吐小便不出毒物或小便通後腹痛者青黛

黃連末冷水調服二物能解斑蝥毒病愈後百日內忌小豆麻子

葑蒜等物此方饒庭氏傳數試神効

○結毒凝腫奇方 龍鱗膏 散結毒凝腫方

百草霜 松脂各等 右二味飽和勻攤紙貼患處○陶按乳

腫痛類用妙

○婦人血積帶下奇方 丁香飲 治婦人血積或帶下吐沫上氣

腰冷時寒熱咳嗽方

水菰一匙 乾芋八匙 當飯五分 川芎二匙 昌陽八匙 紅花三分 此一味脫間丁子

右七味以水二合取一合日二劑或三劑服后發熱倍前者為知

○疝旁勞瘵奇方 義項丸 療疝旁初發咳嗽發熱盜汗黃

瘦者方 茶昆七匙 甘草三匙 麝香二分 右三味糊丸空心

黃耆湯送下十五以上每服七方日二夜一已下用意減之

○疝旁勞瘵初發奇方 墜芍丸 療疝旁瘵初諸証未見者方

冰約 公皮腸胃燒存性 右一味細末糊丸每服三分日二夜一空心

黃耆湯送下○陶按疝旁諸症數用大驗自四五歲十二三歲

每服二方日二夜一劇者以意增之

下血奇方 烏籠散 百草霜 伏竜所右等

○血積痛奇方 香脂丸 治血積結痛方

阿魏二支 乳香 沒藥 丁香香三 石四味為末糊丸每服一錢

日三空心白湯或温酒送下

○小兒癩証奇方 新采丸 治小兒癩証黃瘦者方

蟾頭一枚灸令黃色 鱉頭一枚灸令黃色 蘆薈分二 胡黃連 五倍子 苦練及夜明

砂コフモリ 雄雞一名天雞子 熊膽一枚 雄黃二支 麝香五分 青黛三支

右十二味細末以糯米飲丸麻子大一歲兒每服七丸日三采飲送下隨年壯用意增之

○日用良方惣論 スベテ療治ヲ廣クセント思フニ先ハシラダ

テトナルベキ良方二三オ方ヲ能クエラビヨキ丈ニ加減指引
ヲシテ療治スル様ニ心カケベキ一ニ丈ニテ療治ノカタハナハ
モツ一ニ假令ハ香川家ニハ四劑ト云フ有テ是ニ加減指引シ
ニテ十ノ者四五方通りハスム一ニ又タル大家ニハ扶陽湯ト云
一方ヲ製メ丈ニ加減指引ヲシテオニル丸スヌ一ニ又仲條家
ニハ清氣散ト云方ヲ製メ此方ノ種々加減指引ヲメ産前産
后ヲ初メ其外一切婦人ノ諸病療治ノハシラダテトナシ是モ
十ニル丸一ヲスヌ一石ノ如ク多クハシラダテトナルベキ方ヲ
テヲヒテ丈ニ加減指引ヲメ丈ニテモ知ナキ時ハ思ヒ付ノ方

ヲモ點スベキ一因本云治翁ノ云ハレニ通り療治ニイキスギ
 タル一ハ療治ノ大禁ニ先ジミチニチナレタル方ニテア三口フ
 テ見テ其テ効ナクハイキスギタル療治ヲスルモヨシ始ヨリ
 イキスギタル一ハ次ノ悪キ一ニ故ニ上手ノユトワリタル病人
 ハアトノ療治ニ効ナキ一ヲト云ハレシ一ハナル一ニ江戸原
 雲庵ハ不換金正武散ニ種セノ加味ヲメ五十六方ノ口傳トテ家
 ニ秘メアル一思ヒ合ヌベシ不換金ヲ万病ノ療治ハミラダテト
 シタル一是世ノ知ル所ニメ後世ニ良醫ノ名ヲ得タル所見ル
 ベシ又張介賓ハ万病皆陰有餘ノ陽不足ヨリ起ル病多シト
 云一ヲ療治ノハミラダテトシタル者シ又丹溪ハ張介賓ト

相反ノ陽有餘陰不足ト云一ヲ療治ノハミラダテトシタル
 名医ニ又東垣ハ脾胃不足ヨリ起ル病多シトタテキウテ補
 中益氣湯ヲ製シ是ヲ療治ノハミラダテトシタル者シ又劉河
 間ハ万病火ヨリ起ルト云一ヲ療治ノハミラダテトシタル者シ
 シタル者シ其外ノ名医良医ニ至近療治ノハミラダテナシト云
 一ホス今故ニ舉ル処ノ八方今日治療ノハミラダテトナルベキ
 良方シ是ヲ聖石ニ於テ數年試ムベキ一ニ故ニ其在治ヲア
 ゲテ我ガ徒ニ示ヌ是ヲ朝夕ニ熟シ試ムル時ハ無量ノ大益有
 テ治療ノハミラダテトナルベキ良方ニ我ガ徒是ヲ試ム

此方桂枝湯也
 加味者

瘀血劑

桂枝中 桃仁大 茯苓大 芍藥大 甘草小 牡丹皮中

右六味以水一合半煮取一合分服。按婦人不屬外因者，悉主之。凡婦人經閉腰背攣引脚腫腹痛帶下寒熱皆屬瘧並并中風偏枯歷節癱瘓鼓脹不同男女運用腸癰加薑蒜大虎中為瘧者加蠶甲麻木冷痛加附子。外因屬寒濕外因風寒暑濕類外邪。指云外邪ヨリ生スル也ノ諸証ニハ此方知シシ内ヨリ起ル所ノ右ノ諸病ノ方ハ此方ヲ盡ク用テハミラタラトセヨト云フ

○瘧疾毒氣上逆至方 柴胡大 升麻中 黃芩大 大黃中 甘草小 大棗中 一本ニ多少計 右六味照常煎服。○至治日治痔疾脫肛痛楚難忍或前陰痒痛者方無痛者無効。○外用荆

芥升麻煎湯洗之而後塗能熊膽。○一本曰寒疝寒熱往來腰痛囊痛甚者加午滕延胡。○按下部發瘡疥癩愈後上爵如氣瘳纖夏細慮或如神氣不定者其係痔疾之因悉至之。○此文中心頓愈後三字夏ノ外意味アル一ニ考ベシスベテ痔疾ハ限ズ下疳瘡楊梅瘡イニキニタムシ瘰癧ハキナナ其外下部有ル患瘡ノ類傳菜ナドヲ傳テ早ク愈ル病人ニ由断スベカラズ上カラ早クナラサレテ具毒ガ行処チキ故ニズツト升テ上ニ心ノ臟ニ攻入ル時ハ下ニ云処ノ氣瘳纖夏細慮神氣不定等ノ諸症ヲ患ルニ氣瘳トハ氣ニクセノツクニテ何ノ一モナキニ物ヲクヨクト案ヒスゴシ夫ヨリ色ノフヲトリユシニ案ヒスゴシ腹ヲクテタリ

笑タリ皆常ノ調子ヲハツシテ虚方ノ如ク痲症ノ如クウツラク
 ト起リ醒アリテナカレキテ病ニ証或常ノ時ハ氣ヲガニアリシ
 ガ病氣以來ノ外短慮ニナリ或アホソノ如ク愚如クニナリウツ
 ラクト煩症皆下部ノ毒氣ガヌツト升テ上ニ心ノ臟ニ侵シツ
 故其テ心ノ臟ガ鬱塞ノ如ク此症トナル者アリ或此症徒妄ナド
 モスル一有者ハ此道理ヲ考テヌベテ下部ニ毒氣ノ畜アル者
 ハ必ズ此心ヲ以テ療治スベキ一是不傳ノ秘ニ。猶此條一角
 犀角麩羊角ノ發明ノ條ト并瘰癧毒方疔毒方梅毒毒方
 等ノ條下ト此処ヲヨクク考ヘ併セラ書外ニ其理ヲ考ヘシ此
 症ナドモ此方ニ麩羊角ヲ加ヘ用サレバ知テシ是モ方瘰癧ニ於

テ詳ニ辨アリ保見ベシ。○サテ方中ノ大黃ニツイテ奇アリ此
 処ノ大黃ハ必酒製ニシテ生ニテ用ル時ハ存ノ外知ヤシ其謂ハ
 酒製ノ大黃ノ功能ニ熟セザレハ其理ヲ得難シ故今酒製
 ノ大黃ノ意ヲ述ル一左ノ如シ昔シ盧廉史一人ノ髮疽ヲ治
 セリ防風通聖散ヲ與ル一多服ヲ知ナシ因テ盧廉史丹溪
 先生ノ診ヲ頼テ其方ヲ相談ニ及ヒテ丹溪先生ノ曰是ハ
 防風通聖散ノ症ニト云盧廉史答テ曰防風通聖散ハハ
 ヤ數十劑ヲ与ヘタリ然レ知ヤシ故ニ先生ヲ求メテ處方ヲ決セ
 一ヲ頼シト云（丹溪先生曰然ラバ防風通聖散ヲ酒製
 ニ用ヒラレト云盧廉史其辭ト如ク防風通聖散ヲ酒

製ヲ用レタレバスラクト全快ニ及ビタリト云フ丹溪心法ニ見
 一タリ予此辞ニ從テ數年未経驗スルニ大キニ知ヲ得ルコトヲ
 大黃ニ酒製ニスルト生ニテ用ルトノ區別如此區別ノツク
 是肝心ノ心得也。又李時珍ガ酒製ノ大黃ヲ評ノ云タル語ア
 リ其語曰鳥巢鼻天射落鶴ト云テアリ此意ハ大黃ヲ酒
 製ニスレバズツト升ル勢カニ假令バ鼻天ニ飛鳥ヲ下ヨリ射落
 ス勢ヒ備リテ上部ノ邪氣ヲ驅落スニハ大黃ヲ酒製ニセザレバ其
 カラ薄シト云フ也。○大棗氣湯ノ大黃ヲ酒製ニスルトセザルト
 涼膈散ノ大黃ヲ酒製ニスルトセザルト大キニ區別ノアリ
 此心得リカ病ニラシワタリテ入用ノコト故ニ其略ヲノベテ我ガ

ハニ知ラスル者也。○文中ニ云織憂トハ系スルノ如ク憂ト云字
 何ノサマテモナキコトヲノ外大サワニ昔方ニミタリスル等ノ
 症ヲ織憂ト云ハ細慮モ其通りニテクダクシキコトヲ氣ニカ
 ケタリナゲキタリシテ色クト常ニ異ニテ氣ヲモム症ノ如ク
 細慮ト云ハ心氣不定トハ石ノ通り物ゴトヲトコシ苦
 勞ニスルヨリ心氣モ自然トシチツカズ彼是ト物クルワシク見
 エル症ヲ心氣不定ト云ハ是等ノ症ハ皆是下部ノ毒氣カ心ヲ
 衝故ニ然ラザレバ瘡疥ノ症ニカ、ル心疾ハナキ道理ニ此所ヨ
 ク考べし予心疾論ヲ別ニ論セリ卷ノ三十一卷ノ見(タリ)
 ○諸淋疾奇方 其^中地黃^中滑^中苓^中 一^中本^中大黃^中

右七味照常煎服或加阿膠。按不急痛者無妨服藥後
隱白大鐘穴三日內灸之者名六七壯

○吐宿水奇方 理舊腹痛吐宿水得食痛劇噎氣酸臭移

時吐者方。○一本朝食又吐又食朝吐者

吳茱萸 茯苓 蒼朮 橘皮 枳實 參 甘草 生姜

石八味照常煎服。○一本日加大黃益可。○按不吐者無驗食

已乃吐病如闔格者不中與之。○此方目的免角急証吐三劫

十劫多年吐症用下劫方知一二

○心痛奇方。○一本作治心痛徹背痛者

當歸 黃耆 甘草 人參 厚朴 半夏 黃芩 芍藥 乾姜

川芎 右十味水煎服。○一本日痛甚者兼與金匱赤石

脂烏頭丸切如神

○痢病下重奇方 理利病下重者方泄瀉亦全之

大黃 芍藥 枳實 厚朴 黃芩 甘草 右七味水煎服

一本條下日理利疾裡急后重者及五更瀉泄瀉等症。○按凡

諸下利后重者以疎滌其毒為妙不必收斂也先用此湯宜窺

利減毒盡而漸下也五更瀉或呼脾腎瀉者以其難治必溫補

之遂無寸効每公上息薄驅其毒而後斂之猶可臨生路理

下血漏下者亦與此一般泄瀉亦得此湯乃漸者身宜宜沈思之

○此文中之云如夕五更瀉脾腎瀉云症虛症心下心得三四

神凡二神凡ヲ始ノトシテ其外温補ノ劑ヲ用テ是ヲ治ス
 ルガ古ヨリ今ニ至迄定リノ治方ト心得テ皆温補ノ爲ニ決スル
 者其數ヲ知ル不可然ルニ今爰ニ云処ハ其定リノ温補ノ劑ヲサ
 シヨヒテ大黃枳實厚朴黃芩ノ類ヲ用テ五更泻脾胃泻ヲ治
 スルノ一方是甚高見ノ至段ニ能此條ヲ貫テ後用ニ備テ
 是ヲ試ヨク然ル此ニツノ口訣アリスベテ泄瀉痢病ノ症虚
 實ヲ誤ル不可虚証ヲ以テ實利トナシテカ、ル泻劑ヲ用ル
 モ誤リ、又實劑ノ虚ニ似タル症ヲ誤リテ虚劑ト思ヒテ温
 補ノ劑ヲ投スルモ亦誤リ、然ル將ハ痢病泄瀉ノ治方ハ至ク是
 ハ虚劑カ、實劑カヲヨク見定ル一所ハ心得ニ甚虚

實ヲ熟ト問澤ナク是定ル一全ク衷急后重ノ一ツ有耳其裡
 急后重ニ虚實ノ區別アリ實証ノ后重ハイツ迄モ除カズアトハ
 ハル一甚強シ又虚証ノ后重ハ大便下ル時ハ后重ノ氣味忽
 ノゾキテスミヤカニナル此后重ノ一ツヲ以テ虚實ヲ能ク見
 定ル一ハ惟此裡急后重ノ輕重ヲ見定ルニナル耳脈ヨリモ
 タシカナル目的、此段裡急后重目的虚實實劑目的ノ辨
 ハ四卷目補中益氣湯ノ條下ニ詳ニ是ヲ弁ス併セ見テ其理
 ヲ考ベキ、此ニ云五更泻脾胃泻ヲ實証トナシテ治スル一
 モ猶此裡急后重ノ目的ニ熟スルニ非レバ療治ノミゾコナシナ
 キニシモ非ズ能ク其目的ニ熟メ此方ヲ用ル時ハ又高一等

ノ妙手段アルべし我カ所是ヲ思ヘ○又此方黃柏一味ヲ加テ
更ニ一等ノ妙効アルべし

○久病調理劑 桂枝加苓朮湯

茯苓^大 白朮^大 桂枝^中 芍藥^大 生姜^{二片} 甘草^中 右六味水煎

○按男子不属外因腹中冷痛舊腹痛心中煩熱不能食
或奔豚氣上逼心眩暈男子中風偏枯脚攣急腎虛火動
者通理久息痢百藥不驗者久病後服之最佳也如脚攣
急中風加附子驚甲如久息痢加附子黃柏大駿○張氏
医通曰諸病難明者從脾胃治ト云一有予此語ノ意ニ從
テニバラク諸症ヲステ、參苓白朮散錢氏白朮散ノ如キ脾

胃ノ至方ヲ與テ理ヲ得し一甚多し今此方ノ如キモ又其
一端ナル者之腹中冷痛奔豚上氣中風偏枯休息痢等症
諸証ヲ治スルモ皆是脾胃ノ治ニ從ヨリ効ヲ見スモノニ此
段深ク考べし○休息痢ニ附子黃柏ノ加味甚妙効アリ附子
ト黃柏ト組合スル時ハ一寒一熱相尋テ効ヲナス一予從來
經驗ニ中ニモ黃柏ハ痢病ノ治ニカ

○肺癰劑 理咳嗽腥臭吐膿或如米粒胸肋間隱痛或微背

声枯氣急不得臥者方

耳草^{六分} 貝母^{五分} 桔梗^{六分} 栝萎根^{五分} 杏仁^{二分} 白芥子^{三分} 姜石^{七分} 水煎

按連日咳嗽者或為肺癰多數旁瘵其人微寒熱不欲飲食

欬逆倚息膈間引痛多吐痰沫鼻粘試令病者唾水中浮者是痰沫忽沉沒溶解必有如米粥粒者是膿也新產蓐婦停食者最灵矣腸癰亦灵葦羊產乳後之人於有宿食者宜常識之

○癩風奇方 萬藏丸

大風子^{三百支} 苦辛 牛膝 升麻 防風^{各六} 白蛇烏蛇^{各射香}
^{一本五重} 大黃^{六支} 乳香^{二支} 麒麟血^{五方} 熊胆^{一方} 金箔^{十五} 龜胎^{十五}
一分 人參 一分 一本有川芎六分 ○石十五味 枰大風子二千下內
諸藥合治更枰之內電射令相得凡彈丸大脂之二十日盡服其
毒輕重後急以意消息不必日數 ○一本曰大風子炮スリハチニ
了更碎殘ノ粉葉ヲ入為丸以金箔十五枚為衣經驗云 ○按毒

○發面部者非多服無効一身因脫者難治其毒腫痞癩者易療滑澤生光眉毛是落者多不復者 ○一本曰癩瘡面色腐爛佛々然者治スレシ手足癢急者或回々者不治也可謂一刀藏寺癩菜ト云者是也

○產後寒熱劑 知母湯 理產後乍寒乍熱通身温壯胸心煩悶者方 知母芍藥黃芩^{各七} 桂枝^{五分} 甘草^少 右水煎服

○產後腹痛劑 獨活湯 理產後腹痛引腰背拘急痛者方 獨活當歸桂枝芍藥生薑^{各六} 甘草^{二分} 棗^{五分} 右水煎服

○產後寒熱劑 甘竹茹湯 理產後內虛煩熱短氣方 甘竹茹^{一分} 黃芩^{八分} 人參^{二分} 隱君子^{二分} 甘草^{二分} 右五味水煎服

甘竹茹^{一分} 黃芩^{八分} 人參^{二分} 隱君子^{二分} 甘草^{二分} 右五味水煎服

○小兒虛証劑 弄玉湯 理小兒寒熱黃瘦腹痛或下利者
方大人亦可用○一本作小兒一切虛証

桂枝中木大 茯苓大 橘皮連 木香少 枳實少 枳殼少 芍藥少 甘草少 石七
味水煎服○一本曰加鷓鴣益可也

○小兒疳癆劑 合壽丸 療積塊氣逆欲絕小兒急慢驚
風并疳皆宜之

鷓鴣 枳實 枳殼 芍藥 木香 香附子 青皮 芫花 茵陳 犀角 鹿角 龜板 虎骨 狗寶 熊膽 黃連 茯苓 石十三味糊丸辰砂
為衣

○雞肝丸 小兒治疳眼方

○鷓鴣肝一具 胡黃連五分 茵豆蔻五分 芙蓉花六月花者 石三味以
水一合無灰酒半合煮肝至水殆盡而出肝片切之曰三四次

以菜查及煮汁和寒劑米粉至可丸為度梧子大每服二三十丸

○小兒驚口瘡奇方 一極散 理小兒驚口方

養真虫散土旺中者佳 石一味白湯送下并處足心

○舌上傷爛奇方 尚足飲 療舌上傷爛或生瘡牙痛者方

出牙痛含之 石膏 黃芩各五分 玄參 大黃各五分 甘草二分 黃連三分 紅花五分
亦佳也 石七味水煎分服

○諸失血奇方 桃花散 理諸出血方

子隱曰 葛粉三匙 辰砂少許 石三味合治撮少許糝患人舌

上閉目欬氣即止神驗

○毒蛇咬傷奇方 豆列膏 療毒蛇咬人者方

乾柿ソレニカキ 清酢數日以柿爛成膏厚度

石一味塗傷處汁出毒潰乃愈仙驗

○舌疽奇方 崑崙散 療舌疽口中生瘡方

昆布未經裂者佳 燒為霜 二支

鹽梅連核為霜 二支

巴豆為霜 二支

枯礬 二支

石四味研

末搗瘡上甚良

○黃肝病奇方

針砂湯

茯苓大

桂中

參少

鐵粉大

牡蛎大

右七味煎服兼與黃肝丸

黃肝丸方

鐵粉十兩

蒼朮粉三四

黃連二兩

右翻丸

白湯送下

○產後諸証方

五苓散

理產後諸証

○舌疽奇方

烏羽茶烏羽ヲ以テ患明附ル字

混布一枚

梅干三箇

巴豆一匁五分

右黑燒傳患

風

○慢驚急驚奇方

百鳳散

石膏十匁

輕粉一匁

右細末

白湯送

下煎湯黃連解毒湯灸治大推身柱天樞神闕各卅壯百

會五壯

○脚氣腫滿奇方

九味栝榔湯

治脚氣腫滿微短氣者

栝榔大

大黃中

厚朴大

桂

甘木

陳

紫

生

薑

右九味水煎服

○脚氣衝心奇方

唐侍中方

治脚氣衝心短氣甚者

栝榔大

大黃中

吳茱萸大

實中

右四味煎服

可兼與紫圓錫桂

共

○口中腐爛奇方

芒硝一匁

辰砂少

右碎末

傳患處

隨手愈

○小兒五疳奇方

黑童散

治小兒五疳方

俗ニウナキツケ

鳥 一羽去腸胃浸干糞中三十日
寒中最宜

右取出以清水洗而後車前子

紅花十合入壺中黑燒右與鱧鱓合食神驗

○小兒五疳方 白童散 治小兒五疳俗云コツケ
葉ト云即是

四君子湯二兩木鼈子年兩
コブクヤ右與鷄子合食

○痰疝家方 陳皮 半夏 柴胡 青皮 厚朴 木香 茴香

川棟子 甘草 吳茱萸 乾姜 木瓜 右十二味水煎服

此方ハ御養庭家傳來ノ家方ニ疝氣ノ症ニ痰ヲ兼ル者此方是ヲ
全ル

○又痰疝家方 白木 蒼木 厚朴 青皮 半夏 茴香 香附子

枳實 紫蘇 木香 吳茱萸 桂枝 右十二味水煎服。此方

モ御養庭家家方ニ前証ヲ治ス并ニ痰風邪ヲ兼ル者又是ヲ治ス

○疝氣家方 枳殼 木香 檳榔子 大茴香 川棟子 青皮

吳茱萸 右七味水煎服。此方ハ御養庭家家方ニ疝氣ニ

テ大便秘結スル者ヲ治ス。又俗ニ疝氣ト云症有其症他何ノ疝

氣ヲ兼ル是乃疝氣ノ疝刺ニ此疝氣疝刺ニ木槌子ヲ加テ妙

知アリ

○婦人帶下秘方 禹餘糧 赤石脂 伏龍肝 烏賊 桂枝 當歸

白龍骨兩右七味水煎服。此方ハ帶下ノ寒ニ屬スル者最

知アリ一匙ノ重ニ一匙ニ調合ニ與ヘシ

○小兒一切雜病奇方 真珠一分 射香一分 龍腦一分 全蝎五分 辰砂五分

右翻丸。是程元九方。○此方去大寺ノ家方ノ小兒一切諸病良
 中ニモ慢驚風急驚風其外小兒ノ五疳急病ニ用テ甚知アリ。○
 此菜一粒六又ツミテ賣奇菜ニ去寺ノ代々ノ重宝トス中ニモ西国
 邊ノ武家江戸ノ降退ノ時末ノ返ル人夥シテ是ヲ傳フ。其故
 有故ニ今此ニ此方ヲ記メ我ガ門ノ經驗ニ備フ菜名ヲ龍杏丸
 ト云フ

○小兒餘熱奇方 青皮 厚朴 香附子 芍藥 柴胡 葛根

黃芩 甘草 右八味水煎服。○此方御醫庭家ノ秘方ノ小兒

○一切熱證ニ先此方ヲ用テ是ヲ八味餘熱ノ方ト云フ

○一切癰毒方 艾葉 常山 檳榔子 甘草 右四味水煎服ス

○二日或三日用テ癰落ル

○虫証吐唾水奇方 金梅丸 虫証吐唾口唾清水者

烏梅^大 山椒^大 黃柏^大 細辛^中 鷓鴣菜^大 桂^大 乾姜^中 右八味翻丸

○此方傷寒論ニ有烏梅丸ノ變方ノ故ニ烏梅丸ノカワリニ此方
 ヲ用テヨク知ラトル。アリ。○此方ヲ用ル目的ハ唇赤ノ如ク赤ク
 ナルニ用テ知アラスト云フヤリシ

○氣癖癰症奇方 寧心湯 治氣癖家或癰症發狂者

石膏 知母^大 枳實 厚朴 芍藥 茯苓 大黃^{各中} 連甘^{各小} 姜

○又此方不眠ノ症打ツヒテ發リ其人物グルワミクヤカテ狂亂
 ニモナラシカト見ル症ニ此方ヲ用テ奇効アリ此ニ云氣疾家

ト云ハ此症ヲ云シ

○亡血浮腫奇方 安心湯 遠志 甘^{者ニ}麥^三伏^三飯^三芍^三麥^三川^一棗^一

^{三十} 治亡血家心氣不足手足或面部浮腫者 右八味水煎服

○此方ヲ用ル心符ハ産後産前或金瘡痔血多ク血ヲ下メ支ヨリ胎

ニ動氣ナトメ水氣アル者此方奇効アリ。此方ヲ用ル目的ハ磨ラズ

テ目的トスベシ醫ノ色ガウスマシラケテ動氣アル者此方ニ宜症

ト知ルべシ

○婦人通乳方 黃耆 木通 天花粉 當歸 川芎 生地黃 白

芍藥 干瓢 王不留行 石九味水煎服

○膈噎奇方 治膈噎初起者有効

煎山藥

○^三禮^二草^{一名箱根草} 半夏 萑 青皮^{者等} 冰糖^{三分或至五分} 石五味水煎服

○瘦眼奇方 川芎 大黃^{者ニ} 蒼^一麥^{三分} 右三味細末トサシテ酒ヲ

以テ送下。但シ此方大黃ヲ酒製ニシ炒ラサレバ効ケシ

夕ムシ奇方 唐大黃 和^二大黃^一 塩煤 右四味酢ニテ解タムシヲ

スル^一毎^一日^一一^一二^一度^一スベシ黄汁出ルヲヨシトス

○脚氣腫滿奇方 旋覆花湯 治脚氣腫滿小瘡内攻喘急衝

心者 旋覆花 茯苓 蘘梗 陳皮 犀角 黑豆 大麥 原方

有柴苓雖然因虛証者^一麥^一腫^一滿^一喘^一急^一故^一去^一柴^一苓^一加^一木^一朮^一

桂^一已

○麻疹奇方 葛根連翹湯

葛根連翹 升麻 白芍藥 柴胡酒製 黃芩酒製 當歸 桔梗

山查 蘇梗 山柰右等 甘草槐年 右十二味水煎服。○加減法

紅豆雞出者加防芎 泄利者加扁砂 通草 咳嗽甚倍日桔加

前桑熱甚者加酒栢 酒連 少許或淡竹葉 口渴甚加勞所蒸

血乾大便秘加生地芎 紅將少許 此方百發百中 奇人妙不可

言也

○眼病奇方 局方羌活散 羌活 葛根 茯苓 菊花 川芎 前胡 黃芩

細辛 枳殼 蔓荊子 麻黃 防風 石膏 甘草右等 ○此方久服醫

膜ヲ生スル者ヲ治ス

○馬鳴白芷湯 眼病頸痛者此方全之

白芷大 當歸小 川芎小 防風小 薄荷中 細辛中 蔓荊子中 柴胡小 菊花中 甘草小

右十味水煎服

○小兒百日咳奇方 消中飲子 枳殼 枳椇 葛根 陳皮 甘草

紫蘇 枳椇子 厚朴 旋覆花 紫蘇子 右十味水煎服。此

方ニホウツキノ黒焼ヲ大ニ加テ愈ニ効アリ

○面腫咳嗽奇方 紫蘇 五味子 大腹皮 烏梅 枳椇 陳皮

杏仁 麻黃 桑白皮 阿膠 紫苑 甘草 右十二味水煎服

○此方ヲ用ル心得ハ咳嗽久クフキ咳ヲスレバ面ムクミヲ生ズル者ニ用テ又効有。但此症ニ胡桃仁ヲ加テ猶ヨシ

○痘毒入眼奇方 川芎 菴飯 白芍藥 生地黃各七 白菊花二

○ 蟬退二兩 防風六錢 殺猪草一兩 羌活六錢 草决明二兩 蔓荆子八錢 木賊三兩

羸羊角五錢 密蒙花二兩 犀角五錢 旋覆花八錢 荆芥穗二兩 鬼黃四兩

綠豆皮一合 黑豆皮一合 右二十味蜜丸。○ 眼赤者有黃連一合

加ノ石此方一大家ノ極秘方也。○ 此方散茶ニ用テモ亦煎湯

ニテ用テモ可シ

○ 瘡毒眼奇方 土茯苓大 黃芩中 黃連中 木通 白鮮皮 白芷 丁子

茯苓 陣堯 防風 大黃酒 枳殼 沉香上 生地黄 乳香 木香

升麻 薰陸右 甘竹少 右十九味木煎服。○ 瘡毒ノ目ハ目ノ

色赤 清其上物ヲシルニ赤キ縞糸ヲシル如キノ者 目前ニテラツク

氣味アリ此目ハ瘡毒ノ目ニ入シ者ニ此心得ヲ用テ瘡毒ノ眼ヲ

見分ケベシ

○ 切瘡奇方 九味清脾湯ニルザラミヲ加フ。○ ルザラミハカリキ

此品一味ヲ清脾湯ニ加テ用ル如キアリ

○ 脾健奇方 陳皮 半夏 茯苓 薤白 芍藥 香附子 黃連

白朮 木香 縮砂 神曲 山查子 甘草 右十二味水煎服

○ 此方ハ京都ノ五雲子ノ家方也。○ 此方ヲ諸病ニ用ル心得ハ鬼角

脾胃ノコナレ悪ク食ノモタレモ有少シ脾胃ニクタクレノツキタル

病人中脘ニツカレルアヒバ有テ鬼角飲食ノコナレ悪キアヒ

バイアル病人病前病后病中ヲ問テ一切雜病ニ木茶ノ丹丸

茶シテ散茶ニ共時ノ宜キニ從ヒ用ル方也。目方ハ時ノ宜キニ從ヒ

五雲子
健脾

心下ノ痞ハ強クハ黃連ヲ倍シ食更ノコナレ惡ク腹モチフツイ
トノ惡キ氣味アルニハ縮砂神回ヲ倍シ咳軟痰ナトアルニハ陳
皮半夏茯苓ナトヲ倍又ルノ美是此方ヲ雜病ニ用ル目方ノ心得
也。○鬼角此方ハ大病ノ后脾胃ニシマリヲツケタキ寸用ル方ニ
ト合点スベシ凡葉散茶並茶此見合ハ將ニコレベシ

○婦人調經奇方 蘇人散 婦人一切ノ良方ニ産前産在血道
尋滯スル者經水ヲ潤流ノ子ヲ生ズルノ妙劑此方ニ勝ル者ナ
シ誠ニ婦人調經ノ名方也

○當飯二兩 川芎二兩 白朮三兩 白芍藥二兩 黃芩二兩 木香一兩 甘草一兩
右細末以温湯送下但次ノ正氣散ト見合合方ヲ用ヒ理ヲ得

ル一甚多し

正氣散方 枳榔子 三稜 莪朮各一兩 丁香一兩 石細末白陽三兩 用ユ

○傳曰此二方常ハ別々ニ調ヘテモツシ石蘂人散ヲ用ル時痞
積アル婦人ニハ蘂人散ニ正氣散ヲ三分一加用ベシ痞ハ強キニハ
各半ニセ用ベシ甚痞積強キニハ正氣散ノ煎湯ニテ羊合セノ粉
茶ヲ用ベシ婦人一切血ト痞トノ妙方ニ用ル法ハ始ハ薄茶一服程
ヲ用ヒ其后ハ一服半程用ニ度ニ及時ハ二服程用ベシ始ヨリ強

ク用ユレバ爭テ茶効ナシ此方惡血ヲ追ヒ血ヲングラス一甚妙也
○乳癰奇方 瓜蒌大者 當飯酒漬 甘草各五 乳香另各一 沒藥另各一
石作ニ劑用酒三碗煎至二碗分三次飲之更以植敷患處〇一

切癰疽腫毒便毒皆有神効。或加青皮可。此方婦人良方。出ツ茶名ヲ神効瓜萎散ト名ク予経験數十人有

○淋疾奇方 枳脂松脂 石二味蜜丸或煉茶ニ用ルモヨシ此方殊外神効アリ予是ヲ二奇丸ト名テ廣ク用ス。○淋病ニツハ區別アリ一ツハ瘡毒ノ淋病ニツハ常ノ淋病是ニ此方ハ常ノ淋病用テハ効アリ瘡毒ノ淋病ニ用テハ効ナシ。○予ガ門人は是ヲ瘡毒ノ淋ニ用ヒタリト云乃チ此方ニ上品ノ山椒末五必ヲ此丸茶ノ飲汁トナシテ用ヒタレバ瘡毒ノ淋疾治シタリト云然モ予未ダ此方ヲ瘡毒ノ淋疾ニ用ヒタルコトナシ我ガ門人は是ヲ試テ可シ。○瘡毒ノ淋病ヲ見ケルハ瘡毒ヨリ出タル淋病ハ小便ノスハ口必ダ

ハレ破レル氣味アリ是ハ瘡毒ヨリ出ル淋疾ト心得テ瘡毒ノ治方ヲ施スベシ又常ノ淋病ハスハ口ノヤブレタル氣味ナシ此ニツハテ常ノ淋病ト瘡毒ノ淋病トヲ見分ベシ。○又瘡毒ヨリ起ル淋病ハ舌ヲヨク見ルベシ若シ舌ノヘリ通りニ紫色イロノ點亦チクト星ノ如クアル者カ又ハホフアラ水ニヒタメニヒラメタル如クニ舌ノクルニアル者カ又舌ノグルリ何トナクキタヤク色赤クヌレル氣味アル者ハ是必ス内ニ毒氣ヲ含ミタル舌ニ是瘡毒ノアルカナキカヲ知ル一ツノ目的

○痔疾奇方 丁子三分 茯苓二分 青木香一分 土茯苓三分 甘草十分 肉桂一分 陳皮一分 石七味細末 赤小豆煎汁ニテ飲ベシ。○土茯苓ハ上品

物ヨシ品急ケレバ効ナシ○予此方ヲ以テ煎湯トナシテ効ヲ
得ルノ有然此通リニスレハ其効猶更ノ一速ニ

○瘰癧奇方 瓠蛇鹿角 蟹モクソウカニ
ト云ヨシ 茯苓子 沉香 石五味 各

等分 蒸焼ニ酒ニテ下ス○此物茶ヲ其本劑一加テ用ルモヨシ

○方瘵如瘰 十一味附子湯 治方瘵發寒如瘰先寒後熱氣血

衰極 當飯 山菜 白朮 陳皮 白芍 熟地 黃柏知母 肉桂

川芎 熟附子 姜末右十三味水煎服

○瘰癧奇方 天南星 黃柏 葛粉 石三味 各等分 細末○此物

茶ヲ指ノ痛處フリカケ其上ヲ蠅トリモチニテフキ其上ヨリ

灸スニ灸ノアタ、コルヲ度トシヤム如此スル一毎日二三度

○虫齒奇方 四物湯ニ蒼朮 黃連 黃芩ヲ加フ但熟地黃ヲ生地黃

ニカ、テ用ス如常煎ノ虫齒ニソ、ギ旦ノムベシ

○打撲奇方 雲母 黃精各等分 右二味細末飯糊ニテ煉膏

茶ヲハル如ク痛處ニハル

○癩風奇方 硫黃 細末ノスル

○痛風奇方 當飯 川芎 白芍 茶 生地黃 獨活 羌活 右六

味酒水各等分煎服

○骨繼奇方 白豆ニシキ一味 細末ニテ飲又ツケル

○木水奇方 四苓散ニ西瓜仁 燈心草ヲ加○小便不利ニ

ムクミアルヲ治ス

○呪逆奇方 參蘇飲ニ紫蘇ヲ倍シ用ニ紫蘇息ケレバ効
 十し○又藿香正氣散呪逆ヲ治メ甚効アリ○長門庄左馬
 隠居年八十餘歳八九日ノ間呪逆ツイテ出諸菜効ナシ
 藿香正氣散ヲ用テ一服シテ大効ヲ得タリ其外経験ニ方ニ
 ○落伽風奇方 桂心 細末ニカワニアタノ具トニハル迄ルバ又
 取カヘシ迄タル効ナシ

○癩病奇方 大風子 一斤打碎キ衣皮白ニテツキ油ヲトリ其渣ヲバ丸
 茶ヲノム丸茶ノ大キサ●一日ニ六十程ツ用其
 油ニハ樟腦ヲ少シ加ヘ
 破レタル処ヘツケベシ

○一切積治方 葦朮散 葦朮 當歸 白芍薬 吳茱萸 丁香
 乾姜 白朮 茯苓 牛膝 三稜 枳榔子 甘草 川芎

○右十三味水煎服

○他痢奇方 益智 青葉藿香 唐木香 吳茱萸 肉桂 甘

茯苓 右七味水煎服○此方一切他痢ノ症寒熱虚實
 ヲ同ク先此方ヲ用ヒヨ用テ后實熱アル症ハ少シサワクニ其
 時スミヤカニ實痢ノ在方ニ照スニシ全ク療治ノ手ヲクレト
 ナルコトナシ至テ奇効アル方ニ

○瘰癧氣急 紙ノ摺子ニテ額ノ鉢鉢ヲマワシ額ニテ止其繩ヲ病
 人ノ手一束ヲキリテ太クニ扱殘ノ繩ニテ人指スビノ中ノ寸ヲ
 トリテキリ扱其餘リノ繩ヲ以テ病人ノ咽喉ノ上ニカケ唇
 方ヘタレ下シ繩ノツキタル処ヘカリ点ヲスベシ扱以前ニキリ

タル年ノ中指ノ繩ヲハチヨリニツニ折リ中ヲ其假リ糸一アテ
両方ヘヒラキ骨ヲハサニテ糸ヲツケ中ノ假リ糸ヲ消シ両方各五
百壯位ヲヤクベシ

○瘡截符

此符ニ紙ヲ三枚キリ此紙へ鬼頼ノ二字ヲ

又物ニテ書拵粒カラミノ糊ヲムテ額ニ一枚両ノ足ノ裏へ一枚フ
ハルベシ

○鼠毒奇方

千屈菜

根莖葉共ニ當飯川草 白芍薬地黃
用ニニ々

白檀 紫蘇

御種入参

右八味水煎温服○若此薬

テ知ナクハ更ニ蓮蓬房里豆甘草ノ三味ヲ加ベシ

○河豚臭中毒奇方

眼兒草

右一味極細末ヲ白湯ニテ服スニ

ワカニ吐瀉ノ其効如神

○産后血暈狂気奇方

反鼻

黒燒 菖末 酢切 乾漆 熊胆 右細末

丸トナス又煎茶トナスモ可シ又經驗ノ方ニ

○風眼奇方

黄柏

燒明礬

文字錢

竹葉

水一杯半入一

杯ニ煎朝ヨリ七ツ時迄洗ノコリハステベシ

○内咳奇方

瓜蒌仁 茯苓

知母

黄芩

芍薬

半夏

生姜 棗

右十味水煎服○何膠貝母桑白皮ノ类ヲ加テ

其症ニ從テ加減スベシ○肺ノ臟ニ陰ヒナキク乾キツク寸ハ胡桃

仁何膠ヲ加ベシ此ニ品肺ノ臟ニ陰シラツケル芥一ノ妙品ニスベ

テ久咳ノ症ニハ肺ノ藏津液カワヒテ 咳嗽モ治セヌ者ニ其時ハ

阿膠胡桃仁ノ如キ個ノアル品ヲ加テ肺ニ潤シヲツケル様ニ治ス
し是秘傳ノ阿膠ハ肺ノ血分ニ潤シヲツケ胡桃仁ハ肺ノ氣分
ニ潤シヲツケル妙品ニ○此方ハ香川先生ノ傳方ニ内咳ト云ハ
外邪ニヨラズ内ヨリ起ル咳ヲ内咳ト云ニ内咳ニハ此方ヲ以テ
ハミラダテトナメ加減指引メ治スニ是ヲ久咳ヲ治スル心得ノ
一方ニ

○外咳奇方 瓜蒌仁 茯苓 芍薬 半夏 枳實 甘草 生姜
桂枝 升麻 厚朴 石十味水煎服 ○外咳ト云ハ感冒外
邪退テ后惟咳計ノヨリテイツ追モ出テ止ヲ外咳トモ邪咳
共云ニ其時ハ此方ヲハミラダテトメ加減指引メ治スニ是又香

川先生坐右ノ方ニ

○咳嗽煉菜 生津丹 香附子 茯苓 乾姜 右三味各等分細
末或蜜ニ丸或糊丸トナシ或蜜ヲ以テ煉菜トナスモ亦可

○此方咳嗽咽カワイテ痰出カカル、等ノ症ヲ治ス此方久咳
ニハ胡桃仁ヲ加ベシ肺ニ潤ヒツケバ自然ニ咳ハ止者ニ

○打撲神方 芭蕉 肉桂 右二味細割ニ水煎服大便秘者
ハ大黃ヲ加フ芭蕉ハ其終キザミヲミヲキテ用芭蕉ハ殊外水
氣ヲ小便ヨリ利スル奇方ニ此方度々大知ヲトリシ方ニ

○瘧瘡預芽奇方 唐川棟子 右一味水三合ヲ以テ二合ニ煎
ツメ其汁ニテ一身ヲ洗ベシ○此方能瘧瘡前ノ兒ニアヒセラ

瘡癩ヲ輕クサセルノ奇効ニ予是ヲ傳授ノヨリ人ニ與テ試ムルニ都合八人無難ニテ瘡癩ヲミタリ誠ニ知アル神業ニ〇一人十九歳ニテ瘡癩セズ因テ此方ヲ教ヘテアビセタリ至テ輕シ又五人一処ニ此方ヲ教ヘタリ是モ五人ナカラ無難ニ瘡癩ヲミタリ又二人ニ教ヘ是モ又無難ニ輕クミタリ右ノ通り経験八人アリ此通り割合ヲ以テ多クスベシ〇此方ヲ以テ周身ヲ洗フ中ニモ足ノ僧臬ノ穴ヲ茅ニ洗ベシ

○痔漏奇方 槐角子^{二兩} 何膠^{二兩} 生地黃^{二兩} 川芎^{五錢} 白芷^{五錢} 當歸^{五錢} 黃芩^{二錢} 黃連^{二錢} 枳殼^{二錢} 地榆^{二錢} 秦翹^{二錢} 黃耆^{二錢} 防風^{二錢} 枳實^{二錢} 升麻^{二錢} 連翹^{二錢} 右十六味水煎服〇此方ハ或大家秘傳ノ方ニ予故アリテ是ヲ傳フ

○癩風奇方 凶挂 膽礬 硫黃 輕粉 石四味各等分酢ニ解傳ハ刺枝奇方 鳳仙花 青木 松葉 右等方黑燒ヲ刺ノロニツケルニ若其刺タケタル人遠方ナラバ其人ノ名ヲ記シ其石ノ上ヘツケテモキク妙方ニト云フ

病犬奇方 枯礬 一味水ニ解其液レタル処ヲ少破リ其跡ニ此一味ヲツケル

○眼病醫膜奇方 黑精草 傷風 右二味各等分細末米飲ニテ是ヲ服ヌ甚効アリ

○上焦邪氣下降奇方 沉香 大黃湯

當皈川芎桂枝大黃中沉香大 石五味水煎服〇スベテ上

焦ノ邪氣ヲ下ニ引降ス一至テ妙ニ或頭痛或耳鳴或頭瘡或眼
病或鼻痔或ノボヤ強キ人其外何ニテモ上部ノ邪氣ヲ下ヘヒ

キサケタキ時ニ此方ヲ用ルニ甚大効ヲ得ル方ニ一大家ノ秘方ニ
一切腫物奇方 輕粉硫黃唐土石灰大黃石五味各等分細

末〇此菜一切腫物ヲ治スル一妙ニ堅キ腫物ハ糊ニ和シ膏菜ノ
如クツケルニヤワラカナル腫物ハ鳥ノ羽ニテモ引クべし又ハ時ノ見

合ニヨルべし
〇一切惡瘡奇方 加味五香湯五香連翹湯此ニ方ノ内エラヒ用べし
若モ知レタ惡瘡又ハ體ノ内ニ何トモナクシコリテ石ノ如クカタキ証

ナトヲ治メ知ヲ取ル一此方ノ妙ニ

〇虫下奇方 昆布一味炒用ス〇予ガ門人虚勞ニ似タル症ヲ

患フ或ル醫者有是ヲ診メ日足下ノ病ハ虚勞ニ非ス虫ニ由ラ下サ

バ病スニヤカニ愈シト云門人其方ヲ願乃昆布ヲ細ニ判ミ炒

一服ニ三處目位ニ調合し常ノ如ク煎し空心ニ毎日カ一服ニ

服テ用ヒラルべし遂ニ細虫ヲ下メ其病愈ベシト傳授シケ

リ予ガ門人謹テ其通り服茶シタリ服茶スル一十四五
日餘ニ細虫ヲ下ス一數ヲ知ラス夫ヨリ勞瘵ノ如キノ症治
メ痔者ニ予ガ門ニ入り醫者トナリテ舊年ノ如クスコヤカ
ニ医業唯今務ルニ予是ニテラヒテ鳥梅丸ニイ子ト昆布

トヲ加味シテ用ルニ相應ノ効アリ 鷓鴣菜等ハ諸家重下シニ
用ルニ皆是諸人ノ知レル處ニ昆布ヲ以テ細生ヲ下シ細生ヲ
下スニハテカワテ是ヲキカメ然レ昆布モ鷓鴣菜モ同ク海州
ノ一種ナレバ虫ヲ下スニモアラシ効カ徒是ヲ試ム

○治疰疔奇方 紫葛大 艾ビツルノ根皮 丁香皮小 肉桂小 葶藶小

薊金 右五味細末蕎麥ノ粉ヲ大ニ加陽ニテ煉リ痰疰ノ

上ニツケ残ヲハリヲク一日ニ三度下ツケルニ一月ノ内治メ但其
上ヨリ灸ヲスルモ可シ

○又疰疔奇方 ナベツルサ、ゲ右一味細末し木ニテ磨アツクツケ

其上ニヨキホドニ灸ヲスルニ如此ヒクモアスル時ハ疰内ヨリ水

ヲ出し自然ニ愈ル

○一切結毒奇方 牛皮黑燒時 山脈末時 右二味細末し七日ニ

温酒ニテ用シ盡ス

○面部如癩經驗 予一ツノ經驗アリ其証一應ニ見テハ全ク癩

病ノ様ニ見テハ口モユカミ目モハタカリ牛ノ皮ノ如ク皮厚ク口

ナトハ大キニユカシテ見ケルニキ病人アリ是ヲ癩病カト思ヒ能

ク診察スレバ疔ニモ赤ク大キニ癩病ニツガヒテ年久ク治セザ

ル病人ヲ見ルニ予是追三人ノ何レモ其症同シ一ニ是ニ因テ

或癩病ノ療治ヲヤシ或面部ヨリ血ナトトリテ療治スレバ一

白ニ効ヤシ予此症ニ防風通聖散ニ浮萍ヲ加ヘ芍黃散ヲ合シ

用ル一二入之甚大効ヲ雨リ全快ニ及ベリ蝎蛇ヲモ加ヘテ益
可シ○但シ芎黄散ハ川芎大黃香豸ニ此三味ヲハ別ニ散茶ト
ナシ其散茶ヲ防風通聖散ニ加味スルニ大黃ハ上品ノ物ヲ酒
炒トナシ用ベシ然ラザレバ効ナシニ入大効ヲ得タレニ因テ我
門ノ經驗ニ備フ

○中風病因考 方書云中風師門是ヲ中氣ト云或氣中ト云氣
ハアタル氣ノアタルト云意ニ風ノミアタルト云ニ非ス○其因本積
氣ニテ經絡ノ行急クナリテ風寒濕或滯食諸ノ邪氣當テ
ナス所ニ於此中氣ト云風カ手傳バ中風凡云ベケレ凡去レ凡
元素積氣ヨリ壅塞サセテ氣外ニ運ルルヲトキ故ニ此ヲ患

寒以下ノ諸邪悉ク風ヨリサソヒクモノ也故角弓反張手足
拘攣ノ如キ皆風ノ狀ナル故中風ト名ク然凡是古ノ名ニ非ス后
世ノ説ニモ外無ク六經之傳變内無便溺之阻隔ト云リ今所有
ノ中風ハ皆一定ノ病ニテ積氣ヨリ生シ外ニ變ト云ヘシ世ノ
中風ノ條ニ素問百病ノ長ナリノ語ヲ引テ論スルナド牽合附
會シ老人ノ衰ハシラシスルナトモ皆中氣ニ偏枯セヌ中氣スルモ亦見
素問風論千金方病源論皆云風名誤ニ卒中是急証ニ多食滯
ヨリナル食滯ノ時ハ先食毒ヲ解スベシ卒中食滯ト大ニ似タリヨリ
辨スベシ偏枯共ニ氣血凝滞スルハ本ヨリノ一ニ其中ニモ中氣ノ
脈進ムハクダシナラマ者ニ積氣有方右ニテモ左ニテモ偏枯スル

スルハ口眼喎斜スルハ氣血ノ流行悪キ方ヲ能流行スル方へ引マテ
 テ然リ或痺ヲナシ或痿ヲ成モ此ニ因シ左喎斜スレハ右病ヲ知リ
 右喎斜スレハ左病ヲ知シ此症ヨクハ疝ヨリ生ス此病前ノ兆ニテ
 脉ノ亢者身シ此虛火ノ亢ニ非ズ塞ヒテ行ラヌ所有故激ミテ
 ナス所ニ故ニ亢ル中ニ洪氣味有癱瘓瘰癧ハ風壯ニ風モ添ナレバ
 類中風ト云フ可此風症ナラバ風葉ヲ用テ平愈スベキナレバ
 今此症大方為ニ代病也積氣故ニ年々經絡ノ行悪クニ陽氣流
 行杜クシテ然リ是モ其發所ハ多食傷ヨリ生ス古來風ヨリ
 生ズト云フ此腹中ニ積氣アルヨリ然リト云處ニ心付ヌト見
 タリ言舌回リ兼ルガ六カニキニ故ニ引シヨリトシ

○中風偏枯ノ治方 温泉或蠶蛇酒 卒中之時大劑

參附或人參半夏湯 食滯者枳實厚朴湯加木香山查或小

養氣湯加山查 卒中灸 丹田 氣海 神闕

ヨミカヘリテノチニハ
 蘇後建理湯

○中風病因新按 以上奉ル処ノ全文ハ後藤先生ノ説ニ中風ノ

一証古ヨリ今ニ至迄病因ヲ論スル一證テヨクトリシメナキ
 一ニ予ガ知レル所ノ病因モ十因餘モアルベシ又後藤香川
 説ヲタシ加ル時ハ其病因ドレガドレヤラ一級スル一甚カタシ
 是也素中風ヲ病人ノ不覺ト云ベシ是ニ因テ中風ノ病因病
 症ヲ考ルル一別ニキンミスベシ十卷目ニ是ヲ辨ズルニ併セ見

テ熱ト其病同ヲ決スル様ニスベシ凡角素問靈樞中風ノ病名イ
 ツトナクスタリモノニナリヌクニ後藤氏此論中風ハ積氣ヨリ起ル
 ト云フ論ノ全體ニ於テハ如何ニモテモラニク開レバ然氏此方ニ
 固テ治ヲ施メ見ルニ論ノ通リニ効アルヲ甚ヤシ及テ犀角圓ナ
 トヲ用テ知ヲ得ルヲアリ療治ト論ト宛角引合ヌ様ニ思ハル
 此處熱ト考ヘシ委細ト卷目ニ辨アレバ讓リテ此略ヌ

○神聖復氣湯辨 治復氣兼冷足太陽寒水足少陰腎
 水子能令母實手太陽肺實反來侮土火木受邪腰背胸
 膈閉塞疼痛善噎口中涎目中心位鼻流濁涕不止或息因不
 聞香臭咳嗽痰沫上熱如火下寒如水頭作陣痛目中流火

視物眩々耳鳴耳聾頭并口鼻或惡風寒喜陽日夜臥不
 安常覺痰塞膈咽不通口失味而膈縮急而痛牙齒動搖
 不能嚼物陰汗出前後冷行步欹側起居艱難掌中熱風
 痺麻木小便數而晝多夜頻而欠氣短喘喝少氣不足以
 息卒遺失無度婦人白帶陰戶中大痛牽心而痛面如赭
 色食少大便不調心煩霍亂逆氣裏急而腹痛皮色白後
 出餘氣復不能努力或腸鳴膝下筋急肩脾大痛此寒水東
 復火土之變也

乾姜炮為末 柴胡剉如豆大 羌活剉如上 甘草剉 藜蘆本八分 升麻剉 半夏
 陽洗已上 當歸身酒浸剉 防風剉如豆大 郁李仁入菜同煎 人參已上名五分 附子

炮去皮脂五分 白葵花細剪入 石竹藥都作一服水五盞煎至二盞入
 草豆蔻仁熟去皮乾 黃耆已上名橘皮五分 在內再煎至一盞再入
 下項藥 枳殼五分 黃蘗酒洗 黃連酒洗已上 生地黃酒洗 已上四味
 預一日別用新水浸又以川芎細末 蔓荊子已上名 華細辛二分 預
 一日用新水半大盞分作二處浸此三味并黃蘗等煎止藥作一
 大盞不空担入此浸者藥再上火煎至一大盞空担稍熱服空
 心〇又能治噤頰噤唇噤舌舌根強硬等證如神宜食羊肉
 及厚味滋味大抵腎併膀胱經中有寒元氣不足者皆宜服
 之神驗於日生日滿時隔三五日一服如病急不拘時分服〇此
 方東垣辨惑論出タル方之腰背胸膈閉塞疼痛ト云ヨリ

方後ノ舌根強硬等證ト云ニ至迄是ヲ數ルニ四十一症此
 四十一症皆腎膀胱經ノ内ニ寒邪ヲ復シ元氣不足スル
 人ト云此也此症ヲ患ルニ予此方ヲ用テ知ヲ得シ一往々
 アリ今其医術一ニヲ舉テ經驗ヲ示ス一在ノ如シ一先
 婦七十餘噤頰噤唇噤舌舌根強クテモノ云カクキ
 中風ノ如ク手足不遂齒動搖ノ或痛ム一アリ或如此ノ症三
 身ヲ渡リテ治セズ先医皆中風ノ症トテ中風ノ藥方ヲ
 施セ且治セズ予ニ治ヲ請フ是ヲ診日此症全ク東垣先
 生ノ云ハレタル腎膀胱經ノ中ニ寒アルヨリト云ノ症ヲ見ス
 ト思ヒ乃チ病家ニ此方ヲ書記ノ詳ニ教一用ヒシム病家

方ノ如ク調合メ是ヲ用ル一三月計テ舌根強硬等ノ症ナ
 モノ七八治メモノ云丈ニ頃ゾ大キニ治シタリ然レ極老衰故全
 快ニテラヌ后十五年ヲ経テ天壽ヲ盡メ死シタリ又一婦白帶下ヲ
 患陰戸ノ内火ヒニ痛ニ心引テ痛症全ク此方ノ條下ニ云テアル也
 是又神聖復氣ノ症ト思ヒ付此方ヲ調合メ與白帶下ヲ初
 心痛并二月餘ニメ治シタリ又一婦人上熱ノ火ノ如ク下寒
 如氷ノ症ヲ患諸藥知ナシ持病ノ如ニシテ是モ三年ヲ渡リ
 テ治セズ思ヒラク是又東垣ノ云ハレシ腎膀胱經ノ寒証
 タル一明シト思ヒ此方ヲ割製メ與ルニ其効如神治シタリ又
 一男子ヲ治セリ鼻塞テノ不聞香臭耳鳴耳聾目常泣出

ノ物ヲ見ル一能ク此病人又衆医ノ藥ヲ服スレモ効ナシ予
 思ヒラク是又神聖復氣湯ノ症ト思ヒ此方ヲ割製メ用ル
 一半年計諸症ナシ七八ヲ治メ休業シタリ其后全快シタル
 ヤ否ヤヲ知ラズ右ノ病人神聖復氣湯ヲ以テ効ヲ得シ一惜
 哉此方世ノ人用ル一ヲ知ラズ我カ徒是ヲ試コ○此方ノ方
 後ノ服法甚大クシク如此ニシテハ久服スル一ヲ得ズ予ハ常ノ
 如ク此方ヲ用ヒス大服ニ用ヒタリ煎服法服一辨或論毒
 フル処ノ法ヲバ用ヒザルニ此諸証老人或性質虛症ノ人或
 中風久キヲ經テ治セサル病人ニ往々此神聖復氣湯ノ
 症往々有能ク診察メ彼是ヲ考ヒ併セ復氣湯ノ病状

博スベし是ヲ修行ニ

醫家庭家秘說卷之三十三

小兒夜熱奇方 此方小兒何人熱ト去リテ又知ラズ

御食庭家叙説卷之三十三

御食庭家叙説卷之三十三

小兒夜熱奇方 此方小兒何ノ熱ト云フヲ知ラス諸熱

ニ)

小豆衣糖言次 此方は小豆衣ノ糖ニシテマシキニシテ
醫方ニ載ルル者ニシテ

