


武門
號 245
卷 31





九折堂山田

氏圖書之記



御食店家秘說卷之三十四

暑亂病因考

霍亂トシハ暑

毒ト飲食ト氣食モテ病シ霍亂

トシハ暑邪計ナレハ暑邪ト食傷けナレハ食傷ナリ

霍亂トシズカラズ霍亂ハ暑邪ト食トラ魚ヲ病ヒテ霍亂

云ツニ暑境メ云ハニモ内傷外感ノ半之吐はコモド起身

モニアセリテ揮霍撓乱スアリサヨジキ霍亂トシハ病

各ニシタル者ニ主ニリハ霍亂正乎散乞ニシムク程霍

亂無ハ一毛を霍亂者正乎散乞ニシムク程霍

亂無ハ一毛を霍亂者正乎散乞ニシムク程霍

中湿因

卑湿經絡傳藏ソ不玄故病チ發ス凡モト

連テ中ラ當乎ア不知久々発ニ出ス當分湿敷ニヤヌ矣

民内外ヲ令ハ不育ニ湿ハ皆亦皆ナリ治方 五考敷是
一身内外ノ氣ヲ疏通スル方故也後道ヨリ湿ヲ流通ス

汗湿新擇

湿ハ寒ニ湿ト也湿トヲ別ルラ湿ノ療治肝要
トルニ先ツ寒ニ湿ト也ハ夜歩行キテ夜露ガ寒ハ冷
湿ニ地翁ナドヲタク喫ニ或ハ苏サトヲメシハ冷
リ下ヨリハれ多モ侵サシ或ハ寒中而湿アシリ或ハ汗ジニル
衣服ヲ衣テ一七日冷季モ申ラレシヨリ湿病見ス是湿ト
云フ之其ハ寒ニ湿ト也ニハ五積敷妙剂ニ又拵湿ト也复
月七用中十ドムニシテル努テ雨湿ト暑季外タカヒ行ハ
ヒ湿氣中等モ寒气撲湿ニ拵湿リシテハニ湿湯

五考敷如キ是モ妙剂ニ又空腹撲湿外寒モモワカズ熱モ
ツカケル清涼病アリハ主ニ方ハ不換主ニ白芍葛根ニ味ラ
加ロヘ除湿局ト云フニ方アリ是ニモニ先湿病ハ加梗
ニツニ別ア主ニ方アリタテヨキの○叔湿目的、臍節鎮主去
つか湿目的ニモニツニテ臍節至痛スルモアリ身體ガ
重キモアリけ而アムアシモ鎮主トハ半湿全休アツケル
湿スカタハムノ矣ニテドロコトニテドロミキシテ鎮主ト云フ
テモ鎮主トシドロミキシテ病ノ癡ガノナドリスル付
仰トヤラシ身ガシドロミカリテ不自知えテトモナドガ乃モ鎮

痛ノ事ニ是復ダキ病ト云ヒ冷脾トモ皆無モリ要
 スル必病之又ツノ目的ハ主脾ミフ者是湿ノ目的之湿ハ物ヲ
 フクラス者か人ノ身アリテモ主脾スル之是依テ是ヲ見ル
 時ノ湿ノ目的ノ身体舗モ一ツノ冷肝ノ目的而此ノ会
 トスづ○又湿浮ト云フ病アリテ病脇痛ナシヨリテ大
 便ヲ湿スル是モ湿ノ病ドコトナメラカルモ其浮ノ
 スガタモ此通ニ湿スル是モ舗至、既ハ半サル之是レ
 ナ、脚氣ナリテ湿ノ目的舗至、既ハ陽スル是長々
 ○又後藤先生天民ノ説ヲヤブウテ湿内外トアヘ、既ハ
 ヒ湿ノ皆外翁之トスノ用ベス湿、内湿ナリ外湿アルト云フ
 ルハ古人ノ論云下キヨテ詳之乃干調中主寒湯外
 陽降星門風陽升陽降星乃乎生之主之病ノ内湿也
 ナエト云フリタナシテ或ノ問曰外湿ヨラズ内湿生スル
 抑抑ハ如何善焉脾胃一爻ヒ虚スル附ノ腰内ノ膏肓塞ノ各す
 ノ條下ニ云ハシテ該病ヲ見ヌキ是乃子内湿之何ゾ内邪ナレト云
 るヲ知セ○而中湿論ハ王宇泰ガ医鏡ノ論也詳
 ナリ有て医鏡ノ全文ヲ記前人之理復補ム左
)如

王宇泰中医鏡中湿論
 湿者天地樹物蒸之氣也方其外
 腮干上亢精竈結而未開難寒、天值之亦覺溫煖

此濕氣之熱者也及其布濩于下氣將流演而舒散雖曠月值之亦覺見其清涼此濕氣之寒者也濕氣孰者多中干氣虛之人則發爲濕熱之症頭面如裹而四肢浮腫身體重着而轉側不便者是也濕氣寒者多中干血虛之人則變爲寒濕之症四肢酸疼而關節不痛竹脚版拘牽而行履重滞者是地其有不因鬱蒸之立而得者必冒雨而行涉水而走或露臥以至涼或汗衣而不解漸漬于肌肉之中滯于肾脏之内流溢于脾胃之間牢籠于脾腎之處則肌肉冷而肾脏瘦脾胃薄而腰背痛

慄十風癆則生麻而不仁兼半死血則感不而不覺動半火邪則腫痛而難忍隨其所感而病斯痼焉医者審其濕之或寒之或熱人之或虛或壯病之或上或下感之或淺或深因之而藥之亦庶半其近之矣○藥例頭面如裹乃濕熱蒸于上者宜以蒼朮苗八分為主佐以升中防風葛根甘草加葱姜酒並溫服之微汗出即愈矣○四肢浮腫平素原無脾胃之症者乃湿寒淫于肌肉○宜以蒼朮羌活主藥佐以防風防己腹皮烏桑萸芩甘草加姜葱酒并溫服之微汗

出卯愈矣○身體重着轉側不便者乃濕也
滲入而將深○宜以薑末白及爲主藥佐以吳仙
烏藥枳殼羌活防風南呂生半夏加生姜酒並服之
微汗出卯愈○凡此三病皆因濕熱不散故立微汗
雖病人氣虛亦宜先汗之湿而不宜先補之氣則
腠理皆密濕無繇而致矣少待汗腫能消重着能脫
而後參芪之類可服也○四肢酸痠閑節不利乃
寒濕入骨筋肉之宜以虎骨當取爲主藥佐以薑
或官桂烏頭芍苓防己木通牛膝桑條吳仙之類水
並加車前子汁服之小便利則愈矣○筋脉拘
牽行履重滯乃寒濕滲于血脉也血得寒則
阻滯而不流脈得寒濕則阻滯而不流脈得寒濕
則牽制而作痛○宜以四物湯爲主藥以養心血
尤以赤芍澤鴻木升牛膝防己白芍甘草葛根以
去其湿火加附子官桂以溫其經則愈矣○凡此
二症皆因寒濕所中惟血虛者得之夫濕病宜燥
而反不用燥劑爲主藥者以燥劑大過能耗血
故也血一耗而病終不可愈矣故寧以養血爲
主治而使以利濕溫經之藥使寒得化而除濕得
熟而散也大法濕在上以升麻引經濕在下以荳蔻

引經濕在中以白朮甘牛引經濕在遍身以羌活烏藥
 引經濕在兩臂以桑枝引經濕在兩股以牛膝引經濕
 热與寒濕皆以此為准此等大略也○寒濕疼痛宜
 外治之法以膏藥貼之生姜片半碗米醋一盞廣膠
 四面熬火成膏入肉桂花椒瓦皂川烏末各五六錢射杏
 錢攬和攤干紵絲上先以生姜擦患處烘熱貼上甚
 效○又有湯洗法見股痛門○胃部疼痛白朮一兩
 酒三葉力○腰脚疼痛黑牽牛大黃各一兩
 烏木酒水大如梧子大每服二十九食前生姜湯
 下如要利加至百丸○濕傷腎經腰重冷痛小便
 利如利加至百丸

利附子泡去皮鹽白朮各杜仲牛膝每服五錢水一盞姜七片
 宜心服○脾濕大過四肢腹痛喘逆氣不宣通小便
 赤泥草莖莖四兩防己三兩赤芍芩一兩木香牛膝各一兩
 東肉為丸如梧子大每服二十九食前桑枝皮湯下
 ○風濕相搏手足創半痛並肩背或身微腫
 羌活附子白朮甘牛等各每服四錢水二盞姜
 五斤溫服不拘時○諸濕腹痛四肢腹滿及滴傷胸膈
 刺痛口乾目黃甘遂一兩當歸陳皮各一錢烏木下
 每三錢酒調下濕度經痕四堆謙甫曰春發之
 交人病如傷寒其人汗自出肢節重痛轉反覆

難小便不利此名風溼。非傷寒也。陰雨之後鼻溼或引能過。多有此証。但多服五苓散。小便通利。溼去則愈。肺虛世曰。医者不識。作傷風治之矣。汗故下之久已未。年京師大疫。正為之。本羅得其口說。救人甚多。大抵五苓散。水去溼。耳胸中。有停飲及小兒吐呌。欲作癇。五苓散最妙。亦不從焉。其二也。希羅謙。布ガ說。從中溫。而外邪。似乎病。ノ後此五苓散。用テ大効。ノハメテヨリ。代通。ガモお邊十日。助ヲ。ムシテ。有我門是ヲ。弘ヨ。

咳嗽病因考

凡寒ニ邪テ。咳スル者。邪氣肺鼻より上ヨリ

因寒サセテ。下ヨリ氣カアラル。努テ。咳ナリ。又肺系。胸乾燥シテ。モナス。邪第ニテ。ムレモ熱。テ乾カアル。モ同ニ。又積寒上衝メ。上甚ヨ。因寒ニ咳ナリ。肺痺モ足。同ニ。潤乾テ。ナス。咳嗽ノ久ハ。此ニ傷寒。ヨリナリ。モ有タニカニ。肺痺トイフハ。而今ノ字。咳ナリ。向。咳ニテ。血出ナリ。マリタ。咳。非。バ。不。言。久。嗽。ニモ。肺。痺。ズハ。不。苦。治。方。專。守。肉。物。食。ヒ。潤。テ。キ。ル。ヤ。ウ。ミ。ベ。ニ。咳嗽新稿。湿痰。依テ。咳嗽。不。能。ス。ル。者。肺。ヲ。潤。ス。ニ。乃。バ。ス。肉。物。湿。ラ。生。ス。ル。が。か。之。宣。ウ。是。ヲ。禁。ス。一。肉。物。食。ヒ。潤。ク。早。リ。や。ウ。ニ。肺。筋。ス。ル。ハ。タ。殊。る。之。咳。ハ。ス。

肺津液カワクな潤あ生れ候。亦宣キ並葉モ
阿膠胡桃仁ヲ用テ肺ヲ潤スリカニ既モヤハリ以附
場合之喘急病因考ニシ因ハ奔豚ニ属ス下ヨリ

積寒上テ心肺ヲ侵スヒニ至るハ外邪或食滞テ呻
吸道ヲ妨ケテ生ト多ニ喘吼モ同ト前湯ヲ用ニ見計ヒ
肺ニ属ス只呴入ノミ咳吼モ同ト前湯ヲ用ニ見計ヒ
アルニ病氣勢^{サヤシ}ナシ寸降氣スレバ反テサカライテ惡
キ^ト此等ハ見合テオケバ靜てアリモノ也
治方荷芩細辛五味厚朴枯知母貝母
沈香枳实乾姜生姜各等々煎ハ九ヨリ十四至ル

喘急新林喘急ヲ除スレ重一鷄母丹用テ除スレ病アリ是ハ
年中上盛下虛メ虛火外リ攻^シ多リウハウキニ黒鷄母
丹用テラニヨリ効マル^トアリ^ト穢子降氣湯^ト
煎汁ヲ以テ済スルノアリ是又一種之喘急之初うズ
ニハアルニカツズ瘧痢病因考此其因同ク空虛之始亥

湿経絡中リ居テサテ風入^リ來ルニヨリ瘧トナル瘧ハ
邪表^ヘ発ス風寒^ニ湿^ニ氣^熱うも^ニモ^トく瘧ハ空虚
腸胃^ニ中^ルニ^ト夏月陰陰内^ニ立^テ陽氣衰^ヘ涼^ム此時
人^ニ三令物^ヲ好^ヒテ食^ス故^ニ裏衣愈空^ニ冷^{タル}是故^ニ
夏月空虚^ト人^ニ中^リ易^クホコ^リ腸胃ニ害^{タリ}瘧ハ
夙^ニ氣^ル故^ニ其狀空^ニ性^ニ頭痛^ト表病^ヲナス

病ハ唯寢也アミナル故、表ノ不寢メ裏衣ヲ傷ヘニモ故、
裏面ノ腸胃ニ居中テニモ所ノ血此カム癰結ス故、
裏衣面樹膏塞ス○又ヨク要物ナドヲ食ハ其所イヨク
雍土寒ニメ下焦ノ火盛ナリテ激ニ膚血ノ所ヲ傷ル
故其裏衣面糊テクルナリ辟言ヘバ燒傷メ皮膚ノ糊
同ニ始ハ但黃汁ヲ出ス即キ十キナリ是氣令ニ屬ズ
液化メナメ三十ニ血方ヘ入ルト血下ルニ至ニ多モアリ
居テ後ハ生血ヲ膿トナス間ナク尽血ノミ下ルモアリ
血バカリ下ニ六輕キ病モアリ可見合サテ○膏塞スル
所ノ火糊ニメ上ヘ升シトシ氣ハ下流セトニ相戰テ急迫

メ裏衣急後重ラナス之是皆寒病ナリ故虛人病ナニ
只強人ヨク病ム虛人又トニ空虚ヲ受ルト一曰モニ
瘳メ裏衣ニタモ干テ居トナニ強人ハ此邪ヲ受ナガ
ラニウトタモ七千テ居ル之故此ヲ患フ病ノ腹痛モモ
毒氣盛放ニ今病ニテ下ル血が藏カレトナラ
バ命危殆カラニ腸胃ノ凝血ナリ故命ニ害ナラ
色白トニトニテ赤ラ弊トニ又ハ腸胃ノ湿弊トスル
類是後世ノアヤテナナリ瘧ノ毎日發或ハ間日或ハ
三日五六日ニ至ルモノ多所ラ知カタレ素ニ回瘧論ニ
モ说詳ナリトイル解ニ難シ此支又カキテモ可也

古ハ大病トニタリ故字從鹿聲ニ今リ鹿ハ少ニ呴詰
ナトニテモ治者多レバ大病トハセラズ瘧ハ外ニテモ
邪ヌケ易ク瘧ハ裏面癪カ故ニ六ヶニキノサテニ瘧
瘧一年モ半年モ有テ不乞ハ毒氣ニ凝ニハ湘江曲
付タルモ之又經絡腸胃ニ瘧瘧曲付テ毎年癰モ
アリ○治方 瘥リ初癰ハトカク疏通解毒剤也
用ガ能ナリ 羌氣或ニ氣剤 大黃芍藥木香
ルイヲ加フ 輕重ニ從テ機ビ用ヘニ夜晝白木ナドバ
用ヘカラズトカク瘧テ死スルハ初癰ヲ誤ルナリ
氣剤中ニ夜晝ハ用テ不苦急ニ疏通セト恩ハジ

夜晝ヨガニ股痛ニハ毒氣ニ有ケレハ小承辛ヨ樂フ
ジ初癰既ハ萸連解毒或ハ葛根萸連萸辛湯
ヲ用ジ虚硫石有ハ可湿腰眼天枢ナニ四支スニ
歴日衰虛セハ鴟參湯ヲ用之初癰テモ不食或
口倦セハ鴟參アヲ見合ニ用ジ凡リ承辛湯ヲ用ハ
初二三日内燃毒氣トキナリ十日モスキニハ承辛
用テレヌナリ 理中ヲ用モ酉キニ有氣剤 木香苦
茶アリクミ用ガヨキニ○又歴日愈難或再發スリト
ハ氣剤或理中加木香肉豆蔻或阿片ナド可

○藏鷹系

厚朴

山梔

各大

常山中

臭痢
必死

枳棉大甘十○噤口痢猶參用後ナウニ熱毒内
ヨ攻テ股弓ナリテノトシ初発熱毒焉フメ噤スル
ニハ可用承氣○秀庵曰此毒氣也者也痢毒、
毒腸ニテナ破テ居レハ此證ナニ上腹、毒氣薰升
スルト此ラナス故速用承氣之類可解ニシテ毒
○休息痢是多屬積氣、腹脹スル者多ニ○汝方
立刷或無胆兼困、痢久ニ建中湯石膏之脾氣
衰故ニ理冲湯互ニ○臭色痢必死内經、腸
癖ハ似而異ニ、畜積ハ同ケし氏痢如疫ナト
云所ガ此症ヨラズメ自下ル故裏急後至十三日其毒ナキ

左心腸胃蓄積スル者ナムナ以テ腸癖名ナリ

瘧痢經驗丁未初秋溼令大行旦秋霖祁霽民病瘧
痢並作医者試用新方死者極多時予省老母於肥之長
崎崎氏患瘧也而請藥者、倍合升陽益胃湯隨手
與之隨服愈病雖重亦不過二十貼而瘳信半秉垣製
方之神妙矣今后或遇虛弱人有患溼瘧溼泄者幸
其試之始信ヨリ之有得乎古人言外之微意也

○以理瘧医方口訣頤女見タリ布又以經驗從テ先
經驗又及之瘧後養瘧医通曰邪從少陽循經外泄
少陽胡去表辛加桂枝或補中益氣倍升柴升散則
愈瘧痢医通曰凡風寒之傷於營衛之中則為

瘧飲食傷於腸胃之内則為癆而世有瘧後癆後瘧
此則表氣不固邪氣內犯而致也若瘧邪發泄已盡
必無復為病矣比白蟲元氣下陷脾氣不能升舉故風
寒暑溼得以龍衣入而為病又有病後似瘧非瘧方
陰陽兩虛陽虛則惡寒陰虛則惡熱故寒熱交戰
似瘧也又有瘧痢齊發瘧止而痢甚者皆是脾胃之
氣虛陷所致立宣先喚耆老建中加木香厚朴之
美次與補中益氣加姜桂若服後痢減而瘧作
此陽氣得神而陰氣除也再與補中益氣少加
桂附助陽祛陰則愈○右瘧痢二條選通見外
方從理手抄より氣從生經傳之

泄泻病因考此水壳分利害之故煎湯ハ泻ヲテ有
散利ヲ用ガ吉ナリ泻ニ心氣下リ易ニ心病テ下焦塞
故二字スル之是ハタク字メモ餘リ氣ノヨイハ無ニモ之叔字
ハ寒ニ字多ニ熱字ハ希ニ夏月ノ字ナドヨクハ寒ニ字
ナリ腸胃ノ陽氣不順ノ食物消化スルト成ガタキ
故泻ス水腫ノ泻モ共ニ寒ニ泻ニ今食傷子泄之五更
泻ノ脾腎ノ泻ノ泻ニ心付一カラズ虚損ノモ有
之ノ陽氣乏キ故ニ泄方ニハ泻下セズ陽氣至リ下
焦火ノ陽氣ニシテ動メ五更ニ泻下スル之心字ニテモ脾
腎字似タルアリ治方治中之類灸十二十三十四
脾腎虛火字小鳥ヲ可用水鳥ハアミ、

呌吐噦病因考

〔

虫故呌吐ラナス者アリ。食氣ヲ閑モナド
ヌクハ食滞ナリ又虫ニテモ多リ常ニ好テ食つ物モ倂食
トヲ不得ナドモ皆虫之其余ノ呌吐ハ様ナリ又傷
寒ノ呌吐アリ凡テ中焦ノ病ナリ或ニ痰氣胸膈滞
ルく虫ニテ吐ニハ半生半熟生薑トイニ功ヲシ難ニ捨テ
置テ少ニ薦メテ可用ニシム○治之ノ年夏 生薑モ呌
氣不順ナ佳 脾結スルト有ナリ胃口有寒古本
ヨリノ説ニ未詳コトナリ

噎嘔又胃病因考

〔

此三症同病之其食ヲ拒ム因

吾人ナリトリ噎ハ食物咽ニテ下テ下モニテ又之脇ハ胃高
ニテハ下し近リヨリ下ヘヨリガタキニ留メハ胃ニテ至ヒ
胃ノ府卫收がヌク或其ニ、吐ニ又ハ朝ニ食ノタベニ吐モアリ。
症既ニ肺胃管ノ潤ナク 強リ糞スボてん故ニ凡老人乞病
ハ天然ノ病也。壯年人又ハ半百ノ人ナドノ是ヲ病ハ積
氣アツテ胃ヲ推ス故ニ食ヲウケズ潤ヌテ是ヲ病
有ルニ此故ニ老人ニ反胃ナリロ嘔涌リミ壯人多
及胃ニサレ近リモ一概ニ見夫人年老ハ形衰
皮膚枯燥ス是津液枯渴ニ身中ノ潤ナクナリ故亦
食道胃管モ其如クニ潤ヒ燥キサラムト強クスホリ
自ラ食入りガヌク或ハソリニ比嘔涌ナリ反胃ハ

棊を衝上スル故驚リ此モ胃口ノ潤ナクメ藥モトアリ先ハ
 棋争ナリ噎ミ嘔モ亦棋争下ニ在テ多ラニモアリ
 凡リ老人ハ胃管モ胃モ寛スホニ左食杜年ヨリハ甚減ス
 多是ハ辟言革袋ノ水漬リ火集テ強ルが如シ故シ
 至ラザル始メニ滋補スベ之根本胃リえ陽ノ氣モ衰ル
 かく是タス老人ハ是ヲ病ムハ皆不治之壯年ノモ
 痘ハ潤ハ生シ易キ於ニ保養ヲヨクセハ治ストマリ
 ○治方噎膈ノ灸三五七及胃自九十至六此病中ニ
 モ茶劑及フ外アラズ心氣保養第一トニ希ム方ヲ
 オトニ○解食滯用藥血ヲ行ツ津液ヲ生ルヤウニミ

信成按往歲賀歲社衆七十余テ膈リ患フ之復平
 愈シ九十八歲ニ終リ又事ヲ捨テカドウトナリ心ヨ小
 児ノ如クモチヌタヒノモス若シトガルト有テモカづ
 ブタシシ解食ヲタヤサズ酒ヲ呑ツ用テイットナク平
 愈メ大年ノ后大年ヲ以テ終ル膈リ治方是ニスケルト
 ナニ喉痺度ニ有物些病ヲ患フ一アルモトナリ氣
 屢シハ喉痺ノ血減ル故潤スル者ナレバナリサテ高
 症鼓脹ニ因チ棋争ハ同ニ腰カサ漸々甚シヤ
 ハ鼓トナリ腹大メ漸々リテクルハ高ニ十九ナリニ
 症皆潤スルシ故ニ○秀養曰一種虫ヨリ噎膈

スルアリ虫生メ津液ヲ食シ故身ノ潤ナクナリテ此
病之鼓脹病因考 千足ハ瘦腹脹，狀鼓中空
虚ナルが如ニ加ニ此名アリ此積モヨク中焦ノ内
ヲ阻隔シ元陽ノ養育薄クナツテ脹ル此氣脹之是
難治之股中ノ氣不行スハ此病頗、渴引飲スルモ
此中焦閉塞メ行ラズ故胸膈乾燥メ垂リ至脈
沈或脉ノ平易ナルモアリ微細數ハ死不遠蓋脹
少異ニ其ノ因ヨクハ血塊ニ此ハ婦人ノミヤルモノ
蓋ハトクリノ外堅メ中空虛ナリ此ノ名クル之婦
人不姪者此ヲ串心フルトヨミ是ハ鼓脹如ク千足不瘦

水腫病因考 此一身ノ腫ナリ此モ本ト積モヨリ生ス脾胃
系積多ニ因テアノ煩ナリ方別アシクシモ遊溢
メ多リ水壳不令利セ腰背四肢卫モ兼溢シ此因
テ津液既ニ多キモ化セラシ同ク水多ナル故也腫勢
もニキモノナリニモ腫ハム之鼓脹ト別ナリ此又沈
脈之微細數ハ死不遠此症陰莖ノ腫ヲ見ラト有
腫ヲ知ルズモ腹青筋之見ルハ多キテ底ニアル筋
推モスル鼓モ多クサテ腫ヲ指テ方ニ指リ上ルト偏く
所歸起ルハヨシ不起ハアミ此モ多モカイナキ
故ニ鼓ト同ノ煩渴引飲スルモ少中焦閉塞メ胸膈乾燥ス

六十九〇治方 温泉鯉臭湯 或ハ硫黃湯 附沈西
 桂燈牛〇煮酒水氣障ニヨリ成ニテモ驗アラズ温泉
 ニテハ經ヲ温メ陽氣ヲ行ラス故汗出従ヒシ多枝
 ル之温泉用ヒカタキニハ又ハ只ノ湯ニテ浴スルモヨ浴
 浴後ハ衣敷或ハ綿ナドニヨク覆ヒ汗出ルヤウニ
 スルガヨニ浮腫ワヨク浴湯ニテダニ汗出皮膚緩ク
 カノ落リナトハ木綿ルイニテ巻キえ氣ヲ堅ルヤ
 ハニスベシカヨウニスレハ何付トナクシテ汗出下端
 スレバ人能く心下の用〇此エフ浴湯法方毛又様
 ト尾ナシビ是ニツノ健康アリムモト胸膈アリ
 肉三浴湯スレバ安スモアリテ湯浴ノ為ヨビもサレテ再ヒ
 登スルアリ是マツノ用心又は肉三ノ汗ヲ登ラ水
 率ヒクモモアリ是ハ見食物之充血モ有リ
 ヨル十三ハ九尾ヲ推シ息ノキヒハシモアリト知ル
 ト云一氏胸ヲ推呼吸ハツミナケレバ
 甚ハシモナト知リテシムナキ病人ハ湯浴メ
 汗出スルモ可く代ヘシ也

〔黄疸病因考〕病固より脛ト同ニ不病水腫則黄
 痘五病ニモ核素アリ故内ノメグリ寒クナリ其
 寒湿アタリ其門塞ト所齒スルニヨリ既ス故矣

至之是蒸ヲ薰メ黄、登ス辟言^ハ、曲室外ハ冷内ハ
熱ヲ以テ、麴ヲ蒸ガ如シ外寒ニ内寒キリ弊スルヨウア
矣、黄ハスル也。此症内蒸ス^ト甚^シ、脾腎^ノ為^ニ、之^ヲ子テ善^シ
穀ヲ消メモ養^ノ為^ニハナラヌ故^ヘ、大病后或老人ノリ
瘧^ハ、難治^ニサテ、腫^クルト黄^ハ自^うナク^ナル。

○治方、茵陳五苓散^或、氣利^{加藿香大腹類}
○酒疽^ハ、大酒者^ニ、酒^ニ、酒^テ、脾田日^ヲ、蒸^ニタテ、癰
黄^{スル}、故^ニ是^ヲ、輕^キ者^ト、斯^ニ疽[、]瘡[、]序事[、]
過度^{キル}脾^腎字^ノ後^ヲ、黄^ハ、ナス^有毛茶[、]
色^{ナル}ハ六^ケレ[、]色^ノハ^ツキ^リト、黃^ハ、ナ^ルハ不^苦

○藥解、鮑^ク鯉^鷦、俗^ニ覗^ヲ用[○]、系^モ、六^ケ
エキハ毒深^キが^たいを^ノハ^ツキ^リト、亥^ナルハ不^苦云[、]
フハ毒^ノ清^キが^たく、火動^ノ病因考^{此症虛損ト呼}
冬^キモ^ナリ、火動^セ子^ハ火^ノ病^ハ、ス虛火忘^動ス
ルナリ、虛損^ノ火損^ハ火動^ノ中古以来火動^ヲ論^ス
ル只^ノ、臍中^ノ陰水虛^ニ相火^元ル症^ノニ^テ云^ニ是一概^ニ
積^多、腹^内ニ^ニ鬱^結、^シ宋衡^{運行}ア^ミリナリ内^ノ
潤燥^クト火^ガ元^ル、諸^ノ病^後多^ク火動^トナ^ル是四十^ノ

後^ノ人^タ火^ノ病^ハ凡^入一^瓶、火^ト、諸^ノ藏^火皆^元ル、
火動^ハ一身中^ノ火^未心^リ元^ナリ、飲食不^節、脾^傷
ル^ハ、脾^藏少^少、元^ル房^少、過度^{キル}陰^精、ト腎^傷

藏火亢思慮ヲコラシ宮心甚チ不樂スル陽氣
居候ミテ肝藏火亢風寒邪因テ咳不止ハ
肺葉ヲギテ肺藏火亢心火元火說アリ暫是ト
置ク此故諸病所諸藏火スルモアリ病候方似々
り能カツシ此モ皆移氣本原陽氣行運リ
ナリテ居故諸藏火易シ又其ヨメ火ト
黑火所ハ脉在足三裏火根ナシ又
根火モアリ吹氣之ク按アリ火脉數十
カタキトナリ

勞瘵因考

療ハ察之ノ病
此則必死モツルト云夫義之此腰中火アリテ水
壳精微ノ氣ヲ食之津液ヲ周ニ難ニ當火自生
胃薰ヨ成ナリ此等腸胃向ニミ生スルニ形スヌ

血凝沸火ナル久虫之是虛分ヨリ生トニ思ズベカラズ
寔一人ニテモ虫ヲ生スルト些病トナリニテノ間多
アリ虛火心煩ヲ勞傷ノ起ソナラバ老テハイヨニ
ヨニ病ベキニ多ラズハ唯虫ヨリ生スルト云フ一ヲ知ヒ
又傳尸火病アリ此モトヨリ虫アリテ成者ノ兄病
死バ弟モ病死ス尸ヲ傳フノ義之又十四五ヨリ内火
ヲ病アリ勞ヒ眞えソロヘテス故ニ愈リトマリ此
病苦ト云此等ハ小兒時病ノ虫ア」正痘ヲササズ
内火藏メ漸ク此致スく勞咳トイハ和諧ナ
今時ノ人三十ヨリ内火ノ勞咳ト云フ咳ナケンノ
病トト古ハ虛火ト云アリ此喫當事ノ風寒ノ因テ

ナルニ此ノニ始ニ風寒ノヨリナス也又外リテナル凡肺
氣ヲ房メ咳スル故ニ此名アリ房ニ有所ニ蓄熱益十
後ノ火動ト云フニシテ蒸ハムスノ義之陽氣虚者表
象不行故陽氣も然て舒欝鬱結ノ熱内ヒセテ胃
蒸スルニ辟一バ大寒ノ井久ノ陽氣立加如其ニ
因テ蒸ノ字此病ノ眼目也此ムニ立ル所モ虚火之
身ノ養ニナリ陽氣ニハ樂ス○信成抄ニ壯火食
氣者モ此ルイニ房事ヲスゴシキ陰枯テ熱ルモノ
カ浦ニシテ脉微細敷ニ此症ヲ病ト云フモ皆本
元核ニ内ニアルがニ諸府諸藏ノクヤヒ悪ナシ之
辛ヲ以テ火動房病ヲ方モ大概ナリニナリヨリ内ニテ

モ少火動ラ病アリ四十后房病ヲ病ムモアリ或ハ亦
コレ唯脉ノ微細敷ト浮敷ナルトニテ名ヲ介ウナリ
今時ノ房咳トイフハ右ノ房病也ズヨメハ傷寒ニ應
利リ后或ハ假初ニ風寒ニ時ニ應ニ咳嗽ヲ発シ
内外乾燥ニ經ニ此病ヲナス病因異ナリヤウナリ
胃蒸スルニ同キ故ニ后ニハほヲモ生ニ自此病變
スルニ○治方火動房ニ煮敷一万壯熊胆
餌食火動房ニ夜尋常ノ治テハ四生ヲナリが
タニ火動房ヨリ陰ニ寒陽ヲ助ケニ病ニ當世ノ通患之
Q代無林カ象ノ房病ノ證ニ大キニ異ナシ氏中
トノベキ處アリ能ノ利テ一之理ナレバ詳ナリ矣

方病虛方門於テ是ラ無ズハ其略ス中モは
説内ニ於テ心ヲ用テヨクベキ者ハ信成が説
無ニ胃蓋)説生モ亦味ヒヨクビムシタレバ
モノ虚火之身ノ養ニナル陽氣ハ燥ト云つ
比説中ノ眼目之心用テヨクミ○方去燥病下云
フ部門アリ燥病トキハ惣身ノ皮膚より外乾ヒ
テ潤ナク宣々タキテキラズノ如キモラ皮膚ニ生
スル乞之乞モ乃千些ニテ虚火之比虚火ヲシテ
メサレハ燥ハジセヌ之比又深ク走ラベキ者ニ
呑酸嘈雜鳴火氣病因考此胃中食ス。故酸吐
呑スモ因ハ核身ノ腐絃メ内熱外寒スル故消

化不レーナリ難ノ食物スエレハ猶體室ニ燐ラ歟ラ歟セニトシ
外ハ土ヲ以テ寒ニ卫内ハ火ヲ以テ蒸ト而交トナルガ
如ニ能消化スレバ酸味ナニ東垣ハ空ト云天民ノ餘
食也則湯酸トイフ俱、言タラヌニ喫多モ嗜多内
ニ乳食ノ息ト有リラクビ之是ハ飲食ノモノグリ矣
ニ有ルトナリ嘈雜ハ胸ノヤクニ或ハヤケルト云此ハ主テ
重キ病也アリアリ寒心ハ子ノツルキニ嘈雜ノ重ト云
ハ長病脾胃虛ナドノ病ニアルハニ寒心吃連下
云凡同ニ 治方 脾胆 寄應丸

眩暈病因考此氣上部ニ寒故ナリ上寒下虛ト云
ニ異ニ竟氣上盛ニ血モ共ニシテ虛ナリ氣虛モ
血虛モ有病テモ氣が塞シテ眩ラナスニ虛推

付テイづべカラズ痛ハ眩暈至極之内經諸風掉眩
属肝ト云つ比肝ノ病ナリ凡比ルイノ病肝ノアヅカル
所ナリ肝ノ發生ノ氣ヲ元ル故ニナク激スシハ甚動ズ
極多耳肝キレバモテニ動此ルイヲテ激セム
ルモノハ積氣ナリ此病ハ半集ニキラスカスガヨリ
○眩暈ハ病也アル者ト曰ルハ眩暈ノ病狀凜々
達セサルニ事が逆上セヨハ病モ逆上スルハ有之
血モ亦然リ無ハ病血十ドヲ逆上サセルモハ事ニ氣
ガ下シハ病モ下リ血モ下ルニ事が下うモハ病ハ下う
又ハ癲病ノ卒倒スルモ皆事モ逆上ニ致し此病ト
事ト云フウチモ毒事ノ事ニテ正事ニハ非ガ有ヒ
乾年角沈季十ドリ美ヲ以テモ毒事ヲ下核

スヒヨシケ論至テ達観ニ非ロ徒メテミリヨム

見頭痛病因考

是ニを病ニヨリテ有リ或ハ食傷或ハ風寒
湿ニヨリテ有リ時ニハ本ラムカモカズ左師門頭痛
ノ為トテ加減スルトハイニナシ持病頭痛易クハ是核
事ニ基クハ呎スルニ核多ト云一に經ツセ付クユニタ
モノ痛ニ又却事ニ上ニ寒ニテナス有リ又瘡毒ノ
事ニ逆上メナスマアリ偏痛本ヨリ核多ニ後世事ニ
合ハ寒キニ左核有バ左寒ニテ左痛右モ比同ニ核
事ニ逆上メ經ヲ塞ニハナリ産後頭痛是ヒタイニ風
キテニキニクセ付ク左ニ風が半ルト病ノ是血道頭
痛ナリ直ハ頭^痛ノ胞痛ノ又胞風トイフ胞ハ諸陽ノ胞
左ニ湯氣ヲ凝ラミ外ヘ散セス左ニ死スルニ○頭痛事
血ノ虛ナシト云フカラズ右ニ方暈ノ取脉門ニアル事

血虛○頭痛スルニ方一如ノ効ヲ取シムノ堆リ十三ト云フカ

ラズ心痛病因考

至國積事之脛度又ハ兩乳間(サモコモテ)

參ノ胃脘痛モ參ノ心棲上衝者又モ是ハ胞痛之真ハ

心痛ハ胞中ノ底ニ左テ痛ナリレ又吐血スルモノアリ是ハ

凝血心左テ痛吐血スル故死者十人眞心痛トハ云ハシ

キカ○治方 条 熊胆桂附乾姜此症ハ容易トハ用

ラレバ

腹痛病因考 寒ニ因テ腹痛スルアリ食沸因アリ寒痛アリ

冷腹痛ハ温メテ可ヘ寒痛ハ苦味ヲ以テスカスシ若若キ

ヲ与テ止サルニハ甘ヲ用ヒ甘シ緩中ノ意ナリ

腰痛股痛背病因考 腰痛又ハ寒ニ湿腰間ノ氣

ヲ癪ニ生ヨリ名付イテ時々痛ナスニ又腰ハ

腎ノ府トマニ故腰痛コ腎虚トス比一既す既

走人ノ腰痛ハ陰氣不足ナリ○治方 桂附

建中ノリイ 条 章門 腰眼○丹波ニ婦人

三年腰痛ラ患ツ乾龜ラ寒ニ中ニ用テ功得タ

リ温泉モヨロシ○腰痛備寒ニ有ルハ邪氣閉塞

スハニ余ハ積寒ナリ堵痛大陽經氣行リ

惡クナウテ針ニ底ニ痛ハヌクハ核氣之膀胱經

氣鬱スル故針リ○治方 二症凡ニ○温泉

灸 或氣刺加灸

臂痛病因考

證治要訣名手氣足腳氣對ニテイフ

經絡ノ氣停滯スル故臂痛ラナス以下節門トサテ

居故臂痛難治○治方氣刺加姜黃ハ漏根 条

曲池 溫溜此症治ヲ施メモ痛止難ニ至ガ達ニ難シ之假卫
痛強リナルニ熱蒸モ用キ或ハ湯治モ宜ニ藩板ヲツニ
食フベシ又ハ蒸蒸ニテ痛處ヨリ汗ヲドリ一宜キトカク
温散一茶可也○石姜炭ヲ用テニバニ効ヲ取ニトアリ
姜萸ハ能ク血中リネヨヤブル効ヲ持タル茶か見ヘ
タリ 我力徒矣ヨリ試ヨ

痛風病因考 此凡寒湿ノ三氣參ラシムニ始寒ニ湿絳絡
中テ寒ヘタニ故ニ風が中リ易キハ寒ニ湿ハ陰邪ニ卫痛
ヲ走ス一ハナケビニ風ノ入故アキコニ走痛勢有此一時ニ
邪氣中テニ所ヲソコニヒ又キリテ重リモテユク故此
病ヲナス扳ソノ長引如何ホド日數ヲ歷ルニ凡ハ十日
ホドモスレ去者之故ニ風葉ヲ用テ表表スルハ惡シ

温散メ宣キく又愈タル後モ風寒モレバ又起ハ經絡ノ
セ付故ニ白虎歴節風也フ虎ノカホド痛去フ義此
症ヨリ症變ズルトモニ鶴膝風此壞症也○治方 始續
命湯壞症ナリテカラ後建理湯温泉餅食痛凡
脚氣也因同ジ寒ニ湿皮膚間感入スハ痛凡トナリ肌肉
間入ト脚氣トナシ痛風ハニ脚淺ク脚氣ハ脚甚深シ
故其ハ愈ルトモ遲ニ傷寒ニ後慮後此症ヲ患フルモノ也

脚氣病因考

右名緩凡是古方書所謂凡毒脚氣出此
足内外ノ踝骨或膝膿ニ寒ニ湿取衣テナス其狀テ名ハ督也
寒ハ異ナルナシ腫者湿脚氣トニ不腫乾脚氣トス兔角

骨筋癓聚元々肉陽経散ニシキ向づ

膝十トヽ直リガタニキ金寺。凡毒脚氣トイフ、當病ナリ。宋
元以未ニテ所ノ脚氣ハ當病也。ズ寔ハ疝氣之症足流丸
ガ脚氣ニナリ。亦脚氣腹入テ疝ナルアリ。皆持病。

○治方溫泉 繢命

疝氣病因考

古書疝ハ山ナリ。厥陰經之病也。昂氣積ニ

盛也。意ナガ多氣鬱鬱ヨリ生ス。此火動ラ兼汎症タク。房事ヲスレ積立減シタルモノニタ生ス故矣。收ト。ビコノ病アリ。疝色々アリ。夜癪。晝止。棍疝ト云フ是ハツカニキ。す。虫トテ。疝虫有白色。甚長キモ。代ガ外。出ルト。

疝ハ治ハ其が陰囊(サカム)アリ。小兒偏陰水氣之大成
テトウビント云フ三十リメカリ者。ノ疝便毒也。集ルヲ厥疝云フ。厥陰經へ疝力集ル故也。ノ亦便毒。名ヲ忌ニテ。厥疝モ云フ。アリ。一方也。厥疝ト云フメハヨリハ便毒也。○治方
熊胆 炙。自九至十四 氣剤撰入鳥頭山查
附子桂枝木香吳茱

瘡病因考

剛矛柔ノ二病アリ。剛矛緩急ノ意ニ剛瘡。己易ゾ柔瘡。ハ己難傷寒ノ首。是ヲ論ズ今ノ瘡多柔瘡ナリ。產後或ノ金瘡十ド脱血後角弓又張氣味アルハ剛瘡之示。急瘡ナノ緩急トメ。身スムハ柔瘡。小兒ニテ云ハ急效鷺ハ則瘡ルノ慢效鷺ハ柔瘡ル。

皆節脈痺痪スルノ症ニ傷寒瘧後廁モ外急病ノ若
此病ニ變スルナリ后世方書ニ症ノ字改テ見殊知
是否

痺痪病因考 痺筋骨肉也テカラワニ之痺カラ
ナリト一概思ベカラズ偏枯モ又痺ルトニ風寒ニ湿経
絡ヲ破リ久ク成テ痺スモ一ノ比モ本ト核氣閉塞
ニテ少衛ノ行惡ノメ経絡ノ氣不順ナレバリヨ凡寒
湿津リヤスニえ未ノ不順ヲ凡寒ニ湿經絡ヲ傷メ
筋骨肉也ノ養ヒアシクは故ニ痺症ナル卯ヲ充トメハ
惡シ唯氣血ヲ行セバヨニ痺ハ後人麻木ト名リモ身
吾物ト覺ヘヌ之麻ハトテビリナリ木ハスクム此モ皆

核氣アツテ一身經絡ノクアヒ惡ナル故邪モ中リヤスリ
又中テモ能害ラナシ易キヨリナリ然ニ凡ソコノ
ルイ凡ニ湿ニ氣合メタルト云フニモアラバ凡ニテモ
寒ニテモ湿ニテモ鬼も角氣血ヲ凝泣消込スル故ナリ
ゴ○治方 溫泉 溫散之劑可^レ附子乾姜桂枝ナ

消渴病因考 中焦渴俗カリギー病ト云下焦
渴ヲ消渴ケトイフ田火火ト熾ナル故也^レニ書上中下
三焦ニ令ツ延^レ氏一庭傷^レニ二庭通^レアルモノ之中焦渴スバ
上焦モ燥^レク^レ先ツ又ハ上中焦渴ナリ田火火ニテ壳火
ヲ消スル故ニ飲食スルト尋常ナラズ食物肌膚ト
ナラズメ漸々ニ瘦が未ナリサラ小便頻敷處洪榮
体有モ小便自泻トハカリ久メ沸^レラ見ヒ矣テ

膏、如丸之津液熱、侵サレ罕下スレバ、之甚便通、
飲モノ十倍モ有ルトナリ。如此ナルハ死近之俗ニ便渴
浩スルヲ消渴ト云フ。是ハ白渴或ハ淋症アリト。
○治方 白虎加麥門黃、芩、桔梗、甘草、或白虎加參
或天花粉葛根ノリ葛根モヨシ生姜味ハ多不
可用

正仲致慄病因考 正仲ハ撫摩心血ヲ動ズルが故、無
ラジ内ニテサワツ以外、ハ見ヘヌ。致る特ハ物ニビワクリ。
トメ胎ガラトルヤウナリ。是ハ人參建中リイコ可用。產
後、正仲ハ血氣下(タリニテ血氣逆立テ病氣之則血動ノ
勢)血虛トイフ者、脉ノ正仲属心致る慄ハ属胆

健忘病因考 ワヨク忠レノ意ナリ。此症属腎、肾水充足
スニ心腎相支テコノ患ナリ。大病后、是アリハ氣血生レハ自ア
復ズルモ、老人有之ハヨクハ治シガタシ。○治方、

及鼻交感丹。○香川氏、健忘ノ病ヨムテ、府府ナス誠
ナリ。而ニ諸セテハ至極セリ。於テハ、高疎ノ而府病
門、亦即リ傷セ見リ。及鼻、健忘用ル意後藤
氏モ亦ち意ヲサトルヤ否ヤ

不寐病因考 胆病ニ氣ガサ(テイ子ラヌラムフ肝胆)
氣ヲ達スルガヨシ。狂病、不寐モ胆、肝不安心氣散乱
スル事之停食、テ中焦不化メキモ有不寐トイフ

氣ハサニテ心ハ休ムモノニ故ニソノ側ニテ云フ一悉ハ知ヌ之佛
キ後不寐是津液不足スル故也○治方能胆
或酒雞卯酒ルイ并如石膏湯 餵食尤可

○不寐モ亦痼疾ヨルアリ若病癒ノ條於テ
老ニシ

遺精遺尿白濁淋症大小便因病因考

遺精ハ肝ノ鬱スルヨリ腎ヲ動メテ肝ハ疏泄主シハ或ハ
小便が漲ド陰莖が起ルソニ衣ガ解ヒ肾家ヲ動メ漏リ
トアリ夢交メモリトナドモモテ、处ヨリニ夢ノ精欲
動スル事ナリ又実症ナル人タレシノ精ヲ不泄ハ溢出
ナド、云フコトアレニ至ヤウナ人ハ少カレ、凡遺精ハ
夜之有之氏氣カノ衰ニハラヌ者也房事ナトモ稀別

ナル者ナリ情欲ヲ起アラスモ故、肾ノ骨コシナニ唯曲伏
故ナシハ何トソニクセ付ヲ轉化スルヤウ心得ベキナリ遺
尿ハ以下焦ノ氣不順、メ守ヲ失工、然リ大病後此有ハ
零症ナリ小兒ヨリ此有情欲心生スルト自ラ止ム
濁症凡寒ニ湿ニ中リ膀胱、氣閉塞ノ不化ハ白濁ト
ナル閉スルト強ヒハ抵ラ貯ヘテ赤ニ變ズ甚白及膏
ノ如ナリ有ヘ今ヨリ白濁ヲステ精滑トスルハ誤ナリ滑
ハ精、出ナリ甚シタチヲニハ肾部ノクリカイナキ故ニ
淋本膀胱ノ鬱也、小便腰、如ナ此ヒ膏淋ト云
フ今云外淋症モ多瘧毒、氣アルモ下疳便毒肝経集

テ小便淋漓サル○治方 遺精 可兼九十俞 熊胆
イウレモ温泉 吉 淋毒苓 大黄 通草 车前リト
○大小便閉皆他病ビテアルトニ小便閉膀胱外齒スル故ニ
考ニテ内カ熱メ小便子バリニ閉スルナリ热閉多ニ小便閉是
肝胆頑ルテ此ス當堅道がニリ大便閉ヨクハ大腸ノ
燥熱テ因ス小便閉熱湯ヲ以テキホヤドヲシメニテ
腰ヨリ下ラムスリヨシ夢ヲ冥ニシテヨシ

○遺精ノ論述通毛詳ヘビ右あら者アラジ

痔漏脱肛病因考 之因寒ニ湿ニ大腸卫寒ニ湿中ルト
大腸氣ヲ閉塞スル故此名ナスヘビリ痔イカホドニ
下リテモ不若此止末ヨリ不可用今云血トニモ皆痔下血

スルニハ冬ヘヨモス(カラズ下血ナキモノハ初ヨリ灸ス)

○脱肛モ府ノ内ナリ大腸ニ寒ニ湿アリクリ寒ク成テ
然リ大腸ノ氣不行完ヨ生バ時ニ下血モスルニ小兒十ドニ
多タアリ痢後十ドニ能出来ルナリ右ノ完腸胃ニ生ハ
府ナリ肉ヲユヘテ外ヘ生ルト漏ナリナリ此腸胃ヨリ寒
血流コム故其ハアタリヨキ血モ化メ寒キ血トナリテ漏ナ
ル之○治方府下血十キモノ灸十六七俞或ハ羊眼下
血不止者芩酸芩知母艾トイボ府信石ヲ貼ス
餅食 兔肉 菘田板 **耳病病因考** 聰耳ハ膿血
アラズ黄汁ナリ此津液ナル如テ血分アラズホル
ガ故ナリ參ニヒ久シテハ廁ノ膿血ヲ生ルガ如膿

血ヲ出ス。此上部ノ氣塞リ津液ヲ凝結スル故也。痛アリ
真ハリユマナル方バカリ吹切リ出シバ痛ニ速ノリモナリ。
蒸ヲ用ヒ敗毒ナリ小兒ヲ見ル時心得アリシ小兒時ヨ。
リ大ニ啼キシ時ハ脈モ數ナリ是吹切ラントスル吹切ハ
啼止ムナリ麻油ナドヨシトマリ此吹キラニム之常々
フト耳痛ナリ吹切バヨシ故ニ麻油ヲ今ヨシヨタク耳ノ
出ルアリ若カラズ耳ノ垢ハ氣ニテ津液ヲハリ出スナリ。
腎虛メ耳鳴アリ此上実下虛之又凡熱塞リテ耳
痛アリ瘡毒耳ニ入テ聲嘶スルハ治ミガタシ耳聾耳。
亀ノ小便ヲ度クサセバ閨卫丸ナリアリナリ

鼻病病因考

流涕ハ肺ノ寒ナリ。白鼻ノ閉塞スルハ肺ノ冒
ナリ木ハナ出ル外邪。感シテナスイナリ。木ハナ出ルハ邪
熱樹齶結シ肺部ノ津液凝結シ出ルナリ。寒ニ參メ水、
ナ出ト云フ。モ樹齶ノ熱ヲ生シ熱が潤ヲ流ス故ニ。外寒
内熱ニ。白鼻。白鼻ノ出ナリ。白鼻府ハ白鼻ノ中物
ノ生ズル。ノ外科ノ治アリ。薰劑テハ治シ。酒。鹽。鼻ハ
ヨシ。此ハ外科ノ治アリ。薰劑テハ治シ。酒。鹽。鼻ハ
肺熱ナリ。不治モノナリ。○白鼻。香鼻ヲ知ラルモ肺ノ樹齶
ナリ。亨連辛リ。用テ可ナリ。肺愈。膏肓。灸ス。シ
○酒。查。鼻酒ヲタク飲。酒氣火火上至ムシタキラス
故ニ下戸ニモ間クアリ。薑椒。雞肉。ヨメク食

ノ上部吹出モノヨヌリ出ハニニ血散シテ治スルモノ之
○瘍肉治方ノ草麻子ヲスリツガメ龜入ヒ瘍
肉化メ濃けトナリ治スルノ布是ヲ疎痕セリ○酒查
龜^ヒニ五苓散ヲ用テ酒をタリ布末タモヲ残ズ然し
氏布カ門人先ヨムメ効アリト布^ヒ告ク

傷食病因者コノ症ヨメクハ思慮勞役後上中焦トナリ核
氣塞閉スルノ故飲食克化スルト得ズシテナスモノ之腹痛吐
字甚シテバ四支厥冷シ人皮ヲ知ラサルニ至ル又食毒不化
胸中停滯シ吐字ナキモノアリ○木薑益急ニ
根出ニ用ユベシ或ハ一味熊胆 里丸吐單ノ後四支

厥以セハ四逆參附類擇用○木香藿香益智ニ
味^ヒ振リがシ系^ヒ急用ヲ兼スル方之取扱^ヒモレラ
武^ヒニ効アリ食傷吐泻ノ病先づ三味ヲ用テ其
急^ヒラシキ后ソ^ヒノ症アラバリ^ヒニ系剤ヲトス
ニ是布カ從末ノ經彌^ヒ○俗間云^ヒ三味振^ヒ
方ハ 當將宮ノ沖^ヒト參^ヒヤ否ヤ

眼目病因者夫眼ハ五藏ノ精粹上リ注^ヒ所ナリ故ニ
能物ヲ照ス^ヒオナス鳥睛ハ肝^ヒ主之鳥睛物ヲ照ス
瞳子斗^ヒテ照スト思ハ概ナリ自睛^ヒ瞳子ト相持居レ
故方名瞳子ヲモニ云ト七里眼不重^ヒ又人面眼有

ハ猶天之日月ト云ル人ノ眼尤ハ能照ニ右ハ左ビス一見空
ガウトキニ故ニ左曰右ヲ月ニタトフル一概ナルトナリ
人両眼共ニ相貫テ有ナリ天行眼ノ如キ右病尤
卫ウワリ左ヤメハ右卫ウワル是相貫有トノ驗ニ板里眼ヨ
瞳子ヲシムニハ虚ニ收ス櫛眉スルヨリナス所或は是瘡毒ト
氣ヨリ生ルモノナリ瞳子敝スルハ眼卫注ノ所精血不足
スハ是腎虛ノミニハ物ノリウタイン所精陽ヲ拒故ナリ黑
花ヲ生スルハ陽氣ウスクシテ陰氣精陽ヲ拒故ナリ
見物不正或ハ圓ク見放ニ見ル此陽氣ノ櫛跡スルナリ
皆烏瞳子トモナアヒナリフ故ナリ物ヲニテ見スルハ
是陽氣ウスクメ陰ナキ故ニサテ眼胞ヲ齧レハヤニ黒也

黒ヤニ生ルハ甚惡キトニコニハ並々症ナリヤニハ白黃色ガ大
法くヤニメ白眼赤ソニ烏睛クボミ白眼高起スルヤウニ
明者此白眼カ赤ニテ烏睛ヲタミコメテ惡ク見ズ
サシ凡若ニカラズ実眼ナリ大抵目ノ性弱キニ病目ハ多
ナキ者ニ猶虛人ノ病虛類ヲ不病ト同ニソウタイ
眼病实眼又虚眼ハ少キ者ニ故師門眼病七味
敗毒ヲ用ニ凡眼ニ風ヲ引テナストニ急ニ治セサヘ忽
瞳子烏睛ヲ吹破ルニ故七味敗毒ヲ急ニ用テ敷服
可用天行眼病亦凡眼内ナリ敗毒可ニ眼痛モノク
痒モノクア不見ハ虛眼ナリ最疎モ赤ニモナク唯眼睛
粉ウスソ見ルナリ是ニ難卯ヨニ外障ハウロヒナリ

眼杆ノ點キ不可ナリ能胆ヲ點メ可ナリ内障ハウニツコ
 ヒナリ時節ヨク針メキモ有先ハ難治ノ症青
 云日ハ青ソニミナリ瞳子カ青クナルナリ強テ系ヲ用
 ハヤハリ敗毒ヲ可用ウミゾミヒハトカクリ針サ、辛ハナラ
 又者ナリウミハ黃ミ青ミサセヒコラハ難治ト心レ之シ
 長病眼ハ虛ミ不拘先肝胆ノ俞又ハ腎ノ俞灸
 スベ目ヨリ血取ルト云ハ當令ノト上氣目十ト有
 長病ノ眼ニ可シく省目ハ又各別者ナリ此多肝積ヨリ
 ナスニ經ラ塞生テ目ハ注ク精氣ヲ思ヤウニヤテ
 故ニ無ニ痘毒目ニ入ハ難治ナリ何シハナキアロビヲ
 用テ可シ瞳子ナ上卫白翳羽ガアワクコルト不治ニ無ニ

眼スコニ見ヘルモノ見ト見卫スト云至サルハゲソモ済れ
 ベシ痘毒ノ方ハ小薬考利可之雀目ハ四苓散唐
 苓茶ヲ加テ可シ經猿ノ方ナリ疳眼ハ雞肝可之
 癪毒目ニ入ハ決メ不治シ脾風ハ上下ノ胸メレシテ云
 小兒十トニタタ有リ此ハ胞ハ脾ニ屬スルガ故ナリ

諸證病因考 眇血此般脉經ヨリ逆上スル血ナリ大陽經
 モツニナリテ血ヲ出ス之此撫育モ逆上スル故ナリ故多出
 ルト云モクルニカラス實ナル者ニタク有テ慮ナル者ニ
 有一火ニ陽參安ニ逆上スルヨリメナル之酒ヲ過スモノニ
 アルト是ニ此酒熱ニテ逆上スルナリ此ヲ安止ルハ又テ
 要シコトノ外多出シハ止ルモ可シ危子ノ末ヲ皇龜中ニ

又故極入告可アルヤウニ

入故

山施子ヲケヅリテ鼻中ニ指入テ能ク止ルモノ多シアルヤウニ
氣ニテ上部ノ塞ル氣ヲ閑ケハ其ノ血取ル故ナランカ又ニツ
葉芹ヲホメ用テモヨシ俗ニ項ノモヲ援トアリ此モ督
脈通アシハ上部ニテ多シヲ閑ク者之亦足ヲ水中卫冷
スモ吉此モ逆上ノ氣ヲ引下ス也吐血ハ多田胃口ノ畜血

ヨリ十スツ又シ此畜血ト云ハ何シヨリ畜血スルソト云上部

モヤキ部ニモヤヨ疑血フクレテソレガスレヤズルト其シヨリ

吐血ス血ニモ如此十シハ生所ヘヒタト積ニテ畜血トナル

其破タル所不已内ハイワモ出ルナリモ畜血カヨリモ畜斜

ナセハム利根メ後溢ルト同クタマリテハ血カヨリテ出

ナ故セ日モ止テハ又出ル吐血アリタダ吐血スハ血カシテ

鮮血黒血
忽色モ悪クナリナリ然ニ黒血カ鮮血クト云イヨ知ヘシ畜

血ハ其色黑ニシテ瘀血也又ヨキ血モ畜血テ出ルト

ナリ故畜血ヲ吐メモ面体大色ヲ見スツ有鮮血胃

ヲ破テナス故ニハ惡シ矣ハ血色ニ心ヲ用シ飲酒家

吐血ヨリキハ酒熱ニテ血ヲニヤス故ニ血ハ熱ヲ得テメクルト

云ヘ氏過猶不及メ反テ熱極ルナハ滞ラシメテ胃病

裏表ヲ熱テ破ル故歟此うハ酒ヲヒカテヨキナ

リ又食毒魚毒ニシテ外毒物ニ佛シ吐血スルナリ血肉

外圧ニ肌肉皮膚テ包てリナ有故ニ腫物ナリ如破し
子ハ血ハ不出サテ吐血ノ脉ハ靜ニシテ虛ト云タガヨミ大メ

寔ナルハグニ治方ハ膠艾四物湯ノ類嘆血是ハ不嘆ノ
呪大ニ實在ハ惡シトアリタ

嘔

血出ルヨリモ思キニ此肺ヨリ血出ト云ニ皆鼻サルニハ弊
大カタメ咳甚メ咽ノ道ヲスリ破り出ル所ナリ肺出血出ルト
云ナシハ死ニ近キナリ咽道ハ常ニ出合テ有故セクスハ
モニキニテスし破し出ルニセクスハ肺管ノ所ナリ傷
テ血出ル所ハ食物ノ通ニ咽喉ニ多ハ皆虛症也方
症等ニ長病ニ咳アシハトウトナク咽喉ノ潤乾燥シ
ヒタト咳ニテウガツ故ズ傷テ血出ニ方ノ既ニ肺血
ノ心血ノト云フハ思シタド肺部ノ血ト云不苦吐血モ又
ノ唾ハ潤ナシハ腎ノ主ナリ參す此潤_心腎相交テ和食
故潤有テ唾トナルナリ心肾相交ト云ハ肺陰陽氣鼻降

和順スルナリ故ニ唾血ヲ腎ニ屬ム云參氏唾ニ交リ出ルニ血下
腎ノ藏ヨリ遂上ニ出ト云フニハアラズ升降常ナラヌニ氣
血ニ行ウトケハ血モ凝ナトメ唾ニ交リクルハツナリ痰血ト云ハ
痰ニ交リ出ル之モ唾ニ交リ出ル有比ハ不苦脉色ヲ察
病ニテセキ血凝結メ痰血咳血スル有比ハ不苦脉色ヲ察
メ想ヘシ根又間五邊モ一有朝ニ出ルトト能_{アリ}付ニ寐牀テ
居ル内ニハ_歛キノ血内卫杏コニ帶テ朝ニ成テ寃ニ棉枝下
ワカナスニ出ト同シ此ハ外ノ時ニハ出テズ朝ニハカリ出ルト
云ニ心ヲニ痰血ト云ハ扁咳血ナリ別不可論略血此
無声メ血ヲ吐出スルナリフト出ルモノ有リ此モ腎藏
ヨリ出ルト云ハ只ハ腎病ニ属トハアリ云カタキ者ナリ

瘧

無聲

便血
糞後
漏血
惡症

上部に癰結ノ有無出リニ此ハ吐血、屬ス。シ吐血ハ一度多
出ルナリ便血此ハ下血類也又ハ府ニテ見有リヨリ真ノ
便血ト云ハ大便、後ニ有リナリ尿死症ナリ此ヲ便血ト
トナル也○漏血大病腎虛ノ症アルトク甚惡症ナリ
血淋ハ漏血也似タレモ血淋ハ淋瀝出リニ又小便、如出ルニ
○腸凡下血此當病之腸胃ノ間ニ凡空キ中リ血ヲ動テ下
血スルニ是瘡ノ類也不絕下血スルハ瘡属ニ俄下血ス
ルハ此腸凡ナリ灸所ノ出血ハ此熱ニテ血妄行シテ血ヲ
出スル故ニ萸苓或ハ萸核ノ末ヲ付テ一味萸苓アミ
セテ湯ヲ用テ可ナリ○魏先生嘗か吐血ノ毎アリ桃仁承
氣湯ノ傳ト云併之詳く併見リ

自汗盜汗病因考

八
自汗不可之自汗盜汗モ門閉ラリカラズ各衛氣ヲ占
卫表ノ守ヲ失ヒ腠理固密セサルニ汗スル之然ニ先ツ
盜汗ハ自汗ヨリ重シ自汗ハ勞役十スト表氣ヲ
トロ卫テ出リニ又寔人ノ汗多ハ氣カ張テ出之盜汗ハ
衛氣ノ守ヲ失フ故ニ故盜汗有ハ自行モ有リニ免角
スルヤウニスモ自汗盜汗ナトハ鹿鼈龜カ吉牡蠣ナトモ
食テ吉絶汗ハ死ニ近ウキテ汗玉ノ如クニ流額又ハ
皇ニ頭ニ出ル是之其時ハ參ヲ附用テモ亦ナキ者之
只絶汗ト未ト知テて卫カタニ大利ノ參ヲ桂附ヲ

用テ可ヘ

三二二

口舌病因考 口八脾胃ニ主ニメ舌心ニ主ニ多モ口中痛す咎
モ必腫痛ス心胃熱ト云ハ義ニ非グ大カタロ舌ノ病胃熱ニ
ロノ味ヲ失スル類胃熱ニ有リナリ兔角口舌腫痛ニ石
膏甚効アル者ナリ皆胃熱ヲ能涼クスル故ナリ胃熱
十レハ白虎湯十トヨ用ルニ世人石膏ハ胃氣ヲウツト云
胃熱有トキ用ヒ大益有テ害ナシ胃氣虛タニ病人ハ右
膏用ハ不用也サレニ胃中塞リ熱メ板虛シタ者ニハ參白
虎ヲ用ルヘ口舌咽ニテ痛ニ甘桔湯ニ石膏知母括樓
等ノ京ヲ用ヘ叔重舌ト云ハ俗ニ云コレタナリ舌ノ下ニ
亦舌ト云ヘキ者出ルニ多心脾、齒熱之外科ハ并ナリ
京ヲ付テハ切ルニヤウ有リ不舌ハ舌カ木ノ如強直ヌク
ナリ此モ心脾ノ溫熱熱十トヨリナスナリ重舌木舌
難治内重舌ハ長引キ木舌ハ急ニ死ス者ナリ叔婦
人ハヨリ氣ト寒リ物ヲ若ニスル人莫ニ舌ヲ痛スナリ
此等ハ心脾ノ熱甚ナリ口中吹出モノヲナラスニハ膏大
連小甘牛ウ此ヲ用テ含ムニ兵刃腹中ニ入テ既不苦
百膏新按 本文内口舌腫痛ハ石膏ニ有効アリ是
胃熱ヲ除ク涼クスル故ヘ胃熱ヨリ未しん病ハ白虎湯必
用之世人石膏ハ胃氣ヲウツト云ヘ胃熱之病ニ乞フ
用シハ大益有テ害ナシ胃氣虛シ又病人ニ若石膏ハ

育ナリシテ是誰モ知ルナリニキニ及ハズ也。尼胃中虚無等
兼々病ニハ人多ナラ加テ用ヒシ是石膏ヲ口舌用ヒシ。

一ツノ 口舌咽痛主方 口舌咽ニデ痛ニハ甘桔湯ニ石膏脚
括毒ノ葉ヲ加テ用ヒシ是石膏モ亦從来ノ強徳也。

牙齒病因考

少キハ胃ノ主之也。ニ胃熱ニテハクキ熱ニ生ス
トシニテ包ニサニテヨニ申ノ牙齒ナルニヨロクトクチスカヌ故。
内ヨリ外ノ外ヨリ内ナリ牙齒ノ病タク胃熱ヨリ疾ヨナス。
歯ノ肉ノ主ノ胃熱アル時ハ土克木ノ氣味ニテ痛ス。ナリ
體歯ノシハナリ且モ胃熱ナリ虫力真ニ歯ヲニテスヤウニ思。

ノハ惡シ歯虫ノワク故ハ胃熱ニテ歯格キガムセテ真氣有因
テワクニモ熱毒ニテ歯潤ヲ燥レシカニ歯朽ニ辟言ハ老林
ノ生氣不行メモ所ハ朽カ如シ歯ノ養ヲ失ス故歯
コホナリ強ク腫トニ痛止シ此熱ノ發スルキニ腫物。
虫ノワクモ歯虫ノワクモ同レ皆熱ヨリヘス故ワクナリ根
小兒走馬下疳有リ俗ニ云ハクサナリ此歯ノキカ此紫黑
色ニナリナリ極熱ノ症ナリ此ハ熱也急壅塞ニ氣
血流行ヲ失スルニ治方 白虎湯

咽喉腫喉瘍病因考

咽喉腫喉瘍ハ俗ニドケナリ咽喉腫テ
嘔モ呑ミニス食モ不通コトノホカナギスル者甘桔湯ニ臘霜

横石ヲ加テ用ハニシ幼速ナリ咽ノ痛ニ枯葉モアヒ知
 母升麻葛根黃連細辛危子連翹類撰用テ吉麗
 霽ハ咽塞ヲ開ニ妙ナリ横石ハ独ニ解ス雙乳喉單
 モ咽喉ノ類ナリヒ小兒ニバカリ有モナリヨク乳各
 タカル者へ蝦莫糞瘧ハ收陽經ナリ大頭瘧大陽經
 腫瘻ノ咽喉也大頭瘧ハ芎升柴芩桔梗主
 トス大頭瘧蝦莫糞瘧共ハ繞命湯七味敗毒類
 喉痺ハ氣ノ通路スル喉ニハキズ食物ノ通路スル咽
 ナリ凡ニモ引トフワト起ト有有く其病呻付トニタ
 ト有モノナリ一タビフクシ曲付ト血カラ所至ハ凝易
 キ者ニメヤブレ又血ノ凝結スルニ從テ血ヲ吐出スリナリ先ツハ
 キツカニノ十キ病ナリ痺トニハシビ止ルキニテヒリムトル
 之咽ニ立如ノニ見ニシテ破ル力吉ナリ是
 痰血ガクレテ咽ヲ塞ナリ香辛物ヲ食フト喉痺
 ノクセアルモハヨク発スル者ナリ

咽喉腫痛奇方

甘桔湯ニ覩霜櫻石ヲ加フ

又咽喉腫痛奇方

加味四物湯ニ覩霜櫻石ヲ加フ加味

四物湯ニ加味

四物湯ノ加味ノ咽喉門也

諸瘡病因考

瘰疬ハ此氣方ノ欬嗽帶スルヨリ發ス累

疝ト八累クトニテ頸咽ノ降フ疝出ヲ以テ名シ

凡腫物ハ多ク血分モノ今累歴ハ氣分ニテ血チツヂステア
火故ニ氣腫也。又凡血分ノ腫物ハ愈易シ氣分
腫ハ愈難シ故ニギトハ坤ノアカヌ者ノロアキテ、
氣腫ト云ニ至テモ膿血ウツケハ出ズ。唯萸け白液ノニシ
クミト出其氣分ナルガク之血及ハ膿血出ルハツナリ
全ノ血分ニ不預ニ卫ニ萸けハカリ出之如ハ結核ト
テタニヲ結フ如レ○治方

身桂

曲池

十ト隨方可灸蒸汽ハ氣剤加

桔梗子貝母或萸芩 湿泉共症隨分肉食用
酒ヲ飲者ハトヨク否テ、榮衛氣血ノ和ズルヤウニ至

如比ナシヨツサメ膿十ト出ル才ハ正ニ所處結シタル氣ア
開テヨキノ腰血出ナト三十シハ能愈之。又ハ水分
リ出テモ膿不出ハ愈難クタト卫愈ト云。又
腫出者之世俗之理ヲ不知メ食禁十トラメ唯其
ウムヲキラフ大ニ誤ナリ。亦ハ出狀針ノ頬
ノ如シナヒ各ルニ赤ラ以テス比則別段ノ毒氣之
尋常ノ腫物觀之毒氣トハニ有トニメ其ハ毒猛烈
ナリ。瘀血多一所ニ集ホル故ニ脹卫ハ不出始癰
才ハ西米粒ノ如ニ見卫之根動カセトモ不動高ク。
脹出スメ漫脹ニナルトヘ。又氣カウキシトメ落

附按至
紅線疔、
多々熱毒
有兒改俗
火疔上云
多々急
大病者
死至
針刺
血取下
上手腫

付ヌヤウナ者ノ其毒氣也。因テ脉モ數ナリ其膏
又ボノ味ヲ食シ氣血塞テ生ズル故内経ニモ言
ソノ亦爰是生大丁ト有日本ハ膏梁ノ味ヲアリ。
不食ユ卫疔ヲ病者不多紅線疔トテ紅線ガ
上ルト云ナマリ是ヲ速メキ切ガヨシサナケレバ
責メテ死ニ至ルトナリトカリ血ノ類セル熱毒ナル故涼
剤ヲ用ガ吉レ又其上卫多々毒ヲ去ルヤウニスルモ
可ヘ○敗毒剤櫻皮ヲ入テ用テ奇ヘ又ハ根葉瓦
黒燒ニメ酢ニテトキ出味モノカシラヨシテスルモ
奇方ヘサテソノカシラハ滋ヲ付ルナリヨグ其根ヲ
ズヒ出メヨシキシラ紙ニツケテ上卫ハリ之タク見合
テスベシ○疥癬疥ハ肥前瘡ナリ疥モ疥ノ類ナリ
方骨ニ五疥五癩。有虫ノワクヲ虫疥ト云其臭氣
因テ虫生ズルく乾疥ト云ハウムイナクカワキ有ナリ
其肥前州ヨリハヤリハジメタル故肥前ト名付エト
其因寒ニ湿く皮膚ノ間ニ毒氣有テ肉方ヘハリ
ワスナリニキ痒ト痛トアリヨク傳ハシガル者也叔
母目ツケハ手或ハ足ノ指ノ岐ニ出ルヲ以目アテトス
叔是ヲ早ツ外ヨリスリホド愈ハモ不可ヘ
愈ヘハイユレバテ害ロヲナスノヌ。之毒氣外ヘ

不登肉一入ハ肺滿トヨナス腹ト有此早ク愈ノ害之疏
亥十ドニテスリヌレハ能登メヨキヘトカクイカホドモ登
スルヤウニス^{キナリ}○経驗ニ胤ヲ醬油^{ソテニテ}
食ス又胤ノ里一燒ヲ酒ニテ呑凡些症十ド後
コシケテムキニアルニハ來白或ハ大腹皮宣キ又
○陰腫痛ハ瘡氣肝經ニ集ル故ナリ土夜考利宣
ナリ瘡痛ニラクモナリ膚ノ間ニ凝血有テ上部、
凡寒ニ湿毒ヲ感キナリト見ヘタリ小兒尤莫々
有サノニ根深キモナリ者ニ此ニモ付系ハヤシ荆
芥ニテ洗つがヨシ若毛メ系ヨ用ハ古薺考利月升
麻大亥川芎甘牛可ナリサシモ大カタナ活メモ自
愈ルモノニ○臍痛ハキガサニモ因寒而ニ湿下部
中リ易キモノニヒ瘡蔓ハ已ヘテ冬ノ頃ニ至起速
治^シガメキモノニ如何トナレハ室^シノ^ツ温散^シハグナ
レニ湿ヲ薰テ居ル故ニ清潔スル^シ○浴^シ温泉
古方苓剤 雜

便毒病因考 便毒ノ名小便ノ通^{スル}ハ^シカロ不通^{スル}
滞レニ毒氣^{ヨコシ}所ニ腫上^リナリ小便ノ毒氣^攻
便毒ト云楊毒下疳瘡同ノ^ニ瘡毒ナリ或傳旋^メ
染

発スルアリ此其人毒氣此方へウツリ氣血ケ西ツテ
凝結スル故ニ発スル之便毒ハ隨分ニ所ニテ毒氣ヲ
クノトメ拔テ取ヤウニスモ誤テキラニ或燥ニ愈セ
体中ニ毒移入メ大ニ害有リ下疳瘡ハ便毒ニ對ス
毒氣又ケ難ニ此モ強ノ痛ナト毒氣ヨクスルニ其ヲ
不和テロ、其痛ニミヲ若ニ寒ニ苦ナ服ニ或ハ肝ト
トニテ早ク愈スト甚害ルトナリ瘡毒ノ氣絆
骨筋ニシモ透テ全身ヲ病ナリ板或ハ肝ニ入
ハ目カアキニイニナル此毒氣ニテ眼ノソク精氣ヲ集ニ

養ヲ失フ故ニ脣ニ入耳聾華肺ニ入ハ咽或ハ口中ニヤツツ
舌腫舌ニ完十トアツイ有脾ニ入咽或口中ヤフニ痛ニ
コドガナフナリト有各ニ之經ヘ毒氣陷入スルノ害ニ
何モノ不治ナリニシ肉口舌ノ痛ハ輕キニサテ便毒各
ヲ惡ニテ血病ト云凡肝絆ノ病ハ疝氣ニ屬ス故ニ便
毒ヲニシニ属メ血病ト云是誤リナリ大抵疝氣が癰
腫ヤブレルト云ハニシナルトソレナシハ血病或ハ疝毒トモ
称セラルニ便毒ヲ指テ血病トハ半カイナリナリ
○治方　土薑苓剤車前草　茺蔚大黃通草
雞肉　但州城　嶠新陽　雞肉ハ瘡毒ノ氣

ノ周身へニヨミタル温テサラ卫出也。皇十ト崩ルニ
モヨシ便毒ニテモ雞卵ナトヲ食テ隨分毒氣ノ発ス
ルヤウニスルカ所ナリ。楊梅瘡十トタ多矣。ホトヨキト、
ナレ毒氣表發ス。ナリ。凡瘡毒土茯苓ヲ多角
水道ヲ能通利スル故毒氣ヲ水道ヨリヌキ出セバ、
服スレハ脾胃ヲウツト云也。サウシタキハナキイナリ
便毒下レト云モ。サヨユ子必凝結有者カ大黃ナト
ラソニカ下ルト云ニハ也。斯唯其ハ所リ。氣ヲスカスト。系
トノイナリ。苦飯大黃ト用テ其ト効イチヒニ通
草車前是モ小便ト通ヨリ。毒氣ヲ去。方ナリ。便
毒ニ灸スルハ色付テカラス。ニ又ハ起ル。灸スルト能
ウミテ毒氣散スル。

癰風瘡風三病因考。癰風、十ドナリ。瘡風、屬毒氣
血凝滯メ皆自癰ハ白癰紫癰赤癰黒癰。黒癰ドリ。
汗夕マリ。腠理ヲ閉塞シメ生ズル。汗腺氏。座瘡風也。云
唯硫黃ニテ能洗ヘシ。凝結ノ血ヲ硫黃ハノ陽氣ア開
故ニヨキナリ。瘡風癰、瘡也。天地ノ中ニテ甚惡キ毒
氣ガ中テ。氣血ヲ凝結サセテ。熱ヲ生シ。肌肉筋骨
ヲ腐爛サセテ。熱リ其ハ毒氣コト。ホカハケニキナリ
耳。又子兄弟傳染スル所モ亦尋常トナリ。

ヨリ些病不治ナル一人各々祝所ナリ前カト十六湯
治ヨ一至二年モニメテスルトヨニ治湯テ凝結
血能發シ膿血多出ハモ有又蝮蛇ヲシ酒ニ
ヒシレドケテ膏骨ノ如ナルヲ用モ可也

折傷之病因考折傷ハ其所破血出也ハヨニ不破故ア
トニテ害ラナス不破ハ凝結メ瘀血トナリヨキ血モウテ
惡キ故ニ其所ヲ又ニテ切割ナトシタキ者也

瘻疽肺癰股肉癰病因考瘻ハ輕ノ疽ハ重シ此氣益
ノ流行アシク閉塞スル所ヨリ起り瘻ハイカホド場ト
廣ハクテモ底卫ハ深カラス疽ハ場トリカホテモ底卫

深キモニ股毒氣ニテ底卫膚肉リ入テ死ニ至ルモノニ
トカソギハレナルホド強力宜キヘ是陽氣ノ行リ實
ナル故ナリ只ギバレモサニミ強カラス陷ニテ見ル矣
キニ惡キナリ板此症ノ脉浮類ナルホドカヨキ之沈
ナルハ大ニイヤナモノニ治方 初發ニハ敗毒
用カヨシ 炙ヲ甚セハリ卫大方スシ膿ラモナテ
カラハ參ニ白芷ナトニテ内托ス免角此症ニ参
キヨリ雞卯ヲ大方用ル力宜キヘ蝮蛇ヲ用ニカラ
リ是尤宣キナリ○肺癰ハ今ノ子症之喫ニテ瘻
血出ルナト此類ナリ啖テ肺癰瘻痛シ腫物如

十^ノ之脣^モ瘻^モ先ハキツカイナキ者之肉厚所
ナレハナリ是モ難印ヲ用テ宜キナリ○腸瘻ハ
初発ニハ極テ案シ難キ者ナリ只腸痛有テサ^ミ
トジスレ共効無其ノ痛所ヲ推ニ何トヤラ腫^サ
ハ^ル痛ノキニ有リ禁制ヲ施メ後膿汁ヲ下ス^モ
時ニハ難印ヲタタケベキ也

驚^ハ瘻^モ病因考急驚ハ病勢剛之極視痛極^ニ口鼻^ノ
氣逆^ス積氣有テ行リ寒クビツクリスルハリトイテ
ス^ツ風ヲ引コ^ムナリサテ風ヲウケテリヨリ積氣ヲ
動メナルナリ小兒乳哺一寸已有リ是ガソセヅクト長^シ

テ^ノ瘻症トナル古來驚風ト云ハ風也ヲ見ス故之熊膽ヲ
用テ効有^ヌモヨシ慢驚^ハ漸^ラ以ナル何ニテモ駭
児内引シライテ有^シ後多^シ此症ニナル吐泻十ド^ノ
後イ^ツトナリ此ニナルニ又乳食不足^ス小兒裹十トシテ
皆慢驚^ヲ発ス慢驚ハ口白異^ノ氣冷ナリ其因ハ本
積氣ニテ行リ寒キ故^ニ脾胃ノ氣虛^シ并^シ發^ス故^ニ
其^ノ病常ユル^シ此症ニ^シ快ト云^ヘ又發^ス多^シ死也矣^モ
テモ救ヒカタキ者^ノ此症十ド凡^ノ字^シクルを不可^ト
ナリ慢驚^ハ又^シ虛^シヨリ生ス急驚ハ息ガナル至モ
発^スル^シ慢驚^ハ急驚^ス如^クネ^シ發^ス不^可ナリ

痘之病因考

正傳之内經曰數食肥令人內熱數食

肥令人內熱數食

甘令人中滿蓋之是病因肥甘所致故命名曰癰若
支褊襟中之乳子與四五歲孩提乳呻未息冒氣未全而壳氣尚未充也父母不能調和惟裕姑息誠
積之妄遂令恣食肥甘與支冗累生冷一切烹飪
調和之味朝殮暮食漸成積滯膠固以致身熱
體瘦面色瘠黃或肚大青筋筋肉痛浮癆而諸病
之症作矣此論說得可也右正傳之論也如府先生
味ノ食过テ中焦停滯メ虫ノ生レ積ヲ結故此ノ病
其病狀形瘦色惡ク食ストムモ身ノ潤ニラス此虫
がハニ諸故ナリメウタ食ヲ好ムアリ此ノ脾病ト云脾
胃病ノ性ニテ燥故ナリ痘浮アリ治シ難キ者此食
養ヒニナラサル故ナリ痘ヨリ士卒或兵或凡生米ヲ
食有リ皆虫ノナスノナスノヨウノ奇疾皆虫ヨリナスノ吐津
ノ後痘三十日モヨメ皆積ヨリナスナリ痘眼盲ルハ腹内
ニテ一身ノ養食トナル水壳ノ精粹ヲ虫カハニテス故目
卫注ノ所ノ精氣勢力為消耗ノ肝氣トント腎寒
眼ノ養ヲ於此斷ツ故如此者ニ今痘症目亡目ルトノ
其病多愈此痘毒ノ耳目鼻傷テソユヘ拔レト内
シ○治方 痘之 九十一十四 熊胆

些症赤蛙餓、龜ヲ食ス、シニ品共ニ症ノ虫ヲ殺シ又ヨリ
身ノ潤ラウケル故ニ他ノ茶品ヲ止テ此ヲ用シタク用テ
肝虫下ルト有リ錢氏六味丸ハ唯潤ヲトルニミニバ
○以文中ニ品共ニ肝虫ヲ殺シ又能ク身ノ潤シヲツ
ル在ニ他ノ茶ヲヤミテ是ヲ用ユベシメケ用テ肝虫下ルト
アリ錢氏六味丸ハ惟潤ヲトルニミニバ深シ其
理ヲシメリ能ク味つゞキタル者也

痘病因考

ヘリ眉ニ云出生ノす惡血ヲ呑リカ胎毒ニナルト有サ
モ有(キイナシ)ニ又袋子ト云有コニハ胎毒ナシト云ハズハ
ナラスシハ此論ハ用ルニ足ラス其ハ上惡血ヲ呑ニモセヨ生

ルト早ロヨリ吐出シ又ハカニバトキテ便ス此吐下ニテ惡血
悉ク去シ多シハ此胎毒ハイカナル物ト察シ見ル三十
日間胞胎ノ内ニ有時甚シセル所アリテ氣血此力為
惡タリテ居ル比テ胎毒ト云シ多シハ人ミ多有ルハヅ
ナリ此ムセル所ト氣後ニ癰ノ痘トアルト見ヘメリ多モ
ヨリ痘ヲセラ者アリ又ハ痘アリ輕タ其ト不覓モノ
有又一生セサル者モアリ彼ムセタル氣血ノノ府藏經絡
間ニ藏テ有テ後天行ト疫相和メ痘ヲ發ス故ニ痘ハ
ウムニ多ニ其膿汁ニナル所悉ク惡キ血非スヨキ血モ津
液モ惡物化セラテウニトナルニ板本惡キ血アラヌ

セサル内ハケルソウナモノナシニサナレセキモ時氣也ヨカラ子
 不発所ナリ故其年ニヨリ痘ノヤルトハラヌト有
 兔角時氣ニヨリテヨビ出サル、之其ハ自受有リリ
 ナリ五島平戸ハ文島十トニハ痘ヲセスト云々漢丁モ
 古代ハナツ北秋ヨリ移リ未ルト云々故唐瘡氏云々^リ
 日本ニモ上代ハナカリシトハ矣、只胎毒ニニアウカラス
 疱氣ニヨリト分明也○癰瘍病熱病三日出痘ニ
 起脹三日貫膿、膿尙三日收厭面結病三日右ニ五十五晉テ
 復常ニ其内輕キ痘ハ十五ヨリ内ニ結痂スソウタイ
 日ワモリヨリ早キ者ニ重キ痘ハ此日數ヲ過テ久シ
 カルニウララウットテ再ヒ痘ノウニ加ヘリテウミカノリテ
 ユニヨリ持トアリ松和風俗ニテ酒湯ヲカクルトマリ唐
 ニテタシカニ酒湯ヲスリナシヌセヌトテモ若シカラス
 軽ツキ拭ナドテヌグウホトニテ可ナリ行水ナドサスルヤ
 ヴニスレハ夙ナド引テ恐キナリ○痘ノ目付ハ耳輪冷
 ト足ノヒヨロクトスル所ナリ多モ時氣ニ傷レ者等々
 一有リ又ヲビヘナトスルモ目付ナリ序病ハ熱強メ絶
 入スルホドガヨシ如何トナハ熱毒ヲ發出スル故ナリ初病
 ノ熱解セズメ始終甚有ハ熱毒深メアシ、初癰難ツム
 ヨク出痘ナシハサルホドガヨシソヨリメ又起張ナシ
 スモレニ貫膿、膿尙すモ其通リノ初病ナシ浮十ドアヤ

ヨキナリヒモ毒浮下スル故ナリ。起服ヤ貫膿す。
寸ハ甚キラウナリ。浑因テえ氣脱スルユヘ十分起
脹灌膿セサレバナリ。刲痘ハ色ノホニリトメ真珠ナル
ドヲフリタル如ク地界正クムウチヤリト。ツニナラヌガヨ
シテモトアニキハ蚊蚕脛ト云テ。稗字粥ヲナセ
如ナシハ地界不令ニワサヤリトルモ。其毒深々氣
ノ張ナキ故也。又黑陷ト云テ。黒シナリテ先ノ陷者
アリ。此甚危症ナリ。又惡キ痘甚クサニアリ。其毒
ニテ津液ヲムシ立ルを乳香ナド。燒テ惡臭ヲ
辟ル。又サテ発レ所ヨリテキラフ所アリ。任督
二經ハ氣血ノラモニトヨル所ニ益氣共盛ナル所ナリ。故
天庭或眉間ニ突出者ハ血氣停滞スル所多シ故
危症トナル者多シ。此血熱ノキ。故ナリ。目下呻又鼻
口邊ニタク出少ナト。此不苦又痘敷出ト云モス。キノ戸
キハ不苦少シト云ヘ。氏スキノ惡キハアシ、サニテ大抵痛
寒トニ痒。有ハ可用。神術結術前痘。上_體者
己ハ張ワヨクメク余ニ卫可ヘ。陷トスカラズ
○痘有形ノ神有無神アリ。其神カ内ニ有惡氣
觸テ痘トナリ。其神ハ其惡氣ト相合ス者ナリ。鑑

一種ノ痘ナリ前論スル如ク今ノ痘ノ體本惡キ血
 ヲレ惡血ニテ初生ヨリ有ナラハ不癒スモ甚害
 スシテ多ラスモ一ハ此惡血ニテハナシ其ハづル所因テ被肉
 有惡氣ト相共ニ癥結メ惡血トナルニサテ虛症ナル
 呪ハタゞ痘輕シ實症ナル見ハタゞ重シ凡痘治ハ唯
 惟毒ノ甚キト元氣ノ虛トヨソノ察ホメ施シ乳食平
 常ノ如ク氣徒付ハ升麻葛根芍藥類ヲ用テ大法
 治毒盛ナル寸ハ七味敗毒起脹貫膿時ハ黃芪建
 中或保元湯或附湯桂枝湯其ノ病候ヲ察メ用之
 取捨主母甚キ者ニハ桂枝ヲ用ル一空谷易アズカラス
 挑毒盛メ出痘或起脹或貫膿心ヨカラス或ハ痘色
 應或不食煩悶十ト有ハ速未申尺澤ヲ切テ血出ス
 ヘシ如些スレハ内ノ血熱ノコヅミソヨギテ大快トラ得ル者
 ナリ未申ラカニハ人家往々所在ノモノナハカラソド
 ラシテ立切カヨシレ血熱甚キ者ニハ黒血出ル
 ○後藤先生曰外ニ云フ胎毒ノ説志疎ニ用ユバカラズ
 吾一言序つて於テ是ヲ無ス傳セ見ル
婦人病因考 婦人ノ脉ハ男子ト表裏也反覆不虛説
 有男女子ハオロ高メ尺脈也シ婦人ハ是反スト婦人
 ミテモ下臺メ上ヒソキハ比度ナリ熟レハ此説モニカニ

婦人ノ脉ハ先靜ニ十キモニ血盛ナル故ニ婦人ノ脉ハ微

同キニ立ニ田カ子比スレハ脉ニ高下ナシヒテ所寫子ト後世ノ說ノ如ナレハ婦人ニ平脉ハナキトメシ

經間崩漏帶下病因考

本草ニ經水一日數六日ト有ヒ

ソニハカキラス婦人ノ常ニ血アヒルナリ今ハ七日ト云ニ日也

四日有者ヨクニ大要四十九日有病婦ニ經水ナキアリ其津液力熱テ乾故ニサリサテ血塊ハ經水滯ナリアリ

後ノ血塊ハイウトモナニヨリル者ナリ又血塊カトテ破血ノ剤ヲ用テモ思やりハイカヌ者ニ反テ療治タテヨスレハ外ノ症引出ス者ナリ番椒ヲ當ニ用カヨシ

温泉尤可ニ○崩漏血ノ大ヨリノスルナリ皆本ニ異ニ温湯ガラコツキ出ノ血熱トナルヨリハラカリセウク者ニ船アヒリナル血ハ少ナレモリシヨリヒタトヨキ血ヲサリヒテスサニシタルニ涼血

ノ利可ニ後世崩漏ハ妊娠ニ月内ノ落胎ヲミナリ

○秀菴曰此崩漏ナス熱ニ器内十分ノモスニタル候有レハユル九分ノ共ニアヤカリ化セラレテ皆スアリロア崩スル血モ其ノ初ハ少ニ惡クナリシヨリ他ノヨキ血ヲモ皆化メオレハ却テ其ノ全甚ナヤ故ニ悉ク下ルヤウニテスサテ下リツクルト自愈此治方心得アルキコト無リ○帶下病

ラス下ルナリ此モ血下ニ畜積シ其血甚處ナリテ毒トハ
故ニ長ク不^レ止メ患ラ^ス此モ崩ノ血如ク惡キ血ヨヨキ事
ニシト化テ惡クナスニ故ニ連錦メリ止病冷ルナリ九體ノ
冷ルハリクナイナルヤウニテモ後ニホツ^ムラリル者ナリシテ
膿ノ出ル^ム十ガ血ハ血出ル之其症崩明ト異ナリニテ血モ色
黃ムナリ其下ル中ニヨキ血モヨリル之帶下モ甚通ニ
置ハ消治ノ如ナルナリ○治す 温泉 灸 乾鰐

及鼻 告天鶴類○此ニ云フ敵^トヒム妙^ム崩血崩
漏^ムナリ如キハ血ヲヨリ^ムかス病^ムかやモスシハ瘀血^{ナツク}
ヨキ者^ムリレヲ^ムキウチ桃人承^ム家^ム更^ム連解毒十ドニテ

反テ大効ラ取ルハ^ム場^トニ^ム○襖伊與先生書五御有ニ
善曰血既妄行迷失故道若不去^ム利廢則^ム妄行
常^ム以御示之旦去者自去生者自生何虛之有^ム演
感是論每用^ム玄^ム之物以絕逐^ム得^ム如拾芥焉遂
投^ム二貼鴻下^ム三次其^ム血已^ム矣後用^ム四物及珍而痊○此一條
解^ム今述ル外^ム旨ニアヘ^ム吐血崩漏^ムハシメト^ム之外諸^ム矣
血^ム症^ム存^ム外^ム血^ム妄^ム動^ム惡^ム血^ム脅^ムアリモ^ム時^ム神^ム剤^ム用^ムハ
又^ムテ大^ム害^ム取^ムアリ^ムキ^ム處^ムノ^ム一婦人^ム下^ム血
ニ^ムシ^ム必^ム斯^ム崩漏^ム苦^ム如^ム代^ム病^ム十^ム年^ム除^ム後^ムテ^ム治^ムセ^ム
先^ム医^ム皆^ム血^ム虛^ムト^ム全^ム大^ム神^ムハ^ム病^ム高^ムキハ^ム病^ム

湯一加キ神剂ヨ用テ効ナヒ而伊勢ヨリ学勤サスルト
思ヒテ乃ナ第、連解毒湯ニ四物湯ヲ合メ用ユ乃平大利後
十餘年ノ癢疾頓ニ全快ラシタリ是等ヲ以テ血虛ノ病存
ノ外妄動ノ寔、火アルトヨ知ルベシ

妊娠諸疾病因考

凡妊娠ノ義義ハ天地自然ノ故ニ心ヲ
以テ識カタキ所ナリ故今論スルトナシ大概男ハ左ニ位シ

女ハ右ニ位サテ男女其位シカヒアリ此ヲ俗ニハ座ヌミト云
又腹ノヘンリトニタルヲ女トニコンモリトニタルク男トヌ
カタ此ニアツモノニ惡阻^シ妊娠テ二三ヶ月間ニ有或初月モ
有ナリ二三月胎肥テ掲トリスル故ニ妙リ今妊娠スルトソ

カ胃^モ食^モ上^モナアテケル故^モ胃^モヤウチカウテ此レト
ナスサレ氏四五月モ經テハ胃モソレナリニラキウキテモヤ
不苦楚ハ此^ハ強テ積氣ニヨルト云フモオニ其狀嘔吐惡額
眩惡食擇食肢體沈重好ミテ食酸酸或^ハ寒熱
乍^ハ竹筒^シ等^シ症有ラニサテ妊娠惡阻セサル者少壯
実婦^ハ是十キモ有嘔吐甚メ食スル二十、七八モカドアシカ
アリ腹^ハ入所^ハ僅三二ナリ此ラモ常ナラハヨドアシカ
ランニ妊娠^ハサホトニシ此ラモ妙ナリ所ナリ此ラモ常ニ用
レハ氣剤ニ木香陳皮紫蘇可^ハ丸妊娠内ハ枳苓
木主トメ用又拾ノ類ヲ用テモ可ナリシ故ニ方名^ニ枳
芩ト^ラ安胎ノ系ト云テアリサテ世俗妊娠水腫ハシ

便濁或咳或泄浮スル十ト此ヲサカト
大カタ前云所
惡門後起テ産スルテアリ又産後テモ其キニ有
ナリ又ハ其狀枉痼似テ或悲傷或喜怒スル十有母
ノ子有ハ其子多々枉痼ラ患ルモノ之又是ヨリ之産後枉
ニナルモ有姪ノ内ニアル脛氣ハ産スルト自消ス又不消モア
リ姪姫ノ内ニ其治ラナサ子氏大カタハ不苦浮有モ浮
有モ貧賤リ家十トハカリスニラクモナルホト不若貴富
リ家ニハ此ラ治ニタメ色々有ラ用ヒ却テ他症ラ引出シ小
産十トスル有咳不止テ産後テアシハリシヨリノ辰す當
ニナル有サナキハ大カタニ産スルト止ナリ又水ハラニトニ有姪ス
ルカラ産スルテ水腫有テ産ノすニ大水下テ引ナリ姪姫
祐寒ニ撫往來或咳ラ兼ルモノ此凡邪ナリ氣利去朴緊
襖大腹皮之類用づし姪頸ハ腹中胎有故藏府ヲ上
ヨシトナ故ニ氣塞リ易ニ蔽模ハヨソニ氣疏通故此禁襖
子吉子ノ
子吉子ノ
产論無
古來產
科道論
人云ア
知者
テ始
アズ產
得タル人
名カニ問
テ始
左卫
中央
ノヨリテクル之此時小便マスく頻
年モノノ腰脱腹

子アリト大腹皮ノ类ナリ○**二産婦催生**産ノチハ必其ノ小便頻數
無キナリ
古來產
科道論
人云ア
子吉子ノ
产論無
古來產
アズ產
科道論
人云ア
知者
テ始
アズ產
得タル人
名カニ問
テ始
左卫
中央
ノヨリテクル之此時小便マスく頻
年モノノ腰脱腹

表へ推上ハシメテ故膀胱内ハシメテセバミテ少ソ津ツル~~ツル~~テモハヤ通ス故ハシメテ頻數便俗モ是ヲ産近付タルト知ナリ腹左右カラスイテ中央へ集ハシメテリ其痛ト云ハシメタビニキリツ痛ナリサテ尋常ノ痛トハキガイツハリテキコハニ覓痛只ノ痛トハキカツテ其ツハシメ痛ヨリモナラキマアシク覓之是ヲ俗腰産ト云ナリ又產婦ヨリテ腹サホトニ痛トナクメ安産ストヨリ此ヲハ其婦人ハシメテ大ナル幸ハシメテ將産スレハ破水出コラ俗ニトアケト云水ハカリ出ハシメテルモアリ其アトハシメテ色見ベニモアリ此水ハ胞下水ハシメテ盧ラ袋アリラソーカラ破テ出ハシメテナリ又破水ト思テ小便ノ通スハシメテアリ破水ハシメテ小便ハシメテ其婦人ハシメテ

問ハシメテ自ラ覺ナリ破水下ハシメテルド水ハシメテ浮スハシメテニヤウナル者有シハ其婦致ハシメテハット思ハシメテモニ之氣トラチ付ヤウニモ闇スベシ胎兒胞ハシメテ破テ出ハシメテルハ胎兒腹内ハシメテニテカガル時鼻頭ハシメテニテスリヤブルナリソノ破ハシメテヨリ袋ハシメテが脱メ生出スハシメテナリ又袋ナトテ袋ハシメテ養ハシメテテ出ハシメテルアリ此ヲハ穂婆ハシメテ其ハシメテ人中ハシメテ所ハシメテヲツミ切テ袋ハシメテ脱ハシメテヤエムハシメテ之又生ハシメテスハシメテツルキハシメテ足ハシメテニテツバリテ出ハシメテ其ハシメテ故胎ハシメテ上ハシメテ推上ハシメテモノニ又生ハシメテスハシメテツルキハシメテ足ハシメテニテツバリテ出ハシメテ其ハシメテトドスルハシメテアリ或ハシメテ児ハシメテ眉機ハシメテ一モ有如其ハシメテ生ハシメテスモツルナリ凡ハシメテ児腹内ハシメテニ有すハ生ハシメテ時ハシメテメ又陽氣會居ハシメテ故ハシメテ甚軟弱ハシメテナリ生ハシメテし出ハシメテル而ハシメテ強硬ハシメテナリ故難ハシメテ

产テ是淑不生すハ妙キノ穂波ハ觀ノキ足トトヒキ
テ生サル之本産ト小産ト大産前小産より産
後ハ本産重く其腹痛六十トハ何モ因産前ハ
食ヨリ進テ食シムシサテ餌ヲ食シハ胸腹实
スル故其ハリヤイニヨリ子カリラスル之

○产前ノ脉ハ浮太ナルカ吉腹ウヨリ痛すハ脉モリテ
見ユリナリ顔色ハ赤ヲヨリス産前舌アサキ色ナリ
死胎ナリ可用亨蔽桂又舌色常ノ如クメ唇アサキ色
ナルハ子生テ母タタハ死ス急可用桂姜參内
○产ノ催生ト云ハ難産ノ時之其モ子カカリセ内ニ催

生ズルハ大寒シ子カカリセサル其婦人ノ氣不充ニ温リ
不足ス故亨蔽桂類ノ温葉ヲ以西アタヒヨニ又
胎十ドノ時モシカリタ温葉ナレハ婦人ノ氣カツヨクナ
ルト自ラ産スサナケハタト卫産スルトテモ危症至れ
ナリ更ニ温又隨令腰ヲ温カヨシ腰冷ハイヨリ逢
桂ニテ温補シ又隨令腰ヲ温カヨシ腰冷ハイヨリ逢
桂メ産シカタキニ其法古キ木綿切ヲ夏ク集テ熱
湯浸シヨリシホリテリシラヒ腰脛ヨリ陰間ノ辺ニ
ヨリ温ヒタモノゼニグリシ右綿切トリカヘ間モ十
九如是スレハ産セサルモノ少シ歟ア隨方其婦

教テ氣ヲセキイラツトナカラシムニシテ胸衣下サル。汗
隨急心ヲタカニシキセクリナテハ下ルモノ之氣ア
ラキトヤカクト心ヨアウカハ害アルナリ○ヨリモト出
ルニ從テ帝ラシケリキリモノ當症^ガナリ尽スアリ又
ハ女シウ見エテ日久ノラル者有リ其婦人元^{氣怯一キ}雅^弱メ
ナリサテ度才大ニ努力カラ用過シナトメ血下リ
モタヌキ者ハ産後血暈^ニニ死至ト云ヘ
叔氣ノカホト努甚キ血暈ニテモ死キハ至テ血暈
ナキ者^ニ滯血サクテサテ下ルモサキハ至テ血暈
ノ也モ有世ニ血暈ニ安神散十トナ用テ御テ
ムカツキ出ルモノアリ唯随アシブキ酢ヲ四鉢ノ類入
ヨク起リケル炭火ラソレヘ付テ其氣ヨヒクトキ
テアラキテ鼻中^ノ卫入^ニイカホト甚キ血暈
ヨテモ此^ノカケハ氣ハウキギ^ノトナリテヨニ兵法極
テヨシ其酢ヲヤクニ随方皿鉢ニ腥氣ナキヤウニ
能先テ酢ヲ^ニ度ニ方ホトモ入テソレ^ニ卫入^シ投スルニ
産後ニハ色青キカヨシサシ凡^ノ有テ青色キヤニ
産後ノ脉ハ多ハ浮數ニ^シ唯數急^シハ惡キニ
○産後六^ノ節十ト用カヨキノ股中和^シ食吉又モ
收リテモ度々進メテ食シ^シ其^ノ氣^ノ進ルト

食滞スルトヨメニ産後^トウワトリト送立ハツキリト
ヌトヨメシ此多食ヨリ^ニ進ミテ食停滞スルトリ吐モ
ハヤト快シ○産前後既^ニ治方^モ豆飯桂或參^モ其主
系ナリ産難モ胞衣不下モ児枕痛モ^ハ豆飯桂
參ニテ溫補^スト胎ハ血^ヲ專^シ出^ス者^ニ其益始^ニ
出^シハ胎^ノ出^ル路乾燥^シ産難^ニ至^ルモノ又^ハ方^モ
有^サナ^ケバえ未天地自生^シ故ニメキリウケラレヌト
レハ何^ノ治^カ有^ヘテニヤ○臨產ノ家ニハ兼テ告^ラキテ
將產^ト寸大釜^ニ湯^ヲ多ワ^カサセ又炭^ヲタコニ置

ヘニ火ハ酢^ヲヤクタノ湯^ハカノ温^ニ用^ルタメ其時ニアリ
テハ用ニ立カクテ^ハ氣^テコニ^ラヘ置^シサテ医或^ト主^ト
家ヨリ穗波^ニサレ^グカニキ^フラニハ腹立^ルモノナリ
腹立^ルモ^レヒ隨^カ言^ラ和^テ相談^{スル}ヤウニス^シ産後
二便不通ハ不吉木瞳^{スル}モ不吉只半足^スクバルハ
不沾^ナリ浮腫^{ヨメシ}有物ニヨリ^ナル者之心^ヲ甘^ム
尿^ス勞^ハ大^カタ^ス不^スカ^テ血^晕暉^{ヨリ}狂^ハ如^ナリモ
當^カノ^トニ^シテ血^ノ經水^ノ見^エサル^ト一年ト云^カ先
年生ナリ各不同アリ乳^ヲ用^スハヤツ見^ルモノ^ニ

乳岩無

乳核ヨリケテ培ニル乳核ハ桂桔ノ類用ニシ

乳不出ハ乳腫スルナリ凡乳房ハ藕中ノ如ク其血
筋ツツルト腫テ熱シ痛毫ニ歎絃メ後口アクトニ
朱モ膿出ナリサスレハナヲルナリミラ乳レモノト云
其アトハ乳汁ホソク又不出モアリ○乳

岩ハ夜耳木 参桔枳羊ノ類用テヨリ鬼角胞

膈ノ氣ヲ利スルカヨリ桔枳系桔乾瓢藿ヨシ

