




郷
食
庭
秘
説

婦
人

三
十
六

十
武
9
245
99



明 武 9
第 245
卷 33

胎前 諸症
臨產 諸症
產後 諸症

五 月 不 調

經 閉

婦 人

血 症

血 癥 血 癖 血 風 崩 漏 帶 下 熱 入 血 室



九折堂山田
氏圖書之記

胎熱 胎寒 胎驚 胎疳 胎毒 胎疔 胎瘡 胎癰 胎疽 胎疔 胎瘡 胎癰 胎疽 胎疔 胎瘡 胎癰 胎疽

○ 小兒。多睡內熱。
二十四
五

胎熱 胎寒 胎驚 胎疳 胎毒 胎疔 胎瘡 胎癰 胎疽 胎疔 胎瘡 胎癰 胎疽

傷寒 傷風 夜啼 客忤 天吊 中惡

三十五
咳嗽

三十七
瘡疾

三十八
痢疾

四十一
吐瀉

四十二
驚風

四十三
痢症

四十四
痘疹 ○ 稀痘丹

五十四
痘疹
子不治

五十四
痘疹
急救

同上
五箇敷出血

五十五
痘疹

五十六
中風

五十七
中風

五十八
中風

五十九
中風

六十
中風

絞腸沙痛 · 瘡疾方 · 痢疾初起 · 噤口痢 · 疫痢 · 翻胃
黃腫 · 心膈腫 · 心痛方 · 又方 · 救水溺死者 · 救冬月墜水凍死者 · 火傷

○六方

河豚 · 魚骨咬 · 纏喉乳鴉 · 脊背疔瘡 ○七方

腸癰

六五
肺癰

紅絲瘡

面部瘡毒

黃疔

是疽字

頭風

腸紅

曰六字

六五
大瘰

犬傷
蛇傷

六五
難產

六五
血症

六五
救益死

六五
救益死

六五
救益死

六五
救益死

六五
救益死

饗庭家秘說卷之三十

婦人乾道成男而坤道成女故男為陽而女為陰也

氣屬乎陽而血屬乎陰故男多氣而女多血也陽輕

清而陰重濁故氣無形而血有形也氣惟無形故流

滿于中而不露血惟有形故流溢于外而可見也然

是血也以其初而言即先天真一水也女子十四而

天癸至則源泉之通自此而始若往來有信如潮汐

之不愆其期然後血脉調和無繇生一失其期便能

作疾而生昏之機亦因以窒矣故治女病者以調經

為先而善調經者以順氣為至順氣則經自調經調則血常下皆同嘗足是以月事既止新血即生一交媾間而胎胎即結血少精多則精畏血而成男血多精少則血畏精而成女欲得子者于月事初止之後三日新血始生而氣猶清交感而成胎者必男也三日之外新血漸多而氣已濁交感而成胎者必女也其有交感于三日之內而亦生女者必其平素血氣太盛而其末不清故也其有交感于三日之外而亦生男者必其平素血氣不盈而其末不濁故也其有血氣未

嘗不足而月事又調宜乎成胎也而久不生育者何哉是必男子精氣不調或精寒不相交結故也而非女子之病也其有男子精氣素充而又無子者是必女子子宮之寒不能攝精故也而非男子病也然果何以子宮之寒哉蓋女子尺脈嘗盛若沉細而遲如無所動則子宮之寒可知矣其有子宮不寒而亦無子者必其血不足或痰有餘故也然果何以知其血不足痰之有餘哉亦視其形之肥瘦而已矣蓋瘦人多血虛血虛則不能凝精肥人多濕痰濕痰流注于

下焦則痰與血混淆，而化氣不清，故亦不能凝精也。其有瘦人肥人而示未嘗無字者，何也？蓋瘦人多血虛道，其嘗也。若月事既調而無內熱之症，則血嘗滋潤而不枯，是以能生育也。肥人多濕痰，亦道其嘗也。然或肌肉不甚浮，面色不甚白，飲食無厚味，則濕痰亦少而氣血猶清，是以能生育也。錄是觀之，則女子血實所以寧生之化之之機也。方其未成胎也，則是血周流不息，以期而至。及其已成胎也，則此血榮養于內，以護其胎。今婦人初有妊，即頭眩惡心，或發吐，吐多厭飲食，而嘗思酸者，乃足厥陰肝經養胎也。肝主風，故頭眩。肝百餘脈，故惡心嘔吐。肝勝脾，故多厭飲食。肝喜酸，故嘗思酸也。過此則諸經輪次養胎，其七八月之間，兩足浮腫者，足太陽脾經養胎也。脾主四肢，故兩足浮腫也。兩手不浮腫而獨見于兩足者，何也？蓋脾本足，陰經况此時胎氣已墜下，故不能不見于足也。每一月則一經養之，十月則十經養之，十月滿足而後產焉。其餘二經則又養于既生之後，而化血為乳汁矣。是乳汁亦血也，而其色白者，何也？蓋

吐多厭飲食而嘗思酸者，乃足厥陰肝經養胎也。肝主風，故頭眩。肝百餘脈，故惡心嘔吐。肝勝脾，故多厭飲食。肝喜酸，故嘗思酸也。過此則諸經輪次養胎，其七八月之間，兩足浮腫者，足太陽脾經養胎也。脾主四肢，故兩足浮腫也。兩手不浮腫而獨見于兩足者，何也？蓋脾本足，陰經况此時胎氣已墜下，故不能不見于足也。每一月則一經養之，十月則十經養之，十月滿足而後產焉。其餘二經則又養于既生之後，而化血為乳汁矣。是乳汁亦血也，而其色白者，何也？蓋

胸前部位屬太陽肺經乃西方庚申金白者何也蓋
 血從金分而來故變赤而為白也凡血去多則令人
 虛今乳汁既為血亦不宜去多也然其來也恒有餘
 其出也無盡止是以厭飲小兒而其母不覺虛者何
 也蓋人身血皆資飲食以生者也飲食入胃遊溢精
 氣上輸于肺從肺之部位而去故成乳汁婦人既產
 而飲食倍于平日正以既產之後又屬足陽明胃之
 經養之乳房屬陽明故乳汁多受於此處胃能化飲
 食飲食能生血飲食既足則血亦足血既足則其化

為乳汁也自無窮盡何至令人虛乎且屬胃乳汁亦
 甘白屬肺故乳汁亦白是以既產之後乃肺胃二經
 養之也小兒二三歲間其母復有妊兒飲乳即黃
 瘦泄瀉者以乳汁味酸正足厥陰肝經養胎之日肝
 能剋脾故兒飲之即瀉也當此之時肺金失令胃土
 無權則所以滋養乎血者已無所藉幾何而不為兒
 之病哉此特論胎前產後之事而厚其本于血歸其
 功于十二經耳若夫胎前產後之症又各異于諸症
 條下而此不及論又曰一月肝二月膽三月心也絡

四月三焦五月脾六月胃七月肺八月大腸九月腎
十月膽脫其心小腸養于既產之後在下為乳汁在
下為月水與此不同宜共參考

經閉經閉所以為女人病者何也蓋女人以血為主
者也使其經脈調和往來有準有以應水道潮汐之
期舊血既盡新血復生有以合造化盈虧之數則周
身百脈無不融液而和暢夫何病有之設或閉焉則
新血滯而不流舊血凝而日積猶如河之水壅塞不
通必變為渾濁臭穢其理一而已矣幾何而不為病

哉血癖血風與夫枵入血室之症多自此始然要其
閉之之繇必有所以因而非自閉也或月事適至之時
因渴飲冰并食生冷之物及坐水中洗浴寒氣入內
血即凝滯又能令人經閉也或因墮胎多產而傷其
血或因久患潮熱而銷其血或因久發盜汗而耗其
血或因脾胃不和飲食減少而不能生血凡此之類
皆能令人經閉其有肥白婦人月事不調者必是濕
痰與脂膜壅塞之故也是以醫者當隨其所因而治
之其可以一例施乎

藥例 因感暴怒而經閉者宜君_之以青皮_{佐之}以官

桂木香附赤芍芩當歸梢紅花山查桃仁午膝蓬

水蘊木之類好酒煎服○因食冷物而經閉者宜君_之

以官桂_{佐之}以乾姜木香厚朴香附山查紅花桃

仁故梢午膝之類好酒煎服○因坐冷水而經閉者

宜君_之以附子_{佐之}以官桂木香厚朴香附山查紅

花桃仁故梢午膝之類好酒煎服○因墮胎多產而

傷其血又久患潮熱而銷其血者不可用行血之劑

宜以四物湯為主_{佐以}木香附厚朴甘中之類以

兼調其氣將久而自通矣○因脾胃不和飲食減少

而不能生血者亦不可用行血劑宜以白朮人參芪

苓枳實木香附甘中之類以調會同四物湯煎服

示將久而自通矣○肥白婦人經閉者宜以枳實為

君佐以蒼朮半夏陳皮香附烏芩厚朴午膝桃仁之

類煎服則濕痰去脂膜開而經自通矣

月事不調 月事先期而未者血熱也其色紫者示血

熱也後期而未者血虛也其色淡者示血虛也或先

或後淡而相粘者痰也將來而腰腹痛者血滯而氣

不至也既止而復腰腹痛者血海空虛而氣不收也
 或止或來無定期者因氣不調故血亦隨之為行止
 也或一月兩至或數日一至不可一月論矣氣虛血
 熱也或終年之後累數日而不能止者乃血海脫滑
 兼有火以動之也既止之後隔三兩日而復見微血
 者以舊血未盡為新生之血所催故不能容而復出
 也醫者觀此可以施治矣

藥例先期而來及其色紫者以涼血為至宣君之以
 黃連佐之以槐花山拖香附之類同四物湯煎服而

四物湯之中又倍加芍藥生地可也○後期而至及
 其色淡者以補血為主宣以四物湯起劑佐以香附
 蘄艾龜板玄參五味麥門之類煎服而四物湯中又
 倍加當熟地可也○色淡而稠粘者以化瘀為主宣
 以羊隻茯苓橘紅甘草各二陳吸湯用此藥起劑
 佐以烏菜香附枳殼紫蘇梗之類同四物湯加生姜
 砂仁煎服將來而先腰腹痛者以行氣為主宣君
 之以木香佐之以枳殼青皮香附同四物湯煎服既
 止而復腰腹痛者以補血為主宣君之以地黃佐

七
之以當飯芡芍芍芎朮白朮茯苓甘草香附陳皮之類
煎服或一月兩至或數日一至者以補氣涼血為主
宣以八物湯起劑加黃連山梔香附敗龜板炒黑蒲
黃之類煎服○或止或來無定期者為主君之以香
附佐之以陳皮烏朮砂仁蘄艾之類同四物湯煎服
○經事數日不能止者以涼血止血為主宣君之以
炒黑山梔佐之以炒黑蒲黃之連地榆牡蠣側柏葉
香附之類同四物湯煎服經止後隔三四日復見微
血者惟以四物湯起劑加香附陳皮甘草之類煎服
然此不足病雖不服藥亦無害也

血厥血癖血風崩淋帶下熱入血室

婦人血厥雖有
因于氣食而成者然成于血者居多焉若成氣食腹
雖脹而經不閉成于血其經必閉也婦人之血恒有
餘故月見其血而不以為病若閉而不通則日積而
充滿其始發時小腹先脹久則上連中脘緊脹如鼓
青筋發露而血鼓之症成矣其有因產後惡血不下
逆而上行滲入于皮膚層充滿于中宮甚至上騰于面
而成紫色者此必死之症也婦人癖塊雖因痰與氣

食而成然成于血者居多焉然疼與氣飽而成塊雖
 成而不得于經水成于血者經水雖未亦必有時而
 斷也此必因經水既未之後尚有舊血未盡偶感于
 寒氣或觸于怒氣留滯于兩股小腹之間故成血癥
 也○又有所謂血風者經水逆行上攻于腦頭目旋
 悶不省人事甚至滿面滿頭皆成赤斑者此因經水
 適臨感冒凡邪所致蓋風之為氣善行而數變其勢
 易上而難下經水為風所激以故倒流而上行也⊗
 又有所謂崩淋之者其病相似而實不同崩者如土

之崩源泉逆流而不禁乃血熱而兼氣虛不能收攝
 也淋者如水之淋瀝澀澀而不通快乃內有鬱熱而
 氣亦滯也然崩則血而淋則有赤白沙石之異赤者
 屬血白者屬氣沙石者氣血之尤濁者也治此病者
 惟神其氣血清其內熱而已又有所謂帶下者從腰
 間束帶之處而未故名曰帶雖有赤白總屬腎虛其
 病與淋相似然淋所下者多散而薄必覺臭穢帶之
 所下者多滑而稠無腥穢之氣以此為辨耳○又有
 所謂熱入血室者何以致之必其經水適臨或犯挑下

症因_テ而_レ終止_ニ經隨_テ熱而入_ル干血室_ニ則往_テ未潮_ニ熱如_シ癩_ノ之_レ狀而無_ニ定期_一或一日_ニ三兩發_者是也_ニ熱久_レ不愈_傳骨髓_多成_{骨蒸}其可_レ不_レ早治_之乎

藥例血暈以_テ破血通氣_ヲ為主_宣君_レ之以_シ桃仁_佐之_以以_テ紅花當歸_拍午膝_三稜蓬_木木香_厚朴_官桂_青皮_牙皂川_山甲_之類_必先_以大腹皮_一大團_先煎_後入_餘藥_乃妙_○或用_{血見愁}州_汁和_酒服_之或用_杜牛_膝搗_汁和_酒服_之○血癖以_テ破血_軟堅_爲主_宣君_レ以_蓬木_佐以_三稜_桃仁_紅花_飯拍_官桂_川山_甲牙_皂之_類

共_一處_醋煮_次為_末將_血見_愁搗_汁浸_阿魏_令軟_研爛_加醋_調和_煮陳_米粉_粥為_丸好_酒送_下每_服百_丸一日_二服_○或_早用_血見_愁為_君木_香為_佐浸_酒服_之亦_妙○血_凡乃_血症_之最_急者_也宣_以四_物湯_為主_治加_桃仁_紅花_防風_荆艾_天廣_薄荷_白木_之類_其所以_用白_木者_以其_能去_面上_遊風_及利_腰膈_間血_故也_或用_蒼耳_州陰_乾為_末不_拘時_酒調_一大_盞服_之其_功最_大也_然人_不可_多服_多服_則連_通腦_頭蒼_耳州_一名_喝起_州○血_崩不_止必_用散_子藥_如棕_灰

牡蠣釜底墨山拖黃連槐花側柏葉人參黃芪甘中
 之類為未飛鹽湯下若以此為丸亦妙一日連進數
 服立止或用小薊州汁同藕節汁調和服之○淋症
 宜先通利用大劑之牛膝為君佐以批仁歸梢枳殼
 烏藥香附砂仁木通黃連山拖赤芍芩生白
 中生地之類水煎加童便服之或用車前子一味為
 末酒下一日四五服○帶下不論赤白皆牡仲為君
 佐以人參白朮茯苓當故川芎芍藥地黃芍栢甘中
 澤瀉橘核之類若小腹先痛而後下者不用黃栢參

木加延胡索砂仁香附之類服之熱入血室宜于四
 物湯中倍加生芍地黃佐以赤茯苓黃芩連翹麥冬
 丹皮之類服之

胎前諸症

婦人有妊月餘而惡心嘔逆者謂之惡阻
 乃足厥陰肝經養胎之月也肝嘗有餘本不能容物
 而今乃有妊則肝氣為胎所得不得發洩故惡心嘔
 逆也過此月則別經養胎而惡阻之病息矣夫十二
 經皆養胎者也而肝經獨養于初妊之時何哉蓋胎
 者血之始成而肝則血之所藏以血養血造化之相

為合也然受氣之始則何經以主之曰起少陰腎經也天一生水得氣最先故男子先生左腎女子先生右腎而婦人右腎亦以繫胞為胞之根底先天真一之氣此以為之胎兆也○妊婦心氣痛者受胎必上胎碍其心故心氣痛也小便不通者受胎必下胎壓臍故小便不通也其有遺尿不禁者必其胎氣受寒逼近臍故遺尿不禁也○妊婦腹痛者人皆謂之胎痛而不知胎痛自有分別不可以腹痛例觀也假如努力任重致傷其胎而作痛者方可謂胎痛或

平日瘦弱血不足以潤其胎而致腹痛其痛如芒刺引刺者亦可以言胎痛也若偶傷于食偶感于氣偶觸于穢惡而作痛者非于胎何以亦謂之胎痛耶擊者當審其脈若滑而弦乃是氣色若得濇脈乃為胎痛脈訣云濇脈如刀刮竹行男人有此號傷積婦人有孕為胎痛無孕還須敗血凝絲是觀之可以見胎痛絲于血不足矣○妊婦腰痛與男子腰痛不同男子腰痛乃腎虛也妊婦固亦有虛者然因勞力而得者居多焉勞力以任重致傷胞繫與腎相連胞繫

受傷則腰必痛々甚則胞繫將脫多至小產其有素
 享安逸而妊婦腰痛者必其受胎之後不節房事以
 致傷胞繫也十月滿足而腰痛者非病也欲產故也
 脈訣曰將產之候脈離經又曰一息二至號離經所
 謂離經者胞繫欲離腎經也此脈在妊婦則為欲產
 而無所妨在病人則為欲死而氣將絕醫者亦不可
 不知也○妊婦下血者皆謂之胎漏而不知胎漏亦
 有辨也蓋胞外有血胎內無血胎內有所者水而已
 矣使胞破漏則必有聲而所下者皆水也若所下者

血則皆胞外之物卑豈可以言胎漏耶然下血過多
 則無以養胎下水過多則胞已乾而兒必死皆危症
 也若臨月腹痛而胞破則為欲產亦不可言胎漏也
 ○妊婦傷寒瘧疾皆能墮胎蓋懷胎最怕寒戰則遍
 身筋骨皆振易動其胎故患此二疾者多至小產用
 藥者先以安胎為首務可也○妊婦痢疾泄瀉雖不
 至干墮胎然臨月之時多有難產痢疾則亡血而胎
 無所養泄瀉則去水而胎無所滋泄瀉既止之後必
 將有乾枯澀滯之患而產難恐不免矣用藥者其可

不深，如意乎？若暫瀉，暫瀉其勢不甚者，亦無大害也。

藥例 惡阻 嘔逆 以平肝順氣為主 宣君 宣君 宣君 以枳殼 枳殼 枳殼 以枳殼 枳殼 枳殼

白芍藥 以其平肝 佐之以枳殼 砂仁 厚朴 蘇子 烏藥

以順其氣 藿香 黃連 白豆蔻 以止其嘔逆 而已然此

症乃自然之氣候 雖不服藥 亦無妨 〇心氣痛者 胎

碍其心也 以縮胎降氣為主 宣君 宣君 宣君 以枳殼 以縮其

胎 佐之以砂仁 檳榔 沈香 蘇子 以降其氣 少加四物

湯 服之 〇或用艾葉 茴香 川棟子 俱炒等分水煎 加

醋少許 服之 亦可也 〇小便不通 胎壓膀胱也 以利

小便為主 兼用搐鼻法 以升提其氣 則小便自下 宣

君 佐之以木通 佐之以車前 甘中 指赤茯苓 澤瀉之類

又以烏梅 牙皂 等分 為末 畧吹些 少干鼻中 鼻中酸

痒 欲嚏 不嚏 其氣必升 先服煎茶 如一飯之頃 後用

此搐鼻法 〇遺尿不禁者 胎寒 迫近于膀胱也 以溫

胎為主 宜君 宜君 宜君 以艾葉 佐之以茴香 五味 牡蛎 同豬

尿 煎服 〇胎痛 以生血安胎為主 宜君 宜君 宜君 用四物湯 以

生血 佐以砂仁 白朮 黃芩 以安胎 陳皮 木香 香附 以

調氣 〇腰痛 以安胎為主 宜君 宜君 宜君 以砂仁 佐之以白

木安胎杜中續斷甘中以安胎○胎漏下血其勢已
 危急用阿膠為君鹿角屑熟地艾葉白朮砂仁黃芩
 為佐加葱白一握水煎送下黃蠟丸一二錢一日三
 服○傷寒瘧疾皆以安胎為先定寒熱為次宜用大
 劑白朮砂仁黃芩紫蘇以安胎如傷寒則兼用羌活
 防風甘中無汗則加麻黃如瘧疾則兼用柴胡川芎
 芍藥有食加山查麥芽枳實陳皮神麴之類○痢疾
 以黃連當歸為主治佐以白朮茯苓芍藥木香陳皮
 甘中之類如泄瀉以白朮蒼朮為主治佐以茯苓猪

苓澤瀉神麴陳皮甘中之類二病俱加砂仁煎服病
 愈後又當大補陰血如四物湯龜板阿膠玄參知母
 黃柏山藥五味人參之類作丸服之始可以免臨產
 乾枯澀滯之患也

臨產諸症

婦人小腹之下限戶之上自骨高起中有
 筋斷相透未產則合一臨產則分開謂之交骨此造
 化之巧為男女生音之大關鍵也雖兒頭向下其勢
 已順而交骨不開終難生產立見危殆可愛之甚者
 是豈藥餌之所能及耶○產婦橫生者一臂先下乃

兒在母腹轉運偏側筋斗未翻內有所碍而不得遂也逆產者而足先下必是母腹中脂膜窄狹兒不轉運而直下也此皆因勞力挫閃誤傷其胎以致如此不可駭之甚乎○兒凌心不下者其手必捧母心致母子俱死必以藥引入心令解開兒手方可得下蓋兒手握物最緊藥氣一到兒手自軟故曰解開○子死腹中者腹必悶痛兼冷畧無動意面如土色其舌又黑者是也故試驗訣云面黑舌不黑母死子活此之謂也決不可因其虛而緩治之○或有未曾

坐蓐腹中畧痛而胞水先破棄勢而下固為大幸設或胞水漏乾惡露出盡而兒不能下苟無法以下之則母子俱不可保矣其有產後胞衣不下者不可視以為細故而易之多有升心而死

藥例

交骨不開急用急性子吊鳳仙花子川山甲牙皂射香

等分為末和蜜捏作餅子如指頭大者一塊塞入陰戶近骨之處又將葱二三筋濃煎湯令產婦坐授于中以手運之交骨自推開橫生者將兒手輕々納入陰戶逆產者不必以兒脚推進雖推進亦終不能轉

運スル

變矣全有收生者活活急用蛇退一徐蟬退二十

頭髮一束共燒灰為末温酒調下仰卧片時而下○

嗟心不下者乃兒捧母心也急用猪心血調乳香五

錢好酒逆下兒午遂開亦治子死腹中與心頭痛等

症○或用蛇皮燒灰入麝香少許研細温酒逆下立

產○子死腹中者用當飯川芎砂仁各一兩官桂三

朮木香二朮水酒各半蓋煎服之或用以明粉四

朮以清油蜂蜜各一兩温酒調下須臾立產又治男

婦小兒大便乾燥○或用馬樞掃連食三牧治一切

難產立效○胞水漏乾兒不能下者急以車前子二

三合煎湯以布濾去渣連之服之兒隨水出○統治

難產以益母草為君當飯川芎木香砂仁為佐大約

益母草一兩每用五錢水酒煎服○或用臘月兔腦

去膜乳香末一朮母丁香末一朮射香一字研勻凡

如鷄豆大陰乾油紙密封臨產破水之後温酒下一

丸昂時產下隨果左女右手握出為驗或用當飯川

芎各二枚官桂一枚射香一分為末酒服之產○胞

衣不下者以鷄子清三個去黃取清以好醋三合調

和令服之立下。○或以花蕊石一兩，硫黃四兩，入確鹽泥固濟煨過，為末，童便酒調服一錢，立效。兼治敗血奔心，胎死腹中，及男婦小兒跌撲損折傷。○或用初浴湯一盞，與服，莫令知之，立下。○或用尾油盞，烘乾，仰放產婦臍上，令一人以脚踏住，油盞其胞即下。乃鄉村一法，果驗。

產後諸症 婦人初產，忽心覺昏，連口噤，眼合，面如土色，欲倒者，乃惡血冲心也。名曰血運，急令人扶住，勿使仰臥。即煎醋，向鼻噴之，即醒。後施治，須用降血劑。

○產後發狂跳躍，不顧毒恥，欲上屋者，非顛也。乃各經之血一齊乘虛上升，迷其心竅，而下部惡血又相繼奔騰，其勢上而不下，故發狂跳躍，而不能自禁也。用重劑，使血既經，則安矣。○產後腹痛不可畫，作惡血不行，須看新久。若初產，腹中有痛，陳如將產之狀，膜皮未寬軟，又若轉運不寧，必是雙胎。若經一二日，腹痛者，惡血停滯而未盡去也。名曰兒枕痛。若惡露已收，而腹中如芒刺，痛翕々無力者，乃空痛，不可復以行血之劑治之。惟當養血而已。○產後腰痛多，是

惡血停積于兩腎空隙之處其痛極急不能轉動得
 熱物尉之即緩者是也若兩腰空痛翕々然如不伸
 氣者乃腎虛也○產後下血不止者其色之紅紫紫
 者為舊血任其自下紅者為新血宜先止之而後用
 補然紫者既盡必繼之以紅紅者既盡必繼之以淡
 此必然之勢也宜時々斟酌調治之或丸或散或劑
 隨緩急以施治失此不治則元氣必脫而潮熱虛勞
 之病有不免矣○產後瘧疾適值秋七八月間發者
 可以瘧疾治若春夏及冬時發者非其時而有其

氣謂之似瘧非瘧此必因產後風食所傷當以風食
 為主治而以血藥佐之然須辨其為風為食而後可
 耳寒多熱少而腹不飽者風也熱多寒少而不思飲
 食者食也治食則消食為先而少兼風藥治風則疎
 風為先而少兼食藥全須貫活不可執滯若有痰加
 痰劑宜斟酌之○產後傷寒決不用汗下之劑以其
 氣血俱虛也汗則亡陽而傷氣下則亡陰而傷血若
 犯麻黃大黃多至不救惟以和解為主治而以血藥
 佐之萬無一失然傷寒發產後若真正者必費調治

而病多危惟感冒者為最愈耳○產後中風危疾也
 若外有六經之邪症內有便溺之阻塞皆難治之症
 惟口眼喎斜者無事身若忽然角弓反張目定項強
 者必平素有痰症風邪乘虛而入風痰交作壅塞經
 絡致使榮衛不通以于是此雖有似中風而實無
 分六經治之亦甚費力若又汗出不止或遺尿不禁
 其死必矣○產後瀉痢甚者死多生少不甚者猶可
 施治若瀉比于痢則痢為尤難而瀉或能調治大抵
 瀉者以補脾為主治而以消食藥佐之痢則以扶脾

消食為主治而以血藥佐之蓋痢多下血故用血藥
 瀉不下血故不用血藥用血藥則不能止瀉止後則
 補血藥九子又不可不用矣○產後身熱不止口乾
 煩渴日晡尤甚者血虛也宜大補其血不宜用寒涼
 之藥反佐以溫熱則熱自除矣所以然者以血藥屬
 陰陰非陽不生故用溫熱之劑以助陽而生陰陰血
 既生則邪火自退醫者不可不知也

藥例產後血運不及煎藥只用童便磨好墨在內灌
 下豆醒或以降真香一錢沉香三分為細末當飯煎

湯下可免冲心之患○或血入心經錯語健忘失志
 及產後百病以血竭沒藥等分為細末每服一錢童
 便和酒調下若干分娩時調服一錢惡血皆自下行
 更不冲上○產後惡血冲心發狂跳躍急令兩人扶
 住煎當飯一兩與服之其惡血自下行新血各自歸
 經昂時安寧矣或用芎藭各半兩水煎加重便服之
 立效○產後二三日間腹絞痛者惡血未盡也古方
 獨聖散最佳用山查肉一兩煎濃調砂糖在內煎服
 血自下行其痛立止○或用芎藭飯釜母炒桃仁玄胡

索等分煎服若惡血已盡五六日間服痛者血虛也
 宜四物湯加艾甘草煎服甚效○產後腰痛苦惡血
 不甚下而腰間不能轉側者乃惡血停滯于兩腎空
 處々也宜君以當飯稍挑仁起劑兼以烏朮白朮杜
 仲牛膝酒炒黃柏引經官桂為白導空心煎服得五
 六貼愈○若血去多而腰痛者虛痛也宜以杜仲起
 劑兼以四物湯補血牛膝酒炒黃柏茯苓引經少加
 紅花以養血恐分娩時勞倦以致傷其腰故也○產
 後下血不止以四物為主佐以止血之劑如地榆牡

蠟炒黑山梔炒黑蒲葦棕灰鹿角灰烏梅之類作
 散子服之之一日連進五六服每服一二錢或用
 熟地搗爛每服一兩和酒再研濕服連進三服大效
 ○或用蒲葦三兩炒黑水三升煮一升頓服○產後
 瘧疾宜四物湯加柴胡黃芩以定寒熱有痰加半夏
 掃江有食加麥芽山查有風加防風荆艾頭痛倍加
 川芎寒熱甚者倍加酒炒芍藥柴胡斟酌用之產後惟十三朝內
 以後不大忌○產後傷寒大忌汗吐下三法只宜羌活防風
 紫蘇生姜柴胡川芎甘中之類以解表陳皮香附之

類以調氣有痰加痰藥有食加食藥而又佐以四物
 湯之類多加葱白煎服以微汗出為度若大便秘結
 以密導之或飲密湯亦可也○產後中風不可以嘗
 人中風之例治之雖中腑亦不宜汗禁用麻黃雖中
 臟亦宜下禁用大黃惟當其在表則羌活防風荆艾
 紫蘇甘中之類可用也當其在裏則枳實厚朴茯苓
 陳皮烏朮木通之類可用也兼用南星半夏瓜蒌蘇
 子作瀝姜汁之類以治痰佐以四物湯補陰血治之
 之法不過如此不可求奇取異而用孟浪之藥也○

產後瀉痢不可混治瀉則補脾為主如白朮茯苓神
 麴甘艸陳皮之類有食消食有氣理氣而四物之類
 且少停而勿用以飯地皆非助脾之劑也若久瀉加
 烏梅大棗人參至于痢疾則不忌心四物當與平胃散
 同用兼以消食之劑與調氣養血而已○產後身熱
 不止宜于四物湯中倍加酒炒芍藥兼以炒黑乾姜
 佐之茯苓滲泄柴胡清熱一月後身熱未除宜加人
 參大抵產後不宜用人參恐補住惡血也一月後
 惡血已盡新血已生故不忌人參而猶必以陳皮監
 製可也

產後
 禁參

製可也

加減總方

婦人諸病諸血不足用當歸熟地各酒浸
 一宿焙乾芍藥川芎等分每服七錢水二盞煎服隨
 症加減○血氣不調加吳茱萸甘草○血氣勞症加
 荆艾柴胡○血崩淋漓加炮附子赤石脂○血滯不
 通加紅花桃仁○便血帶下加荆艾地榆○潮熱加
 前胡乾葛人參黃芪○血氣滯腹皮刺痛加肉桂○
 虛熱口乾加麥門黃芩經血淋瀝加炒乾蓮房
 加桃仁大黃○產後虛憊血熱煩悶加生地○虛而

多汗加煨牡蠣桂枝○產後悶亂加伏神遠志○妊
娘心腹痛加竹瀝產後寒熱往來加柴胡麥冬○產
後風頭痛加石脂甘艸○產後惡露腹痛不止加桃
仁蘓木牛膝

換湯總方 婦人室女血氣不調及胎前產後諸症用

香附子童便浸煨半斤烏梅炒四兩甘艸炙一兩以
為末以生姜四兩葱白一握搗取汁併好醋一碗共
打糊丸如桐子每服三五十九隨症換湯服○血氣
不順心胸痞滿紫蘓湯下○腹痛腰腿疼痛茴香湯

下○翻胃嘔吐脾胃感寒以老姜燒黑切五片鹽水
許煎湯化下○驚憂喜怒傷神心滿腫疼面浮石菖
蒲湯化下○血運悶血刺痛血積血瘕良姜赤芍藥
醋水各半盞煎湯化下○喘滿氣急面浮生姜紫蘓
湯下○吐血喉中腥氣黃桑葉湯化下○經絡感熱
血脉妄行生地湯化下○敗血冲胸咳逆生姜柿蒂
湯化下○血瀰大便秘枳殼或青皮湯化下○崩中
帶下小便頻數炒吳茱萸湯下○妊娘傷食胸膈不
快木香或破仁湯化下○產後子腸脫下鯽魚頭煎

湯化下之。產後寒氣入腹，臍下刺痛，炊吳茱萸湯化下。
小兒 男子婦人病，可以問而知，可以切而得，斷死生，
 辨難易，審善劇，猶有所依據，而不至大悞。若小兒懷
 抱之時，雖有所苦而不能言，及能學語，又不能指其
 所苦之處，欲診其脈，則骸骨短小，氣血未定，寸關尺
 將何以分？浮中沈將何以定？雖有一指滾取三部之
 說，而終未得其部位，況至數急促，豈能以悉審之大
 約八九至為平，五六至為遲，七至為數，依稀彷彿
 之間而已。故啞科治療之難，每十倍于大人，而尤不

可以不慎者也。惟虎口之脈，稍為可驗，其脈在
 食指外側，每一節為一關，三節為三關。男視其左，女
 視其右，有筋脈如絲，映于肉內，仔細視之，紫則為風，
 紅則為寒，青則為驚，白則為疳，黃則為脾困，青黑則
 為慢驚入掌，則為內吊。若三關過度為沉病之候，惟
 此可以少知之耳。雖然醫者之治病，當多方求之，豈
 可執虎口之脈法而盡小兒之諸病哉？必于病之未
 形而用意察之，庶可以為預消之地。小兒呵欠連綿，
 乃臟腑受邪作病之漸也。若面赤則知其為風熱，而

多睡
内熱

瀉肝之劑可以_テ先服_ス面青則知其_テ為_ル驚風而治_テ驚之
 劑可以_テ先服_ス面黃則知其_テ為_ル脾虛而補_テ脾之劑可以_テ
 先服_ス多睡則知其_テ內熱而清_ス熱之劑可以_テ先服_ス口中
 氣熱則知其_テ為_ル傷風而疎_ス風之劑可以_テ先服_ス皆當_ニ隨_テ
 症形而先治_ス之勿俟_テ其發_ス而後用_テ藥也其有_ニ不治_ス之
 症者_ニ不可_テ以_テ不知_ル小兒腮上有赤脉顛腫及_ニ隔者
 一_ツ不治也魚口气粗噤齒咬人者_ニ二_ツ不治也冷汗如
 兩_ツ痰熱不退三_ツ不治也脐風撮口鎖肚吊腸者_ニ四_ツ不
 治也四肢虛浮八_ツ不治也胸高而突九_ツ不治也五軟

五六七
關半條

以已之意
探病之情

五硬十_ツ不治也凡見此等之症即當_ニ去_レ矣者_ニ不知_ル幾_ツ
 而復_ニ藥_ス之則病者之死雖不_ニ繇_レ于我而我亦何有_ニ辭_ス
 于彼哉大凡小兒之病有常_ニ多者_ニ不得_レ遂_ル其欲則易_ニ
 怒_リ而啼故肝病常_ニ多_ニ飲食不知_ル節雖飽而猶求_レ食故
 脾病常_ニ多_ニ心神未定聞_テ響易_ニ驚_ス故驚病常_ニ多_ニ肌膚柔
 嫩腠理未_ニ密_ス故風病常_ニ多_ニ性喜_テ吮乳其味停積而又
 易_ニ感_ス風熱故痰病常_ニ多_ニ治_レ兒之病審其所常_ニ多者_ニ酌_テ
 而施_ス之以已_レ之意探_ル病之情示_レ庶_ニ乎_ニ用_テ藥無_ニ悞_ス也然
 此數種雖或常有而肝脾之病尤_ニ多_ニ縱有_ニ他_レ症常_ニ兼_ス

抑肝和脾之劑為斂神而明之存其人得心應手要
不可以言求也

胎熱胎寒胎熱之症面赤眼閉五心煩熱大小便不
通乳食不進啼叫不止嘔血尿血或生下遍體皆黃
凡若此者皆謂之胎熱蓋因其母受胎之後不忌辛
熱之味或好飲酒或好沐浴或不節房事或感冒風
熱兒在母腹積受熱邪故成此症必以清熱之劑為
主治也胎寒之症面色青白四肢逆冷大便清黑小
便不禁腹疼氣痛盤腸內吊或生下又感寒感不時

寒戰凡若此者皆謂之胎寒蓋因其母受胎之後不
忌生冷或外着寒邪或平素稟氣寒冷兒在母腹呼
吸母氣久受積寒故成此症必以溫熱之劑為主治
可也○凡治此二症小兒不宜服藥當大劑濃煎令
其母食後捏去宿乳服藥少頃乳之蓋因胎中受病
故于乳中過藥得于內者亦從其丹治之不離母氣
則藥易應效也

藥例

胎熱以生地為君赤芍當歸川芎丹皮黃連
山梔連翹犀角澤瀉猪苓赤苓天花粉木通丹中類

為佐。○胎寒以熟地為君，當歸、川芎、酒炒白芍、大小茴香、木香、乳香、沒藥、官桂、熟附子、炙甘草、麝香為佐。○二症必用四物湯起劑者，何也？蓋血以養胎，胎中受病，大抵皆血之使然，故不離乎血方之藥也。

胎風撮口

胎風撮口，總為一病，未有胎風不撮口而末有撮口而不胎風也。患此病者，九死一生，蓋胎氣根也。胎為心所入，命根絕矣，而可以得生，幸求其所屬之經，乃心脾之症也。開口屬心，閉口屬脾，風入于胎，先流于脾，歸脾而上傳于心，心為邪所感，故口

不能開而頻撮也。其發搐者，風使之也。究其病之所繇，或有胎因外因之異，蓋胎帶係于胞，必其所生之時，其母先感風邪，遺其邪于小兒，謂之胎風。其驚搐者，謂之胎驚。病從胎得，故曰胎因。其或斷胎之後，包裹失于周密，被窩風入，未及六七日而胎帶已脫，必成此症。病繇外得，故曰外因。匿者，又以艾灸其胎，徒苦之，身竟何益哉？欲求一生于萬死之中，惟下之而已矣。此外更無餘法。

藥例

大法即以小兒腕下胎帶洗淨，先以水煎至五

六沸去帶入牙皂善蚕川山甲麻黃防風荆芥四
 半夏南星之類又煎五六沸入生大黃畧煎一二沸
 澄清入射香末水許姜汁竹瀝調勻徐徐以匙灌下
 若得通利即有三四可生不然必死其時以生南
 星末封之亦可以追去餘風○或用午黃三四厘射
 香半夏為細末姜汁竹瀝調之滴入口中亦可若口
 噤不開以南星為君射香為佐研細擦其齦自開
 驚口重舌 舌者心之苗也心為君火其體本熱而况
 以純陽之軀先受熱于胎復感熱于內其母愛惜之

至惟恐其寒而又畏之以綿衣覆之以重衾幾何而
 不為兒病哉重舌驚口之症未必皆兒自病或者其
 母有以致之也台人曰若嬰小兒嘗令饑與寒饑
 不至于傷脾寒不至于生熱此非保嬰之道乎所謂
 寒者亦非使凍之也惟令當溫不至于甚煖耳冷暖
 得宜豈復有重舌驚口之病然何以名之曰重舌重
 舌者舌下腫突其狀若又一層故謂之重非真有兩
 舌何以此名之曰驚口驚口者滿口皆白有似驚之口
 中俗謂之雪口是也分而言之重舌屬心驚口屬脾

合而言之總為心熱何者心統于脾脾為心之子心
熱則遺熱于脾故白治于口也使不歸于心熱則口
雖白而舌自赤何為而舌皆白耶大法內服瀉心清
熱之劑而外敷涼藥則重者可消而白者可退矣

藥例

重舌宜瀉心而不瀉脾以黃連為君生地甘
中石蓮木通連喬燈心紫為臘雪水煎得溫時之滴
入鼻中令嚥欲吐則任其吐亦可以發散熱邪○驚
口以瀉心而兼瀉脾以黃連為君生地生日山梔
煨過石羔木通燈心為佐臘雪水煎如前服法○口

中舌上並用軟角畏指蘸水拭淨用黃柏青黛風化
硝硼砂黃連人中白之類為細末敷之亦以可治口
疔

丹毒

丹毒火症也得于肺熱其母受胎之後不忌胡
椒姜蒜並熬灸燻酒麪之類或感風熱或不節房爰
皆能助火火邪內攻胎受其毒而傳氣于小兒故小
兒出胎之後多有此症近則五六日或十日半月遠
則彌月之後或兩三月其形症不同或頰下如櫻桃
突出色赤而光謂之赤瘤或遍身紅點如洒朱謂之

丹疹或遍身紅腫熱氣如蒸謂之火丹或小腹踰上
 陰囊等處忽然紅腫如霞流行不定謂之赤遊丹病
 名非一總為丹毒丹毒入腹腹脹不飲乳者死必于
 未入腹之時急服退毒冷劑外用小刀輕之刺出血
 或獨可生其入腹者無如一瀉間有有瀉而得生
 者乃千百之中一也諸丹毒惟赤遊丹至為急善保
 嬰者若見小兒多啼少乳即遍視其身上一有紅
 色即急治之苟看視不周丹毒在身而母猶未覺及
 至覺時已入腹中救之莫及丹毒惟紅線癩不治因

外用小
 刀刺出
 惡血

父腹熱草遺熱有胎非藥所能解也

藥例

丹瘤如櫻桃狀者是也宜以綿羊腦子同朴
 硝研爛貼患處立效或以草麻子同麩研和敷之○
 丹疹遍身紅点如洒朱是也宜以淡防己半兩朴硝
 犀角黃芩黃芩升各一錢加竹瀝煎服○火丹遍
 身紅腫是也宜以當飯赤芍甘草中大黃等分每服三
 錢水半盞煎三四分食後服或用煎疹方服之亦妙
 ○赤遊丹流行不止于一處是也此為至急救遲即
 死矣宜用積年胞衣所化之水和金汁塗之神効若

無_三金汁_二單以胞衣水_一和風化硝冰_一塗之若無胞衣
 水_一單以金汁_一和甘_一中大黃末_一塗之皆能取效○或用
 野人糞_一下土_一鷄子清_一調塗又以人中黃_一二三錢_一煎服
 之能去胎毒○或用麻骨_一燒灰_一先將香油_一調塗_一次用
 麻骨_一點火_一倒持_一之將不點火_一一頭_一出_一烟_一董患處_一立退
 或用雄黃_一五倍_一等分_一為細末_一醋_一調塗_一之○丹毒_一並方
 黃連_一黃芩_一黃柏_一生甘草_一連翹_一天花粉_一皂角_一刺各_一五方
 水_一一盞_一煎_一五方_一飲_一之丹毒_一入腹者_一加大黃_一一錢_一○五
 腫丹毒_一用鬱金_一甘草_一桔梗_一天花粉_一葛粉_一等分_一為末_一每

服二錢_一薄荷湯_一入_一蜜_一調下_一○十腫_一丹毒_一如_一三日_一不_一治
 毒入_一腸胃_一則不_一可_一治_一宜_一仔細_一辨認_一依_一方_一治_一之萬_一不_一失
 一○一從_一頂頭_一起_一腫_一用葱白_一研_一取_一汁_一塗_一之○二從_一額
 上_一起_一紅腫_一痛_一用赤小豆_一末_一鷄子清_一調_一搽_一○三從_一面_一起
 赤腫_一用竈心土_一鷄子清_一調_一搽_一○四從_一背_一起_一赤_一点_一用桑
 白皮_一為_一末_一羊脂_一調_一塗_一五從_一兩_一臂_一起_一赤腫_一黃色_一用_一柶木_一
 燒_一灰_一水_一調_一塗_一六從_一兩_一脚_一起_一虛腫_一用_一生鐵屑_一和_一猪糞_一調
 塗_一○七從_一兩_一脚_一赤腫_一用_一乳香_一末_一羊脂_一調_一塗_一○八從_一兩_一脚_一
 上_一起_一黃腫_一用_一煨_一柳末_一米醋_一調_一塗_一○九從_一兩_一脚_一赤白_一點

用猪槽下土麻油調塗○十起陰上起黃腫用屋漏處土羊脂調塗

中惡天吊客忤夜啼中惡天吊者為惡鬼之氣所中

而目上突吊起而不能睜也此因胎氣不足精神失守虛之所在即必淺之心虛則神走肺虛則鬼亂肝虛則魂亡脾虛則意擾腎虛則精乏而鬼邪得以犯之矣其症面白帶青或如土色目睛上視口吐白沫手足拘攣身冷如冰有似驚風而實非驚風也又有所謂客忤者非中惡之謂也乃偶見生大異物卒然

驚駭啼哭不止心志恍惚聞響即跳嘗欲躲避者是也如為客所忤犯名客忤非鬼之為病也又有所謂夜啼者非客忤之謂乃心經受熱也其症至夜即啼百計安之而不能止蓋為君火主半血夜則血歸于肝心虛火熾故煩躁不寧而多啼也

藥例中惡天吊宜先安心神使權婦君主如夜神

遠志菖蒲燈心麥門冬之類煎湯調下辰砂末量兒大小用之外用辟鬼之法如蒼朮檀香沈香射香安息香之類近兒旁週圍燒之香炯如霧則鬼不能容

待兒稍甦以桃葉湯浴之○客忤亦安心為生或為
 生人所忤即當令此人見之使兒習慣如為物所忤
 猫犬之類亦令兒習見自不驚駭其所服之藥亦如
 前茯苓神等之劑可也○夜啼繇于心虛有熱宜用人
 參麥冬炒鹽類以神其虛茯苓神遠志葛蒲之類以安
 其神石蓮黃連之類以去其熱燈州木通薄荷之類
 清其氣外用壓鬼之法或以井中四旁州暗置兒蓆
 下或寫父名倒貼床脚裡面不令人知或以桃木枝
 擊兒四旁如趕逐狀呪曰天蒼々地皇々小兒夜啼

踈客堂多誦幾遍內服藥而外施法則啼自止矣

傷風傷寒

傷風之症既疼身熱鼻塞氣粗噴嚏呵
 欠呻吟不絕見風則怕洒淅微寒與大人傷風無異
 若挾食即吐食挾痰吐痰作劑比大人所服藥宜減
 一半不論痰與食有否嘗須兼用之蓋小兒易傷食
 而熱則生痰故劑中宜畧帶月但輕々踈解令微汗
 出不宜過劑過劑則真元亦傷是伐無過之地也傷
 寒之症六經感受亦無異于大人但大人元氣已削
 天真不完况有七情相感又多挾丹傷故患真正傷

寒最難調理小兒則天真未斲七情又少所感之症
比大人差緩但寒多熱少外感必深熱多寒少內病
必重外感心遍身骨疼內病必腹痛飽悶治之劑
嘗兼治內之藥而汗下法比大人宜從輕焉

藥例傷寒一二日之間頭頂痛腰脊強惡寒發熱無

汗者乃大陽經症也宜以羌活為君防風紫蘇甘中
生姜葱白頭為佐若不汗少加麻黃桂枝○傷寒二
三日之間日痰鼻乾不得眠發熱不惡寒乾吐有汗
者乃陽明經症也宜以白芷為君防風紫蘇芍藥桂

枝生薑為佐○傷寒三四日間胸脇痛兩耳聾往來
寒熱者乃少陽經症也宜以柴胡為君黃芩半夏枳
實防風紫蘊或中生薑葱白為佐○傷寒四五日間
腹滿咽乾身無大熱自利不渴者乃大陰經之症也
宜以蒼朮為君乾姜或中葱白為佐○傷寒六七日
間煩悶舌卷囊縮身不熱者乃厥陰症也宜以桂枝
為君附子青皮甘中生薑為佐○四時感冒傷寒宜
以九味羌活湯為主治代桂枝黃湯用方見首卷
傷寒門○春傷于風宜以川芎為君柴胡紫蘊羌活

防風寸中葱姜為佐○夏傷于風宜以羌活為君川
 芎紫蘓防風寸中紫胡葱姜為佐○秋傷于風宜以
 柴胡為君川芎羌活防風寸中紫蘓半夏茯苓葱白
 生姜為佐○冬傷于風宜以桂枝為君升麻葛根羌
 活防風寸中紫蘓葱白生姜為佐已上傷寒傷風二
 症若挾食則兼消食挾痰則兼消痰俱禁用茯苓以
 其滲洩能引邪入內也又有夾驚者當兼驚治

咳嗽

小兒咳嗽風熱居多而寒者間或有之以其為
 純陽之體其氣嘗熱而不甚懼寒也凡肌肉肥白者

易干惹風色赤而結實者易干感熱惟虛弱瘦損面
 青不實乃易感寒焉感風而嗽者必鼻塞氣粗之症
 惟口中覺熱舌燥煩渴面赤頰嗽而有濃痰者是
 也感寒而嗽者洒淅惡寒哮喘不寧至冬月即發者
 是也凡此症與大人無甚異而所感畧有不同大人
 兼七情所傷或任勞嗜酒而小兒無是是以不能無
 出異耳藥劑以輕清為佳而服藥亦不宜太驟逐匙
 進之不盡劑

藥例

風嗽以午膳南星為君半夏黃芩薄荷防風荆

葶瓜薑甘中桔梗為佐兼以蘘子橘紅以順氣若壯
 熱無汗氣壅喘急少加廣黃以解其表蓋麻黃亦肺
 經發散之藥也○熱嗽以貝母為君半夏葶瓜天
 粉黃芩山梔竹茹茯苓桔梗甘中為佐兼以蘘子橘
 紅枳殼順氣若有食加萊菔子枳實黃連山查麥芽
 之類○寒嗽以欬冬花作君麻黃杏仁半夏南星灸
 甘中桔梗生姜橘紅為佐○或以蘆吸散為極細末
 蜜丸如肥皂角姜湯磨化徐徐服之○諸嗽初起宜
 瀉宜散而桑皮杏仁可以兼用久則宜補宜收而麥

冬五味可以量用如喉痒加玄參痰盛加薑汁竹瀝
 頭眩加天麻丹熱加茯苓又山梔煩渴加天花粉葛
 粉而桔梗乃本經之藥尤不可缺惟少用則不覺飽
 多用則痰反不能降以其承載諸藥為舟楫之劑也
瘧疾 小兒瘧疾不外乎風痰食無食不榮熱無
 風不作寒而痰繇風食之所成也外感乎風則乎大
 陰肺經先病肺主皮毛故風易入內傷飲食則足大
 陰脾經先病脾受有刑故食多則傷脾也肺氣不清
 則生痰脾土受傷則畏痰故痰者風食之所成也無

痰不成癰故寒熱作焉而
脾而風食之所藏又近于膽
經故作寒熱蓋膽為足少
陽其位在半表半裏是以
寒熱往來也太率寒多則
為風熱多則為食寒熱相
半則風食俱多治此病者
惟消食疎風化痰而已然
消食則兼疎風化痰三者
不全則不能成癰故宜兼
治但量其所屬而輕重之
可也

藥例

風癰寒多熱少以防風為君
川芎紫蘘升廣柴胡
甘草為佐加枳椇枲藨以消食
半夏黃芩陳皮生

姜以化痰○食癰熱多寒少
以枲藨為君枳椇枲實陳皮
山查麥芽柴胡甘草為佐加
半夏生薑以化痰○痰癰寒
熱交作嘔吐痰涎防風紫蘘
川芎以疎風○痰癰寒熱交
作嘔吐痰涎以半夏作君貝
母瓜蒌生薑甘草枳椇枲實
紅柴胡黃芩為佐加枳椇草
草以消食○熱蘇防風以疎
風○久癰不愈以酒灸蠶甲
為末每服一錢一日三服姜
湯調下○或用常山一兩剉
碎以好酒浸一宿瓦器內
煑乾為末每服二錢水一盞
煎半盞去渣停冷立更初服
之吐不瀉大効○或用知母
貝母常山枳椇

等分水酒各半蓋匙至半蓋去渣錄獲露一病立更
面東服之即効但可不令婦人見

痢疾 醫家以瀉為在脾痢為在腎故先瀉後痢者則

曰脾傳腎為賊邪其病難愈先痢後瀉者則曰脾傳

脾為微邪其病易愈此前人之說也以患論之瀉為

有脾不假言矣而謂痢在脾不能無議焉瀉固多錄

于飲食而痢獨非飲食所傷乎飲食停積因濕熱而

化遂為稠濁膠固于腸胃之中欲下不下是以有裏

急後重苦明胆注病矣而顧以痢屬于腎者何以謂

吾未聞飲食之人不錄于脾而反錄于腎夫既謂之

腎病矣然治痢之藥悉皆蒼朮厚朴黃連木香白朮

陳皮之類並未有用牡仲黃柏牛膝地黃補腎赤藥

治腎家之疾而乃用脾家之劑必其非腎病也要知

先痢後瀉而後易愈者以積滯已盡而脾尚虛也豈

脾傳腎之謂耶先瀉後痢難愈者以脾土已壞而積

而積滯方壅也豈脾傳腎之謂耶脾能藏精不能藏

飲食若以痢屬于脾則飲食皆藏于脾矣豈理也哉

大約治痢之法與大人無異但下痢純血者在大人

則為難治。在小兒則為食積而無疳。若治小兒之
痢，又宜多以消積為主。耳其詳見于大人痢疾門。故
以不復贅。

藥例 凡初痢疾腹痛後重，宜先以消積等藥治之。問
其所傷者何物，若穀食則麥芽神麩為君，肉食則山
查蓬朮為君，麩食則萊菔子為君，冷食則枳實為君。
宿食則黃連枳實為君，而又用蒼朮以燥其濕，厚朴
以寬其腸，木香當歸以調其氣，當歸以養其血。
木通茯苓以分利小便，則自通快。若不通快，加大

黃以利之。初痢無止法，切不可用粟殼，雖烏梅亦未
可便用。初痢無神法，切不可用人參。雖白朮亦未可
便用。若見其去後多次欲止，提其氣而用茯苓、白朮。
見危殆，戒之戒之。○痢疾半月後始可用白朮一月，
後始可用烏梅。若有腹痛，亦未可用也。痢久虛，乃可
用人參而為佐之。以陳皮如胃寒，則肉豆蔻、肉桂之
類亦可用。蓋痢本溫熱，若遷延月久，入于秋冬之
交，則變為寒痢，故可用溫藥也。○瘧痢兼作，莫重之
病，若以風食治之，則得之矣。宜防風、羌活、紫蘇以解。

其表柴胡芍藥以定其寒熱黃連以瀉其火枳榔枳
 實麦芽神麴消其積而蒼木一味尤不可不多用以
 其氣雄能治丹外邪也瘧痢傳涼者即名疫痢禁用
 神劑若下人參其死可得○久痢不止去後無度非
 神不可必以人參白朮為主茯苓肉豆蔻訶子烏梅
 蓮肉大棗煨姜之類為佐神中帶收乃妙也若餘血
 未盡宜加當歸芍藥側柏葉地榆之類神中帶止庶
 平不寬不驟得調理之宜而蒼木厚朴檳榔黃連等
 劑又不可用矣雖木香一味本為治痢之良藥但行

氣太甚久痢用之反助下行之勢又豈可以常用哉

吐瀉小兒吐瀉交作人皆為以脾胃受寒不能容飲

食故上則為吐下則為瀉此據其病形而言耳而不

知脾胃受寒者止于腹中便之痛或微瀉或吐痰

涎而已其勢殊無可畏至若大吐大瀉一時發越津

液頓亡面目乍瘦豈受寒之為病哉必是平素先傷

飲食鬱蒸作熱蓄之既久將發未榮一感外風熱勢

不可遏故攻擊乎臟腑一齊而至遂令小兒困憊當

此之時若以為吐瀉空虛即投神劑及濕熱之藥立

攻擊
臟腑

至危殆慎之。如有瀉而無吐或吐而無瀉者，乃有寒熱之分。吐酸臭而苦者，熱也；清澀則非熱矣。瀉臭穢而不可近者，也。熱清煩則非熱矣。治者當自審之。

藥例 小兒吐瀉交作，其氣潰亂，一時未能清理，只宜益元散泡湯，冷定時，自能分調，其氣待勢稍緩，然後進以他藥，先止其吐，後治其瀉。止吐以順氣為主，如藿香、陳皮、砂仁、蘇子、黃連、生姜、茯苓之類。治瀉以養脾為主，如白朮、大麥、茯苓、神麴、陳皮、半夏、炙甘草。

之類。若邪氣已盡，能畧進飲食，而脾胃虛怯，氣短不能呼吸，須用人參倍加，白朮而又佐以陳皮可也。○吐酸苦者，宜從熱以薑汁炒黃連佐君，半夏、藿香、茯苓、砂仁、蘊子之類為佐。○吐清痰者，宜從寒治，以生姜為君，白豆蔻、茯苓、蘊子、藿香、半夏之類為佐。○瀉臭穢宜從熱治，以黃連為君，神麴、麦芽、陳皮、白朮、茯苓、芍藥、滑石、生甘草之類為佐。○瀉清薄者，宜從寒治，以肉豆蔻為君，白朮、蒼朮、厚朴、茯苓、肉桂、炙甘草、大麥、生姜之類為佐。○吐瀉交作，手足轉筋，乃肝勝脾也，為

霍亂之極候宜以木瓜為君青皮黃連扁豆為茶之類為佐以制肝而艱筋又用大劑藿香以正其氣砂仁木香以調其氣而平手足亦須浸于冷水中則其筋自然調暢矣○吐瀉之後口乾舌燥引飲不飲小便便短少者津液亡也宜用人參生脈散加烏梅酒炒黃柏知母生薑中之類○吐瀉之後脾虛欲發慢驚者必年足微搖急以人參白朮水益加薑汁竹瀝調下硃砂礞石膽星半夏等之末亦可以彌患于未然若已發慢驚則不救矣

驚風

夫風者一也在大人則為中風在小兒則為驚風大人無驚故止名之曰中小兒易恐且易驚故以驚名而兼乎中也驚之有慢有急猶風之中腑中臟急驚與中府同謂之陽症而症俱在表慢驚與中臟同謂之陰症而症俱在裏醫者能辨其陰陽表裏而治之斯可以無誤矣蓋急驚之症其身常熱眼開手足跳躍頭項強直痰涎壅盛啼叫哭泣煩躁不寧者是也慢驚之症身不熱眼常半開手足微製精神倦怠形體若呆大便或洩者是也又有慢脾風

呆大便或洩者

者手足不動遍身皆冷而眼常合不能啼哭症而至
 以無復加矣慢驚甚于急驚而脾驚甚于慢驚病根
 固有淺深而亦可以施治千萬一之中若因急驚而
 變慢驚或因吐瀉而生慢驚則難治矣因慢驚而成
 慢脾或因吐瀉而成慢脾則不治矣大抵驚屬于心
 風屬于肝心火動故振跳而不可遏肝風發故搐搦
 而不自持二經相助其勢必盛心有餘故火盛而風
 益猛是風從火生也肝有餘則風柱而火益柱是火
 隨風熾也風火齊發故病可畏以此特以急驚言之耳

而慢驚慢脾又兼脾虛子寒勢若稍緩而反深焉然
 以其病之可生死者而細分之則各有所屬非謂止
 于于心肝之二經而不入于他經也是故不時吊眼
 者驚入于肝夢中咬牙者驚入于腎夜啼至曉者驚
 入于小腸喉中如鋸者驚入于大腸面青下白者驚
 入于膽氣喘啞水者驚入于脾不時乾嘔者
 驚入于胃夢中驚哭者患在三焦此皆可生之症也
 至若凡黑者為肝絕瀉黑血者為心絕日多盜汗者
 為衛絕忽鴉聲作者為肺絕咬人者為骨絕眼半開

半合者為脾純口鼻乾黑者為脾純驚風有此其又
可生耶

藥例 急驚屬陽屬熱其症在表法宜涼瀉以茯神為
君麥冬菖蒲遠志燈心之類為佐以安心神青皮芍
藥黃連之類以瀉肝氣羌活柴胡薄荷防風荊芥之
類以疎其風半夏膽星薑汁竹瀝以治其痰此治急
驚並劑之大畧也○慢驚屬陰屬寒其症在裏法宜
溫補其安心神抑肝氣疎風化痰之藥皆與急驚同
但加川烏木香以溫其裏更加人參白朮以補其虛

此治慢驚並劑之大畧也○慢脾屬大虛大寒法宜
溫熱大神以附子為君川烏乾姜灸甘草中之類為佐
以溫其裏人參白朮以補其虛姜製半夏姜製南星
以治其痰而安心神抑肝疎風之劑且勿用此治慢
脾之大畧也○急驚慢驚慢脾非金石之藥不能速
効今有一方統治之症用礞石一兩醋淬蛇含
石半兩硃砂半兩全蝎半兩姜製半夏一兩牛膽南
星二兩茯神一兩猪心血晒乾半兩射香三錢金箔
一百片銀箔三百片各為末又次研極細以姜蚕牙

皂菖蒲麥門冬各等分水煎成膏拌蘇葉為丸如櫻
 桃大量兒大小加急驚為批以黃連為生薑中煎
 湯加薑汁竹瀝磨服慢驚為養以熟附子為中煎
 湯加薑汁竹瀝磨服每以一九二九為正凡小兒一
 二歲為驚風十歲以上為顛十歲以下為癇不論大
 小○凡角弓反張不能言語者為瘧宜皆以此治之
 修合忌雞犬婦人及有喪服人藥成收貯菴器中以
 蠟塞其口勿令出氣用時隨症換湯治之以統治驚
 症之仙藥也

疳症 小兒疳症大抵多是過食甘甜膠膩之物停積
 于脾不能消化久則變而成疳疳在也脾喜甘而凡
 味之甘皆屬于脾從病後耳故曰疳其疳身體常熱
 形容黃瘦肚腹膨脹小便如泔毛髮黃嫩臉多白印
 惡心欲吐飲食不為肌膚凡頭面頸上多生疔瘡而
 疳之大槩有如以者皆脾之疳也脾先受病傳于他
 臟故又有五疳之名在心則為驚疳在腎則急疳在
 肝則為風疳在脾為滾疳在肺則為氣疳五疳分受
 五臟而其為病亦未盡同悉而言之則渾身壯熱四

肢無力面黃臉赤怕寒愛暖口鼻乾燥者因驚蹇而成所謂驚疳是也搖頭揉鼻白膜繃眼揩磨多淚面有黑色渾身瘡癬毛焦髮豎者因感風而成所謂風疳是也食物難化愛吃泥土腹大有筋頭髮稀喘急呵欠無歡欲啼痢多酸臭者因傷食而成所謂瀆疳是也多啼嗽逆鼻頭生瘡昏之愛睡體瘦腸滑四肢軟弱面色帶白瀉膿吐血者因傷氣而成所謂氣疳是也瀉痢兼作吐逆脫肛身體壯熱手足偏冷飯食不進者病勢已急所謂急疳是也五疳之症惟急

疳為難治以其腎氣不足粉米尅水故也粟而言之總起于脾脾土一虛則不能生五臟之氣故其傳變至干如此大法惟健脾胃積殺蟲而已

藥例 小兒十歲已上疳勞壯熱刑體羸瘦者宜服雞

內養丸宜黃連二兩銀柴胡一兩薑黃半兩去皮川鶴虱半兩秦艽二兩知母一兩紫苓一兩使君子肉一兩共為末以黃雌雞一雙重斤許者專以大麻子飼之五六日後去毛令淨于尾下開一孔取出肚腸洗淨拭乾入茶葉干內以線縫之用小甌先以黑豆

鋪氈底厚三寸安雞在氈內四旁以黑豆圍裹而亦以黑豆蓋之亦厚三寸自日出蒸至晚後溫冷取雞取出腹中屎及筋骨頭翅淨肉研和得所如乾入酒少許為丸如大麻子大每服十九十九歲者二十九以意加減空心或臨臥用麥冬湯送下若小兒疳勞骨蒸年十五歲以上用酒送下忌食猪肉○小兒五疳不長肌肉不思飲食日漸黃瘦者並宜服蘆薈丸用蘆薈一錢萹萸一錢玄肉青黛一錢檳榔一錢蟬殼二十個宜黃連一錢胡黃連半兩射香少許攪膽

一個共為末以猪膽汁為丸如大麻子大每服五六七九十歲二三十丸並用米飲湯送下○小兒黃瘦腹大口臭好食泥土飲食不為肌膚腹中常痛者宜服肥兒丸胡黃連神麩麥芽各二兩使君子木香各四錢檳榔三個蘆薈七錢肉豆蔻半兩為末黃米糊丸如黍米大姜湯送下每服三十丸量兒大小加減用之○小兒五疳八痢面黃肌瘦頭髮作縷好食泥土不思飲食者並宜服保童丸大蠍蟆一個燒存性皂角一挺去皮按燒存性蛤粉二錢水飛射香一

錢另研為末，黃米糊為丸，加麻子大，每服二十九
 米飲湯送下。○統治小兒痘疹，取大蝦蟇不狗幾個，
 放深缸內，取糞坑中蛆虫，淘淨在內，任其自食，俟五
 六日待其馮出，宿蠶每一個將砂仁半兩揀入其腹
 中，以線縫其口，倒掛陰乾，灸腕為末，每末二兩使后
 子肉一兩，白木面一兩，陳皮山查，麥芽枳實，黃連，萊菔
 子各半兩，神麴作糊為丸，如黍米大，白滾湯下一錢，
 或五六分，量以大小，加減此統治諸痘之仙藥也。
 痘疹小兒未生之前，積受胎中穢濁之毒，至十月而

始生，五臟六腑受毒已久，一時不能發洩，雖瘡癩疥
 癬之類，未必非胎中所受。然毒之在皮膚之間，身而
 臟腑積蘊全無，未動必待天行時氣運于下土，侵入
 人身，觸發其根，而後向之所受，于十月中者一齊而
 起，一見出痘，群兒隨之，不論富貴貧賤，咸受一場之
 苦，改刑易形，輕重不齊，自幻至長，必生一次，故名之
 曰百歲瘡焉。其未出之先，或時發驚悸者，心症也。呵
 欠煩悶，肝之症也。面燥腮赤，咳嗽噴嚏者，肺之症也。
 乍涼乍熱，手足稍冷而多睡者，脾之症也。唯腎在臟

胸之下不受微瀉，獨無其症。若未發而先腰痛者，必
 其得氣不足，亦為毒所干。俗謂之折腰痘。痘雖未出，
 而不止，其不治矣。故當天時行出痘之際，須要愛惜
 保護，必倍于平時。而後可。雖有可怒，不可驚嚇。雖有
 可捷，不可趕擊。雖有可責，不可罵詈。雖有暴熱，不可
 解脫。雖有可肥，不可多喂。蓋驚嚇則見必震懼，而傷
 其心。趕擊則見必傾跌，而傷其骨。罵詈則見必忿悶，
 而傷其肝。解脫則見必感邪，而傷其脾。多喂則見必
 作瀉，而傷其脾。五臟受傷，血氣已亂，而偶值出痘，必
 有變異。非為父母者，有以致之耶。然五者中，惟傷脾
 傷骨尤為利害。傷脾則瀉不止，痘心丹編傷骨則血
 已凝，痘必變黑。丹編者，或可急補而免發之。變黑者
 必不能返之，而便紅活也。故苟能調護，則則重者
 庶可以變輕，不善養者則輕者或反。至于變重甚哉
 保嬰之道不可不知也。且以痘疹，朝數言之。二日之
 日之間始見微之，澁本如粟米大，或菜豆大，員似水
 珠，光澤明淨，朗之而勻者，上也。若如子或簇壯，通
 穿者，其本必繁，期為下矣。四日五日之間，大小不一

有變異。非為父母者，有以致之耶。然五者中，惟傷脾
 傷骨尤為利害。傷脾則瀉不止，痘心丹編傷骨則血
 已凝，痘必變黑。丹編者，或可急補而免發之。變黑者
 必不能返之，而便紅活也。故苟能調護，則則重者
 庶可以變輕，不善養者則輕者或反。至于變重甚哉
 保嬰之道不可不知也。且以痘疹，朝數言之。二日之
 日之間始見微之，澁本如粟米大，或菜豆大，員似水
 珠，光澤明淨，朗之而勻者，上也。若如子或簇壯，通
 穿者，其本必繁，期為下矣。四日五日之間，大小不一

根活紅潤壘之堅實者上也若項灰白及軟不堅者
 其勢必危新為下矣六日七日之間穎之肥徒淡紅
 光澤者上也若氣促口渴腹脹不寬者其毒必大盛
 新為下矣八日九日之間充足肥滿色如蒼蠟者上
 也若寒戰心煩煩渴咬齒者其毒心丹攻新為下矣
 十日十一日之間當醫而不醫者丹氣必虛也十二
 日十三日之間瘡漸落而癩尤豎或凹或凸者氣
 血未勻也醫者視其朝數之或近或遠毒氣或淺或
 深正氣之或虧或足身體之熱或寒病勢之或輕或

重當隨其症而加減之不可執一定之方而治多變
 之疾也大拍瘡未出喜微熱而微汗瘡既出喜熱漸
 退而汗止身熱甚宜利小便不可妄用發表之劑一
 發表則元氣易散必成斑爛洩瀉未止急補脾胃不
 可妄投收澀之劑一澀則毒不出必發腹脹自始至
 終皆宜以解毒為主而兼之以活血理氣諸無誤病
 失凡看瘡疹先看小兒之大小壯怯或嬰孩一二三
 歲而刑體瘦弱者出瘡雖稀必須謹慎從毒氣淺
 薄而元氣猶未足便或卒患洩瀉亦令危殆若十歲

前後刑體長大，本痘雖多，苟無他症，亦無所妨。以其
 元氣將實，足以勝之，故也。設有痢疾下血，驚風傷寒
 等，彼則不論痘之未出已出，本見之或大或小，總歸于
 不治而已。不治之痘，人皆以飯後變黑者當之，故凡
 有黑色者，莫不指之曰：腎經之痘也。而不知痘疹之
 中，惟黑者最難識。若初出時隱隱有黑點，自三四朝
 至六七朝，其黑如如，不見紅色，但如玄珠，而亦
 有光采者，名曰黑痘。不獨男女如，有此痘，主冰帶之
 貴與歸腎變黑者不可同日而語也。蓋歸腎變黑者，
 初本冰不紅，至後反黑，陷匿者又當識之。

藥例 痘疹將出未出之際，身體壯熱無汗，乃腠理密
 也。法宜疎解，以升。升者，根起劑。佐以紫蘊、柴胡、防風
 之類，以疎其表。連喬、白芷、天花粉，或十之類，以解其
 表。當飯川芎、紅花，以活其血。陳皮、枳殼、烏茶，以調其
 氣。木通，以行十二經絡。此用藥于未出之時，則然也。
 ○痘疹初本一朝，至四朝，若有微汗，即去升麻、葛根、
 紫蘊、柴胡、防風解表之劑。若無汗，仍用紫蘊、柴胡、
 帶、疎表，宜以白木起劑，佐以白芷、連喬、天花粉、或州

當飯川芎紅花陳皮枳殼烏藥以解其毒治其血中
 其氣而已矣此用藥于既本之後則然之○瘡疹九
 朝至九朝不用解毒之劑宜以黃芪起劑佐以白朮
 人參以補其裡不用當飯但用川芎以行血中之氣
 其加木香以助之仍白芷連翹天花粉甘草用以解
 其毒若身熱未解宜以茯苓木通滑利小便若或覺
 飽仍用陳皮些少以製人參枳殼些少以製黃芪以
 用藥于發將水之際則然之○瘡疹九朝至十二朝
 瘡已回盡宜用八物湯起劑加天花粉連翹木通之

類若有餘熱少加芍藥黃芩以用藥于已回之後則
 然之○已上皆大平瘡疹故用以藥瘡疹黑陷倒靨
 乃必死之症也而亦不可坐視宜用無價散以人猪
 猪犬四者之糞先晒乾至臘月辰日燒灰研細用熟
 密作餅子白滾湯磨服一歲一字二歲一錢三歲二
 錢以意加減則即瘡變為紅活無不神效○或用人
 牙燒灰入射香些許共研極細密作餅子以溫酒調
 下二三服○或用小猪尾尾尖血三四點研入冰片
 少許新水調下○或用鐵脚威靈仙一錢炒為末冰

冰一分溫水調服取下瘡痂為効。○瘡疹半不快以
 蟬殼洗去土晒乾為末每服一錢溫酒調下若不善
 酒以白滾湯送下。○瘡疹將水不足以人參黃芪各
 二錢灸寸十白朮各一錢大棗五枚肉桂五錢用大
 米泔二盞蒸至半盞溫服若不快即干此方中去
 桂寸十加五味五分蒸服。○瘡疹入眼用白蒺藜炒
 灸寸十羌活防風等方為末每服二錢熱水調下。○
 瘡疹眼內有雲翳用輕粉黃丹等分以竹筒吹入耳
 內左眼有翳吹左耳內翳即退或用瓜蒂根半錢蛇

退蟬退各二錢半為細末用羊肝一兩薄切數瓦將
 藥末一錢揉勻用紙包線繫定于淘米水內懸煮令
 熟去紙臨用湯下日進二服

瘡疹不治有十當醫不醫或無不應問亂不寧以則

噎氣寒戰癢甚大便泄瀉詰語不止者一不治也○
 瘡正赤而嘔吐瀉痢不止者二不治也○大便下血
 乳食不化而脾虛者三不治也○瀉血而瘡爛無膿
 者四不治也○大小便閉聲啞瘡如灰色無得水者
 五不治也○面黑或鼻有黑氣者六不治也○口燥

渴小便澀，泄瀉，不食者，七，不治也。○面目閉暗蒙昧，
無~~魄~~者，八，不治也。○頭面至胸，盡~~爪~~破碎，下羊身，雖
好，或身~~跳~~引飲不止，足冷至膝者，九，不治也。○不~~光~~
澤，不起~~發~~根，窠不~~紅~~，腹脹氣促者，十，不治也。

痘疹忌觸臭氣者十四

腋下狐臭，氣一也。○溝渠污

惡，氣二也。○房中淫液，氣三也。○婦人經血，氣四也。

○諸般血醒，氣五也。○酒醉暈醒，氣六也。○硫黃毒

茶，氣七也。○射香臊穢，氣八也。○疫汗蒸濕，氣九也。

○煨~~燒~~頭髮，灰，氣十也。○臭骨諸臭，氣十一也。○葱

蒜~~韭~~，氣十二也。○烹~~煎~~油膩，氣十三也。○坑廁屎糞

氣十四也。凡此臭氣有犯之者，立見~~變~~異，慎之。

本痘之家，必須多用~~胡~~荳，搗汁和酒，各處噴之。門戶

牆壁，幃床榻，皆令噴過，甚能辟臭氣。

急救丹方

凡症瀕危者，一時醫藥未便，聽其死之，殊

可痛~~惻~~，茲特簡丹方，驗過者，五十有奇，救人於呼吸，

間志者，幸廣傳之，以同心利濟云。

五穴敷出血

先將井水當面噴幾急，分開頭髮，用草紙

數層蘸醋，令透搭顛門，其血即止。次以當飯一兩，葱

好磨沉香五錢加秋石三錢服之如無秋石以童便和服可

天行時氣發熱詁詁名瘟疫人中黃五錢蒼朮羌活各三錢煎服立愈

冬月中寒不可遽用湯火烘熨恐寒毒入內須臥溫和處先以生姜汁和溫酒灌飲以姜湯調服穩合先醒後用湯藥

暑月中暈昏倒在路者急以水灌之則醒或用蚯蚓糞填臍中令少兒撒尿其上亦醒切勿以冷水

與飲之即死亦飲冷物通氣逼之亦死
卒中風不省人家用白礬二錢生研細末生姜自然汁調和軟開口灌下其痰涎或吐或化便醒

絞腸收痛切不可用湯藥熱水急以食塩置刀頭燒紅淬入水中調和令病人頻飲之得大吐大瀉為度吐瀉盡後徐用平胃散調服

瘧疾方 紅花六錢香附四錢黃酒一碗水一碗煎八分露一宿翌日清晨畧溫入姜汁一盞服二服全愈

痢疾初起好茶葉一兩帶皮生薑五錢同搗碎滾湯

痢疾初起好茶葉一兩帶皮生薑五錢同搗碎滾湯

炮濃服之，最效。

噤口痢 以乾山茱細茶，佐以人參、石蓮、黃連、茯苓之

類，水煎，加生姜汁，徐呷之，任其吐出，仍與飲之，又吐

又飲，終至不吐，即可生矣。胸次一開，自然思食，故劑

中尤宜用石菖蒲。

疫痢 傳染者是也。用倉朮一兩，水三鐘，煎至二鐘，去

蒼朮，入防風、白朮、芍藥、人中黃各一錢，煎至一鐘，去

渣，溫服。

翻胃 泔汁二兩，牛乳一盞，生姜取汁，竹瀝半盞，童便

一盞，五味調勻，頓服。

卓腫脹 將陳年葫蘆取一小竅，杏仁留穢，入好酒，將

原竅蓋緊，以布帛縛之，隔湯煮之，四沸飲之，或吐或

利，立效。

黃膨脹 用雞蛋一個，將銀簪男破，火頭，女破，小竅，以

木驚子三個，焙乾，為末，攪入蛋內，用紙糊口，放飯上，

煮熟，或酒或湯服下，去后，數次立效。兼治痞

心痛方 以雞子壳，丹衣，煨灰存性，為末，每服錢五方

好酒送下，其痛立止。

又方用銀匠膏板上，瀝青年久者，作丸酒服下數丸，
三次全愈

救水溺死者

先以刀斫開死人口，橫放一筋，令仰之，

便可出水，又急解去死人衣帶，用艾火灸劑中，即活。

救冬月墜水凍死者

切勿便以火逼，急用布袋盛熱

灰，放在心頭，冷則換，熱者待眼開，用溫酒或姜湯，采

飲灌之，即甦。

火傷皮肉潰亂者

用老蚌一個，紙封黃泥，畏龍種火

煨燉過，取出研末，菜油搽之，效。

又方用細茶焙乾，研末，羅罈中，飛麴各等分，菜油調

敷，亦效。

跌撲傷損骨折筋斷者

用路上墻脚下，往來人便溺

處，久碎尾瓦一塊，洗淨，水燉，米醋，沖，九次，黃色為度。

刀刮，細末，每服之，錢好酒調下，在上，食前，在下，食后

神效。

跌撲傷損風寒入內，頭疼發熱者

川芎一錢，當歸半

錢，紅花四方，羌活六方，防風六方，白殭蚕一錢，土鱉

皂，個搗碎，川椒三大，皂酥酒灸，小柴胡八分，生草中

鱉

四分水酒各一碗善之瓦蒸八方不拘時熱服傷在下部加牛膝一錢加一時藥不使用青葱生薑切碎搗汁一盞和酒內熱服亦妙

又斧傷用舊油毡帽口一徐火煨過存性研末敷上即愈

又方用風化石灰共大黃炒桃紅色研細末以童便洗患處搽上扎緊亦效

杖傷菘菜石斛赤芍當歸紅花桃仁牛膝杏仁乳香沒藥茯苓木賊暈加白芷水酒各一碗蒸服

杖瘡敷桑狗骨灰不拘多少山柰十個打碎飛翹四兩酒調塗上消去毒水即愈

護杖丹末杖之前服是不致傷身木耳一瓦瓦上煨灰存性研細末將地蠶虫袋一個細碎和木耳末酒調服如不效用熱湯浴身解之

解砒霜毒急將白扁豆生研入水絞汁飲之

又方用青松毛松壳菜豆共蒸服下得吐可解

解河魃毒急將鮮橄欖連嚼數枚嚥下得生汗魃與鴨印同食不傷人甘草亦效

服 塩酒欲死者急将生豆磨将水灌下不傷命

諸般 魚肉骨梗用象牙末一錢以橄欖磨濃汁同水調下梗物自化

纏喉 風隼乳鵝用榆樹上刺毛窩一個剪病人指甲

脚爪用食鹽少許同入窩內煨過為末吹入患處以牛指柏其後項即時破潰痰血而愈

又方 用荔枝草洗淨搗爛入醋半盞絞汁將鷲翎蘸入喉中探吐痰涎即愈

一切 發背疔瘡腫毒用槐花四五兩微炒黃色乘熱

入酒二大鐘煎十餘沸去渣趁服未成者二三服即消

發背 初起用山甲四兩炒半皮膠四兩炒共為末好酒二盞調勻從容服盡無大患

又方 未成切者將榆樹皮和人乳搗爛加膏圍在四週即退矣

疔瘡 用蒼耳叶梗內取毛形如蚕狀收未慢火在上焙陰乾磁器盛之待有疔瘡之人其心迷亂以中一條為末酒將水送下其毒即解○此中重陽日收

又方用甘草花搗汁冲入热酒内服之亦解

諸腫毒初生於下部者以瓜蒌半斤連皮搗碎槐花

之錢大艾之錢煎服得大便秘利其腫立消○治橫

痃乳瘡亦最効乳瘡加橘葉橫痃加黃柏方飢飽服

之

乳瘡腫毒川大黃粉炒各一兩為末好酒煎成膏以

絹攤貼其上仰臥仍以温酒服一大匙取下惡物

愈

腸瘻用出過蚕蛾垂子燒灰每灰多少配大黃多少

川山甲牙皂多少共為末酒調下三錢膿血皆從大

便中未成膿者服之其毒化黃水瀉下而愈

肺瘻用桑白皮剉燒甜葶藶隔紙炒各一兩為粗末

每服五錢水二盞煎七分温服以利為度

又方用陳年醜芥菜瀉瓊服最効

紅絲瘻生於手足間有黃泡其中忽紫黑色有一紅

絲通透而生若至心腹使人昏亂不救急以針橫截

紅絲到處刺之使血出以膏藥貼之

面部瘡毒初起時將水蛭一二條用醬少許共研塗

紅絲瘻

紙上貼之即退紙上留孔水氣

黃疸滑石二錢水飛班毛二十去頭足用糯米炒米

色黃為度二味共研細用陰陽水一鐘方之服五更

起調服少頃又服之二次完勿便食糲如小便未利

隨煮木通燈心湯徐之溫服即効

頭風用新艾微炒同陳年好酒糟搗成餅燥極熱以

絹帕包細患處一夜得汗而愈

腸疝用淮棉花核不拘多少炒黑烏梅為丸每服二

錢空心白湯下最効

治大麻風法先將瀉醋與臘酒糟勻和以磁器盛之

隔湯煮二三沸先掃淨地以盛炭火鋪地量人身長

短燒地極熱瀉水干上加熬煎聲為度即將糟醋鋪

上蓋草蓆干上又鋪草被一床令病人裸體眠上以

絮被蓋之俟汗出隨拭勿使仍收加以洩其邪

散其風裸體正其氣解其毒便立愈矣

大傷先嚙腎水淨洗將綿拭乾用天南星防風各等

分為細末搽之即効

蛇傷急用香白芷不拘多少為末先取麻繩紮定傷

處，面頰，總以白芷，末，搽上，復，在，麥，門，冬，洗，淨，再，搽，待，
惡水，出，盡，腫，消，皮，合，方，好。

婦人難產逆產急用蛇退一條，蟬退二十頭，醫一束，

共燒，石灰為末，溫酒服，即臥，吃時，即下。

又方以婦人右腳小指尖，上灸，各三壯，立產，艾葉如

麥，火。

臨產心痛不下急用猪心血調乳香，末五錢，好酒送下。

即下治子死腹中與心痛等症。

胎衣不下以旱芹子七粒，巴豆之粒，研如泥，加射香

火許，作餅，貼臍，即下兼治難產。

產後血運急用蕪菜一把，搗爛，入酒壺中，將沸醋傾

入壺內，蓋壺頭，以壺嘴放產婦鼻中，薰之，即醒。

血崩舊棕人髮，荆芥，歸頭，乾姜，芍藥，柏葉，各燒灰，存

性為末，與服二錢，童便下，或烏梅酒下，最效。

治血崩紅帶用伏過十二日，雞卵，泥封固，火煨，存

性為末，將無灰酒調服，一卵可作四服，完全愈。

小兒疳風撮口用槐樹皮如錢，大置臍上，外以麴調

蜜團，四邊以艾火灸之，甚效。

小兒赤遊丹 用積年胞衣水，和金針，塗之神效。如無金針，單以胞衣水，和風和硝冰片，塗之，如無胞衣水，單以金針和，其中大黃末，塗之，皆能取效。

小兒走馬牙疳 用婦人溺桶中，白垢，火煨一錢，入銅線之，方射香分，半數之。

勝江方 棉花煨炒熟，去壳之，西側柏葉炒黑，四兩，柿餅為丸，清晨白滾湯下，四錢，神驗。

稀痘丹 未出痘，小兒用，春分秋分，日，每晚一丸，能使痘毒消化，如遇本痘時，氣身一發，起即磨服一丸，能

使本時稀少，修合者不可加減，以致無效。耳麻黃升，天，各一兩，五錢，羌活，梓皮，蒿州根，枯樓根，鼠粘子，煨，並至，羊升，去，香入銀器，內重陽燉成膏子，入煉蜜少許，調勻，入后藥，冰氣，雄黃各五，卜射香七，卜全鴨，十，四個，灸黃各為細末，入並藥，和勻，方作十九，以蠟封之，臨服用，猪心血，或兔血，同煎，酒調，溫服。

又方 蕎麥麵少許，雄黃五，卜兔血，調和，作餅，陰乾，用俟小兒初生三日，后加菜豆，大者，乳汁下，二，三，丸，以

遍身發紅點為驗○以後每遇朔日鍊子並湯溫洗
遍身○又用指甲蛇退鷄子壳各等分俱用新瓦焙
黃脆研細末除夕砂糖全煎酒調湯服每氣一分服
之次永不出矣

救湯死

須緩之抱起解下切勿以刀割斷扶在床上

仰臥一人將膝頭厚裹衣服抵住糞門不可泄氣刺
雞冠血滴入口中男唯女雄再用一人將脚踏注兩
肩以半緊之挽住項髮捺正其喉按其腹氣要往
上行再用蘆管四個取梁上塵如豆大者令四人各力

吹入耳鼻以待氣回但心中畧有熱氣無不可救治
者急用薑湯潤其喉嚨

諸症戒宜

每見庸医救多繇認病不確妄投湯藥俟

有可起之疾卒至不救尤痛憾之今畧指陳其戒宜
以示治病毋忽之意○凡傷寒自春分后忌用麻黃
桂枝湯以九氣羌活湯為主治凡正傷寒慎勿亂
投湯藥只以薑汁煎酒或薑茶等類與飲守至七日
自解如欲用藥先服羌活冲和湯一二劑疏之以此
劑不犯之湯禁忌耳○凡見傷寒吐者雖有大熱忌

用涼藥，犯之必死。蓋胃中有寒，虬上膈，凶兆也。須先
 溫劑以定，虬后用涼藥以退，庶可耳。○凡治傷寒，若
 經十餘日，以上有表症，當汗者，宜微表之。有裏症，宜
 下者，當微下之。蓋傷寒過經，正氣多虛，若誤用麻黃，
 令人汗多亡陽，誤用承氣，令人大便不禁。○凡見傷
 寒尺脈弱而無力，切勿汗下，寸脈弱而無力，切勿發
 吐。宜用小柴胡湯和之，傷寒發熱，雖熱症，禁用涼藥。
 恐過邪氣，於丹多至不救者，宜解毒發散為主。○凡
 感風邪，忌用荻苓，以其味淡，滲泄表症，服之則引邪
 入陰經，而邪無繇發矣。○一切內傷症，似傷寒者，若
 誤認真傷寒，用廣黃升，發散藥，則內氣升發，面赤
 咽乾，火皆奔上，汗出不休，陽之氣耗，其死必矣。慎之。
 ○凡血虛，腸燥不通者，蓋因發汗過多，或去血太甚，
 或新產婦人，或久病虛人，脈虛弱者，忌大下。宜當飯
 間，燻湯外用蜜導法。○凡產後傷寒，大忌汗吐下之
 法，只宜解表調氣之劑，佐以四物，如大便秘結，用蜜
 導法。○產後，瀉劑不可混治，瀉則補脾，為主。參以得
 食理氣，而四物且停，而勿用。至干痢疾，則不忌四物。

入陰經，而邪無繇發矣。○一切內傷症，似傷寒者，若
 誤認真傷寒，用廣黃升，發散藥，則內氣升發，面赤
 咽乾，火皆奔上，汗出不休，陽之氣耗，其死必矣。慎之。
 ○凡血虛，腸燥不通者，蓋因發汗過多，或去血太甚，
 或新產婦人，或久病虛人，脈虛弱者，忌大下。宜當飯
 間，燻湯外用蜜導法。○凡產後傷寒，大忌汗吐下之
 法，只宜解表調氣之劑，佐以四物，如大便秘結，用蜜
 導法。○產後，瀉劑不可混治，瀉則補脾，為主。參以得
 食理氣，而四物且停，而勿用。至干痢疾，則不忌四物。

兼以調氣消積之劑。○霍亂腹痛不吐不瀉乃一時邪氣擾亂火熱內攻切而慎以為飲食并絕每投煎藥尤忌羹湯羊湯及烏梅之醬等湯服之立死雖熱湯亦禁用。○凡小腹作痛脹緊如石乃房勞傷也慎而認霍亂每投冷水宜用海傷破血調氣之劑。○凡人大指或次指平木不仁三年內必有至大風也急用節勞寡欲養氣固精。○凡中風初起不可驟用肥射半薑等藥恐引風氣入骨髓又不可用大戟芫花直遂以洩大腸之經大抵日淺當順氣日久當活血

待痰為先祛風為要。○凡治鼓脹翻胃吞酸吐酸皆皆禁用甘中蓋甘能壅氣又能發氣故也。○一切症氣禁用姜橘同服同至干細辛尤為補肝閉氣患肝經者服之即時悶脹慎之。○凡治虫症不可驟用花椒雖殺虫于吐虫時驟用之虫必驚致傷胃口慎之治虫痛亦然。○治一切氣結痰涎血結食結寒結痞結水結物俱用生姜一斤搗爛去汁將渣炒熱包棗慰胸膈脹下其滿痛豁然自愈如姜查有入姜汁再慰以效為度惟熱結用冷姜查慰之大抵痰結症

須用導痰法以鴛翎蘸桐油皂角末入喉中探吐痰
 本愈每惜挾奇方而重射利竟什襲藏之即如士人
 見一蟻一風便思放之曰我好生及遇貧病無告之
 人則又漠不動心豈其但知愛物二字不識仁民二
 字耶倘有同志肯出方之應驗者錄示當即續刻以
 廣其惠古人云利濟亦吾道存誠為物祈斯言可為
 射利者頂門針矣

