

械門  
卷  
245.  
34



日麻暫木○久麻久木  
瘡塊三 痘飲積聚三 痘飲成塊治方五

寒症 热症 劳症 膀胱氣 湿症

婦人陰症

小兒食積症

諸瓦

諸血

止血丸藥十五

勞瘵遺精盜汗骨蒸

夢遺鬼交

自汗四

盜汗

九折堂山田  
氏圖書之記



三  
嚙  
齒  
熱

潮  
骨  
蒸

瘡  
症


眼  
疾

喉  
痺

齒  
痛

口  
舌

瘡  
瘍



鄉食庭家秘說

○麻木 人皆以麻木為一病而不知麻與木固自有不同也 所謂麻者非痒非痛 肌肉之内如千萬小虫亂行 雜沸 按之不止搔之愈甚者是也 所謂木者亦不痒不痛 自己之肌肉如他人之肌肉 按之不知搔之不覺者是也 麻如麻之乱 故名曰麻木 如木之頑故名曰木 麻猶知痛痒 而木則全無所覺矣 然未知其病之所屬 將何以斷之 盖麻有久暫木亦有久暫 暫時之麻者或因坐臥不得其所 四體相壓阻抑 榮衛血行既遲而氣亦味至故也 然麻或太甚亦有似于木焉

暫時之木者，亦因坐臥不得其所，一四體重壓又着寒氣，不時不曾護持，而榮衛不相聯屬，血已不行，而氣久不至，故也然。木或還醒，亦有似半麻焉。此其暫時之麻木，雖因氣血不足，而猶未足爲病。惟久麻久木者，斯爲病耳。蓋經年累月無一日不麻者，麻之久者也。麻之久者，非坐臥不穩所致。必其內氣虛甚，風痰湊之，本不能作麻。以其挾于風邪，痰爲風，所噓如風吹波浪，自騰沸而起。肌肉之中已爲風痰所據，陰陽之二氣失其運行之柄矣。安得而不麻乎？經年累月無一日而不木者，木之久者，亦非坐臥不穩所致。乃是死血凝滯，内外挾風。

寒又因陽氣虛敗，不能運動，而肉已死。若血與我不相干，此其所以木人之一身皆氣血所養，氣血行遲，即能成病。况其不行乎？此久麻久木之所以可畏也。然麻木之處，小猶可治之。若半體一肢，決難救療。醫者知之，則人之死生病之輕重了然于胸中。而用藥之妙，在于善變。其可以執泥，而設使暫麻暫木，而用重劑，則損其益完。久麻久木，而用輕劑，則不能取効。審而治之，可也。

藥例大法：麻木之病，雖有風痰死血之分，然治療之藥，皆當以熱藥為向導。如生姜附子、官桂、川烏之類，以引經藥引至各經。如手臂用桑條，股足用牛膝、威靈仙之類，以行

氣藥一通其氣如烏菜木香枳殼青皮之類以通竅藥開其經絡如木通川山甲牙皂之類有疾則去病有風則竇風有血則行血此其總綱也○久麻者皆氣虛為風病所轉也雖係氣虛亦不暇補其氣一補其氣則風無自而散無自而去矣宜以生姜為向導枳殼以開氣半夏南星以去痰防風荆芥羌活以散風牙皂不通以通經絡待其病減然後用參芪白朮茯苓甘草之類以補其氣可也○皆上麻木以羌活為引經胸前麻木以桔梗為引經面上用升麻為引經風用風菜痰用痰藥血用血藥皆以開氣為主而此三處惟以生姜為向導而附子之類

不必用也○遍身肌膚大麻痺淫々然如虫行者風也宜以姜荳為君羌活防風為佐烏菜以勻氣木通以開經生姜為開道蓋木通能行十二經絡烏菜能一身之氣生姜能一身之腠理羌活防風能去一身之風而荳一味專治如魚行者之聖藥也至于加減輕重之劑則在乎其人耳而豈吾之所能備述者乎

○痞塊痞者否塞之意也從病從痞故有痞之名焉又以其堅實有刑故又名之曰痞塊然是物也從何而得哉蓋因死血化痰飲積聚宿食不消痰飲積聚而成者也有三者併而成塊有三者各自成塊各自成塊者易治併而成塊者難治然某何以辨之

察其脉視其形而已矣。脉弦為疾脉滑為食脉芤為血。三脉俱見則并而成塊也。以其形而定之。宿食成塊者居于中脘。視之則無形。按之則有質。在腸胃之間者以人飲食皆入胃故不在皮裡膜外者。痰與血也。痰能流注于脂膜。血能運行于皮肉。痰積而不流則脂膜之間為其所據而有形可見。血之異。亦害其痛之何如耳。痛甚者為血痛。不甚者為痰。療而不行皮肉之間為其所礙而亦有形可見也。欲辨痰與血之異。亦審其痛之何如耳。痛甚者為痰。以熱物熨之而癄緩者為血。熨之而若無所覺者為痰。此痰與血之辨也。又手推不動者為血。手推易動者為痰。以熱物熨之而癄緩者為血。熨之而若無所覺者為痰。此痰與血之辨也。若痰與血相成者。何以辨之。塊之以漸而大者是也。蓋先有

死血而又有痰。裹之則以漸而大。先有積痰而又有血。以并之。示以漸而大。若單是血或單是痰。無相裹相并之物。只如初起之形而已。何至以漸而大。卒然宿食成塊。亦未有不資于痰與血也。蓋飲食所傷者。惟中脘作痛。或按之硬實而已。初未嘗如彈丸之形也。使不資于痰與血。何以成塊乎。必先有硬飯或魚與肉或餛飩米團之類。一時失嚼誤咽。停于胃中。經月不能消化。碍其道路。血流過其處。必裹一層痰。或經其處。又裹一層痰。與血互相裹。則不能不塊矣。裹一層。則大一層。故如彈丸。久則如杯如碗。其初尚隱于胃中。猶有質而無形。其後漸大。則腹皮負起。

而形外見矣又有時升時降時見者乃氣塊也或左或右或上或下按之不見其塊不按又若有刑而瘻作者乃停飲也非塊也此統論其塊云耳然以其在人而言則雖各有專病而又不可拘也如婦人之塊多惡血而亦有氣成者小兒之塊多食積而亦有痰成者易怒之人多氣癖而亦有血成者肥胖之人多痰飲而亦有食成者醫者當問其得病之繇或偶傷食自此日而起者或偶受氣自此日而起者或偶負重勞力自此日而起者或平素有鬱痰固結偶發作而起者在婦人必審其月事之通閉在小兒必審其飲食之多寡方皆當以意求之

不能盡述也大法治一切痞塊皆以開鬱行氣為主又各隨其症而用主治之藥佐佐之如破結軟堅之味則得之矣其有癖塊成龜盤之形能行動者又不獨以塊治當自有藥以消之也

藥例死血成塊者以消血為主○用桃仁紅花山楂薑木血見愁之類以消血三稜莪术之類以消堅青皮烏藥香附枳殼之類以開鬱行氣共成一劑以好醋五六碗煮乾為末即以醋糊為丸隨其塊之上下以時之饑飽服之好酒送下二三百丸一日二服所以必用醋者取其酸能破結也○痰飲成塊者以化痰為主○用半夏南星瓦龍子

灰青礞石海浮石之類以化痰加三稜蓬木香附青皮之類示以醋煮為丸如前服之○食積成塊者以消食為望食仍加三稜蓬木青皮香附之類用醋者乾調神麴糊丸○痰血食積相累成塊者○用海浮石龍子礞石之類以消痰积实萊菔子枳根草莫之類以消食枳實官桂香紅花之類以消血仍加三稜蓬木青皮香附并木香之類醋煮丸之諸氣成塊者以破氣為主用枳實官桂香青皮香附之類以破氣仍加三稜蓬木醋煮丸之○停飲作塊者以泄水為主用日遂荒花大戰之類以停飲作塊者以泄水為主用日遂荒花大戰之類以

泄水佐以順氣之藥如烏菜青皮枳殼木香之類使從大小便而出○癆塊之形如龜鱉狀而能行動者乃是食積死血相聚而成也以其日月既久藉人之氣血養之故成此物必日嘗使病者食鱉魚甲與骨用醋炙脆與三稜蓬木青皮香附之類為末將烏梅肉醋浸令軟搗爛為膏丸之好酒送下其物皆化為血水從大便而出矣此方亦治瘧母如神統治諸塊用蓬木為君三稜當歸青皮香附紅花瓦礫子海浮石官桂木香山甲阿魏山查枳實枳根為佐次加巴豆霜礞石砂射香為末以陳米細末入醋煮成爛粥丸之好酒送下不抱瘀血

食積作塊服此藥易消○凡諸塊不宜用煎剉只宜  
用丸子<sup>ヲ</sup>蓋塊至難消若用煎剉如過路之水而徒損  
元氣<sup>ヲ</sup>干塊無益惟丸子入胃徐々而化逕至所患之處  
潛消<sup>リ</sup>奪日漸損削其塊自小亦不宜消盡其塊假  
令<sup>シ</sup>鶯印大者消至如彈丸即止不必再服蓋塊既  
漸小大勢既殺無再大之理如煖解水<sup>ヲ</sup>一解即不能合  
矣若必欲消盡則人之元氣亦消盡反不可保况塊  
勢既衰久必自消矣經曰衰其大半則止過者死醫者  
所當知也○凡諸塊丸子藥每服三百丸每日二服若病  
勢已劇一日三服以好酒<sup>ヲ</sup>送下不善飲者砂仁鹽湯<sup>ヲ</sup>

送下<sup>ス</sup>每服丸子<sup>ヲ</sup>三日至第四日不要服丸子<sup>ヲ</sup>必用大補丸<sup>ヲ</sup>  
空朝用淡鹽湯<sup>ヲ</sup>送下<sup>ス</sup>二錢隨用乾食<sup>ヲ</sup>壓之守此法  
服藥可奏全功<sup>ヲ</sup>蓋<sup>シ</sup>塊之藥不得不用丸代之剉<sup>ヲ</sup>若不  
服補剉<sup>ヲ</sup>則正氣無所養邪氣何時而除故攻補兼施  
乃萬全之法也補剉以<sup>シ</sup>人參當飯<sup>ヲ</sup>為君白朮茯苓甘草  
川芎芍藥地黃官桂黃芪<sup>ヲ</sup>為佐<sup>ノ</sup>全大補湯即以  
為末密為丸服之忌食蘿蔔大蔥及生冷油膩麩麵  
之類恐難其藥氣<sup>ヲ</sup>不能施功也

○疝氣 痘氣者下部之病俗名小腸氣其實亦小腸之病  
也而所屬者足厥陰肝經也人之一身惟兩腸與小腸以<sup>ニ</sup>

至陰囊睪丸皆統于肝。肝主筋而脉循陰器。陰器者筋之宗也。一着于寒則宗筋短縮而小腸急痛下連睪丸牽引作痛甚。至有升上入腹者焉。又有照旁動氣或時脹起橫入陰處。鄉音如蛙聲而作下降者。此皆寒疝也。至于感濕而成者。一丸漸大。一丸漸小。而小者或至干消盡。皆係于大者而成獨丸焉。其冷如冰其硬如石。其大如鶩卵沉々而痛上連小腸筋脈牽引坐卧不能安。肝木得湿鴨荅條達。如樹得地氣易中長成。此為濕疝也。又有身體發熱陰囊腫大皮破水流痛不可忍乃得之。房勞因婦人不潔穢水浸淫熱氣蒸滲所致。此為勞疝也。

又有身體發熱耳後忽生痄腮。紅腫脹痛痄腮將退而睪丸忽脹一丸極大一丸在下。有似半偏墜而非偏墜也。蓋耳旁乃少陽膽經之分。與厥陰肝經相爲表裡。少陽感受風熱故痄腮忽生。後又遺熱于厥陰。故痄腮既減而睪丸即大。此為熱疝也。又有陰囊脹大如斗陰莖反縮。入內小便淋瀝不能通快。行履濡緩不能輕健。者非疝也。乃膀胱氣也。蓋腎與膀胱爲表裡。腎主水而不能藏。故膀胱受之氣化則能出焉。惟腎虛為邪所客。遺病于膀胱。膀胱受邪氣秘而下墜。小便滲入陰囊。日積月累。故脹大如斗也。治此病者

婦人陰疝

以伐腎邪為主。若夫小兒偏墜，當以食積治。蓋食積不消，脾湿下行，流入肝部，故成此症。又豈可大人之症同論哉？至婦人小腹兩旁，逼近陰處，忽然并結，脹痛。或皮肉頂起，如雞子頭者，乃寒氣聚于厥陰所致。小腹受寒，其病即發。是謂陰疝。孰謂婦人無疝乎？大法以熱治寒，以燥治濕，以活血治勞。有食積則消之，有邪則伐之，有寒則祛之。斯得之矣。

藥例 罩丸升上，入腹者，寒疝也。宜以青皮官桂爲主治。佐以荔枝核大小茴香酒炒，或藥木通、烏芷之類。先用好酒煎乾，次入水煎，加飛鹽二三錢，磨沈香五六分，空心服之。

○或用雞子殼或鶯子殼燒灰，爲末，空心熱酒送下。三錢不過二服，即能壓下。罩丸復取，故所其效如神。○腸旁動氣橫入陰處，下墜作聲者，寒疝也。宜以青皮官桂爲主治。佐以前同藥，但少加升麻、焰前煎法，磨木香錢許，熱服，而飛鹽沈香則不可用。其墜下，故也。蓋或升或降，雖曰總屬平寒，而氣有上下，則不可不斟酌用之也。○或用黑附子川烏大小茴香丁香官桂乾姜良姜木香等分，少加射香，爲丸，好酒送下。五六十九良久，即覺內氣如雷動，前攻後撻，甚為驚人，收項，如欲大便，狀如祛出寒氣，有聲連發，其痛即寬。能使三四年不發，乃却藥也。○罩丸一大

一小者濕疝也。宜以蒼术白术防風為主治。佐以官桂青皮不通  
膀胱澤浮烏藥大小茴香橘核之類。煎之仍以帶鬚葱  
天搘前湯浸罩丸于內即服。此藥當添熱湯浸之以  
手搘之立能使之一樣。就坐湯中撒尿其病易去。○陰囊  
脹大皮爛水流者勞疝也。宜以猪屎脬一個當歸三錢為主  
治。佐以紅花桃仁官桂橘核青皮鹽炒黃柏炒芍藥苟香於  
芩木通耳艸之類煎服。○痄腮退後勿患偏墜者。熱疝  
也。宜以柴胡青皮鹽炒黃柏為主。治上佐以赤芍桔梗甘草  
稍橘核生地當歸之類。若挾風邪加荆芥防風。○陰囊  
腫大如斗小便淋瀝者膀胱氣也。宜代胃邪用澤瀉。

一行切片分作四分一分童便浸一分鹽水浸一分酒浸一分  
醋浸各七日夜日中晒乾不要去汁收至極乾畧焙為  
末陳米粉粥為丸每空朝白滾湯下二錢至下午饑時又  
服二錢如此服去自然小便流利陰腫漸寬將久而自愈矣  
不可求速効。○婦人小腹近陰之處先結脹痛或皮肉項  
起如雞子頭者陰疝也。宜以官桂為主治。佐以木香枳  
棗青皮大腹皮大小茴香附烏藥之類煎之磨沈香  
五六分空心服。○小兒偏墜乃食積也。宜用山楂麥芽  
枳實黃連枳殼炒仁蓬木神曲白朮蒼朮半夏陳  
皮甘草之類等分為丸白湯調下量兒大小與之久而自

愈矣大抵病皆屬肝經惟小兒偏墜乃繇脾經而反傳于  
肝也○凡一切疝症皆禁用姜橘同服或單用姜或單用  
橘則無所妨但二味相合斯補肝矣至于細辛尤為補肝  
而能閉氣<sub>形</sub>患肝經症者服之即時悶脹頓之令肝無補  
法以其常有余也五臟惟肝有余而疝氣則又肝氣有  
餘之甚者也其可以復補乎哉

○諸氣人得天地之氣以成形形者氣之所繇寓者也  
氣者刑<sub>形</sub>之所繇以充者也二者固相爲用也而亦有輕  
重之差焉形病氣不病雖肥壯而可憐<sub>是</sub>在所輕而  
氣在所重也人能安養天和使五臟之氣均得其平

形病氣不病  
可愛

焉則何病之有惟內傷七情外感六氣六氣內侵而五臟  
之氣病矣故心氣盛則煩不寧口乾舌燥肺氣盛則  
壅塞喘急上膈煩滿肝氣盛則暴怒時發兩脇脹急  
脾氣盛則中脘痞塞腹滿飽痛腎氣盛則膀胱滿急  
水道不通此皆氣乏有餘者也至若心氣虛<sub>入</sub>精神  
恍惚夢寐不寧肺氣虛<sub>入</sub>則呼吸短淺皮毛酒淅肝  
氣虛<sub>入</sub>則筋脉不和頭空睡少脾氣虛<sub>入</sub>則饑不欲食  
溏泄自利腎氣虛<sub>入</sub>則腰痛不能轉側大便滯小便  
前後牽引而微痛<sub>入</sub>此皆氣乏不足者也氣失其平  
則為疾善醫者調其氣而已有余者瀉之不足者補之

又豈有實々虛々之患乎大法臟常以三臟治本經之虛實固宜補而宜鴻矣然虛則補其母實則鴻其子則又不可不知也

藥例心氣虛則補之以炒鹽心氣實則鴻之以生甘艸此本經之補浮也然肝為心之母虛則姜橘兼用以補肝補肝即所以補心也脾為心之子實則黃連枳實鴻脾浮脾非所以鴻心乎○肺氣虛則補之以五味子肺氣實則浮之以桑白皮此本經之補浮也然脾為肺之母虛則甘草大棗補脾補脾即所以補肺也腎為肺之子實則澤鴻浮腎鴻腎非所以浮肺乎○肝氣虛

則補之以姜橘○肝氣實則鴻之以芍藥此本經之補浮也然腎為肝之母虛則地黃黃柏補腎補腎所以補肝也心為肝之子實則生甘艸浮心鴻心所以鴻肝乎○脾氣虛則補之以大棗甘艸○脾氣實則鴻之以黃連枳實此本經之補浮也然心為脾之母虛則炒鹽補心補心即所以補脾也肺為脾之子實則桑白皮浮肺鴻肺非所以浮脾乎○腎氣虛則補之以地黃黃柏腎氣實則鴻之以澤鴻此本經之補浮也然肺為腎之子實則芍藥鴻肺補肺補肺即所以補腎也肝為腎之子實則芍藥鴻肝浮肝冰所以鴻腎乎○合而言之諸氣之病分屬五臟

五臟之病分<sup>テ</sup>為諸症<sup>ヲ</sup>要<sup>アリ</sup>不可以一節<sup>ヲ</sup>言也此之所言乃補浮之大畧耳然此正藥之外亦不能無增益者焉如炒鹽補心甘艸<sup>アシカ</sup>浮心固矣而麥門冬亦可以補心黃連亦可以浮心如五味子補肺桑白皮鴻肺<sup>アシカ</sup>固矣而人參亦可以補肺黃芩亦可以補肝黃連亦可以浮肝如甘艸大棗補脾黃連亦可以補脾黃芩亦可以補肝姜橘補肝芍藥浮肝<sup>アシカ</sup>固矣而杜仲亦可以補腎茯苓亦可以鴻腎臨病用草石蠶勢<sup>アシカ</sup>定方得于心而應于手者其又可以言傳耶

○諸血 人身之血猶地中之水也水流而不息故能滋萬物血流而不息故能榮百脉也惟善調攝者不妄作勞則血之運于身者無一息之停自然肌膚潤澤筋脉和暢何病之有在不善調攝者特其壯盛恣情酒色而貧窮困苦之人又不暇自惜涉遠負重奔走于衣食而無日夜之安息其能不傷于血乎傷于上部則胸膈痛傷于中部則兩脇中脘痛傷于下部則腹痛錄是衄血吐血便血尿血之病作矣夫衄血與吐血無異但所錄之經則不同而要之皆裏于肝也脾能裏血不能使血之上升胃火上蒸則血從口出

肺火上騰スミ則有口鼻、鼻之異也然亦有輕重之蓋焉  
衄血太甚始與吐血無異不甚不足為慮也至于吐血雖不  
甚而實為可畏之疾用藥者其可以混施耶夫吐血固  
重于衄血矣而就其吐血言之則示自在輕重如一略一塊  
者胃口血也其所從來者近痰中見血色如瑪瑙而成  
塊者示胃口血也其所從來者亦近二者勢若可畏而  
猶能措手法當任其自出又必者其色不鮮者舊血也  
勿以藥止之其色鮮者新血也所積者必不甚多宜以藥止  
之蓋舊血終不歸經若所出者多則損人矣故宜以茅止  
之此皆可以調理而愈者若痰中見血或一點之小或一條

之細語其勢若無可畏而病根反深此血非胃口之血也乃  
從肺臟中來肺為虛火所逼血隨痰出故也其所以下步  
者何也蓋肺臟以氣為主本多氣而少血是以出者亦少也  
肺臟之血本少而逼而出之則肺已枯而無以領一身之氣  
矣其害不亦大乎至于五竅出血者勢如潮湧耳目口  
鼻一齊逆流藥不及煎針不及下死在頃刻間此猶  
血症之至極者也而究其之所成莫非酒色無度及奔走勞  
碌以致五藏皆傷是以五竅出血也殷腎者其可無急治  
法乎若夫腸風臟毒大便下血與小便出血者其病易治非  
若上焦之血也大法未見血則宜消宜和既見血則宜涼

宣止。舊血未盡則化其血，新血未生則補其血。因其勢之輕重而為緩急之施，則無不中矣。若婦人崩漏女子，月事則有本科而此不及載之。

自

藥例。衄血甚者，先以濕紙搭願門，其血立止。然後以鴉籜節搗取汁和童便服之。○煎劑用炒黑山梔炒黑蒲黃炒黑香附側柏葉茅根地榆同四物湯煎服。吐血甚者以小薊草搗汁和童便先服用犀角地黃玄參何臘地榆之類為主治。佐以黃連山梔側柏葉之類煎之磨沈香少許令其降下再加鴉籜節汁磨上等清烟墨二錢，服之待其血止然後四物湯加敗龜板何首烏地榆之類。

煎服。○痰中見血者，干治痰藥中加止血之劑如貝母、蔓仁、茯苓、麥門冬、玄參、竹茹、柏子之類以治痰犀角阿膠側柏葉炒黑山梔之類以止血黃芩黃連之類以降火調花蓋石細末四五分徐之服之可用竹瀝一碗入阿膠二兩溶開將石羔煅過一兩蛤粉一兩青黛半兩好墨一兩共為細末調和丸如黍米大每服一錢苦若送下其効甚速。○五竅出血者先將井花水當面連噴幾口急分開頭髮用草紙數層蘸醋令透搭在願門其血即止次以當歸一兩煎好磨沈香五六錢加秋石二錢服之如一時無秋石即以童便和服則血各歸經水無事。

矣然後以四物湯作剷加五味人參為末將紫阿車洗盡血水童便者火爛鴉和為丸空朝白湯送下可收萬全之功示治療○大便血者看其色鮮者急宜止之如黃連槐花烏梅地榆熟地牡蠣之類煎之調藕節汁空心大口咽下送丸子二三百粒其丸用五倍子髮灰敗龜板灰金底墨牡蠣棕灰類為末將烏梅肉煮爛鴉和如泥丸之亦治婦人血崩○其色紫者任其自下反以四物湯加桃仁山楂紅花赤芍之類合而服之則既不損新血而又能消瘀血待其色淡只用四物湯加龜板何首烏前服○小便血者乃心經受熱

遺熱于小腸也以黃連為君石蓮麥門赤茯苓赤芍菜當歸甘艸梢山梔為佐前後加便童調服○腸風臟毒乃酒色過度之故又有不因酒色而得者必勞苦之人負重涉遠而不惜其身者也用藥者當因人而施之○血有下干糞後者上為遠血從小腸經來宜清小腸之火而兼以收澁則以黃連為君而梔為佐加烏梅前服○血有下干糞前者為近血從大腸經來宜大腸之火而兼以收澁則以槐花為君而黃連山梔為佐加烏梅前服○血有糞前糞後雜下者乃從脾胃中來也宜以煅過石羔為君槐花山梔甘艸為佐

加烏梅ヲ煎大服。○若下血甚者，加入參ヲ以補之。牡蠣粟殼ヲ以  
滻之升麻ヲ以升提之。此治酒色過度之血也。若奔走負重  
而得者，當于四物湯中倍加當歸服之。任其自下，驟用止  
血之劑ヲ待所下。若鮮血色乃新血也，須兼補滲。示不可  
用大滲之劑ヲ如牡蠣烏梅之類，示可也。而槐花黃連二味又  
豈可少哉？

○癆瘵遺精盜汗骨蒸。病者勞也。繇妄作勞以成病也。從病  
從勞故名曰病。勞力而以負重，則傷血而氣亦傷。精猶  
未傷也。勞力以行房，則傷精而血亦傷。氣能獨不傷乎。  
如或勞力以負重，又復勞力以行房，更失于檢束而不避。

風寒特其強壯而縱飲麴蘖，則精氣與血俱傷。而  
真元劉削。風寒麴蘖交攻而虛火愈熾，病根日深已。  
不可拔猶不知戒而肆情逞慾，則心肺腎損忘損。  
則精神不守恍惚易驚。肝損則失血少，睡面白無色。  
肺損則聲音低小言語不續。腎損則腰膝軟弱小便  
短數。而虛損之症成矣。虛損者，病瘵之始。病瘵者，虛  
損之終。繇勞傷而成虛損。虛損而成病瘵。而病瘵之為病也，有咽乾喉痒，頻嗽而無痰者。有哮喘滿急，氣  
壅不得眠者。有痰中見血一咳而即出者。有面常頑然  
或酒淅而似寒者。有胸前如火而兩足冰冷者。有腰痛背

痛而筋骸無力者總屬于虛而已至干夢遺鬼交盜汗自汗骨蒸潮熱孰非虛之所致耶究而言之夢遺鬼交虛不暇言矣然何以有是夢有是鬼而又有是精耶蓋夢者心之神也鬼者肝之魂也精者腎之液也心之火君火也肝腎之火相火也相從君令者也君火一動相火從之而夢遺鬼交之病起矣盜汗自汗虛不暇言矣然均之為汗也何為而有盜與自之異耶蓋盜汗者睡去則出醒來則即收如盜之例竊乘其空隙而惟恐人知故有盜之名焉而未其所以屬之經則繇于心氣不足汗者心之液也心氣不足則神不守舍而液無所據故睡中汗出

而一驚覺之間心神漸定故汗亦收也自汗無睡無醒自然濡濕故有自汗之名焉較而言之則自汗為甚是何也蓋盜汗本于心虛而真元猶未盡虛也自汗則真元耗散腠理皆開肺失統氣之權不能固表故毫竅踈豁汗流不禁豈不大可畏哉若汗出膏凝而不流者乃真元盡泄于外而生氣已絕死期至矣骨蒸潮熱虛不暇言矣然何以使熱之蒙于骨耶蓋骨之所屬者腎也腎主寒則寒腎虛則熱腎熱則龍火大旺煎熬真陰真陰既竭熱無所容流入于骨故成骨蒸骨蒸既久上蒸于額額熱而赤則不救矣蓋額者骨之本也骨

本一枯モロマ則腎經已絕死期至矣又有喉啞一症百無一生傳屍一症九死一活相思一症無藥可治或平素有漏病及下部忽生腫毒與夫脾虛發腫泄淫者皆不治之症也  
藥例 喉痺乾嗽以滋陰降火為主大劑玄參為君佐以阿膠貝母茯苓黃柏知母之類○喘急不盪以定喘順氣為主大劑蘓子為君佐以杏仁馬鳴芩貝母瓜萎橘紅茯苓黃芩竹茹之類○痰中見血以清痰降火為主宜貝母為君佐以天花粉麥門冬、茯苓、蘓子、阿膠降真香犀角玄參黃芩山梔之類若痰多于血以痰藥君之血多于痰以血藥君之但以治火之藥佐之可也面常頰熱少頃即減者虛火也

以黃柏為君人參茯苓知母連翹麥門冬之類為佐○胸前如火而足冰冷者陰虛火升也以麥門冬為君黃柏知母茯苓人參瓜萎仁為佐以生附子為末塗兩足心○酒粥似寒者反熱症也以黃芩為君人參連翹柴胡黃連為佐若無痰喘宜加芍藥不可誤以為風而用風劑○腰疼背痛筋骸無力者虛甚也以人參為君龜板山茱杜仲黃柏牛膝為佐如無痰用四物湯配之○病人虛甚而痰嗽不止不容不補惟以化痰之劑送下補藥示妙用熟人參為極細末將雞子青拌和淨手擣之令其軟潤却以貯母阿膠天花粉茯苓蘓子橘紅竹茹黃芩之類

煎好澄清。將參末放舌上徐々送下。○虛勞惟紫阿車為聖藥。以久補久之意也。用頭胎男子胞衣洗淨。挑去血筋。不停換水洗之。直待無一些血水乃止入淨器中。煮爛搗如泥和乾菜丸之。其乾菜如人參白朮茯苓甘草。以補氣。當取川芎芍藥茱萸地黃以補血。天門麥門冬。五味兒絲故紙杜仲以補精。而又佐之以知母黃柏。引降火。滋陰。此其大法也。凡如相子大。滑石。為衣。秋石湯。百丸或用鱠魚血。烈日中晒乾為末。或半斤。或一斤配人參末。蜜丸。如桐子大。空心淡鹽湯送下。百丸。或用敗龜板水浸。二日刮去垢。晒乾。鎔碎。為細末。蜜丸。如梧桐子大。又

用阿膠。將蛤粉。炒成珠。為末。蜜丸。如葵莖大。空心服。龜板丸。以補腎。水臨晚服。阿膠丸。以潤肺。金匱用白滾湯。下大有奇効。龜板生用不失本性。若灸則動火。或用敗龜板人參等分。為末。將阿膠投竹瀝中化開丸之。空朝一服下午。饑時一服。白滾湯下百丸。○病症喉啞。治法。蓋肺為氣主。為五臟之華蓋。統領一身之氣者也。大邪燄。金則氣索而無声。是以不治。若微有声者。猶可延年也。若死中求生。亦有一法。用大猪肺一具。割去心皮四旁。浮脂。將刀劃破其中。入生蜜三四两。在內綿緊繫入淨鍋中。用生蜜三四斤水一二斗。同煮半日。若稠厚。再加滾湯。○

煮之取出溫湯洗淨，秋石四兩食之能復肺氣。又干丹田連臍貼參附膏可復真元。其方用火參半斤附子半斤為粗末，將天鵝油三斤浸半月慢火熬至焦黑紋出渣再熬至滴水成珠，下上等紗丹一觔慢熬，膏成待溫入麝香末三錢攤紵絲上貼之。美食調養可保復生此秘要之訣也。惟有緣者遇之，瓦膏藥必無用人參者故此方必無人信。病症傳屍無治法。蓋因初起病之人先為屍虫蝕食其五臟而死。既死之後五臟皆冷尸虫不能居皆從鼻中而出以覓乃肺之竅病乃肺之病故從其而敷而出也。其色多赤。

乃血所化無翼而能飛或有不見而能着人者，以骨肉尋骨肉以同氣覓同氣雖在千里外其人當病必無能脫者可畏之甚也。○此物在禽類則名尸虫，在鬼道則名尸鬼出入無常變化莫測不獨病病之人有之而人人皆有者但不犯此病即不能為害矣。本艸雖有殺尸蟲之藥多不能効惟死人身上的可以治之。恨人不知雖知之亦以為臭穢而不用外此無治法矣。○病症素患漏瘡與下部忽生腫毒者永無可生之日。蓋虛火縱橫攻擊手流毒于腸胃而直注于上下焦故也。○又有相思病者神魂縹緲背人偷淚悲咽吞声亦。

無治方惟得遇所思之人以遂其慾則自愈矣不然  
有死而已○病症惟心肝肺腎四臟受病而脾胃尚無恙  
也脾肺之母脾土不衰猶可以生肺金故患肺金病者常  
令脾土調和勿使損壞可也醫者不知利害但見病人  
陰虛火盛日夜補陰用當取生地黃柏知母麥冬之類以  
為常服之劑將謂補其陰則元氣自復固然也豈  
知此等藥性味寒涼易滑腸胃久服必鴻一浮則元  
氣脫盡矣下多血陰將以補陰而反以元之將見面  
目手足皆發浮腫喘急雖存而精神已盡不死何待乎  
○病症痰多血虛醫者多以四物二陳加減與之蓋謂

○二陳治痰四物補血自以爲無遺法矣豈知二陳太燥四物太  
臟合而用之兩無成功而病反增重况痰在上焦血居下元  
一剂之中豈能上消其痰下補其血哉論治法宜以清火  
順氣化痰之劑日間徐服而四物更合他藥作丸滚  
以滑石空朝服之庶不礙痰而下元亦可補矣煎劑中  
示不礙痰而能補血者阿膠玄參復枯艸龜甲之類  
是也又何首烏頭髮灰一味最能補血但干丸藥中  
用之而煎剉則非所宜矣

○夢遺鬼交夢屬心鬼屬肝精屬腎君火動而相火  
從故有此症治此症者不徒澁其精又必清心火不徒

○清心火又必補其虛惟虛故火易動故精易泄也實煅過蛎牡荷花鬚金櫻子之類以澁精石蓮黃連茯神遠志麥門冬之類以清心火安心神入參白朮之類以補虛作丸子空朝服之藥中加秋石一二兩丸妙或用鹿角屑炙脆為細末將天門麥門地黃人參等分煎膏拌和為丸如桐子大空心鹽湯下百丸或用童便酒下亦可

○盜汗自汗盜汗屬心自汗屬肺心神不守故有盜汗肺氣不斂故有自汗盜汗以茯神門冬為主以安心神君以麻黃根佐以浮麥牡蛎大忌茯苓生姜蓋茯苓

滲益用之則亡津液生姜開竅敷用之則汗流不止故忌之也此惟無痰者可用此方若有痰則去參五味而麥冬亦無妨或用牡鈎梗米等分為末包生布中遍身擇之隨擇隨止示一時外治之良法也○傷寒汗症則用芍藥桂枝甘草以和其表氣虛汗出不休則用黃芪為主此並治癆瘍中之汗症也

○骨蒸潮熱骨蒸潮熱微有分別骨蒸則無時而不熱潮熱則如潮信之來必有定期潮熱將成之骨蒸骨蒸者已成之潮熱而總歸于腎虛腎虛則熱故也宜以杜仲黃柏牛膝茯苓為主治佐以四物人參枸杞五味子

龜板天門麥門冬之類，塗丸服之，亦虛腰背痛及骨肉疼，甚効。須久服乃可。○本艸謂地骨皮治骨蒸，之初起可也。牡丹皮治無汗之骨蒸，此特治骨蒸之初起可也。若骨蒸而至兩顧之症，亦亦難矣。醫者不為坐視，求一生千萬死之中，不論有汗無汗，只用此二味，洗淨水煎成膏，晒乾，為末，以鹿脊髓一具，如無用猪脊髓煮爛，搗如泥丸之，不拘時服，所以必用煎膏者何也？雖有治骨蒸之功，然氣味淡薄，徒加干煎劑之中，服之安能取効？必用以前膏，則此須之前膏已，投幾兩之劑矣。况煎膏則性又醇和，善續經

絡，而更有脊髓助之逕，至患處，故可奏功。然又必令病人，日常啖猪脊，作散食之，亦能助藥力。此秘要之法也。若人無他病，而單患夜熱者，以生芍藥來冬竹茹茶，各三四錢煎服，甚効。○已上三症，雖示癆瘍中之一病，然非患癆瘍者，亦恒有此症，故附于後。

○咳嗽，有痰無聲之謂，咳有聲無痰之謂，嗽有痰者名曰咳嗽，然謂無聲者，非全無聲也，咳而易出声之，甚鄉音也。謂無痰者，非曰果無病也，但嗽而費力，疹之不易出也。分而言之，咳為有肺嗽，為有肺合而言之，總歸于心，是何也？蓋肺主氣，声之所從出也，肺主憂，

痰之所繇<sup>テ</sup>藏也心主热火之所繇生也火魁金者也而肺之所屬者金心火缺甚則肺無傷甚則至<sup>ト</sup>于肺受<sup>ヒテ</sup>火邪則熱而<sup>シテ</sup>氣沮不能不<sup>ヒテ</sup>充而為声是以嗽也火生土者也而脾之所屬者土火不甚則脾得所養甚則反至于困脾脾有流飲又因火化不能不<sup>ヒテ</sup>變而為是以咳也然則咳自為咳嗽自為嗽二者各自為病與曰非也肺與脾迭相為用而又互相為害者也使肺不受熱則化氣自清亦可以利脾而何至于生痰脾不受热則游溢精氣自足以<sup>シテ</sup>滋肺而何至于成嗽此肺與脾之所以迭相為用也肺家受热則氣已壅盛而下流于脾

其能以不<sup>ヒテ</sup>作痰乎脾家受热則痰隨火升而閉塞肺院其空以不<sup>ヒテ</sup>發痰乎此肺與脾之所以互相為害也繇是觀之則肺脾雖分二經而咳嗽總為一病病之所繇成皆心火之所致也雖然心火固能致病矣而示有得于外感者或傷于风或傷于寒或傷于热如此之類種々不同亦苟歸咎于心火乎殆不知始之者凡寒與热也而成之者火也内外夾攻病斯成焉而不可以端末也此特論夫咳嗽之繇耳咳嗽之名非一言之所盡悉而數之有火痰嗽欬嗽痰嗽頑痰嗽清痰嗽凡痰嗽寒痰嗽酒痰嗽食積痰嗽與夫乾

咳嗽之異上焉而諸嗽之形症又何以別之蓋火痰嗽者必  
嗽面赤用力久而後出者是也湿痰嗽者喉中漉漉有聲  
嗽而易出者是也鬱痰嗽者胸臆脹滿連嗽不出  
喉中有喘声夜不得眠上飽下餓者是也頑痰嗽者  
膠魚咽喉揮咯音尾不得出必努力大嗽而後出少許如脂  
膏之狀者是也清痰嗽者必待嗽而後出其痰不稠  
粘者是也凡痰嗽者肺氣壅盛必頓嗽而後出其痰浮  
而有沫狀如津唾而畧稠者是也寒痰嗽者得于秋冬  
之交或為冷雨所淋或為冷風所侵或雨路臥星月  
或寒天入水所致其嗽必哮喘或肩背覺寒得熱湯  
不中矣

飲之即緩者是也酒痰嗽者得之醉後感冒風熱腹中  
有酒積飲濁酒即癰者是也食積痰嗽者食後即  
嗽胸膈不寬其痰稠粘覺有訴意者是也乾咳嗽者  
平素陰血不足虛火有余喉中常痒即頻嗽有声而無痰  
者是也又有嗽而兩脇痛者名曰肝咳有嗽而腰脅痛者  
名腎咳有嗽而中脘作痛者名曰脾咳有嗽而鼻流清涕  
者名曰肺咳有嗽而口苦舌乾者名曰心咳又有嗽而遺溺  
者氣虛也有嗽而五心煩熱者血虛也醫者審而治之無  
不中矣

藥例火痰嗽者不宜用半夏南星以其大燥也惟石膏

知母瓜蒌竹茹之類以化痰<sup>ス</sup>黃連黃芩山梔之類以降<sup>ス</sup>  
火<sup>ヲ</sup>橘子橘紅茯苓之類以順氣<sup>ヲ</sup>○湿痰嗽者不宜用  
玄參阿膠知母以其滋潤<sup>也</sup>也惟以<sup>テ</sup>蒼朮防風之類以<sup>テ</sup>  
燥濕半夏南星姜汁竹瀝之類以去痰枳殼橘紅之  
類以順氣<sup>ヲ</sup>黃芩山梔之類以降<sup>ス</sup>○鬱痰嗽者不宜用  
五味麥門<sup>以其</sup>補肺也惟以枳殼桔梗便浸香附之類以<sup>テ</sup>  
開鬱<sup>ノ</sup>貝母瓜蒌半夏之類以治痰<sup>ス</sup>橘子杏仁之類以定喘  
茯苓黃芩山梔之類以降<sup>ス</sup>○頑痰嗽者不宜用煎劑<sup>ヲ</sup>  
宜以散子<sup>ノ</sup>滑磨<sup>之</sup>如青黛蛤粉海浮石凡化硝明礬瓜  
蒌礞石之類為極細末以姜汁竹瀝<sup>ヲ</sup>和服<sup>ス</sup>其證固不

開非輕劑所能愈<sup>也</sup>○清痰嗽者宜用緩藥<sup>以治之</sup>如貝  
母天花粉茯苓黃芩竹茹橘紅橘子之類○風痰嗽者  
宜<sup>テ</sup>輕浮之劑以治之如荷<sup>ノ</sup>薄紫<sup>ノ</sup>橘梗葉桑白皮防風  
半夏黃芩枳殼之類<sup>少加</sup>麻黃甘草<sup>ヲ</sup>○寒痰嗽者宜服<sup>ス</sup>  
薑吸散<sup>ノ</sup>如肉桂雄黃<sup>ノ</sup>鶯管石<sup>ノ</sup>款冬花甘草等分為極細  
末<sup>テ</sup>潤<sup>テ</sup>薑管<sup>ヲ</sup>挑藥輕<sup>タ</sup>含<sup>シ</sup>吸入<sup>ス</sup>唯因徐<sup>々</sup>以清茶過口<sup>ス</sup>  
或以此藥蜜丸如雞豆大噙化示效若熱嗽<sup>ノ</sup>去肉桂用甘草  
石<sup>ヲ</sup>若用煎劑<sup>ノ</sup>半夏南星陳皮茯苓款冬花生姜各  
甘草之類○酒痰嗽者宜山梔黃芩黃連以治火<sup>ノ</sup>貝母  
瓜蒌半夏曲之類以治痰<sup>ス</sup>蛤粉萊菔粉天花粉之類以消酒<sup>ス</sup>

紫蘿梗葉陳皮之類以順氣○食積痰嗽者宜以枳實  
萊菔子神翹麥芽山楂之類以消食陳皮木香砂仁之類  
以順氣半夏南星之類以消痰石羔黃連之類以降火加  
生姜竹茹○乾咳嗽者宜以知母玄參阿膠貝母麥冬之  
類為主治佐以黃柏茯苓天花粉山梔甘草之類加燈心  
竹茹服之甚効○諸嗽皆宜用桔梗乃肺經本藥故不可  
不用但不可多用耳以其為舟楫之劑而不下不霑則不能  
引諸藥至肺部多用則又承載諸藥而不能行反能作  
飽故不可多用若治喉痛與玄參甘草同用若開鬱與积  
慶香附桂芍薈木貝母同用若作吐藥只與甘草等分為

一天劑一服之自捲痰而出矣○久嗽不愈用麥冬為君  
貝母知母茯苓竹茹黃芩蘿子之類為佐亦加五味甘草  
燈心一服之華蓋散茯苓桑橘蘿子麻杏同煎大有効  
○附痿症 痰之為病甚多不獨咳嗽有痰方為痰症也如  
胸膈迷悶咽喉不清肩背作痛遍身微痛或頭項支節  
之間皮膚之內無故腫起大小不等而無紅赤之色按之如焚  
不甚痛苦或手足上下半邊身體麻木不仁或頭眩眼花  
卒然昏憊角弓反張四肢不動或步履如踏灰上或眼  
前如見白雲或睡中昏迷常厭鬼或飯後倦怠欲  
眠或脇下如湯沸熱者或心頭嘈雜似餓或恶心欲嘔或

吞酸如此之類難以牧舉。莫非痰之所為也。豈特咳  
嗽見痰方為痰哉。夫未有無痰者。但痰中有養胃  
不見其為害耳。**礞石滾痰丸** 治痰之聖藥。諸痰皆  
可服之。**○青礞石** 两 打碎如豆大。同硝石。两。拌和入  
罐内。大火煅之。以硝盡為度。倾出。碾細入滚湯漂  
三四次。漂去硝气。再碾細。聰用。又將川大黄半斤片黄  
芩半斤。切片。同姜汁竹瀝各一碗。浸一宿。連汁晒乾。放罈  
桶内。蒸半日。取出晒極乾。為細末。上等角沈香五錢。亦  
為極細末。同一處。再研和以姜汁竹瀝。和白蜜。煉  
熟。九如。如袁豆大。收貯磁器中。以黃蠅塞口。每服三

**○十九** 一日一服。痰多者。一日二服。隨其痰之上下。以時之饑  
飽。服之。小兒只可十九。老人只可十五丸。或二十丸。量人之大  
小。及所稟之原薄。用之。**○若痰盛。作飽。欲使痰從大  
便出。即與此方。礞石再加一两。沈香再加半两。其大黄。黃  
芩。不用蒸熟。以生蜜丸。如桐子大。臨臥用白滚湯。下  
五十丸。再不許開口說話。睡至天明。其痰即下矣。**○四  
製半夏丸** 示治痰之聖藥。不拘男子婦人老人小兒皆  
用之。可以常服。不動脾胃。不代元氣。不損陰血。勿以為常  
藥也。大半夏先泡去皮。洗去滑水。淨秤一行。入淨錫內。  
水二斗生姜搗碎半斤。同煮。半日取一個。切開。看之中心**

透明無白色方。止取起冷水洗淨，晒乾功完。分作四分，一分用明礬二兩煎湯浸之。一分用牙皂一兩煎湯浸之。一分用竹瀝半碗浸之。一分用童便一碗加鹽二兩浸之。各浸七日連汁晒乾為細末。聰用加木香末二兩沈香末一兩同一處再研和。將枳實半斤水煎濃汁如蜜丸如菉豆大。人服。皂丸小兒五十丸肥人三百丸白滾湯下。○痰症干嗽條中備陳之矣。但人見痰則為有痰，未見痰則為無痰。而不知無形之痰能作多端之疾。非因咳嗽而始有痰也。故復附于此而不自以為贅。

○眼疾人之有目猶天之有日月也。有明臨炤萬方。若烟霧障

天則明者暗矣。兩目有神旁燭萬物。若風火發越則神斯眊矣。善調攝者安養天和使氣血常運。何至有目痛之患乎？惟夫七情內攻六氣外感。加以酒色過度。當凡眺望。或冒熱奔走。宿水洗面。不知自惜。是以病干目也。分而言之。眼皮上下皆屬干脾。皮紅濕爛。脾火上蒸也。左右皆屬心。皆肉綻紅。心火上炎也。四圍白處。皆屬干肺。白有紅筋。肺火上騰也。瞳外之輪。皆屬干肝。兩輪腫痛。肝火上冲也。輪內之瞳。皆屬干腎。兩瞳昏痛。腎火上升也。總而言之。皆以肝為主。肝為相火。相火一動。諸經之火從之。而痛斯作矣。然又有視瞻多淚痒。不可忍者。風也。風而痛斯作矣。然又有視瞻多淚痒。不可忍者。風也。

其

動肝火吹噓鼓舞故連睇不吉所以多淚者淚<sub>者</sub>肝之液風行則水流故也其所以痒不可忍者純于風而無火但但痒而不痛也又有瞳子散大而無光者腎虛也腎水不足無以滋養肝木肝木無力不能收斂英華故散大而無光也又有視物昏花者氣虛也乾枯少潤者血虛也蓋明喜暗者虛極也眩暈不足者風痰雍也眼眶脹痛者肝氣盛也醫者審而治之有火則馳火有風則散風氣虛則補氣血虛則補虛風痰壅則定風去痰肝氣盛則抑風順氣而凡<sub>ノ</sub>是目疾又皆以養益為要此其大法也

## 藥例

眼皮紅爛以浮脾火為主君以煅過石黑以茲熟大黃黃連白芷升麻蓮翹生甘草與四物湯同煎○兩臂肉線紅以浮心火為主君以黃連佐以石蓮赤茯苓連喬告日升麥冬燈心與四物湯同煎○白上有紅筋以浮肺火為主君以黃芩佐以山梔連喬黃連升麻橘甘節生日升與四物湯同煎○兩輪腫痛以浮肝火為主以黃連龍膽草佐以柴胡青皮決明生甘草連喬升麻與四物湯同煎○瞳子昏黑作痛者以浮腎火為君<sub>ト居ス</sub>澤淳黃柏佐以黃連連喬升告日升與四物湯同煎○連睇多淚作痒者以疏風為主君以防風荆芥佐以薄荷紫蘿

黃連升麻生甘艸與四物湯同煎。○瞳子散大無光者以補虛收斂為主君以五味佐以黃柏天麥門冬與四物湯同煎。

○視物昏花以補氣為生君以四君佐以四物加升麻黃芩木賊甘草花之類乾枯少潤以補血為生君以四物佐以天麥門冬黃連連翹升麻生甘艸人參黃柏之類。

○黃芩大棗之類。○眼眶脹痛以柳肝順氣為生君以黃連佐以青皮柴胡艸决明龍膽艸生甘艸與四物湯同煎。

○頭眩不定以定風去痰為生以天麻半夏佐以黃芩柴胡黃連。

黃連升麻甘草與四物湯同煎。○統治一切眼疾四物湯。

為主加柴胡升麻以引經防風荆芥以散風黃連連翹生甘草以消火艸决明青皮龍膽草以抑肝枳殼蘿蔔梗以順氣蜜蒙花木賊以酸鴉甘草薄荷以清頭目任意加減用之。

○膏子藥點諸般眼痛以黃連不拘幾副洗極淨用雪水或黃梅雨水煎極濃去渣澄清成膏子加熟蜜人乳羊膽汁調和晒微乾捏作餅子用新井水磨點。

○散子藥點諸般眼痛以風化硝白硼砂硃砂冰片水晶珍珠琥珀等分一為極細末和人乳汁点之。○風化硝必冬瓜上生者為妙用秋後冬瓜一牧功去蓋剗去瓤將朴硝一窠其中仍以蓋蓋之用竹釘住將稀糞細繩絡。

袋之掛當風處月余其皮上自然生出鎗硝以鷺翎刷下入藥必以此為君方妙○丸子藥治一切目疾當飯為君川芎芍藥生地為佐加黃連升麻共為細末入生羊肝同搗極和又晒乾為細將羊膽汁與蜜同煉丸如桐子大者空心服一半如棗豆大者午後服若有痰姜湯下有風紫蘿蔔湯下氣不順青皮湯下有翳木賊湯下眩暉天麻湯下心膈熱燈心湯下忌蘿蔔油麵及蔻氣蔻血之物大抵眼科中用四物湯取其入于血分以養肝也而四物之中又必多用當飯乃為得法醫問者宜知之

○喉痺 喉者一身之關隘也閉而不通則道路阻絕飲食難下死生係焉使不蚤治則不救矣而喉痺之症惟纏凡尤急乳蛾次之若左右皆乳蛾是示纏凡也纏凡云者喉中皆纏累微有一線之通乳蛾云者腫處如蛾形猶有可通之路要其致病之繇皆繇平日感受風熱積之既久留于上焦一時未免乘機而動或醉後而重醉勞後而復勞動其相火相火一熾而平日所積之風熱一齊而起痰血騰湧如潮之至結干咽喉外不得吐內不得下為腫為痛苦楚呻吟饑不得食渴而不得飲煎劑半難奏功丸散安能施効

病勢已迫，將立而視其死，與必須用刀針以決之庶可洩其毒，而救其勢，然後治之。以藥乃可愈耳。

藥例 喉症口噤，不開血自而入，宜尋經絡刺之。惟刺少商穴，在指爪甲內邊去爪甲如韭葉許者是也。不分男女左右，兩手皆刺，血出即寬，蓋此穴乃手太陰肺經之穴，直通咽喉，故也。其針用三角彎葉遍薄者，取針冬之針也。○若患人畏刀針者，急分開兩邊頭髮，但猝住頂髮一抱盡力拔之，其喉即寬，亦要法也。○喉閉不通以巴豆烟通之，其法用粗帛數重，一頭以巴豆末攤干上，一頭不用巴豆，緊卷作一炬，長二寸餘，將有巴豆一頭點火隨吹令滅，其無

○巴豆一頭令病人含在內口，使一人對火輕吹之，令烟透喉中，立破膿血而即寬矣。畧寬，烟透即取去，不然令人作鴻。○纏喉風雙乳蛾絕妙立驗，方用榆樹上出過載毛窠一個，剪其左手左腳甲右邊乳蛾，剪其邊手甲足甲，若雙乳蛾，左右皆剪，用食鹽少許，煅過為末，吹入患處，以手指拍其後項，視其患所在，左指左在右，右指右，兩邊皆患，兩邊皆拍，即時破潰而瘀血並出。○或用蜘蛛一枚放在小銷銀罐底，以明礬填入煅過為末，吹在患處，立寬以蜘蛛能截能擒也。若有五色遍身者尤妙。○喉症輕者不必用刀針，亦不必用前藥。

但用白硼砂燈艸灰風化硝黃柏青黛水片為細末，以蘆管吹入至嫩燈艸最難燒一燒即過安能得火，必緊之禁作一把令其堅實塞入罐內固濟煅之罐紅為度待冷取出方有存性黑灰也○或用青魚膽煎以膽礬入其中線紮其口懸于當几處陰乾為末，遇患者以雞羽蘸藥點喉中即大吐痰血而寬○喉症煎劑以玄參為君桔梗甘艸黃芩蓮翹黃連薄荷山豆根之類為佐加燈心一錢抱煎服之有痰加竹瀝有血加涎汁而半夏生姜之類絕不可用也

○齒痛 齒與牙同類而異名齒者內床也牙者外版也內床

能嚼而外版無為能嚼則恒勞而無為則恒逸恒勞則易傷恒逸則無恙故痛多在內床而罕及于版也味之辛酸氣之厚薄質之堅脆性之冷煖一咀嚼間而飲食之毒流滲于齒縫其有餘物些少偶軋其中未能即脫者又于當凡處剔之至甚有剔傷出血者幾何而不為致病之階也故齒痛之病凡痛居多凡入于內即時脹痛痛連頰頤咀嚼難合此人之所最苦者也而凡痛之外又有火與蟲之屬焉風從外得火自內生而虫又火所化也何以言之蓋齒者骨之苗腎之餘也而齒根之肉當縫之深處則屈于足

陽明胃之經今之患齒痛者豈真齒之痛耶齒堅尤甚于骨血脈筋乃物之至頑而木者何痛之有痛之所以所在則在于齒根之肉當縫之深處也以陽明有火熱蒸于胃胃家受熱上通于齒故其痛也必臭穢難近根肉深赤齒縫流血而味似鹹名為牙宣而多糜爛此得之于胃火而成者也其或痒或痛或大痛難忍之際又忽然止而如恙者非屬于風非屬于火其蟲之為蠹乎然是蟲也又何從而生之必有些頑食物留于齒根為火蝦煉藉血氣而成也嚙其齒則齒碎嚙其肉則肉疼其或不嚙而微動則肉痒此矣痛之

所以異凡與火也或有不痛而焦枯脫落者非胃熱也乃腎氣衰弱不能其根也是以老人齒多疎豁而少壯者無恙焉觀于此則可以施治矣又云上齦屬足陽明胃嚼而不動下齦屬手陽明大腸動而不休

藥例 風入齒縫張腫作疼宜以防風為君猪牙皂角製升麻白芷薄荷甘草為佐挾熱加黃芩黃連煎服又用青鹽煅過淬竹瀝中取起条乾又淬又条每青鹽一兩收盡竹瀝一杯為度碾為末擦痛處血水出即止○或牙皂一錢冰片二分射香一分點入齒縫其痛立止又胃火上升真齧齧作痛齒根紅紫宜以煅過石羔為君

白芷升麻竹茹黃芩黃連酒蒼大黃甘草為佐挾風  
加防風荆艾薄荷牙皂煎服或加竹茹一團細茶一撮  
○又用朴硝提淨煅過二兩白芷細辛各三錢黃柏三  
錢為末登上洗面時擦之或用煅過朴硝鐘乳石等  
分少加冰片射香為末揩入痛處立止○患牙作疼  
以雄黃蟾酥花椒射香等分為末以東肉鴉成膏  
拌藥丸如黍米大塞一粒于痛處其蟲皆化為水而  
○齒縫中出溢不止以竹茹四兩醋浸一宿少含之  
不過三度其血自止○或用蒲黃燒灰用飛鹽擦之  
或白礬煎湯含漱立止○牙疼不可忍欲取落不必  
用

用手惟以蠅鳥畢搘各半西川椒細辛各一兩為末每用  
少許揩在患處内外不過三四次自落○齒根動揜欲  
落用生地黃當歸等分同煎濃汁漱之其齒自牢又用  
黑鉛鎔開以新柳芽投入炒之背成灰待冷竹師去活鉛  
研細朝夕擦之最能固齒○一切牙疼以蛤蟆肉如葵菜  
者搗取汁和好醋含漱其疼立止○或用草麻子五六  
枚牧射香少許蒜鬚少許燒夷少許和搗丸如棗核  
大綿裹塞耳內○或用石羔白芷黃芩竹茹細茶升麻  
各二錢煎服立効

○附口舌口舌生瘡咽喉腫痛用提淨朴硝半斤聽用先將

蒲黃五兩薄荷一斤水五升拌勻浸一晝夜入鍋內加水五升煎至一斗以布去粗澄清又入鍋內慢火熬成膏取出放大碗內將硝投膏中重湯煮化取起露星月下凝結成冰微乾入青黛二兩共為末以絳囊盛之懸當風處愈久愈佳每用一錢研細搽痛處良久吐出痰涎如喉痛吹一字于患處立効兼治熱痰吐血火丹等症○口瘡舌爛以細辛黃連等分先以布巾揩淨患處將生姜極薄片蘸藥末兩邊干口內噙之呴汁不妨常噙一斤○又方將附子為末醋調男左女右貼脚心示妙○凡舌病雖皆屬太陽不可純用寒藥必兼辛散乃能奏功

○瘡瘍經曰諸痛痒瘡皆屬火則瘡瘍之疾非外得也而昔人列之為外科者以形症在外非若內症之無形可見也然外所成內所發未有不繇臟腑而出者其可視為外病而忽之乎瘡瘍之中瘧症為甚而大疔之毒尤甚于瘧症故治大疔者十二治二治瘍者十治其五六治瘍者十治其八九惟毒有淺深故治有難易耳果何以辨其瘧症與大疔也哉示視其腫之高下地之廣狹脉之浮沈而已蓋瘡者壅之義也氣血為毒所壅瘀而不行故發而為瘍也其初發之時必酒淅惡寒而身微熱多生于背與頸在背之上部或右或左為上搭手在背之下部或左或右為下

搭手トス以其手之可搭處トガタ故俗以名焉其在背之中心當肺  
愈之處者謂之正發背トスル生于頸上者謂之對口瘡トウコウナガ之  
上下搭手為左毒也凡瘡皆微然トシ而腫高其勢高大其根  
不甚深乃六腑之所發トスル從乎陽也瘡者阻之義也氣血  
為毒所阻滯而不行故發而為瘡也其初發之時亦酒漸  
惡寒先覺麻痺如瘡癟之狀按之內實半權ハーハン不能動  
示多發于背腰肩隅之間及小腹胸旁其發于肢足  
間者名附骨疽焉凡疽腫不甚高勢不易大而其  
根反深惟發背心及腿足者為最重乃五臟所發從乎  
陰也疗者釘之似也猶釘之在木拔之不能出挫之不能動

其根至深其毒至寧其頭至硬其初發之時反不知痛痒  
但覺麻木外雖ハリ如麻而裡則如瓦及其勢盛則痛苦異  
常應心入膽而不可忍乃五臟六腑之火煅煉已久併合  
于一處而生者也多見于面部骨節之間而究其毒之所從來多錄飲食服餌之中經曰膏梁之變足生疾  
疔凡肥甘厚味炙燭煎熬之物最能助火嗜味之人恣  
供口腹而又醉之以酒勞之以色脾土于是干燥烈腎  
水于是干枯竭積之既久流于五臟布于六腑火鬱  
而不敢乘其氣血所虛之處而發之根抵于內而煩熾于  
外其毒尤甚于鴉鳥試割其肉以飼雞犬竟見其斃

此大疔之所以多死也。若大似疔而非疔者，則但以腫毒治之，而無大害矣。然三者之脉何以辨之？蓋浮而數者，毒氣在表，故知其為癰；沈而數者，毒氣在裡，故知其為瘍。若沈而又沈，數而弦急者，必疔也。○此皆有形之可見，而治之難易猶可因其症而施之。至干腸瘍、腹瘍、肺瘍之類，皆為內瘍。其狀與癰痕、痞癧無異者，苟或以為內科之症，而進以削堅破結之劑，三移蓬木、阿膠之類，所治亦其所患幾何？而不損人之命也然。必何如而可以知其為內瘍耶？蓋內瘍之症體膚甲錯，而緊急如版，按之有塊，而根則堅牢，外無紅腫之色。

內多疼痛之苦，身雖無熱而脉氣反數。經曰：脉數身無熱，內有瘍也。若夫癥瘕痞癧，則豈有此等之症與？脉此特論。內瘍之大畧耳。而肺瘍、腹瘍、腸瘍之狀又何如耶？蓋肺為五臟之華蓋，其位最高，而瘍生干肺，則上膈滿悶，口吐膿血、腥穢之氣不可近。火其始得于肺，瘍不治，故結而為瘍也。腹居中宮，脾胃之位也。而瘍生干腹，則中脘併結，騰々而痛，飲食減于平時，惡心生于飲後，小便短流，覺惡寒者是也。至于腸瘍，雖在于腸，而實係于腸。其為病也，盤腸紋痛，內氣交攻，而不能通暢。生于干小腸，則小便不利。

或反深于大腸以作鴻生于大腸則大便閉塞而糞或從小便出其出也痛楚非常欲死不死欲生不生故患此瘡者多死診其脉則弦數而芤見于寸口則謂之肺瘡見關部則謂之腸瘡腹瘡脉經曰寸芤積血在胸中關內逢之腸裏瘡此之謂也觀之則可以辨三者之瘡也大法瘍瘡之在外者初發無如一灸艾烟一透其毒立散卷六至六七日則不可灸矣毒之淺者點之毒之深者決之毒之尤深而針刀所不及者則烙之味成膿則用化毒之劑既成膿則用托裏之藥膿既潰則一干補而已矣若夫瘡之在內

者艾烟不能入刀針不能加則惟以化毒等藥令其膿于大便中出亦庶乎其可生也此皆難治之症故歷言之其餘毒吾亦何暇于遍論耶

藥例背上瘡疽屬太陽經未成膿之始宜解毒散以羌活為君防風紫蘚獨活金銀花當歸川芎蓮翹殼全蟬殼皂角刺川山甲白芷甘草為佐加葱頭煎服送下蠅礬丸百粒凡瘡瘍皆治而反用官桂者何也蓋氣血得寒則斂得熱則行故以為血導使毒氣自內發外不停留中也此特其總方耳然在上在中在下皆各有引藥如

上搭手則加升麻，下搭手則加酒炒黃柏，其對心者，則加大劑麥門冬以護心，當肺俞之處者，則桔梗玄參，要當以意參之。○瘡疽已潰，以大補氣血為主，黃芩當取二味為氣血之君，佐以人參茯苓甘草川芎芍藥地黃為佐，加糯米一撮，大棗十枚，煎服送下。肉丸凡瘡瘍補創禁用白朮、白朮雖補大能作膿，故不用也。惟痘科不禁。○蠅礬石丸黃蠅十兩，熔化入飛過明礬石末五兩，攪和投水中丸如菜豆大，每服百丸，大能護心，使毒氣不入，即以前菜送下。○長肉丸黃蠅一斤，熔化入乳香沒藥血竭末。

各二兩，象牙末四兩，搗和投水中丸如菜豆大，每服百丸一日二服，即以前菜送下。○頭癰近喉，毒氣畧入，即為不救，尤其可畏之甚者，必半決，速之方能救療，以羌活為君，升麻玄參，桔梗白芷，天花粉瓜蔞仁，黃芩，金銀花，連翹，甘艸，皂角刺之類為君，瘡潰後方，可施補而示不可用峻補之劑，以其近干喉，恐生痰閉塞也。○瘡疽圍某處露其頭，而四圍紅腫之外，無不塗之，使毒只從頭上出，宜以人中黃為君，大黃五倍子，小粉灰白芨白蘚黃柏，寒水石，射干為佐，共為細末，好醋調傅，甚者以人中黃白益母草等分為末，將草麻子肉數粒搗爛，加生蜜或雞子清調傅，其痛立止。

○諸腫毒初生下部者可一下而愈以瓜萎半個連皮搗碎槐花三錢大黃三錢煎服得快利其腫立消此方治橫痃及乳瘡最妙乳瘡加橘葉橫痃加黃柏分饑飽服之○附骨疽在富貴者多是厚味多燉及酒後行房流毒于陰經所致其在旁苦之人必常乘酒入水血瘀于骨節之間故耳若未成膿宜大劑牛膝黃柏為君作以當歸梢川芎赤芍茱萸生地獨活皂角刺白芷金銀花之類加官桂附子為向導水酒煎服已成膿者宜烙之既烙之後而加以調補可也○或當歸半兩甘草二兩山梔十二個木鼈子一個為細末每服五錢酒調服○疔瘡

之毒至深必拔其疔根而後可生用蟻娘一個去翅足同硯砂五分白矾三分共搗為丸如赤豆大先以三棱針刺瘡約深幾許將此丸納入以頰簪捺下須臾大痛皆變作黃水而出然後以野菊花搗汁一盞和酒服之一日連進三服盡醉為度再以一味人中黃為丸日夕好酒送下○諸毒瘡無名者急以乾桑葉粉艸瓜萎當歸榆樹根皮各半兩生姜七片葱一把酒煎一碗熱服仍飲酒大醉睡覺即安○代針膏治惡瘡不用刀針二點即破瘡大者以筆蘸膏畫為十字其瘡自逕開又干紅肉上畧畫之即潰出膿矣用礆酒二碗入硯砂五錢

煎至一碗，入天明子石灰一塊，待化過再熬，至乾，入白砒末三錢，仍入好醋研和收貯器中。○瘰癧腫硬疼痛，又不癢，用貓頭蹄骨一具，酥灸黃為末，昆布海藻酒洗去鹽水，晒乾，各二兩，連喬黃芩、金銀花、川山甲、皂角枳殼、香附各二兩，用醋煮乾，為細末，將玄參煎膏為丸，如桐子大，每服七八十九日，三服以姜汁三匙調入好酒下，能收全功。○或用丁子五十粒，班蝥十個，射香一錢，為末，以鹽豉五十粒，湯浸如泥，和煎藥丸，如菉豆大，每服五六丸，食前湯酒送下。日進三服，至五七日，外覺小便淋瀝，是藥之功也，便下如青筋薄膜之狀，是病之根也，忌濕麪毒物。○又

方：昆布海藻當歸連喬乾葛石膏夏枯草煎服。○肺癰喘急，坐臥不安，以桑白皮剉燒，訛其亭歷隔紙燒，各二兩，為粗末，每服五錢，水二盞煎，七分頓服，以利為度。○或用一味，五倍為末，稀糊為丸，如米大，自滾湯下一二錢，如欲吐心畧嚼，生姜即止。此藥能長肺肉，去肺膿，亦治治肺痿，調理方用天花粉一兩，桔梗三錢，枳殼二錢，黃芩二錢，半甘草一錢，金銀花一團，桑白皮三錢，水二盞，煎一盞，頓服，須臾吐膿血為効。○腹癰，腸瘻以出過，贊疎爾等，燒灰，每灰多少配大黃川山甲牙皂多少，共為末，酒調。

下三錢膿血皆從大便出其未成膿者服之其毒化為  
黃水浮下兼治瘍飲停飲肚腹臍脹○或用牛  
皮膠投酒中煎濃汁送下大乙膏丸百粒一日二服  
○大乙膏方玄參白芷當歸赤芍藥肉桂大黃生  
地各一面為粗末用麻油二斤浸十日入銅鍋中煎至  
焦黑去粗再熬滴水不化為度入黃丹一斤再  
煉成膏收貯器中此藥可貼可服兼治婦人月  
水不通○灸腸瘻法以小艾丸一條兩肘尖銳骨上  
十四壯膿從大便出以此法灸之虛瘻初起能令自  
消○廣瘻十貼收功每貼冷飯團三四切片水四碗

煎二碗去粗入羌活獨活白芷連翹苦參黃連川山甲當  
歸川芎甘草蒼朮防風荆芥蟬退各二錢煎至一碗去粗  
入廣膠三錢煎一盞和好酒服之外用輕粉為君硃  
砂雄黃蘆眼子石為臣為細末將黃蠅焰開投前藥攪  
和作膏藥貼之如膏藥大硬加樟腦少許自稠若不  
用黃蠅為膏草用前藥加冰片數克兼治下疳甚効  
○膀胱內廩外廩大小濕瘻用水飛黃丹血竭寒水石各  
一兩為細末將黃蠅六兩猪脂三兩慢火熔開入藥調勻傾  
水中依瘻大小捏作膏藥先將花椒葱白煎湯洗淨拭  
乾貼上以油紙蒙之輕乞禁住貼一日再洗滌翻轉貼

之兩日換一膏半月即愈或用黃柏黃連各五錢好醋一碗煎至半碗去渣入冬青葉五六片重々浸慢火者至乾擦起停一夜每一葉畧移輕粉血竭末些貼之至妙或用烟膏二兩飛礬二錢寒水石煅過三錢黃柏醋煮三錢為細末香油厚調塗瘡一分厚以油紙蒙之輕々紮定痛勿撓痒勿搔直待其乾不覓痛痒輕去其痂已全好矣○天泡瘡小兒常生之瘡勢一盛然有至死者用香爐蓋上烟脂三錢黃連二錢青黛二錢冰片二分為細末雞子清調或猪膽汁調敷甚妙○膿泡癰瘡用烟膏一两硫黃焰硝各二錢飛礬四錢猪牙皂角二錢共為細

相本草

末猪脂同研如泥先以葱姜花椒湯洗浴然後敷藥三四日即愈○或用黃丹雄黃飛礬大風子牙皂輕粉蛇床子露蜂房蛇退花椒等分少加白矾射香研細末相油為九遍身滾之○上部癬瘡沿及頭面痒不可忍者杜大黃根生葱等分搗極碎生地紅花亦等分以醋浸爛搗如泥加枯礬又同一處搗和以生布包之擦患處先以川山甲刮碎擦之待乾再擦三四日即先不再發驗○遍身頑癬用斑蝥去翅足二錢川槿皮五錢飛礬三錢大風子二錢輕粉二錢白矾五分為細末醋調敷之而癬之初癢者不必用此重劑也宜以陳醋一碗入川槿皮一兩牙皂半兩大風子三錢煎至

半碗去渣澄清入明礬皮硝各五錢又煎至一酒盞和以禿  
菜根自然汁生姜自然汁各一酒盞先以川山甲零刮微破將  
筆蘸塗之不幾日即愈○陰囊濕爛黃水如流或痒或  
痛者名湿陰瘡用細茶為末加冰片少許再研極細移上  
即愈○陰囊爛破兩核突出痛苦萬倍先用桑皮線一  
條將甲蓮竹汁浸一宿晒乾樣軟以牛輕々納進兩核抨  
住囊皮縫之用血竭龍骨象牙屑共為末以桑樹汁濃  
塗縫處○內服之剉用黃芩為君人參白朮黃柏橘核澤  
浮金銀花獨活白芷連翹甘草為佐煎之即以此藥空心送  
下蘋礬丸一百粒半月可愈○一切惡瘡死肉不消成紫黑

色突出高起臭穢不可近以鳥梅肉燒灰為末移上立  
消○或用白礬二兩黃丹一兩硇砂三錢為末鍋內炒乾  
為細末移于膏藥上貼之○或用巴豆霜一錢五灵脂  
半兩阿魏黃丹各二錢飛礬一錢為細末以糊為錠子入  
瘡內其肉自消

卷之三

五言詩

七言

八言

九言

十言

