

Kodak

LICENSED PRODUCT
Black

© The Tiffen Company, 2000


KODAK Color Control Patches

Centimetres

Cyan Green Yellow Red Magenta White

Blue

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19



• 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3
JAPAN
TAMIA

古方節義卷之三

城州 伏陽 河陽 駕定

門人 王州 固 先繼

桂枝湯

太陽中風

汗出惡寒

頭痛

身無熱

汗自出

惡寒

頭痛

身無熱

脉浮

五味酸

水七升微火

服已須臾

大病

脉微

微似有汗者始佳

不更衣

少病

復服之可

其頭半日

汗出

脉微

身無熱

脉微



古方節義卷之中

城州 伏陽 内島保定 著

門人 土州 岡 瑞鑑 校

○桂枝湯 太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出嗆々亞寒淅々惡風翕々發熱鼻鳴乾嘔者主之

桂枝 三分 芍藥 三分 甘艸 二五分 生姜 三七分半 大棗 十二枚

右五味㕮咀以水七升微火煮取二升去滓適寒溫服一升
服已須臾熟稀粥一升以助藥力溫覆令一時許通身熱
々微似有汗者益佳不可全如水流滴病必不除若一服汗
出病差停後服必不盡劑若不汗更服依前法又不汗後服
當小促其間半日計三服盡若病重者一日一夜服周時

觀之服一劑盡病證猶在者更作服若汗不出者乃服至二

三劑

傷寒論中太陽中風太陽傷寒ト云アリ 中風ト云今世上ニ
云中風非ズ風ニ傷ラレタルト也傷寒ト云ハ寒ニ傷ラレタルト也
仲景風ニ傷ラレタルト寒ニ傷ラレタルト辨別明也又風ハ衛ヲ傷
リ寒ハ榮ヲ傷ルト云アリ此榮衛イハ委ク云ハ長キト也先氣血
イト思フヘシ衛表ヲメグリテ腠理ヲ主トリ表ヲ守ルモノユエ紫
表陽ト云風ハ陽邪也ソレユエ風邪ノ人ニ中ル時ハ先表陽ヲ傷
ル也榮ハ皮ヨリ内ヲ順ルモノニテ此モツテ云ハ血ノト也寒ハ榮ヲ傷
ルト云ハ寒ハ陰邪ナルユエ表ノ陰血ヲ傷ル右云通り風ハ表陽ヲ傷生
卫皮膚ノ腠理疎ニナリテ自汗出ルナリ又寒ニ傷ラレタル時ハ

表ノ陰血ヲ寒邪ニテ閉塞グユエ無汗發熱スルナリ初本
文ノ陽浮而陰弱ト云ハニ指ヲ浮テ候フニ陽トレ沈メテ
候フニ陰トス陽浮トハ脉必外ニ浮フ此本陽性ハ熱スル
モノ故ニ發熱スルナリ陰弱ハ内弱ノ内ニ守ルアタハズ陽
躁ニソ外ヲ固ムルアタハス故ニ自汗出ル也嗇ミハ不足ノ貞
ト注シテ物ノ足ヌヤウニ惡寒スルトソレヲ形容ゾ云也漸
々ハ酒淅トツビイテ酒ハ地ニ水ヲソグイユエゾウクト風ヲ惡
キヲ云翕々ハ鳥ノ羽ヲ以テナヅルゴトクホツグト發熱スル
ト也鼻鳴乾嘔ト云ハ風邪皮毛ヲ傷ルユエ肺氣通利セ
ズソグスクト鳴ト也嘔ハ風邪冒中ニ鬱スル故ニ冒和セズソ
嘔スルナリ此ハカクアルモナキモアリ定マリタルトハナシ

太格ヲ云タルモノ也論中尚考エ見ルヘシ初傷寒論中ノ
初ニ脉浮緩ト云ヘアリ風邪ニ傷ラレタルモノナハ緩ト云脉
アルヘカラス浮數浮盛ナルベシ然ルニ緩ト云ハ畢竟傷寒ノ脉
浮緊ト云ニ對ト云タルモノニシテ緊ノコトクニヒンクト指ラハシク
如クセハシクナキヲ云風ニ傷エタルモノユエ惟風ノ中ルガ氣味
惡クアルモノ也食ニ傷ラレタル者ノ食具ヲ惡ムガ如シ此症
汗セズトイヘ自汗出ル虛邪ナルユエ傷寒ノ如ク強キ發散
ノ劑ヲ用ヒス但肌ヲ解スルト云テ邪氣ヲ桂枝ノ辛溫芍藥
ノ酸寒ヲ以一散一收ノモメ合ノハジミニテ汗發スルナリ又
陶節庵此ニ恙活防風川芎白朮ヲ加テ疎邪實表湯ト名
付テ桂枝湯ニ代用ヒヨト云此ハ桂枝湯ハ小劑ニテ表散ユル

キト思フテ恙活防風ノ類ヲ加ヘタルモノト見ユルナリ此小刀
細工ニテ仲景ノ桂枝湯ノ方意實ニ合点ニカヌユエ也又
本朝ニモ名古屋氏ハ本方ニ蒼朮半夏茯苓乾姜ヲ加ヘテ
和解湯ト名付テ一切發散ノ通劑トセリ此モ小刀細工ニテ
從ヒ用ユヘカラス凡風邪表症ニ此桂枝湯ヲ服ノ右後ニ
云通リニ粥ヲスラセテ蒲團ニテモ被リテ汗ヲ發スヘシ
此恙活防風ノ及ブ所ニ非ズ桂枝湯ハ柔カナル藥ユエ粥ニテ藥
力ヲ助ルナリ又風ニ傷ラルヒ寒ニ傷エルヒ分ズ風寒俱ニ
傷ラレタルモノハ葛根湯ヲ用ユベシ此和解湯ノ及ブ所ニ非ズ
其外產後虛勞泄瀉痢疾或腰痛疝氣偏身疼痛ノ類此方
ヲ以指引進退ノ可用右五味㕮咀ト云ハダ、イロ中ニテ嚥コト

ニテ今ノ刻ト云々也水七升ト云ハ漢ノ一升ハ日本ノ九勺余
リ然レバ七升ハ六合半ニテ此ヲ三升ニ煎ズル時ハ今ノ三合計
ナルナリ初漢ノ一兩ト云ト云々今ノ二錢九分餘リニ當ル今唐
ノ一兩ハ十錢目也漢ノ秤目ノイ色々々紛々トノ知レガタレ強テ解ス
タラズ今其大槩ヲ記ミ先一兩ヲ三錢計トミテ右五味合ソ
和ノ秤ニテ總藥合ノ三十三錢目程ニ當ル外ニ大棗十二枚入
水七合ヲ以三合不足ニ煎ズル時ハ甚濃煎法ニテ此ヲ三分カテ
ハ和ノ九勺余リナリソシラ一度ニ服ソ粥ヲス、リテ右ノ通リ蒲
團ニテモ被リテ汗ヲ取ル此服法ヲ失フテハ効少シ此湯ヲ服
ソ汗モセズ常ニ通リニシテ居リテハロクニ汗不出邪氣去ス也
熱敷タハ敷ケハ小雨不輒トアリテジシト汗ノ出ル也大流ル

ガ如キ汗出ル時ハ反テ邪氣トクト去ラヌト多シソレユヘ水ノ
流滴スル如ク汗ヲ出スヘカラズト云惟ジトクト出ル汗甚宜
シトス初此文ヲ此ハ風濕ノ文段ガ入雜リタリト云ナルホド
風濕ノ所ニモ此文段ガ有故カク云ヘニ以テ見ニ汗ノ一
度ニ大ニ出ルヨリジトクト出ル汗ニテ邪氣快ノ去ルモノ故
必錯簡トハ見エズ一升ヲ服スト云ヘ一合不足也此ヲ飲テ
快ク汗出ル時ハ後服ヲ止ムトアリ甚濃藥エウ如此モアル
ベシ且異朝ノ人ハ常ニ肉食ラスルユ卫脾曾モ厚シ今日本
人ハ常ニ肉食モセズ食少キ故ニ脾胃弱シシテカマウノ濃
太劑ハ飲得ヌ也若是ニテモ汗不出風邪不去時ハ残リ
二升モ用井ヨト云其ニテモ汗不出時ハ半日ノ三時計ニ

右ノ三升ヲ不殘飲ヨリモ也初此兩日ノイハ宜ラ考テ斟酌スベシ猶師傳アリ此兩目ノ割合ノ違ハヌヤウニスベレ只今世上ニテ調合スル所ハ甚小劑ニシテ兩目ノ詮議ハナラヌ也仲景ノ方劑ハ此兩目ノ違ニテ無盡ノ意アリ桂枝湯ハ芍藥三兩桂枝三兩トアリ建中湯ハ桂枝三兩芍藥六兩トアリ又桂枝加桂湯ハ桂枝五兩芍藥三兩トアリ此兩目人違ニテ其方意甚變レリ分量カヘワヌト云モノハ杜選ト云甚ノ也齒川スルニ足ズト云ベレ凡小建中湯黃芪建中湯當帰建中湯等ノ補劑ハ皆此方ヨリ來レリ後世氣血兼補ノ劑ハ皆建中湯ノ意ヨリ出タルモノ也仲景此方ヲ以傷寒論開卷第一ノ主劑トス微意自ラ存仲景ハ百世ノ方祖ト云モ是ナリ

○麻黃湯 太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者麻黃湯主之

麻黃二十九分兩 桂枝二十六分兩 甘艸一三分兩 杏仁七十個

右四味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥取二升半去滓溫服八合覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法按ニ此方專ラ寒ニ傷ラレテ頭痛發熱レ身疼惡寒甚ニ脉浮緊ナルモノ此寒邪皮表ニ鬱閉ノ内榮血凝テ不流ニ因テ無汗身疼ムナリ中風ハ虛邪故ニ發熱レテ自汗出ル傷寒ハ實邪故ニ惡寒ノ無汗モノ也喘スルハ陽氣寒邪ノ為テ、メラレテ逆シテ肺中へ衝上リテ喘スルナリ麻黃ハ皮毛ヲ溫メ發汗寒實ノ邪ヲ去桂枝ハ辛溫ニ麻黃ニ組テハ汗ヲ發スルノ助ト

ナル麻黃得桂枝能發汗解表アラマウカヒタケイハセキハシツノウツクハシツノウツク最甚モモモモ此方發汗第一ノ主劑
タリ杏仁エドヒナ反佐ハシツサニテ能胸膈ウキウカラノ氣ヲ下行スルモノナレバ麻黃桂枝ノ
發スルモノヲ按アサツキヘテ其勢ヲ強ヨククシテ汗ヲ当カタク出サタニ組ミツ入スルモ
モト見エタリ初此方ヲ後人冬ノ正傷寒ニ用ル方ニシテ余月ハ
用ヒズト云此亦僻論カタタガタナリイツニテモ頭痛惡寒發熱甚レク骨
節疼痛カツカツノ無汗者六四時共ニ用ユカラス麻黃湯ノ症寒月六多々夏月六少キ
モト云テ然ルヒ又節庵麻黃湯ノ重劑ナルヲ忍此方ニ
升麻防風羌活川芎白芷カクホウカンホウシロウ加スルテ升麻發表湯ト名付テ麻
黃湯カクホウ易用ル此モ前ニ云通り節庵仲景ノ大意ニ達セザル
ユ卫ナリ凡風寒ニ傷ラレ頭痛發熱等アルニ麻黃桂枝ヲ

用テ風寒サヘ發散スヘハ頭痛自ラ止マタニモノナリ此又川芎白芷
ノ及フ所ニ非ズ且又羌活防風ヲ加ユルハ蛇足カシヌクト云テ蛇足ナク行
モト其ニ足ヲ添タダヤウナモノニテ無用ノト也又春夏ハ麻黃桂
枝ヲ用ヒズソ九味ノ羌活湯ニ易工用ゴト云類此モ小細工ニテ大
匠ノ意ヲ知ラズト云ベシ但シ春夏ノ溫疫ノ如キハ白虎湯柴
白湯或ハ麻黃葛根湯麻黃解肌湯等ノ方選ヒ用ユシ本方ニ
蒼朮ヲ加ヘテ名麻黃加朮湯カクホウカツトウ感カニ偏身痠痛無汗惡寒
或微腫カクシヌクスル者此方ヲ用ユベシ方中ノ麻黃陽ヲ通レ鬱カクシヲ開
キ竅カクシヲ利ス故ニ風腫或ハ氣滯ノ腫ニ用之テ皮表ノ水氣ヲ追
陽氣ヲ宣通スル時ハ腫自ラ退クモノ也又太陽ノ中風傷寒初
桂枝湯ノ類發散ノ藥ヲ用テ血血スルモノハ邪自ラ解セントスル

ナリ其血流ル、モノハ暫クノ間ニ解ス。若血不流、モダクト散セ
又モノハ此汗スベキヲ汗セズ。鬱熱經ニ迫リテ、衄血ヲナス也。此時
ハ麻黃湯ヲ用テ汗スレハ、衄血自ラ止ムベシ。又金匱ニ本方ノ
桂枝ヲ去テ名還魂湯。テ惡氣不正ノ氣ニ感ソ卒死レタル者
用ユル也。若口噤テ不開時ハ、齒ヲコジ開テ用ニヨトアリ。

○桂枝二越婢一湯 太陽病發熱惡寒熱多寒少、脈微弱
者、此無陽也。不可發汗、宜此方。

桂枝一兩
大棗三株

芍藥
麻黃十八銖

甘艸八銖
石羔四銖

生姜三銖

右七味㕮咀以水五升煮、麻黃一二沸去上沫、內諸藥煮取
二升、去滓溫服一升。本方當裁為越婢湯。桂枝湯合飲一升。

今合為一方、桂枝二越婢一

按ズルニ此方風寒俱二傷エテ、又其上ニ濕ヲ兼タル者ニ用ル
ト見ユルナリ。本論ニ發熱惡寒熱多寒少シト云ハ此表熱多
脉微弱ナル者ハ陽氣不足ナリ故ニ此方風濕ニ感ソ偏身疼
痛シテ少浮腫アツテ脉微弱ナルモノニ能應ズルナリ。或蒼朮
ヲ加ヘテ宜シトス。又此方桂枝湯ノニ分ヲ以テ鬱熱ヲ和ス且
桂枝ノ一ツ分ヲ以テ鬱熱ヲ和ス且石膏ノ寒涼ヲ以テ曾ノ鬱
熱ヲ和スル時ハ熱化シ津液生ジテ脾氣發越ノ汗不出能
風邪ヲ散ジ又能小便ヲ通ジ痛止、腫モ亦自退クモノナリ
數用テ効アリ。

○葛根湯 太陽病頑背強几々無汗惡風者主之

葛根四分、麻黃三分、桂枝三分、芍藥三分、甘艸三分

生姜三分半、大棗十二分

右七味㕮咀以水一斗先煮麻黃葛根減二升去沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法

此方太劑ナレバ水モ多ク用ル也先葛根麻黃ヲ煎シテ二升ヲ減シ上沫ヲ去ドニ此掘立ノ藥ニテ藥氣強ク飲難キニ止上沫ヲ煎シ去テ其後總藥ヲ入ニ升ニ煎シ詰ルナリ

按ズルニ此方ハ太陽ノ病未戰或頭痛惡風惡寒頂強等ノ症アルニ用ニ表症ニ其脉浮ヲ帶テ已ニ邪陽明經ニ入ニトスル故ニ渴身熱項背強或下利或嘔スルモアリ皆此方ヲ用テ太陽ノ

表ヲ發散シ葛根ヲ以テ陽明ノ邪ヲ除モノ也右ノ通先此方ノ的症ト云ヘシ凡ミハ頸背ノシリテ項ヲ伸シトスル形ヲ云先何デモアレ此方傷寒時疫一切ノ表症アル者ニ主トシユベシ無汗時ハ麻黃湯有汗時ハ桂枝湯ヲ用ニヨトアリテ麻黃湯ハ發散ノ強キ剤ニテ表邪鬱閉ヲ開ト甚シ故ニ寒邪皮表ヲ閉テ汗不出者ニハ麻黃湯又發散セザレ庄素ヨリ汗ノヂシクト出ル者ニハ柔ナル桂枝湯ヲ用テ發散ス是ヲ肌ヲ解スルト云又麻黃湯ハ發散ノ瀉劑桂枝湯發散ノ補剣ト云ヘシ然ニ今一切ノ外證傷寒時疫ノ類發散シト欲スル時麻黃湯ハ強スギ桂枝湯ハ柔ニシテ發散手元キコトアリ故ニ切ノ表症無汗有汗ニ拘ハラズ齊ク此方ヲ用ニテ

發散スベシ方内芍藥葛根涼劑アツテ麻黃桂枝ノ辛熱ヲ制ス故ニ麻黃桂枝ノ能汗ヲ發スルモノモ穩ニテ用ヤスシ或云此方中葛根ハ陽明經ノ藥ニテ邪イ一ダ陽明經ニ不入者ニ用ユベカラズト云是仲景ノ意ニ達セサル人ノ論也葛根桂枝俱ニ表ヲ發シ肌ヲ解シ裏ヲ和スルノモノナビ有汗無汗下利不下利俱ニ用テ發散ノ主劑トナスベレ勿論春夏秋冬ニ不限發散ノ通劑也又或云春夏溫暖ノ時麻黃ヲ用ユベカラズ心熱毒ヲ増シ反テ熱甚シクナリ發班ナド出テ不宜ト云是モ不通ノ論也此節庵が六書ニ惑ヒタルモノトミエタリ今外邪ニテ惡風惡寒シノ無汗ノ証ニ用テ何害之有哉節庵自己ノ臆見ヲ以テ反テ仲景ノ經旨ヲ

乱ル從ニ信ズベカラズ王訥庵醫方集解ニ節庵ヲ叱ルト思ヘ取用ニ是ハ撻ホウテ摩マツルト云モノナリ可笑若亦惡寒發熱口渴甚シキ者ハ此方ニ加黃芩ヨウキン或聖濟總錄ノ麻黃解肌湯ヲ可用芍藥葛根各一兩半甘草杏仁各二兩肉桂半兩生姜五片又瘧疾初惡寒甚シク發熱スルモノ時疫トモ瘧トモ分タザル時先葛根湯ヲ用ヒテ發散スベシ痢疾其初發熱甚者下劑ヲ不用此モ先葛根湯ヲ用ヒテ發散スルヲ宜ヒトス初ヨリ直ニ下劑ヲ用時ハ弦腹痛裏急後重盛サカニナルモノアリ可考○柴胡桂枝湯傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未去者此湯主之

桂枝

三合

黃芩

三分

人參

四分

兩半

甘艸

一二合

半夏

二合六分

半

芍藥一兩半三分 大棗六枚三分 生姜一兩半三分 柴胡四兩八分

右九味以水七十升煮取三升去滓溫服

按此方太陽之邪少陽二傳元故ニ桂枝湯半ヲ取太陽ノ未盡ノ邪ヲ散ジ小柴胡半ヲ取テ少陽ニ欲入心下ニ支結スル者ヲ散ズ發熱微惡寒支節煩痛スル者ハ太陽ノ證也心下支結ト云ハ心下ノ少陽ノ邪全少陽ニ入時八兩脇ノ間ニ塞ガリ滿ル此ヲ胸脇苦滿ト云此ハ全少陽經ニ不入ノ輕症故ニ心下へ支工結也右云通り小柴胡湯ト桂枝湯ト合レタルモノニテ小柴胡湯ハ表裏和解ノ劑桂枝湯ハ榮衛ヲ和スルノ劑故ニ此二方ヲ合レテ表裏ヲ和シ氣血ヲ和順スルノ劑也外邪其初麻黃湯桂枝湯葛根湯

ノ類ヲ用テ汗出後惡寒惡風少止ト云ヘドモ頭痛發熱口渴小便赤者表症未ダトクト不解ノ熱已ニ裏ニ入シト欲ノ或心下ニ支工塞ルモノ此時此方ヲ用ヒテ表ヲ發シ裏熱ヲ解スベシ又一切ノ外邪發熱不涼或頭汗盜汗出者小柴胡湯ヲ用ヒテ不正者此表邪全不去也此時モ柴胡桂枝湯ヲ用エレ此方、裏裏ヲ和スル劑也ニヨツテ感冒傷寒ノ後調理ノ劑トナスベレ其外瘧痢產後積聚癥氣ノ類惡寒發熱アル者ニスヘテ用エベシ又婦人瘀血久滯ニ因テ種々ノ證フナスモノ必可用甚効アリ此証多クハ太便秘結スルモノナリ或ハ耳鳴手足麻痺疼痛ヲナスフアリ此湯ヲ宜トス尤何モ大黃ヲ加ベレ總テ大黃ハ婦人ノ聖藥ナリ後人香附

子ヲ以テ婦人ノ聖藥ト云香附子ハ能^シ鬱氣ヲ開クト云
「庄燥^{サカ}劑ニノ血ヲ乾^スモノニテ殊ニ便祕^ス杯^六甚^ニ不宜^ス不^可」
モ太黃^{サカ}丁味ヲ色々製^シノ大極丸ト名付テ婦人ノ諸病ニ用
ルヲ記セリ又近々回春ノ產前產後ニ用ル回生丹杯モ大
黃ヲ本藥ニノ製^シタルモノナリ其^故ニ產前產後ノ諸證ニ用
ヒテ毎々効^{ハシ}アリ其^内肉桂太黃ト組合セ用ユル時ハ寒熱相和
ノ瘀血^ヲ血滯^ヲ開キ退ツル^ヲ穏^ニ最^モ効^モ也^シアリ
シテ後害^{ナレ}巴豆^ヲ如キハ泻^ソ後熱毒殘リテ害ラナス^ヲアリ
故ニ久レク用ユル藥ニ非^ズ太黃ハ症ニ因テ能^シ應^{ハシ}バ久シク用
ヒテ害アル^ヲナレ尤^ニ用ヒ試^テレルベレ

○小柴胡湯 傷寒五六日中風往來寒熱胸脇苦滿默少

不欲飲食心煩喜嘔或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇
下痞鞕或心下悸小便不利或不渴身有微熱或咳嗽此湯
主之

柴胡半斤

黃芩三分

人參三分

甘草各三分

半夏半升

生姜三分

大棗枝十二

三分

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升
日三服

按ズルニ傷寒、邪少陽經ニアルモノ以此方^ヲ和解^シ少陽
經ハ陽經既ニ終リテ陰經ニ傳エレトスル處ニテ此^ヲ後人半表
半裏ト云中風傷寒ノ邪表ニアル時寒レ裏ニアル時火熱ス
今邪半表半裏ノ間ニアリテ定ニリタル處ナレ是以寒熱往

來スル也若邪表ニアル時ハ心腹不滿邪裏ニアル時心腹脹滿
スル也今胸脇苦滿ト云ハ邪氣表裏ノ間ニアリテ胸脇塞リ滿
或痛フモアリ黙々ハ不詳ナリ此神氣内ニ鬱ソ冒中不和ソ然リ
邪在表食レ邪在裏不能食今邪表裏ノ間ニアリ不欲食ト
云テ必食セヌト云ニハ非ズ邪在表時ハ不煩不嘔邪在裏時ハ煩
滿ソ嘔ス心煩嘔スルハ邪欲入裏時裏氣外工拒故ニ嘔スルナリ是
肝氣不舒ノ内ニ鬱スルユエナリ此皆小柴胡湯ノ症ニメ今テコニ
云テアル通リニアルモ無フモアリテ定マラ又言ニテ或ケト云或
嘔スルモアリ嘔セヌモアリ或渴スルモアリ渴セヌモアリト云フ也
免角トカラ小柴胡湯ハ專ラ寒熱往來スルヲ主トシ用エ仲景小柴
胡湯ノ意ハ略柴桂湯ノ條下ニ見エナリ表邪去テ既ニ

ニ入シスルヲ落入ラサルヤウニ人參柴胡ノ升陽スルモノヲ
以引上ル意ニテ自然一汗出テ邪氣肌表ヨリ散ズ是仲景熱
ヲ涼ス涼補ノ劑ト云ベシ然ルニ此方ニ黃連陳皮枳殼ナドヲ
加ヘ或節庵ガ如ク陳皮芍藥ヲ加ユルモノハ仲景ノ意ニ違
反テ熱不去難治トナルアリ又後世傷寒汗吐下ノニ禁カツ
アリト云テ汗スルトモ吐スルモ下スフモ無症ニ皆此小柴胡
湯ヲ用ユル一云最然リ初發表ノ劑ヲ用テ汗出テ熱不
涼時ハ此湯ヲ用ヒテ表裏ノ邪ヲ解スルフト思フベシ又傷寒
時疫ノ類熱不涼咽渴口燥有汗脉長洪テ數十ルモノ必石膏
ヲ加ヘテ用ユベシ或白虎湯ヲ合ソ柴白湯ト云然ニ只石膏
一味ヲ加ヘテ用ユビ穏スムカラ用易シ石膏ヲ用ユル症ハ發散モ

解熱ノ劑ヲ用テモ自若トノ其熱不涼咽渴口燥舌黃白胎
テ大便難ク其脉洪實ヲ數其上ニ汗アル症ニ的方ト思ベレ
若熱甚シク無汗メ脉細緊ニドカクト至テ急ナル者ニ用ヒ難
レ此證初メ發散ガ足又カ又ハ下地大ニ疲レタル人ニアルモノ也能
々察シテ誤ルベカラズ尤石膏ハ小劑ニテハ効レナシト云汪訥
菴力醫方集解ニモ石膏一兩ヨリ少ク、レテハ効レナシト云ヘリ
信ニ然リニ錢餘或五錢目モ用ヘレ此時ハ柴胡ノ兩目モ小
劑ナレハ八分或一錢六分黃芩六分或八分モ入其餘半夏人
參甘艸大棗生姜モ此ニ應メ用ヒシ且石膏其邪ヲ表ニ送
リ出ヒテ能熱ヲ涼スルモノナリ芩連ノ類性寒苦味ヲ升發
スルト不能反テ其熱不去日久ク連綿トシ壞症トナルモノ

多シ黃連ハ鬱熱ヲ涼スモノニテ邪熱ヲ涼スモノニ非ス初又初
ニモ云如ク未熟ノ古方流ヲ為ス人表邪去テ後熱不涼時ハ尽ク
此石膏ヲ用ヒテ潤^保レ涼スフト覺エテアグナゲモナク用ヒテ太ニ誤リ
人ノ毀リラ受ルト毎々アリ能キ脉一二便ノ清濁通利ノ次第ヲ
考工用ユベシ其眞假ヲ不辨ノ誤リ用ヒカラズサレ正石膏ニアラ
カバ傷寒時疫ノ熱ハ涼ルモノニ非若石膏ヲ恐レテ用ヒザル時
ハ遂ニ其熱不去ソ裏ニ入テ死ス若其意ヲ得テ用ユル時ハ其
効ヲ得ル^ハ舉テ云ベカラズ能々思議スヘシ其外一切雜病寒
熱往來產後產前瘡刺虛勞或耳痛目疼下疳便毒ノ諸證
尽ク此方ヲ用ヒテ主トスベシ總ジテ人ノ病ハ肝膽ニ屬スルモノ
多シ肝ハ發生ヲ主ヒルモノニテ少ニテモ氣ヲ凝スカ氣ヲ傷ル

カスハ肝氣内ニ鬱ノ邪火トナツテ上ニ塞リ或耳鳴目痛或頭痛眩暉狂癇等證ヲナス多シ故ニ小柴胡湯ヲ用ユル症多シト知ルベシ

○大柴胡湯 太陽病過經十餘日反二三下之後四五日柴胡證仍在者先與小柴胡嘔不止心下急鬱微煩者為未解也與太柴胡下之則愈

柴胡半分 黃芩三分 姜藥三合 半夏半升

枳實四分 生姜五分 大棗十二枚 大黃二分

右八味以水一斗二升煮取六升去滓再煎溫服一升日三

服

按ズルニ過經ト云ハ傷寒病付ヨリナ百過冬者ヲ云此症太陽

ノ症少陽傳エテ未少陽ノ證不罷ソレラモハ裏証カト思テ反テ下之誤テ下スト云モノフレデモ變逆セズソ四五日柴胡ノ症仍在者トハ寒熱往來等ノ小柴胡ノ症アル一誤リ下スト云庄小柴胡ノ症アレバ先小柴胡湯ヲ與ヘテ表ヲ解シ裏ヲ和スヘシ心下急ニ滿テ鬱勃微煩ト云ハ惟息短シ苦シキト煩トハワクスルト此少陽表裏均レク解セズ故ニ大柴胡湯ヲ與テ下之此方裏ヲ攻メ表ヲ和スル藥ナリ又按ズルニ此方右ノ通リ寒熱往來胸脇苦滿トテ心下ヨリ兩脇工向テ塞リ滿或嘔吐ナル者ニ先小柴胡湯ヲ用ヒテ熱不涼太便不通メ息短シク其舌黃胎ナルモノ此時太柴胡湯ヲ用ユルナリ此ヲ吳昆ガ名醫方考ニ表症未罷裏症急也トアル寒熱往來口苦ハ表

症也煩ノ太便難ハ裏症也此時此方ヲ用ヒシト云仲景ノ意ハ誤リ下スノ為ニ設ルモノ也サ一正吳氏ノ說モ意ハ同レ道理アリ太便不通煩ストイヘ正頭痛惡寒イタ少ニテモアルカ脉ノ浮丸ノアレハ此表裏不解ト云モナリ其上舌ノ色腹中ノ虛實ヲ考エテ此湯ヲ用ヒテ下スベシ又少モ惡寒等ノ表症ナクノ腹中按之堅ク裏症ニキハナリテ太便不通者六大小承氣湯ヲ用ユルト知ヘシ後人小兒又ハ婦人產後杯ニ下スキ症アル時承氣湯等攻下ヲ用ヒズシテ此湯ヲ用ヒテ下斯時ハ穩ナリス此モ表症スキト去テ裏症ニキハナリタルモノニ用ルハスマニト見定メヌフハ先指扣テスルモアルレ又小兒邪ニ感ジ表症去テ後熱不涼太便不通煩ノ渴スル者ハ小柴胡湯ニ大黃一味ヲ加

ヘテ大柴胡湯ニ馳用ユルト幼々集成ニ見エクリ此モ面白キト見合可用其外瘡熱甚シク太便不通痢疾發熱甚シク裏急後重不止或食傷積聚腹痛ノ類外邪ヲ兼テ表裏俱ニ熱ノ痛不止者此湯ヲ用ヒシ又太陽發熱汗出不解半痞鞭嘔吐下利者大柴胡湯主之トアル此ヲ醫宗金鑑ニ下利ノ下利二字ノ誤リナラ下ル者ニ下スハス、又不利ト改メヨト云是管見ソ甚シキモノ也醫宗金鑑モ傷寒論金匱要略其註解得ギト云ヘ正其正誤ノ内ヲ見レバ彼是鑒說多シ今嘔吐下利スル者内ニ邪熱アツテ嘔吐下利スルユ卫太柴胡湯ヲ用ヒテ其留滯邪熱ヲ下大時ハ反テ嘔吐下利モ止モナリ常ノ輕症ニテ嘔吐下利スルト違スソレトモ其脉其腹ヲ考エテ用ヒキト勿論

也且其腹中脇ヨリ上兩脇一向ニ堅ク満テ按之痛モノ是也此モ下劑ナガバ下スニジキヲ下ニ害ラナス能ニ考エ用ユベレ

○白虎加人參湯 服桂枝湯大汗出後大煩渴不解脉洪大者此方主之傷寒病若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時々惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者主之傷寒脉浮發熱無汗其表不解者不可與白虎湯渴欲飲水無表證者此方主之

石膏三錢知母六錢甘艸二分粳米六錢人參三分

助分

兩分

兩分

合四分

三分

右五味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升日三服此中風ノ邪桂枝湯ヲ服ソ大汗出後不解大ニ煩渴ノ脉洪大ナル者は邪已ニ陽明ニ入津液大汗トナシテ胃中ヲ傷ル故ニ

乾燥ス此方熱ヲ涼シ津ヲ生シ煩渴自ラ除ク又傷寒ノ病若クハ汗シ若クハ吐シテ七八日熱不涼表裏熱ニ時々惡風スル者邪熱表ニ在テ未解又口大渴ソ舌上乾燥ノ煩亢者此結熱在裏表裏保ニ熱ス白虎能外肌熱ヲ解シ内裏熱ヲ涼ス人參ヲカルモハ汗吐下ニ因テ後津液亡ビテ氣弱シ故ニ是ヲ加ヘテ氣ヲ益シ津ヲ生スルモノ也又傷寒ノ邪傳エテ陽明ニ入脉浮ニ發熱無汗者其表不解方り燥渴ストイヘ太青龍湯ヲ用ヒテ白虎湯ヲ與ヘカラズ若渴ソ水ヲ飲シト欲スル者多々陽明ノ渴也白虎湯ヲ與ヘシ太陽ノ表證ナクソ始テ此ヲ可用

按ズルニ此方初メ發散ノ藥ヲ用ヒ汗ソ表邪去テ熱解セ

ズ大ニ煩渴シ脉洪大ニシ舌白ノ白土ノ如ク或黃ニ焦色ナリ
タル者必此湯ヲ與フベシ又溫熱病時疫舌上白脂シ渴ニ古
ノ根ヨリ漸々ニ黃色ニ及舌ノ真中ニ至ルモノ此方ヲ與フベシ然
ルニ發散ノ後煩渴ソ水ヲ飲レト欲ストイヘ五苓散猪苓
湯ノ症アリ或桂枝加葛根ノ症アリ誤テ白虎ヲ與フカヌ
太陽ノ中風有汗ノ症桂枝湯ヲ用ユキモノニ麻黃湯杯ヲ
用ヒテ大ニ汗ヲ發メ曾中ノ津液ヲ傷テ煩渴スル者必水ヲ
飲シヲ欲スソレハ少々水ヲ與エテ胃ノ氣ヲ和セシムテ愈ルモ
トアリ又桂枝湯ノ症桂枝湯ヲ用ヒテ不解熱陽明ノ經入
ント欲ノ渴スルモノハ此桂枝葛根湯ノ症也誤テ白虎湯ヲ
與フカズ白虎湯ハ本夏月中暦ノ主劑タリ中暦ハ中

熱ナリ夏月太暑ニ傷ラヒテ發スルヲ中暦ト云其證溫熱病ト
同ク大ニ煩渴スルモノ也溫熱病ハ其脉盛也中暦ハ其脉必虛ニ治
方ニ於テハ同ク此白虎湯ヲ用ユル也且石膏ノ大寒、陽明ノ熱
ヲ解シ知母少陰ノ源ヲ涼クシ甘艸粳米中氣ヲ助ケテ
肺氣ヲ保モノ也又中熱背惡寒スルモノハ白虎湯主之トアリ
背ハ陽トス背惡寒シ口不渴口中和スル者ハ少陰ノ症ニ附
子湯ヲ與フベシ今口燥渴ノ背惡寒スルモノ此裏熱ノ證也惡
寒ストイヘニ甚シカズ故ニ微惡寒ト云此證白虎湯ヲ用ヒテ表
ラ和シ裏熱ヲ涼クスベシ後人立夏以前處暑以後安リニ白
虎湯ヲ不可用ト云亦不通ノ論タリ春秋冬三時トイヘ五
熱大渴アル者凡此症アリテ此藥ヲ用ユルニ何ノ忌所カアラン

又仲景ノ傷寒論ハ正傷寒ラ論ノ温熱病ヲ論セスト云此亦仲景ノ經旨ラ不明モノ也白虎湯承氣湯竹葉石膏湯ノ類皆温熱病ノ藥ニ非スヤ右ノ藥剤可施ノ証アル者以何方治之哉夫傷寒、温疫ノ異ナルト古來說多シ吳又可ガ温疫論ニ此ヲ論ソ曰傷寒ハ風寒ニ傷ラレテ鬱熱ヲ不待直ニ發ノ惡寒、發熱シ後頭痛、偏身疼痛シ其脉浮數或緊無汗ヲ傷寒トシ脉浮緩ニシ汗アルラ傷風トス時疫ハ天地ノ厲氣ニ感ソ發ス故ニ其邪只鼻ヨリ入其初感冒ノ因ナク忽チ凜々トサムケアツテ後但熱ソ惡寒セズ或ハ初少氣分勝レズニ三日四五日ラ漸々ニ熱強ク出テ午後ヨリ段々熱シテ八時ニ益甚シク其脉不浮不沈但數ナリ其

邪夾脊ノ内ニ舍リ終ニ募原ニ蟠ルト云募原ハ素問瘧論ニ横連募原トアリテ募作膜皮ノ下肉ノ上筋膜ノ在處ナリ又肉理藏府ノ間ヲモ云トアリ何テアレ邪氣募原ヲハナレ子ハ熱解スルモノニテナシト云傷寒、如ク麻黃湯桂枝湯ノ類ヲ以テ發シテモ莫邪不去反テ表氣ヲ傷テ熱涼スナリ又下ストイニ邪裏ニキユ卫徒ニ冒氣ヲ傷テ熱不涼渴甚クナルモノナリ此時達原飲黄芩 芍藥 知母 厚朴 各一錢 桂榔二錢ラ草藥七分甘艸二分生姜一片大棗二枚以テ其募原ノ邪ヲ切り離スヘシ若感スルノ重キ者、舌上白胎アリテ粉ラヌリタルゴトク或舌ノ根先黄ニシテ舌ノ真中ニテニ至ル者ハ邪漸ノ冒ニ入ナリ此ハ本方ニ太黃ヲ加エテニ消飲ト名ヅテ用ルナリ其上ニ脉長洪數大ニ汗出テ渴多キ

モノ是邪氣募原ヲ離ル也此時白虎ヲ用ユベシ若舌上
黄焦シヨウニテ大便不通裏症ヲ兼ルモノハ承氣湯ヲ用ルナリ白虎
辛涼ヲ解散ス此ヲ服メ應ズルモノハ戰汗シ或自汗ソ解スル
ナリ免角瘡邪ハ承氣湯ヲ用ヒテ其邪毒ヲ下スベシ燥屎ヲ待テ下
スニ非ズト云此論最タリトイヘサレ正下スト只能々其証ヲ明ラメ
ヌシテハ下サルモノニテナシ尚工夫スベシ凡傷寒時疫誤下セ其
害キヲ反スカ如シ能議ベシ又赤水醫案ニ時疫ノ浮ニ孫子主
柴白湯ヲ用ヒシ時或人此浮ニ柴苓湯ヲ不用ソ柴白湯ヲ用ル
如何ト云不審ヲ云苔曰此深則漏底浮ト云モノニテ其下處
皆水ニシテ糟粕ソウブナク此極メテ熱ツ致ストコロナリ故其證口渴齒
燥鼻乾舌胎黃色アリト云柴苓湯ハ内人參白朮肉桂皆

熱ヲ助ケ燥ヲ發ソ必班ハシヲ發シ齒燥キ舌乾テ焦黒色
トナルモノト云ヘリ尤然リ常ノ雜病或濕邪ニ因テ熱アシテ
浮スルニ柴苓湯可也時疫ノ浮ニ寒藥クンヤクデナケバ治セヌ也或
黃連解毒湯或大小ノ承氣湯或葛根黃連黃芩湯ノ類ヲ
用ヒアリ赤水醫案モ說得タリトイヘ其治法皆古法ニ
加減シタルモノニテ規律トナリガタシ本文傷寒ヲ論スル處ヲ
見ハ皆節奄ハシラ柱トシテ書タルモノ醫案トハ大違カニニシテ
信用ナリガタシ又傷寒時疫發班出ルモノアリ是胃熱甚シ
クソ生ズ或ハ陽症ニ誤テ熱藥ヲ用ヒ或ハ汗スベキヲ不汗可
下スナ不下宜ヨコシキ失エ血熱不散ソ班ハシラ生ス輕時ナシハ蚊ノ跡カニ如ク
重時ハ錦紋ハナシマツノ如シ皆人參白虎湯ヲ用エシ後人是ヲ化班

湯ト名シク又温瘧ト云フアリ此証熱ノ寒ナク但骨節疾テ
湯水ヲ好ミ或大ニ渴ノ嘔ス白虎桂枝湯ヲ用ユヘシ又消渴
大ニ渴ノ水ヲ貪リ或ハ大ニ食ノ羸瘦スルモノ白虎湯ヲ與フ
ベシ若小便多クシテ飲水一斗小便一斗ナルモノ腎氣丸ヲ
用ユ其外痘疹產後熱甚シクソ古ニ胎アツテロ渴キ舌乾
或ハ狂証甚シキモノ火熟ニ屬スル者悉ク此湯ヲ用ユルト知
ルベシ

○小承氣湯 陽明病脉遲雖汗出不惡寒者其身必重短
氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濶然而汗
出者此大便已鞢也太承氣湯主之若汗多微發熱惡寒者
外未解也不潮未可與承氣湯若腹大滿不通者可與小承
氣湯

氣湯 微和胃氣力令大泄下

大黃

四一錢

厚朴

三分

枳實

三分

枚

右三味以水四升煮取一升二合去滓分溫一服初服湯當
更衣不爾者更飲之若更衣者勿服

傷寒、陽明ニ傳エテ脉遲汗出ルト云正惡寒、セズ此外証解セシ
ト欲ス脉實ナラザル者ハ攻下ス、カラズ若其人身重ク熱ヲ困
短氣ニシテ喘スルモノ熱上塞ナリ腹滿テ潮熱スルモノ此熱
中ニ聚ルナリ又手足濶然トメ汗出テ大便不通者熱下ニ結ル
ナリ此外邪已ニ解シ内實已ニ成ルモノ故ニ太承氣湯ヲ以
攻下ヌベシ若亦汗出テ少ニテモ發熱惡寒アルモノハ此外未ダ
解セガルナリ其上潮熱セガル者ハ裏未ダ實セズ承氣ヲ與

アベカラズ潮熱ト云ハ暨ハツ時ヨリ暮過ノ間ニ潮ノサス如ク
日ニ一度ソ、出ルラ云日ニ二度モ熱出ルハ發熱ニテ表熱トス潮
熱ハ裏熱ナリ故ニ腹大ニ滿テ不通ソコテ少シ小承氣湯ヲ用ヒ
テ胃氣ヲ和スベシ太承氣湯ナドラ用ヒテ大ニ攻下スベカラズ此
初二脈遲トアルユエ下ストイヘ先ハ小承氣湯ヲ以テ下シテ胃
氣ヲ和セヨトナリ傷寒論中ニ陽明ノ病必潮熱シ太便難
クノ不^ル通者ハ承氣湯ヲ與フベシ若太便不^ル鞭モニ與フベカラズ
ト云此潮熱アリト云ヘド其太便ノ鞭ヲ試テ太承氣湯ヲ與フ
ベシ潮熱ハカリニテハ太承氣湯ハ用ヒラレズ然レバ又太便不通
計ニテモ太承氣湯與エラレズ大使不通ト六七日ニソコテ燥屎
アルヲ知ベシ此ヲ知シト欲スル時ハ先ハ小承氣湯ヲ與エテ

轉失氣スル者ハ此燥屎アルヲ知ル此時太承氣湯ヲ用ヒテ攻下ス
ヘシ小承氣湯ヲ與エテ不^ル轉失氣者此胃氣虛ス故ニ初ノ大
便鞭ト云ヘ圧後必溏ルモノ也此ヲ攻ベカラズ此ヲ攻ル時ハ胃氣
愈虚ノ脹滿ノ不食スルヤウニナルモノナリ或ハ噦スヤウニモナルモノ
ナリ只太便ノ鞭メ通シ難キモノハ津液渴テ水穀減スルユニ通ゼ
ガルアリ此時ハ小承氣湯ヲ與エテ和スベシト云ヘリ後人小承
氣湯ハ攻下ノ劑ト計覺ルハ鹿キ也仲景ノ和スルト云ヲ見ル
ベシ下シテ後再ビ大使結セントスルモノハ小承氣湯ヲ用ヒテ
和スベシト云ヘリ又太承氣湯ヲ用ヒシト欲セハ先ハ小承氣湯ヲ用ヒテ
ヒテ試ヨトアルヲ能見ベシ下スト云ヘ圧先指扣テ試ル也後
世安リニ攻下ベカラサルヲ示セリ又論中ニ陽明ノ病譖

語潮熱ヲ發シ脉滑ニノ疾者小承氣湯ヲ用ヒト云ヘリ是ハ
脉ヲ以テ譖語ノ虛實ヲ辨ズルモノナリ陽明ノ譖語ニモ虛アリ
實アリ若潮熱ヲ發ソ脉滑修ム疾太便不通者此陽明ノ證
ナリ小承氣湯ヲ用ヒベシ其上腹中ノ轉朱氣ヲ候案フテ其虛實
ヲ辨シテ後與フギ歎與フベシガル歎ヲ見ルベシ若太便通ゼズ
ト云ヘバ脉滑疾ナラズ反テ微濶ナル者微ハ氣衰工濶ハ血
少キモノナリ此裏虛ノ邪盛ニ正氣衰フルモノ此ハ難治ノ
証トス妄リニ承氣湯ヲ與フカラズ又論中ニ汗多譖語
ルモノハ小承氣湯ヲ與フテ下スヘシト云モノハ汗多時ハ津液
外ニ出テ胃乾燥ノ胃實ノ証トナ故ニ可下スト云サレモ其
入汗出ルト多キ時ハ汗液外ニ耗故ニ太承氣湯ヲ不用ソ

小承氣湯ヲ用ヒテ其胃ヲ和スベシスレバ譖語自ラ止モノ
ナリ若剤ヲ過ハ復津液ヲ傷ル立後服ヲ止ト云ナリ
又金匱三下利譖語者有燥屎也宜小承氣湯ト云是下利
ハ裏虛ナリ若脉大ニアレハ裏急ヲ兼ルモノナリ必宿食ア
リ其下モノ粒リテ甚矣モナリ其上手ヲ以附腹ヲ按エ
テ見生堅クノ痛ハ此燥屎アリ小承氣湯ヲ用ヒテ下スト疑
ヒナシ只譖語バカリミテ燥屎ノ目的ナクノ用ヒ難シナレドモ
傷寒、時疫ノ証下利ノ譖語スルモノ小承氣湯ヲ用ヒルナ
毎々アリ能察シテ可考用

按スルニ傷寒邪^今ニ陽明ニ傳ル時ハ少モ惡寒ナク潮熱譖
語シ手足脇下濶然ト汗出腹滿シテ痛ミ大便不通吉貴

色甚則焦胎シヨウタケ黑胎トナル脉沉實或沉數ヲ見ハス此時於太小ノ承氣湯或調胃承氣湯ヲ用ヒテ邪熱ヲ下スナリ右ニ方ニ於テ各差別コトカサベツアリ陶節庵トウセツアン云痞滿ヒシヨウ燥實堅ジオウジケンノ五証備ハルモノ六芒硝ヲ去テ小承氣湯ヲ用ヒ芒硝ヲ去ハ下焦血分真陰ヲ傷シコト恐ル燥實堅シヨウケンニ証アツテ痞滿ヒシヨウノ二証ナキモ六枳實厚朴ヲ去テ甘艸ヲ加ヘ調胃承氣湯ヲ用ルナリ枳實厚朴ヲ去モハ上焦レシヨウノ元氣ヲ傷ラシコト恐ルナリト云汪訥庵ワウエン醫方集解ニ此ヲ詳ニソ云痞ヒシ六胸腹ケツモモ不食スルナリ滿マツ八胸腹ハツモモ脹ヒバクトフクレテ脹ヒバクル云也燥ハ煩渴ケンケイノ大使燥カクク也實ハ腹滿ヒシヨウ痛テ大使セガル也堅ハ腹ヲ按テ硬也訥庵ワウエンガ此論甚

詳ラア吳崑名醫方考徐春甫シキ古古今醫統其外先輩皆從之然ニ仲景ノ本意ヲ考ルニ陶節庵トウセツアンが説非也凡テ右述ル處ノ陽明ノ症アツテ其病輕カクク甚シカラガル者六小承氣湯ヲ與エ重ク甚シキ者六大承氣湯ヲ與フ邪熱太陽ヨリ來テ中焦胃ニ入テ結定セント欲スルモノニ其結定ヲ俟テ調胃承氣湯ヲ用ヒ大黃芒硝、實ヲ泄キラシ熱ヲ消シ燥ヲ潤シ堅カクク也甘艸ヲ用テ藥性ヲ緩ハラクシ胃中ニ藥ヲ暫ヒヤウク留ヌ邪熱ヲツヒテソロクト下行セシム也甘艸無ナシバ藥性急ニ下リテ熱胃中ニ殘ル惣ソ甘艸ハ下ル藥ニ加ヒ急ニ不下寒ヒヤウル藥ニ加ヒ寒性ユルクナリ熱藥ニ加ヒハ熱勢ユルクナリ何ニ加ヒテモ此合点ナリ此則仲景ノ本意三承氣湯ノ分別也初先ハサウエ小承氣湯ハ潮熱也テ脉沉實

沈數ニシテ有カ心下鞭按シテ痛不得眠モ小便多^シ或譖語下利口渴舌黃脹腹滿ノ痛甚シタゞ發生煩躁悶亂等ノ症ナク小熱小實ノ症ニ用エト知ヘレ仲景小承氣ヲ下ストエズ和スラ云ヲ能考エ見ハシ又此湯傷寒外食傷腹滿硬痛或癆疾熱去テ後裏急後重^{リキツルモビ}不止モノ此ヲ用ヒテ甚驗アリ尚本論承氣湯ノ條下ヲ考エミル必謬ヤ勿レ

○大承氣湯

大黃四两厚朴半两枳實三分苦硝三分

右四味以水一斗先煮一物取^リ五升去滓テカラヒ大黃取二升去滓内芒硝更上火微^シ沸分温服再服得下餘勿服

本論ニ陽明ノ病汗出譖語スル者ハ燥屎在胃^{シテ}以ノ故也ト云此

太陽中風ノ邪ノ傳ル所ニシテ表虛裏實スルモノ也若六七日モ不立タ卽^ク下^ス斯時ハ裏熱未結^タノ下^ス故ニ胃虛レ熱弥甚^シ語言^シ乱ル、モノナリ表虛スレハ汗出^テ裏實スレハ譖語ヲナスナリ必^シ熱裏ニ入^テ能察^シ太承氣湯ヲ以テ下スレ早ク下スベカラズトナリ又陽明ノ病譖語潮熱^{シテ}ハ反^ヒテ不能食胃中^モ必有燥屎五六枚也太承氣湯ニヨロシト云此^シ能食スルト食サルトヲ以テ燥屎ノ有無ヲ辨ズルモノナリ譖語ハ胃中ニ熱甚シ多致ス所ナリスレバ胃熱スル時ハ能穀ヲ消^シ能食スベキニシテ瓦^タ食セヌト云モノハ是胃中ノ津液ヲ傷^ステ氣化下^ス及^スノ燥屎胃ニ逆スモノ也太承氣湯ヲ以テ下スレシ若能食スルモノ胃中ノ氣化^シ自^ラ行^ステ邪熱津液ヲ傷^ス是ハ大使但鞭^{カタ}久カラズメ

通ズルモノナリ必藥ヲ用テ通ズル不及ト云如此食ノナラヌヲ
ヲ下ストアレニ此ノ前ニモ云通リ甚ダ為ガタキフ也其脉及全
体ヲ能考エ令シテ下スベシ又論中ニ陽明ノ病下之後心中懊
懃シ煩スル者ハ胃ニ燥屎アリト云懊懃ハクニモタルニテ胸中
ノ云ニ云ハレス苦シキト煩ハ息ダハシキト也若腹大ニ満テ大便
不通ノ小便ノ頻數ナル者ハタトエ初メ下スト云ヘ正未尽ノ燥
屎アリ復攻下スベシ若亦腹少シク満ルモノハ妄リニ攻ヘカ
些ア誤テ下斯時分叉テ脹滿ヲナシ不食ヲナシ或ハ噦等ノ憂逆見
モノ也弥燥屎ノ有無ヲ考エテ太承氣湯ヲ用ヒテ下ス
シ又下テ後六七日モ大便セズ煩シ不解腹仍満テ痛テ
ハ初メ下ルト云ヘ正未尽キトコロアリ故ニ腹ナラ痛ナリ此水
ハ初メ下ルト云ヘ正未尽キトコロアリ故ニ腹ナラ痛ナリ此水

宿食尽サルモノナリ大承氣湯ヲ可用ト云後人初下リタルヲ
聞テ其後大便數日不通者再下スヲセスソ其症不治因循
ト遂ニ死スルモノ多シ能思議スヘシ又陽明ノ病小便不利大
便乍難乍易時有微熱喘冒不能卧者有燥屎也宜太
承氣湯ト云此小便數三少キモノハ津液中ニ帰リ入ルナリ
故ニ久シカラスソ必大便スヘシ今小便不利大便反テ乍易キ
モノハ熱内ニ結^合テ水道不通内ニ燥屎アリテ胃氣下行セズ
反テ上逆シ喘冒シ不能卧也此モ用太承氣湯可下也惟
大便不通ト六七日ニシ又小便モ通利少シ其上喘冒シ卧
コラセサル者必可下ノ證ト知ルヘシ右ノナル處ノモノハ其大概
ヲ記スナリ太承氣湯ヲ用ユル時ハ甚シカタキユ卫本論ノ

大意ヲコニ載ルモノナリ

按スルニ太承氣湯ノ用ヒ形ノ太意ヲ云ヘ發熱頭痛去テ後
晡時ヨリ熱出脈沈實數ニシテ喘滿レ或腹痛譫語ソ
狂ヲ發レ渴メ大便不通腹滿レ手足腋下ニ汗出舌黃胎
或黑胎ニシテ小腹硬滿テ痛ミ按之病人甚不好或手ヲ
揚足ヲ擲衣服ヲ脱去リ又ハ清水ヲ下利レ少モ糟粕ナクシ
水計ヲ下ス者アリ此内ニ燥屎アリテ膀胱ヨリ流レ出ルモノチ
リ此方厚朴痞ヲ去枳實滿ヲ泄レ七硝堅キヲ軟ケ太
黃實ヲ泄ス故ニ此方凡テ熱邪内結ノ症ニ用ヒテ其邪
毒ヲ下スモイト知ヘシ其外食傷腹滿痛甚レク太便不通及
痢疾後重甚レク腹痛不止脉滑ナル者此方ヲ用エシ太

承氣湯ヲ傷寒論金匱ナトニモ不良ノ者ニ用ルアレ庄前ニ
モ云通り食ノナラヌ者ニ用ヒ難シ惟食ソ大便不通脉ヲ
按テ底ニガアル者ニ用ユニサレ庄其時ノ熱時宜ニ因テ不食
ノ者ニ用ルヒモアルベシ一概ニ心得ベカテス繩テ傷寒時疫
ニ下劑ヲ用ヒベキ場所恐レテ不用熱弦裏ニ入テ譴諱煩躁
レ或循衣撮空脉モ亦虛數トナリテ此時ニ及シテ一下
劑モ用ヒラレヌ手ノ及ブ所ニ非ス故ニ節庵此為ニ黃龍湯ト
云方ヲ立タリ太承氣湯ニ參甘艸當帰ヲ加タルモノナリ
尤ラレキ方ナレ庄少モ効アルヲナレ復ニタヌフト云ヘシ冀
大槻ヲ述尚於本書可玩味也

○調胃承氣湯

大黃四一五
兩甘草二
兩芒硝半
斤

右三味㕮咀以水三升煮取一升去滓內芒硝上灰微煮令沸少少溫服之

按スルニ調胃承氣湯ノ證ハ初汗ヲ發レ汗出テ後熱不涼少モ惡寒セスソ熱甚シク蒸々トムスガ如クニ熱出テ心煩ト胸息タワシクソ大使不通脉數急ニシテ少々譴語ス此熱胃ニ結セントスルモノ也此時此方ヲ用ヒテ胃中ニ結スル所ノ熱ヲ蕩滌トトラカレソングモノ也仲景下スト云ハス和スルトアルヲ見ルヘシ實熱一ダ胃中ニアリテ下エ下ラ子バ調胃承氣湯ヲ用ヒ甘艸ヲ以テ急ニ不下ソワク上胃熱ヲ去ルモテ其病重ク甚シキ者ニシテ氣ヲ用ヒ邪氣伏セスソ治セズ又病ソレホドニモナキニ承氣

湯ヲ用ユレハ遇テ正氣ヲ傷ル又病胃ノ中焦ニアルモノ急ニ下ス下劑ヲ用ユハ藥力上ニ留ル間ナク胃中ノ熱反テ去ラスソレテ大小ノ承氣湯六急ニ下ス為ニ甘艸ナシ調胃承氣湯之變下サント欲ノ甘艸ヲ加ヘタルモノ也此時甘艸甚少シテ反テ調胃ノ本意ヲ失テ害ラナス也調胃ト云ハ胃ヲ調トト云ヘニテ胃中ノ熱ヲソロクト下ニテ胃ヲ調工和スルト云意也前ニモ云如ク節庵ノ誤リハ上焦ノ元氣ヲ傷ラシコラ恐レテ枳實厚朴ヲ去ルト云ナレハ下焦ニ邪ナキカラハ芒硝モ去苦シナリソニ調胃承氣湯ニ芒硝ヲ用ユルモノハスニ又ニナル其上調胃承氣湯ノ傷ラシコラ恐ルト云ハナレ此方ニ枳實厚朴ヲ去ハ上焦ヲ傷ラシコラ

上焦ノカニヒナイ藥ナレハ枳實厚利ヲ用ヒテ上焦ノ恐レハナイ苦
ノ傷寒論中ニ調冒承氣湯ヲ用ユル症ハ所ニアル中ニ皆痞鞭
ノ太便乾燥スルト云トハ云テナイ冒氣力和セヌノ冒實ノ腹滿
ト云テアル此表症皆罷ヨミテ陽明ノ府ニ入テ大便結セント欲ソ
痞鞭スルハナイソレテ傷寒論ニモ太陽篇ノ内ニテ太陽陽
明ノ未タ間ナキ處ニ用ヒテアルラ見ルヘシ太小ノ承氣湯トハ大違
ナリ如云トイヘ此モ下劑ニテ其上芒硝多ク入ル方ナレハ未熟
人妄ニ用ヒ難シ能クエ夫ズシ尤此ニ承氣湯ヲ用ユル場合
少シニテモ違エハ仕損スルト云モノナリ必誤ルトケレ
○桃仁承氣湯 太陽病不解熱結膀胱如狂血自下者愈
其外不解者尚未可攻當先解外外解已但少腹急結者乃
可攻之宜此湯

桃仁五十個 桂枝二兩 甘草二分 大黃四五錢 芒硝一升分
右五味以水七升煮取二升半去滓內芒硝更上火微沸温
服五合日三服當微利

此太陽ノ傷寒榮血ヲ傷テソレカ汗トナツテ出レバ治スルソノ
外工發スキモノ發セズソレデ不解ト云其血下膀胱ノ府工結
ノ其人狂人如ク譖語ヲ發スル也然ルニ血自下ル者ハ邪熱
膀胱ニ留ラス故ニ血自下ル者ハ愈ユシト云サレニ其外不
解者ハ下スカラズ先麻黃湯杯ヲ以テ表邪ヲ解スベ表邪
去テ後コレヲ攻ヘシ瘀血下膀胱ニ畜ル時ハ小腹急ニ結ス
ルモノ也此時桃仁承氣湯ヲ以テ攻下スレトナリ

按スルニ此方太陽ノ症不解ノ膀胱ノ府ニ傳エタルモノユエ桂枝ヲ以テ表ヲ散レ木黃芒硝ヲ以裏ヲ下ス此表裏兩解ノ剤ナリソレデ調胃承氣湯ニ桃仁ヲ加ヘテ瘀血ヲ追桂枝ヲ以テ外邪ヲ解スル也其證小腹堅カタチ小便頻數ニシ能通ズルモノ也或譁語狂言まきごん不ハナスモノ也若又小腹堅キト云ヘ庄小便通セヌモノハ畜血ニ非ス用エカタス其外吐血ツクモカク婦人瘀血小腹堅カタチノ痛甚ジク或ハ產後瘀血不下ノ腹大痛ニ或打撲腹痛瘀血ニ屬スルモノ尽ク此湯ヲ用ニベレ○抵當湯 太陽病六七日表證仍在脉微而沈反不結胸其人發狂者以熱在下焦少腹當鞭滿ス小便自利者下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀熱在裏故也此方主之

水蛭三十個 蟲蟲三十個 桃仁二十個 大黃三兩

右四味為末以水五升煮取三升去滓溫服一升不下再服按スルニ此脉大ナ必レ今脉微ニシテ沈ナルモノハ外太陽ノ表症アツテ内少陰ノ脉ヲ見ハスモノニシテ麻黃附子細辛湯ノ症也若邪裏ニ入時ハ結胸あく或ハ藏結くわくノ症トナヒレ然ニ此太陽少陰ノ症アツ又結胸藏結ノ病トナフズ但其人狂きょう狂きょう發スルモノ是又瘀熱下焦ノ血分ニ結モノ也故ニ少腹鞭ス滿ス小便能通斯是血下焦ニ畜ルモノ也其ノ人下血スル時ハ自ラ愈ル也若下ハザルモノハ宜ク是ヲ下スシ抵當湯ニアザシ瘀血ヲ逐下ス能ハス抵ハシメ至三同ト至當不易ノ良方也又婦人瘀血經閉或ハ為塊者其痛甚者屋用ニテ効アリ若不痛其塊堅カタキ自若トシ動カザルモノハ用下

イヘ仄効寡シ此時ハ抵當丸以テ緩々ニ攻去バレシ本方
中ノ蟲虫ヲ虎杖ニ易ヘ用ヒテ甚父効アリ又虎杖煎ト云方千金
ニ出其方生虎杖根數百本切刻シ水一斗ヲ以テ一升ニ煎シ酒
ヲ加ヘテ又煎詰テ膏ノ如クナルヲ交モテ丸トスヘシ虎杖和名イダリ
高山ノ物好ト云ヘリ瘀血經閉ニ用ヒテ能効アリ

○大陷胸湯 太陽病脉浮而動數浮則為風數則為熱動
則為痛數則為虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解
也醫反下之動數變遂膈内拒痛胃中空虛客氣動膈短氣
躁煩心中懊憹陽氣內陷心下因鞭則為結胸此湯主之

大黃六分芒硝一分甘遂一分

右三味以水六升先煮大黃取二升去滓内芒硝煮一两沸

内甘遂末溫服一升得快利止後服
按ズルニ浮ハ風トス數ハ熱トス動ハ諸痛ノ脉トス頭痛ハ太陽
証也盜汗出ハ熱陽ヲ蒸ス時ハ陽虛ソ自汗出ツ熱陰ヲ
蒸トキハ陰虛ソ盜汗出ハ陰虛スル時ハ惡熱スヘシ今テ反テ
惡寒スルモノ此陰虛ノ盜汗ニ非ズ表未解ノ盜汗也故ニ
表ヲ解スベシ然ラ醫誤テ此ヲ下ス故ニ動數ノ脉變ノ遲
トテル動數ハ表邪ヲ誤リ下スニヨツテ客氣膈中ニ結テ膈
内拒ニ痛ム也此又胃中空虛ニ陽邪胸膈ニ陷ル故ニ短氣
躁煩スルナリ懊憹ハ前ニモ云通リ胷中ノ云ニ云ハレス甚々
クルシキ也此ニ因テ心下堅ガタモノヲ結胸ト云太陷胸湯王之
今云通り此誤リ下スニ因テ邪氣不去反テ胸膈ニ攻上リ

テ心下ヨリ少腹ニ至テ鞭ク満テ甚^シ痛テ手モ近クヘカラサルモノ也故ニ大陷胸湯ヲ以テ其結實ノ實邪ヲ下スナリ小結胸モ心下ニアリトイヘ此ヲ按ハ痛按サレバ痛^{イタク}サルモノ也初太陷胸湯ハ誤リ下レタル上ラス又下ス^ト故ニ甚^シバタ用ヒ難キ方也心下甚^シ痛テ手モ近ヅケラズ右ノ如ク鞭^{カタク}ノ實邪タルヲ能考工得テ用ユベシ安^{アヤ}ニスルフナカレ

○小陷胸湯

小結胸病正在心下按之則痛脉浮滑者此

方主之^{アラ}

黃連

二分

半夏

半升

括囊實

大者一個

六分

右三味以水六升先煮^{アラ}取三升去滓內諸藥煮取二升去滓分溫三服

按スルニ大結胸ハ邪重^{アキ}クノ熱深クノ心下ヨリ少腹ニ至テ鞭ク満痛テ手モ近ヅクヘカラズ脉モ亦沈實ナルヘシ大陷胸湯ヲ以テ其結ヲ攻^{アセ}テ其熱ヲ浮スベシ小陷胸湯ハ邪淺ノ熱輕ク其邪心下ニアリテ鞭^{アラ}ク此ヲ按ハ痛按サレバ痛^{イタク}サルナリ脉亦浮滑ナヘシ小陷胸湯其結ヲ開テ其熱ヲ泄^{アセ}ス此症痰飲素ヨリ盛ニア熱邪ヲ狹テ内ニ結テ心下ニ集^{アセ}リ塞^{アラ}ルモノ也大陷胸湯ト其意大異ナリ半夏括囊實痰ヲ推開キ黄連熱ヲ泄シ結ヲ散ズ故ニ心下痞^{アラ}ソ此ヲ按シテ痛ムモノ用ルト知ベシ誤リ混ズベカラズ

○小青龍湯 傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而咳或渴或利或噎或小便不利少腹滿或喘者小青龍湯主之

麻黃 三分桂枝 三分芍藥 各三分甘草 二分五味子 半分升 六分乾姜 二分細辛 二分半夏 升六分

此表不解ト云六脉浮緊頭痛發熱無汗惡寒ノ證仍在也
表不解ユニ三水飲心下ニ止リテ乾嘔或咳嗽或利或嘔或
小便不利少腹滿シ或喘スルナリ或々ト云ハ定マラタニテ或
渴スルモアリ渴セヌモアリ或小便通スルモアリ或通セヌモ
アリト云フ也此内何レナリ庄一症モアルシ此内ニ水飲畜
積シタルモノニテ此モニ症アリテ風ニ傷ラレテ有汗者表
虛トス五苓散ノ證也又傷寒無汗者ハ表實トス小青龍
湯ノ證也

按スルニ此方本風寒ニ傷ラレテ寒少ク風多キモノニ用エ

ル方也人身肺ノ藏ニ常ニ水液升ジバ清涕トナリ降テ
心下ニ留ニ六水飲トナシテ或熱レ或冷或渴レ或八
小便不利ニテ種々ノ證ヲナス此小青龍湯其水飲ラ
散スルナリ其水飲ラ表ニ散スル時ハ小青龍湯内小便ニ
導ク時ハ五苓散ラ用エル也故ニ風寒ニ傷ラレテ咳嗽甚
々シク大ニ痰水ヲ吐クモノニ主方トス又水飲ラ散ズル劑
ナルガユニ表邪ニカワズ一切咳嗽痰水多ク出テ或浮腫
スルモノニ用エヘシ又水寒、肺ヲ犯シテ喘咳スルモノ此ニ限ラズ
射于麻黃湯厚朴麻黃湯ノ類皆此方ヨリ變出スルモノ也
考工可用且ニ方中ノ五味子ハ收斂スルモノユニ常ニ表邪ニ
忌也此方中ニ有テハ五味子ヲ以テ永氣ヲ集メテ麻黃桂

枝ニテ發スルト見エタリ又傷寒、五法ト云書ニ此方ニ枳殼
橘皮ヲ加ヘタリ此モ此方水飲ノ為ニ製レタルヲ不知シテ
但參蘿飲ノ意ニテ加ヘタルモト見エル其外仲景ノ方ニ尽ク
加減ノ小細エラナス面白見エルヤウナレニ仲景ノ本意ヲ取
失ヒタルモノナリ信用ナリガタシ

○大青龍湯 太陽中風脉浮緊發熱惡寒、身疼痛不汗出
而煩燥者大青龍湯主之若脈微弱汗出惡風者不可服服
之則厥逆筋陽肉瞶此為逆也

麻黃六兩桂枝三分甘草二兩杏仁四十個生姜三兩

大棗十二枚石膏如雞子大

右七味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三

升去滓溫服一升取微似汗汗出多者溫粉撲之一服汗者
停後服汗多亡陽遂虛惡風煩燥不得眠也

此太陽ノ中風脉浮緩ナルモハ是中風
ノ病ニテ傷寒ヲ兼タルノ脉ナリ中風ナハ身疼イタズソ汗自
ラ出ルモノ也今身疼テ汗出ス此中風ニシテ傷寒ヲ兼ル證ナ
リ汗不出煩躁シサカスルモノハ風ハ陽邪也寒ハ陰邪也陰寒外ニ
齧スル時ハ無汗陽邪内蒸ス時ハ煩躁此風寒ハシカガラ氣盃
ヲ傷ツテ同ク病モノナリ故ニ麻黃桂枝ノ二湯ヲ合ソ石膏ヲ
加ヘタルモノ也大青龍湯、氣血同病ノ實邪ヲ解スルナリ
若脉微弱ニテ汗出テ惡風スルモノハ煩躁アリトイヘ比此少
陰ノ煩躁ニテ太陽ノ煩燥ニ非ス太青龍湯ヲ服スベカラ

ズ若此ヲ服スハ厥逆ト足令筋惕トスヂラドリ 肉瞼ト皮
肉ビククト動スルノ患ラナシテ速ニ其陽ヲ亡ス故ニ為逆云
按スルニ此方モ風寒ノタメニ氣血俱ニ傷ニシテ寒多風少キ
モノニ用ユル方也脉浮緊發熱惡寒身痛疼並者ハ皆寒邪也
然ニ本條太陽中風トアルハスニヤウナレ汗不出ト云ニ氣ヲ付
テ見ルベレ無汗ト云ト汗不出ト云語意不同無汗ハ始カラ汗
ナイフ汗不出ハ元來微汗アリソレガ寒邪ニ閉ラレテ汗不出
内ニ鬱ノ熟甚父レ故麻黃桂枝ニ方ヲ合シ芍藥ノ收
斂ノシムルモノサリテ急ニ發散スルナリ石膏ハ煩燥ヲ解スル
モノナリ此方ハ無汗煩燥スルラ目的トス汗不出故ニ病久甚
ハタ苦シニテ煩スルニ毎々アル也能氣ヲ付テ見ルベシ若

有汗煩燥スル者ニ真武湯ヲ用ユル也抑此方コニ用ヒシコナ
ハ厥逆筋惕スルヲ恐レテアレ凡今用ヒテ見ルニ左程屬シキ
藥非ズ勿論汗出ルモ左様ニナキモノ也此ハ今用ル所ノ
麻黃古ノ如ク厲シクナキト見エタリ又ハ小劑ナルニ可疑又
汗出多者ハ溫粉ノ法ヲ用ユルト此モ後人加ヘ名モノト見ユ
ルナリ其法白朮藁本川芎ヲ細末ニシテ米粉ヲ入テ此ヲ周
身ニ撲ト云此也

○五苓散 太陽病發汗後大汗出胃中乾煩燥不得眠
欲得飲水者少々與飲之令曾氣和則愈若脉浮小便不利
微熱消渴者與五苓散

猪苓

六銖

澤瀉

一兩

茯苓

六分

桂枝

半兩

白朮

十八分

米粉

右五味為末以白飲和服方寸匕日二服

此用桂枝湯解肌ノ症ヲ麻黃湯ヲ用ヒテ大ニ汗ヲ發シ反テ
邪解セズ冒中水穀ノ津竭テ冒中乾ク故ニ煩燥スルナリ冒
不和故ニ不得眠冒中燥熱甚レク故ニ水ヲ得テ滋サンフヲ
欲ス此時ハ少々水ヲ與ユテ冒ノ氣ヲ和セシムハ愈ル也然レ正
恣ニ飲セシムヘカラズ少々ミヅ、水ヲ與フベシ若水入テ不解脉
浮ナル時ハ表症アリ小便不利微熱消渴スル者ハ其熱膀胱
胱ニ傳エルモノニテ表裏不解故ニ五苓散ヲ用ヒテ表裏兩解
スル也發汗已脉浮數煩渴者五苓散主之ト云此又發汗ヒイ
一正脉猶浮數ナル者ハ表不解其上煩渴者ハ水液内閑
也小便モ必遠キカ通セヌアモアレシ此五苓散ヲ用ヒテ發汗

小便ニ利ノ表裏兩解スル也

中風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水水入則吐
者名曰水逆五苓散主之トアリ此風邪ニ傷ラレ發熱ノ六七
日不解ノ煩スルモノハ表證アリ其上ニ渴ノ水ヲ飲ヒト欲ノ
吐スル者ハ裏證アリ今渴ノ水ヲ與ユテ水入テ消セズ上逆
ノ吐セント欲スルモノ此ヲ水逆ト名ヅクコナゼナバ府入所ノ
熱邪其人素ヨリ停ル所ノ水飲ラツテ上逆元程ニ外ヨリ入ル
所ノ水ヲ拒テ受ツケヌ也故ニ水逆ト云此證モ必小便不利ス也
ノ也五苓散ヲ用ヒテ此モ表裏兩解スル也

霍亂頭痛發熱渴欲飲水小便不利者五苓散主之

霍亂水飲内ニ發ス故ニ吐泻交作風寒外ニ襲ニヨツテ

頭痛發熱身疼ム也熱多クシテ水ヲ飲ント欲ス是飲熱ナリ此モ亦五苓散ヲ用ヒテ兩解スルナリ

金匱云假令瘦人膀下有憆吐涎沫而癲眩アキ此水也五苓散主之瘦人ヨクダニ弱ノ人也膀下憆スルト云ハ膀下ノダククト動スルナリ此水也心下憆スルト云モ亦此水氣心ラ干サント欲スル者ナリ又膀下憆ホシト奔豚トナシント欲スルモノアリ此ハ陽虛ニ茯苓桂枝甘草大棗湯ノ證也今此症ハ吐涎沫ト云此水畠ニ逆スルモノナリ癲眩ハ眩暈スルナリ此上蕉ニ水飲アリテ陽ヲ阻ルモノナリ皆水飲ノナス所也故ニ頭眩正テ涎沫ヲ吐ソ動氣アリ必ス此方ヲ用ヒテ水飲ヲ小便ヨリ辛ヒレハ速ニ治スルナリ桂苓朮甘湯白朮澤浮湯モ此方ヨリ出

タルモノニテ何モ留飲ヲ去モノ也故ニジク頭眩ヲ治スル也按スルニ五苓散ハ表裏ノ劑ニテ太陽中風ノ證未止脉浮大胷ニ渴スルモノ此熱膀胱ノ府ニ傳ニタマ傳ニ傳ユル故ナリ此表裏ノ症ナリ故ニ桂枝ヲ用ヒテ表ヲ解シ白朮澤浮茯苓熱ヲ小便ニ下ス時ハ煩渴自ラ解スル也又白虎湯、表症已ニ解シ邪裏ニ傳工脉洪數ニ煩渴スルモノナリ誤リ混ズカラズ表症未止ト云ニ心ラツシシ此方散藥ニシテ用ニ方ナリ此ヲ服ソ後多ク緩水ヲ飲テ汗ヲ出也吳山甫カ說ラ按スル茯苓澤浮猪苓白朮性異ナリトイヘ正均ク水ヲ利スル功ハア也桂ハ辛熱ニ能氣ヲ和ス氣和ゾバ小便自ラ利ス小便利スハ熱小便ニ從テ泄ル、咽渴不治ソ自ラ除ク然リト云ヘ正汗下ノ後津液ヒトキ古出

通利ノ劑ヲ用ニバ重子テ津液ヲ亡ボシテ益其陰ヲ虧ト云此ト言此方ヲ用ニル端的也本條ニ云所ノ水逆ノ症ハ其人ト水飲停滯ナキモノハ水逆ノ症ナカバレ渴ノ小便不利ト云モノ必定ノ候ナリイツデモ此證カハラヌ的證ト思フベシ又病人身体發熱頭面汗出頭以下無汗咽渴テ小便不利身燥スル者ハ此熱外ニ不越ソ内ニ蓄ヘテ黃疸ラナスモノ也茵陳五苓散ヲ用ニベシ又濕ニ傷ラレテ遍身浮腫ソ泄浮スル者此散ヲ與フベシ又小便不通小腹痛ニ此ヲ按テ甚ハタ不堅此ヲ彈テ音アリ脉數ニン有力煩渴引飲スル者此散ヲ與フベシ

○猪苓湯 脉浮發熱渴欲飲水小便不利者此方主之

猪苓

茯苓

阿膠

滑石

澤泻

各一

六分

右五味以水四升先煮四味取二升去滓内膠烊消溫服七合日三服

按五味浮發熱元者ハ熱表ニアリ渴欲飲水者ハ熱裏ニアリ熱アル時ハ渴ノ能水ヲ消シテ反^{カシ}テ其水内ニ留テ小便通セサルモノナリ故ニ猪苓湯ヲ以テ小便ヲ通セシムナリ又五苓散モ脉浮小便不利トアリテ猪苓湯ノ症ニ似タリ然ニ五苓散ハ表裏ノ熱ヲ解スルモノニシテ桂枝湯ヲ以テ主トス猪苓湯ハ邪陽明ニアツテ渴ノ小便セサルモノニ用エルナリ故ニ滑石ヲ以テ主トス發熱渴ストアリニ表ヲ解スル剤ニ非ズ惟裏熱ヲ小使ヨリ去^ガモノ也又其外雜病熱アリテ小便不通或ハ麻病小便益ノ類此湯ヲ用ニベシ

○赤石脂禹餘糧湯 傷寒服湯下利不止心下痞鞭服淳
心湯已復以他藥下之利不止醫以理中湯與之利益甚理
中者理中焦此利在下焦赤石脂禹餘糧湯主之復利不止
者當利其小便

赤石脂一 禹餘糧一

已上二味以水六升煮取一升去滓三服

按此二服湯ト云六湯ハ蕩よナリ即下劑也心下痞鞭ヒカクスル者誤エラシテ此下スニエ也此虛痞也シコデ浮心湯ヲ服スト云半夏浮心湯
見ニルナリ然ルヲ又他藥ヲツテ此下ニテ其利不止醫又理中湯
ヲ以テ此ヲ投ズ其利益甚シウソ不止此理中ハ中焦ヲ理メ調フル
モノナリ此利ハ下焦ノ虛脫ダクニ中焦ニ預アリラズ故ニ赤石脂禹餘糧ヲ

以腸ヲ潤シ胞ヲ固ルモノ也其利可止若其ニテモ利不止時ハ
五苓散ノ類ヲ以テ小便ヲ利スル時ハ利自ラ可止トナリ

○桃花湯 少陰病下利便膿血者此方主之

赤石脂一 乾姜兩 稔米一

右半味以水七升煮米令熟去滓溫服七合內赤石脂末方
オヒ日三服若一服愈餘勿服

按此少陰病凡テ下利元者ニ溫藥ヲ用元虛寒ニ属
スルモノ也又少陰下利便膿血者此熱內營血ヲ傷也然
ルニ苦寒ノ劑ヲ用ヒズソヌ温藥ヲ用ユルモノハ日久シ多熱血
隨おテ去リ腎其邪ヲ受テ下焦固タフス滑脫ハツダクスルモノ也此方赤
石脂性濁ヨクテ腸ヲ養ヒ脱ハグラ固クス稩米中氣ヲ滋ハサミニ取此方

妙乾姜ニアリ才オカニ一兩ヲ加ユルモノハ其意温ニ非ズノ
火鬱ヲ散ズナリ此ヲ借テ以テ其膿血ヲ開テ化スルナリ若
一服ニ愈ハ餘勿服ト其滌劑元ラ以也然ルニ今用ヒ試ルニ數
服用ヒテモ何ノ害アルナシ此赤芍脂真物ナラザル故欵又
按ズルニ傷寒時疫ノ類便膿血スル者種々アリテ其熱ニ屬ス
ルモノ十七八間寒ニ属スルモノ一二アリ陽症内熱アリテ必鮮
血ヲ下ス陰症内寒ハ或ハ紫血ヲ下シ或ハ塊ラナス故發熱屢
作テ不止膿血ヲ下利ノ脉數ヲ水ヲ飲シト欲スルモノハ白頭
翁湯若臍下熱ノ病ムハ芍藥甘草湯或ハ黃連阿膠湯
此ラ主トル各不同惟此桃花湯下利甚シノ日久シクン虚
脫スル者ニ用ユルト知ルベシ

○黃連阿膠湯 少陰病得之ニ三百以上心中煩不得

臥者此方主之

黃連

四
一
五
二
分

黃芩

一
三
合

芍藥

二
六
分

雞子黃

二
三
枚

阿膠

三
九
分

右五味以水五升先煮三物取二升去滓內膠烊盡小冷內

雞子黃攬令相得溫服七合日三服

按スルニ此ニ三百少陰ノ病但欲寐四五日ニ至テ變ノ心中
煩ノ臥コラ得ズ但下利ニ止利清穀等ノ症ナシ此寒ニ非
ス乃熱ナリ黃連阿膠湯ヲ以テ熱ヲ去陰ヲ救フモノナリ
芩連以テ煩熱ヲ清クシ雞子黃阿膠陰血ヲ潤レ芍藥
陰氣ヲ收メテ邪熱ヲ泄ス故ニ傷寒瘟疫ノ類熱利虛極
ノ者必不可少又溫熱病膿血ヲ下利レ煩渴ノ臥コラ不得者

亦可用。

○旋覆代赭石湯 傷寒發汗若吐若下解後心下痞
鞶噫氣不除者此方主之

旋覆花三兩 人參二兩 生姜五兩 半夏半升

代赭石一兩 大棗十二枚 甘草三兩

右件七味以水一小斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升

日三服

按スルニ傷寒汗ヲ發スル時ハ在表ノ邪已ニ解ス若コレヲ吐
シ此ヲ下せ中下ノ邪已ニ解シテ心下仍痞鞶噫氣不除者
此汗吐下ノ後中氣傷レテ虛氣上逆ソ痰飲上ニ聚リテ
痞ラナレ或ハ噫氣ラナスモノナリ此方人參甘草正氣ヲ

養ニ虛ヲ補テ中氣ヲ安レ代赭石ノ重モノ能上逆氣ヲ
鎮メ旋覆花半夏ノ辛氣ヲ宣痰飲ヲ滌キ退クル故ニ
上逆ノ濁氣下リテ痞鞶噫氣自ラ消ス華氏云病解後
心下痞鞶噫氣不除ソ不下利者ハ旋覆花代赭石湯主之
若下利ソ噫氣スル者ハ半夏淳心湯主之兩端能考工見ルジ
○黃芩湯 太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯若嘔
者黃芩加半夏生姜湯主之

黃芩三兩 甘草二兩 大棗十二枚 大棗十二枚 药藥二兩

右四味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日再服夜一服
若嘔者加半夏半升生姜三兩

按スルニ此太陽少陽トノ合病太陽ハ發熱惡寒ス少陽ハ

寒熱往來ス此ニ證並ヒ見ルモノチリ若此症表邪盛ニシテ肢節煩疼スル者ハ柴胡桂枝湯ヲ用ヒテ表裏ノ邪ヲ解スベシ今此證裏熱盛ラノ自利スルモノ也故ニ黃芩湯ヲ用ヒテ其ノ裏熱ヲ和スベシ咽スル者ハ半夏生姜ヲ加ヒテ甲ヲ和シ逆ヲ下ス此方裏熱アリテ不和故ニ下利ス黃芩其熱ヲ清シ甘艸中ヲ和シ芍藥大棗脾陰ヲ補フ此熱ヲ清シ裏ヲ和スルニヨツテ利自ラ止ム又一切ノ雜病熱アツテ浮久不止者此方或ハ白頭翁湯ヲ二方擇ビ可用

○炙甘草湯 傷寒脉結代心動悸者此方主之

甘艸四兩 桂枝 生姜各三
炙甘草湯半升 麻仁半升

人參

阿膠各二

大棗三十

生地黃一升

右九味以清酒七升水八升先煮八味取三升去滓內膠烊消盡溫服一升日三服

按スルニ此症論中解シ難シ此汗吐下ニ因テ津液込ヒテ脉結代スルモノ欬心下ニ動氣アリテ尤巨里ノ動甚シキモノト見ユルナリ金匱ニ虛勞不足汗出而悶脉結悸行動如常不出百日危急者十一日死トアリテ此虛勞ラ汗出胸悶テ其上ニ脉結代スルモノハ行動常ノ如キモイト云厄日不入ソ死スルモノ也此方營血ヲ益シ脉ヲ通ス故ニ平人行動常ノ如クニノ脉不出者屢用ヒテ效アリ此方人參菖陽ヲ助テ血脉ヲ補ニ甘艸大棗桂枝營衛ヲ調和シ血脉ヲ順ス生地黃阿膠麥門麻仁ノ諸藥能血益レ脉ヲ通スルモノ

ナリ

○吳茱萸湯 食穀欲嘔者屬陽明也 吳茱萸湯主之
得湯反劇者屬上焦也

吳茱萸

二升

食入參

三四分半

生姜

六九分

大棗

十二四分半

故

右四味以水七升煮取三升去滓溫服七合一日三服
按スルニ此食穀欲嘔者陽明ニ屬スト云モハ胃、穀ヲ受納ル
モノ也今胃中寒ジテ穀ヲ納ルト不能故也ソレデ嘔シ
ト欲ス此湯中ヲ溫メ逆氣ヲ下シテ其嘔ヲ止ム也若此湯ヲ服
シテ反テ甚シキ者ハ必此中焦陽明ノ裏寒ニ非ズ乃太
陽ノ表熱也吳茱萸氣味俱熱藥ニメ病ニ應ゼズ故ニ
劇也葛根加半夏湯ノ證ナヘレ初此方ハ吳茱萸辛溫裏
熱也葛根加半夏湯ノ證ナヘレ初此方ハ吳茱萸辛溫裏

ヲ散ジ胃ヲ暖メテ嘔ヲ止ルナリ人參甘溫田陽ヲ益シ
中ヲ補フ大棗胃氣ヲ助ク生姜嘔家ノ聖藥ナリ故四味
以テ中ヲ溫メ逆氣ヲ下シ嘔ヲ止ム然ルニ吳茱萸飲ガタレ
少ニモ熱アルモノニハ應セヌナリ獨嘔日夕不止胃陽尽シ
ト欲スル者必求ルトコロナリ

○半夏瀉心湯

半夏

半九分

黃芩

四分半

乾姜

四分半

人參

已上各四分半

黃連

一升

大棗

十二

甘草

四分半

兩

右七味以水一斗煮取六升去滓再煮取三升溫服一升日三服
按スルニ此方傷寒、惡寒發熱アルノ症汗出テ表邪去ト云
凡但心下痞ノ不痛或嘔吐利元者此中氣順ラズ邪熱

心下ニ蓄テ痞滯スル也此方熱ヲ浮シ痞ヲ散シテ水氣ヲ追フ若心下痞レ^{ヒヤトコホリ}嘔ノ發熱スル者、柴胡湯ノ症也又下後心下満テ鞭ク按之手モ近ヅクベカラサル者ハ太陷胸湯ノ症也半夏浮心湯ノ症ハ發熱汗出テ其熱解スルト云ヘ正後心下満テ不痛ノ痞スル者ニ此方ヲ用ユベシ乾姜半夏ノ辛以痞ヲ散シ芩連ノ苦寒以熱ニ勝人參甘艸大棗^{甘以扶中氣}又一切ノ雜病浮アリテ心下痞シ或ハ不食或ハ濕浮暑浮ノ類利棗ノ劑ヲ用ヒテ其ノ浮不止者ニ用之數効アリ此方世人一切心下痞滯スルモノニ其ノ痞ヲ不辨ノ漫ニ用ユルモノハ甚誤り心下痞スルト云ヘ正太便祕スル者ハ不宜又發熱潮熱汗ノ症ニ用ユベカラズ方中乾姜ノ辛熱以テ芩連ノ苦寒ヲ推ト

見エテ熱多者ニ用ユル時ハ反テ熱ヲ助ケテ不宜也惟心下ノ濕熱水氣ヲ去ド云フラ且當トスベシ故ニ酒客ノ人心下痞ノ不食スル者ニ用ヒテ効アリ此方痢疾ノ調理ニ用ヒテ宜ト云ヘ正若未邪毒不^{ハシキ}時ハ下利止瀉^{ヨリカキ}テ後重增^{ハシキ}モナリ此方濕熱水氣ヲ乾カス^{ハシキ}見ヒレ先虛痞ニハ半夏浮心湯實痞ニ三黃浮心湯ヲ用ヒテ也

○生姜瀉心湯

生姜

四分半

甘艸

四分半

人參

各三分

乾姜

一分半

黃芩

三分

半夏

三分

黃連

二分半

大棗

各二枚

四分半

右八味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

按スルニ此方其人素ヨリ胃氣虛ノ兼テ脇下ニ水氣アリ此誤リ下シテ餘熱虛ニ乘ソ裏ニ入テ胃中和セズ穀氣不和故ニ心下痞鞭乾噎ノ食ノ臭^香忌モノ也水氣行ラザル故ニ腹中雷鳴^{ライメイ}レテ下利スルナリ主ドルニ生姜浮心湯ヲ以テスルモノハ其意水氣ヲ散ズルニアリ先ハ嘔多キモ^ノニ用元也因テ生姜四兩ヲ加フルモノ也此仲景ノ妙處ニ^ノ兩目違ニ因テ用ニ所ノ方ノ意味ヲ見バシ後人ノ兩目カ又ト云モノ論スルニ足哉

○甘艸浮心湯

甘艸四分半
大棗十二枚
黃芩四分半
乾姜各三半
半夏升九分
黃連二分

右六味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

按スルニ此方本傷寒中風誤リ下シテ其久下利日夕不止日夜數十行ラ穀不化腹中雷鳴ノ心下痞鞭シ或ハ満或ハ乾嘔心煩シテ安カラザル也此火熱上ニアツテ下水ニ交フラ得ズ故ニ心煩ソ不安也醫心下ノ痞ヲ見テ病不^ノ急トシテ復下之因テ下ルモノ益下リ上ルモノ益上リテ其痞益甚シテ此熱結ニアラズ又寒結モ非ズ誤リ下スヨリテ中氣虛ノ邪氣上逆シテ痞ラナスモノ也故ニ甘艸浮心湯以テ其急ラ緩クノ中ラ和スル也方甘艸ヲ以テ名トスモノハ和緩ノ意ニ取ルモノ也甘艸大棗ノ甘中氣ノ虛ラ助ケテ急ラ緩クヌ

半夏ノ辛逆ヲ降シ嘔ヲ止メ芩連ノ苦寒、痞熱ヲサリ
乾姜ノ温^{タク}痞中ノ水寒ヲ散ス故ニ此方中ヲ緩クシ逆ヲ
降シ痞ヲ浮シ煩ヲ除ク寒熱并べ用ヒテ上逆ヲ下スト云カ
此方ノ主意ニ人參ヲ去ハ氣ノ上逆ニ害アレバナリ
○予治一婦人其ノ患痢疾其ノ初用下剤裏急後重去腹痛
止邪大半除而後嘔不止雖用半夏浮心湯生姜浮心湯小
半夏湯等嘔益甚於此用甘艸浮心湯治其上逆、一服而嘔
止不數貼日快食進復常

此證何ホド嘔ヲ止ルノ劑ヲ用ヒトイヘ反テ嘔甚シウソ不
止モノ此中氣虛ノ上逆スルモノ也故ニ甘艸ノ甘ヲ以其寧
緩ノシ上逆ヲ降^{タク}サシムルナリ是以効アリ

○三黃湯 心氣不足呴血衄血此湯主之

大黃二兩

黃連

黃芩各一兩

右三味以水二升煮取一升頓服之

按スルニ此方本伊尹三黃湯ト云又ハ食公火濟湯ト名ヅ
クト云ヘニ俱ニ書ナケバ云傳エタル追也傷寒論ニ大黃
黃連二味ニテ大黃黃連浮心湯ト云此方心氣不足トアリ
方名ハ浮心湯トアリテ論ト方ト相違ノヤウニ見元々金匱
ニ心氣不定トアリ此ハ足ト定ト文字誤リタルカト云ヘドモ
不定ト云テモトクツズヌナリ先此方ハ丹溪云ヘルゴト其人
少陰心經不足ニヨシテ心陽甚盛^{タク}陰血妄行^{タク}ノ血上衝
出ルモノナリ故ニ大黃其亢所^{タク}甚シキ火ヲ下シ芩連ヲ以

テ心肺ノ火ヲ救時ハ心肺ノ火退キ陰血自ラ其木ニ護テ
平和ナラシムモノ也故ニ心氣不足吐血衄血ヲ治スルソ主劑
トナスベシ尤此時生地黃ヲ加ヘテ甚ダヨシトス又此湯一
切血症勿論其餘男子婦人三焦ノ積熱上焦盛ニノ
心ニ攻衝狂癇ヲナレ或々眼目赤腫頭頸腫痛或ハロ舌
瘡ヲ生シ甚シキ者ハ積氣心ニ衝上リ煩燥不安飲食不
進小便赤澁大便秘結レ五臟俱ニ熱シ或々痔疾下血ノ
肝門腫痛スルモノ悉ク此方ヲ用ヒテ主トスベシ又傷寒論
太黃黃連ノ二味ヲ以浮心湯ト名付テ心下ノ痞ヲ浮スヒ主
剤トメ心下按之濡上云醫宗金鑑ニ不濡上不ノ字ヲ入タルモ
亦鑒說ト云ベシ若痞滿硬實ト云時ハ承氣湯ヲ用ユル也

此痞ト云ハ邪熱心下ニ聚リテ痞結スルモノナリ故ニ傷寒
論ニ大下後復發其汙心下痞惡寒者表未解也不可攻
痞先當解表々解乃可攻痞トアル見心下ニ大下テ後汙ヲ
發シ誤治ニ因テ心下ノ痞スルト云ハ邪熱心下ニ集タルモノニテ
濡ト云ヘシ不濡ト云ベカラズ

○木防己湯 脊間支飲其人喘滿心下病堅面色黧黑其
脉沈緊得之數十日醫吐下之不愈宜木防己湯虛者即愈
實者三百復發復愈不愈者去石膏加茯苓芒硝湯主之
木防己三十九 石膏一枝半 雞子大桂枝二四十 人參四八分
右四味以水六升煮取二升分溫再服
按スルニ支飲膈間ニアル故ニ氣血通利セズ通利セザル時ハ

氣ト水ト同ク肺ニ逆ソ喘満ヲ發ス血利ガル時ハ血ト水ト心
下ニ雜リ結テ痞堅ラナス而色黧黑ハ此凝血ノ色亦黑
レ故ニ其色獨面ニ見ル、ナリ脉沈ハ飲トス緊ハ寒トス此
寒邪ニ非ズ水氣ノ寒ナリ得之數十日ハ支飲甚シレウタ
正氣虛スルナリ醫吐下ノ治方ヲ以テスト云企藥病ニ白セズ
メ徒ニ吐メ其陽ヲ虛シ此ノ下レテ其陰ヲ虛スル故ニ愈
ザルナリ木防ニ湯ハ脾曾ラ補助ノ飲ヲ散ズルニヨツテ虚
者得之即愈實スル者ハ暫愈テ復發ス此舊飲未父
去ズノ新飲繼テ停ルモノ也故ニ復發ソ不愈其實スルヲ以
テ有宜木防ニ湯ニ石膏ヲ去テ茯苓芒硝ヲ加ヘテ以堅ラ
輒ニ水飲ラ下スベシ

○木防己加減茯苓芒硝湯

防己

六分

桂枝各四分

人參四八分

芒硝

三一分

茯苓四分

兩八分

右五味以水六升煮取二升去滓内芒硝再微煎分温再服

微利則愈

此木防己湯ハ防己太小使ヲ利シ痰飲濕熱ヲ散ズ石膏心
肺ニ逆氣ヲ治ム桂枝水道ヲ宣通ス入參氣ヲ補而胃陽
助ク正氣旺スル時ハ水飲散ズラ不待ノ自ラ散ベ木防己根
芩芑硝湯ハ芒硝ノ酸寒ヲ以テ痞堅ラ更ニシ茯苓ノ甘淡
ヲ以テ痰飲ヲ滲ス按スルニ此二湯客邪ニ因テ流飲心下ニ留
マリ肺ニ逆メ喘満痞堅ラナスモノ此方ヲ以テスベシバ邪氣万

ニアツテ輕ク故ニ木防己陽ヲ以テスラハ邪血分ニアツテ重レ
故ニ也硝ヲ加フルモノ也

○葶苈大棗浮肺湯 肺癰喘不得臥者此方主之

葶苈

熱令黃色搗
力加彈丸大

大棗枝

右先以水三升煮棗取二升去棗内葶苈煮取一升頻服
按スルニ肺癰ハ口中ニメスラ乾燥ノ胸中ニシク痛ニ脉數實ニ
又喘ラナシ臥スト不能モノナリ是邪肺ニ止マリ肺氣甚々急
迫スルナリ故ニ葶苈大棗浮肺湯大苦本寒剤ヲ用ヒテ
急ニ肺邪ヲ浮スベレ稍遲クシテ脹ラナス時ハ難治ナル又按
スルニ肺癰ハ此危症ナリ初叢ノ時戰ク此ラ知テ宜ク此ラ
攻ムベシ若遲キ時ハ救カタシ其人平日飲ラ好ミ或ハ膏味

ヲ嗜ム人痰濕盛ニシテ肺ヲ犯ノ肺癰トナラント欲スルモノ
ハ皂莢丸ヲ以テ其肺ヲ利スベシ又肥盛ニ喘滿レ痰多キ
者ハ葶苈海肺湯ヲ以テ其肺ヲ浮スベシ若其心火ヲ忍
ニテ平道ヲ守テ遲滯ニメ膿已ニ成時ハ獨其死ヲ待ノ

皇朝詩林卷之三

宋人詩

卷之三

宋人詩

卷之三

宋人詩

卷之三

宋人詩

卷之三

宋人詩

卷之三

