

Kodak
LICENSED PRODUCT

© The Tiffen Company, 2000

KODAK Color Control Patches

Centimetres



門武
孫 247
卷 3 止

古方節義卷之下

城州 伏陽 内島保定 著
明人 土州 岡 瑞鑑 校

○小建中湯

桂枝 甘草各三 大棗十二

芍藥六 生姜二 膠飴一

右六味以水七升煮取三升去滓内膠飴更上微火消解温服一升日三服

此方傷寒二三日心中悸而煩者主之金匱云虚勞裏急悸衄腹中痛夢失精四肢痠痛手足煩熱咽乾口燥小建中湯主之愚按スルニ傷寒論ハ傷寒ノ為ニ發之金匱ハ虚勞ノ

古方節義 小建中湯



為ニ發之各同シカラスト云ハ傷寒ニ二百病尚太陽ニラテ
麻黃湯桂枝湯ノ類ヲ用ユキニ然ルニ其人虚心中悸ノ煩ス
心悸ハ氣虚也煩ハ血虚也此氣血内ニ虚ス故ニ小建中湯ヲ與
テ正ヲ養耶ヲ祛モノ也此病本發表ヲ用ユキ證ナレ其人氣
血虚弱ニ心中悸ノ煩スルニヨツテ氣血兼補ノ藥ヲ用ヒテ治之
又
金匱ニ虚勞ニ用ル意ハ裏急ニテ腹中痛四肢痠痛手足煩熱
スル者ハ脾虚ナリ悸ハ心虚ナリ血ハ肝虚ナリ失精ハ腎虚也咽
乾口燥ハ肺虚也此五藏皆虚ノ至ハ萬物ノ母タリ故ニ此方
ヲ用ヒテ先其脾土ヲ建ル時ハ諸症自ラ除キ去モノ也又此方
本傷寒ノ桂枝湯ノ變方也桂枝湯ハ發汗ノ劑小建中湯
ハ芍藥ヲ倍ノ氣血陰陽兩補ノ劑トス仲景用ヒテ虚勞勞

倦ノ主劑トス又金匱ニ勞之為病其脈浮大手足煩ト云然
ルニ今テ虚勞ノ脈ヲ診スルニ多ハ虚數ニシテ甚則虚細數此湯
ト脈ト不應然ルニ仲景以此湯ヲ治之小建中湯黃耆建中
湯ハ氣血陰陽兩虚ヲ補フ劑也陽生陰長スル時ハ血液自然ニ潤ニ地
黃當歸ノ類ヲ用ヒテ直ニ滋潤ノ劑ヲ不假ト云ハ勞熱自然
ニ退キ虚數ノ脈自然ニ平ナルモノ也若火動盛ニ燥渴ノ證甚
キ者ノ為ニハ八味腎氣丸ヲ製スハ味丸ハ八兩ノ生地黄大甘寒ノ
品ヲ用ヒテ急ニ下焦ノ腎火ヲ消シ桂附各一兩ヲ以テ甘寒ノ
生地黄ヲ監ス此仲景治勞虚ノ手段又虚損不得眠者酸
棗仁湯内乾血アリテ勞ヲナス者ハ大黃廋虫丸ヲ用ユ今ノ人
殊テ不用惟滋陰降火湯ノ類甚キ者ハ太補益氣歸脾湯ヲ用ユ

ルモノ俱ニ論ズルニ足モノナシト云ベシ初又黄芩建中湯ト此方トハ
ニ方俱ニ虚勞勞倦ノ藥ニ氣血兼補フノ藥也其中ニ補陰ノ
功ト裏急腹痛ヲ治スル此方優レリトス裏急腹痛ハ血虚ニ因ル
補陰ハ則補血ナリ初氣ヲ補ヒ保肺衛氣ヲ固クスルハ黄芩建
中湯ヲ優レリトス又虚勞ニ非ストイヘ氏其人腹中攣々心
ノ按之堅ク引張モノ或ハ積聚日久不退動氣アルモノ
盡ク此方ヲ用ヒテ宜トス此所謂中ヲ緩シ肝ヲ制シ脾ヲ
補フノ妙方ト云ベシ又此湯ヲ温補ノ劑トナシテ用ユルモノ
アリ又補陰ノ劑トシテ用ユルモノアリ陽虚ニ用ユルモノ
トナリ陰虚ニ用ユルモノハ補血トナル又仲景ノ時虚勞勞倦ノニ
ツラ分タス齊ク此方ヲ用ユル此仲景ノ妙思議スベカラガ

ルモノナリ後人ノ及ブ所ニ非スト云ベシ又黄芩桂枝芍藥
各三两ツク等分ニシテ桂枝五物湯ト名ツケテ富貴奉養ノ
人常ニ筋骨弱ク勞ソ汗出微風ニ感シ其風血分ニ入テ
身體麻痺スル者ヲ血痺ト云此方主之又小建中湯ニ當歸
ヲ加ヘテ内補當歸建中湯ト名ツク婦人産後虚羸不足腹中
刺痛不止小腹急痛背腰ニ引痛者ヲ治ス又千金方ニ産後
一月日ニ四五劑ヲ服ノ令人強壯ト云當歸辛温ニ補血
ノ主劑タリ故ニ産後ノ主方トス

○大建中湯 心胸中大寒痛嘔不能飲食腹中寒上
衝皮起出見有頭足上下痛而不可觸近大建中湯主之

蜀椒合ニ六分 乾姜四一分五分 人參二一分

右三味以水四升煮取二升去滓內膠飴一升微火煎取一升半分温再服如一炊頃可飲粥二升後更服當一日食糜温覆之

心胸中大寒痛八腹中上心胸ニ連テ大ニ痛也此大寒痛ナルモノナリ或ハ欲冷ノ脉伏スルヲ可有嘔逆不能飲食者ハ此寒甚シク中ニ拒ムモノ也上衝皮起出見頭足モノハ此寒甚シク外ニ聚リテ見ルモノナリ上下痛手ニテ觸レ近ツクベカラス内藏府外經絡痛甚シ此皆寒ノチヌ所故主之ニ大建中湯ヲ以ス
按スルニ此方寒氣内ニ入腹痛甚シク腹中頭足アルコトク甚シクハ腹中持上ルカ如クムクトナツテ痛ムモノアリ或ハ虫痛ニ

寒ヲ兼テ痛ムモノニ用ヒテ宜トス然レ今ノ人小建中湯ト同シク思ヒ大小トアルニ付テ小建中湯ノ應セヌ者ニ大建中湯ヲ用ユルヤウニ覺ルハ誤ナリ初ゾリ小建中湯トハ立ノ違ヒタルモノ也蜀椒乾姜大ニ寒邪ヲ散シ人參膠飴大ニ中氣ヲ建ルモノナリ服ノ後覆テ微汗ヲ取ル寒去テ痛止此心胸中ノ寒ヲ治スルユエナリ

○柴胡加龍骨牡蠣湯 傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利譫語一身盡重不可轉側者主之

半夏合ニ 大棗六枚 生姜 人參 龍骨 鈔丹 桂枝 茯苓 牡蠣各一兩半 大黃二兩 柴胡四兩 右十一味以水八升煮取四升內大黃切如碁子更煮一二

沸去滓温服一升

按スルニ此八九日トイヘ凡邪解セズノ表未盡誤リ下スハ
ス若此ヲ下ス時ハ其邪虚ニ乘ソ在上輕時ハ胸滿重時ハ
結胸トナル在中時ハ煩ノ驚ス小便不利モノ裏虚シ
津液メグラガル也重時ハ狂煩ノ譫語ス此皆熱心ニ乘ソ
心神不安ナリ又此方胸滿ノ煩スルモノヲ除ト云モノハ龍
骨牡蛎鈆丹神氣ヲ收メテ驚ヲ鎮メ茯苓心氣ヲ收メテ
能津液ヲ通行ス大黃瘀熱ヲ逐テ譫語ヲ止ム桂枝陽氣ヲ
行ラシテ身重キヲ解ス故ニ種々交リ出ルノ邪ツキガルモノヲ治
スルヲ知又婦人瘀血ヲ兼テ動氣甚シクノ大便不通心志
不安者此方ヲ用ヒテ數効アリ

蜀漆
常山ノハ

○桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蛎救逆湯 傷寒脉浮醫以
火迫劫之亡陽必驚狂起臥不安者此方主之

- 桂枝 兩三
- 甘草 兩二
- 生姜 兩三
- 牡蛎 兩五
- 龍骨 兩四
- 大棗 枚十二
- 蜀漆 兩三

右為末以水一斗二升先煮蜀漆減二升内諸藥煮取三升
去滓温服一升

按スルニ傷寒脉浮ナルニ醫桂枝麻黄ノ類ヲ用ヒズノ火ヲ
以テ此ヲ劫カス故ニ火邪ニ因テ神明散乱ノ驚狂起臥
不安也火ト云火鉢爐ナリテ温メテ汗ヲ出ス類ナリ此
因テ氣上逆シフラクトシテ甚シキ時ハビククトシテ驚癇
ノ如ク起臥不安ナリ或ハ常ニ熱湯ニ入或ハ火ノ強キ火

救逆湯

燻ナドニ寐テ大ニ氣上リ眩暈ヲナシ氣ヲ取失ヒナトスルモノ同
 シ此湯ヲ用ヒテ効アリ此方桂枝湯ノ方内ニ於テ芍藥ヲ去モ
 ノ芍藥陰性ニ遲滯ス迅ニ陽位ニ達セシメテ急ヲ救シテ
 欲ス故ニ是ヲ去モノ也蜀漆氣味寒苦寒能熱ニ勝
 苦能逆ヲ降シ火邪ヲ退ク龍骨牡蛎神氣ヲ收テ火逆
 驚動ヲ治ス也

○桂枝人參湯 太陽病外證未除而數下之遂協熱而

利利下不止心下痞鞭表裏不解者此方主之

桂枝 甘草各四合 白朮 乾姜 人參各三分

右五味以水九升先煮四味取五升内桂更煮取三升温服

一升日再服夜一服

此太陽表裏解セズノ痞ヲナスモノ也太陽ノ病外症未除
 者ハ肌表未解也數下之時ハ遂ニ其中氣ヲ虚ノ外邪乘
 虚ノ裏ニ入實ヲナスノ協熱利トナル協ハ音カク合也ト
 アリテ表裏合セテ解セサル也外未除ノ復痞鞭ノ下利
 ス此表裏不解故ニ桂枝ヲ以外ヲ解シ參朮姜棗ヲ
 以テ中ヲ温メ表解ノ裏亦和ス正復ノ邪自ラ去モノ
 ナリ

按スルニ此方傷寒中風ノ症惡寒發熱スルモノ其脈沉遲
 或ハ微弱ニ下利スルモノハ此裏虚也此方ヲ用テ不下ト
 云ハ其初發ニ脈力無弱キ者用之補虚發散ノ劑トナス
 一シ大柴胡湯ハ泻也桂枝人參湯ハ補也皆下利痞鞭

ヲ治スルモノヲ虚實ノ異ナルモノ也

芍藥甘草湯

白芍藥

甘草各四兩

右二味以水三升煮取一升半去滓分温再服之

按スルニ此方芍藥ノ酸以テ血ヲ和シ又能收甘艸ノ甘以

テ此ヲ緩クス酸甘相合ノ血脉ヲ和シ陰血ヲ補フ故ニ今

足攣急ノ不伸者此方ヲ用ヒテ數効アリ大劑トナシテ

用ヒテ試ミ知ルベシ理外ノ功ヲ得ルアリ

桂枝甘草湯

發汗過多其人又手自冒心心下悸欲得

按者此方主之

桂枝四兩

甘草二兩

右二味以水三升煮取一升去滓頓服

按スルニ汗多時ハ血ヲ傷ル血傷ル時ハ心虚ス心虚スル時

ハ心氣不安ノ動氣アツテ悸ク故ニ手ヲ交工自ラ心ヲ按

エテ人ノ按ヲ欲スルナリ桂枝心陽ヲ助テ逆氣ヲ下シ

甘草此ヲ緩クスルナリ故ニ心悸自ラ止ムナリ

○茯苓桂枝甘草大棗湯 發汗後其人臍下悸者欲作

奔豚此方主之

茯苓

甘草

大棗

桂枝

右四味以甘瀾水一斗先煮茯苓減二升内諸藥煮取三升

去滓温服一升日三服作甘瀾水法取水一斗置太盆内以

杓揚之水上有珠子五六顆相逐取用之

按スルニ此乃心中ノ陽虛ノ本經自ラ病モノ也其人臍下
 悸スル者ハ此乃心陽虛腎ノ邪水虛ニ乘ノ上心ヲ干サ下欲
 スルモノ也故ニ奔豚ノ形ノ如ク臍下ヨリ心下へ衝上ニ下欲ス
 ル也此方心氣ヲ保テ腎邪ノ上奔ヲ防グモノナリ甘草大棗
 中上ヲ補テ水邪ヲ制スナリ甘瀾水ハ掲之水性ヲ緩クシ
 水氣ヲ助ケガルニ取モノ也

○芍藥甘草附子湯 發汗病不解反惡寒者虛故也此
 方主之

芍藥 一匁二分
 甘草 各三兩一分二分
 附子 一枚六分

已上三味以水五升者取一升五合去滓分温服
 按スルニ未汗セスノ惡寒スル者ハ邪盛ニノ表實ス麻黃湯ノ

證也汗能發スト云ハ凡病解セス反テ惡寒スルモノハ邪退
 表虛スルモノ也此方之ヲ主トル汗ヲ發メ解セサルハ熱尚ア
 ル故ニ芍藥ヲ以テ陰ヲ救フ陽虛スレハ惡寒ス故ニ附子
 ヲ以テ表陽ヲ堅クスル也又此方芍藥甘草湯ト同シク熱
 ナク腰痛或ハ足攣急シテ痛ム者ニ用ヒテ効アリ此時世
 醫五積散杯ヲ用ユルアリ五積散ハ多味ヲ無用ノ藥多シ
 蜀此方ハ單方ナリ甚効アリ

○竹葉石膏湯 傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐者此方
 主之

竹葉 一把
 石膏 一觔
 半夏 半升
 人參 三兩
 甘草 二兩
 粳米 半升
 麥門冬 一升

右七味以水一斗煮取六升去滓内粳米煮米熟湯成去米
温服一升日三服

傷寒解後虚羸スル者ハ傷寒中ニ熱ニ傷ラレ或ハ汗シ或ハ
熱ニテ食不進或ハ耳鳴氣上逆ノ津液ヲ亡シテ必虚羸ス
ル也此時脾胃未全飲食化シ難ク其餘邪飲ヲ挾テ胃
ヲ犯ス故ニ欲吐也此湯ヲ以テ主トス

按スルニ此方即白虎湯去知母加人參麥門冬半夏竹葉モノ
也大寒ノ劑ニシテ清補ノ劑タリ且石膏ハ胃熱ヲ涼シ人參甘
草益氣竹葉麥門冬津ヲ生シ虚煩ヲ除キ半夏逆氣ヲ下シ
痰飲ヲ逐粳米胃氣ヲ助ク故ニ此方津液ヲ生シ逆氣ヲ
下シ嘔ヲ止ム又一切ノ氣逆ニ因テ頭痛耳鳴目痛齒痛者皆

此方ヲ用ヒテ逆氣ヲ降ス時諸症自ラ祛ルモノ也又傷寒時
疫熱解メ後耳鳴或ハ不聞頭重シ動搖スル者此方ヲ用ヒテ
餘熱ヲ涼シ逆氣ヲ下ス時ハ津液潤ヒ上逆治メ元氣本ニ
復メ能食進テ日ニ快クナルモノ也

○桂枝附子湯 傷寒八九日風濕相搏身體疼痛不能自
轉側不嘔不渴脉浮虚而濇者此方主之若大便堅小便自
利者去桂加水湯主之

- 桂枝 四兩
- 附子 三枚
- 生姜 三兩
- 甘草 二兩
- 大棗 十二枚

右五味以水六升煮取三升去滓分温三服
按スルニ此方風濕ニ用ユル方也風濕ノ治方種々アリトイヘ
在此湯風濕相搏身體疼痛不能轉側不嘔不渴脈

浮虚ニ瀼ナル者主之トアリ身体疼痛スル風ナリ不能轉側
 八起臥ノ自由ニナラザルヲ云此濕ナリ脉浮虚ハ表虚ナリ瀼ハ
 寒濕也不嘔不渴ト云ラ目アテトスベシ此傷寒ト同ジカラス又
 身體疼痛トアレソニ限ラズ一身ノ内手ニテモ足ニテモ頭ニテモ
 熱ナク多痛甚シク脉浮虚ニ瀼ナル者ハ多クハ寒濕也必此
 方ヲ用ユベシ若浮實ニシテ身體疼痛煩スル者ハ麻黄加木湯ヲ用ヒテ
 大ニ其風濕ヲ發ス若其人大便鞭小便自利スル者ハ去桂枝加
 白朮附子湯ヲ用ユベシ此大便堅ハ邪熱裏ニ入テ鞭キニ非ズ
 風濕ニ因テ燥テ堅也下スヘカラス去桂加木湯ノ桂枝ヲ去モ
 ハ大便堅小便自利スル故ニ再ビ汗メ其津液ヲ亡スヘカラサレ多
 ナリ加白朮モノハ濕ニ因テ身重不能轉側又濕肌肉ナリ

故ニ此ヲ加ヘテ分肉ノ濕ヲ去ル也

○甘州附子湯 風濕相搏骨節疼痛不得屈伸近之
 則痛劇汗出短氣小便不利不欲去衣或身微腫者此方主
 之

- 甘州二附子二 白朮二 桂枝四
- 兩 枚 兩 兩

右四味以水六升煮取三升去滓温服一升日三服初服得
 微汗則解能食汗出復煩者服五合恐一升多者服六七合
 為妙

按スルニ此風濕ノ重キモノ也濕ハ為陰邪故痛風ハ為陽
 邪故ニ煩ス又風ハ上ヨリ受濕ハ下ヨリ受風濕相搏テ聚ルニ
 至テハ經絡關節骨髓軀殼ノ間處トメ流レ至ラザルコトナシ

流注スルニヨツテ処トノ無不痛故ニ不得屈伸也此症汗出
多クハ亡陽ス亡陽スレバ短氣ス濕勝トキハ水氣不行ノ小便
不利ナリ惡風不欲去衣ハ風肌表ヲ傷テ表陽虚スユエナリ
濕外ニ薄リテ微腫スルアリ比日陽虚風濕ノ症ト知ル今此
方ニ加附子テ虚腫大温補劑トス甚効アリ後世ノ壯原湯
實脾飲ニ勝レリ

○乾姜附子湯 下之後復發汗晝日煩躁不得眠夜而
安靜不嘔不渴無表證脉沉微身無大熱者此方主之

乾姜 兩 附子 一枚三分

右二味以水三升煮取一升去滓頓服

按スルニ此方傷寒太陽ノ症誤下シテ後復發汗晝日煩躁

不得眠夜ハ反テ安靜也不嘔不渴無表證脉沈微ニシテ無大
熱モ人陰不病ノ陽病モノ也然ニ今此ヤウチ誤治ハナシ
故ニ中寒トシテ用ユル也此方房後寒毒ニアタリタル者ニ
用ユト云北山氏評之曰此健夫勇士或山野ノ鄙人藏氣不
乏者陰事ヲナシテ陰寒内ニ伏藏ノ逆冷スル者ニ用ユニシ虚人
ニ必ス人參ヲ加スシト云サレ凡中寒ノ急症ニ人參白朮モ反テ
邪魔ニテテアリソレテ後世姜附湯ト名ツテテ中寒ノ急症ニ用ユ
ルナリ

○四逆湯

甘草 二兩一分 乾姜 兩一分 附子 一枚一分

右三味以水三升煮取一升二合去滓分温再服強人

可用大附子一枚乾姜二兩

按之此方正面ハ少陰ノ直中ニ用ユル方也然ルニ少陰ノ症
ニ色々アリ先直中ト云テ寒邪腎藏ヘ直中テ陰寒ニ
属スル症アリ又初陽經ノ邪陰經ニ傳テ少陰經ニ至テ傳經
ノ熱證トナルアリ又傳經ノ熱証變ノ少陰ノ寒症トナルア
リ何モセヨ少陰ノ証ノ遁レ又目アテハ本論ニ云為少陰之
病脉微細但欲寐也トアリ此一句少陰經ノ物体エアツカル
直中ノ寒證ニモセヨ傳經ノ熱証ニモセヨ未傳ノ寒中ニモセヨ脉微
細ニ倦臥ト身ヲ屈メテ但欲寐サレトツト寐入コハオラズモ
也少陰ノ症ナレハ必此症ヲ見ハス此症ナレハ少陰ノ症ニテ無
ト知ベシ又本論ニ云少陰病脉沈者急温之宜四逆湯トア

ル此四逆湯ヲ用ユキ症トイヘ但脉沈トハカリニテハハカレ又右
云通り少陰ノ傳經直中ニ此脉ト此證トアルナリ此方ヲ用
ユル目アテハ初表證或ハ三陽ノ證ヲ見ハシテ後其證變ノ脉
沈細數ヲ見ハシ口中燥テ大便不通者傳經ノ少陰ノ熱證
也此ニ大承氣湯ヲ用ユシ若是時手足厥冷スルモノハ熱
厥也四逆散或ハ當皈四逆杯ヲ用ユル也若未傳寒中ノ
証トナツテ脉微細ヲ欲寐口渴小便清白ナル者ニハ四逆
湯ヲ用ユル也又此方通ノ三陰ノ証脉沈ニ惡寒シ手
足逆冷或ハ傷食吐瀉ノ手足厥冷スル者ニ此方ヲ用ヒテ大
温補ノ總司トナスベシ尤此時ハ四逆加人參湯ヲ用ユベシ
附子ハ上頭項ヲ行ラシ外肌表ニ徹シ經ヲ温メ寒ヲ散

ス乾姜藏府ヲ温ム甘州ヲ多用ヒテ其性ヲ緩クシテ
乾姜附子ノ熱ヲメ久ク内ニタモクシメテ藏府ニ深ク徹セシ
メント欲スルモノナリ甘州一兩乾姜一兩トアリテ甘州乾姜
ニ一倍也附子一枚ト云ハハ藥肆ニ云三十掛ノ附子一枚ニ
五錢目程アル附子也

○茯苓四逆湯 發汗若下之病仍不解煩燥者此方
主之

茯苓六兩 人參一分半 甘草五合 乾姜一兩 附子一枚
右五味以水五升煮取三升去滓温服七合日三服
按スルニ此方正面ノ證ハ太陽ノ症發汗或下之其病不解
煩燥スル者ニ用ユル方也四逆湯ニ人參一兩茯苓六兩ヲ

加ユ煩ハ心煩ナリ躁ハ腎躁ナリ乾姜附子入腎以テ躁ヲ
除ク人參茯苓心ニ入テ煩ヲ解スルナリ茯苓ヲ三倍用ユル
意ハ茯苓ハ緩キ藥ニテ多ク用ヒ子ハ功ナキモノ也茯苓ハ
茯神ト同物ニテ補心ノ藥ト同ク用ヒテ心煩ト胸中ノサワ
カシク息イキタハシキヲ止ムモノナリソレテ四逆湯ヨリハ藥和ワス
シテ峻スベニナキ方也凡無汗アツノコレニ因テ煩躁スルハ大青龍
湯ヲ用ユ汗多出テ煩躁スルハ茯苓四逆湯ヲ用ユルナリ
此汗出ズノ煩スルト汗多ク煩スルトノ異アリ極テ肝要ノ
意得ナリ能考フベシ

○真武湯 少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不
利四肢沉重痠痛自下利者此為有水氣其人或欬或小便

利或下利或嘔者此方主之

茯苓^{七分半} 芍藥^{七分半} 生姜^{各三} 白朮^{二分} 附子^{一枚}

右五味以水八升煮取三升去滓温服七合日三服

按スルニ傷寒論中有水氣發熱有汗煩渴引飲小便不利者太陰ノ中風ニシテ五苓散ノ證也無汗乾嘔不渴小便不利者太陽ノ傷寒ニ屬ス小青龍湯ノ証也今少陰ノ病ニ三日不已四五日ニ至テ腹痛下利スル者ハ陰寒ノ深キ也小便利スル者ハ此純寒ニシテ無水附子湯ノ証也今小便不利或ハ欬シ或ハ嘔スル者此陰寒ニ水氣ヲ兼タルモノ也故ニ水寒ノ氣外表ヲ攻ル時ハ四肢沉重疼痛ス水寒内裏ニ盛ナル時ハ腹痛自利スル也水氣上衝胸膈ニ停ル時ハ咳

喘而臥ヲ不得若水中焦ノ府ニ停ル嘔ノ下利スル也又下焦膀胱ニ停ル時小便不利或ハ小腹滿ル等ノ諸症總テ陰寒ノ水ニ屬スルモノニシテ五苓散ノ表熱ノ飲ニ非ス又小青龍湯ノ表寒ノ飲ニモ非ス唯真武湯ハ寒ヲ温メ水ヲ制スルモノ也今此方或附子ヲ以テ温補ノ物司トシ傷寒時疫ハ勿論諸病向死脉虚微者ハ可用然ニ又其症熱不涼元氣疲テカケル者多シ能小便清濁舌ノ燥潤ヲ見ルベシ又時疫ノ類其熱日久不涼脉按之無力咽不渴不食ノ元氣疲テ見ユモノ熱アリト云ハ見合テ此ニ方ヲ選用ユベシ其上ニ熱強ク出テアリト云ハ先此温補ノ劑ヲ用ヒテ元氣ヲ引立其後又解熱下劑ヲ用ルアリト知ベシ若下地元氣疲タ人纔邪氣ニ感ソモ療治ノ施方惡ク多急ニ草臥出ル者多シ此ヲ後世勞役ノ傷寒ト

稱ス俗ゾク陰症ノ傷寒ト云手又カリナク早ク此方或ハ附子湯ヲ用テシ誤テ寒劑下劑ヲ用テカラス必危篤ノ證トナツテ死スルモノ也切又此方ト附子湯ニ甘草ナシ此湯ハ水飲ノ散スルモノニテ四逆湯ノ如ク甘草ノ甘ヲ以附子ノ温性ヲ中焦ニ暫ク持タシムルモノト異ナリ其上乾姜ナク均藥アリテ同シ温補ト云テカラ反テ和スル意アリ又附子湯ハ散失ノ陽ヲ急ニ復セント欲メ甘草ヲ去テ人參ヲ加ヘタルモノト見ユナリ今此方古方家ニ下元不足或ハ勞役ノ傷寒用ユルト云ハ活メ用タルモノ仲景ノ意ニ異ナリト云ハ臣經驗シタルモノト云ベシ此モ時從テ甘草ヲ加テ切得ナリ

○附子湯

- 附子二六分 茯苓三六分 人參二四分 白朮四八分 芍藥三六分
- 枚二 兩二 兩二 兩四 兩三

右五味以水八升煮取三升去滓温服一升日三服
 按スルニ本論ニ云少陰ノ病得之一二日口中和一其背惡寒スル者ハ當冬之一此方少陰直中ノ症ニ用ユ其人素ヨリ表裏俱ニ虚シ寒邪中之時太陽經ノ表ヲ帶テ一支モスルナラス無人城郭ニ入ル如ク直ニ少陰ノ裏ニ入リ脉微欲寐ハ少陰ノ總証ナレハ不言ノ可知口中和ストハ不渴不燥也裏熱無一可知故ニ病ヲ始一二日ノ中發關元穴一少陰ニ灸スル一活人書ニ大谿ノ穴トス大谿其上一大温補ノ藥ヲ用ルハアワテタマウナ療治ナレトコトノ外危急ノ症ニテ手又カリヌト取反シナリガタシ切背惡寒スルハ陰陽俱ニアリ陽明ノ病無大熱口燥渴シ心煩兮背微惡寒ス者乃白虎加人參湯ノ症ナリ又少陰ノ病得之一二日口中不

燥其背惡寒スル者ハ少陰陽虛ノ惡寒スルト異也此大温
補ト大寒藥トヲ用ユルノ分別口燥ト口和スルノニツテ以テ知ヘシ
若コレヲ見フコトハ生死手ヲ反スガ如シ此方先用附子テ回陽
消陰茯苓白朮人參脾胃ヲ補ヒ陽ヲ扶クルモノ也又芍藥ヲ
加一テ陰ヲ助ケテ偏勝ナカラシム真武湯ハ水ヲ行ラシ陰ヲ收ル
モノニシテ生薑附子ヲ佐トシ辛熱ノ勢ヲ取テ經中ノ水飲ヲ散
セントス附子湯ハ人參附子ヲ佐トシ純ラ温補ノカラテ散失
ノ陽ヲ復セント欲スルモノ也故ニ附子湯ハ真武湯ニ附子一倍ヲ
用ヒテ同シカラス一例ニシテ見ルカラス

○理中丸及湯

- 人參 甘草 白朮 乾姜 己上各各六分 三兩

右四味搗篩為末蜜和丸如雞黃大以沸湯數合和一丸研碎
温服之日三服夜二服腹中未熱益至三四丸然不及湯湯
法以四物依兩數切用水八升煮取三升去滓温服一升日
三服

按スルニ此方夏月外風冷ニ感シ内冷物ニ傷ラレ停滯メ不化
嘔逆泄瀉脉沉細或伏スル者ハ太陰ニ属メ是霍乱ノ症也裏
寒スルユエニ食滯テ不化故ニ乾姜ヲ用ヒテ内ヲ温メ邪ヲ散ス
參朮甘草陽ヲ扶ケテ氣ヲ益ス甘辛ヲ得テ不滯不燥ナリ
此方本外寒邪ニ感ジ内冷物ニ傷ラレ霍乱ヲナス者ノ為ニ設
ケリ後世活メ温補ノ總司トスル也此方内外ノ邪ヲ理スル方ニ
テ理ノ字ト補ノ字トチガヒアリ理中湯モトヨリ温補ノ劑ナレ

仲景霍乱二用ニラレタハ外風寒ヲ邪内冷食ノ邪内外ノ邪ヲ
 理スル為ニ建立シ名方也理ハ治ト同ク内外ノ邪ヲ治ムル合
 点ニテ指出テ補中ノ意ニテハナシ然レモ此藥ハ至極ノ補藥也
 後人附子ヲ加ヘテ附子理中湯ト名ツク手足厥冷スル者
 ノ主方トス手足厥冷ハ四逆湯甚勝レリ急ニ温ムル時前ニ
 云通り白朮ノ緩キ物反テ邪魔ニナルアリサレモ附子理中
 湯温補ノ重劑ト云モノニテ立方ノ本意ハ各別ノ法ト心得ベシ切
 又霍乱ト云モノハ風寒暑濕飲食生冷ノ邪交雜リテ一時ニ吐瀉
 霍乱ヲナス表ニ甚シキ時ハ發熱惡寒ニ裏ニ甚シキ時ハ吐瀉而
 腹中大ニ痛或ハ轉筋厥冷ノ冷汗出暑甚シキ時ハ大渴ニテ
 引飲而不已病因不同故ニ治方モ亦各異ナリ惟其因ヲ詳

スベシ一概ニ誤リ混スベカラス熱多ク水ヲ飲ント欲スル者ハ飲
 熱也五苓散ヲ以テ其飲熱兩解スベシ若水ヲ飲テ欲セザル
 者ハ是中寒スル也理中湯ヲ以テ其中ヲ温ムベシ

○麻黄甘草石膏湯 發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘
 無大熱者可與麻黄杏仁甘草石膏湯

麻黄四分 杏仁五十個 甘草二四分 石膏半

右四味以水七升先煮麻黄減二升去上沫内諸藥煮取二
 升去滓温服一升

按スルニ此太陽ノ病下之後微喘スル者ハ表未解也桂枝加
 厚朴杏仁湯ノ症也此太陽ノ肌表ヲ解シテ其喘ヲ治ス
 也又太陽ノ病桂枝ノ症醫反テ下之利不止ノ脉促汗出

テ喘^{ゼン}ス者ハ表未解也葛根黃連黃芩湯ヲ以テ陽明ノ肌熱ヲ解^ゲシテ其喘ヲ治スルナリ今太陽ノ病發汗後汗出テ喘シ大熱ナクシテ惡寒セサルモ此邪太陽ノ表ニ非ズ邪太陰肺經ニアルモ也故ニ桂枝湯ヲ以テ汗スベカラス麻黃杏仁甘草石膏湯ヲ以テ肺中ノ邪ヲ發散スベシ汗喘俱ニ自ラ止モノ也又持病ニ喘息アル人邪氣ニ感メ屢發スル者此方ヲ用テ肺邪ヲ散シ鬱熱ヲ涼スル時ハ喘自ラ退クモナリ

○麻黃附子湯 水之為病其脈沈小屬少陰浮者為風無水虛脹者為氣水發其汗即已脈沈者宜麻黃附子湯主之

麻黃 三一匁二分 甘草 二一匁 附子 一一枚二分半

右三味以水七升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取二升半溫服八合日三服

按スルニ此方腎ハ水ヲ主トル少陰聚水浮腫ス故ニ脈沈小ニ少陰ニ屬ス若シ脈浮者ハ風ニ屬ス水無クシテ虛腫スル者ハ氣ニ屬スルモ也水病脈浮ニ表ニ在ル者ハ汗ヲ發スベシ此症腎藏ノ中ニ屬ノ脈沈小ナリ故ニ附子以テ其寒ヲ逐ニ麻黃水寒ノ水ヲ散ス甘草扶脾土ヲ水ニ勝シルモ也沈明宗曰今以此方ヲ用ユルヲセザル者ハ何ゾヤ水邪從溢ノ通身腫滿スル者補陽ノ中兼テ輕滲ノ劑ヲ用ヒテ陽ヲ通シ鬱熱ヲ開キ竅ヲ利スル時ハ眞陽宣テ邪自ラ去此水ヲ理セズノ水自愈麻黃附子一散一補本ヲ固クシ陽ヲ通ス故ニ其

古方節義 下 麻黃附子湯

腫自ラ去ルモノ也今ノ人惟腎氣丸ヲ用ヒテ其内ヲ補ヒ壅
イテ陽氣益不宣轉補ヲテ轉壅リ水邪出ルノ路無メ水腫
日ニ増テ咳血ノ死スル者アリト云尤然リ

○麻黄附子細辛湯 少陰病初得之反發熱脉沈者此
方主之

麻黄 細辛各二 附子一枚二分半

右三味以水一斗先煮麻黄減二升去上沫内藥煮取三升
去滓温服一升日三服

按スルニ少陰ノ病ハ但欲寐ナリ脉沈者微細ナラズメ沈ナリ
少陰ノ病始テ是ヲ得テ發熱スベカラスソレニ反テ發熱ス
ルハ是少陰ノ裏寒太陽ノ表熱ヲ兼ルモノ也太陽ノ表証

ハ發熱頭痛シテ脉浮ナリ此証ハ脉沈ニテ發熱ノ頭痛ナ
レ少陰ノ証ナレハ脉浮ニテ頭痛スベキニ反テソウナイハ少陰ノ
表症ト云モノヲ汗ヲ發スベシ故ニ麻黄附子細辛湯中ヲ温メ
汗ヲ發ス此陰ヲ退ケ陽ヲ救フナリ故ニ兩感ノ邪均ク
解スルヲ得ル也

○麻黄附子甘草湯 少陰病得之二三白此方發汗以二
三日無裏證故微發汗也

麻黄一兩 甘草二兩 附子一枚二分半

右三味以水七升先煮麻黄一兩沸去上沫内諸藥煮取三
升去滓温服一升日三服

按スルニ前方ト同証ニテ前証ハ日數ナク直ニ此ヲ得テ發

麻黄附子細辛湯 麻黄附子甘草湯

熱脈沈ト云此方ハ少陰病得之ニ三日仍脈沈ニヤ熱スル者ハ病少ク緩シ故ニ細辛ヲ不用ノ甘草ヲ用ヒテ温散ノ中緩和ノ意アリ無裏證トハ吐利煩躁嘔渴ノ裏症ナキ也此熱仍外ニアリテ少シ緩キ氣味ニテ和スル意アリ故ニ甘草ヲ用ヒテ緩ク汗ヲ取ルモノ也

○續命湯 治中風痲身體不能自收口不能言冒昧不知痛處拘急不得轉側

- 麻黃 桂枝 當歸 人參 石膏 乾姜

甘草各三兩 芍藥各四分 杏仁四十枚

右丸味以水一斗煮取四升温服一升當小汗薄覆脊憑几坐汗出則已不汗更服無所禁勿當風并治但伏不得臥咳

逆上氣面目浮腫

按スレハ痲ハ風病ニ一方痛ム者ヲ云此邪氣ニ因テ榮衛氣血内外ヲ養フヲ得ズノ身體不用故ニ自ラ收持スル能ハサル也又邪心腎ヲ閉塞ス此ニ因テ精神恍惚トシテ口不能言心氣冒昧ノ痛所ヲ不知也邪筋脈ニ中ル時ハ拘急ト身體引ツリテ自由ナラス故ニ不得轉側ト云此方外臺千金等一切中風ノ主劑トス後人中風六經ノ形證アル者ニ用ユトイハ臣太陽ノ証陽明ノ証ト云イモナク惡寒發熱頭痛ナドアルニテモナシ此ハ所謂虛邪賊風ニ傷ラレタルモノ欬中風ハ必邪風ニ傷ラレタルモノト見エテ半身不遂ノ口眼喎斜スルナリ他症ニ於テ此アルナシ然ルニ只今アル所ノ中風ヲ見ルニ多ハ兼症アツテ中風ヲ患ル者多ク

或ハ氣虚ヲ兼或ハ血虚ヲ兼或ハ陰虚痰飲ヲ兼ルモノアリ
 此方麻黄湯ノ變方ニシテ麻黄桂枝和ヲ散シ石膏ハ麻黄
 桂枝乾姜ノ辛熱ヲ制シ當皈川芎人參甘州ハ血ヲ補ヒ正
 氣ヲ扶ルモノナリ故ニ元來中風ノ妙劑也サレバ兼症アル時
 他方ヲ選テ用ヒシ凡テ中風ト云モノ輕證ハ偶治スルト云
 一向ニ半身不遂ト云ナリテハ治スルノ希ナリ但中風ノ症兼症
 不見ノ脈滑實ニテ日久不治モノ此時ニ他方ヲ用ヒテ効シテキ
 モノ也獨此方ヲ用ヒテ効ヲ得ルノ間アリ尤初ニ此續命湯
 ヲ用ヒシ日久キ時ハ千金續命湯宜シトス續命湯モ千
 金外臺類方多シ今テ爰ニ二三方ヲ記ス
 又按スルニ此方林億古今錄驗ノ方中ヨリ採テ金匱中風ノ末ニ

金匱

續命湯

麻黄 桂枝
 石膏 人參
 甘草 乾姜
 其草各二兩
 芍药 一斤
 杏仁四十枚
 右凡味水煎

附スルモノナリ古今錄驗ハ階ノ訛言所著仲景ヨリ後人ナリ
 然レ此方モ用ヒテ數功アルモノ也

○小續命湯千金 治卒中風欲死身體緩急口自不正舌強

不能語奄々忽々神情悶乱諸風服之皆驗今人不入虚方

麻黄 防己外臺無之 人參 黄芩 桂心 芍藥

甘草 川芎 杏仁各一兩 防風一兩 附子一分 生姜五分

右十二味以水一斗二升先煎麻黄三沸去沫内諸藥

煮取三升分三服甚良不瘥合三四劑必佳

○大續命湯外臺 治中風肥盛多痰多渴肢體不遂

金匱續命湯去人參一作竹瀝 加黄芩荆瀝

○八風續命湯千金 治卒中風半身不遂手足拘急

金匱續命湯去麻黃川芎加獨活黃芩

○桂枝芍藥知母湯 諸肢節疼痛身體尪羸脚腫如脫

頭眩短氣温々欲吐此方主之

桂枝四分芍藥三六分甘草二四分麻黃二四分生姜

白朮各五分知母四分防風四分附子二兩四分

右九味以水七升煮取二升温服七合日三服

按スルニ諸肢節痛ハ骨節悉ク疼ム也若シ痛久シキ時ハ邪カ
カンニ正氣衰エテ身體尪羸トツカレヤスル也此氣血衰弱ノ人風
寒濕ニヲカサレテ氣血凝滯テ此ニ因テ關節諸筋ニ流通スルトラ
得スノ歷ル処ノ肢節皆疼痛スルナリ風濕下ニ注ク時ハ脚腫ル
ヲナス若シ筋ヲヤブラル時ハ脚腫如脫也頭眩短氣ハ正氣上

ニ虚スル也温々ハ鬱ノモヤクトスル也欲吐者ハ寒濕田中ニ

塞ガルモノ也此證昼静ニシ夜イタミ甚シクソ骨髓ニ徹ス

ルモノ也後人此ヲ白虎歷節風ト云今痛風ト云モノ是也

此方陽ヲ壯ニシ寒濕ヲ散スル也故ニ桂枝芍藥麻黃防

風白朮附子專ラ陽氣ヲ温行ノ又寒濕ヲ散ス生姜多キ

モノ欲吐ヲ以テ也知母之苦寒以テ辛熱ヲ制スルモノ故ニ今

痛風寒濕ニ因テ痛甚シクソ其脉沈ナル者ニ用之可温散

又此方後人難用トスル劑也能考工用ヒテ其意ヲ得ベシ

○越婢加水湯 治肉極熱則身體津脫滕理開汗大

泄厲風氣下焦脚弱

麻黃六分石膏半斤生姜三三分甘草二三分白朮四分大棗十五四分

古今醫方

桂枝芍藥知母湯越婢加水湯

十一

右六味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三升分
温三服惡風如附子一枚炮

按スルニ肉極熱ハ風毒濕熱内ヲ攻テ脾ニ入モノ也故ニ脾病
時ハ肉變ス因テ其ハ津液脱シテ滕理開キ汗大ニ泄ル也
厲風疫風也風氣下焦ニ流レテ肢弱ク或ハ痛者アリ此
方風毒濕熱ヲノ外皮表ニ散シ内小使ニ通セシムルモノ也婢
外臺作脾婢ハ誤ナリ越脾ハ脾胃濕邪ノ氣ヲ發越スル
ニテ麻黃ノ温表ヨリノ越シ石膏ノ寒裏ヨリノ化ス亦脾胃ノ
濕邪ヲ散シ甘州大棗脾ヲ和ス故ニ能水氣ヲ追小使ヲ通
ス此所謂開鬼門ト云モノ此ナリ又此方肢氣腫滿最上
方也或ハ風水濕腫或ハ蹙節痛風腫甚シキ者又風濕

ノ氣下焦ニ流レテ腰ヨリ以下浮腫スル者盡ク此方又用ヒテ
効ヲ得ズト云フナシ惡風ニ加附子トアレヒシニ限ラス痛久
不止者ニ加附子テ温散スル腫退イテ痛止モノ也

○桂苓朮甘湯 傷寒苦吐若下後ハ下逆滿氣上衝胸起
則頭眩脉沈緊發汗則動經身振々搖者此方主之

茯苓 四兩 桂枝 各三兩 白朮 各三兩 甘州 二兩

右四味以水六升煮取三升分温三服小使則利
按スルニ此方水飲流飲ヲ小使ヨリ去シムルモノナリ其症ハ下
工流飲聚リ衝上リテ動氣アリ上逆ニ因テ頭眩ヲナシ頭
フラクトスルナリ或ハ下身振々トシテ動搖スルナリ此誤リ
テ吐下ヲナスニ因テ邪氣虛ニ乘ノ水飲ヲ搏テ經脉ヲ動

スルモノナリ又金匱ニ心下有痰飲胸脇支滿目眩用桂苓
朮甘湯トアリ是心下ニアル所ノ痰飲ノ水流レテ膈間ニアリ
故ニ胸脇エ支エ滿テ陽氣ヲ上頭自ニ通セズ目眩スルナリ
目眩ハ眩暈也白朮濕ヲ去脾ヲ健ニシ茯苓ノ淡キ水ヲ泄
ス桂枝上逆ヲ下シ又茯苓ト同シク水氣ヲ宣導シ水飲
ヲ小便ヨリ去ラシムモノナリ流飲經絡ニ溢ル時ハ上逆ノ眩
暈ヲナシ或ハ浮腫ヲナス若孫絡ニ溢ル時ハ脇下肩背ニ微
ノ痛甚シウソノ寐臥モナラザルモノナリ此時ハ控涎丹或ハ十
湯ヲ用ヒテ大便ヨリ其流飲ヲ下スベシ若經ニアル時ハ桂苓
朮甘湯ヲ以テ小便ヨリサラシムベシ又金匱ニ夫短氣有微飲
當從小便去之桂苓朮甘湯主之腎氣丸亦主之トアリ

桂苓朮甘湯モ腎氣丸モ俱ニ小便ヲ利スルモノナリ是ヲ張
氏醫通ニ論ノ云桂苓朮甘湯ハ其飲陽ニアリテツク息ノ短
キモノヲ主トス腎氣丸ハ其飲陰ニアリテ引息ノ短キモノ主
之ト云ニ方俱ニ短氣微飲ノ方ラシハ輕清ノ劑ヲ以テシ一
ハ重濁ノ劑ヲ以テス其趣同シカラズ學者最モ反復思議
スベシ

○澤瀉湯 心下有支飲其人若冒眩此方主之

澤瀉 兩五 白朮 兩二分

右二味以水二升煮取一升分温再服
按スルニ心下ハ膈下也水膈上ニアル時ハ喘滿ス水膈間ニ
アル時ハ痞ノ悸ス故ニ惟眩暈ヲナス此方和平ニ輕劑ナ

リ支飲眩暈輕者此湯ヲ用スシ若流飲上逆ニ因テ眩
暈ヲナス者桂苓朮甘湯五苓散等ヲ撰ヒ用スシ此方澤
浮水氣ヲ泄シ白朮土氣ヲ補テ以テ水ニ勝モノ也

○八味丸 或ハ腎氣丸ト云

乾地黄 八分 山茱萸 各四分 山藥 各四分 澤瀉 三分 茯苓 三分

牡丹皮 各三分 桂枝 三分 附子 各一分

右八味末之煉蜜和丸梧子大酒下十五丸日再服

按スルニ此方金匱ニ出ル処五ヶ處アツテ腎元ノ水ヲ潤シ亢
極ノ火ヲ制スルモノナリ就中虛勞門ニ於テ虛勞腰痛少腹
拘急小便不利者ハ味腎氣丸主之トアリ虚勞ノ腰痛ハ
腎氣虚而腰ノ氣怯キモノナリ小腹拘急小便不利者ハ腎

氣虚ノ膀胱ノ氣不化也或ハ小腹不仁ト云ヒ或ハ消渴ト云
ヒ或ハ婦人轉胞ト云モノ皆腎氣虚ノ下焦ノ氣守ラ失ヒタ
ルモノナリ又此方腎中ノ水ヲ潤スト云ヒ腎水不足スル水中
ノ陽モ亦從テ虚ス故ニ此方八兩ノ乾地黄ヲ以テ火ヲ瀉シ
水ヲ救ヒ一兩ノ桂附ヲ加ヘテ真陽ヲ保ツ又乾地黄ノ
寒滯ヲ制シ重キヲ行テスノ意アリ故ニ陰虚ノ火動スル
者早ク此方ヲ用ユベシ虎極ト云ニナリテハ治セ又モノ也又
宋ニ至テ錢中陽小兒先天ノ腎氣ヲ補ハント欲メ此方ノ
附子肉桂ヲ去テ熟地黄ヲ用ヒテ六味丸ヲ製ス是ヨリ
後ハ味丸ト称スル者皆熟地黄ヲ用ヒテ誤ルト久シ此仲
景ノ原方ノ意ヲ曾テ不知モノナリ此方陰ヲ潤シ火ヲ

ヲ制スルヲ不曉ノ六味丸ヲ以テ壯水ノ劑トシ八味丸ヲ以テ陽虛補火ノ劑トスルモノハ仲景ノ意ハ大ニ違ヘリ又張介賓澤浮茯苓ヲ論シテ此利水ノ藥ニテ補腎ノ劑ニ入ト云ヘ至極腎氣ノ虛シタル者ニハ不宜トシ此二味ヲ不用ノ左歸丸右歸丸ノ二方ヲ製ス然レニ仲景此二味ヲ用ユル者腎虛スレハ必腎ニ邪水アリ故ニ此二味ヲ用ヒテ地黃山茱萸ヲ引テ下焦腎ニ飯シ且腎ノ腐水ヲ瀉スルト云仲景ノ妙意也此張介賓モ仲景ノ意不達ノ穿鑿金ト云ヘ從ヒ用ユルカラス又八味丸ヲ腫脹ニ用ユルモノハ腎氣不足ノ人其脈沈ニシテ惟小腹張滿テ下焦ニ腫多キモノニ用ヒテ甚効アリ

○甘州乾姜湯 肺痿吐涎沫而不咳者其人不可不渴必遺

尿小便數所以然者以上虛不能制下故也此為肺中冷必眩多涎唾甘州乾姜湯以温之若服湯已渴者屬消渴

甘州四兩乾姜二兩

右咳咀以水三升煮取一升五合去滓分温再服

按スルニ此方金匱肺痿門ニ出タリ肺痿ハ肺熱ニ因テ咳久シ不止肺ハ葉乾テナルモノ也欬ノ涎沫ヲ吐セサル者ハ肺燥テ欬スル也又欬ノ涎沫ヲ吐スル者ハ肺熱痿也若只涎沫ヲ吐ノ咳セサル者ハ肺中ノ冷飲トス肺中ノ熱ニ非ズ其人不可不渴必遺尿シ小便頻數ナリ此皆上焦ノ陽虛ノ下焦飲水ヲ約スルヲアタハズ下焦ノ水溢レ上リテ唾涎ヲ吐スル也甘州乾姜湯肺ノ寒飲ヲ温散スル也此方涎沫ヲ吐ノ欬セサル者ニ用ユト云ヘ凡其人熱

ナリ肺中ノ冷ト見エテ欬甚シクノ涎沫ヲ吐スル者ニモ用ヒテ
効アリ

○射干麻黄湯 欬而上氣喉中水鷄聲者此方主之

射干十三枚一法三兩 麻黄四兩 生姜各四兩 細辛六分 紫苑六分

款冬花各三兩 五味子半升 大棗七枚 半夏八枚一分

右九味以水一斗二升先煮麻黄兩沸去上沫内諸藥煮取
三升分温三服

按スルニ欬ノ上氣ハ咳ノ氣上テ衝逆スル也甘草乾姜湯欬セ
スノ涎沫ヲ吐スルニ用ユ此肺痿ニ非ス肺冷トスルナリ又射干
麻黄湯ハ欬ノ涎沫ヲ吐セサルニ用ヰリ此亦肺痿ニ非ス肺冷ト
ス此方モ俱ニ肺中ノ冷トスル者ニ用ユ然ニ冷飲ノ外ニアル者

ト内ニアル者ノ別アリ同ク辛温ニ温ト散トノ異ナルアリ水鷄
聲ハ蛙ノイテ鳥ノイニ非ズ咽中蛙ノ鳴如クゴロクト鳴ト也此寒
冷肺ヲ犯スモノナリ外寒内熱ヲ包テ咳喘胸高ク喉中水鷄
聲ノ如キ者宜ク此湯ヲ用ヒテ外寒ヲ散ベシ麻黄半夏細辛
等以在表ノ風寒ヲ散ス射干以胸中ノ結熱ヲ散ス半夏痰
ヲ豁カニシテ喘ヲ定ム紫苑五味子款冬花等肺ヲ潤シ
嗽ヲ止ムモノ也故ニ寒邪肺ヲ犯メ喘咳甚者ニ此方ヲ主トス
○皂莢丸 咳逆上氣時々唾濁但坐不得眠者此方主之
皂莢八兩刮去皮用酢炙
右一味末之蜜丸梧子大以棗膏和湯服三九日三夜一
服

按スレニ欬逆上氣惟時々唾濁ハ痰涎多ナリ但坐ノ不得臥者ハ氣逆ノ甚レキ也此症寒飲ニモ非ス又火逆上氣ニモ非ス故ニ皂莢以テ痰ヲ導キ其甚氣ヲ通達ス大棗ノ甘皂莢ノ猛氣ヲ和ク若大棗ナク用テ時ハ咽喉腫ルナリ又此方皂莢痰ヲ消シ堅ヲ破リ濕ヲ燥ス若虚勞ノ痰火逆ノ痰鬱痰等工用ユカラス惟寒痰ニ用ヒテ能痰ヲ燥シ濁痰ヲ去モナリ

○厚朴麻黄湯 欬而脉浮者此方主之沈者澤漆湯主之

- 厚朴 五一分 麻黄 四分 石羔 如雞子大 杏仁 半升 半夏 半升
- 乾姜 四分 細辛 兩各二分 小麥 升四分 五味子 升半四分

右九味以水一斗二升先煮小麥熟去滓內諸藥煮取三升温服一升日三服

此方小青龍湯ノ變方ニ芍藥ヲ去テ厚朴杏仁小麥ヲ加ヘテ發中ニ降下ヲ兼テ喘咳ヲ止メ逆氣ヲ下ス脉浮ナル者用之

按スレニ此方脉ノ浮沉ヲ以テ咳ヲ治スヲ論ジテ其症ヲ云ハス此證極メテ邪氣風邪アツテ後脉浮沉ナルモノナルニ厚朴麻黄湯ハ外邪ヲ散スルヲ主トス故ニ浮ト云澤漆湯ハ内飲ヲ逐ヲ主トス故ニ脉沈ト云又厚朴麻黄湯ハ小青龍加石羔湯ニ同シクニテ惟邪ヲ散シ飲ヲ蠲ノ力多トス澤漆湯ハ下ニ趨ノ力多シ惟下焦工逆氣ヲ引下シテ表ヲ發セス蓋シ欬嗽皆肺

邪也脉浮ナル者多ハ邪表ニ居ス故ニコレヲ驅テ外ヨリ出サ
シム脉沈ナル者ハ其邪多ク裏ニ居ス故ニ此ヲ驅テ下ヨリ
出サシムルナリ

○澤漆湯

半夏半升 紫參五兩 澤漆三斤以東流水
生姜五兩 甘草六分 黃芩六分 人參六分 桂枝各三
白前五兩

右九味以咀内澤漆汁中煮取五升温服五合至夜尽
此方澤漆痰ヲ消シ嗽ヲ止メ水ヲ行ス大小腸ヲ利ス紫苑
肺ヲ潤シ火ヲ浮ス白前モ亦肺ヲ浮シ痰ヲ下ス故ニ此方
諸藥痰ヲ消シ逆氣ヲ下行シ止喘咳下ヨリメ其邪ヲ泄ス脉

沈者用之

○麥門冬湯 太逆上氣咽喉不利止逆下氣者主之

麥門冬七升 半夏一分 人參二兩 甘草二兩
粳米三合 大棗十二枚

右六味以水一斗二升煮取六升温服一升日三夜一服
按スルニ太逆上氣ヲ千金方ニ火逆上氣ニ作咳而上逆ニ咽
喉不利ハ氣上逆ニ因テ咽喉爽カナラズノ物アルコトク通利
不宜也惟痰咳水鷄聲ナクメ火氣上逆スルモノナリ麥門冬湯
其火逆ヲ止其上氣ヲ下ス也此方竹葉石膏湯ノ中ニ於テ
竹葉石羔ヲ去テ麥門冬數倍ヲ用ヒテ君トシ人參甘草以
テ肺母ヲ滋シ此ニ因テ水穀ノ精微皆上肺ニ注クヲ行

テ自然ニ沃澤ノ津液ヲ生シ虚火炎上ノ證ヲ治スル也凡
 人津液アル時ハ潤澤シ壯堅也津液無時ハ乾枯ノ死ス故ニ
 虚勞咳嗽失血或ハ上逆頭痛目痛耳鳴消渴白濁一切津液
 乾燥ニ因テ生スル所ノ病此ヲ用ヒテ甚効アリ失血ニハ加生
 地黄消渴ニハ加石膏白濁ニハ加龍骨牡蛎或ハ加乾地黄
 ○奔豚湯 師曰奔豚病從小腹起上衝咽喉發作欲死
 復還止皆從驚恐得之又奔豚氣上衝胸腹痛往來寒熱此
 方主之

甘草 芎藭 當皈各二兩 半夏四兩 黃芩二兩
 生葛五兩 芍藥二兩 生姜四兩 甘李根白皮升一
 右九味以水一斗煮取五升温服一升日三夜一服

按スルニ奔豚ハ驚恐ヨリ得之ト云其形豚ノ走ル如ク小腹
 ニ起テ上下スル時ナレ驚ハ心ヲ傷リ恐ハ腎ヲ傷ル此ニ
 因テ腎氣上心ヲ凌テ逆上ヲナス小腹ヨリ上テ胸咽ニ衝
 上ル也甚シキ時ハ發作アリテ欲死微ナル時ハ氣上テ胸ニ
 衝テ胸腹痛テ往來寒熱スル也後人此ヲ腎積ト云此腎
 氣發動スルモノ也故ニ血藥ヲ以心腎ヲ調工葛根以テ津液
 ヲ通シ李根皮逆氣ヲ下ス余此方經驗ユニ記ス
 ○男子年十三氣從下上而衝於胸振々動搖殆欲倒死數
 月不止歷醫無寸効余診之左右俱弦數乃問曰曾得有驚
 哉否對曰近隣有失火驚甚而失度後四五日而此病發
 余曰然是從驚恐得之心也乃與奔豚湯不數日如平

古方節義 下 奔豚湯

○小兒患疹卒然吐血死其親驚悲太甚而後其人氣自小腹上衝咽喉殆死日二三度有汗不止已過十年其面色青且浮腫請治余診之其脉沈遲發則滑大也余悟曰是因驚恐得之也乃用奔豚湯不數日其病不復發然二奔豚ニ似テ奔豚ニアラザルモノ多シ誤リ用テ此方ノ經驗ナキコトヲ毀ルベカラス能ク考可用又奔豚ニ非スト云ヘ凡積聚自下衝上ル者ニ用ヒテ數効アリ

○厚朴生姜甘草半夏人參湯 發汗後腹脹滿者此方主之
 厚朴片半 生姜片半 半夏片半 人參一分半 甘草二三分
 右五味以水一斗煮取三升去滓温服一升日三服

按スルニ此發汗後表已ニ解シテ腹滿スル者ハ大陰裏虛ノ腹滿ニシテ裏實ノ腹滿ニ非ス此本桂枝湯ヲ用ユベキ症ヲ誤テ麻黃湯ヲ用ヒテ大ニ汗ヲ發シ津液外ニ泄テ脾胃ノ氣虚ノ陰氣内ニ結レ塞テ腹滿ヲナスモノ也故ニ此方脾胃ヲ益シ胃ヲ和シ氣ヲ降シ飲ヲ滌クモノ也今發汗ノ後腹滿ノ下ス証ニアラザル者ニ必ス用ユベシ實滿ニ用ユルモノニ非ス

○厚朴七物湯 病腹滿發熱十日脉浮而數飲食如故此方主之

- 厚朴片半 甘草三分 大黃各三兩三分 大棗十枚
- 枳實五枚 桂枝二兩 生姜五兩

古方節義 厚朴生姜甘草半夏人參湯

右七味以水一斗煮取四升温服分合日三服。嘔者加半
夏五合。○下利去大黄。○寒多者加生姜至半斤。

按スルニ發熱十日脉數為熱熱スル時ハ穀ヲ消ス故ニ飲
食如故此方ヲ與エテ腹滿ヲ推下シ表熱ヲ發ス此表裏俱
ニ實ス先表ヲ解ノ後裏ヲ攻ベシ今表邪微ニ裏邪甚シ
故ニ承氣湯ヲ以テ桂枝湯ニ合シテ表裏ヲ和スルモノ也此
方厚朴枳實大黃小承氣湯也桂枝甘草生姜大枣桂枝
湯ニ芍藥ヲ去ルモノ也相合シテ腹滿發熱ヲ治スル劑
トス此表ヲ發シ裏ヲ下ス故ニ霍亂吐浮腹痛或ハ痢疾
初起リ發熱腹痛裏急後重或ハ食傷腹痛下利スルモノ
或ハ發熱腹滿スルモノ食スル食セサルニ拘ラス此方ヲ用

テ其積滯ヲ推下ス時ハ腹痛下利發熱俱ニ去テ食進
ムモノト知ベシ

○厚朴三物湯 痛而閉者此方主之

厚朴兩八分 大黃兩四分 枳實五枚

右三味以水一斗二升先煮二味取五升内大黃煮取三升
温服一升以利為度

按スルニ腹滿テ下利スル者虚スルモノハ理中湯實スル者ハ
厚朴七物湯其中ヲ温ルナリ腹滿テ痛テ便閉スル者ハ
厚朴三物湯其下ヲ開キ通スル也此則小承氣湯ニシテ
厚朴多シ故ニ厚朴三物湯ト名ツク塞カルモノハ利ニ閉スル
モノハ通ス此湯其邪ヲ蕩滌スルモノ也或ハ痢疾初テ

起り發熱甚者ハ先葛根湯ヲ用ヒ或ハ桂枝加大黃湯
厚朴七物湯等ヲ用ヒテ發熱去トイヘ腹痛裏急
後重不止者惟厚朴三物湯ヲ可用甚者大承氣湯ヲ可
用

○厚朴大黃湯 支飲胸滿者此方主之

厚朴一尺 大黃六兩 枳實四枚

右三味以水五升煮取二升分温再服

按スルニ此即小承氣湯ニシテ大黃多シ故ニ厚朴大黃湯ト
名ツク若シ厚朴多時ハ厚朴三物湯ト云サテ支飲胸滿者
ハ必其人素ヨリ濕熱多シテ濁飲上逆ヲ致スモ也故ニ
此方ヲ以テ中焦ノ濁飲ヲ滌キ下スナリ大黃痰ヲ下シ

飲ヲ退ク厚朴痰ヲ消ノ滿ヲ除ク枳實胸脇ノ痰痞ヲ去
獨此方濕熱上ヲ攻テ胸滿或ハ喘咳ヲナシ大便秘者必
可用

○烏頭桂枝湯 寒疝腹中痛逆冷手足不仁若身疼痛灸

刺諸藥不能治此方主之

烏頭 千金十五枚 要略五枚

右一味以蜜二斤煎減半去滓以桂枝湯五合解之得一升
後初服二合不知即服三合又不知復加至五合其知者如
醉狀得吐者為中病

按スルニ寒疝腹中痛テ逆冷シ手足不仁テ身体疼痛スル
者此寒疝ノ重キモノ也灸刺諸藥効ヲ取ルテ能ハス急ニ

烏頭煎ヲ以テ桂枝湯ヲ加ヘテ以テ内外ノ重寒ヲ温散スル
モノ也烏頭煎ハ熱藥也能腹中ノ寒痛ヲ散ス桂枝湯ハ
表藥也能外邪身痛ヲ治スニ方相合スルトキハ能臟腑ニ達シ
血氣ヲ和シ寒疝其脉弦緊ニ痛甚者此方ヲ用ヒテ大ニ
効アリ此方ヲ服メ後酔ヘル状ノゴトク一身體痺ノ甚時ハ
吐シ脉モ亦不出殆ト死セント欲スル形ノ如シ此病ニ中レリト
ス然ルニ見ル人甚恐レラナシ反テ此藥ヲ用ヒテ医ヲ怨テ
他醫ヲ招キ治ラセ者アリ其医來テ解スル能ハズハ醫藥
トシ藥ヲ與フ果ノ暫アツテ夢ノ醒ルカゴトク次第ニ快ヨ
ナリテ本病治スルアリ此煎医ノ功ニ因テ病愈ルヲ得
テ遂功ヲ後醫ニ收ラレテ反テ處ヲ前医ニ帰スルアリ

故ニ其意ヲ得タル人ニ非ズンバ妄ニ用ユヘカラス扱又此方
烏頭ヲ蜜ニテ煎ジ滓ヲ去其煎汁ヲ用ユル也蜜ハ烏頭ノ
大熱毒ヲ制スト云然ニ蜜煎ニセズノ用ユル時ハ其功少ク
酔ヘル如ク麻痺スルモノナシ此蜜ニテ反テ烈シクナル飲予未
決之

○大黃附子湯 脇下偏痛發熱其脉弦此寒也以温藥
下之宜用此湯

大黃 兩三九分 附子 枚三枚三分 細辛 兩二六分

右三味以水五升煮取二升分温三服若強人煮取二升半
分温三服後如人行四五里進一服
按スルニ脇下偏痛スル者ハ此肝ノ實邪也若發熱ノ脉數大

ナル者八胃熱實邪也今脈緊弦トアレハ此陰寒ノ聚テナスモ
也發熱ストイハ臣大黃附子湯其寒實ヲ下ス方中ノ細辛以
テ其肝邪ヲ散ズ後人此方ヲ寒熱虛實ヲ辨ゼズノ脇下ノ
痛者ニ用ユルモノアリ誤用ユル勿レ

○附子粳米湯 腹中寒氣雷鳴切痛胸脇逆滿嘔吐此方
主之

附子一枚 半夏半升 甘草二兩 大棗十枚 粳米半升
右五味以水八升者棗熟湯成去滓温服一升日三服
按スルニ腹中切痛ハ寒也腹中雷鳴ハ寒氣ニテ水氣不順
也胸脇逆滿嘔吐スル者寒氣胃中ニ迫ルモノ也此方腹痛
寒疝沈寒固冷ノ病久治セズ嘔ヲ兼ル者ニ用之數効アリ

○甘遂半夏湯 病者脈伏其人欲自利利反快雖利心下
續堅滿此為流飲欲去故也此湯主之

甘遂大者三枚 半夏十二枚 芍藥五兩 甘草如指大一斤
右四味以水二升煮取半升去滓以蜜半升和藥汁煎取八
合頓服之

按スルニ此流飲中焦ニ留ル故ニ脈伏スル也自利ハ水飲下行
スルナリ自利ストイハ臣續テ心下堅滿スル者舊飲漸去ラ
ント欲ノ新飲又續テ聚ルモノ也甘遂半夏湯以テ其流
飲ヲ下スベシ故ニ此方甘遂流飲ヲ決リテ結スルモノヲ散レ
半夏亦能流飲ヲ散ス堅モノヲ和スル為ニ芍藥ヲ以ス
此方水氣ヲ下ス速ナルニ過タリ故ニ甘草白蜜ノ甘ヲ

以テ此ヲ緩クスルモノ也或人甘遂猛劑ニシテ金戟ノ如シト
云モノアリ此未用ニ試サルモノ也凡流飲甘遂ニアラザバ
去レ能ハズ下利ストイヘ臣大黃芒硝ノ如ク寒下ノ品ト大ニ
異ナリ何ソ怒ル、フカアラシヤ然レ臣流飲ナキ人ニ用ユル
時ハ劔戟ト云ベキモノ歟故ニ其症ヲ明メズソ用ユベカラ
サル、諸方俱ニ然リ

○十棗湯 病懸飲者此方主之

芫花熬 甘遂 大戟 各等分

右三味搗篩以水一升五合先煮肥大棗十枚取九合去
滓內藥末強人服一錢匕羸人服半錢平日服不下者
明日更加半錢得快下後糜粥自養

按スルニ脈沈而弦者懸飲内痛トアリ脈沈ヲ流飲トス
弦ハ肝脈也流飲脇下ニ留ルモノニシテ即懸飲也懸飲
ハ咳唾ノ咽痛ス故ニ内痛ト云此方芫花ノ辛能水ヲ散シ
大戟ノ苦能水ヲ泄ス甘遂直ニ其飲処ニ達ノ結スル所ノ
流飲ヲ追フ三物皆峻劑ニヨツテ大棗ノ甘ヲ以テ此ヲ
緩クス此流飲ヲ下ス強劑也流飲ニ因テ胸脇痛ニ肩背
ニ微シテ痛甚シク或ハ咳嗽ノ脇下ニ引痛ム者此方ヲ用ヒテ
大ニ効アリ張子味此方ニ牽牛子大黃ヲ加ヘテ三化神祐
丸ト名ツテ濕熱ノ諸症ヲ下ス今脚氣積聚疝氣流飲心
下ニ衝テ欲死者或濕熱脹滿ノ者其人下スニ堪タル者數
用ヒテ効アリ

○小半夏湯 嘔家本渴渴者為欲解今反不渴心下
有支飲故也此方主之

半夏升一 生姜斤半

右二味以水七升煮取一升半分温再服

按スルニ嘔家渴スル者ハ是レ嘔吐ニ因テ胃乾キテ津液ヲ傷
テ渴スルナリ故曰嘔家本應渴先嘔ノ後渴スル者ハ少ク
水ヲ與エテ飲シメテ以テ胃ヲ和シ津ヲ生ズナリ故ニ為欲解
ト云若嘔吐ノ反テ不渴者ハ是レ必素ヨリ心下ニ痰飲アルニ
エナリ小半夏湯ヲ用ユニ此方惟能嘔ヲ止ム又水飲上逆
ノ嘔スルヲ治スナリ半夏痰水ヲ滌キ生姜嘔ヲ止ム邪ヲ散ス
凡暴病諸嘔吐無外邪者此方ヲ用ヒテ數効アリ惟小劑ニ

テハ切寡シ半夏二錢或ハ三錢生姜二錢或ハ三錢初テ切
ヲ見ルヘシ

○小半夏加茯苓湯 卒嘔吐心下痞膈間有水氣眩悸者

此方主之

半夏升一 生姜斤半 茯苓兩三

右三味以水七升煮取一升五分分温再服

按スルニ卒然ト嘔吐シ心下痞塞スル者ハ是レ膈間ニ水アリテ
滯リ結スル也眩ハ眩暈也此水陽ヲ阻テ升ラサル也悸ハ
動氣也水心上心ヲ干ス故ニ此方一切ノ嘔吐不渴ノ惟頭
眩アル者ニ用ユニ半夏水ヲ去リ生姜嘔ヲ止茯苓水ヲ
利ス三味相用ヒテ嘔ヲ止水飲ヲ治スル時ハ眩悸自ラ

小半夏湯 小半夏加茯苓湯

止モノ也

○大半夏湯 胃反嘔吐者此方主之

半夏二三分 人參三分 白蜜一分

右三味以水一斗二升和蜜揚之二百四十遍煮取二升半

温服一升餘分再服

按スルニ胃反ハ今ノ翻胃也朝食ノ暮ニ吐シ暮ニ食ノ朝

ニ吐ス是ヲ反胃ト云又膈ト云モノハ食滯ノ膈中ヨリ胃

ニ下ルヲ不能ノ直ニ涎沫ヲ吐スモノ也反胃ト膈ト大同ノ

少異ナリサテ翻胃嘔吐スル者ハ脾胃ノ氣虚ノ飲積テ散

ゼス半夏飲ヲ逐テ逆氣ヲ下シ人參胃氣ヲ扶テ蜜ト同

ク胃中ノ燥ヲ潤ス揚之ハ水ノ性ヲ緩而其氣ヲ下行セン

トラ欲ス則胃氣ヲ扶テ嘔吐ヲ止ル也

○大黃甘艸湯 食已即吐者此方主之

大黃四兩 甘艸四兩

右二味以水二升煮取一升分温再服

按スルニ食已即吐スル者ハ火也朝ニ食ノ暮ニ吐スル者ハ

寒也寒性ハ遲ク火性ハ急也故ニ大黃甘艸湯中ヲ緩ク

シ火ヲ浮ス火下行スハ吐自ラ止ム也食止テ吐スルモノハ

火逆攻上テ吐逆スルナリ此証多クハ大便秘結ノ通セス

故此方主之然ルニ今反胃朝ニ食ノ暮ニ吐ス者ニ大

便數日不通モノ多シ因テ甘艸大黃湯ヲ用テ大便ヲ通

セシムル時ハ大便通メ嘔吐自止食止已テ即吐スル者ニ大

大半夏湯 大黃甘艸湯

半夏湯ヲ用ヒテ數効アリ此火ニ屬スルカ寒ニ屬スルカ此本
文ノ意ト異ル一ニ方用ヒテ以テ知ベシ學子者宜考之

○白頭翁湯 熱利下重者此方主之

白頭翁^二兩^{四分} 黃連^六分 黃柏^六分 秦皮^{各三}兩^六分

右四味以水七升煮取二升去滓溫服一升不愈更服
按スルニ浮利膿血久不止裏急後重スル積熱ノ深キモ血
故ニ白頭翁湯大苦寒ノ藥能熱ニ勝濕ヲ燥シ濕熱去
テ下重自ラ除ク又此湯熱利下重ニアラスト云ハ凡浮利熱
アリテ久シク不止或ハ水浮シテ後重アリテ日久シク不止者
ニ此ヲ用ヒテ數効アリ阿膠甘草ヲ加ヘテ白頭翁甘草
阿膠湯ト云産後熱利ノ者ニ用ヒテ効アリ

○大黃牡丹湯 腸癰者小腹腫痞按之即痛如淋小便自

調時々發熱自汗出復惡寒其脉遲緊者膿未成可下之當
有血脉洪數者膿已成不可下也此方主之

大黃^四兩^六分 牡丹皮^二兩^{四分} 桃仁^五三^分 瓜子^半升^一 芒硝^三分^三分

右五味以水六升煮取一升去滓内芒硝再煎沸頓服之有
膿當下如無膿當下血

按スルニ腸癰ハ其症少腹腫テ硬ク此ヲ按テ痛此内ニ癰
アルヲ知ルベシ瀉時如淋尿色自調者ハ腸癰初テチ
ラント欲ス此時察メ腸癰タルヲ知ル也時々發熱惡寒
スル者ハ表症アルニ似テ表病ニ非ズ此膿ナラント欲スルモ
也其脉遲緊ナルモノハ陰盛ニシ血イダ化セズ其膿未成

是ヲハ可下ス大黃牡丹湯ヲ用ヒテ以テ瘀ヲ消シ熱ヲ浮スハ
大便必血アルベシ若其脉洪數ナルモノハ陽盛ニ已ニ腐ス其
膿ナルモノハ下スベカラス

又按スルニ此腸癰已ニ成者ヲ治スル方也本文ニ膿已ニ成
不可下トアルモノハ疑ラクハ皮膚工腐爛スルモノハイナルベシ
臍ニ當テ穴アキ腐爛ノ膿外工出ルモノハ必死内ニアル時
膿ニテモ血ニテモ差別ナク下スベシ膿成テモ治セヌト云ニ非
ス其人ニヨルヘシ

○甘州粉蜜湯 蛇蟲之為病令人吐涎心痛發作有
時毒藥不止此湯主之

甘州^ニ粉^一蜜^四
兩^二兩^一兩^四

右三味以水三升先煮甘州取二升去滓內粉蜜攪令和煎
如薄粥温服一升差即止

按之ニ蟲動ズル時ハ胃緩ク胃緩キ時ハ舌下廉泉ノ穴開ク
故ニ涎下リ出ルナリ發作有時ハ腹痛甚シク暫時痛テ又
止又卒ニ痛出ルヲ云寒ニ因テ綿々トソ痛ム者ト異ナリ毒藥
不止ハ心腹痛ムエ氣藥ヲ用ヒ血藥ヲ用ヒ温藥ヲ用ヒ或ハ
逐積ノ藥ヲ用ヒテ此ヲ治スルト云ハ其痛不止ヲ云ソレニ此甘州
粉蜜湯ヲ以テス甘州甘中ヲ緩クシ胃ヲ和ス又蜜ト同シク蛇ヲ
誘ヒテ白粉ノ虫ヲ殺スモノヲ合スレバ能虫ヲ殺メ腹痛ヲ止ル
也又方中粉後人米粉ヲ用ユル人アリ我此ヲ不取粉ハ則鉉粉也
能虫ヲ殺スモノナレハ腹痛時ニ作時ニ止モ鉉粉ノ辛ヲ以テ虫ヲ

古方考卷下 甘州粉蜜湯

去レ痛自ラ止也

○烏梅丸 蛇厥者當吐蛇令病者靜而復時煩此為臟寒蛇上入膈須臾復止得食而嘔又煩者蛇聞食臭出其大當自吐蛇厥者此方主之

烏梅 三百個 細辛 兩六 乾姜 兩十 黃芩 斤一 當飯 兩四

附子 兩六 川椒 兩四 桂枝 兩六 人參 兩六 黃蘗 兩六

右十味異搗篩合治之以苦酒漬烏梅一宿去核蒸之五升米下飯熟搗成泥和藥令相得內臼中與蜜杵二千下丸如梧子大先食飲服十丸三服稍加至二十九丸禁生冷滑臭等食

按スルニ病人寒了ツテ胃中冷ハ必蛇ヲ吐ス是蛇厥藏寒也

静ニシ時ニ煩スルモノハ蛇上テ其膈ニ入故ニ煩スルナリ又暫シテ止ニ得食又吐煩スルモノハ蛇食臭ヲ聞テ出ルユエナリ主之烏梅丸ヲ以テスハ蛇酸ヲ得テ静一リ辛ヲ得テ伏ス苦ヲ得テ下リ大酸太辛大苦此皆虫ヲ治スルノ要劑トス傷寒時疫雜病俱ニ蛇ヲ吐スル者此方ヲ用ユベシ若痛不止者ハ大建中湯若少陽寒熱往來嘔ノ蛇ヲ吐スル者ハ小柴胡參甘州大棗ヲ去テ烏梅黃連ヲ加フ若胸中痞スル者ハ三瀉心湯ヲ擇テ用ユベシ又此方痢疾久不正休息痢トナルモノニ用ヒテ數効アリ

○桂枝茯苓丸 婦人宿有癥病經斷未及三月而得漏下不止胎動在臍上者為癥瘕害妊六月動者前三月經

水利時胎下血者後斷三月血也所以血不止者其癥不去故也當下其癥此方主之

桂枝

茯苓

牡丹皮

桃仁

芍藥

各等分

右五味末之蜜和丸

按スルニ此經斷テ有孕名ツケテ妊娠ト云下血スル者ヲ漏下ト云婦人宿ヨリ癥瘕ノ病アリテ胎ヲ受テ未ダ三月ニ不及ソ漏下ヲ得テ下血胎動不安者ハ癥瘕此ヲ害スルモノナリ故ニ其動臍上ニアリ又妊娠六月ニ胎動血下テ不止者ハ前三月胎未ダ固カラズソ血ヲ下ス後三月血ヲ下サスト云ハ比今又胎動下血スルモノ此癥瘕不去故也其癥ヲ下スベシ此方主之此條缺文アリト見エテ鮮シガタシ又胎ト血トヲ辨スル前三月經水

順ニ通シテ後經斷ルモノ此胎也前三月下血ヲ經テ後經斷ル者ハ此必血トナルモノナリ又千金方ニ妊娠一ヶ月ヲ始血ト云スルハ血ト病ニ非ズイツレニ缺文アリト見エタリ姑闕疑ノミ凡此ヲ婦人瘀血血滯ノ者産前産後ヲ不問或ハ小腹痛ニ或ハ腰痛足膝痛或ハ瘀血腫滿ヲナス者ニ可用尤此方煎湯トナシテ用ユル其宜トス又婦人經水久シク不止者此内ニ癥瘕アルニヨルモノ多シ此方ヲ用テ瘀血ヲ去バ自ラ止ムモノ也又時ハ當飯川芎ヲ加スベシ産後調理ニ此加減ノ方ヲ用ヒテ他方ノ及所ニ非ズ證ニ從テ大黃ヲ加フベシ

○芎飯膠艾湯 婦人有漏下者有半產後因續下血都

芎飯膠艾湯

四十二

川芎

阿膠

甘州

各二兩
艾葉

當歸

各三兩
合五分

芍藥四分
乾地黄四分

右七味以水五升清酒五升合煮取三升去滓內膠令消盡
温服一升日三服不差更作

按スルニ五六月ニ墜胎スル者此ヲ半產ト云婦人漏下下血ノ疾五六月ニ墜胎シテ下血絶サル者ハ此癥瘕是ヲ害スレハ也然ルニ癥瘕ナクノ唯下血ノ腹中痛モハ此ヲ胞阻トス此胸中ノ氣血和セズノ其化育ヲ阻ルモノ也故ニ此方ヲ用ヒテ其血ヲ和スベシ血化ノ胎育スル也又此方止血ノ良劑也方中四物湯ノ藥味アリテ芍藥涼血ノ品ヲ分量大ニ血脱ヲ收ム乾地黄ノ甘寒ヲ用ヒテ亦涼血ノ主品トス金匱ニ

生地黄ノ分量ナシ外臺三四兩ニ作り又ハ六兩ニ依ル偏ニ涼血ノ劑タルユエ他ノ分量重ヨリモ多クシテ減スベカラス又此方寒涼ニ偏ナルユエニ艾葉ノ辛温ナル止血ノ品ヲ用ヒ佐トトス阿膠甘州止血ノ聖藥ナリ且有情ノ血類其補血ノ切草根樹皮ノ及ブ所ニ非ズ此ニ味ヲ用ヒテ又佐之又此方主治婦人ノ崩漏或ハ半產ノ後下血續テ不絶或妊娠漏下凡テ一切ノ下血此ヲ用ヒテ陰血ヲ補ヒ以テ此ヲ固ルモノ也

○温經湯 問曰婦人年五十所病下利數十日不止暮即發熱少腹裏急腹滿手掌煩熱唇口乾燥何也師曰此病屬帶下何以故曾經半產瘀血在少腹不去何以知

之其證唇口乾燥故知之當以此湯主之

吳茱萸二三分 當歸二三分 川芎二三分 芍藥二三分 人參二三分

桂枝三分 阿膠二合 牡丹皮三分 生姜二合 甘草各二兩

半夏半升 麥門冬一升

右十二味以水一斗煮取三升分温三服

按スルニ婦人年七々ヲ過レバ任脉虚ノ大衝ノ脉衰エテ天
癸竭テ地道通セズ今下利スル下血ナリ下血數十行不止
ノ多キ時ハ陰ヲ亡ス陰虚スル時ハ暮ニ發熱スル也任衝ノ
脉皆少腹ニ起ル任衝虚スル少腹急ナリ内ニ乾血アリバ
少腹滿ル也陰虚スル火盛也故ニ手掌熱ス血虚スル唇口
ヲ潤スル能ハズ故ニ唇口乾燥スル也婦人年五十五此病

有時ハ帶下ニ属ス以テ其人曾經ニ半產ヲ乾血アリテ少腹
ニ着テ不去ユエナリ又ニ半產ヲ得レバ任衝傷レ其上七々
ヲ逾レバ任衝竭テ以唇口ヲ養フ能ハズ唇口乾燥スル
ナリ又此瘀血アルヲ知ヘシ故ニ温經湯ヲ以テ調之モノ也
此方吳茱萸當歸川芎桂枝皆温藥也故ニ温經ト名
ク瘀血温ヲ得ル時ハ即行ル方内皆氣血ヲ補養スルノ藥
ニシテ曾テ瘀血ヲ逐フヲ以テセズ瘀血自ラ去モノ也此正
ヲ養エバ邪自ラ消スルノ理ナリ因テ婦人崩淋不止或ハ
不胎孕或ハ月事不調帶下不止者並ニ此方ヲ以テ主ト
スベシ

古方節義卷之下終



本堂
印記

明和八年辛卯六月

京師書堂

額田庄三郎
 梅村三郎兵衛
 村上勘兵衛
 山本長兵衛
 中野宗左衛門
 山本平左衛門



印記

明和八年辛卯六月

東洋書堂

藤田庄三郎

梅村三郎兵衛

村上嘉兵衛

山本長次郎

中野三郎兵衛

...

