



傷寒雜病論集解

陽明病卷

武
25分



辨陽明病脈證并治第八



按陽明以胃言也夫人之陽氣藉胃中水穀之氣而盛
 明季靈柩刺節真邪篇曰真氣者所受於天與索立并
 而充身此乃兩陽真立合明之地故曰陽明然則陽明者
 胃府之德號以胃者水穀之海大府之大源也且夫陽
 明者本天之六立中之二乃通於於立者萬物收斂草木
 結實也是故胃中燥結心大便者名曰陽明病也其未
 也有表熱盛矣而腸胃自乾燥者或有發汗若吐若下
 若大若脫血而亡其津液者大便同鞭者皆謂之陽明
 病也又有胃中虛冷嘔吐下利者此亦曰陽明病其病矣

曾故爾或又裏症熱極同是陽明病也然其人見手足厥冷故并諸少陰厥陰二篇之中也

問曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明何謂也

此設問答以并陽明病之所自表也為表症發汗遂亡其津液而胃中乾燥者謂之太陽之明也表熱熾盛而胃中自燥者謂之正陽之明也其症應與柴胡而以辛溫強發其汗或以辛池利其小便而胃中燥煩實者謂之少陽之明也

答曰太陽之明者脾約是也正陽之明者胃家實是也少陽之明者發汗利小便便已胃中燥煩實大便難是也

脾者土藏之脾主為胃行其津液者猶得女供給飲食故名曰脾也約者省的之約即節少之謂此為胃乾才已其津液故脾之職以省約也因轉屬陽明謂之大陽陽明言其為發汗津液乾少以轉裏症也

正陽之正陽者盛陽也表熱盛實而胃中自成乾燥無汗竟傳入胃者是也少陽之少陽者利之上自若字。少陽即表裏之分界苟邪入於陽則寒已變熱也此應微寒某涼解之而

便則為胃燥大便難也蓋少陽之明者以熱犯熱入於胃故為煩逆實滿也太陽之明者為發其汗亡津液

推入於胃也正陽之明者表熱熾盛而津液自燥胃中
自為矣也是三陽之明之因雖少殊要皆不過言胃
燥便秘耳

陽明之為病胃家實也

諸註本無是字今從之按此一條當在篇首篇首在也
陽明本是天之三陰三陽六立中之一節謂秋立也本
篇曰陽明病欲解時從申至戌上是一日之秋以時春
過夏長導蒸盛行有兩陽合明之義故曰陽明言陽之
極也在人體則胃府為陽明位是以邪在胃而為燥矣
凡病作秋之象者皆謂之陽明病也夫陽明之為病之

陽明指胃府而言自此以下凡曰陽明病者以邪在胃
者言也胃納水穀津液之所由也一經汗下津液被
奪則胃中自成壅滯燥熱生於是表之邪悉成收
斂隨燥熱而內陷謂之胃家實也此則篇中之總括

問曰何緣得陽明病答曰大陽病發汗若下若利小便此
以津液胃中乾燥因轉屬陽明不受衣內實大便難者此
名陽明

玉函及諸註太陽病下無若字又玉函名陽明下有病
字○表症過汗或誤治妄吐下或利小便而亡津液胃
中乾燥則周身液少熱無由以輸泄因與胃燥相併此

為轉屬陽明也轉遷轉也言其邪去表入裏也不更衣
謂不大便也人登廁必更衣故謂不大便曰不更衣也
內指胃而言矣者大便結鞅滿而不得出也更加
以蓄熱愈燥結難通此名陽明病也

問曰陽明病外證云何答曰身熱汗自出不惡寒反惡熱也

陽熱盛極而由裏透於表故身熱汗自出也不惡寒
反惡熱者表症已罷裏熱盛極之徵蓋陽明病者汗自
出汗出則其熱當解所以其不解者何也夫汗也其
後津液不復灌則熱不足以去也此胃中燥而汗出其

何能得解矣

問曰病有得之一日不發熱而惡寒者何也答曰雖得之
一日惡寒將自罷即自汗出而惡熱也

玉函發作惡。此虽症既轉屬陽明猶有表症未盡者
此際應有惡寒惡寒已罷自汗出而惡熱也

問曰惡寒何故自罷答曰陽明居中土也萬物所歸無所
傳始雖惡寒二日自止此為陽明病也

玉函及諸註無主字。陽明者胃也胃居中央乃土之
象土者萬物所歸夫四傍有病皆能入於胃入胃則無
復傳以萬物歸於土也而始未入故惡寒也至次日

全入裏則惡寒自罷即自汗出而惡寒也此熱由裏蒸
發肌表乃其病在胃故為陽明病也

本太陽初得病時發其汗汗先出不微因轉屬陽明也

發汗吐下過法則亡津液故能轉屬陽明即汗之一法
猶差其時亦能轉屬陽明也先字可觀專微通也不微
言汗出而邪不服也病在大陽時驟發其汗汗先出而
邪不服則津液早耗且辛溫藥性內留反致格燥邪以
為熱斂殆此為轉屬陽明夫至是則離乎大陽之表既
入陽明故曰轉也

傷寒發熱無汗嘔不能食而反汗出濇々然者是轉陽明

也

傷寒發熱無汗邪無所以泄也不能食者則陽不得宣
但前於胃口耳此將入於胃之漸也邪已入胃則由裏
而蒸出膚表故濇々汗出也初之時無汗而今汗出故
曰反也濇々猶緝々也言汗出緝々不止也下條曰陽
明病法多汗

傷寒三日陽明脈大

玉函脈大下有者為欲傳四字。此條義疑不可強解
傷寒脈浮而緩手足自溫者是為繫在太陰大陰者身重
發黃若小便自利者不能發黃至七八日大便鞭者為陽

明病也

傷寒以熱在裏言也若熱在裏內結壅閉則手足為厥也此是手足過則非裏結脾立不行水索并蒸使然也且脈浮而弦則非裏脈浮為在表緩則痰熱已行也故曰擊在太陰太陰者脾也脾主為胃行其津液者也今也脾立并滯不能以宣行其津液輸於肌膚而為熱單以小便不利故濕熱交盛必蒸身為黃若小便自利者濕泄而熱獨在也不能發黃其人至七八日大便鞭者此因胃實使然乃燥熱熏蒸之所致故此而大便鞭者為陽明病也又有至七八日暴煩下利日十餘行者

見太陰病中

傷寒轉擊陽明者其人漉然微汗出也

轉者去表也擊陽明者屬裏症也胃者水索之海熱盛於胃故漉然微汗出

陽明病若能食名中風不能食名中寒

風邪入裏表症未全罷者謂之陽明中風乃與二陽併病義同中風該傷寒言也口苦咽乾腹滿微喘者裏症已見也發熱惡寒脈浮而緊者表症表脈仍在也凡陽明症見八九而大陽症有一二未罷即從太陽而不從陽明此可汗而不可下也大陽篇曰二陽併病若太陽

病症不罷者不可下下之為逆也此可小便汗夫口苦
咽乾者熱在胃管也腹滿微喘者熱已入胃也卷熱惡
寒者表症未罷也脈浮而緊者表寒未全化也而反下
之胃陽頓衰立化不行故腹滿小便難也

陽明病若能食名中風不能食名中寒

玉函及外臺二名俱作為口。中寒初傷寒之互辭陽明
病若能食者從凡而未不能食者從寒而未此以食之
能否而弁其輕重也

陽明病若中寒不能食小便不利手足濇然汗出此欲作
固瘕必大便初鞕後溏所以然者以胃中冷水穀不別故

也

此亦胃虛之陽明病也陽明病者熱已入胃也若猶或
也中寒不結前條中寒同乃胃中虛寒也胃中虛冷之
入中氣不行故不能食此化不行故小便亦易能滯而
起入於胃者是欲作固瘕之漸也固者久固瘕者瘕泄
乃謂滯泄之久而不止者也手足濇然汗出者為熱聚
於胃之徵此因中寒而汗不能至於周身唯手足濇然
汗出也蓋今因熱結而大便鞕然本以胃中虛冷故後
必溏所以然者未病之前胃中有冷陽弱不能引水水
故也

陽明病欲食小便反不利大便自調其人骨節疼翁久如
右甄伏奄然奄狂濺然汗出而解者此水不勝穀氣與汗
其併脈緊則愈

玉函及諸註并作併。此反上文復言胃寒症也內熱
壅滯久不食而今初欲食是胃陽得回以求伸也汗液
還入胃中故小便反不利大便自調也大便調者不穀
不軟自得快通也是以內若自用胃陽暴伸故其人骨
節疼翁久如有熱伏是猶酒客之醉伏也奄忽也忽然
奄狂者將汗作狂也此名狂汗胃陽暴伸衝擊不能領
用故忽然坐臥不安且狂且躁必得汗而解也此稟氣

現強水不能勝是以汗不先出而陽亢衝擊也水者以
汗之在內者言也夫食入於陰長立於陽者也汗出其
陽則衰故曰與汗共併脈緊則愈言汗出而浮洪脈減
則愈也此非寒陰之緊矣

陽明病欲解時從申至戌上

陽明病者潮熱譫語日晡益甚此時反靜者欲解之漸
也所謂自得其位而安也蓋陽明病之欲解從申至戌
上是一日之秋可見陽明病作秋之象也此則陽明二

字註脚

陽明病不能食攻其熱必噉所以然者胃中虛冷故也

其人本虛故攻其熱必噦

玉函及諸註本虛下有故字。能食不能食可以弁中
立之強弱則凡不能食者總屬胃中虛冷之人。此雖有
推勿妄攻之也。陽明病者熱已入胃也不能食者其人
素胃中虛冷陽弱不能消穀故也。攻熱皆是寒下之藥
復胃陽被傷故噦也。胃中虛冷以不能食言其人本虛
以平素言其熱以陽明病言也。夫傷寒者熱症也宜攻
之。然其人胃中虛冷者又不可一例而推也。

陽明病脈遲食難用飽。久則微煩頭眩必小便難。此欲作
穀疸。雖下之腹滿如故。所以然者脈遲故也。

陽明病即胃病也。脈遲為寒。久則不能直行。胃立故食
難用飽。夫饑則立尚流通飽即填滯。而以中立不行。粟
立不盛形立衰少之故。有微煩頭眩症以下皖不通之
故。有小便難症。爾乃胃虛食滯致熱。此欲粟瘕也。瘕與
瘕同黃病也。蓋中焦升降失其職則水穀之氣不行。而
鬱而成黃。因黃下之腹滿如故不減也。夫熱者發黃之
暝滿下之便可去。此是乘虛不得宣洩。但因胃立虛寒
使然。下之益重其虛。故腹滿如故也。所以然者申明上
文之辭。通明其不可下之意。再出脈遲以欲人從脈上

悟出胃中冷素

陽明病法多汗反無汗其身如蟲行皮中狀者此以久虛故也

陽明者胃府名胃者水穀立血之海也熱乘於胃輒蒸之肌表故多汗而反無汗其身如蟲行皮中狀但痒者其人自利經久或素有他病先虛或本病日久不愈或反覆數下以致周身血液枯涸故不得汗但身痒而已久虛者明所以其不能透出於肌表之由也非謂當用補矣脈法曰遲為無陽不能作汗其身必痒

陽明病反無汗而小便利二三日嘔而欬手足厥者必苦頭痛若不欬不嘔手足不厥者頭不痛

陽明病法應多汗而反無汗者也由胃中無陽復小便利陽從下洩中誰與過積之稍久胃中獨治之寒厥逆上欬故二三日也而欬手足厥冷也必苦頭痛者陰盛自于手陽也其實與陽邪無涉頭痛者標也欬手足厥者本也條中有一也字其不能食可知此胃中虛冷之

陽明故一云冬陽明病

陽明但頭眩不惡寒故能食而欬其人必咽痛若不欬者咽不痛

此言風邪之欬嗽咽痛也以咽為胃系故列之陽明病又有少陰之咽痛不可不辨也夫風邪雖結於咽喉然

按微不致頭痛但起則頭眩而已其人不能食者
本是邪正微故也

陽明病無汗小便不利心中懊懣者必發黃

陽明病者熱在胃下同陽明病無汗熱無由以越小便
不利濕無所泄而心中懊懣

蒸飲發於外

故也濕滯熱發身必發黃

陽明病被火額上微汗出小便不利者必發黃

火者灸燻之矣陽明病被火熱邪愈熾而津液上奪是
以額上微汗出而周身之汗悉小便愈不可得也

蒸身必發黃

陽明病脈浮而緊者必潮熱發作有時但浮者必盜汗出

陽明病脈浮而緊者從傷寒來也故潮熱發作有時但

浮者從中凡來也故盜汗出此太陽凡寒轉陽明後微

細也

陽明病口燥但欲漱水不欲飲者此必衄

陽明病以不大便言也此凡熱在上兼以腸胃壅滯故

衄逆而然

陽明病本自汗出醫更重發汗病已差尚微煩不止者

此大便必難故也以止津液胃中乾燥故令大便難當問

其小便日幾行若本小便日三四行今日再行故知大便

不久出今為小便數以津液常還入胃中故知不久必大便

小便出少則津液還停胃中

潤則便

滑則不久必通

傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之

心下硬滿者不可攻之攻之利遂不止者死利止者愈

陽明病者抵已入裏也下同其人心下硬滿者邪仍在

表裏之間未全入府故不可攻之攻之利不止者邪未

盡而真元先脫也於法為死利止者邪去而真元猶

存也故愈

陽明病面合赤色不可攻之必發熱色黃小便不利也

玉函攻之下又有攻之二字。太陽篇曰面色緣久正

赤者陽立拂符在表當解之重之若誤攻之津液愈耗

故周身發熱也其人身色黃者痰涎壅於心表此必小

便不利也蓋熱不兼濕不為黃矣

陽明病不吐不下心煩者可與調胃承氣湯

不吐不下謂醫不與吐下藥此明非梔子豉湯証也蓋

不由吐下而心煩則發於胃矣可知。

右葉方之 陽明病脈遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濇然而汗出者此大便已鞕也大承氣湯主之

下條曰陽明病脈遲汗出汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜桂枝湯陽明病者熱已入胃也遲者發之至文即中風脈也若汗出惡寒者表未解也雖汗出不惡寒者表症已罷也身重者腰膝痿弱不能起床但如醉人然其熱尚息而立血阻滯故也短氣腹滿而喘有潮熱者即胃實之候故曰此外欲解可攻裏也潮熱者申

酉戌間獨熱餘時不熱如潮之有信也手足濇然汗出者胃中熱甚而蒸發騰達於四支故手足汗出為熱聚於胃蓋津液尚在而熱入胃者周身汗出若無津液而熱入胃者但手足心濇然汗出故曰大便已鞕也若汗多微發熱惡寒者外未解也

此表症未除也猶未可打之

其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不通者可與小承氣湯微和胃氣勿令大泄下

承氣湯高大便氣湯也其熱不潮者熱未全聚此是大滿而不甚結故可但與小承氣湯以通其壅滯耳

大承氣湯方大黃^{四兩}厚朴^{半斤}枳實^{五枚}芒硝^{三合}右四味以水
一斗先煮二物取五升去滓內大黃黃取二升去滓內芒
硝更上火微一兩沸分溫再服得下勿服小承氣湯方大
黃^{四兩}厚朴^{二兩}枳實^{三枚}芒硝^{三合}上三味以水四升煮取一升二合
去滓分溫二服初服湯當更衣不爾者盡飲之若更衣者
勿服之

表邪歸裏內結壅閉四傍不承煩於是與此湯以通其
內結則裏立復矣諸外而形罷無不煩煩故名曰承氣
湯也三承氣俱以大黃為君某以其潤而最能降也其
餘皆治標之品耳惟痞滿而無燥者^實枳實厚朴為之佐

使以破結導滯此名小承氣湯也其有燥實者更加芒
硝以潤燥軟堅此名大承氣湯也芒硝其性走下鹹寒
足以軟堅去實熱故能蕩滌腸胃積滯也若無痞滿但
有宿結而有痰熱者謂胃承氣宜之

陽明病潮熱大便微硬者可與大承氣湯不與者不與之
若不大便六七日恐有燥屎欲知之法以與小承氣湯湯
入腹中轉失氣者此有燥屎乃攻之

陽明者通於秋氣日晡為一日之秋日西而人氣始衰
邪氣始生是以潮熱為熱結於胃之徵乃柴胡加芒消
湯症曰潮熱者實也是故潮熱一症便可放手用下法

不大滿不通レ但大便微鞭者可與大承氣湯下之微鞭對大滿痛而言也若不鞭者熱未成矣縱有潮熱不可妄與大承氣先以小承氣湯試之可矣湯入腹中轉失氣者即知腸中有結屎也此因劑少而未能遽下其所下者但屎之元耳不妨更與大承氣湯攻之也轉失氣者轉動失泄之氣即放屁也。再按微字衍

若不轉失氣者此但初頭鞭後必澹不可攻之攻之必脹滿不能食也欲飲水者與水則噦

與之小承氣湯也無轉失元之際大便即下下者其人腸裏燥而本自胃虛故爾此但初頭鞭後必澹不可攻

之若誤攻之腹脹滿不能食以攻其若寒復虛其胃故也靈柩師傳曰篇曰胃中寒則腹脹前條曰中寒者不能食夫下後腸燥故欲飲水本是自胃虛故與水則噦下條曰胃中虛冷不能食者飲水則噦其後危者心大便復鞭而少也以小承氣湯和之不轉失氣者慎不可攻也

玉函經之上右潮字。此接上文乃可攻之。句其後者用大承氣湯後也攻之後發熱者餘邪復到胃也故大便復鞭而時未久故必少耳宜以小承氣湯和之若不轉失元大便即便下者屬胃中虛寒也慎不可攻之

本支

夫實則讖語虛則鄭聲々々重語也。

實以邪言以正言也以其聲威嚴曰讖語以怯懦曰鄭聲其實則一故曰鄭聲者重語也言鄭聲即讖語之複辭也以後但言讖語不言鄭聲欲人於虛之中年讖語即於讖語之中年鄭聲語聲間間無甚以異也故吳又可曰鄭言讖語態度無二但有虛實之分不應兩立名色又程應旆曰讖語一症有大實亦有大虛實者症與脈俱實其矣別名讖語虛者症虛實而脈虛其矣別名鄭聲々々與讖語無異以亂雅得名耳其實鄭聲即讖語之複辭也

直視讖語喘滿者死下利者亦死

讖語之人直視者此本應下失下燥結益甚或大發汗或數下之以奪其津液而胃液乾枯熱從內生其陽則絕故陽精不榮于目是以直視也又喘滿者津液枯槁邪火獨存故也下利者津液從下脫邪火益熾夫如是則何處停生氣

發汗若重發汗者凶其陽讖語脈短者死脈自如者不死

太陽初得病時發汗過多若陽明病多汗者重復發汗乃亡其陽讖語也陽謂胃中精液也胃中精液不足則津枯槁奇故神昏為讖語也靈柩經脈為日殺入於胃

脈道以通血氣乃行其脈短者其窮也故凡脈自和者血氣未竭也故不死

傷寒若吐若下後不解者津液以亡邪熱益熾故也不大便五六日以上至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者死則不識人循衣摸牀惕而不安微喘直視脈弦者生瀉者死

傷寒若吐若下後不解者津液以亡邪熱益熾故也不大便五六日以上至十餘日日晡所發潮熱不惡寒者裏証悉具也獨語如見鬼狀者精神昏憤猶重乎譫語也若劇者對下文微者而言也若夫病重而元氣不勝

其邪者死則不識人循衣摸牀肢體戰惕而不安此皆大虛之候將危之症也乃血燥津枯以致微喘直視其証矣為可畏然其脈弦者生夫弦者所謂滑柔之脈也素問直^評虛實命曰滑則從瀉則逆也弦脈猶帶長養瀉脈已成涸竭生死以此斷之

微者但死熱譫語者大承氣湯主之若一服利止後服微者謂元氣未衰不至於其劇也但死熱譫語者仍是邪燥結實而已故與大承氣湯下之便愈

陽明病其人多汗以津液外出胃中燥大便必硬則譫語小承氣湯主之若一服譫語止更莫復服

津液外出則胃中燥胃中燥則心胸無液以養是故心神為燥熱所昏以發識語乃與小承氣下其藥蓋則胃潤液和而識語止

陽明病識語發潮熱脈滑而疾者小承氣湯主之因與承氣湯一外腹中轉失氣者更服一升若不轉失氣勿更與之

玉函及成本轉氣作轉失氣。陽明病識語發潮熱者當與大承氣湯也然脈滑而疾者有新入之宿食故至以全小承氣湯而人有裏虛有裏實以轉失氣試之裏實者續之用下法裏虛者不在此例則如下文。再按

識語發潮熱五字衍

明日不大便脈反微澀者裏虛也為難治不可更與承氣湯也

此與小承氣湯也不轉失氣大便即使下明日又不大便則胃中無物可知也脈反微則陽暴亡且瀉則液竭故曰裏虛也其人面色青黃手足逆冷者死面色微黃手足溫者生故但為難治此承氣湯之誠不可不識也陽明病識語有潮熱反不能食者胃中必有燥屎五六枚也若能食者但輕爾宜大承氣湯主之

有燥屎者腸胃結故不能食也若能食者腸胃未結故

但便鞭耳能食但鞭者宜小泉氣湯蓋腸腸者即與也
消但便鞭者不與芒消也未句接有燥屎五六枚也之
下

陽明病下血識語者此為熱入血室俱頭汗出者刺期門
隨其實而瀉之澌然汗出則愈

陽明病以熱在裏者言也其人下血識語者此不乘於
胃而乘血室也血室者榮血停留之處經脈所集會也
榮血者素入於胃泌精微蒸津液化其精微上注於肺
脈者也其津液化為血之處謂之血室即肺助間乳下
期門日月之邊也然太陽篇有婦人中風傷寒熱入血

室症皆以經行言之故古今諸醫血室以為子宮也今
以婦人乳汗充足之間經行稀少而觀之血室者謂榮
血停留之處也明矣婦人經行亦其本在乳下照助間
可推知也故靈樞本神篇曰肝藏血脾藏營由是言之
熱入血室男婦俱命之可矣蓋此症也本下胃實而得
下血因下血而熱入血室是以但頭汗出識語而已故
刺期門以散血室之熱也隨其熱而瀉之者勿失鍼之
權宜也瀉其結血澌然汗出而愈設有榮熱宜小泉胡
湯以有頭汗之表症也又因胃實而下血仍未止者宜

小泉湯

汗出譏語者以有燥屎在胃中此為風也須下之過經乃
可下之下之若早語言必亂以表虛裏實故也下之則愈
宜大承氣湯

胃有燥屎本當用下法此以譏語而兼汗出蓋陽明病
自汗出不惡寒反惡熱也此汗乃兼惡寒可知故曰此
為凡也言中風症既現裏症而表仍未解也宜俟表症
全罷悉入在裏而下之故曰過經乃可下之過經者其
熱已過去表分之謂以經在表也下之若早燥屎雖除
表邪乘虛復陷於裏乃胃虛抵胃正氣昏胃故語言必
亂

以表証王函及諸註下之下有別字。此接上文過經乃
可下之々句表虛者表症全罷之謂裏實者熱邪悉聚
於胃之謂蓋表虛裏實所以申明過經之義

傷寒四五日脈沈而喘滿者為在裏而反從其汗津液越
出大便自難表虛裏實久則譏語

傷寒四五日日數尚未深也脈沈而喘滿其邪在裏也
言雖四五日之淺然熱已在裏者不可必從其汗蓋示
勿熱滯於日數之意也邪氣入裏故其脈為沈而喘滿
者是胃實之逆益也前條曰腹滿而喘有潮熱者此外
欲解可攻裏也反從其汗津液越出表則胃中愈燥故

大便為難也。表虛謂外症也。已罷裏實謂大便結也。夫日以則不止喘滿而識語隨起。此以津乾也。故爾。

三陽合病。腹滿身重。難以轉側。口不仁而面垢。識語遺尿。三陽合病。表裏俱有大熱也。熱壅甚而氣滯。腹

滿身重。難以轉側也。口不仁。謂無口之知覺也。面垢者。熱淫之甚也。熱淫布於胃。氣獨識。會故識語也。口舌不

仁。水道亦是不仁。故遺尿也。發汗則識語下之。則額上生汗。手足逆冷。若自汗出者。白

虎湯主之。玉函識語下有甚字。攻燥熱。倍加故識語甚攻裏。

則表熱乘虛內陷。故手足逆冷。但陽孤而上越。故額上生汗。若自汗出者。此熱邪散漫。乃白虎湯之所宜也。未

二句接上文識語之下。方又。二陽併病。太陽證罷。但發潮熱。手足熱。汗出大便難。而

識語者。下之則愈。宜大承氣湯。

本太陽病併於陽明。故曰二陽併病也。太陽症罷者。外症悉解也。但發潮熱。手足熱。汗出者。為熱聚於胃

之。大便難。識語下之無碍。

陽明病。脈浮而緊。咽燥。口若腹滿而喘。發熱。汗出不惡寒。反惡熱。身重。若發汗則燥。心煩。煩反。識語。若加燒鍼。心忪。

惕煇躁不得眠若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊懣
舌上胎者梔子豉湯主之

陽明病脈浮而緊與二陽併病義同此裏症而表脈未
已也咽燥口苦者熱在胃管也腹滿而喘者熱在胃府
也而發熱汗出証難認然以不惡寒為表症罷但熱盛
於裏故反惡熱也身重者熱壅甚而立血阻滯故爾此
應下之證

李文瀾

若發之胃實症發汗則津液愈竭邪陽益熾故躁也憤々

心亂身瘧則憤々然亂言寐則復加識語也前症未識語
今汗之加識語故曰反

本方前出

若加濕証濕鍼即燒鍼怵惕驚動自太陽為傷寒者加濕

鍼必驚也又曰加燒鍼因胸煩此火氣內攻故也

若下之云下有下後心中懊懣者設也若下之則胃中無物
物故曰空虛胃中無物則膈中無液以和故枯液不得
布苛熱隨生但挽動膈內能使心中懊懣也客氣謂枯
液苛熱也懊懣若惱苛悶之意舌上胎亦膈熱之所為
也其胎乃白胎矣

葉天士

若渴欲飲水口乾舌燥者白虎加人參湯全之

五瀉及脈經無加人參三字。此亦以下後變渴更治

言右某方

若脈浮發熱渴飲飲水小便不利者猪苓湯主之

此就上文胃燥之渴復言水蓄之渴也蓋此渴由病後津液未復水道熱秘而小便不利故拳脈浮發熱以明非裏熱燥渴也水蓄則津液不行故氣道燥以作渴也猪苓湯方猪苓茯苓阿膠滑石澤瀉各二兩右五味以水四升先煮四味取二升去滓內下阿膠烱消溫服七合日三服

猪苓茯苓澤瀉宣通水道阿膠補血與液而存津液於決瀆滑石利竅瀉熱

陽明病汗出多而渴者不可與猪苓湯以汗多胃中燥猪苓湯復利其小便故也

此是白虎湯症不可誤與猪苓湯也

脈浮而遲表熱裏寒下利清穀者四逆湯主之

脈浮故知表熱遲故察裏寒也裏寒故陽不斂於但浮越於表是以外體熱也陽衰於裏則水穀不化是以下利清穀也治法以復陽為主此以胃中虛寒也錄之陽

明病矣 某方

若胃中虛冷不能食者飲水則噦

胃中虛冷不能食者必下利也其人津液內竭故虛火

遊于咽喉間是以欲飲水胃陽未復故飲水則噦
脈浮發熱口乾鼻燥能食者則衄

此承前條胃中虛冷不能食者復言胃氣強能食者也
脈浮發熱口乾鼻燥者凡熱在上部也其能食者胃立
素強加之食入於腹長立於陽故上逆為鼻衄也此以
胃氣強能食也隸之陽明病矣

陽明病下之其外有熱手足溫不結胸心中懊懣譫不能
食但頭汗出者梔子豉湯

陽明下之者^病蒸下久之也而外體有熱手足溫者熱不
結於裏之徵所謂不結胸也此虽法則對而胸中之液

先是以心中懊懣此枯液不得布膈內并煩故爾胃虛
熱格故譫不能食也但頭汗出者膈中并熱上蒸所致
也梔子滋潤以中之

陽明病發潮熱大便溏小便自可胸膈滿不去者小柴胡
湯主之

陽明病從潮熱上言潮熱者本胃實之候胃實之潮大
便鞅小便赤澁此是柴胡湯症而反下之故熱入於裏
乃發潮熱也大便溏小便自可者未定成鞅而胸膈滿
不去者柴胡症仍在也太陽篇曰凡柴胡症不罷者復

柴胡湯

陽明病眩下^鞞滿不大便而嘔舌上白胎者可與小柴胡湯上焦得通津液得下胃氣因和身濺然而汗出解也

陽明病以不大便言也其人眩下鞞滿者即熱邪痰飲結於腹下也不大便而嘔者痰飲拒^拒胃口上下不和故也舌上白胎者熱未成實故可與小柴胡湯上焦得通津液得下者言胸腹之痰飲悉流通也胃氣因和者言胃中陽氣宣發也蓋上焦窒則汗不得^得若^若一^一通之而津液不窒自能四^布故身濺然汗出而解

陽明^中風脈弦浮大^而短氣腹都滿^而下及心痛又按之氣不通

風邪乘裏症謂之陽明中風也脈弦為脈滿腹心痛之診後大為風熱蓋此條陽明中風症居六七而虛寒症亦居三四觀^本文其義自見矣凡^凡熱^熱壅^壅於^於腹中不得以故短氣腹都^都滿也凡^凡熱^熱虛寒^{虛寒}搏於^{搏於}心腹間故^故下^下及^及心痛也久按之立不通者其確乎^乎虛寒^{虛寒}症要畧曰病者腹滿按之不痛為虛又曰跌陽脈微弦法當^當腹滿不滿者必便難而眩疼痛此虛寒從下上也以溫藥服之

是乾不得汗嗜臥一身及面目悉黃^黃也便難有潮熱時以噦耳前後腫利之小差外不解病過十日脈續浮者與小

柴胡^湯脈但浮無餘證者與麻黃湯

玉函及諸註目之上。有面字。止止第言虛寒之見症而此第言風熱之見症也。虛寒之人受風熱故佛前不能越其欲出不得。欲入不得。入經纏被擾無所不至。究竟因虛寒而陽氣無力宣洩不及。而見症如是也。鼻乾者風熱在上部也。以內有虛寒之故。不得汗然。病勢不暴故嗜臥也。一身及面目危黃者。以不得汗故。熱不得汗故。熱不得汗。故熱及于胃也。時々身必發黃。其有潮熱者。外不得汗。故熱及于胃也。時々噦者。虛寒所乘於熱故也。耳前後腫者。風熱滯於上故也。外不解者。表熱未除也。病雖過十日。其脈續浮者。此

有表復有裏故與小柴胡湯也。脈但浮無餘症。謂短氣。脈滿。脈心痛之症。即不兼虛寒也。故與麻黃湯。若不尿。腹滿。噦者不治。

此接上文按之。立不通之句。不尿。腹滿者。無三焦以化也。噦者。虛寒之至矣。素問實命全形論曰。病深者其聲噦是也。胃氣將竭。更無力。可送其邪。故知某不能治也。漢方

陽明自汗出。若發汗。小便自利者。此為津液內竭。雖硬。不攻之。當須自欲大便。宜蜜煎導而通之。若土瓜根及與大猪膽汁皆可為導。

汗其大便皆胃汁所釀不盛于外者必竭于内故病後津液未復其人柔道燥不得大便然此非結熱是則輒不可攻之宜以柔外治而導之總是無病邪但若不從也耳當須自欲大便而行之

蜜煎導方七合一味内銅器中微火煎之稍凝似飴狀擾之勿令焦著欲可丸併手捻作挺令頭銳大如指長二寸許當熱時急作冷則硬以内敷道中以手急抱欲大便時乃去之

玉函及諸註蜜煎下有導字○挺直也柔道即門也疑以下後世註文或土化根搗汁竹管灌入柔道集註工

仙根療諸邪氣熱結蓋其汁潤滑以便於通利也

猪膽汁方猪膽一攻瀉汁和醋少許以灌敷道中如一食頃當大便出

猪膽潤大腸法醋斂腸液

陽明病脈遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜桂枝湯

陽明病謂有裏症而以大便秘言也遲者緩之互文乃中凡脈也汗出多微惡寒者猶未離表此雖氣裏症可但從表法也漢方

陽明病脈浮無汗而喘者發汗則愈空麻黃湯

陽明病以不大便言也浮者表之診即邪外向也無汗而喘者其喘必由表并故發汗則愈

陽明病發熱汗出此為熱越不能發黃也但頭汗出身無汗劑頸而還小便不利渴引水漿者此為瘧熱在裏身必發黃茵陳湯主之

越泄熱也陽明病發熱汗出者此熱越而狂氣不并故不致發黃也但頭汗出身無汗劑頸而還者熱氣并內而不得越但上蒸于頭而然蓋周身無汗則無由以越氣以小便不利濕無所泄熱并濕滯濕熱相搏其身必發黃渴引水漿者高瘧熱在裏之徵也瘧熱謂熱之瘧

滯者

茵陳蒿湯方茵陳蒿_{二兩} 梔子_{十四枚} 大黃_{二兩} 右三味以水一斗

先煮茵陳蒿減六升內二味煮取三升去滓分溫三服從安君今補過字

小便當利尿如皂角汁狀色正赤一宿腹減黃從小便去也

陽明病者熱在裏以蒸之表故多汗也而表裏壅閉汗當出而不出兼_不以小便不利故濕熱相搏乃發黃也是以茵陳為君散宛陳泄瘧熱梔子為佐使散其於小便以其性屈曲下行能降火也大黃則為臣破結通導滯故為之先導以逐其根則表裏疏通黃從小便去也

陽明證其人喜忘者必有畜血所以然者本有久瘀血故
令喜忘尿雖澀大便反易其色必黑宜抵當湯下之

和血及諸証無黑者之者字○陽明証謂大便結燥之
人也其人喜忘者腸胃中必有畜血也是故周身之血
亦乾為瘀滯而在上也心家在下也燥腸胃故令
喜忘大便亦澀也尿至澀大便反易者呈結壅得痰而
潤下也血與壅併故其色必黑以抵當湯下其瘀血則
新血隨生心神斯得輔相漢書

陽明病下之心中懊憹而煩胃中有燥屎者可攻腹微滿
初頭澀後必澀不可攻之

陽明病下之以津氣滯下之也心中懊憹而煩者某力
未足以勝病燥澀欲行而攪作也胃中有燥屎者以轉
失氣知之宜大承氣湯下之故曰可攻腹微滿初澀後
澀者屬胃中虛寒故曰不可攻之

若有燥屎者宜大承氣湯

此二句接上文可攻之句

病人煩熱汗出則解又如瘧狀日晡所發熱者屬陽明也
太陽篇曰欲自解者必當先煩乃有汗而解此日必如
瘧狀者舉其汗不出者而言也熱之往來猶瘧之作
有時而不來况發熱日晡所發是胃熱潮作故為屬陽

明也

脈實者宜下之脈浮虛者宜發汗下之與大承氣湯發汗宜桂枝湯

實者沉實也勞傷為日脈沉實者以下解之浮虛而浮脈乃中凡脈也

大下後六七日不大便煩不解腹滿痛者此有燥屎也所以然者本有宿食故也宜大承氣湯

大下謂停食水浮之暴下也其人六七日不大便者水去胃燥故也煩不解腹滿痛者水去索留乃為燥屎而使之也所以然者本有宿食未解故也可下為日病腹

中滿痛者此為實也當下之

病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能臥者有燥屎也宜大承氣湯

胃本有燥屎氣化不行故小便不利因小便不利而大便乍難乍易時有微熱者即胃實潮作也喘謂呼吸之裏胃謂心氣不清也不能以臥者腹中有物壅滯故也此為有燥屎宜攻之

食穀欲嘔者屬陽明也酸茶更湯全之得湯反劇者屬上焦也

食穀欲吐者納不能納之象此屬胃寒立逆故曰屬陽

明也得湯及劇者屬胸上之熱若疾飲故曰屬上焦也
上焦指膈上言

吳茱萸湯方吳茱萸一升人參三兩生姜六兩大棗十五枚右四味以水
七升煮取二升去滓溫服七合日三服

吳茱萸氣過而過胃味苦而降逆氣蓋過而降者吳茱
萸也寒而降者黃連也是以寒用吳茱萸熱用黃連也
人參補中氣虛生薑散飲止吐大棗為生薑之佐
劑也

太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出復惡寒不嘔但心
下痞者此以醫下之也如其不下者病人不惡寒而渴者

寸緩關浮尺弱即寸關尺浮緩而弱此乃言虛人也虛
人而下之即易致裏虛裏虛則水飲虛氣必聚於心下
因作痞也其人發熱汗出復惡寒者太陽症未罷之候
不嘔但心下痞者是被誤下而胃陽衰弱水飲以聚於
心下也若四渴者與五苓散太陽篇曰水以下之故心
下痞與浮心渴痞不解其人渴而口燥煩十使不利者
五苓散主之

如其不下者病人不惡寒而渴者此轉屬陽明也小便數
者大便必澀不更衣十日無所苦也

此及下文復言其不下之者也其人發熱汗出不惡寒

而渴者此表症罷而作渴故為轉屬陽明也乃謂胃原
氣湯症然小便數大便因鞅者但津液滲之所致而非
結熱故不更衣十日無訶熱證證之若也其人渴飲飲
水少少與飲之_之以潤胃中故曰但以法救之法者何也
所謂與水也

渴飲飲水少少與之但以法救之渴者宜立苓散

此按上文以匡下之也之句

某方注 脈陽微而汗出少者為自和也汗出多者為太

過

脈陽高而上前者為陽

之浮發言

也中凡本自汗故曰汗出少者為自和也和對太過言
謂未至太過耳若汗出太過者津液虧二大便因鞅則
與下文同歸也

陽脈其因發其汗出多者亦為太過太過為陽絕於裏止
津液大便因鞅也

陽脈其以傷寒之浮緊 傷寒本無汗故曰汗發其

汗發而出多者亦與自出多者一致故曰亦為太過蓋

發汗之理從內以達表乃胃中元液蒸之而出於肌

謂之汗素同評無命曰人所以 者皆生於素之生於精

是以汗出過多則胃中津液先亡故曰太過者為陽絕

於裏也津液也裏者胃中陽者胃中之精液也精微之
五故名曰陽津液而指其體也蓋此二篇言胃家矣
之根由也

脈浮而芤浮為陽芤為陰浮芤相搏胃氣生熱其陽則純
浮有氣上行故為陽芤空于內故為陰相搏言合一也
浮芤乃津液外出內空之診胃氣生熱者胃液乾枯熱
從内生也此本應下失下血液為熱搏以致氣血虛耗
故脈為浮芤也又有大發汗或數下之以奪其液而成
者及乎其極也皆能致此矣蓋人而其陽則絕猶天之
無日也身體其可得久乎

跌陽脈浮而濡濡浮則胃氣強濡則小便數浮濡相搏大便
則難其脾為約麻仁丸主之

跌陽二字是診法之題面乃言胃病也蓋此陽明病矣
同浮為胃之燥熱故曰浮則胃氣強言腸胃多有熱也
濡為津液之不足故曰濡則小便數言津液偏滲也夫
腸胃宿熱多且小便數大便乃難脾主為胃行其津液
猶婢女供給飲食因名脾也其脾為約者津液偏滲而
脾之職斯為省約也然與熱結者不倫但為宿熱燥
而津液不足故大便難耳是以諸承氣不中與之俱
用也其宿熱津液以知矣

麻仁丸方麻子仁一斤芍藥一斤大黃一斤厚朴一斤枳實半斤杏仁
并右六味為末煉蜜為丸桐子大飲服十丸日三服漸加
以和為度玉函及諸註作芍藥
煉蜜為丸又知作和

玉函作厚朴杏仁各一斤諸註亦同局言作麻仁五兩
厚朴半斤杏仁五兩半○大黃能潤最降枳實厚朴能
導同結之滯麻仁杏仁能潤乾燥之堅芍藥飲液輔潤
市後如枳桐子大以二大豆藥之

大陽病三日發汗不解蒸々發熱者屬胃也調胃承氣湯
至之

大陽病三日々未深也此至日數沒然以其人本胃中

壅滯故發汗不解猶炊籠之蒸々而發熱也夫熱勢自
內騰達於外即胃實候故曰屬胃也大陽篇曰發汗後
不惡寒但熱者實也當和胃氣與調胃承氣湯

傷寒吐後腹脹滿者與調胃承氣湯

吐後腹脹滿者此非食也為吐可知

大陽病若吐若下若發汗微煩小便數大便因難者此小
承氣湯和之愈

吐下發汗後微煩者此由過法亡其津液而胃家虛失
其液以為胃實症也和之者下其燥實以平和之也

得病二三日脈弱無太陽柴胡證煩燥心下覆至四五日

雖論食以承氣湯少與微和之令小安爾日與承氣湯病二三日言未狂也也脈弱者其人素虛弱也無太

陽柴胡症者表症悉罷也蓋太陽不言某者以有走支

麻黃之不同也柴胡不言症者以專支陽也煩躁心下

鞞至四五日者此雖日數深然以太陽柴胡症已罷故

知諸症屬陽明也其人雖能食不可以為胃強而妄與

承氣湯以脈弱故也但以小承氣湯少與微和之

令安為得耳其間不能得法亦足以誤事

至六日與承氣湯一升若不大便六七日小便利者雖不

能食但初頭鞞後必溏未定成鞞攻之必溏須小便利屎

定鞞乃可攻之宜大承氣湯

以脈弱故恐一升之多至次日始與一升為弱脈之胃

稟素虛而日誅久

若不

上節言弱者與承氣湯又此節言小便利而胃中水索

不別者與承氣湯也前條日鞞語有潮熱反不能食者

胃中必有燥屎五六枚也此曰不能食即有燥屎之五

文此雖曰應下之然以小便利故知胃中水索不別也

不可以為胃中有燥屎而輕與大承氣湯但初頭鞞後

必通以其人小便利故未定成鞞也小便利則水去而

鞭定然後可攻之

傷寒六七日目中不了了晴不知無表裏證大便難身微熱者此為實也急下之宜大承氣湯

靈柩邪氣厥厥病形篇曰精陽氣上走於目而為睛蓋目之視耳之聽鼻之臭舌之味皆胃中精陽氣上走而為之也目中不了了晴不知者此精陽氣不至於目即胃實結燥之所為也無表裏證謂表無惡寒裏無潮熱譫語也大便難身微熱者其症雖不劇而津液不營於目其言非細故即靈柩抵病篇曰目不明抵不已者死故急下之急者勿遲緩之意

陽明病發熱汗多者急下之宜大承氣湯

胃實症發熱汗多者津液益亡遂至其陽則絕故急下之

發汗不解腹滿痛者急下之宜大承氣湯

發汗不解腹滿痛者其病在胃故急下之以通其壅滯也

腹滿不減々不足言當下之宜大承氣湯

那明盛矣急下之其邪不易衰此不妨下之而再下下之也

陽明病發熱病必下利其脈不負者順也負者失也互相

^{本文}冠賊名爲負也

陽明謂胃中有寒少陽謂胸腹有飲也合病者其病同時發也胃有寒胸腹有飲則中氣不行何至能化水穀下利可必矣其脈不負謂下利後脈有胃氣此因下利而寒去陽復故為順也負者謂下利後脈無胃氣但見急脈也故曰負者失也互相冠賊言胃陽衰則必見不^フ衰則不見所謂土敗水賊木賊土敗血虛邪實邪實正虛名為負也

脈滑而數者有病食也當下之宜大承氣湯

滑則榮氣衰數則為熱是榮氣衰有熱之診乃為宿食

也下之則愈

病人無表裏症發熱七八日雖脈浮數者可下之微令已下脈數不解合熱則消穀善饑至六七日不大便者有瘀血宜拍膏湯

病人無表裏症謂發熱之外無他症候此言無外邪也蓋無外邪而發熱者則裏之壅滯也裏已壅滯雖脈浮數者宜下之也已下脈數不解發熱亦不除故曰合熱此非外來之邪熱乃腸中有瘀血之熱也故消索喜飲太陽篇曰病人脈數久為熱當消索引食至六七日不大便者對下文下不止而言也夫下之後下利止而脈

脈數本解消索喜饑者其人自瘀血可知也

若脈數不解而下不止必協熱而便膿血

怛杖通怛熱謂下利杖表熱也蓋飲食如常有數脈即

瘡瘍若膿血之診

傷寒發汗已身目為黃所以然者以寒溼在裏不解故也

以胃不可下也於寒溼中求之

傷寒發汗已抵邪解矣何緣反蒸身目為黃所以然者

以寒濕在裏不解故也寒以濕之性言裏對表之裏即

在內之通緬此寒濕并蒸之抵非實抵以為不可下也

宜於寒濕中察或淺或深而治之求之初下文三法

傷寒七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿者茵陳蒿湯主之

如橘子色謂其黃之鮮明也小便不利腹微滿者瘀熱

在裏也宜下之

傷寒身黃發熱者梔子蘘皮湯主之

抵已發於外自與內瘀不同宜隨其抵勢而清解之

梔子蘘皮湯方梔子十五個甘州黃蘘三四各三味以水四

升煮取一升半去滓分溫再服

梔子其性屈曲下行能降火從小便中泄去蘘蘘利下

竅除濕可草和中氣

傷寒病熱在裏身必發黃麻黃連軀赤小豆湯主之

玉函及諸註必下有發字○傷寒病熱在裏者病在

裏寒濕籠裏表之謂此不但發黃復有喘滿氣急之變故

於麻黃湯中增損之也疥癬灌洗其身喘滿氣急煩加

粥死者用此效効又有邪而滲身周身浮腫者亦用此

數奏効

麻黃連軀赤小豆湯方麻黃_{二兩}赤小豆_{一升}連軀_{二兩}杏仁_{四十個}

大棗_{十二枚}生梓白皮_{一升}生薑_{二兩}中枳_{二兩}已上八味以潦水一斗

先煮麻黃再沸去上沫內諸藥煮取三升分溫三服半日服

盡

細註連軀根成本作翹房今按根字衍玉函及諸註作

甘枳一兩○此方於麻黃湯中去桂支易連軀蓋桂支

辛溫為病熱不宜故以連軀之苦寒代之而行表發也

寒濕裏熱則喘氣有加故以杏仁降喘逆赤小豆下水

滲濕以降胸膈之滯逆生梓白皮雖曰除肌肉之濕熱

然於葉鋪難得之不足以備急救故以桑白皮代之而

利肺氣開表以行水道之化亦佳生姜助胃中生發

之氣以煥葉氣逆達於表大棗斂液以防患於前中枳

枝中氣以行撫育之政煎以潦水者以苜蓿之水而治

苜蓿病也潦水朝滿夕除者乃用之以欲病熱之速去

也。雨水謂之潦，等退之。詩云：潢潦無根，涼朝滿夕，已除
潦音老。以上三方傷寒後發黃之治也。蓋表證者，與
麻黃連翹赤小豆湯而發之，裏證者，與茵陳蒿湯而下
之，表裏無證，但欲清解者，與梔子蘘皮湯。此治寒濕之
三法也。

右午陽明病脈證并治凡八十一條

論疑一三章

