



痘疹書  
扁鵲傳

三冊合本

武 9  
258



門  
新  
子  
子  
子

蘇盛條書

蘇盛條書

蘇盛條書

古碑

皮  
之亦  
房中  
乾  
炒  
黃  
明  
中  
進  
胃

門 武 9  
第 2 卷  
卷



古寧張遜玉先生纂

# 種痘新書

內附小兒麻科雜症



痘科類編釋意

氣藥類

新印

馬國書

人參

味甘氣溫氣味俱薄浮而升陽也入手太陰肺經

黃芪

味甘氣溫平氣薄味厚可於三日之前熱症忌用

白朮

味甘氣溫味厚氣薄可於三日之前熱症忌用

蒼朮

味苦甘辛氣溫味厚氣薄陰中陽也入手太陰脾經

色用痘瘡濕癢者及不結痂者宜用之亦宜房中

陳皮

味辛苦氣溫氣薄味厚可升可降陽中之陰也溫水洗淨去白化痰涎留白去筋膜和中補脾胃止嘔治疔瘡能導滯行氣

青皮

味苦辛氣微寒氣味俱厚沉而降陰也入手少陽三焦足厥陰肝散滯氣瀉肝氣消食破積溫水洗切開去中穢剝碎曬乾用治疔瘡

石菖蒲

味辛苦氣溫通九竅出音聲主瘡腫遍身熱毒痛癢一十九節者佳水浸去粗皮用疔瘡驚癩神昏

五味子

味酸氣溫味厚氣輕陰中微陽也入手太陰肺足少陰腎主咳逆上氣生津止渴肥大肉厚者去梗酒洗淨晒乾

貝母

味辛苦氣平微寒主咳嗽上氣清痰肥白輕鬆者佳去心用

細辛

味大辛氣溫氣厚於味陽也少陰經藥散水寒治內寒細莖氣烈者佳去蘆并葉溫水洗過晒乾用及瘻塌用之

乾薑

味辛氣大熱氣味俱厚半浮半沉可升可降陽中陰之寒炮用炮

生薑

味辛氣微溫氣味俱輕陽也益脾胃散風寒治痰嗽止嘔吐能殺半夏之毒疔瘡不起發色灰白者用起發光壯紅

麻黃

味苦甘氣溫氣味俱薄陽也輕清而浮升也無毒衛藥也發散風寒泄衛寔去榮中寒陳久者佳去根節酒蜜各半浸良久致妙用凡疔瘡出遲及痘子黑陷剝磨

白芷

味辛氣溫氣味俱輕陽也通行乎足陽明經主一切瘡疔排膿止痛內托生肌擇白而堅寔者用蠶

大附子

味辛甘大熱其性走而不守可升可降陽也補助陽氣不足溫脾胃治四肢厥逆頂平而圓臍正重一兩者佳先以童便浸過慢火中炮極熟去皮臍切片再用防風甘草煎湯乘熱浸晒乾用之惟疔瘡瀉泄內虛手足冷寒戰交牙瘡色灰白或癢癩者用之其餘不可妄用

豆斗頁扁等意卷之下性

半夏

味辛苦氣平沉而降陽中陰也入足陽明胃大陰  
脾少陽膽經化痰止咳吐涎益脾胃之氣白淨勝正

木香

味辛苦氣溫用湯水浸七日水隨日換切曬  
乾薑汁炒用湯水浸七日水隨日換切曬  
氣止痛後重凡痘出不快者用順氣行毒而痘出  
自快頂陷可起但不可多用恐瀉氣而

肉豆蔻

味苦辛其氣溫入手陽明大腸經主內虛瀉瀉  
疾疔包裏慢火中煨熟乘熱以重紙包槌去油用  
吐逆瀉泄之要藥也

砂仁

味辛苦入手足太陰經陽明經太陽經治痘虛寒  
腹中煩悶不思飲食吐瀉嘔噎溫裏進食去鼓炒  
研碎

桂枝

味辛甘氣大熱氣味俱薄體輕而上行浮而升陽  
也入手少陰經桂枝入足太陽經通榮衛開腠理  
和氣血散風寒發表之要藥也治痘賴其鼓舞上  
行以開榮衛又引黃芪以達肌表痘子手足發不  
透者用桂枝引經痘瘡寒戰咬牙者宜加用內虛  
腹痛用肉桂皆刮去皮用邪熱症及痘後作瘰皆  
用不可

茯苓

味甘淡氣平氣味俱薄能升能降陽也白者入手  
太陰足太陽少陽赤者入足太陽手少陽少陰補  
中氣用白利小便用赤者刮去皮與中心木用

丁香

味辛氣溫純陽入手太陰肺足陽明胃少陰腎凡  
痘色白胃寒嘔逆瀉泄腹脹不食胃虛寒者必用  
若痘寒戰咬牙足冷者與桂同用蓋了

藿香

味甘辛氣微溫氣厚味薄浮而升陽也入手足太  
陰經助脾開胃溫中快氣治吐逆入烏藥順氣散  
則理肺入黃芪四

檳榔

味辛苦氣溫氣薄味厚沉而降陰中陽也破滯氣  
世胸中至高之氣形若鷄心尖長中不空虛切開  
者佳

枳殼

味苦酸辛氣微寒味薄氣厚浮而升微降陰中陽  
也主胸膈痞塞散結氣走大腸瀉肺氣又治偏身  
痲疥大風在皮膚中如麻豆若癢通關節去積白  
蘇炒用與枳實同但枳實性速

厚朴

味苦辛氣溫味厚氣重濁而漸降陰中陽也  
治血分病枳殼性緩治氣分病  
溫中益氣厚腸胃走冷氣消宿食治腹痛脹滿黃  
豆并煎扁豆卷之下性

結之聖藥肉厚紫色者佳削去粗皮

大腹皮 味辛氣微溫下一切氣健脾胃先以酒洗去毒

紫蘇 味辛甘氣溫湯解肌發表治心腹脹滿開胃下食用

大棗 味甘氣平溫氣厚陽也安中養脾助十二經平胃

牽牛子 味苦氣寒屬火善走主下氣利大小便以氣藥引

南星 味苦辛氣平有毒除風痰利胸膈消腫溫水泡七

烏梅 味酸氣平陽也收肺氣止下痢瀉腸止瀉去痰止

杏仁 味甘苦氣溫入手太陰肺主咳逆上氣下氣定喘

粳米 味甘氣平微寒入手太陰經少陰經益氣止煩渴

陳倉米 味甚者可炒熟煮湯飲之

酒 解毒藥須酒浸洗炒用可以通行一身之表

赤石脂 味酸澁氣寒止瀉利又治疳蝕瘡白礬火飛過用

枯白礬 味酸澁氣寒止瀉利又治疳蝕瘡白礬火飛過用

漿水 味甘酸氣涼微溫主調中引氣開胃止渴解煩去

龍骨 味甘氣平微寒陽也去脫胃氣澁腸色白者佳研

穿山甲 氣微寒取鱗爪上甲以東向陳壁土拌炒焦黃色

麝香 味辛氣溫痘瘡黑脂者用此引發表解毒之藥直

當歸 味辛甘氣溫氣味俱輕可升可降陽也入手少陰

血藥類 豆斗頁扁犀象卷之下性

當歸 味辛甘氣溫氣味俱輕可升可降陽也入手少陰

血藥類 豆斗頁扁犀象卷之下性

當歸 味辛甘氣溫氣味俱輕可升可降陽也入手少陰

血藥類 豆斗頁扁犀象卷之下性

當歸 味辛甘氣溫氣味俱輕可升可降陽也入手少陰

血藥類 豆斗頁扁犀象卷之下性

當歸 味辛甘氣溫氣味俱輕可升可降陽也入手少陰

血藥類 豆斗頁扁犀象卷之下性

當歸 味辛甘氣溫氣味俱輕可升可降陽也入手少陰

川芎

味辛氣溫能走而散上行頭目下血少陽通肝

芍藥

味苦酸氣微寒抑肝緩中扶陽收陰補血破血脾經

熟地黃

味苦甘氣寒能補腎中元氣乃天一所生之源也補

生地黃

味苦氣寒陰能補腎中元氣乃天一所生之源也補

天門冬

味苦甘氣寒能補腎中元氣乃天一所生之源也補

麥門冬

味甘微苦氣平微寒陽中破陰入手太陰肺經治

紅花

味辛甘苦氣溫陰中之陽多用於破血少用則入

牡丹皮

味辛苦氣寒陰中破陽入手厥陰經足少陰經治

牛膝

味苦酸氣平主四肢拘攣不可屈伸活絡生血

蒲黃

味甘氣平主積小便利血消痰血一切吐衄腸風

茅根

味甘氣寒補中益氣利小便除痰血止消渴解

大小蘆根

味甘苦氣溫主養精保血止渴血下血歸入

香附子

味辛氣微寒陽中之陰能下氣開胃又逐去瘀血

鐵以童便浸曬乾炒焦用

五

地骨皮

味苦氣寒陰也入足少陰手少陽主五內邪氣熱

蘇木

味甘酸平氣平陽中解有汗之骨蒸

桃仁

味苦甘平氣平陰中陽也入手足厥陰經主瘀血

解毒藥類

黃芩

味苦氣平寒味薄氣厚可升可降陽中陰也求枯

黃連

味苦氣寒味厚氣薄陰中陽也可升可降入手少

黃柏

味苦微辛氣寒氣味俱厚沉而降陰也足少陰經

旋子

味苦氣寒氣薄味厚輕清上行氣浮而味降陽中

羌活

味苦辛氣味俱薄陽也無毒散肌表風邪利肢節

獨活

味苦辛甘氣味俱輕陽也升也無毒乃足少陰引

升麻

味苦甘氣平微寒味薄氣厚浮而升陽也陽明經

葛根

味甘氣平性輕浮陽也足陽明胃行經藥主消鬱

葛根

味甘氣平性輕浮陽也足陽明胃行經藥主消鬱

葛根

味甘氣平性輕浮陽也足陽明胃行經藥主消鬱

天不...

子



### 防風

味甘辛氣溫純陽脾胃二經行經藥大陽本經藥  
乃辛任卑賤之職隨所引而至者也為肺寔散頭  
目滯氣除上焦風邪之仙藥去蘆又頭又尾者用  
如瘡癩瘻瘻與黃蘗同用手足是瘡不起與白芍桂  
枝同用瘻太濕  
用之風勝濕也

### 荆芥穗

味辛苦氣溫辟邪氣通利血脈傳送五臟能發汗  
又能破瘡腸結聚之氣凡痘子出發不快不透者  
必用之

### 桔梗

味苦辛氣微溫味厚氣輕陽中之陰治鼻淵喉痛  
藥也  
痛利胸膈之氣治肺熱嗽逆消痰涎肺癰又能開  
提氣血載諸藥不下沉故名舟  
釋去蘆米泔浸切片陰乾用

### 柴胡

味苦氣平微寒氣味俱輕陽也升也少陽厥陰行  
道升提胃氣  
上行去蘆用

### 前胡

味苦氣微寒主心腹結氣治時氣發熱推陳致新  
治風寒咳嗽痰涎去蘆用又尾者不宜用  
味甘氣平治胃中虛熱平胃氣長肌肉遂皮膚邪

### 車前子

味甘酸氣寒主利水道治熱淋雖利小便而不走  
氣澀肝中風熱衝口赤前炒研用

### 白蒺藜

味苦辛氣微寒治身體風癢去惡血長肌肉明目  
輕身炒先搗去刺後研碎用凡痘瘡癢潰爛者用  
味辛苦氣寒純陽血積下氣凉心止血破惡血此  
如蟬肚色赤

### 鬱金

如姜黃者用  
如蟬肚色赤  
味苦氣溫熱治驚惕治兩目赤腫睛脹疼痛不可  
忍去蘆用

### 草龍胆

味辛苦氣平寒陰也通行十二經止肺氣喘嗽殺  
蘆用  
癰腫惡結諸蝟疥癬蟲瘡除邪利大小便漢防已

### 防已

味辛苦氣平寒陰也通行十二經止肺氣喘嗽殺  
蘆用  
癰腫惡結諸蝟疥癬蟲瘡除邪利大小便漢防已

### 天花粉

味苦氣寒味厚陰也主消渴身熱煩滿大熱唇乾  
口燥排膿消腫毒生肌肉利胸膈治熱痰止咳  
味苦氣寒味厚陰也主消渴身熱煩滿大熱唇乾  
疹癢痛酒蒸用凡痘瘡癢瘻黃爛加煎以此作丸  
用咽笑痛

### 苦參

生研末用  
味苦辛氣平微寒陰中微陽入手足太陽經解傷  
寒煩熱行滯氣化痰利腸痘子瘰癧可為薰藥以  
能去濕

### 茵陳

味苦辛氣平微寒陰中微陽入手足太陽經解傷  
寒煩熱行滯氣化痰利腸痘子瘰癧可為薰藥以  
能去濕

豆斗頁扁異急卷之下性 七

知母

味苦辛氣寒寒氣味俱厚沉而降陰也足少陰經藥  
主消渴熱中補腎水瀉腎中大消痰止咳潤心肺

馬兜鈴

味苦氣寒主肺熱咳嗽氣逆痰結喘促去膜用  
肉白者去毛皮忌鐵

大黃

味苦氣大寒氣味俱厚沉而降陰也入足陽明經  
瀉熱通腸胃推陳致新通利水穀性走而不守瀉著

葶藶

味辛苦氣大寒治腫壅上氣咳嗽喘促痰飲通利  
水道走瀉為功大降氣壅病人虛者慎用壯者炒用

猪苓

味甘苦而淡氣平寒氣味俱薄升而微降入足太  
陽少陰經解傷寒瘟疫大熱除濕利水道治渴濕

澤瀉

味甘酸氣寒氣味俱厚沉而降陰也入手太陽少  
陰經治淋閉逐膀胱三焦停水瀉腎除濕擇白淨

木通

味辛甘氣平味薄陽也除脾胃寒熱通利九竅血  
脈關節治五淋利小便導小腸熱出音聲療耳聾

瞿麥

味苦辛氣寒陽中微陰主開格諸閉小便不通夾  
壅腫排膿明目去翳

大戟

味苦甘氣寒陰中微陽主行十二經水伐腎邪去  
腹脹煩燥者宜此以瀉膀胱

射干

味苦氣平微溫主喉痺咽痛不得消息散結氣消  
腫毒行太陰厥陰之積痰使結核自消甚捷去根

菊花

味苦甘氣平寒明目養血去翳膜黃色味甘應  
候開者佳去枝葉并蒂治瘧後目

木賊

味甘微苦主目疾退翳膜明目益肝膽去節以酒  
潤濕火上烘乾用

穀精草

味辛氣溫主明目去膚翳  
味辛氣溫主明目去膚翳

桑白皮

味甘辛氣溫入手太陰經瀉肺有餘喘唾血消  
痰止咳去肺中水氣取人土疾康行者佳出土上

薄荷葉

味辛苦氣涼氣味俱薄浮而升陽也入手太陰厥  
陰二經能引諸藥入榮衛發汗通利關節治痘壯

薄荷葉

味辛苦氣涼氣味俱薄浮而升陽也入手太陰厥  
陰二經能引諸藥入榮衛發汗通利關節治痘壯

薄荷葉

味辛苦氣涼氣味俱薄浮而升陽也入手太陰厥  
陰二經能引諸藥入榮衛發汗通利關節治痘壯

薄荷葉

味辛苦氣涼氣味俱薄浮而升陽也入手太陰厥  
陰二經能引諸藥入榮衛發汗通利關節治痘壯

薄荷葉

味辛苦氣涼氣味俱薄浮而升陽也入手太陰厥  
陰二經能引諸藥入榮衛發汗通利關節治痘壯

薄荷葉

味辛苦氣涼氣味俱薄浮而升陽也入手太陰厥  
陰二經能引諸藥入榮衛發汗通利關節治痘壯

薄荷葉

味辛苦氣涼氣味俱薄浮而升陽也入手太陰厥  
陰二經能引諸藥入榮衛發汗通利關節治痘壯

本草綱目卷之下性

胡 菱 味辛氣溫痘不出酒煎噴之

香 薷 味辛氣微溫治傷暑除煩熱調中溫胃利小便疔  
得則清化行而熱自下用莖穗葉去根夏月出痘  
不可缺清暑故也

訶 子 味苦酸氣溫性急善降開胃瀉腸止瀉痢又治肺  
氣因火傷極鬱過脹滿喘急咳嗽味酸苦故有收  
斂降火之功去核用

蔓 荆 子 味苦辛甘氣微寒溫陽中之陰太陽經藥主風頭  
痛腦鳴目淚出散風邪除目翳內痛微炒去蒂用  
味苦氣微寒主五淋清心解熱

淫 羊 藿 即仙靈脾羊食多淫故名淫羊藿治痘瘡絕陽不  
起去刺羊油炒用不可多用恐發癢也

何 首 烏 味甘苦澁氣微溫無毒治痘血不足過期不起發  
不收斂

天 竺 黃 味甘氣寒無毒此竹內所生如黃土者可用主痰  
壅失音明目去諸風熱驚悸鎮心滋養五臟  
薏 苡 仁 味甘氣微寒無毒益氣助胃除風濕理脚氣

山 藥 味甘平氣溫無毒補中益氣強陰痘中瀉泄者炒  
用之

白 扁 豆 味甘氣微溫主和中下氣止吐瀉痢炒去皮勝甲  
味鹹甘氣溫無毒治胃虛食難消化腹中脹滿而  
痘不起發者此王道和緩之藥始終可用炒用

麥 芽 味甜氣溫調中下氣化水穀消宿食炒用  
殼煎湯發痘疹但多食發熱發癢肉治痘虛作瀉  
陷伏不起用此養脾

荔 枝 味苦氣寒無毒主五內邪熱氣強陰益精治痘風  
眼赤痛風癢瘡瘰

枸 杞 味甘辛氣溫有小毒治痘四皮風熱不退及頭目  
不清可用散風利熱解毒薑汁浸透製熟用

白 附 子 味鹹苦氣平微寒主青盲目淫膚赤白膜腫痛淚  
出除肝熱

地 膚 皮 味苦氣寒無毒主膀胱熱利小便去皮膚中熱解  
毒

龍 腦 味辛苦氣溫治疔疾發痘豆瘡治痘熱盛狂言昏  
迷不省

犀 角 味苦酸鹹氣寒無毒能安心神止煩亂鎮肝明目  
涼血丹溪云屬陽性走散痘後用此散餘毒若血  
虛小兒忌用  
牛 黃 味苦氣平涼有小毒解心中火毒凡痘驚熱狂  
發癢痘色紫赤可用氣血充足日至不斂者亦用

丹砂 味甘氣微寒痘瘡將出空調服之解痘毒令出快

朴硝 味苦辛鹹氣薄味厚沉而降陰也主諸寒熱邪氣

滑石 味甘氣性沉重入足陽明經主燥濕實六腑化食

石膏 性寒味甘辛寒則能除熱甘則能調胃辛則能解

人牙 氣平牙者骨之餘腎主乎骨用此以伐腎邪凡痘

兔頭骨 味甘氣平無毒能解五臟之毒發痘疹臘月者良

象牙 氣平無毒極利小便痘不收靨用之以其有利水

彊蠶 味鹹辛無毒治驚風痰壅熱甚四肢搐搦亦能發

人中白 即尿桶中白垢厚者火煨治痘牙疳

人髮 火煨研細入藥汁調服補陰甚捷能止血痘中則

雞冠血 味甘辛氣微溫以無灰酒調服能發痘蓋鷄屬巽

琥珀 味甘氣平屬陽治痘驚風及小便不利而痰熱甚

血竭 味甘鹹氣平有小毒主五臟邪氣一切惡瘡止痛

沒藥 味辛氣平無毒破血理氣止痛療痘癰餘毒

伏龍肝 味甘微溫即竈中對釜臍下黃土也消痘癰腫止

鹿茸 味酸甘苦辛氣溫無毒凡痘氣血虛脾寒陷伏不

以上藥味有發表者有攻裏者發表寓解散之義

攻裏有開竅活動之功故皆著於解毒類中以下

則解毒之藥也後學當知

甘草 味甘氣平生寒熱溫陽也無毒入足厥陰太陰少

藥毒性能緩能解諸急熱藥用之緩其熱寒藥用之

緩其寒生用大瀉熱火熱用補三焦元氣健胃和

陰經主五臟六腑寒熱邪氣解毒溫中止渴解百

藥毒性能緩能解諸急熱藥用之緩其熱寒藥用之

緩其寒生用大瀉熱火熱用補三焦元氣健胃和

連翹

中養血補血稍子生用除胸中積熱  
去莖中痛節生用消腫毒去皮用  
味苦氣平微寒氣味俱薄陽也可升可降手足少  
陽經陽明經入手少陰心經瀉心火降脾胃濕熱

山豆根

除心經客熱主諸癰毒惡  
瘡有神功去便去穢研用  
味苦甘氣寒主解諸毒消瘡腫治咽喉腫痛好  
毒凡用磨水入藥內服

牛蒡子

一名惡實一名鼠粘子一名大力子味辛苦氣平  
主療風毒腫瘡疹喉痺風熱痰壅咽膈不利頭面  
浮腫治痘解毒起項不可

懸參

味苦鹹氣微寒足少陰君藥此乃樞機之劑骨領  
諸藥上下肅清治空中氣氤無根之火此乃聖藥  
也去盧稍

淡竹葉

味辛甘氣寒涼心經除煩熱止渴  
用忌鐵

紫草

味苦氣寒治傷寒時疾發瘡疹不出者利九竅通  
水道治痘心經有熱閉塞不通氣血凝滯而毒盛  
起也紫用此涼心開竅使痘發越而痘易

山查子

味甘酸氣溫平陰中陽也消食化結氣健胃又發  
痘消滯血蒸熱去核晒乾用

胡麻

一名巨勝子味甘氣平補五內益氣力長肌肉堅  
筋骨除疥癬及浸淫瘡痘後潰爛之瘡最宜用

黑豆

能解毒和諸藥而兼利小便不論寒熱虛實皆可  
用之物

赤小豆

味甘辛酸氣溫平陰中之陽上下水排腫膿膿血  
熱中消渴止瀉利小便解諸熱毒小兒未出痘者

菀豆

皮浸水能治目翳膜  
性可味苦氣薄能解毒故痘中用之以拔疔毒也

淡豆豉

味苦氣寒治傷寒時疾發汗主寒熱瘴氣惡毒煩  
燥滿悶痘瘡發表解表宜用之無鹽者佳

薤白

非類形似菲而無實味辛苦氣溫無毒療諸瘡主  
久痢不差腹中常惡者但多食之亦痢取薤黃

蟬退

味酸甘氣寒無毒能發痘解毒而退風熱若熱盛  
紅紫可用寒症忌之又云不論寒熱虛實可並用

蜜

凡痘出不快或倒陷黑陷勿去翅足研  
細入湯調服去目中翳去翅足研  
味甘氣平微溫無毒主心腹邪氣安五臟諸不足  
益氣補中止痛解毒治疔疔不瘡用湯調時以羽翎

豆斗頂扁翠意卷之下性

菜豆

味甘氣寒無毒除熱氣解痘毒治痘煩熱消滯

金銀花

味甘溫無毒消痘癰腫痛解諸毒

人糞

氣寒主時行大熱狂走解諸毒治痘瘡惡陷燒爛

臘雪

味甘氣寒解一切毒治天行時痘疫臘月或以瓶

蜜蒙花

味甘氣平微寒主青盲目翳赤澁多眵淚消目中

馬齒莧

味酸氣寒性滑無毒主癰瘡毒利大小便治痘後

附錄

一治痘毒...

附幼兒雜症方論

幼兒之病自痘症而外若驚疳吐泄等症關係安危最重今將聶久吾經驗調治得其竅妙者附刻痘書之後以備選用慈幼者閱是編而幾乎全矣

急驚風

古謂之陽癇

急驚之候身熱面赤搐搦上視牙關緊硬口鼻中氣熱痰涎潮壅忽然而發發過容色如舊有偶因驚嚇而發者有不因驚嚇而發者然多是身先有熱而後發驚搐未有身涼而發者也此陽證也蓋熱盛生痰痰盛生驚生風宜用涼劑以除其熱而化其痰則驚風自除矣切不可用辛燥等驅風藥反助心火而為害也當其搐搦大作時但可扶持不可把捉恐風痰流入經絡或至手足拘攣也又不可

驚惶失措輒用艾火灸之燈火燒之此陽症大不宜於火  
攻曾見有用火攻而壞事者矣戒之戒之此症雖急若從  
容服清涼之劑調理自可平安不可聽信時醫峻用攻擊  
如巴豆輕粉之類以取速效傷害不小古諺云急驚風慢  
慢醫此通言之切當而可用者也

急驚有八候不可不知搐搦掣顛反引竄視是也搐者兩  
手伸縮搦者十指開合掣者勢如相撲顛者頭偏不正反  
者身仰向後引者臂若開弓竄者目直似怒視者睛露不  
活是謂八候也身仰向後即所謂角弓反張也  
又有一證欲出痘疹先身熱驚跳或發搐搦者此似驚風  
而非驚風也最宜辨認當服散藥切不可誤作驚風治  
之

清熱鎮驚湯

連翹 去心蒂 研碎

柴胡

地骨皮

龍膽草

鉤藤

黃連

山梔仁 炒黑

片苓 酒炒

麥門冬 去心

木通

赤茯苓 去皮

車前子

陳枳實 炒各四分

甘草

薄荷

各二分 滑石細末 八分

燈心一團淡竹葉三片水一茶鍾零五分煎至七分溫  
服兒小分作數次服

加減涼膈散

連翹

片苓

山梔仁 炒

枳實 炒

前胡 各五分

黃 酒炒 薄荷 一錢

甘草 各二分

水一鍾煎五分三歲以下者分二三服之微利一  
次痰熱自退若已通利則不必盡劑

宣風散

陳皮去白檳榔末各五錢甘草末二錢黑牽牛四兩半生全  
兩二錢以上四味和勻一歲以下服三分二歲以上服五  
分五歲以上服七分俱用蜜湯調服微利一二次為妙服  
前方而痰熱未除者後二方隨用一方微利之若前方已  
效則後二方不必用

慢驚風

古謂之陰癇

慢驚之候多因吐瀉或因久瀉或因久瘧而得之身冷面  
或白或黃不甚搐搦目微微上視口鼻中氣寒大小便清  
白昏睡露睛筋脉拘攣俗謂之天吊風蓋由脾土極虛中  
氣不足故寒痰壅盛而風動筋急也此陰證也亦危證也  
急宜溫中補脾則風痰自退蓋治本即所以治標全不必

治風治驚彼用蜈蚣全蝎辰砂牛黃等藥皆快也益元散  
抱龍丸牛黃丸蘇合丸等藥急驚俱似可用若慢驚切不可  
可與之誤用下咽即斃矣  
有所謂慢脾風者即慢驚失治而甚者耳其實難大分別  
亦不必別立治法

溫中補脾湯

白朮用裏白無油者去蘆製半夏七分黃耆蜜炙人參各  
去皮炒一錢二分  
白茯苓 白豆蔻仁研 乾薑 砂仁研各 官桂  
陳皮 甘草炙 白芍酒炒各 覺虛寒甚者加熟附子

老生薑一片大棗一枚去核水二茶鍾煎八分溫服兒  
小者分數次服必得肢體溫和風除神爽方可止服遇



此症服此藥不至於遲緩過時其效如神立起迴生矣  
而昔人謂慢驚爲九死一生之症何也得非調治錯悞  
而云然乎

慢驚因吐瀉而得者最多其病勢最危急一兒稟氣頗旺  
甫一歲時因脾胃受寒而泄小便不利有一幼科老醫召  
而治之用四苓散加水通車前以分利小便不效第二日  
加琥珀磨服又不效第三日又少加炒黃連服不知其泄  
原因感寒而服分利清涼藥太多遂致脾胃虛寒第三日  
不惟泄不止而又增嘔吐矣每飲乳輒吐至夜卽傳慢驚  
目上視手微搐身冷昏睡予以錢氏益黃散與之纔投藥  
下咽卽吐因以茶匙每次只挑二三匙少停又挑與之然  
積至二三次又盡吐出舉家駭愕以爲吐不受藥不可如

何危急甚矣予因思此必脾胃虛寒胸膈胃口壅有寒痰  
是以拒藥不受惟用辛熱或可以衝開之因用人參黃耆  
白朮各一錢乾薑白蔻砂仁各八分官桂陳皮半夏炙草  
白苓各六分加薑棗濃煎以一酒盃驟灌之其藥下咽卽  
受而不吐因漸漸連服此藥二劑而吐瀉立止驚搐等症  
悉除但至次日眼皮猶不能舒因用前藥加熟附子四分  
再服一劑而全愈矣予因此而知庸醫治此等病不知悞  
却多少人自此遂不信時醫矣

急驚屬實熱宜用清涼慢驚屬虛寒宜用溫補二病若霄  
壤之相隔治法若冰炭之相反而諸方書多用一藥以治  
二病何其謬妄之甚也雖錢氏明戒之而諸家又明犯之  
著書立方者且然而又何責於時醫乎時醫之悞亦自有

由蓋因二症俱有痰涎喘促遂先治痰喘而以一藥治二病耳若辨明寒熱標本一遇慢驚急急溫脾回陽何至以急驚藥施之慢驚病乎此處殺人甚多故表出之以示醫家病家

治小兒驚風並退只是聲啞不能言并諸病後不能言

大天南星一個泡去皮臍爲末量兒大小每用二三分或四五分用獾猪膽汁調成稀糊又用淡薑湯少許開食前服之卽能言

### 吐瀉

小兒吐瀉其證不一最宜詳審有因傷食吐瀉者有因感寒停食而吐瀉者夏月則有因伏暑吐瀉者傷食吐瀉者其吐有酸氣其瀉糞狀如糟粕亦有酸臭氣此宜消導之

感寒停食而吐瀉者或食後感冒風寒則其食停滯不化或脾胃先受風寒而後飲食則其食亦停滯不化或飲食後誤食寒冷之物則其食亦停滯不化雖致病不同其爲感寒停食則一也此宜發散而兼消導然此吐瀉或多胸腹刺痛卽霍亂吐瀉是也治法亦同伏暑吐瀉者小水必不利必兼煩渴當以暑治之吐甚者煎香薷散調益元散瀉甚者煎四苓散調益元散須斟酌用之然而吐瀉交作最是小兒危證若其屢作不止則不論何因皆當用參朮等急救胃氣不惟傷食停食者當急救之卽伏暑者亦當急救之蓋其初雖有暑氣而多吐多瀉之後則熱氣已散而胃氣驟虛若不用溫補急救恐中氣頓絕則虛痰上演而須臾告變矣且多吐之後胃氣太虛氣不歸元而陽浮

於外反有面赤頭熱身熱作渴而似熱證者俗醫不知其理誤認為熱而投以涼藥殺人如反掌甚可畏也故治吐瀉而藥不中病者與其失之寒涼寧失之溫補失之溫補猶可救療失之寒涼下咽即斃其禍甚速多不及救也加味平胃散 治傷食吐瀉

蒼朮 米泔水浸 厚朴 去皮薑片炒 山查肉 各六分 陳皮 去白 青皮

麥芽 炒 香附米 炒 砂仁 研 小川芎 各四分 甘草 炙二分

生薑二片水鍾半煎七分分三次緩緩服

藿香和中湯 治感寒停食吐瀉

藿香 紫蘇 炒香附 製蒼朮 製厚朴

山查肉 小川芎 各六分 羌活 砂仁 麥芽 炒

白芷 陳皮 去白各四分 炙甘草 二分

生薑三片煎法服法俱同前

香薷散 以下三方水暑吐瀉用

大花香薷 三錢 白扁豆 炒去殼 製厚朴 各一錢

水煎候微溫調益元散二匙服

四苓散

赤茯苓 去皮 猪苓 澤瀉 各一錢 白朮 八分 木通

車前子 微炒

水煎候溫調益元散二三匙服

益元散

滑石 飛過 甘草末 一兩 不用辰砂

用滾白水少溫調服應藥調服者照方用之

錢氏白朮散 治瀉已久虛火作渴者用此方

人參 白朮 白茯苓 炙甘草 乾葛 各五分

南木香 二分

老生薑一片水一鍾煎半鍾溫服

參砂和胃散 嘔吐不止者宜此方

人參 砂仁 製半夏 各四分 白朮 去蘆刮 白茯苓 去皮

各五分 藿香 陳皮 炙甘草

水一鍾半煨薑三片去皮煎七分溫服

薑末湯 吐多而胃氣欲絕者用此安胃

老生薑一塊重一兩許煨熟去皮研爛用水一碗陳米

二撮同人瓦罐內煮清湯候溫用小酒盃少少漸服其

嘔自止如無陳米食米亦可

凡吐瀉交作者止吐為急吐而不瀉者治法俱同上

治小兒暑月水瀉小便赤澀或全不小便者

赤茯苓 猪苓 澤瀉 各一錢 木瓜 五分 白朮 六分

木通 八分 車前子 四分

燈心一團水二鍾煎一鍾入鹽少許令藥微有鹹味飢

時服之小便自利其瀉立止

治小兒脾瀉其瀉每日只溏糞一二次然病由脾虛久而

不治多不可救宜用參朮散加山藥炒扁豆治之

參朮散 白朮 用裡白無油者去蘆刮 人參 白茯苓 去皮 砂仁

炙甘草 去皮 薏苡仁 炒熟 家蓮子 去心 真神麴 炒 山查

肉 各五錢 肉豆蔻 麩裏煨熟去麩切細 訶子 煨取肉 廣陳皮

洗淨去筋膜 南木香三錢

酒各四錢 豆科類編等意 卷之下 七

以上共爲極細末每服用二錢清米飲調食前溫服見  
有不肯服者入稀粥和服亦可

疳

小兒臟腑嬌嫩飽則易傷乳食不調甘肥無節則積滯而  
成疳是積者疳之本疳者積之標也蓋積鬱既久則生熱  
熱蒸既久則生蟲有熱有蟲而疳成矣熱盛蟲盛而諸惡  
症生焉則疳深而危矣善治者當其有積時卽用藥以消  
除之則熱自退而蟲不生則能治其本者也易爲力也及  
其旣成疳也仍用莪朮三稜檳榔厚朴等藥以消積用川  
黃連胡黃連等藥以清熱用史君子蕪荑川練蘆薈等藥  
以殺蟲此治本而兼治其標者也循此法而蚤治之未有  
不得全安者也但恐治之旣晚而胸陷腹滿骨露齒張肌

瘦目閉等症交作則元氣已脫雖盧扁復生難爲力矣然  
消積清熱殺蟲此古人治疳要法必用此先除其病然後  
可以加補養此其次第也近世治疳者雜用參朮訶薤等  
劑非其治矣蓋積疳之源雖由脾胃虛弱然當其有積有  
疳時而投以補劑適足以增其積滯益其鬱熱是助病而  
非除病也其有疳瀉已久脾胃極虛而不可單攻者當兼  
用六神散與肥兒丸相間服之此攻補兼施活法也又有  
一種母已有孕兒飲孕乳多亦成積熱久亦成疳此病頗  
多而古今方論不道及何也然其治法大畧亦同有疳熱  
盛而成痢者用清熱導滯湯去牛蒡蓮翹加三稜莪朮有  
成癖塊者治法亦同須兼用外貼藥交攻之  
清熱導滯湯

黃連

條芩

白芍

枳殼

山查肉

各一錢

厚朴

去皮薑

青皮

檳榔

當歸

甘草

牛

芩子

連翹

各五分

水煎服

疴亦難分冷熱惟有瀉有不瀉耳不瀉者鬱熱無所發洩故胸腹發熱更甚瀉者鬱熱有所發洩故胸腹不甚熱然亦由積熱作瀉也非冷也此瀉溫之而愈甚清之消之而自愈著書立方者不知何以有冷疴之名而用熱藥無亦訛謬相承乎

肥兒丸

三稜

莪朮

青皮

俱醋炒神薹

川黃連

胡

黃連

史君子

去殼浸透去皮各一兩

蘆薈

堅檳榔

香

附子

炒

陳皮

去白麥芽

炒

蕪荑

各五錢

南木香

二錢

以上為細末除神薹麥芽另研為細末打糊和前藥為丸如粟米大二歲以下每服三分五歲以下服五分空心清米飲下臨卧白滾水送下癖塊加阿魏酒浸研化和入乾

漆

炒各七錢

大蘆薈

治疴蟲蝕脊骨身熱痛瘦十指生瘡頰齒指甲等症

蘆薈

蕪荑

青黛

檳榔

黃連

各一錢

胡黃

連

史君子肉

各七錢

南木香

二錢

蟬退

二十隻

麝香

少許研碎

為細末猪膽二個取汁浸糕丸如麻子大每服三十九

米飲下

雞蠟丸

治疴積休息痢

用黃蠟一塊如指大入杓內火上鎔化次入生雞子黃

白一個炒熟與兒空心食之

紅花膏 貼痔瘻用

水紅花蓼 一捆煎汁去渣熬膏一碗 麝香

五錢 赤芍 當歸各錢

阿魏

血竭 各三錢

為細末入膏內攪勻以青布攤貼患處

腹痛

小兒驟然腹痛其症不同有挾熱而痛者其痛多緩或一日只痛數次甚者或自下而痛上痛過一陣則有時不痛良久又痛宜用涼藥加疏利藥治之有感寒挾食而痛者其痛多急連綿少有停止甚者或如刀刺欲吐不吐欲瀉不瀉手足冷面色青宜用升發藥加消導藥急治之外有蟲痛者則煎炙食物香氣則痛宜用苦練皮史君肉等藥

以殺其蟲則痛自止

枳連道滯湯 治瀉痛

陳枳殼 去穢炒 黃連

山梔仁 炒黑色各六分 赤芍

前胡

連翹 去心蒂各四分 三稜

莪朮 俱醋炒 檳榔

甘草 各二分

水煎飢服覺熱盛大便秘者加酒炒大黃一錢二分微利之

升消平胃散 治感寒挾食腹痛

厚朴 蒼朮

小川芎

香附

紫蘇 各五分

藿香 砂仁

白芷

陳皮 各三分

炙甘草 二分

麥芽 六分 山查 一錢 加羌活

防風 各三分

生薑三片同煎帶煎服

發熱

痘科類編釋意

卷之五

十

小兒發熱多端有感寒發熱有傷風發熱有傷食發熱有內熱發熱有痘疹發熱有疥疹發熱有驚熱有疳熱以上諸熱俱可隨症辨認各有治法茲不備載惟內虛發熱其症難識獨有張季明醫說深得病情今錄于後

醫說云有一小兒感冷身大熱惡寒此有表症用發汗藥汗出遂涼過一日復熱醫謂表解裏未解以大便秘知之服四順清涼飲利一行遂涼隔一日又再熱醫曰心經熱未解以小便赤知之服導赤飲一劑過三日又至其家無所措手醫曰脈已和非病也既發汗又利大小便其兒已虛陽氣無所歸皆見於表所以身熱以和胃氣藥如六神散之類加烏梅煎令微有酸味收其陽氣歸內自此全愈又云小兒積熱者表裏俱熱則遍身皆熱頰赤口乾小便

赤大便焦黃先用四順清涼飲利動臟腑熱則去既去復熱者裏熱已解而表熱未解也當用發散藥微汗表熱乃去表熱去後又發熱者何也世醫到此盡不能曉或再用涼劑或再解表或謂不可醫誤致天傷者甚多此表裏俱虛氣不歸元而陽浮於外所以再發熱非熱證也只用六神散入粳米煎和其胃氣則收陽氣歸內身體自涼此二說發明虛熱妙理最爲明透且此證不惟小兒有之大人亦多有之人多不識遂束手待斃此說直破千古之惑大有回生之功予故揭錄於此以補醫功之缺

四順清涼飲

當歸

芍藥

甘草

大黃

水煎服



導赤飲

生地黃

赤茯苓

木通

麥門冬

各等分

燈心一團水煎服

六神散

人參

白朮

茯苓

甘草

山藥

白扁

豆薑水浸去殼炒

生薑二片棗一枚去核同煎

虛麻不調而更難治者以再發熱非熱也只用六  
京麻丸再服未效隨不可留過效天動者其多此果是  
去未熱之效又發熱者向此也醫候此盡不論熱效再服  
持香裏燕口藥而素燕未熱也當用發熱藥燕口末燕口  
亦大野黃黃共用四兩煎京黃煎煙煎燕口末燕口

疹科纂要

目錄

麻疹通論

麻疹症治大略

麻疹潮熱症治

麻疹出沒傷風

麻疹汗渴飲水

麻疹出沒煩燥

麻疹出沒譫語

麻疹出沒喘嗽

麻疹喉痛失音

麻疹嘔吐腹痛

麻疹出沒泄瀉

麻疹出沒痢疾

麻疹出沒便血

麻疹飲食滯毒

痘瘡後益痘疹

疫病發癩夾癩

傷寒發癩癰症

孕婦麻疹發癩

水痘症治

麻疹効方

疹科纂要

水痘

寒痧

痧疹

痧疹

痧疹

痧疹

痧疹

痧疹

痧疹

痧疹

痧疹

痧疹

痧疹

痧疹

痧疹

痧疹

痧疹

痧疹

疹科纂要

目錄

疹科纂要

新印 財藏記

邯山馬之騏纂

益都翟 良定

麻疹通論

夫嬰兒麻疹固與痘瘡大不相侔亦與癩疹癰疹並不相  
 同蓋麻疹亦屬胎毒乃係六腑蘊蓄積熱發自脾肺二經  
 或受風寒或傷飲食時氣感觸煽動心火燔爍肺金肺主  
 皮毛故其邪發於皮膚之上出為細疹遍身點點紅色甚  
 則疊腫有小顆粒隨出隨沒沒則又出俗名糠瘡又曰瘡  
 瘡其症初發熱時略類風寒而實大異亦與痘症相似但  
 痘瘡自裏而出於五臟臟屬陰其病本深難出難收故有  
 形有漿麻疹自表而出於六腑腑屬陽其病本淺易出易

有顆粒係  
 太陰之疹  
 宜宜揚  
 宜用清涼  
 若覆水發  
 巧寒發內  
 攻多致煩  
 喘促而

收故有形無漿然多實熱無寒又有戰慄似寒者乃熱極生陰反作寒耳切不可作寒症治之雖較痘瘡爲易然倏忽變化其症急速自初出一二日以及愈後月餘虛者百日皆不可以其易而忽之經曰痘前疹後信哉

若初生嬰兒未及滿月或百日內外或未生痘瘡之先遍身發出紅點如粟米狀滿月內外名爲爛衣瘡百日內外及未生痘瘡之先名爲瘙疹蓋兒在母腹中爲陰血之氣薰蒸已久生後忽遇陽風一逼遂發此疹不治自愈

若痘瘡愈後起居不節飲食過度外感風寒痘愈數日之後身忽略熱遍身卽出紅點大小不一亦如粟米之狀作癢愈抓愈盛如雲成片名爲雲頭疹又名蓋痘疹非真疹也勿以爲真疹而畏之

若天行疫病大人小兒感之六便秘結熱氣流於胃中忽發紅痧隱於皮膚之內有色點而無顆粒如蚊蚤之迹錦文之狀者無頭且平名曰發痧其症有陽毒陰毒之殊總皆熱毒所致非真疹也不可與疹同治

若感冒時氣頗類傷寒俗名紅眼汗病係心火燥平肺金紅點隱於皮膚之間發則多癢或不仁者是有風濕之殊色紅者火也亦皆熱毒所致其症多屬於脾狀隱隱然故名曰癩疹非真疹也亦不可與疹同治

麻疹症治大略

麻疹爲實熱之症屬在於肺其發也多因風熱兼痰而作浮於皮膚有小顆粒隨出隨沒沒則又出故雖值寒天亦不可重加衣被而過於熱恐毒入咽喉令其聲啞麻疹不

出致有變症為害不小。治療之法宜清肺火降痰主乎解  
散。惟以發表出透為妙。汗之即愈。亦有可下者。但忌認作  
傷寒妄汗。妄下汗之則增其熱。為鼻衄。為欬血。為口瘡。咽  
痛。為目赤痛。為煩躁。為大小便不通。下之則虛其衷。為滑  
泄。為滯下。多致不救。慎之慎之。故初熱時先宜發散。次清  
利。次清熱。次補血。蓋發散則風熱解。清利則肺金清。清熱  
則心火瀉。免致金受火剋。則症自輕。然麻疹屬陽熱甚則  
陰分受損。血多虛耗。必宜滋養陰血。此首尾所以當瀉心  
火清肺金散風熱滋陰血為主。不可少動其氣。宜通聖散  
中消息用之。如人參自木半夏一切燥悍之藥皆不可用。  
即升麻升動陽氣上冲亦不可多用。蓋麻疹標屬陰而本  
屬陽也。若麻疹未愈。輕用溫熱燥悍之劑。多致牙齦腫爛。

雖氣血虛弱亦必待麻疹愈後方用補虛養血調理脾胃  
之藥。斯乃萬無一失。不則毒氣壅遏頓生奇禍。不可不慎。  
此治麻疹之大端也。

麻疹潮熱症治

麻疹初發時略類傷寒而迥異。蓋其增寒壯熱頭痛臉赤  
目赤頰紅身體疼痛。此略類也。至其火熱太盛多咳嗽。噴  
嚏鼻流清涕。眼光如水。眼胞浮腫。眼角生眦。眼淚汪汪。惡  
心乾嘔。恒欲飲水。或痰涎吐瀉。不思飲食。大便急而小便  
澀。則皆熱之所致。為迥異耳。然有熱一二日而出者。有發  
熱五六日而出者。或有發熱七八日而出者。症候未明疑  
似之際。但覺潮熱。即宜升麻葛根湯加紫蘇蔥白一根煎  
服。或參蘇飲去人參半夏陳皮。腹痛仍用陳皮加砂仁煎

服被蓋微表之得汗自頭至足方漸漸減去衣被則皮膚  
通暢腠理開豁自無留毒而疹易出矣若有未出亦不可  
再表 既表之後即宜謹避風寒勿食生冷戒忌酒肉雞  
魚一切腥葷等物如外犯風寒內傷腥冷輕則癢疹生痰  
嗽成驚搐重則皮毛閉塞毒氣難出遂變紫黑而死矣  
如食酒肉雞魚腥葷等物則毒入脾胃必至麻疹後生瘡  
癩下流大腸為泄瀉白痢等症流入小腸則小便赤澀為  
血痢等症俗謂白痢屬冷血痢屬熱者非也戒之戒之  
麻疹未出時發熱吐瀉交作三日內出耳後項上腰腿先  
出一日出三次二日再出六次見點紅活顯露形小明顯  
項尖不長隨出隨沒三四日方收者順症也不治自愈  
疹未出時發熱乾霍亂身體極熱欲出不出隱伏皮內發

不透快者險宜升麻葛根湯大寒加麻黃即出 疹未出  
時發熱喘促者險宜三拗湯加煨過石膏茶葉名五虎湯  
治之 疹未出時發熱面先青黑乃毒氣攻心者逆宜內  
托散消毒湯以解之不然則必死 身體極熱隱伏不出  
或帶紫色不明或不突起與肉一平或一二日就沒喘嗽  
利下者逆速宜解表急則用麻黃湯以發之胡荽酒以擦  
之緩則用升麻葛根湯加石膏黃芩以解之 疹疹正出  
時身猶大熱宜升麻葛根湯加黃芩地骨皮治之若以手  
摹之疹色白起手即紅者血虛宜養榮湯主之 正出色  
紅者火盛宜化癍湯主之或人參白虎湯 色紫赤乾灰  
燥暗大渴飲水不止乃火盛毒熾宜六一散解之或四物  
湯去地黃加紅花黃芩進之或黃連麥門冬湯亦可大熱

不退加柴胡黃芩升麻葛根牛蒡子懸參 色紫黑乃內  
外熱甚而血結者逆必須急速解表宜葛根麥門冬散生  
地黃散升麻葛根湯或荆防敗毒散加梔子仁或雙解散  
有痰加杏仁無汗加麻黃若其色變黑者宜黃連杏仁湯  
主之或山梔子湯化癩湯速解治之緩則不及矣 故曰  
初發赤白者生黑紫者死蓋赤疹屬陽遇清冷而消白疹  
屬陰遇煖溫而減故皆可生若所發黑紫者內熱甚而血  
結生機將絕速就前法解治死中求活者也 痲疹已出  
時其疹色正而身猶大熱宜升麻葛根湯白虎湯倍加牛  
蒡子懸參 既出已過三日不能沒落乃內有虛熱宜四  
物湯治之 又有失血之症加犀角汁解之 痲疹已沒  
落身猶大熱宜升麻葛根湯加黃連地骨皮治之 痲疹

已沒落別無他症但餘熱不除宜黃連解毒湯調益元散  
治之 痲疹收平數日之後猶有餘熱未盡復再發熱日  
夜不退每夜煩燥譫語狂亂失血且多驚搐重出一番痲  
疹比前略少此乃心血耗散餘毒熱甚先治失血急用犀  
角地黃湯解毒湯一劑再用四物湯加遠志肉三分甘草  
二分服一劑而血止若譫語狂亂驚搐再煎五苓散調辰  
砂益元散一錢服之諸症自無凡遇此症血實者易治血  
虛者難治 總之痲疹前後燒熱不退飲食不進等症并  
屬血虛血熱宜四物湯按症加減 滋陰補血湯加麥門  
冬犀角汁嗽加括蕁仁痰加貝母橘紅 內多實熱宜四  
物湯加芩連防風連翹涼其中以退其陽 凡汗出不透  
燒熱不退倍加紫蘇葉葛根白芷等藥助之當得大汗去

病如掃。蓋麻疹屬陽陰血被其煎耗作熱故以滋補陰血為主其熱自除所謂養陰退陽之義也。

### 麻疹出沒傷風

當發表後麻疹正出之時偶遇大風大寒或內傷生冷令麻疹隱隱於皮膚之內時有時無欲出不出如物影之搖動謂之影疹急宜升麻葛根湯化癍湯或活血散治之其影疹不日即出如小便不通熱甚宜四苓湯加梔子水通若不急治則皮膚閉塞毒氣壅滯或一片白一片紅一片紫喘滿腹脹腹痛反覆變亂危亡立至如出一日而沒乃為風寒所襲忽然沒落急宜消毒飲治之若不急治毒氣內攻癰爛而死既見三日退後若有被風之症亦宜消毒飲神效。麻疹退後不可當風苟見風太早一腫即

消必體瘦肌黃恐防病且致生麻風瘰如有麻風瘰宜大連翹飲加牛蒡子防風金銀花爛處敷生肌散

### 麻疹汗渴飲水

麻疹得汗為妙固不可無汗亦不可過於汗如初熱時未曾用藥發表自然多汗遍身流出如水此則腠理開泄內毒盡從汗出順症也不必再用發表亦不可驟止如汗出太多不止乃毒盛致液妄行宜用五倍子三錢為末唾津調為餅敷貼臍上其汗即止。麻疹之症猶如傷寒熱病未有不作渴者傷寒發渴得水而生麻疹發渴亦可飲水但不可過多如麻疹渴時只宜常服蔥白湯或以穀蘆糠用滾水潑淋候溫飲之稍涼亦可使毛竅中常有微汗潤澤其疹自出自無發搐之症或以烏梅一兩熬水二鍾入

井水中浸涼每用一盞攪凉水一盞徐徐飲之如熱不退  
渴不止宜服化癍湯數劑亦不妨渴止熱減住服或人參  
白虎湯其渴即止大熱不退作渴人參白虎湯主之不可  
飲水過多過恐生水描之病蓋熱極而渴者心也水既入  
心傳於脾為吐嘔瀉痢脾傷水五苓散主之傳於肺為喘  
為嗽肺傷水清肺飲加白丑末少許主之傳於腎為小便  
不利為陰囊浮腫傳於肝為脅痛為筋軟為膨脹肝與腎  
傷水亦用五苓散加木通車前子以泄膀胱之水則肝腎  
之病除矣

麻疹出沒煩燥

未出煩燥宜升麻葛根湯加紫蘇蔥白一根 已出煩燥  
宜黃連解毒湯加白虎湯 沒落煩燥宜黃連解毒湯加

麥明冬地骨皮

麻疹出沒謔語

初出實熱火盛謔語宜升麻葛根湯加調辰砂益元散  
已出謔語宜黃連解毒湯調辰砂益元散 謔語熱甚昏  
昧不省人事宜黃連解毒湯 沒落謔語者凶宜燈心湯  
調辰砂益元散

麻疹出沒喘嗽

未出咳嗽宜升麻葛根湯加麻黃 若發熱咳嗽三五日  
不出者以胡荽酒擦之或炒胡荽子以薄綿包裹乘熱熨  
身上亦即出矣 已出咳嗽宜涼膈散加桔梗地骨皮  
若已出三四日之間發熱咳嗽聲音不出乃火毒在肺與  
胃中急宜用凉水調兒茶散數次火退聲音即出再服清





疥癩之毒用  
疥癩之毒用

金降火湯自愈。若咳嗽痰吐不出，發散後宜括婁仁、黃連、枳實、甘草煎服之。沒落咳嗽宜涼膈散，加桔梗、地骨皮、五味子。總之，疥癩前後咳嗽皆係痲毒，不可輕視。宜服參蘇飲、瀉白散，或防風通聖散皆可選用。若久嗽頓成疹後風，或令咽喉出血，急宜服麥門冬、清肺飲。若不急治，傷及肺胃，胸高腹脹，喘急滿悶，唇面青白，紅紫枯黯，顏色不正，口鼻出血，則難治矣。故疥癩退後須謹避風寒，慎戒水濕，忌食雞魚鵝鴨，不則終身咳嗽，患風瘡，傷眼目，無有愈日，切宜戒之。

痲疹喉痛失音

痲疹咽喉腫痛，宜甘桔湯，加懸參，痛甚再加射干、鼠黏子，或桔梗湯，或以冷水磨山荳根服之。升痲疹聲啞無音，宜

桔梗湯，加荆芥、防風、懸參，或兒茶散，或以冷水磨訶子服之。痲疹沒後聲啞不出，宜清金降火湯。若沒落八九日，聲啞無音，宜兒茶散服之，即愈。

痲疹嘔吐腹痛

痲疹嘔吐，五苓散去桂，加化癍湯主之。夏月五苓散去桂，加黃連、滑石、乾嘔，五苓散加竹茹、腹悶，五苓散去桂，加紫蘇、香附。熱盛腹痛，煎去桂，五苓散調益元散，或水磨山查子服之。

痲疹出沒泄瀉

初出未出泄瀉，宜升麻葛根湯，加五苓散去桂。若夏月更將四苓散煎湯，調益元散服之。四苓散即五苓散去桂。巴山泄瀉宜黃連解毒湯，加五苓散去桂，或人參白虎湯最妙。

另抵疹家  
宜利滯下  
宜於疹家  
承之不可  
作吐利滯  
下而治失  
與本也

沒落泄瀉宜黃連解毒湯加導赤散 總之麻疹吐瀉乃  
火邪內迫純是熱證莫作寒論宜四苓湯加牛蒡子訶子  
切不可溫悞用荳蔻木香乾薑之類 又須分別新久寒  
熱新瀉熱瀉宜四苓湯加木通熱極瀉清黃水宜黃連解  
毒湯合五苓散治之水瀉黃白宜五苓散加減瀉黃去桂  
加木瓜瀉白吐乳宜同蘇合丸治之泄瀉米穀不化傷食  
者宜四苓湯加消導藥惟至久瀉方宜荳蔻丸或五倍子  
鶯粟殼燒灰水調澀之 寒瀉者十中無一如有傷食生  
冷不得已以理中湯一服卽止 凡泄瀉宜用苦溫苦寒  
之藥以治之不可用參耆等甘溫之藥必瀉止後脾胃虛  
弱方可用參耆等藥以補之

麻疹出沒痢疾

麻疹出時痢謂之夾疹痢宜黃連解毒湯加枳殼白芍  
沒落後痢赤白宜黃芩湯黃連解毒湯等劑治之 沒落  
後多食油膩厚味致令久痢不已此因積賦所傷餘毒留  
在大腸不可速止宜先清利其毒而後補之先用大黃黃  
連枳殼檳榔以疎利之或用三黃湯加檳榔枳殼同煎調  
益元散服之可愈若妄投澀藥一服卽止則內毒上攻令  
其嘔吐不食禁口不語二三日毒攻大腸或下鮮血或下  
如屋漏豆汁遂成不治之症矣

麻疹出沒便血

麻疹發熱時鼻中血出此毒從鼻血而解不可驟然卽止  
如血出太多是火毒熾盛逼迫太過致血妄行宜當歸六  
黃湯一劑卽愈 初出鼻口出血宜升麻葛根湯加炒梔

子仁 已出鼻口出血宜黃連解毒湯加梔子仁生地黃童便 沒落後鼻口出血宜涼膈散加梔子仁生地黃童便 沒落後牙齦腐爛鼻血橫流並爲失血之症宜急用四物湯加山茵陳木通犀角之類以利小便使血下行外用獨棗丹治之不可緩視 麻疹初出大便出血宜升麻葛根湯加犀角地黃湯治之 小便溺赤宜黃連解毒湯加犀角地黃湯治之 小便溺赤宜黃連解毒湯加水通 沒落後溺赤如泔濁者宜五苓散加車前子木通 總之麻疹心火未散發爲嗽血吐血衄血失血下血或傷眼目俱宜犀角地黃湯主之 若失於發表熱毒不得出內攻五臟眼角耳中出血不止大便出血不止者逆宜急用升麻葛根湯加當

歸六黃湯治之可救一二 凡痰嗽失血以及大人酒色過度損傷肺腎真陽咳嗽吐痰衄血吐血咳血咯血等症宜服苦寒甘寒之藥以生血降火不可用參耆等甘溫之藥

### 麻疹飲食瘡毒

麻疹正出時雖不大飲食但其色紅白潤澤者無妨蓋熱毒未解不食無害若數日不食止於飲水宜清胃養脾解毒爲主毒退自然飲食如常用調中湯去藁本加黃連自利者減大黃胃弱者勿下沒落後不食宜四物湯加神麩砂仁麥芽一二服自能食矣如胃氣虛勿下 麻疹忌食鵝鴨卵如犯傷目 忌食薑椒熱物如犯胃火上觸口舌生瘡宜人中白炒過爲末少許撒之即愈 忌食甘甜如

犯致生牙疳宜獨棗丹擦之 疹前後縱意多食甘甜之物濕熱動虫爲走馬牙疳穿腮落齒或面頰浮腫環口青黑唇崩鼻壞及胃爛臭氣疳瘡色白者皆不治逆症 疹疹愈後牙齦潰爛肉腐出血臭氣冲人皆因疹後未服解毒清利之劑以致餘毒遊熱不退積於皮膚入於胃中久而不散故發此症宜清胃散涼膈散獨棗丹等劑治之以退胃火可無大患唇口多瘡而極癢一似傷寒狐惑之病若不急治上下唇俱爲虫蝕腐爛以及昏悶失聲遂爲不治之症宜急用化虫丸治之雄黃散擦之可愈 疹夾丹毒宜涼膈散加當歸生地黃 麻疹沒後生瘡疥及眼目疾宜黃連解毒湯加減治之

痘瘡後蓋痘疹

痘瘡愈後數日之間內傷飲食外感風寒身忽少熱發出蓋痘疹如雲成片一名雲頭疹雖不與真疹同治宜三仙散再加防風黃連消積食除風熱以免瀉痢之患

疫病發癩夾癩

天行疫病大便秘結熱毒入胃忽發紅癩隱於皮膚無粒且平名爲發癩若身熱作渴宜白虎湯加大青懸參一劑而愈 麻疹正出忽發紅點者多爲夾癩宜小柴胡湯加當歸生地黃

傷寒發癩癰疹

此癩疹症卽今俗謂傷寒穀黍之症又謂紅眼傷寒之症有色點而無顆粒者曰發癩隱於皮膚發則多癢曰癰疹屬風熱夾痰而作其發類傷寒乃痰熱之病症之發於外

者也亦有自裏而發於外者其症有陽毒陰毒之不同  
陽毒脈浮數洪大內外結熱極深面赤健亂舌捲焦黑鼻  
若烟煤四肢煩燥狂言譫語如見鬼神下利頻多不安發  
熱癰爛名爲陽毒陰毒脈沈細疾實眼痛唇口青黑咽喉  
不利身體沈重背強不能轉四肢厥冷毒氣攻心小腹急  
痛乾嘔身發癰點名爲陰毒濕毒總皆熱毒所致或症病  
下之太蚤熱氣乘虛入胃或下之太遲熱氣鬱積胃中或  
誤服熱藥過多胃氣熱甚及內傷熱症虛火灼於脾肺之  
間皆發紅癰是爲癰疹亦皆熱毒之所致也 至於丹疹  
最是惡候熱血蘊毒遇君相二火合起卽發 亦有時疫  
腫毒咽喉堵塞亦臟腑積熱之所致大約初發赤癰者多  
生初發黑癰者多死丹疹先從四肢起而後入腹者死

六脈洪大者陽毒也宜汗而解之如失汗則邪傳入臟毒  
熱在裏不散致狂亂妄語如見鬼神面赤四肢煩燥發出  
癰爛下痢瘀血又加遍身自汗口如魚口開張者死若能  
過七日則過經陽熱退方有可救之理 六脈沈細而疾  
者陰毒也體重眼痛小腹急痛唇口青黑四肢厥冷咽喉  
不利宜速灸臍下丹田關元穴以回陽氣陰氣自散若過  
六日乃陰極陽生方可望生 其治療之法無問大人小  
兒黑癰紅癰瘡痒癰疹并宜防風通聖散爲未調服之  
或以通聖散中消息用之宜微汗以散之切不可下或以  
化癰湯升麻葛根湯懸參升麻湯通加羌活防風荆芥桂  
枝芍藥隨宜酌用合上諸方煎服外用黃瓜水調伏龍肝  
土紅點癰發癰風熱夾痰而作自內發外者宜通聖散以

微汗散之。發癩似傷寒者痰熱之病發於外宜升麻葛根湯以微汗散之。發癩有屬裏者因胃熱助手少陽火入於手太陰肺故紅點如癩出於皮毛間宜白虎湯瀉心散調胃散承氣湯從長選用之。內傷發癩者胃氣極虛一身之火遊行於外所致。補以降之於陰症例中求之或調中湯陽毒宜陽毒升麻湯梔子仁湯。傷寒時氣陽毒發癩胃實之人快服熱劑或加以風暑宜陽毒升麻湯。胃爛發癩因陽明胃實或失下或失之太蚤所致宜化癩湯石膏湯。陰毒濕毒宜黃連橘皮湯調中湯升麻鼈甲湯黑膏。傷寒時氣濕毒發癩宜懸參升麻湯重用荆防敗毒散。時氣發癩宜石膏湯。瘟疫發癩癰疹痛癢宜大青四物湯加味敗毒散犀角消毒散解毒防風湯加

味羌活散消風散葛根橘皮湯。丹疹如遇熱時宜通聖散辛涼之劑解之寒月以升麻葛根湯辛溫之劑解之。冷丹屬血風血熱宜通聖散若痰血相搏宜用蟬蛻僵蠶荆芥南星以治之時疫腫毒疙痞或臟腑積熱發於頭項咽喉堵塞水漿不下或面赤熱甚六脈洪浮宜漏蘆湯加升麻黃芩大黃各一錢大青葉即大藍葉懸參各二錢煎服。乳孩因胎毒兩腋生癰後腹脹發赤疹如霞成片者取剪刀草春汁調原蠶沙敷之即愈。凡傷寒時氣大病熱退之後先服參耆甘溫之藥以扶元氣隨即服滋血生津潤燥之藥。以上二類本不宜註治法但恐與疹相混不厭詳耳。  
孕婦麻疹發癩

孕婦麻疹發癩以安胎清血為主宜四物湯倍加白朮條芩

艾葉服之則胎無危而疹易出矣。疹出不快宜白虎湯合用升麻葛根湯倍加懸參牛蒡子治之。胎氣上冲急用芎根艾葉煎湯磨檳榔服之。再以四物湯進之。熱甚胎氣不安服固胎飲數劑如又不愈腹痛腰酸即知胎有必墮之機如胎墮即以產法論先用大補次用他症藥胎雖動而婦可生蓋麻疹宜裏空熱毒隨胎氣而下也。

水痘症治

水痘之症亦類傷寒之狀面赤唇紅眼光如水咳嗽噴嚏唾涕稠粘身熱二三日而出明淨如水泡易出易靨與痘瘡大不相同雖不為害亦不宜溫燥苟或溫之則痂難落而成爛瘡亦不宜食薑豆生薑沐浴冷水恐成癩疥水腫始覺及出長宜服麥湯散。

麻疹効方

內方各雖重而藥則異用者詳症用之

升麻葛根湯

方見痘書

治大人小兒時氣瘟疫頭痛發熱肢體煩疼及痘症疑似之圖

參蘇飲

方見痘書

三拗湯

治感冒風寒鼻塞聲重語音不出咳嗽喘急

生甘草

麻黃

帶根

杏仁

帶皮尖各等分

右細切用水一鍾薑三片棗二枚煎至七分溫服以得汗為度痰滑乃止每服或三錢或五錢

內托散

治一切惡瘡與痘家方各同而異

綿黃耆

甘草

金銀花

牡礪

火淬二次各三錢

右為末水一鍾煎至七分入黃酒一鍾再煎至七分隨瘡上下食前後服

消毒湯

治一切惡瘡腫毒膿已成未成等症

紫花地丁

去蘆

金銀花

當歸

大黃酒浸赤芍

黃耆各五

甘草一錢

加升麻

右細切作二服每服酒一鍾銀磁器煎至半鍾溫服

內托千金散

方見痘書

麻黃湯

正夏夏後不可用有汗不可用

麻黃

去根節水泡二錢

肉桂

甘草

杏仁十箇去皮尖炒黃色

右細切水一鍾煎至七分溫服覆卧得汗即愈

養榮湯

當歸

川芎

芍藥

地黃各等

人參

白朮

黃耆

甘草減半

右細切水一鍾煎至半鍾食前溫服

化癰湯

與痘家方名同而異即白虎湯加懸參也

石膏

四錢

知母

懸參

各一錢五分

甘草

一錢

糯米

一合

右細切水一鍾半煎一鍾約米熟為度

人參白虎湯

方見痘書

治麻疹化癰發疹止渴如神

六一散

方見痘書

四物湯

方見痘書

黃連麥門冬湯

治煩渴火成飲水不止

黃連

九節者去毛鬚

麥門冬

肥大者以苦瓠汁浸去心各二兩

右細切每服一二錢至三五錢止水煎去渣溫服

葛根麥門冬散

方見痘書即麥門冬湯

治熱毒癰疹頭疼壯熱心神煩悶

生地黃散

治癰腫疹毒身熱口乾咳嗽心煩

生地黃

五錢

麥門冬

七錢

杏仁

湯泡去

皮尖

款冬花

陳皮

麥門冬

去心

杏仁

湯泡去

皮尖

款冬花

陳皮



各三錢 甘草 錢半

右細切每服二三錢水一鍾煎至七分溫服

又生地黃散 治鬱熱衄血或咯血吐血皆宜服之

枸杞 柴胡 黃連 地骨皮 天門冬

白芍 甘草 黃耆 黃芩 生地黃 熟

地黃

右各等分細切水一鍾煎至七分溫服下血加地榆

荆防敗毒散 方見痘書

雙解散 治小兒瘡疹用此解出極快

黃連杏仁湯 治小兒邪熱癰疹咳嗽煩悶嘔逆清水服赤咽舌生瘡瀉瀉

黃連一錢 陳皮 杏仁 皮尖 麻黃 去節 枳殼 去瓢

葛根 各五分

右細切水一鍾煎至七分溫服泄瀉加甘草厚朴

山梔子湯

梔子仁 白蘚皮 升麻 赤芍藥 各一錢 寒水石

甘草 各五分 紫草 薄荷 各少許

右細切水一鍾煎至半鍾溫服

黃連解毒湯

黃連 黃芩 黃柏 俱酒浸炒 梔子仁 炒各五分

右細切水一鍾煎至七分溫服

犀角地黃湯 方見痘書

五苓散 方見痘書

辰砂益元散 方見痘書

活血散

白芍藥 不拘多少 酒浸焙

右為細末每服二錢溫酒調下

四苓湯 方見痘書

消毒飲 與痘家方名同而異

牛蒡子 炒三錢 荆芥 防風 升麻 各一錢 甘草 五分

右細切水一鍾煎至七分溫服

大連翹飲 方見痘書

生肌散 方見痘書附方

清肺散

五味子 十粒 麥門冬 當歸身 人參 生地黃

各五分 黃耆 二錢

右細切水二鍾煎至一鍾去渣食後溫服

白虎湯 功見痘書

涼膈散

連翹 四錢 大黃 梔子仁 薄荷 黃芩 甘

草 各二錢 朴硝 一錢 一方不用 各等分

右為麤末每服二三錢水一鍾竹葉五片蜜少許煎至

七分食前服

兒茶散 治癩疹 嘔無音

孩兒茶 五錢 硼砂 二錢

右為細末每服一匙用凉水一鍾調下

清金降火湯 治癩疹後熱火乘

當歸 酒洗 白芍藥 酒洗 生地黃 酒洗 陳皮 貝母 去心

甘草 枯苓 酒洗 山梔 懸參 麥門冬 去心 石

麥門冬

石

膏 桑白皮 杏仁去皮 紫蘇 黃連各等分

右細切水一鍾生薑一片煎至七分溫服

寫白散一名瀉肝散 治肺氣壅盛 咳嗽不已

桑白皮 地骨皮各一 甘草炙二錢

右為末每服三四錢粳米百粒食後溫服

麥門冬清肺飲 治疹後咳嗽或出 血或澀湯水等症

知母 貝母 天門冬 麥門冬 桔梗

甘草 杏仁 馬兜鈴 陳皮 石膏火煨各等分

右細切水一鍾糯米一撮煎至七分溫服

又麥冬清肺飲 治脾胃虛弱氣促氣喘精神 神短少或吐血等症

紫菀茸一錢 黃耆 白芍 甘草炙各七分 人參 麥

門冬 當歸各五分 五味子九粒

右細切水一鍾半煎至一鍾食後溫服

甘桔湯 方見道書

桔梗湯 見道書

桔梗炒五分 半夏錢半 人參 甘草炙各一錢五分

右細切每服三錢或五錢水二鍾煎至一鍾食後溫服

導赤散 方見道書此多人參麥冬

蘇合丸

白朮 青木香 硃砂另研 烏犀屑 沉香

麝香另研 訶子煨去核 丁香 安息香另為末用酒 蘇合油

白檀香 香附炒各二錢 龍腦另研 薰陸另研

右為細末研勻用息香膏蘇合油併煉蜜為丸如櫻桃

大每服一丸生薑蔥白自然汁化開白湯調下

荳蔻丸 治疔瘡

理中湯 治見疔瘡

黃芩湯 治疹後赤白痢

芩炒 黃連去蘆

枳殼 去瓢

檳榔 炒

甘草

木香 各等分另研

右細切水一鍾煎至半鍾溫服如未愈再煎調益元散服

三黃湯 治三焦火盛煩渴不生肌肉積熱結滯臟腑心膈煩燥咽喉腫閉小便赤澀大便秘結俱服之

黃芩 去蘆

黃芩 去蘆

大黃 各等分

右細切每服四錢水煎空心溫服或研細末煉蜜為丸如梧桐子大照麝為衣每服五丸至十九丸熱水送下

白木 黃芩

甘草 三錢

右細切每服五錢水二鍾煎至一鍾去渣食前溫服

當歸六黃湯 一方等分倍加黃芩

當歸 各一錢

生地 各一錢

黃芩 各一錢

黃柏 各一錢

黃連 各一錢

右細切水二鍾煎至一鍾臨臥食前通口服小兒減半

地黃湯 治小兒鼻衄血

川芎 生地黃

赤芍 當歸各等分

蒲黃 炒

獨棗丹 治痘疹麻疹後牙疳牙疔潰爛肉腐出血等症

乾紅棗 一枚

雄黃 一錢

右將雄黃入棗肉內燒灰存性研為末米泔煎湯入鹽

少許漱口擦之

調中湯

治夏秋之間暴寒折於甚熱結於四肢則痛  
熱頭疼寒傷於胃則下利或血或水并宜服之

大黃 七錢

黃芩

藜蘆

白朮

葛根

芍藥

桔梗

茯苓

甘草

炙各五錢

右細切每服五錢水一鍾半煎至八分溫服得利即止

不利再服

清胃散

治因服熱藥或食辛熱之物致使牙疼  
引頭腦滿面發熱大痛喜寒惡熱等症

當歸身

黃連

夏月倍用 生地黃

酒洗各三分

牡丹皮

五分

升麻

右細切水一鍾煎至半鍾涼服

化虫丸

治諸虫細小者皆化為水大者自下

檳榔

苦楝皮

東引不出土者 胡粉

炒各一兩

白礬

明礬

各一兩

黃連

五分

五分

右為細末米糊為丸如梧桐子大量小兒大小加減

歲五九溫漿入生麻油三四點打勻送下清米飲亦可

又化虫丸

能化虫為水

硫黃 一兩

木香

五錢

蜜陀僧

三錢

附子

一枚炮乾

另為細末

右先以附子末用醋一鍾熬成膏餘為細末以附子膏

丸如菜豆大每服二十九丸荆芥茶清下

雄黃散

治小兒因痘疹牙齦生疳蝕瘡

雄黃 一兩

銅綠 二錢

右研為極細末量瘡大小乾摻其上

綿繭散

方見痘書

治因痘疹身體肢節生疳膿腐水不絕及大人小兒乳癆等症用竹筒

吹之

三僊散

山查

神麴

麥芽

各

右為細末每服二錢入白沙糖一分百沸湯調下

小柴胡湯

方見痘書

防風通聖散

因症加減俱詳蓋於方後用者察之

防風

川芎

當歸

芍藥

大黃

麻黃

連翹

芒硝

各五錢

石膏

黃芩

桔梗

各一兩滑石

甘草

各三兩

荆芥

白朮

梔子

各三錢

一方有砂仁無芒硝

右為籠末每服三錢水一鍾薑三片煎至六分溫服

生癰疹或赤或白倍加去節麻黃鹽豉蔥白發汗罷依

前方加四物湯黃連解毒二藥合煎日二服 勞汗當

風汗出為酸鬱去芒硝倍加芍藥當歸

寒加益元散五錢生薑三片蔥白三根鹽豉一握水一

大碗煎六七沸溫服一半以雞鵝翎探之即吐吐後更

服一半汗出立解 諸風潮搐及小兒急慢驚風大便

秘結邪熱暴甚腸胃乾燥寢汗咬牙目睛上竄睡語不

安轉筋驚悸倍大黃梔子煎調茯苓末二錢如肌肉爛

動者調羌活末一錢 打破損傷肢節疼痛腹中惡血

留滯不下加當歸大黃煎調乳香沒藥末各一錢 風

傷於肺涎嗽喘急加半夏桔梗紫苑煎服各二錢 氣

逆者煎調木香一錢 頭旋腦熱鼻塞濁涕時下加薄

荷黃連煎服 飲酒中風身熱頭疼加黃連蔥白煎服

腰脅走注疼痛加硝石當歸甘草煎調車前子末海金

非可等

砂末各一錢。小便淋閉去麻黃加滑石連翹煎調木香末一錢。痢後兩脚腫痛足脛枯腊名曰鶴膝風煎服之。按此方不可無生薑同煎乃治諸風熱燥三者之總劑也。蓋風本於熱熱極則風生燥生於風風動則燥至是風熱燥三者其實一源流也。故此一方能兼治之。

通聖散

川芎

當歸

麻黃

薄荷

連翹

白芍

各五錢

黃芩

石膏

桔梗

甘草

滑石

三兩

荆芥

梔子

白朮

各一錢五分

右研細末每服三錢生薑三片搗爛煎湯調下如血加蒼朮羌活痰嗽加半夏

懸參升麻湯

治發癩咽乾濕毒發癩或傷寒失下熱實發於外甚則煩燥謔語宜服之

懸參

升麻

甘草

各一錢

右細切水一鍾煎至七分溫服

瀉心散

治心經邪熱狂言妄語心神不安

牛黃

硃砂

各一錢五分

大黃

生用一兩

又瀉心散

治心經蘊熱

右各另為末和勻再研每服三錢涼生薑湯蜜水調下

調胃散

蒼朮

米泔浸去麋皮入錢

厚朴

薑汁炒

陳皮

各五錢

茯苓

丁香

參斗要

三

白朮

甘草 各二錢

右為細末以沸湯入鹽點二三錢或麩末入薑棗水煎溫服

承氣湯

治胃實譫語五六日不大便腹滿煩渴併少陰舌乾口燥日痛發熱脈沈實者

大黃

酒洗

厚朴

薑製

枳殼

麩炒

芒硝

各等分

右細切水二鍾先煎枳朴至一鍾半去渣入大黃再煎至一鍾去渣入芒硝再少煎服以利為度未利量虛實

加減服

調中湯

治內傷外感所發陰症

蒼朮

半錢

陳皮

一錢

藿香

炒

砂仁

甘草

炙

桔梗

去蘆

半夏

泡七次

白芷

羌活

枳殼

各七分

川芎

五分

麻黃

去節

桂枝

各三分

右細切水二鍾生薑三片煎至一鍾溫服

陽毒升麻湯

治陽毒赤斑及傷寒一二日間身發痲或吐下後變成陽毒腰背痛面赤狂言

吐膿血咽喉腫下利脈浮大

升麻

一錢

犀角屑

射干

黃芩

人參

甘草

右各等分細切水二鍾煎至一鍾食前溫服

梔子仁湯

治陽毒傷寒發熱發狂百節疼痛身發痲爛煩燥面赤咽痛

梔子仁

赤芍

知母

升麻

柴胡

石膏

石膏

一錢

黃芩

各一錢

甘草

五分

杏仁

去皮

豆豉

一百粒

一方加

右細切作二服每服水一鍾薑三片煎至七分溫服

石膏湯

石膏

二兩

梔子仁

大青

升麻

芒硝

各一分

豆

三

三

三



豉一合 葱白五分 生薑五錢

右細切水一鍾半煎至七分去渣入芒硝候溫徐徐服之

黃連橘皮湯 治熱毒發癩

黃連四錢 橘皮去毛 杏仁去皮 枳實 麻黃去節 葛根

各三錢 厚朴 甘草炙各一錢 一作四服

右細切水二鍾煎至七分溫服

升麻鼈甲湯 治陰癬

升麻二錢 當歸 甘草各二錢 川椒二十粒 鼈甲炙 雄黃

四分 另研

右細切水二鍾煎至一鍾去渣調雄黃末溫服

黑膏 治濕毒陰癬由及六月大暖人受不正之氣至春發癩如錦文者脈浮屬陽脈沈屬陰皆宜服之以消

疫毒之氣

生地黄半斤 香豉一斤

右細切以猪膏二斤合煎之取濃汁如膏用雄黃麝香如菜豆大各一塊為末入膏內攪勻每服彈子大一塊

白湯化下

大青四物湯 治痘疫發癩

大青四錢 阿膠炒成珠 甘草炙各一錢 香豉一合

右細切水一鍾煎至七分溫服

加味敗毒散 治痘疫發癩及癰疹等症或因虛而感冒風濕發癩并宜服之

羌活 獨活 前胡 柴胡 當歸 川芎

枳殼 桔梗 茯苓 人參各五分 甘草 薄荷

各二分 加白木 防風 荆芥 蒼朮 芍藥

生地各五分

右細切水二鍾生薑三片大棗二枚煎至七分溫服

犀角消毒飲

治發癩瘡疹等症

牛蒡子炒四錢

荆芥穗

防風

去蘆各二錢

甘草

一錢

犀角

另燒為末臨服入之

右細切水二鍾煎至一鍾調犀角末溫服

解毒防風湯

治發癩瘡疹及癢疹癢痛

防風

地骨皮

黃耆

芍藥

荆芥穗

枳殼

牛蒡子

炒各五分

右細切水二鍾煎至一鍾溫服

加味羌活散

治感四時不正之氣發為癩疹

羌活

前胡

人參

桔梗

甘草

枳殼

蘇炒川芎

天麻

茯苓

各五錢

蟬蛻

薄荷

各三錢

右細切水二鍾薑三片煎至一鍾溫服

消風散

治諸風上攻頭目昏眩項背拘急鼻嚏聲重耳腫癢等症

荆芥穗

甘草

各二兩

陳皮

焙去白

厚朴

薑製去蘆皮各五錢

人參

白僵蠶

防風

去蘆

藿香葉

白茯苓

川芎

蟬蛻

羌活

各一兩

一方各等分

右為細末

每服二錢感風頭痛鼻流清涕荆芥湯茶清調下遍身瘡癬溫酒下

葛根

橘皮湯

治肌膚癢痛濕熱始發

葛根

橘紅

杏仁

知母

黃芩

麻黃

甘草

各等分

葛根

橘紅

杏仁

知母

黃芩

麻黃

甘草

各等分

葛根

橘紅

杏仁

知母

黃芩

麻黃

冬斗寒要

右細切每服五錢水一鍾煎至七分溫服

漏蘆湯

治臟腑積熱發為腫毒時疫疔瘡頭面紅腫咽壅填塞水藥不下一切危惡疫癘

漏蘆

升麻

大黃

黃芩

藍葉

即大藍青散葉

懸參各等分

右細切每服二三錢水一鍾煎至七分溫服熱甚加芒

硝

又方漏蘆湯

治五種并毒及一切瘡癰毒腫初覺二三日便如傷寒頭疼煩渴拘急惡寒肢體疼痛沈重性燥便赤黃并宜服之

漏蘆

白蘇

黃芩

麻黃

朴硝

升麻

甘草

枳實去白

芍藥

大黃

二錢

一方加連翹去枳

實芍藥

一方加連翹枳殼地丁金銀花去甘草枳實芍藥餘各等分大黃地丁金銀花減半

藥餘各等分大黃地丁金銀花減半

右細切每服三錢水一鍾煎至七分空心熱服或加薑

三片薄荷三片煎以利下惡物為度

固胎飲

止痛安胎

地黃

川芎

當歸身

人參

白芍

陳皮

各一錢

白朮

黃芩

甘草

三分

黃連

桑上羊兒藤七葉圓者

右細切每服二三錢入糯米二十粒水一鍾煎至七分

溫服痛加砂仁血虛加阿膠

金匱當歸散

治胎動不安妊娠宜常服之乃養血清熱之要劑也

當歸

川芎

白芍

黃芩

各一兩

白朮

五錢

右為細末每服方寸七空心溫茶湯任下日三三服

石膏六合湯

治妊娠傷寒身熱大渴蒸而煩

石膏

六分

粳米

一升

水

一斗

右細切每服三錢水一鍾煎至七分

溫服痛加砂仁血虛加阿膠

金匱當歸散

治胎動不安妊娠宜常服之乃養血清熱之要劑也

當歸

各一兩

川芎

白芍

黃芩

各一兩

白朮

五錢

右為細末每服方寸七空心溫茶湯任下日三三服

石膏六合湯

治妊娠傷寒身熱大渴蒸而煩

石膏

六分

粳米

一升

水

一斗

右細切每服三錢水一鍾煎至七分

溫服痛加砂仁血虛加阿膠

金匱當歸散

治胎動不安妊娠宜常服之乃養血清熱之要劑也

當歸

各一兩

川芎

白芍

五錢

四物湯 四錢 石膏 知母 各五分 四物湯乃當歸地黃川芎白芍

右細切水一鍾半煎至一鍾溫服

升麻六合湯 治妊娠傷寒下後過經不愈濕毒發癩如錦文者

四物湯 四錢 升麻 連翹 各七分

右細切水一鍾半煎至一鍾溫服

凡安胎用黃芩乃上中二焦藥降火下行用砂仁止痛行氣若血虛胎不安阿膠主之

麥湯散 治水痘

地骨皮 炒 甘草 炙 滑石 各一錢 麻黃 去節 人參 熟地黃

知母 甜葶藶 羌活 各三分

右為籠末水一鍾小麥七粒煎至半鍾溫服

附久吾治疹大法

疹疹初發熱欲出未出者宜用宣毒發表湯

升麻 白粉葛 各八分 防風 去蘆 桔梗 各五分 荆芥 薄荷

甘草 各三分 牛蒡子 炒香 連翹 去心帶 前胡 枳殼 炒

木通 淡竹葉 各六分 天氣大熱加黃芩 炒八分 大寒加麻

黃 八分

按此方疎風開表清熱寬氣透毒無一味不萬分斟酌較之單用升麻葛根湯者力大而不猛用廣而不雜真妙方也醫家細心審之

痲疹已出而紅腫太甚者宜用化毒清表湯

牛蒡子 製同前 連翹 天花粉 地骨皮 黃連

黃芩 山梔 炒 知母 乾葛 懸參 各八分 桔梗

前胡 木通 各六分 甘草 薄荷 防風 各三分 口渴

加麥門冬

去心一錢

白石膏

煨研二錢

大便瀉加酒炒大黃二分

按此方固是瀉火抑陽養陰然仍兼疎表送毒之品者謂勢雖熾盛只求外出蓋以疹家出盡則毒盡恐寒涼太過冰伏內攻也視純用黃連解毒湯合白虎湯者流動活潑一派化機大有不同用者詳之

有毒氣流注而成痢者宜用清熱導滯湯

黃連

條芩

白芍

枳殼炒

山查肉各一錢

厚朴

去皮薑汁炒

青皮

檳榔

各六分

當歸

甘草

牛

蒟子

連翹

各五分

紅多者加紅花三分地榆五分

秘

瀉甚者加酒炒大黃一錢二分

按此方泛泛視之調氣行血清熱不過滯下平劑耳自非心領神會默窺其微鮮有知其妙者此係清利麻疹

餘毒之方而非尋常治痢之藥也以用牛蒟連翹二味不同而羣藥俱化疹用蓋疹屬木痢屬標治疹而痢自除經曰治病必求於本此方有焉誰謂方可易定哉  
麻疹變態不亞痘症久吾止用三方誰不疑其疎於立法乎不知方期對病欲其當不欲其繁繁則雜雜則惑選擇為難而收功反寡譬之我有精兵三千可以當彼疲師百萬不貴多也醫何異此觀上三方藥味有限妙用無窮病機治法槩括已盡此真扼要爭奇療疹之綱領也後學莫以其簡忽之合讀馬書條分縷析麻疹一症思過半矣

巳巳之春日

是太田錦城先生之所著書也男庶那  
四郎氏之所持借得寫者也  
十七年八月際曝書泉石老人識

扁鵲傳

異傳

扁鵲傳



秦越人

遮那按秦策注吳師道引周禮紀文姓秦

名小齊越人之說曰紀文為是越人似非名字是不知

扁鵲自稱臣齊勃海秦越人也且以越人為名者不

獨扁鵲秦策有段干越人齊東野語云段干越人因邑

以為姓越人其名又按朝鮮相有<sub>下</sub>名路<sub>上</sub>人者見朝鮮傳

肥如令有<sub>下</sub>名郢<sub>上</sub>人者<sub>都</sub>郢<sub>楚</sub>見漢書燕王傳皆其類也

當知物 博物志云趙襄子以為物徐察之乃人也

按物義与之同謂怪物也上文知物与下文見五臟癥

結相應。癥結即腹中怪物也。癥與瘕通。玉篇瘕腹內瘕結病也。視見垣一方人。按此句喻隔皮肉見

臟腑。猶眼力通神而隔垣見人也。

在趙者名扁鵲。按當以扁鵲過魏。太子死扁鵲

過存。桓侯客之二段為先。趙在者名扁鵲當晉昭公

時一段。次之。秦太医令李醯所殺一段。又次之。說詳于

前。有秦和漢藝文志秦緩抱朴子秦越人湛淵靜語並神仙傳鑑為名緩字越人

董安于 韓非內儲說淮南道應訓作董闕于戰國

策作董

闕安于

公孫支 索隱云子柔也。呂覽尊師云秦穆公師百

里奚公孫枝高誘曰公孫枝大夫柔也。

且令而因男女無別 而汝也。下文及而子之杜亦

同。按且令二字。敗之誤拆也。敗而因。下所謂敗秦師於

殺是也。男女無別。所謂西歸縱淫是也。

鈞天廣樂 抱朴子聽鈞天之樂。虞喜志林奏鈞天

廣樂。張衡西京賦。享以鈞天廣樂。按所遊鈞天也。所奏

廣樂也。然諸書以鈞天為帝之天。為樂名。非也。續博物志

引廣雅曰。中央鈞天是也。列子以廣樂為帝之所居。亦

非也。廣樂見于戰國中山策。



萬舞

詩簡兮鄭箋以于舞為萬舞非也三章有執

籥秉翟句則萬舞者文舞而非武也朱子曰萬者舞之

總名武用干戚文用籥箏是也

熊羆

正義曰熊羆范氏中行氏之祖也

二筭

正義曰代及智氏也

兒在帝側

兒及下文而字謂趙共諳趙襄子也趙

世家云兒主君之子也

厲我一翟犬

趙世家云翟犬者代之先也呂氏春秋

云趙襄子攻翟一朝而城下

中庶子

高君使執事魏相公叔座為中庶子索隱

曰魏已置之非自秦也周禮夏官涓之諸子禮記文王

世子謂之掌庶子掌公族也戰國韓策韓公叔與幾

瑟爭國中庶子強謂太子曰吳師道曰云中庶子強謂

太子豈亦太子之官歟新序雜事云楚莊王之時士

庶為令尹受相印中庶子聞之跪而泣曰臣尚衣冠御

即十三年矣是左右侍御之臣也刺客傳秦王寵臣中庶

子蒙嘉魏策座之圍御庶子公孫鞅史記作中庶

子故暴蹙而死按呂氏春秋高誘註云蹙逆

疾也正義引穀名云蹙氣從下蹙起上由此二說則蹙

者蹙起之義而血與氣并走於上也傷寒論尸厥之症

為腎氣微少精血由此則慶者竭之美而腎氣與精血俱竭也漢書食貨志生之由此者甚少而靡之者甚多天下賤產何得不慶應劭曰慶傾竭也尸慶即今所謂中氣也

鑿石 張介賓類經經蓋翼拳鍼者一曰鑿鍼漢藝

文志云度箴石湯火所施師古曰箴所以刺病也石謂砭石即石箴也古者攻病則有砭今其術絕矣 鵲冠

子扁鵲鑿血脉 鑿石蓋砭石之鑿者倉公傳亦有

橋引 按橋引與留侯世家道引輕身同爾雅雜糴

獸注伸引手足索隱云橋引身如熊顧鳥伸也

案杭 攷異云按杭之杭當作玩从手从元轉寫詒

玩耳索隱云按摩而玩弄身體

毒熨 以毒藥熨病處也索隱為毒病之變非是

湯液醴灑 按湯液非湯藥之謂蓋倉公傳所謂火

齊湯者粥火齊米汁之類歟後世不詳其傳醴灑

灑蓋醴灑之誤謂酒醴之淋灑也 素問有湯液醴灑

篇

一揅見病之應 字彙揅開也蓋一揅開衣衾之謂

多紀引曲礼衣毋揅注揅發揚貌是也 見病之應與

下文病應見於大表相應

因五藏之輸 此句當屬下句讀或作輸或作輸不  
如史記作輸之明白增韻凡以物送之曰輸張介賓曰  
輸猶之輸言臟氣之所輸也

割皮解肌 視五藏輸穴之所在然後施割皮解肌

之術猶今人割乳癌鷓冠子世賢扁若扁鵲者鑿血脈  
投毒藥剖肌膚間列子湯問扁鵲飲二人毒酒迷死  
三日剖胸探心易而置之投以神藥張堪注云魏世華  
他能剖胸易胃滿洗五藏

訣脈 孟子決汝漢朱云決去其壅塞也訣與決通  
擗髓腦揲荒 玉扁擗正也持也髓骨中暗也張介

賓曰腦頭中髓也 按荒與髓通肉間也玉篇揲教也

曾不可以告咳嬰之兒終日 玉篇咳小兒笑也按

咳與孩通嬰與櫻通咳櫻之兒與孟小孩提之童同義

朱云二三藏之間知孩笑可提抱者也 戰國秦策鮑

包彪注云集韻女曰嬰男曰兒吳師道云兒名始生

曰嬰二胸前也抱之胸前乳養故曰嬰 疑各說屬穿鑿

終日例論語中允多 說雅云嬰送逆鱗

若以管窺天以郄視文 漢東方朔傳語曰以管窺天

以蠡測海師古曰窺古管字 玉篇郄與隙同字彙却

不同却音却周禮注畫繪之事書與赤謂之文

寫形 言寫病人之形於已眼中也。文心雕龍：白日

垂其照，青眸寫其形，多紀引之甚當。

聞病之陽論得其陰 言聞病之左背論知其右腹

也。正義引揚玄標說曰：為陰背為陽。

不出千里決者至衆不可曲止也。決者決病症也。

言已不出千里而請決者甚衆不可委曲止之也。董份

之說得當。

當聞其耳鳴而鼻張 多紀曰：陰眠上爭故有耳鳴

而鼻張。說苑辨物篇云：耳中焦々如有嘯者，聲然。韓詩

外傳云：耳焦々如有啼者，聲

循其兩股 循撫循也。與漢李陵傳：循刀環同義。多

紀引傷寒論尸厥條云：陽氣退，熱下，歸陰股。

目眩然而不瞋，舌橋然而不下。莊子庚桑楚：兒子

終日視而目不瞋，說文：瞋，開闔目數搖也。說文：橋，舉

手也。按下言不下，則橋然為舉，負明矣。多紀引荀子注

橋然強負者，非是。

幸而舉之 舉者，舉太子也。孟嘗君使嬰告其母曰：

勿舉也。其母竊舉生之。又云：文頴首因曰：所以不舉五

月子何如。漢書文三王傳云：則懷年子，增嬖使勿舉。師

古曰：不養也。

偏國寡臣幸甚

索隱以寡臣為親君董份為太子今以說苑辨物篇并  
韓詩外傳見之則索隱似是接下二句見之則董份似  
是姑存二義而可也

棄捐 多紀引穀名曰不得理曰棄之於野也不得

其尸曰捐之於他境也玄齡曰穀名所說殆屬穿鑿棄

捐者蓋棄捐命也李斯傳云父捐命是也東坡謂章子

厚曰能自棄命者能殺人也

噓唏服臆魂精泄橫 字彙噓是唇吐氣曰噓王篇哀

痛不泣曰唏由此噓唏者哀痛不發聲也留侯世家戚

夫人噓唏流涕 多紀引閻居賦注云歔歔泣餘聲也

未盡 玉篇臆肌同肌胸也因此則服臆與中庸服

膚同服思也義在詩毛傳並莊子郭注 多紀云服臆

通方言臆滿也郭璞注臆氣滿也此說亦通 魂精之神也泄橫散亂

負

尸蹙 尸下文形靜如死狀太子未死相應

夫以陽入陰中 陽氣入陰部 動胃續緣也 中

經 經在裏政 維絡 絡各聯繫故曰維絡 別下 陽

於三焦 指下 膈脫 自動胃至此覆下說 是以陽

脈下遂 廣雅遂遂行也 陰脈上華 巢源千金作上升素

下行極而上多紀曰陽脈實極而下遂陰脈受道而上華者即此機也

是上行至頭而下行循臂至指端陽氣從手上行至頭而下行至

郭雍曰陽脈陰脈者陽經陰經也

於三焦 指下 膈脫 自動胃至此覆下說 是以陽

足故曰陽病  
者上行極而下  
會氣閉而不通  
下德用曰氣會膻中穴也  
會而氣也

即膻中上氣海而心藏之所居也今陰邪氣上爭則氣海閉塞故心無所知也  
陰上而陽內行者陰上

飛上爭也陽內行者陽脈下遂也  
下內鼓而不起  
陽氣鼓動于下而不能起也  
上

外絕而不為使  
素問曰陽在外陰之使也  
素問馬蒔注以絕為多紀  
曰陽氣下鬱于上外隔絕而不

為陰使也  
又曰人身之理上于外相親下于內相屬  
疾  
破陰絕之色已糜

上有絕陽之絡  
上有與陽相  
下有破陰之紐  
素問篇紐說文紐

系也  
多紀曰破字未必破敗之謂蓋言  
有下陰氣為陽被格礙而不能行之訪紐  
作矣

夫以陽入陰支藏者生  
靈樞以神氣之  
蘭

為橫節陰支蘭為膽藏者甚奇甚怪所舉素問者今

無所攷多紀曰此二句不過言以陽入陰者生以陰入

陽者死其義自明  
固語天之所支不可懷也  
韋云支

柱也  
固策魏不能支注支猶拒也  
列子說符糶文蘭

支蘭同  
漢王泰使與牛馬同蘭師古曰蘭謂遮蘭之

支蘭蓋即遮蘭  
支蘭藏者上文所謂動胃纏絡中經維

絡別下於三焦膈脫是也  
以陽入陰與上文以陽入

中應  
藏即五藏也  
遮蘭五藏之氣是以會氣閉而不

通也  
凡此數事  
上件諸證  
皆五藏廢中之時暴作也

五藏氣厥皆從中上逆  
此時暴發  
暴卒暴也郭雍曰厥氣亦邪氣也

弟子子陽  
子陽韓詩外傳作陽子說苑作子容

取外三五陽五會 肘後方尸蹙下曰針百會 張氏  
類經音翼云百會一名三陽五會一名巔上

先為外泄次施熨術次用服藥是扁鵲之舊法也此術

豈待蘭匠之所為耶 齡曰言為十分之熨分而為三則亦也熨火者或用綿布或  
用葉不置莖不用熨手耳蓋分而為三故下云更熨火

為五分之熨 貞曰熨之令溫暖之氣入五分也

以八減之存和者以之 漢藝文志云度歲石湯火所施

調百藥存和之所宜至存之得猶慈石取鐵

千金方曰灸熨手熨兩脇下 按減者煎減也八減者

蓋在八減二也存和者今人所謂調合也熨兩脇而血脈

融通猶天溫而水雪釋是自然之理

以更熨兩脇下 一本脇作臍非也

在漆理 靈樞賤理癸泄張介賓注云賤理者皮膚層

之隙 欲以不疾者為功 以韓非喻老作治是也

後五日 後五日新序作居十日 與上文五日不知人

韓子作十日不知人同例

司命 天官書文昌宮六星四曰司命

使聖人預知微能使良醫得蚤從事 使聖二字衍

文然新序使聖雜事載此事結末云故聖人蚤從事矣

從事施匠術也 人之所病之病多而匠之所病之

道少 郭雍引此語作人之所患之疾多 醫之所患之  
道少 董份曰 病道少 言治病之道少也 日知錄

以道少為下文六者 驕恣不論於理

其行驕恣而不知道理者也 輕身重財吝嗇

衣食不能適通 靈樞云 飲食欲適寒溫 一云適

身陰陽并 岐曰 素問血氣未并 五藏安定 又云陰

身陽耗 血氣以并 病形以成 并者 混殺之謂也

食公使云 陰陽之文者是也 形羸不能服藥 體羸性弱 不堪藥

石 信巫不信醫 醫本酒名 古字作醫 論語巫醫用

呂覽 畫數

云今世上卜筮禱祠本故病愈來

帶下醫 非赤白帶下之謂 區月經之疾也 謂之帶

下病 耳目痺痺 老人所患 冷痺及耳目也 一得老

腰脚痿弱之疾 至今天下言報者由扁鵲也

与始特以診脈為名耳相應 奇咳術

淮南兵略訓曰 明於日月星辰之運 刑德奇寶之數

注奇寶 陰陽奇秘之要寶 漢書藝文志 五音奇咳刑德

二十二卷 按說文 奇 候 非常也 玉篇 賅 奇也 非常也 又

方言 非常 曰 候 東 蓋 咳 与 候 通 奇 咳 術 乃 非常 術 其 作

奇 寶 奇 咳 等 者 皆 假 借 耳 咳 小 兒 笑 息 咳 足 大 指 毛 也



該軍中約也。並出說文。但亥。即該字。亥。侯同。正義引  
許慎。為該。該之義。誤矣。

