



救瘟

袖曆

初編

全

武十
262



門 楫 9
第 262
卷

救瘟袖曆序



同僚采原士慈。校故晚切翁
所筆。救瘟袖曆。為翁幼孫靜
卿。刻家塾以公於世。蓋晚切翁
者。士慈之姑父。府君隆朝如春
之好丈也。翁在在也。其如春於濟

生之切。難。弟。難。兄。一時大振名聲。都人士稱之。工。乘。二名手。實生本。潘光輝。茂質嘗事二子。如師兄。受其警咳者久之。遂為通家之好也。晚切翁。資性磊落。不以彫蟲為事。每

蒙款待語及治法。驚于冠芳。不易曉會者。居多。然賴其啟發而得窺精微者。亦不少矣。一日語余曰。近南總醫人著療治茶談一編。頗有所見。吾亦有獨得之說。行將錄以

授流芳。茂質嘉而為德。德為。此編即是也。今也。披卷讀之。恍如遇知己。法然泪下。追想往事。二十年于此。而其没距今十年所。居無幾。如喜尔即世。士慙此舉。其志可謂篤也。

二子若有知于地下。其欣然雀躍也。必矣。此書行于世。眾醫屬目。其必知翁之骨法非凡庸矣。士慙素知余之與二子有舊。校成請余一言。何敢當乎。然以師兄之義。

通家之好。故不顧蕪陋而
題卷端云。

文化十二年乙亥仲冬

磐水大槻茂實



救瘟袖曆序

此編ハ温疫治療成敗ノ事蹟ヲ誌テ子弟ニ授ル
也温疫ハ時行ナレハ年々ニシテ小異同アリ十
年許ニテ一變アル故一定ノ治法ヲ以テ永ク守
ルベカラズ固ヨリ正傷寒ニ異リ傷寒ノ治法ヲ
得タリトモ温疫ノ意味ヲシラザレバ人ヲ誤ル
ヲ免レカクカルベシ吳子ノ温疫論ナドヲ見
テ其異同アルヲ知ベシサレド初學ノ士ハ先
正傷寒ノ經ニ傳ル病状ヲヨリ理會シ又病人ニ
得テ治療ノ根基ヲ定ムベシ四時温疫ハ始終經

ニ傳ヘザルアリ經ニ傳テ種々變化スルアリ其
經ニ傳ルハ畢竟壞病ニテ正傷寒ニ異ナレド傳
經ノ理ハ差フナシ故ニ此傳經ノ症ヲ病者ニ
得テ初學第一ノ勉メトスベケレド正傷寒ハ
甚稀ニテ直ニ病人ニ得ルニ道ナシ今マヅ正傷
寒傳經ノ機脉状舌候諸症ヲ述ヘ又温疫ノ種類
多キヲイヒ近來流行セル濕温ノ病状治療ノ予
カ經歷シタル得失ヲ有ノマヽニ誌シテ當用ニ
備フ治療ノ理ハ時行ノ轉變ニヨツテハ夕ガハ
ホレドモ治方ハ差ナキヲ得ズ君此時行轉變

シテ又新ニ治方ヲ立ル時ハ故ヲステ、新ニ就
クベキニヨリテ袖コヨミトハ題セリ
寛政丁巳春二月

晚切堂主人誌



袖曆初編目次

正傷寒傳經ノ説

瘡説

脈説

舌候

汗候

大便候

小便候

虛火炎上ヲ辨ス

温疫轉變ノ説

疹疫ノ事蹟

時疫初得及傳經ノ説

濕温治驗

濕温名目

救瘟袖曆初編

仙臺

工藤球卿平助父著孫

周菴靜卿刊行

同藩

桑原季愿隆朝重校

正傷寒傳經ノ説

傷寒論陰陽二證ノ治法ハ陽症ニハ陽ヲ奪ヒ陰
症ニハ陽ヲ救テ曾テ陰分ニ及ノ治ナク唯一氣
ノ盛衰ヲ抑揚スルノミ也雜病ノ陽病ハ陽ヲ治
シ陰病ハ陰ヲ治スル例ニ非ス是故ニ藥ノ氣ヲ
借ルノミニテ湯液ヲ多ク用ユ又金匱ノ陰ニ入

ル藥ニ丸散ヲ用ル₁多キハ陰氣トハイヘト質
有ル者ナレバ藥モ質有₁用ルナルベシ腎氣丸
ヲ始トシテ婦人方ノ桂枝茯苓丸及ヒ諸丸散等
皆質有ル藥ノミニテ湯液ヲ用ル₁稀ナリ初學
此意ヲ翫味シテ傷寒ノ治ハ一氣ノ斡旋ニ止ル
₁ヲシルベシ凡外邪ノ人ノ身ニアルハ扇ヲ以
テ物ヲ扇ガ如シ火ヲ扇ケバ熱シ湯ヲ扇ケバ冷
ユ其扇ニ差別ナケレド扇ノ所ニ随テ氷炭ノ夕
ガヒ有リ外邪陽分ニ入₁テ煽動スレバ陽熱盛旺
シ陰分ニ入₁テ煽動スレバ陰寒盛旺ス傷寒傳經

ノ理カリノ如ク熱病モ陰症トナレバ大寒ニ化
シテ熱ノナゴリアル₁ナシ傷寒トイヘド寒ニ
非ズ熱病トイヘド熱ニ非ズ經ニ随テ寒ニモ熱
ニモ化スルナリ若夫中寒中暑ハ外邪ニ寒熱ノ
差有₁テ直中ノ症ニハ白虎湯四逆湯ヲ用₁テ直ニ
其急ヲ救ヘドモ傳經ニ至リテハ中寒モ熱ニ化
シ中暑モ寒ニ化ススベテ傳經ノ上ノ寒熱ハ吾
陰陽ノ邪ノ夕メニ煽動セララル、ニテ外来ノ寒
熱ニハアラス是予カ家言也此コトワリヲ明ラ
ムルハ瘧ニシクハナシ先年著ス所ノ瘧說ヲ出

三下互考二備下

瘧說

瘧可怪者七寒熱交作間時如不病一也隔日一發
 二也或日發或晝夜發或三四日一發三也發作之
 早晏必有次第四也諸病不可截瘧獨可截五也其
 瘧一頓而大寒壯熱不知形之六也或七情冒觸或
 厭勝呪符皆能可截七也此瘧之所以為怪而病之
 源亦可因而辨也夫瘧者陰陽和不和耳凡外邪初
 得皆能憎寒壯熱憎寒兼壯熱者不成瘧若憎寒太
 甚不遷化熱至戰慄鼓顛寒定而後發熱者外邪間

陰陽也外邪既間則陰陽不能交泰各自發寒熱如
 此者往往為瘧非別有所謂瘧者也非外襲之邪有
 寒有熱也吾之陰陽為邪所鼓動之為耳陰方動為
 寒戰則陽不能自守亦動為壯熱壯熱已收餘勢未
 醒延及二周時伏極而後陰寒復發陰收陽旺陽伏
 陰旺往來循環若環之無端而瘧狀成矣二周時一
 發者為純瘧他為雜瘧雜瘧者為必有他故也其陰
 寒之餘勢短陽熱之餘勢長者蓋陰勢衰則陽便乘
 之陽勢雖衰而陰不便逼必待其伏極而後發迺剛
 柔之象耳其狀似有休作其實則寒熱交旺間不容

髮也其發作之早晏有次第者蓋餘勢早收則發期
近反之則遠耳病之淺深不在寒熱之小大而在外
邪之輕重辨之之法當於間時詳察其脈證焉若夫
治療適宜外邪頗解而寒熱猶未減者交旺之餘習
不能自和也方此時非盡截藥之可截凡厥勝况第
及七情胃觸皆可以截矣其瘥一頓而大寒壯熱不
知取之者蓋大氣一轉而陰陽交泰耳無復足怪者
矣

古今截藥煎成露宿一宵發日早晨一頓冷服者
蓋方午陽熱既收餘熱少存忽得冷物則伏陰乘

機而和耳予有和氣湯可截瘧

和氣湯方 柴胡一錢 陳橘皮五分

右二味水二合煮取一合露宿一夜先發期三大
時一頓冷服假令已時發者寅時服酉時發者午
時服亥時發者申時服他倣此若亥時發者亦早
晨服則去發期遠而無成以世間為陰瘧不可截
者蓋坐於此諸截藥服法宜倣此也

瘧ノ寒熱ヲ發スル理此ノ如シ治法ハコ、ニ預
ラザレバ細録セズ大抵ハ截藥ヲ用ヒズ邪去テ
自ラ治スルヲヨシトセリ葛根葱白湯下ニ出加

升麻或ハ神授太乙散加當歸鼈甲ナドニテヨク
解セリ近來濕温流行ニ感セシハ利水ニシク
アルベカラス近來瘧ヲ療ビザレバ治驗ナシ後
ニ論ゼシ寒熱ノ化ヲ經サル者ナレバ發表ト解
毒トニ從シカドモスベテ寒熱發セシ後必大汗
出ルヲ以テミルニ多ク暑濕ニ感セシナルベク
利水ニシクハナカルベシ濕温ノ氣ニ感セシハ
猶サラ也猪苓湯匡正化毒湯ナド選用スベキニ
ヤ猶後ノ濕温ノ說ヲ互見スベシ
初學ノ勉ムベキトハ病ヲ治スル標的ヲモトム

ルニ在予才乏ク學淺ク得ル所少ナケレド標的
ノサグマリタルヲ記シテ初學ニ益アラントス
此意ヲ擴テ多ク標的ヲ定メタキ者也

脉說

脉ハ古來成說有テ治療ノ大標的ナリ驚方ノ言
語ヲ添ベキニハアラ子ト大小剛柔浮沉遲數ハ
クシカニ辨ズベシコレヲ綱領トシテ條目ヲワ
ケ心ヲ用ヒ年ヲ積テ習熟スレバ指ニ應ジ心ニ
得ル言外ノ妙有リ後條ニ散見ス病證ニ拘ラズ
脉ニ據テ切ヲ立ルハ常ナレド脉ヲ取ラズ治ヲ

施ス_レモアリ一概ニイヒカタシ脉學ニ達セザ
ル粗_レトテモ一病人ノ上ニテ日_クノ變化ヲ知
ハ_レ脉ニシク_レナシ此故ニ初學ノ人必_ス心ニトメ
テ終身修行スベキモノトスベシ今少クシリ得
タル數箇條ヲ出セリ
脉陰陽マキレヤスキモノアリトハ病人肌
熱譫語煩渴シ舌ニ黃黑胎厚ク乾燥シ小便赤澁
短少氣息急迫心下痞悶大便結燥シ或ハ下利ス
是世間ニ多キ陽明病石膏ノ症ニテ脉細數絲ノ
如ク重按スレバ全_ク無キ者尤多キ故此脉ヲ認テ

石膏ノ脉トスコレハ中氣虛弱ニシテ如此ナル
ニハ非_ス熱毒ニ閉ラレテ此ノ如クナル也此脉
多キ故コレヲ見トメテ規則トス外邪ノミナラ
ズ脉閉テ沉細取得カタク者十ニ九ハ熱閉也石
膏ニアラザレバ開カズ

一男子疫ヲ患フ病ヲ得テ十餘日數醫ヲ易フ舌
根黑胎乾燥ス數日不寐絶食一朝上竄全ク人事
ヲ省セズ額上黯黑脉弦大ニシテ散亂ス諸醫皆
辭ス一老醫六書ノ升陽散火湯ニ附子五味子知
母莪朮黃連ヲ加工黃芩陳皮ヲ去用テ愈_フ此脉

由香切

六

陽明病ノ危篤ニ甚マギル、所アリ舌候モ承氣湯ノ症ニマギル、所アリ是ハ八分許リノ陰症二分許リノ陽症ヲ帶テ純陰ノ症ヲ現セサル也純陰ニ化スルヲ待ベカラザル急アル故ニ此湯ヲ用タリスベテ額上ノ黒キハ附子ノ症也初學心得ベキ一也乙卯春末一婦人性柔惰勞役ニ堪ズ時ニ公用繁ク勉強シテ事ヲ視ル一日大惡風壯熱倦怠苦頭痛氣高ク煩渴シ脈浮大チカラアリ升麻葛根湯ニテ汗出其夜舌上褐胎乾燥スコレ勞力感寒也脈チカラ有ハ元陽動テ走ラント

スルニ外邪ヲ帶タルニテ其實ハ虛極也トシテ補中益氣湯ニテ安シ此等ノ症ハ脈バカリニテハ陰陽ヲワカチカタクケレドウチミタル状全ク鑿王ノ症也弘ク救療セシ醫ノ心ニハ奇効トモセズ平常ノ茶飯也白虎湯ノ脈真武湯ノ脈根ノ無ト有トニテワカレドモ人ニヨリ洪大ノ浮大ニマギル、浮大ノ洪大ニマキル、アリ初學マドヒヤスシフトク指ヲウツハ同シ一也重按シテチカラアラバ真ノ洪大ニテ白虎湯ノ症也重按シテ全ク無ハ散大ニテ真武湯ノ症也閉テ純

脈ニモ至ルハフサグ故也浮大ハフサグ事ナキ
ニ按シテ全ク無ハ真ニ根ノ無脈ナレバ此所ニ
テ陰陽繁然トシテワカル、也初學心ヲ用ベキ
所ニ三四十年以前ノ傷寒時疫ノ陰症ニ傳ルハ
皆此浮大無根ノ脈ニコレハ純陰ノ症ニテ真武
湯ナド十分ニ用テ名ゴリナク解スル故ナシヤ
スシ近來多クハ沉細ニ沉細ハ古法則ノ陰脈ナ
レドモ陽毒ノ残タルニ此脈ヲアラハスアリ尤
ナシガタキ症ニ又陽症ノ熱毒ニトチラレタル
モ沉細無根ナレバ甚マギラハシ此外ニモ時ニ

ヨリタシカニ證ニトリニクキ事アリテ紙上ニ
論セシ通りノ明白ナルモノニハ非ス先哲ハ脈
ノ明白ナル者ヲ舉テ法則ヲ立タル也吾輩ノ術
拙ヲシリ得ザルノミニハナク實ニマキラハシ
キ所有リ何故ソト云ニ碍ル所アレハニ世ニ脈
ヲトラザル醫流アルモマギラハシキヲ恐ル、
ナレド甚非也日月蝕ノ測量ハ密合スレド陰雨
ナレバ證ヲ取ニ道ナキカ如シ病者ノ碍ル所有
テアラヌ脈ヲアラハスハチカラナシマギルレ
ハマキル、ヲ多ク視覺テラシクルミテ大標的

トナレリ凡脉學ハ鈞船ノ船頭ノヨク岩根ヲシ
リ風雨ヲシルガ如ク人々ニシテ各自ヲ得ル術
之心ヲ用ルヲ久シクシテレバ智愚トモニ其術ヲ得
サルナシ

舌候

舌ハ外邪ヲ治スル第一ノ標的也表裏陰陽ヲサ
シカニ辨ズベキハ舌ニシクナシ舌ト脉ト現
證ト二便トヲ合テ勘考スレバ多クハ誤ルナ
シ大略白胎黃胎褐胎黑胎灰色芒刺乾燥ナリ表
症ハ胎ナシ表證ニシテ胎有ハ發表ニテ病盡ズ

トスサレド頭痛惡風發熱等ノ證具ラバ發表ス
レド表證除テ邪解セズ傳經スベキヲ初ヨリ心
得ベシ裏症ニテ胎ナク平常ナルハ寒也若脉症
實熱ナレドモ舌上平常ナラバ邪胃中ニアラス
トス温疫ノ舌ニ胎ナキモノ多シ胃中ニ邪ナキ
エヘナリ沉重ニ至ルマデ胎ナキ者アリ黃白胎
有リ芒刺有ハ半表半裏トス黒胎乾燥ハ裏症也
舌胎ノ厚キヲ陽症トス芒刺赤色モ皆實熱也黒
胎舌根ニ至リテ益厚ハ大黃ノ證也乾燥ノ舌ニ
見分難キ證多シ初學大ニ心ヲ用ヘキ處ナリ胎

由香刀

九

厚クシテ乾燥スルハ石膏ニアラザレバ解セズ
藥方ハ時ニ臨テ相當アルベク後條ニ散見スス
ベテ陽症ノ舌ハ胎有テ乾燥ス胎ナクテ乾燥シ
舌ノ肌理細密ニナリテ薄紙ノ如ク皮ナキカ如
ク甚キハ黒燥或班點胡麻ヲ散カ如ク乾燥シ大
渴水ヲ好ム者モ胎ナキハ陰症ニ畢竟ノトコロ
胎有テ乾燥スルハ陽症ニ胎ナクテ乾燥スルハ
陰證也
舌ノ兩傍ウルホヒ中心黄黒胎乾燥スルハ寒也
コレ又一種也純陰ハ稀也陽毒ヲ少ク帶タルニ

アリ詳ニ後條ニ散見ス
舌ノ黒ク燥クヲ世ニ火氣盛ニシテ鍋ノ底ノ水
氣盡テ黒ク焦ゲツキタルガゴトシトセリ思ニ
陽症トテモ火氣ノニニテ熱湯ノ如シ陰症ハ走
陽ニテ無根ノ火也皆炭火ノ如クナルニハ非ス
黒ク焦ルハ一有ヘカラズ凡津唾ニ子バリ有ハ
皆穀氣ナルベシ舌胎ハ舌ニ含ム穀氣ノ熱ニヨ
リテ舌上ノ細孔ヨリ口キ溢シテ舌上ニ着クナ
ルベシ津唾モ熱氣ニテ粘着スルナルヘシ其色
ヲ變スルハ舌ニ含ム血ノ共ニ舌上ノ細孔ヨリ

由香切

出ルニ混和シテ黒色ヲナスナルベシ一人温疫
ヲ患フ古ト齒齲ヨリ血出ツ多キ時ハ床蓐ニ流
ル少キ時ハ舌ト齲トニ乾キ着テ全ク墨ノ如シ
予此病人ヲ見テ初テ血ト穀氣ト和スル時ハ黒
色ヲナス事ヲシレリ又大便ニ糞ト血ト和スレ
ハ皆黒シ黄モ褐モ皆血ノ色ノ淺深ナルヘシ其
乾燥スルハ舌上ノ細孔閉塞シテ津液ヲ運漕
セザルナルベシ陰證ノ胎ナキハ陽氣散走シテ
舌本空虚ニナリ穀氣湧溢ノイキホヒナキナル
ベシ初學コレヲシラズ大熱毒舌ノ内炭火ノ如

神醫秘

十

ク水盡テ黒ツコゲツキタリト思ヒテ陰陽ヲ詳
ニセズ大料ノ峻劑ヲ施テ人ヲ誤ルハ多シ凡ヤ
ケドヲシタル人其ヤケタル處イマタ黒ク焦ル
ニ至ラスシテ身先ツ死ス豈附子石膏ノ力ヲカ
リタル湯液ヲ吞テ黒ミ去リ潤出テ其アト爛レ
ズ痛マズ傷痕ナキノ理アラシヤ萬ニ鍋ノ底ノ
焦ツキテ黒ク成タル比ニアラス又ヤケトノ類
ニアラズ一老醫陽症ノ胎有テ黒燥スルニ十味
人參散ニ竹葉石膏湯ヲ合シ每貼一錢煨石膏五
厘或ハ二三厘ヲ入用タルニ黒燥退クハ一周時

由醫切

七

ヲ待ス予モ此方ヲ用テシバ効アリ見ルベシ
胃中和シ津液通ル時ハ舌上ノ細孔開キ血メク
リテ滑澤ニ及コトヲ又芒刺ヲ生ルコトハ細孔ノ
閉ル時怒脹スルナルベシ人々ニヨリテ差アル
ニテ治療ニハ差アルマヅ灰色ハ陰症トス胎ハ
アレドモ乾燥ヒズ生氣ナキガ如シ舌上冷ルモ
アリ又灰色ノ厚胎アリテ乾燥スルハ陽證ニテ
尤沉重ノ症也後條ニ出セル陰陽兩感病ナルベ
キカ未タ定説ヲ得ズ此症ノ末ニ腐爛ノ魚腸ノ
如ク便シ膿汁ヲ便シテ救ハレサル有リ邪血分ニ入

故血液舌中ニメグラズシテ黑胎ニナラザルガ
陰症ノ灰色トハ一等別段也

汗候

傷寒發汗ノ法麻黃湯桂枝湯ノ標的ハ人ノシル
所也正傷寒稀ニテ今ノ外感ハ温疫多クレハ發
汗ノ法ニモ心アルベシ瘟疫ノ初テ身ニ入ルハ
發汗ニテ解スベシサレド發散ノ期ヲ待タズ強
テ汗ヲ發スレバ汗出テモ邪解セズ種々轉變ス
ルアリ渾々熱アリテ汗出ヘキ期アルヲマテテ
發スヘシ邪汗ニ随テ解ス又時月久シク沉伏シ

シル疫邪ノ發動スルニ夕トヘ惡風頭痛アリテ
モ脉沉審ナルハ發汗スベカラズ其邪ノ表ニ達
スルヲ待テ發汗スベシ表症アラバ發表ノ藥ヲ
與ヘテ自然ノ發汗ヲ待ニヨロシ此ノ如キハ多
ク盜汗ニテ解ス盜汗ヲ吉地トス若シ氣虛表脱
ナド、ニテ補氣固表ヲ事トスレハ沉重ニモ至
ル也又時疫初テ愈テ後ノ盜汗モ皆解汗ニテ餘
邪ノ表ヨリ洩ル、ナレハ當歸六黃湯ノ類禁忌
ナルベシ差後盜汗アル人ハ再發再、發ナドノ
虞ナシスベテ解汗ハ表症ニカキルニアラズ小

柴胡湯ノ的中シテ大汗シテ解スルハ藥ニ發表
ノ功アルナレバ勿論ナレド大柴胡湯白扁湯承
氣湯モ機ニ投ズレバ發汗ス真武湯四逆湯ハ猶
サテニテ必大汗ヲ以的當トス皆和汗也諸病發
汗ヲ得テ解スルハメテタキ一也又中濕ノ汗ハ
大ニ發表ヲ禁ズ水道ヲ利シテ解ス詳ナルハ
後ノ濕温ノ下ニ出
麻黃湯桂枝湯ヲ時疫ニ用レバ害アル一有り葛
根湯モ同ジ此故ニ麻黃桂枝ヲ去テ升麻ニ換升
麻葛根湯原名升麻湯ヲ制セシハ深ク温疫ノ機

由齊切

十一

ラシリタルナリ予シバク用ルニ實ニ疫邪發表
ノ聖藥ト云ベリ桂麻ハ忌ム所ト云ベシ寒ニ傷
ラレタルニ非レバ也其外不換金正氣散藿香正
氣散八解散香蘇散十神湯參蘇飲人參敗毒散神
授太乙散等選用スベシ此ノ如ク種々ノ藥方ヲ
立タルハ症ヲ按シテ設メルニハナク諸家ノ治
驗ヲ輯録セシナレバ時々合タルヲ選テ用スベ
シ近來ノ疫ニハ升麻葛根湯葛根葱白湯神授太
乙散ヲ輕重ニ通ジテ用タリ若ク汗ヲ取ル一早ク
表開キ汗出レドモ邪ハ内ニ止リテ解セズ表症

ナホ在ルハ再ビ藥ヲ與ヘ溫覆薰蒸シ大汗ヲ得
レバ邪盡テ汗自ラ止ル也惡風頭痛アリ吐舌ニ
胎有口苦ク渴有ナドセバ大發汗ハ十スベカラ
ズ病必除カズ

大便候

大便ノ候古法則ヲ守テ標的トス故ニ詳説ニ及
バス後條ニ散見ス燥屎アル症ヲヨク察スベシ
傷寒論中ニ著明也燥屎ヲ腹診ニテシルハ古方
家ヲ勝レリトス或ハ心下陷テ堅硬板ノ如キハ
燥矢アリ外邪ノミナラズ勞瘵骨立ノ者ニ多シ

燥去レハ諸症解ス古方家ニツキテ問ベシ
傷寒温疫ノ下利ハ裏實多シ後條ノ兩感病ニモ
多シ下痢ニ心ヲ留メズ症ニ從テ治ヲ施シテ下
利ハ自止ム也但醫下利ヲ以テ虚候トスルハ非
也陰症ノ脉浮大無根ニハ下利ハ稀也純陰ノ症
ニテ走陽ナレバ也其下利有ハ危症也又陰症ニ
陽毒ヲ帶サル者ニ下利有若又直中ノ中寒ハ下
利脉沉細或ハ絶脉ナルハ陽氣ノ沉伏スレバ也
是ニテ浮陽ノ下利稀ナルヲ理會スベシ
今ノ古方家脉ヲ取ラズ腹診ヲ精クス亦一家

言也サレドマギル、一アルハ脉ヨリモ甚シ
是故ニ腹診ノミヲ標的トスレバ誤治多シ

小便候

小便赤澁短小ハ裏實也清利ハ陰症也又五苓散
猪苓湯ノ症ニ小便不利トノミアリテ詳細十ヲ
近來濕温流行ヲ以テルニ大抵五苓散ノ症ニ
ハ頻數淋痛短少ナルモノ多ク猪苓湯ノ症ニハ
頻數ノ者稀也一日夜二行或ハ一行二日一行也
不利ナル有リ或ハ行ゴトニ二合三合ヲ利スル
モアリスベテ淋澁ノモノ稀也又小便閉ハ濕温

ノ小便遠キニ異ナリ小腹堅滿コレヲ按スレバ
痛テ通氣アリ熱閉ノ者ハ導赤散氣閉ハ通氣湯
ニ宜シ

導赤散 治面赤唇乾口渴錢氏方治麻疹既出謔

語小便閉者萬病回春

生地黄 木通 各等分 甘草 同 竹葉七片

水煎

陳白明通氣湯 治氣閉婦人良方

紫蘇 陳皮 枳壳 木通 水煎

又陰病小便閉ノ者有其標的ハ前條ノ症候ニテ

定ムベシ

虛火炎上ヲ辨ス

陰症ノ全ク實熱ノ候ヲ見スヲ虛火炎上トイヘ
ト炎上スル子細ハ陰旺シテ元陽ノ根本ヲ奪ル
故陽氣皮表ニ散走シテ全ク火症ヲ現ス也尤危
篤也虛火炎上トイヒテモ通スルナレド元陽ノ
散走スルト見ルトハ療治ノ上ニ差別アリ虛火
炎上ト心得レバ真武湯四逆湯ハ用カタク虚火
ノアシラヒモ有タキ心有り陶氏ノ益元湯龔氏
ノ復元湯有テ輕症ハ治スレド救陽ノ主方真武

湯四逆湯ノ意ヲバ失ヒタリト云ベシ陰陽兩感
病ナドニハ相當ナレド其ガタメニ處シタル藥
ニテハナシ陰旺シ陽散走トタシカニ心得レバ
急ニ陽ヲ救ニチカラヲ入ル、故真武湯四逆湯
ノ大料モオソレナク施スベクモトヨリ碍ル所
ナシ此所ニ迷有レバ大事ヲ誤ル故丁寧ヲ盡セ
リ其候火症ヲ現トイヘド何カニツキテ無根ノ
候有上下唇及前板齒黒燥スレド舌ウルホヒ舌
黒燥スレド胎ナシ脈浮大ナレドモ根ナシ謔語
ニ似タレド鄭聲ニシテ語音ニ根ナシ仰臥手ヲ

又シテ昏々タレド精神爽ハズ熱ニ犯サル、者
ニ似ズ食量減ゼズ或ハ食ヲ欲セサルモ共ニ口
苦カラズ小便水利シテ喜テ睡ル大渴水ヲ好ム
モ有世ニ陰症ハ熱湯ヲ好ムトイヘルハ非也飲
ミモノ、冷熱ニテ陰陽ヲ定ムルハ理ヲ推テ論
ゼシニテ病者ニ參シタル論ニマラズ或ハ發斑
粧か如ク狂躁悶亂スルナド皆實熱ニヒトシイ
カニトナレバ走陽ニテ一身ノ火皆表ニ在レバ
也虛火炎上トハ云ベカラズ病候烈キホト舌ト
脈トニ純陰ノ候歷々トメマガフナシ附子劑

由唇カ

七

ヲ得テ解スル状ハ先ツ舌ニテシルベシ舌乾燥
ウルホヒ黄黒色去リテ平常ノ如シ又汗ニテシ
ルベシ藥ヲ得テ熱瞞シ汗出テ流ル、ガ如ク鼻
上ト口吻ニ最モ甚シキハ解汗也脈遲緩ニテ煩
躁鄭聲止テ精神明了也初學陰症ヲヨク見覺レ
ハ陽症自ラ明白也先此陽ニマギル、陰症ヲ詳
ニシリコレニ反スルヲ陽症トシルベシ一躰ノ
見タル所モ陽症ハ何トナク充實シタル所有リ
陰症ハ虚脱シタル所アリ病者ヲ多ク見レハ明
白ナル者也初學病人ヲ診察シ勇猛決斷ヲナス

ニ臨テ猶亦丁寧反覆スベシ一七ヲ誤レバ性命
ヲ喪フヲナレバ慎ニ慎ヲ重ヌベシ
右ハ傷寒傳經ノ陰陽分別ノカタハシヲ云リ
温疫ヲ治スルニ經ニ傳レバ全ク傷寒ノ治ニ
從フ故先ツ此數條ヲ出セリ

温疫轉變ノ記

寶曆ノ末年ヨリ今寛政ニ至ルマテ三四十年来
江戸ノ病人ヲ見ルニ正傷寒ハ稀ニテ四時共ニ
多クハ温疫也温疫ハ戾氣ナレバ正傷寒ノ第一
種ナルノ比ニハアラズ種類品々也此故ニ只一

疔ヲ知得タリトテ盡セリトハ言カダシ予寶曆
 丑寅ノ頃世四五歳ノ時ヨリ專ラ治療ニ苦ミシ
 カ明和中マテ十二三年ノ後時行一變シ寛政ノ
 始ニ至リテ又一變セリスベテ時ノ流行ヲヨク
 シリ得ズハ測ラザル變ニ逢テ狼狽スルヲ多カ
 ルベシ予巖工ナリトイヘド犬馬ノ齡幸ニ八九
 ノ年ヲ積テコレマデノ流行ヲ考ルニ變轉トハ
 イヘド今ノ流行今ニ始ルニモ非ス四十年來ヨ
 リ有キタリタレド其治ヲ得サルユヘ徒ニスク
 シタル也一般流行トイヘト種々ノ病證イツト

テモ交リオレリ其内ニサマデ誤治之由オモハ
 スシテ沉重ニ至ルハ見シラザル一種ノ疔ナル
 ベシ願クハ予か志ヲ嗣テ温疫ノ種類吾輩ノシ
 ラザルヲ治シ得ルヲアラバコレニ續テ救世ノ
 術ヲ弘メタマヘカシ

疹疫ノ事蹟

寛保ノ頃ナベカブリトイヘルハヤリ風有テ死
 亡甚多カリキ予八歳ノ時此病ニ罹レリ快復ノ
 比ノ事ノミウスニ覺タリ眉ヨリ上腦後髮際ニ
 至ルマデ黒色ニナリテ鍋ヲ冠リタル如シ色深

キ者ハ多クハ救ガタシ予モヤ、正黒ニ近カリ
シヨシ既ニ解スルノ後其色ウスク残りテ其黒
疔ニ小疹出テ少シ水泡有テカシケタリト覺タ
リ其後似タル者モナシ今考ルニ寶曆明和ノ頃
水痘ノ類ノ水痘ニモアラズ又一種ノ發疹一般
ニ流行セシト有其發前全ク温疫ニテ未タ疹ヲ
發セズシテ救ハザル者ハ醫モ疹序ナルヲ知ラ
ズ時疫トノミオモヒテスマシタルト多シ辛ク
シテ死ヲ免ル、時惣身ニ疹ヲ發セリ發セル後
ハ事ナクシテ平安也此疹發セ子バ多クハ救カ

クシ救得レバオツカレトカレ發疹セザルハナ
シ水痘ノ如ク少シ水泡有モアリナキモ有人々
ニシテ少ツ、差別有小大顆粒ト、ノフラハル
疹ニテサノミ稠密ニモアラザリシ私ニ名ツケ
テ疹疫トイヘリ鍋冠モ此類ノ毒フカキ物カト
オモハル其以來一切見及バヌ時疫也此症ノ治
方ハ全ク時疫ノ法ニテ別ニ手覺ノヲモナシ予
其頃ハワキテ疎漏ナリケレバ的方モ定メカ子
タリ時有テ經ニ傳テ陽症モ陰症モ現ハセリ盛
熱ノ内ニ發疹スルハ即チ解シテ平安ナリ升麻

油番切

七

葛根湯ナド應ゼリスベテ葛根芍藥ノ類ヨク應
ズ傳經ニ至レバ經ニ從テ治ヲナセリ天明ノ頃
ハ此症ハアラスレド葛根葱白湯ナド諸症ニ通
メ相當セリ麻黃桂枝ノ症ナキユヘ本方葛根湯
ハ却テ切ヲナシガツシ正傷寒ナラヌ温疫ナル
故ナルベシ其頃ノ脚氣腫衝心ニモ葛根葱白湯
ナドニテ切ヲ成セリ皆是時行ノ氣ニ感シテ熱
病ニモ脚氣腫ニモ變スレハ也時行ノ疹ヲ發ス
ルニ予一説有リ其略ニ云
近來流行疫ノ病後ニ疹ヲ發セルハ痘麻ノ如

キ一種ノ疹ナルベシ千金方ニ小兒十蒸八變
シテ人トナルトタイヘリ其狀痘序ノ如シト
見ユ是レ隋ヨリ唐ニ及テノト也ワレヨリ漸
漸ニ痘瘡世ニ行ハル續テ麻疹世ニ出テ水痘
モ世ニ出タリ此ヲ以テ觀ルニ痘麻ノ世ニ出
ベキ根基ハ上古ヨリ具足セルナルベシサテ
今ノ小兒ニ變蒸アルトナシキエボトリト訓
ズレド變蒸ニ似タル者ヲ見ズ思ニ痘麻世ニ
出ベキ漸ニ變蒸アリ痘麻世ニ出テ流行ノ疫
氣ニ感シテ一生一次ニ胎毒ヲ發洩シ盡ス故

ニ變蒸ナキナルベシ近來ノ疹疫モ亦一種ノ痘麻ノ如キ者世ニ出ベキ漸ナラン痘麻ノ世ニ出ベキ根基ハ既ニ上古ニ具セリサテ傷寒論傳經ノ次第必期ノ如クナルト見ユルニ今ノ傷寒ハユレニ夕ガヒテ日期ナシカクイヘバ牽強ニ近ケレド私ニ案ズルニ痘疹ハ十二日ヲ期トセルニ未タ世ニ出ス變蒸トテモ十キ頃ノ傷寒ヲ病ム人ハ身中ニ暗ニ此日期ヲ具スルユヘニ今ノ傷寒ト夕ガヒタルナランカハ丈島ナドノ痘アラザル所ノ傷寒ハ日期

アルカ詳悉ニシリタル上ニテ此説ヲ立ベキトト心中ニ貯ルヲ久シ下畧鍋カブリノハヤリシハ元文寛保ノ初也其後此症ナク寶曆明和ノ初ニ流行セシ疹疫モ鍋冠ノ類ニテ畢竟ハ發疹ノ序熱ニテ麻疹ノ序ノ日數多キモノニ其以來當年ニ至ルマテ此症ナシ又近年ニ流行スベキナレバ豫メ此説ニ及ベリ心ヲ用テ其流行ヲ知覺スベシ

時疫初得及傳經ノ説

時疫ノ人ヲ病シムルハ感ジテ即病ムアリ時月

久シク潜伏シテ時有テ發動スル有リ發動スレ
 ドモ經ニ傳ヘザルウチハ熱ニモ寒ニモ化セズ
 脉沉ナラズ浮ナラズ肌熱不食或ハ絶食ニ至リ
 或煩躁或潮熱發渴小水赤澁大便秘シ或ハ溏シ
 昏々譫語シ氣急促迫心下痞悶舌上薄胎ヲ生ズ
 ルアリ胎十キモアリ俚醫証テ傷寒トシテ妄ニ
 麻黄桂枝大小紫胡ナドヲ施シ効ナキノニナラ
 ス無辜ノ經ヲウゴカシ荏苒沉重シ其毒胸中ニ
 入レバ癰ノ状ノ如ク左手牽彎シ昏憤斲睡シ人
 事ヲ省セズ湯藥咽ニ下ラズ強テ灌ケハ口角ヨ

リ流レ術計畫テ死スイマタ此ノ如クナラザル
 モ變出百端シテスクヒガタキニ至ルハ妄ニ傷
 寒ノ治ヲ施ニ誤リ經ニ傳ズシテ危篤ニ至ル状
 此ノ如也予モイマタ達セズトイヘド初ヨリ此
 心得ニテ輕劑ノ發表宜達達原等ノ藥ニテ深ク
 沉ニ伏シタル邪ヲ浮動セシメテ經ニ傳レテ
 要シイマタ寒熱ノ化ヲ經ザルト見定メテ治ヲ
 ナセリ其ウチ熱毒深ハ解熱ニテ治スレドサモ
 ナキハ手ヲ下シガタシ既ニ經ニ傳レバ陰陽共
 ニ病々者多シ傷寒ニ合病併病兩感病ノ差別有

リ此例ニハ比シガタケレド先ヅハ兩感ノ類ナ
ルベキ元來疫毒深キ故陰經ニ入ルベキモ陽部
ニ毒ヲ止テ少シク陰候ヲ顯シ又既ニ陰症トナ
リテモ陽症全ク除カサルナルベキニヤ是ヲ治
スルノ大意ハ兩感トハイヘド必輕重有テ陰症
陽症ノ分別有ルナレバ陽症ニ陰候ヲ帶ルハコ
トサラニ温劑ヲ施シテ純陽ニナスベクタトヘ
バ陽症ナレド虛ヲ帶テ脉ノタルム所ニテ補中
益氣湯ナドヲ用ル一四五貼其病激シテ純陽ニ
化スレバ多ク陽明ノ症トナル也石膏劑大黃劑

ニテ解スモシ傳テ陰症トナレバ附子劑ニテ解
セリ參芪ハ禁ズベキヲ沉伏ノ邪ノ經ニ出ルハ
陰陽共ニ病ム故其重キ方ニ集メントスル也此
手段ニモカギラズ經ニ傳ヘテ陽症ニ定レバ正
傷寒傳經ノ例ニテ治スル也此症ノ陰ニ傳ルモ
些シ計リノ陽症ヲ帶ルハコトサラニ清冷劑ヲ
用テ純陰ニ變ゼシメントス若シ純陰トナラサ
ルモ陽症ノ盡ルヲ待ガタキ急有故速ニ治スル
也其狀異同ハアレド大略舌ニ胎有テ乾燥シ脉
浮沉ノ中ニテ陰陽ヲワケガタク小便利スレド

由膏カ

上カ

赤ク或ハ澀リ喜テ睡リ或ハ口苦ク或ハ口苦カ
ラズ譫語アリテ精神爽ハズ或ハ渴アリ或ハ渴
セズ或ハ大便溏ス真武湯四逆湯ヲ用レバ藥未
ク徹セズシテ古軋燥煩躁氣急ナスベカラス急
ニ解熱ヲナセドモ藥毒陽毒相アハセテ遂ニ救
カタシ此等ノ症ニ生料四物湯ニ附子大黃ヲ加
ヘ用レバ碍リナクノ解ス或ハ益元湯復元湯ナ
ドモヤ、用ユベシサレド附子大黃生地黃ヲマ
サレリトス若或ハ陽分ニ餘邪アル時ハ或ハ大
半解シテ小半解セズ舌ワルホヒテ又胎ヲ生ジ

軋燥スルノ周時ヲマタズ發熱譫語脈狀緊數全
ク陽症ヲ現スアリ醫硝黃石膏ヲ用レバ再ビ陰
ニ傳ヘ脱汗危篤ニ至ル急ニ附子劑ヲ用テ救得
ルモ再ヒ陽ニ出ツ此ノ如ク重テ困シ又困スレ
バ遂ニ救カタキニ至ル也是治瘴急ニ過ル故也
初メ陰症ノ解スル時餘邪陽候ヲ現スハ兩感病
ノ常ナレバ過テリトセズ附子ノ力ニテ餘邪ヲ
鼓動シテ分外ノ病状ヲ發ルトモ二三日ニテ危
篤ニ及ブ理ナキヲナレバ或ハ生料四物湯或ハ
逍遙散ナド其外輕劑ニテ血ヲ潤シテ見アハス

ベシニ三日ニテ解スル有モシ解セヌハ陽症ニ
 定マール之其後心シヅカニ症ニ随テ治ヲ施スベ
 シ再ビ陰ニ入ラスレテ解ス十味人參散六書散
 火湯加味逍遙散イツレモ生地黃ヲ加工用或ハ
 犀角地黄湯ナド選用セリ凡附子ヲ用テソムカ
 ガレド全ク解セズ續テ陽症ヲ現ハ多クハ一時
 血ノ乾クヨリ出ルニテ正陽ノ症ニハアラス此
 故ニ諸藥ニ生地黃ヲ加用セルニ利アリスベテ
 純陽ノ症ニ誤テ附子ヲ用テ惡症ヲ發スルニ生
 料四物湯ニテ即チ解ス前醫ノ誤治ノ後ナドニ

シバニ用テ奇驗アリ或ハ黃連黑豆或ハ硝黃石
 膏ナドニテ急ニ藥毒ヲ解シ熱毒ヲ制セントス
 レバ救ガタキニ至ル也元來附子邪陽ヲ夕スケ
 テ暴厲ノ威直ニ陰ヲ克スル故危篤ニ及ナレバ
 急ニ陰ヲ救ヘバ妙ニ其機ニ投ゼリ傷寒論ノ治
 例ニアラストイヘド初學疑ヲ交ヘズ此法ニヨ
 ルベシ是愚者ノ一得也凡陰陽兩感ハ先哲難治
 トセリシカルニ今ノ時疫ノ傳經ハ多ク如此十
 レハ止ムヲ得ズク必ク心ヲ用テ拙キ法
 方ヲ設テ一時ニ備フル也寶曆ノ末ヨリ近來マ

テノ事實也近來少シク得ル所有リ是マテノ非
ヲ知テ大ニ悔ル取アリ後條ヲ見テ知ベシ

濕温治驗

寶曆ノ末年東都ニ大疫アリ其症自汗壯熱煩渴
小便頻數淋痛短少大便或ハ秘シ或ハ溏甚者ハ
頭眩嘔逆譫語脉浮緩ナリ類案ニ羅子ノ說ヲ引
テ云風濕ト名必ク傷寒ニアラズトアリテ五苓
散ヲ主トセリ此說ニ從ヒ五苓散ヲ煎湯トナシ
典ヘテ人ヲ救フ一多シ若シ脉ニ根ナク舌胎ナ
ク乾燥スルハ本方ニ附子ヲ加テ愈此治方ヲシ

ラズ十數日ヲフレバ前ニシルセシ兩感ノ症ト
ナリテ沉重ニ至レリ此症脉ヲ標的トセリシカ
ルニ類案ニ脉ヲシルサズ闕タリトイフベシ又
症同クシテ小水遠ク脉緊數ナル者ハ五苓散應
セズ往々壞病トナリ又兩感ノ症トナレリ羅子
風濕トハイヘドモ概シテ濕温ト云ベシ此症五
苓散ノ症ノ流行ノ内ニマナリテ其治ヲ得カリ
キ明和中ニ至リテ五苓散ノ症マレナリ脉緊數
ノ症マ、アリテ有來リノ温疫ニ雜リテ流行セ
リ寛政辛丑夏一婦人壯熱昏憤譫語煩躁自汗小

由曆切

七二

便不利一日夜只一行脉緊數十予思フニ猪苓湯ハ自汗ニハ禁ズレド大陽病ニ非レバ用ベシトテ是ヲ與フ四五日ニシテ諸症大半ヲ減ズ服スルヲ四十餘日ニシテ愈是ヨリ得ル所有テ猪苓湯ヲ主トス其後多クミルニ猪苓湯ノ症ニハ小便遠クノミニテ汗ナキモ有五苓散ノ症ニハ必汗アリ麻黄湯桂枝湯ノ分別ノ如ク又陰陽ノ分別アリ共ニ濕温ニテ脉ヲ以テカテリ此理ヲ知サレバ人ヲ誤ルベシ其以來此症流行セリ深秋ヨリ冬ニ至リテ發シ春ニ及モ有リ汗アリ小

便不利脉緊數ヲ標的トス一人汗ナク大頭痛大惡風小便不利也醫發表ヲナシ又大柴胡大青龍ヲ與ヘテ効ナシ猪苓湯ヲ用ル一一周時ヲ待タズ頭痛惡風除キ諸症皆減ズ數十日ニメ愈又此症ニ發癩スルアリ或ハ呼吸促迫上竄直視口喎流汗人事ヲ省ヤザル者或歷節疼痛腫熱熱ノ者アリ其外人ニシテ小異同アレド濕温ノ症ナレバ此一方ニシテ解スユレヲ用ニ法アリ事ナクシテ一方ニテ解スルアリ中間脉浮緩ニナリテ五苓散ニ轉スル有又舌胎有テ乾燥スル有

由香切

七

本方ニテ守レハ自ラ潤フ若乾燥甚シク燥渴ス
ルハ石膏少許ヲ加ヘ一二日舌潤ヘバ又單方ヲ
用ヒ時トシテ汗止小水ヤ、シゲク經ニ傳ル有
其見症ニ隨テ治ヲ施セリ此症ニ血ヲ動スノ機
アリ吐衄下血ノ人十ニ七八也皆此湯ニテ愈若
吐下血甚シク狂ノ如ハ桃核承氣湯ヲ與ルアリ
漸次陰症ニ入ルモアリ其外經ニ傳ルノ諸症ハ
ソレ々ノ藥ヲ用諸症退テ又自汗小便不利ナル
時復猪苓湯ヲ投ス此機關ヲ失フベカラズ畢竟
ハ猪苓湯ヲ地ニシテ經ニ傳ルヲ待テ投ル藥ハ

全ク傷寒ノ治例也諸症退ケバ又猪苓湯ニテ調
理ニ至ル人ニヨリテ猪苓湯ヲ惡ムアリ予思テ
一方ヲ處ス匡正ト名ク
匡正方 蒼朮 厚朴 陳皮 半夏 猪苓
澤瀉 茯苓 當歸 甘草 生姜水煎
此湯ヲ此症ノ地ニモ病後ノ調理ニモ用發表ノ
藥ヲ加ル時ハ利水ノ功ナキカタトオモヘリ
今ヲ以テ思ニ此病ナラヌ時疫モ時有テ經ニ傳
ヘ藥的當シテ其症除ケモ毒解ヒズ又經ヲ離レ
テ其原所ニ潛ル丁アルハ皆同シカルベシ猪苓

湯ノ症ハ自汗小便不利ニナル故明白ナリ其外ノ症ハアヲハニ見エサル故ニ古人モ知覺セズ我輩モ心ツカハリキ今此症ニ此機關有ラレリテ大ニ發明セリコレヨリ此症ナラヌ時疫ヲ療ズルニ傳經ノ症退キ復原所ニ潜ル機ヲ知テ大ニチカラヲ得タリ

此症差テ後再感再々感ノ如キ者アリ其状壯熱惡風頭痛或ハ寒熱往來シ大發汗シ或ハ下利シ或ハ咳嗽シ或ハ嘔逆シナトニテ小便不利也本方ヲ用テ平安ニ至レリ初ハ再感ト思ヒシニ數

十人ニ及テ案ヲ拍テ云ツコレ再感ニアラズ元來潜伏ノ邪半ハ發シ半ハ發セサルガ先ニ發ル所解スレド繼テ發スル故再々ニ及也ト定メテリ此濕温ニ限ラズ從來時疫ヲ患ル人毎々再感再々感有ハ多クハ此例ニテ伏邪ノ漸ヲ以發洩スル也世醫再感ト云フヲ通言トシ病者ノ不慎ヲ責ムレド餘邪ノ追々ニ出ルト云フハ吳子ノ說モ有テ珍ラシカラ子ド此症ニ充多シ餘邪ノ殘レル故ニヤ此症輕キトテモ平復ニ至ルニハ數十日ノ工夫ヲ費セリ食後勞復トテモ餘邪ノ

潜伏セル人ニ多カルヘキニヤ
此症俚醫ノ誤治ヲ歴テ寒熱ノ化ニ口タラズ壞
病沉重ニ至ルモ小水不利ナル者ハ本方ニテ愈
ユ一醫濕温ヲ患フ日ヲ經テ嘔逆寒熱往來ニ吐
血禁セズ柴胡四物湯ニテ其症除キ汗出テ小水
不利ニナリタルニ猪苓湯ヲ與シニ病者竊ニ附
子劑ヲ服シテ大下血狂躁舌黒燥スルトキ桃核
承氣湯ヲ用テ症除テ又自汗小水不利ニナリテ復
本方ヲ與ヘテ漸ニ調理ニ至ルニ病者マタ竊ニ
歸脾湯ヲ用伏邪ノマカノコレルニ補充ニ逢テ

毒秘シテ倦怠ノ状ヲナセバ大虛トシテ大劑ノ
參芪桂附ヲ服シテ死ススベテ此症解シテ未ホ
トナキニ參芪ヲ用レバ必再發シテ危篤ニ及者
アマタコレハ伏邪有テ補充スルニ誤レリ一
人濕温ヲ得テ十數日汗ナク昏々痴ノ如ク衄血
禁ゼザル一數日脉緩ニシテ力有小水一周時一
行舌胎ナク乾燥シ縮テ齒外ニ出デス醫ハジメ
ヨリ小柴胡ニ出入シテ與ヘ真武湯ニ轉ゼシト
擬ス予其舌根ヲ察スルニ厚胎根本ニ及テ益厚
ク乾燥セリ猪苓湯ニ石膏末ニ厘許ヲ加ヘ服セ

シムル一二日舌潤ヒテ石膏ヲ去リ單方ニテ十
五日ニシテ解シテ解後疫臭病ノ盛ル時ヨリ倍
セリ因テ思ニ伏邪未ク盡ズシテ漸ク皮表ニ發
洩スル之此人必再發ノ患アルマジトス果シテ
再發ナク三十日ニシテ愈其他差後疫臭ヲ發ス
ル者甚多シ皆再發ナシ此機ヲシラズ參芪ヲ服
スル者死セサルヲ得ズ孫真人ノ下後補藥ヲ
得テ熱氣溲成トイヘルモ此理也前条ニシルセ
シ傳經ノ症退ケバ復原所ニ潜ルハ其巢穴ノ守
兵ニ合スルナルベシ吳子ハコレヲ指シテ募原

ニ舍ルトイヘト予未ダ其然ルヤ否ヲシラス唯
原取トイヘリ
前ニ論セシ兩感ノ如キ症ハ瘟疫ノ治ヲ失ヒタ
ル壞病ナルヘシ前ヨリノ流行ヲツクノ思ニ
猪苓湯ノ症近年ノ盛ナルニハ似サレト昔ヨリ
有リ来リシガ心ツカガリシ之ヲノ外ニモ利水
ノ症甚多カリキ因テオモフニ時疫ハ多ク春末
ヨリ秋初マデノ濕熱ニ感シ潜伏シテ深秋ニ發
シ冬ニ發シ春ニモ及ベリヒトリ人身ニ伏スル
ノミナラズ暑濕ノ毒天地間ニ潜伏シテ秋冬ニ

及テコレニ感シテ即病ムモ同症ナルヘシサレ
ト身中ニ潜伏スルコトフカキ故再發再々發ニモ
及ナレバ春夏ノ頃ヨリ身中ニ伏スル者尤多キ
ナルベシコレヲ以テ推ニ一切ノ温疫ニ表症ハ
表ヨリ解シ裏症ハツレツレノ解法ヲ施セシカ
潜伏ノ邪ノ治法ニイマ夕正當ヲ得ヌ唯寒熱ノ
化ニアツカラザルト心付タルヲ大取得ニテ傳
經ヲ待テ治セシトセシハアヤマレルカナノ
時疫ノ傳經ニ至ルハ壞病ノ類ナリ發表解毒ノ
症ナキハ利水ニシクハナシ頭痛惡風脈浮ナラ

サルハ小水ヲ利シテ退クニ此法ヲ得テヨリ陰
陽兩感トナラズニテ解セリ俚醫ノ誤治ヲ歴タ
ル上ハゼヒナク前ニイヒシ兩感ノ治法ニヨレ
リサレド此節ノ疫濕温ナラヌハ稀ナレバ唯三
五人ヲ試タルバカリクコレモ濕温ノ氣ニ感ス
ル故ニ利水ニ功有シニヤ多ク試テサタムヘシ
前ニイヒシ寒熱ノ化ニ與ラザルニハ年來苦シ
ミシ所々濕温ナラヌ時疫モ解毒ト云ヘバ利水
ニシクハナカルベシ古人モ此心アリテ柴苓湯
アリ竊ニ按スルニ少陽ノ症ナキニ柴胡湯ハ中

ラバ膏ニ切ナキノニナラズコレヨリ壞病ニモ
ヲモムリノスベテ無辜ノ經ヲ動スハ大ニ恐ル
ベキト之因テ思フニ痘疹モ亦疫ナリ其解毒皆
利水ニテ解スルニテミルベシ今化毒湯ヲ處之
テ吳子ノ達原飲ノ用所ニ充ツ

化毒湯 治下瘟疫在身肌熱沉昏四肢倦怠或咳嗽
或嘔吐心下痞鞭氣息急促不思飲食小水赤澀

脈緊弦末屬寒熱之化者

- 葛花 澤瀉 茯苓 鼠粘子 連翹
- 荆芥 防風 甘草 當歸 芍藥

水煎

此藥ヲ用ヒテ傳經ニ及バズシテ解スベシ前ニ
イヒシ疹疫ニモ專用タルベシ既ニ傳經ニ至リ
タトヘバ小柴胡ノ症具リテ小柴胡湯ヲ用ヒ症
退キテ病解セガハハ經ヲ離レテ原野ニ潜ル
此湯ナドニテ觀望スベキクイマタ多ク用試
ス唯此一方ヲ處シテ豫ノ他日ヲ俟ノ
今ノ醫觀望ノ時ハ皆小柴胡湯ヲ用オレリ唐山
モ皆如此ニトミヘテ活人書ニモ近時多ク行小柴
胡湯傷寒家皆令服之因成陰症者甚多仲景雖云

傷寒有柴胡證但見一證便是不必悉具此為是少陽證當服小柴胡不必少陽症悉具耳トイヘリ經ニナキ邪ニ用レバ陰症ニハナラズシテ壞病沉重ニ及者甚多シ其害陰病ニナルヨリ甚シ今日用テ明日變ゼサル故醫モ病家モシラガレド此觀望ノ間ニ生死ノ機アリ小柴胡湯ハ少陽病ノ主方ニテ其功神ノ如シニ夕リニ用ベキモノニ非ズ初學オモフベシ疫邪初得苦頭痛大渴惡熱壯熱ノ者ヲ治ス發表ノ方

葛根葱白湯 活人書

葛根

芍藥

知母

葱白

川芎

生姜

頭痛如破者ニハ

今豆豉ヲ加フ

疫邪初得ノ者ニ此湯ヲ服セシムレバ大汗出テ即時ニ解ス天明ノ初年ノ頃此藥大ニ功ヲ収ム風毒脚氣ニテ手足麻痺痿弱氣息急迫咳嗽シ踏マリテ仰クトヲ能クセズ小水不利面目四肢胸腹皆脹危篤ニ近キニ此湯ニ豆豉ヲ加入シテ愈又中風半身不隨言語錯亂ノ者モ愈其外諸病ニ通シテ功有シ寛政以來其症稀ニテ此藥ノ功モ少

由香刀

七

近來ハ脚氣腫モ衝心モ猪苓湯ニテ治スル者
多シ是亦時行ノ轉變ヲ觀ベシ今コレヲシルシ
テ子弟ニ示ス之此以來モ轉變ニ從ヒテ増加ス
ベシ
近來ノ濕温ノ頭痛ハ巔頂ニ在テ眉稜骨ヨリ眼
睛ニ連レリ皆猪苓湯ニ宜シ一時急ニ頭痛ヲ除
クニハ後方ニ宜シ

硫黃圓本沉存中方出本事方治頭痛

硫黃ニ兩

硝石一作二兩本州

水圓如指頭大空

心膈茶嚼下暑喝懣胃者氷冷水服下咽即豁然

清莖

予此方ヲ用テ持病ノ頭痛ヲ治ス糊丸麻子大五
十九ツ々用
大頭痛眼睛ニ連ル者ニ風眼有リ心ヲツクベシ
風眼ノ頭痛ハ眼睛ノ痛甚レク引テ頭上ニ及ホ
シテ耳鳴雷ノ如シ世醫多ク防風通聖散ナトヲ
用テ眼睛透裂シテ明ヲ喪ヒ重者ハ死セリ可憐
ノ至ク直中ノ寒邪頭ニ入テ如此ナルニ麻黃附
子細辛湯ニ宜シ輕キ者ハ五積散ニ附子細辛ヲ
加ヘテヨシ脈ト症ト二便トヲ詳ニ考ヘ合ス時

由香刀

七

ハ附子ノ症タルト明カニ初學風眼ハ熱毒トノ
 ミ心得テ脉ヲモ二便ヲモ不問急ニ大解毒ヲナ
 セリ風眼屬熱モ有ベシ予ハ未見畢竟外感ノ部
 類ナレバ葉ノツイテニ書ヲケリ

温疫論ハヨク讀ベキ書ニ傷寒ノ書古今ノ説論
 ハヨク識得ベシコレニクテケレバ傷寒ノ理ニ
 クラエ傷寒ノ理ニクテケレバ温疫ノ療治ハナ
 ラヌ之其内呉子ノ温疫論ハ古今ニ卓越シテ大
 ニ見解ヲ開クモノ之サレド三四十年來ノ流行
 ヲ以テ考ルニ温疫論ニ正當ノ症ヲミズ當時流行

ノ温疫千百人トモ必承氣湯ノ症ニナリテ解ス
 ルトニエタリ今ノ世ノ時疫ニ承氣湯ノ症ニナ
 ルハ百ニ一ツ也又陰症世間罕有トイヘドモ今
 ノ時疫陰症ニナリテ附子ヲ得テ解スル症十ガ
 九也近來濕温流行シテ陰症ヤ、マレ也トイヘ
 ド傷寒傳經ノ治ヲナシ或ハ種々雜療ニ誤ル、
 時ハカノ兩感ノ状ニナリテ陰症ニ傳ルト多シ
 此故ニ達原飲三消飲三承氣湯三養榮湯ヲ以テ
 治セントスレドモ施スベキ所ナク近來ノ流行
 ニ合ハザレバ此治方モ今ハ舊曆トナレリ

按スルニ達原飲ハ予弱冠ノ頃ヨリ數ニ試テ
頗ル治驗ヲ得タリ近來ハ相當ノ症マレナリ
今ヲ以テミルニ其頃ノ症ハ黃芩芍藥第一ニ
功ヲナセリ吳子ノ趣向ハ瘡論ノ募原ニ連ル
トイヘルヨリ理ヲ推テ瘡ノ要藥厚朴枳榔草
菓ヲ主トセシト見ユ予瘡說有テ募原ノ說ハ
信ゼズ此三藥ヲモ瘡ヲ治ルニ用ホレバコレ
ヲカリテ温疫ヲ治スルニ意ナシ

濕温名目

活人書ニ濕温不可表也
西一脛逆冷胞腹滿頭目痛
苦多汗者濕温也

汗發者名曰重喝如死若醫
殺之得宜桂附湯白虎加蒼朮湯
活人ノ說カクノ如クニ方ヲ以テ見ルニ陰陽ニ
症有ト見ユ其說簡畧ニテ取用ヒガタシ近來ノ
流行ヲ濕温ト定メシハ予カ家言ノ也普通ノ
名目ニハ非ズ吳子濕温ノ名ヲ出シテ治方ナシ
即温病夾外感之魚疔トセリ是亦近來ノ流行ニ
ハタカヒタリ
活人書ニ若傷寒引飲下焦有熱小便不通脉浮緩
者五苓散脉沉者猪苓湯也コノ說ナド予ガ論セ
シ今ノ流行ニ略相當セリ其說詳細ナラズ此說

バカリニテハ治ヲ施シカタシスベテ活人書ハ
温疫ト云名ハ出シタレド大方傷寒トイヘリ傷
寒論ノ文例ニ倣ヒタルトニユ六書モ亦如此六
書ハ多ク紙上ノ道理ヲ推シテ論說ヲナシタル
者ト見ユ温疫ヲ正シクシワケタルハ呉子ヲマ
サレリトスベシ
石膏ヲ用ル_一ハ人々ニシテ夕カヒ有古方ハ碁
子大ニシテ縮ニ包煮ト有藥氣ノミニテ質有_一
ナクコレヲマサレリトス今ノ人細末ニメ用又
病家ノオクルニ因テ色ヲカヘテ用ル人モ有

煨シテ用ルモアリイグレ細末ニテ用レト害有
_一モナシ細末ハ多ク用ルニ及ハス一貼五厘或
ハ二三厘ヲ用テ功アリ必シモ大料ヲ事トスル
ニアラズ予弱冠ノコロ病局ニ在テ數百人ヲ療
ゼシ時煨石膏生石膏ヲ用ヒ試レニ煨トテモ寒
性減ゼズ熱毒ヲ解スル力ハ生ヨリモスルドナ
レド誤治スル時ハ救カタキ_一モ有滋潤ト發表
ノ切ウスキカトニユ本草ニ近_言人_言因其性_言寒_言火_言煨_言
過_言用_言トアリ此說ニヨリタルトニユレド元末空
理ヲ推タルノミナルベシ生ナルヲ大ニマサレ

由下カ

七

リトス
 凡治療ハ高キ山ニ登ルカ如シ山ニ登ル道ハ四
 方八方ニ在テイツレヨリノボリテモ千カキ遠
 ノ差別ハアレドヒトシク絶頂ニ到ルベシ我カ
 覺タル道ヨリ外ニ登ルベキ方ナシトスルハ非
 ナリ醫モカクノ如クニチオノレニ種々ノ手
 覺アリテ治シ得ハヒトツク内傷雜病ニ最モ多
 シ式部卿法印ハ天下ノ大醫ニテ榮名今モ減セ
 ス附子キラヒニテ一代用ヒスサレド其大醫タ
 ルニ害ナシ予治蹟ヲ見シニ傷寒陰症痘瘡灌膿

ノ脱症ナド附子ヲ用ル症ハ皆死亡セリ侍醫輩
 ヒフカニ附子ヲ用テ救得ルヲ多カリシホノタ
 ルヲニハナケレド人々ニシテタカヒアルヲ如
 此若吾得タル道ノ外ニ正路アリトシラバ速ニ
 改メテソレニ就テ學グベシ
 此書ヲ以治療ノ用ニ備ントセニハ傷寒論ノ
 方ヲ始トシテ誰モシリタル古今ノ藥方主治ト
 モニ盡ク擧ガレバ事足レリトモ予カ意ハコ
 コニアラス初學古法則ニヨリテ治ヲ施スニ臨
 テ予カ如ク誤治ヲ歷テ後悔スルノ間生靈ヲア

ヤマラン一ヲ恐テ其過ヲ著シテ後ヲ警スルノ
微意ナリ喜テ新奇ノ説ヲ出スニハアラズ古法
則ニヨリテ治驗アルハ醫家ノ常ナレバ何ソ重
複ニ云ヒスベキ唯時ニ臨テ少ク得ル所有テ書
シルンテ子弟ニ傳ルナレ新奇ヲ好ムノ誦リヲ
イカニスベキ
寛政丁巳春二月

救瘟袖曆初編終

救瘟袖曆 二編 嗣出

文化十三年丙子三月

東都書林

浅草南馬道町

栗村半藏

