



門 楨 〇
號 274
卷

試善兒茶性撰要目錄

軟化劑

純糖粉滑藥

西刺比亞護謨

亞○月舍劑別

粘骨油類藥

亞麻仁 甘扁桃

殼粉類藥

燕麥 大麥

傑列乙類藥

蛋清類藥

家猪脂 酪

亞广子油

收飲酸

硫磺

○月凡私

○机東氏意方

○二味護謨散

○西刺比亞護謨藥

○月舍劑別

○粘骨油類藥

○亞麻仁

○殼粉類藥

○燕麥

○傑列乙類藥

○蛋清類藥

○家猪脂

○亞广子油

○收飲酸

○硫磺

○月凡私

○机東氏意方



達刺侃焉護謨 ○亞兒的

棋植核

沙列布

扁桃乳

扁桃大皮乳

裸麥

小麥

沙吳木

亞兒魯

阿列機油

甘扁桃油

海塩酸

蘇魯林

明卷

金卷肥

蘇魯林

蘇魯林

蘇魯林

蘇魯林

蘇魯林

○慈烏利尔度水
○若把尔膏
○晏石列广室煎水
○结番更曹陀
○阿仙药
○阿仙药
○刺皮尼
○木醋
○膜
○胃
○粘

○阿仙药
○阿仙药
○刺皮尼
○木醋
○膜
○胃
○粘

○香窟收欽藥

○玫瑰花
○水楊梅根
○撒尔菲画

○若味以欽解熱藥

○水楊皮
○七葉樹皮
○加酸煎

○保国強壯藥

○鐵月屑
○越復屋斯布末兒秩劑
○拾碌屈斯末兒秩劑
○撒尔

○木兒秩斯
○收欽鉄液
○棋植加鉄了幾劑
○開達鉄了幾劑
○碩鉄

○單苦味

○健負更那
○復方了幾劑
○月舍利劑

○拾失画
○月了幾
○珊葛里
○月了

○脛菜
○月了幾劑
○拾編僕
○月了幾劑

○粘滑苦味

○依蘭苦

○鹹性苦味
○葛兒儒
○月了幾劑
○紫堇
○新鮮絞汁
○蒲公英
○月了幾劑
○广尔羅歇

○傑尼私陀
○失枯列乙
○月了幾劑
○牛胆

○香窟苦味

○魚尔蘇
○水
○抗更哥
○忽布
○月了幾劑
○律怖力捏
○土

○安伍斯點刺
○月了幾劑
○葛私加栗刺
○月了幾劑
○加密列花

○泥苜根
○橙皮
○月了幾劑
○精

○揮發衝動劑

○薄荷
○茴香
○過泥子
○私握尔過泥
○默栗薩
○月了幾劑
○送迭香

○刺質培尔花
○油
○精
○菩提樹花
○橙花
○舍利別
○丁子
○油

○肉豆蔻
○月了幾劑
○有利
○百屈林
○亞尔尼加
○白芷
○胡椒
○必百力捏

○草澄茄
○百亭兒
○香椒
○姜
○沙羅葡
○碎米著

山俞菜

黑芥子

○失苟尔倍若舍利别○月昆設尔弗○舍利别

○鎮痙剂

芸香

艾

結草

○丁幾

阿魏

○丁幾

膏

護謨尼

○月哥魯加胃奴膏

○丁幾

琥珀

○月油

加耶布的油

實百尔油

○月油

○月油

○月油

麝香

○月哥魯加胃奴膏

○丁幾

琥珀

○月油

加耶布的油

實百尔油

○月油

○月油

○月油

亞的兒

○月哥魯加胃奴膏

○丁幾

琥珀

○月油

加耶布的油

實百尔油

○月油

○月油

○月油

硝砂精

○月哥魯加胃奴膏

○丁幾

琥珀

○月油

加耶布的油

實百尔油

○月油

○月油

○月油

○月華

○華精

○加燒酒精

○硝砂加過泥子精

○月揮發精

○月揮發精

○月揮發精

○月揮發精

○月揮發精

○月揮發精

阿芙蓉

○麻醉剂

○舍電華謨阿芙蓉液

○月膏

○托歇尔私汗散

○托歇尔私汗散

○托歇尔私汗散

○托歇尔私汗散

○托歇尔私汗散

○托歇尔私汗散

○莫尔比捏

○醋酸莫尔比捏舍利别

○硫酸莫尔比捏舍利别

○硫酸莫尔比捏舍利别

○硫酸莫尔比捏舍利别

○硫酸莫尔比捏舍利别

○硫酸莫尔比捏舍利别

○硫酸莫尔比捏舍利别

○硫酸莫尔比捏舍利别

○硫酸莫尔比捏舍利别

底里谷

○菲沃失

○新發汁

○番木鱉

○月利馬

○老利尼

○結尔私

○雙

○雙

○雙

羅華

○失鳩谷

○新發汁

○番木鱉

○月利馬

○老利尼

○結尔私

○雙

○雙

○雙

實艾

○青酸

○月利馬

○老利尼

○結尔私

○雙

○雙

○雙

○雙

○雙

烟草

麥奴

羅實侃私

○丁幾

○解凝剂

○疏利解凝藥

食塩

海水

海塩泉

酒石葉

○晶

硝砂

硝砂

○稀狀解凝藥

固性亞尔加里

剝馬亞私

酒石塩

○驅熱鎮吐飲

炭酸剝馬亞私

炭酸剝馬亞私

炭酸剝馬亞私

炭酸剝馬亞私

炭酸剝馬亞私

炭酸剝馬亞私

炭酸剝馬亞私

炭酸剝馬亞私

○調多私列尔石酸膏

膏

○硫肝

○月的列並油

○泥澱硫黃

○硫水素酸

硫黃泉

硫黃泉

硫黃泉

硫黃泉

硫黃泉

硫黃泉

○硫黃更固兒

水銀

○華涅滿溶汞散

○赤降汞

○越復屋布私密涅刺

○越復屋布私密涅刺

○越復屋布私密涅刺

○越復屋布私密涅刺

○越復屋布私密涅刺

○越復屋布私密涅刺

○越復屋布私密涅刺

○越復屋布私密涅刺

○含汞酒石剝馬亞私

○升汞

○普洛多乙阿就列

○公母協度

○羅尔棠

○羅尔棠

○羅尔棠

○羅尔棠

○羅尔棠

○羅尔棠

○羅尔棠

○羅尔棠

○水銀膏

○消酸汞膏

○赤降汞膏

○護謨規吉儿

○亞括八括的

○亞括八括的

○亞括八括的

○亞括八括的

○亞括八括的

○亞括八括的

○亞括八括的

○亞括八括的

○刺戟解凝藥

塩酸金塩

安慎摸担

○月酒

吐酒石

金硫黃

○結兒茂私密刺列

○結兒茂私密刺列

○結兒茂私密刺列

○結兒茂私密刺列

○結兒茂私密刺列

○結兒茂私密刺列

○結兒茂私密刺列

○舍硫加尔幾

安慎摸担

○月酒

吐酒石

金硫黃

○結兒茂私密刺列

○結兒茂私密刺列

○結兒茂私密刺列

○結兒茂私密刺列

○結兒茂私密刺列

○結兒茂私密刺列

○結兒茂私密刺列

木炭 加尔剥亚扭广里 沃实涅 〇月丁几剂 〇澈度里至抱私剥葛
更私 〇月膏 〇瓦乌私葛 澈度里屋抱去谟软膏 〇乙沃实列去母
普哩 〇普哩多乙沃列去谟澈度里 〇德乌多乙沃实列去母
度里 〇普哩多乙沃列去谟澈度里 〇德乌多乙沃实列去母
〇因壮解凝藻 塩酸重去塩酸加尔几

〇吐剂

吐根 〇吐根酒 〇月舍利别 〇月几 〇越默知涅 〇越默知圆 吐酒石
〇月膏 安贞母尼酒 瞻磐 皓磐

〇下剂

〇清凉下泄藥 荅广林度 阿波勒 〇梅肉膏 〇泻利煉膏 芒硝 霸王塩
泻利塩 純精酒石 孕酸酒石 〇酒石酸 剥葛亚私曹達
〇煇酸曹達
〇緩性下泄藥 淌那 蜂蜜 〇屋施茂兒

〇強壯下泄藥

大黃 〇月丁幾 〇水製丁幾 〇酒製丁幾 〇舍利别
峻下泄藥

海那 〇月舍利别 〇泻利煉膏 〇複方丁幾 〇軒能西私泻利水 〇葛答
〇盧蒼 〇月丁幾 〇核方丁幾 〇水製及キス 〇哥西更儿 〇健比儿
〇卢胆 〇驅虫膏 藥刺巴 〇華尔私 拾碌董葛 〇月丁幾
墨列僕里 藤黄 蕪甘母扭 瓦刺扶阿刺 巴豆油 加印加根
〇水製及キス 落葉松茸

〇發汗剂

温湯 蒸氣浴 接骨木 〇舍利别 〇花水 加蜜列 山午茅根
癒瘡木 癒瘡木脂 〇月揮在于幾 〇丁幾 薩沙布羅私 沙兒
波哩兒羅 〇識多广尼撒尔沙煎 土茯苓 攝尔扁太里更
鞞布羅 麝香 硫黄 安贞母扭製剂 挖布尔私 汗散
双蘭菊 砒砂 酒石葉 驅熱鎮吐飲 氏理列精 固
洋芹 〇月子水 〇画的兒油 海葱 〇月醋 〇月酒 〇護謨海葱膏

海葱醋蜜 ○五子丸 ○海葱丸 格兒失屈誤 ○月酒 ○月醋蜜
○實丁幾 ○實酒 杜松實 ○月實油 ○板方 ○月實傑列乙實美若
利私 稠箇葉 加印加 木賊 拔尔撒誤霍汗骨 草澄茄
拔尔撒誤加奈若的列並底那 ○月硬軟二膏 鷲掌爪拔尔撒誤
的列並底那油 荒菁 ○月丁幾 孕硼酒石 塩酸金塩
更斯亨尔及私 越幾私及舍利別 拔尔治若葉 白魯羅葉
因石腦油 因地膽

○通經劑

護謨安母尼亞殘 若綸膏 護謨海葱膏 阿魏 瓦尔枚

奴誤 芦會 茂藥 丁幾 越幾斯 芸香 薩昆那 油

薄荷 加密列花 墨利僕利 丁幾 越幾斯 墨列僕利茂藥

九 硼砂 麥奴

○祛痰劑

甘草 ○月越幾斯 精製甘中膏 乳糖 乳清 點失刺猴

日新絞汁 哈列阿普失私 伊里私那魯楞底那 遠志

魯弊哩那應布羅 若葉 丁幾 百尔蘭独苗 茂藥 獲謨安母

尼亞幾 安息香卷 ○圖 無花果

○殺虫劑

攝綿失那 月亞的兒製越幾斯 太那設點謨 油 綿馬

日油 鷓鴣菜 傑腦弗魯伊 油 石榴根皮 大蒜

的列並底那油 加斃尔填油 名 スロペリア

○劑酸劑

石灰 ○月水 結番土 喇玷石 广屈涅失亞 曹達泉

碳酸泉

○清涼劑

水 水醋 水 杓櫛汁 舍利別 栗毫子 酸模 醋

莖餽醋 醇精醋 酒石酸 硼酸 消石

○引赤發泡腐蝕劑

芥子 山芥菜 瑞香 皮膏 荒菁

○腐蝕藥

鑛酸 枯岩 刺必斯加烏蟄屈私 硝酸銀 安旗没尼酪

砒石 月液

硫黄泉 ○鑛泉 ○浴湯
 剛鐵泉 炭酸曹達泉 硫酸曹達泉 苦塩泉
 海塩泉 海水 人工鑛泉 蒸気浴

家篤児薬性撰要目錄終

家篤児薬性撰要

和蘭 敏任家篤児 著
 小倉 甘河普勒歇 校神
 林 強洞海 譯稿

○軟化劑
マキカメシタ。レキラビシチア
 フルステンベンテミツテレン
 キユミアラビヤユム。キユミ
 ミモサ。セウ。アカキア。羅
 純粋粘滑薬

○亜刺比亜護謨
キユミアラビヤユム。キユミ
 ミモサ。セウ。アカキア。羅
 嗽衝声嘔疔毒ノ侵刺等ニ由テ発スル呼吸器ノ諸病粘液剥脱疔物酸
 敗液軟膜毒嗽衝等ニ由テ発スル胃及ヒ諸臓ノ痙攣痛ヲ治ス○劇製ノ
 泄瀉及ヒ痢病ニ用ヒテ連々下利ヲ止メテ其度ヲ減シ裡急後重ヲ鎮メ
 ○眼嗽衝唇吻乳房ノ剥脱等ハ亜刺比亜護謨漿ヲ外敷シ輕症ノ出血
 ハ粉末トシテ用ユ○散トメ一又ヨリ二分至テ頻服ス護謨一分ヲ以テ水一盃ニ溶
 化シ半時或ハ小半時毎ニ一食ヒツラフ○護謨加胸鏡ハ祛痰劑トシテ用方
 元本ニ見ユ○固ヘルハスク山緩和止痛愈ノ効アリ又ハ痺止痛ノ効アルニ林

ナリスノ実験スル所ニ入下利ヲ止ル効アリ此葉ニ号ヲ取リ水三升ニ煮テニ此ト為レ一時半毎ニ四号ヅ、与フ

○逆刺侃為護謨 ギユムミタララカント羅

効用重刺比重ニ同レ胃痛及ビ急急ヨリ發スル疝痛ニ用テ緊要トス○水ニ溶レ用フ水二十倍ヲ以テ之ヲ溶レ一茶匕ヲ服ス

○重尔的亞 ヘームスト羅

泄瀉痢病疝痛等ヲ治ス又小便不利若クハ閉塞粘液膜ノ嗽衝呼吸器及ヒ泌尿器ニ分布セル粘液膜ノ嗽衝ニ効アリ○粘滑葉中此根尤モ軟化包根ノ力多シトス咽喉嗽衝肺及ビ気管ノ聖京偃咳嗽嘶啞肺嗽衝咽喉粗糙眼嗽衝ノ初期等ニ多ク此劑ヲ採用ス○煎劑ニハ一号ヨリニ号至ラ以テ煎メ六号或ハ十二号ノ液ヲ取リ半時毎ニ一匕ヲ服ス

○錦葵 コルハニ

性効殆ント過尔太亞ニ同シ多用ニ供ス○内服劑ニハ半号ヨリニ号ニ至ル煎メ六号十号ノ液ヲ取ル

○沙列布

諸般ノ勞瘵呼吸器ノ聖京偃咳嗽泄瀉痢病膜ノ裡面ノ粘液剥脱骨ノ

潰瘍膜内諸臟ノ嗽衝疝痛等ニ用ヒテ良効アリ○末一分ヲ八号ノ熱湯入レ予ヲ休メス攪拌メ十分溶解飽熟スルニ至ル○半時若クハ一時毎ニ一食匕ヲ与フ

○檳榔核 クエツヒテン蘭 微シク收斂ス

唇吻破裂乳房剥脱其化凡テ外皮脱剥及ヒ瘡口瘡ニ用フ殊ニ眼嗽衝ニ聖眼水トシ用テ効アリ○水八倍ヲ以テ稠厚粘液トシ用フ

○粘滑油質葉

○重广仁 レンサード蘭

腸ノ嗽衝急急疝小便不利及ヒ閉塞石淋等ニ奇効アリ○搗爛シ或ハ粉トシ緩和ノ琶布或ハ蒸漏劑トシ用フ○煎劑ハ半号ヨリ一号至煎メ九号若クハ十二号トナス

○甘扁桃 スーラアマンデレン

過敏ノ感動ヲ鎮靜セント要スルノ諸病ニ緊急必用ノ葉劑トス荒菁瞑眩ニ由テ奈ムル尿管ノ諸病其他小便不利痲疾石淋等ニ用ヒテ妙ナリ○熱病下利ヲ兼ル者胸ノ聖京偃咳等ヲ治ス○拾遺 若扁桃代用杏仁患液ヲ淨刷シ能ク解ク又粘痰ヲ疎詰シ小便ヲ利ス脾病胸膈痛ヲ治レ経閉

取 油 煎

ヲ通シ塵滯ヲ駆除ス

○穀粉類菜

第一燕麦 ハール 第二大麦 ゲルスト 第三裸麦 ルオ 第四小麦 イト 第五砂兵米 サフゴオ
○大凡此類種ハ煎汁ハ勞瘵ニ嬰ル者ニ滋養ノ良料トシ用テ殊ニ骨蒸熱ヲ兼瘵スル者ニ良効アリ○胸腹諸器ニ瘵スル瘵寧性焮衝性ノ諸病腸ノ利脱及ヒ粘液脱失等ニ用ヒテ瘵寧焮衝ヲ軟和弛緩シ酷厉毒ヲ包攝ス

○麦粉劑

喘息勞瘵精神虚憊ノ人及ヒ小兒ノ羸瘦病ニ良効アリ

○傑列乙須菜

殊ニ滋養ノ効アリ故ニ熱病ノ患者胃腸ノ感心動敏疾吐下利腹痛ヲ瘵スル者ニ偉効アリ○暴瀉若クハ失血大過ニ係テ精力虚憊セル者ニ要菜ニ

○脂油類菜

○家猪脂 ハルケン
○酪 ポートル

兩種共ニ大率軟硬ニ膏ヲ製スルニ用テ殊ニ酪ハ眼膏ヲ製スベシ又能ク鉉毒仙ヲ預防ス

○蜜蠟

更衣ノ度ヲ減却スル性アリ故ニ脂油粘稠ノ者ヲ加ヘテ泄瀉窘迫痢勞瘵病ノ衰耗下利ヲ瘵スル者等ニ十ハヨリ二十ハ迄内服スルコトニ數次

○脂油ノ植物ニ出ル者

○阿列穢油 オレイン
内臓ノ瘵寧疼痛ヲ止ム故ニ胃瘵寧急症鉉毒疰冒及ヒ諸臓ノ焮衝小便不利及ヒ閉塞ヲ緩解シ膽腎膀胱ノ結石痛ヲ鎮靜ス又或ハ劇製ノ兒枕痛ヲ寬解ス○寧急咳ノ瘵飲咯出シ難キ者痛急ノ瘵寧ニ由テ起ル者吐血ノ瘵寧ノ瘵ヲ兼ル者ニ用テ○殺虫ノ効アリ故ニ蛔ノ擾動滯滯増進ヲ抑制テ瘵スル症ニ用ヒテ奇効アリ○痛風ニ其法阿列穢油ニ号若クハ三号ヲ以テ飲服セシメ又之ヲ患部ニ搽ス○内服ニハ一号ヨリ半号四号至テ取リ草味或ハ粘滑藥ヲ加ヘ用テ

○甘扁桃油

主治効能用法阿列穢油ト同シ○一号若クハ一号ヲ粘滑菜四分八号ニ和シ

一七〇、用フ

○重广子油 リリンオー

下利ヲ劑トシ用ヒテ 腸ノ位置ヲ失スル者 タルムコロンケン ヲ 治ス又外用トシ用フ ○一斗ヨリ二斗ニ至ル

○鹿广子油 オールドホム 俗名トフマ

緩和下劑ノ効アリ 故ニ内臓ノ痲衝ニ由リ若クハ痲痺ノ縮迫ニ由テ発スル便秘ヲ治ス又知毒痲疔吐瀉痲病ヲ捕探良俛屈ヲ治ス又殺虫劑トシ用ユ ○一分ヨリ二斗ニ至ラ單服シ或ハ粘稠ニテ加ヘ用フ ○皮ハ刺戟ノ効アリ

○収斂酸性止血防腐劑

○硫酸 スワーフル レニール 固單收瀉茶收瀉藥尤居多

純硫ハ能ク外敷メ疣贅及ヒ息肉ヲ消除シ又眼瞼外及睫毛倒生等ニ塗擦メ其部ノ弛緩ヲ收斂ス ○稀硫酸ハ外敷メ能ク惡性ノ腐敗瘍ノ惡臭ヲ去リ含嗽劑トメ惡性ノ咽喉痲衝口中ノ失苟兒陪苦病ヲ療ス ○稀硫酸一斗ヨリ一斗ニ至ラ以テ粘物煎汁六斗或ハ十二斗ニ和シ一食匕ヲ与フ ○収斂性的兒ハ二十滴ヨリ四十滴至ラ單用シ或ハ一斗ヨリ漸々倍加メ多量ニ至ル者ヲ以テ水液六斗ヨリ十二斗ニ至リ和シ腹ス主治本條ニ同シ ○越采失尔 モリス 葛立沃利 ハハ 六十

滴ヨリ三十滴至水或ハ適宜ノ導液ニ加フ日ニ二三次稀硫酸ノ的症ニ用ヒテ良

○固血石 ブルト 性收瀉閉澀シ乾燥ス諸失血吐血止ルニ速ニ効アリ白

帶下下利萎黃病經閉ヲ治スルコトゴロクスマルテト同シ其性甚タ鉄ニ近ク

質モ亦鉄礦ノ一種トス服量末トシ十五斗ヨリ一斗迄適宜ノ飲液ニ点服ス ○

○消酸 サルベール 固單收瀉

水多量ヲ加ヘテ之稀薄シ腐敗性ノ病ニ與ヘテ清涼防腐ノ良藥トス又大

量ニ用ヒテ利尿ノ効アリ 故ニ水脹ヲ長服メ發スル水腫ニ用ヒテ殊効アリ

○此酸ヲ以テ病院ヲ薰蒸シ陳敗氣ヲ清楚スル法アリ之ヲ斯密葛ノ薰

法トシテ疹赤班熱等ノ如キ呼吸器ニ關係スル諸病ニ於テ最モ抗東氏ノ方

法方ニ優レリトス ○半斗ヨリ二斗至水液二十四斗ニ和シ毎食一食匕ヲ服ス但

シ利尿ノ効ヲ要スルハ十滴ヨリ三十滴至水液四斗ニ淋滴シ服ス ○外敷メ疣

贅息肉及ヒ痛風ニ發スル結節腫ヲ消シ洗劑トメ汚穢ノ瘍及ヒ腐骨

疽ヲ清潔トス

○海塩酸 固單收斂

主治消石酸ニ同シ殊ニ百日効ノ初期ニ大効アリ ○塩酸一分ヲ合スル者半

性益所腐

分ヨリ一分至適宜ノ飲液ニ和シ服ス

○蕪魯林 ホクロリン 因草收瀉 即ケアロリンホシ

悪性ノ赤班熱腐敗熱慢性下利痛風等ニ用ヒテ効アリ ○蕪魯林瓦斯ハ大気陳敗メ得深毒ヲ含ム者ヲ清甦シ腐穢物ヲ淨潔ス乃チ杓東氏ノ薑油方ヲ以テ證スベシ

○蕪魯林曹達 同上

經驗歴試ニモ夥シ元本ヲ参考スベシ大凡水腫寒脱疽失音兒倍若咽喉焮衝疥癬等ニハ欠ク可カラサル要薬タリ ○約ノ之ヲ言ハハ唯悪性腐敗ノ諸病ニ用フルノモ ○十五滴ヨリ三十滴至ラ水一杯ニ和シ服ス

○蕪魯林加爾幾 カールヒルリン 同上

不正気及ヒ傳染毒ヲ擯排ス

○明礬 アリウミン 同上

収斂ノ性アリ故ニ慢性慢性ノ諸病凝体弛緩或ハ諸液將ニ溶崩セトスル者ニ多量ニ与フレハ溶崩ヲ結聚ス腐敗熱或ハ神經熱ニ至スル脱汗虚性ノ失血衰耗下利等ニモ亦良驗アリ ○止血ノ聖薬トス故ニ諸散ノ失血殊ニ崩漏ニ用ヒテ太ク妙ナリ ○腸ノ衰弱緩緩ヨリ至ル慢性ノ泄利ニ

○粘滑薬 カヘ鉛毒症ニハ阿芙蓉ヲ伍用ス ○含漱射注洗滌諸劑トシ

弓知ノ衰弱弛緩ヲ収斂強壯ス故ニ粘液性ノ咽喉焮腫懸壅壅ノ弛緩脱肛脱脰脱子宮白帶下腐敗瘻ノ潰瘍ニ纖維ノ弛緩ヲ兼タル者慢性ノ眼焮衝等ニ良ナリ ○散劑若クハ溶液トナス太約五ハヨリ十ハ至一時毎ニ用フ多量ニ用フレハ胃ヲ害シ吐下ヲ発ス ○明礬ハ泄下ノ功アル故ニ下利ノ症ニハ効少シ

○粘岩 ヘブラシド

散トシ塗擦レテ金瘡潰瘍ノ息肉ヲ消シ又糖ト伍用シテ角膜ノ班点ヲ消スル等皆外用ニ供スルベシ

○鉛糖 カドソイ 同上 ○酸鉛鉛

腸血下利脱汗等ノ經久頑固ナル者ニ驗アリ ○焮衝熱倭ノ瘻私熱胃腸熱ヨリ發スルハカヘラシドニテ瘻ニ的薬トス ○鉛糖ハ一昼夜ニ用フニ最良トス ○慢性眼焮芙蓉四分ハヨリ二ハ至ラ加ヘテ丸或ハ散トシ用フルヲ最良トス ○慢性眼焮腫ニハ二ハヨリ八ハ至ラ清水ニ溶化シ點眼水トナシ用フ然レバ胆岩水或ハ能岩水ヲ勝レリトス能岩點眼水ノ法元本ニ出ス眼中ニ点滴スルニ日ニ二回

○金密陀 ニウトダ

世所産

頭ハ収斂スルヲ鉛糖ノ如シ而シ弛緩ノ潰瘍湯火傷表皮剥脱等ニ外敷ス
ケル内服ニ供スルヲナシ○薤烏刺尔度水アツクワ火傷剥脱羅斯様ノ焮腫
ニ良効アリ○若把尔骨ハカ創ニ貼ス善ク創口ヲ癒着セシメ潰瘍剥脱ニ
貼メ外氣ノ侵入ヲ防禦ス

○**酸性止腐ノ動物ニ出ル者**
忽斯忽尔酸ボスボール 固单收溜

透徹刺衝ノ性アルニ因テ殊ニ骨痛ヲ良善ニス故テ腐骨疽ニ内外共ニ用フベシ
○五滴ヨリ十滴至水或ハ一分ノ盃杭設兒ニ混和メ一回ニ服ス此ノ如クスルニ日ニ
数回外用ハ一分ヨリ四分ニ至ル

○**酸性止腐ノ植物ニ出ル者**

○**木酸ボール**
外用ニ寒壞疽諸創ノ腫脹ニ変スル者骨膿齒齦破腫ノ寒壞疽ニ変スル
者水痘癩狀ノ癰咽喉焮腫ノ脱疽ニ変スル者等ニ殊効アリ但シ之ヲ用フル法其
部ノ知覚機衰壯ノ度ヲ較計シ或ハ単用シ或ハ多少ノ水液ヲ加フ可シ○昆涅
兒里水止血ノ効アリ

○**結毒重曹陀ケレオ**

峻性ノ止腐薬タルニ因テ又能ク活体ノ汚濁山肌流ヲ制止スルニ極メテ良シ○
結毒重曹陀水ハカ創ノ寒脱疽ニ変スル者孩兒ノ皮膚赤爛スル者及ビ破
爛等ニ外用スルニ可シ○**結毒重曹陀**純者四五滴 糖右ニ呆和シ散ラシメ或ハ糖護
母ヲ加ヘテ丸トシ一日ニ服ス其効能ハ梅毒ノ潰瘍及ビ疣贅等ニ試用メ効ヲ得
又肺癆ニ内服メ奇効アリ○創傷出血ニハ結毒重曹陀水或ハ純結毒重曹陀
ヲ外用ス齧齒痛ニハ先ツ齒ノ陷々ヲ淨潔ニ結毒重曹陀一滴ヲ以テ綿糸ニ滴
シ齧齒ノ陷々ニ充填ス此方頗ル妙ナリ

○**单収斂ノ植物ニ出ル者**

○**櫛皮バト** 固单收溜

弛緩腐敗ノ潰瘍挫傷創傷脱肛脱脛脱子宮白帶下緩緩ノ後疥等ニ
用シ又腐骨疽ニハ粉末トシ脱疽ニハ煎汁トシ用フ○外用ノ煎法ハ一分ヨリ
三分至五分ハ分或ハ十二分トス○**櫛实**ハミケ 瘰癧病殊ニ其ニ傍発スル

○**没食子カハイ** 同上

峻烈ノ収斂薬タルニ由テ多ク内用ニ供セズ但シ解毒ノ為ニ必ズ収斂薬ヲ要
スルハ没食子ヲ用フベシ外用櫛皮ニ同シ○外用ハ半分ヲ取り煎メ十二分

トラス

○阿仙菜 アサキ 同上

窮迫利及ヒ泄瀉ノ内臓衰弱ニ因テ持久スル者白帶下後淋及ヒ小便頻數
ニ効アリ諸部ノ弛緩ニ因テ胃寒ニ在苜トメ解セサル者及ヒ虚性ノ肺血尿血
等ニ効アリ○外用ハ纖維弛緩メ海綿損傷ヲナシ且ツ出血し易キ潰瘍ハ
淨潔シ水銀膜取リ流涎ヲ清メ粘液性ノ緩漫咽喉爛腫口中齒齦等ノ
失為兒倍若ニ感スル者ヲ治ス○散劑十ハヨリ十五ハニ至浸劑ハ二ハヨリテ
侵メ六ハヨリ液ヲ取リ一時毎ニ一七ヲ服ス○外用ハ水浸或ハ酒浸スル者ヲ
以テ含漱洗滌射注諸劑トス○阿仙菜丁幾劑一時半毎ニ二十滴ヨリ
四十滴至テ服ス或ハ一分ヨリ二分至テ茶液六ハヨリ知シ一時毎ニ一七ヲ与フ○阿
仙菜錠アサキ聖京極ノ呼吸器ニ感スル者及ヒ咯血ニ用ヒテ奇驗ヲ奏ス○
阿仙菜昆設尔帛口中失為兒倍若ノ景況アル者ニ賞用ス

○吉納護謨 キナ 同上

虚性ノ失血殊ニ子宮ノ脱血經久下利粘液ノ分泌過度ナル者白帶下後淋
「スレームガラーヘル」等内外共ニ用フベシ○散劑一時若クハ一時半毎ニ十ハヨリ
半分至テ幾劑ハ一分ヨリ二分至テ服法阿仙菜丁幾劑同シ○外用ニ溶化シ用フ

但シ此護謨ハ水ニ溶化シ難シ多ク水底ニ沈ム故ニ亞刺昆虫ヲ加ヘテ溶解ノ力
ヲ扶クベシ

○葛尔綿ゲル 同上 登体ノコトナリ

出血衰耗下利經久泄瀉失為兒倍若瘍等ニ内用シ静脈痛ニ洗滌劑トシ
用フ○散劑半分ヨリ一分至テ煎劑ハ一分ヨリ一分ヲ煎メ十二分或ハ十六分ヲ取リ
一時毎ニ一七ヲ服ス○葛尔綿煎劑丁幾劑一分ヨリ二分至テ主治阿仙菜丁幾
ニ同シ

○拳参 ケンサン 同上 和名イブキトラノヲ

性効葛尔綿煎劑ニ同シ○散劑ハ二時半毎ニ一ハヨリ二ハヨリ或ハ日ニ一ハヨリ三
ハヨリ至テ服ス

○刺連厄 チヂキ 同上

困准木様ノ根保固強壯薬ニ甚ク幾那ニ近シ
但シ幾那ニ比スレハ味佳ク胃ニ停滞セズ虚弱ノ諸症ニ長服メ胃傷ノ消化力
ヲ妨ケズ間歇熱失血亦ニ用ヒテ効力幾那ニ優リ且ツ健胃ノ効殊ニ多ク故ニ
晩近是ヲ以テ幾那ニ代用ス幾那ニ比スレハ効力最峻ナリ凡ツ欬血薬中此ノ
劑ノ如ク過誤ナキ峻効アル者植物中ニ比ス可キ者ナシ

子宮血吐血衄血白帶下等ニ賞用ス○外用ノ經久弛緩ノ潰瘍齒齦ノ失為

叔
單

児倍若く感ふる者、良薬アリ○大約越後和劑半勺ヨリ二勺至香竈ノ精液四勺ヨリ六勺至之溶化し一時毎に一匕ヲ與フ散劑ハ十八二十ハ至月二三次

○強壯解熱劑

香竈収斂茶

○玫瑰花 ローゼン 和名ハマナス

輕症ノ咯血崩漏白帶下脱汗等、煎服し口内或ハ咽喉ノ失苟児倍若慢性ノ粘液咽喉焮腫ニ合劑劑トシ用フ○二勺ヨリ三勺或ハ三勺至テ以テ煎メ六勺或ハ十四勺ヲ取リ服ス○玫瑰花設尔弗 ロスマル ノ主治本條ト同シ一勺ヨリ二勺至○玫瑰蜜 リユム 外用メ失苟児倍若瘍汚穢瘻口瘡粘液咽喉焮腫ノ良薬トス○二勺ヨリ一勺至因玫瑰花水 アラクワ 此物ヲ加ヘテ失苟児倍若ノ齒齦腐爛ニ貼メ良ナリ○玫瑰花水 アラクワ 此物ヲ加ヘテ失苟児倍若ノ氣美好ナルヲ以テ諸茶ニ加用ス因此花清涼ニ収斂ス(玫瑰醋失氣昏冒ニ之レヲ面部ニ撒ケテ省微ス又頭痛ニハ綿布ニヒタシ頭ニ貼メ効アリ玫瑰了錢ハ腐敗熱ヲ治ス良薬トス

○水楊梅根 ナールヘン ナーガルカロイト蘭 ヨルテル ガイコンサリ 俗稱

大病治メ后全軀衰弱ヲ余々者瘰癧病失苟児倍若消食器ノ萎弱及ヒ其萎弱ニ由テ生スル瓜氣膨脹腐液下利等ヲ治ス輕症ノ間歇熱ニ用テ良ナリ○散或ハ煎劑トシ半勺ヨリ一勺至テ以テ煎メ六勺或ハ八勺取ル

○撒尔菲亞 イサリ 圖 鼻中ニ吸入メ喉ニシム外敷メ腐敗ヲ敷メ打撲傷在大咬傷ホリ治ス

瘡癩家脱汗ニ由テ軟著ノ衰弱ヲ致ス者ニ用ヒテ能ク其脱肝ヲ歇ム經久ノ胃寒粘液過泄ヲ兼ル者諸般ノ皮膚表及弛緩ニ由テ連綿トシテ治セザル者ニ用テ良ナリ○合劑劑トメ瘻口瘡齒齦及ヒ口中失苟児倍若若状ニ感スル者ヲ治シ洗滌劑トメ弛緩汚穢潰瘍ヲ治ス○一勺ヲ以テ浸メ六勺或ハ八勺ヲ取リ一匕ツ、與フ

○若味収斂解熱藥

○水楊皮 ハツランサレケ

的症ノ病症ヲ分ツテ八種トス此ニ其大概ヲ挙ク一、間歇熱ニ用フ二、腐敗熱ニ用ユ此根癩癬ニ用ユ四、經年ノ粘液漏泄白帶下後癩等、良ナリ五、瘰癧症ノ胃血痔血崩漏等ニ用ユ六、失苟児倍若若ニ用ユ七、内臟弛弱ニ由テ起ル下利血液腐敗ニ傾ントスル瘻口瘡等ニ用ユ八、外科術ニ管ル諸病其部ノ弛緩ヲ兼依シ来ル者ニ用フ○散或ハ煎劑トシ内外共ニ通用

ス散劑一又ヨリ半分至ラ一時或ハ一時半毎て用フ煎劑ハ一ヨリ四分至ラ
以テ煎メハ分或ハ二十四分ノ液ヲ取リ一時毎一七ヲ与フ○栲皮越後和
劑主治本條ト同シ一又ヨリ一分至五分○撒里失涅的當ノ病症同歌熟ノ患
者有熱間殊ニ発熱ノ后多時血液頭眩、腦凌、頭痛劇烈者身體
弱羸メ自汗淋漓清タル者數回規尼捏ヲ投メ、雖凡其熱頑固コメ効ヲ奏
スルヲ能サル者等共ニ用ヒテ佳ナリ○脈法規尼捏ノ如ク免熱時ニ於テ一時毎
二八或ハ四八ヲ散若クハ溶液トシ用フ又十二八ヨリ二十八更ニ多量ヲ倍シ
孟僂散六分ヲ和シ毎分一七ヲ服ス○粘液癆白帶下胃ノ衰憊又胃
瘕ニハ硝酸「ヒス」ムト「フ」加ヘ用ヒテ効アリ

○七葉樹皮カクタコイ
主治楊皮カクタコイ異ナラズ○散ハ二分ヨリ半分至ル

○烏華烏尔失

泌尿器ノ諸病其曰結石潰瘍及ヒ其部ノ衰弱等ヨリ来ル者ニ用ヒテ良効
アリ又小便失禁遺精其他粘液膜水尿管等ノ衰弱ニ由テ起ル諸病ニ効
アリ○散劑ヲ良トス半又ヨリ一分至ラ用ニル「日」數次浸劑或ハ煎劑ニ分
ヲ以テ煎メ六分ヲ取リ服ス

○幾那ハルヒユマリン

此藥ハハルヒユマリンノ取ル法ヨリ「ハ」ニ同シ
此藥ノ若果ハ鉄ト明答フ「ハ」

第一間歇熱第二替第二替當熱第三羸瘦病第四失血第五慢性神經
病第六惡液瘰癧慢性病第七子宮粘液漏泄第八腸胃衰弱第九外用
大約幾那ヲ用ニル應スル應セサル病證ハ委リ元本ニ見ユ○腐敗熱神經
熱瘰癧瘰癧赤班熱失苟兒陪若瘰癧病水腫鼓脹梅毒白帶下經
久麻○歷欵ニ由テ発明スルノ諸説大病后譬ヘハ熱病瘰癧瘰癧赤班熱
等ノ后発スル瘰癧病ノ如ク之ナリ○胃寒緩慢月ヲ經テ癒ヘス后チ粘液
肺癆ニ陥ラントスルノ候「ハ」或ハ既ニ肺癆トナリ粘膠ニメ膿ノ如ク痰ヲ咯出
スル者○肺癆破潰「日」夥ク惡臭ノ稀痰ヲ咯出スル身體之レカ為ニ羸
瘦シ生カ之レカ為ニ脱衰シ粘瘦骨立「日」一日ヨリモ太キモノ○慢性ノ瘰癧瘰
癧病ニ由テ起ル者ハ其首尾ヲ論セス○瘰癧ニ於テ間々幾那關クヘカラサ
ハ「症候」殊ニ病不ニ至テ口中嚔口瘡ヲ生シ衰耗下劑脱汗ヲ発シ四肢浮
腫シ全軀粘瘦太タシク多ク臭痰ヲ咯出スル者皆コレ幾那ノ標的タリ○血
液山崩生カ脱衰等ノ如ク幾那ヲ除ヒテ後々救治ス可カラサルノ危症アル者
ハ胃腸ノ汚物ニ拘泥スルヲ速ニ緩性刺戟藥下劑等ヲ用スヘシ赭色
幾那ハ黃或ハ赤幾那ニ此スレハ消化ニ易シ強壯ノ効ヲ要スルハ赭色幾那

証候

収斂ノ効ヲ要スルハ赤絨那ヲ勝レリトス○外用ハ諸病纖維ノ衰弱ヲ
兼ル者ハ絨那ノ効驗内用ニ異ナルヲシ故ニ脫疽腐骨疽疔軟腕或ハ經
久疔緩ノ瘡瘍失苟兒倍若湯癩毒瘍及ヒ癰腫ニ奇効アリ○絨那ヲ
用ニヘカラサル微候ニ分メ十件トス元本ニ蓄ナリ○絨那ニ含蓄セル没食
子酸太ク絨那ノ効カシ耗損ス故ニ煨製ニ屈没失更フ但用スルヲアリ詳ニ原
本ニ見ユ○絨那ニ具有セル収斂防腐強壯等ノ質性能ハ規尼捏全ク之レヲ
脱失ス只解熱ノ効ハ絨那皮ニ倍セリ加之小量ニ用ヒテ解熱ノ効顯ル烈ク消
食機衰弱ノ者ニ投メ損害ヲ見ルナシ○絨那末絨那ハ未メ効カズ大
脈量一及ヨリ三及ニ至ル若シ已ムヘカラサルノ故アリテ其効更ニ切実ナラシ
ヲ要セハ一及ヨリ二乃至一貼トシ用フヘシ蓋シ絨那ハ能ク消食器ノ損害ヲ招
ク故ニ葡萄酒其他若果香竈ノ品ヲ使シメ其ノ弊ヲ救フ可シ○絨那水浸
劑絨那一号冷水八号或ハ十二号浸出スルヲ二十時余ニ振蕩メ滓ヲ去リ半
時毎ニ一食ニ或ハ二食ニ用フ又方絨那一号沸湯八号或ハ十二号製方曰
前収斂ノ効前劑ヨリ稍烈ナリ○製酸絨那浸法元本○絨那依而去讓法元本
本ニ見ユ○酒浸劑方法元本○絨那煎○加酸絨那煎○加酸絨那浸往來熱
痔瘻失苟兒倍若百日咳等ニ塩酸ノ方ヲ用ヒテ屢良効ヲ得タリ○煎浸合

方絨那酒○軟絨那越絨方元本私方元本用方一及ヨリ半号ニ至ル○硬絨那越絨
私○寒寒絨那越絨私劑○絨那丁絨劑絨那一号燒酒者硝子燻
ニ入レ浸出スルヲ六日○半号ヨリ半号ニ至ル○絨那消毒丁絨劑向歌熱神
經熱ノ良藥タリ脈量一及ヨリ三号ニ至ル○絨那橙徒丁絨劑主治内前
一及ヨリ四号ニ至ル○絨那華尔斯十二時間一及ニ至ル○絨那舍利別脈
量一及○規尼捏聖叙尼捏之モ又絨那制煉劑ノ一腫ナリ○硫酸規
尼捏塩酸規尼捏之諸種ノ絨那羅屈塩ハ共ニ諸名家經驗説ノ知リ其解
熱ノ効太ク絨那ニ優レルト云臣註胃ノ知覺過敏ナル者胃瘕吐ハ微スモ
ノ脉管ノ刺衝機太過ル者血液頭部ニ灌流スル者自汗ノ前徵アル者衰
耗下劑ヲ奈セントスル者等ハ供ニ規尼捏ヲ用ヒテ害アリ○替旨熱腸胃性ノ
疔張替旨神經熱ニ用ヒテ奇効ヲ得タリ又慢性ノ諸病消食器ノ衰弱
白帶下舞踏病顔面痛百日咳癩瘡病齒齦失苟兒倍若ノ換替アル者
熱病后ノ水腫等ニモ屢ニ良効ヲ見ル○規尼捏ヲ用ユル規尼捏太約絨
那ニ異スルヲ○脈量ノ多少ハ患者ノ年齢ト病ノ性質トニ從テ消息スル
尤モ察急タリ小兒ハ大約一日四及ヨリ六及至テ取リ分チテ每脈四分及ノ
一ヨリ半及ニ至ル大人ハ大抵一時毎ニ二及ヨリ三及ニ至ルベシ○方劑ノ製法充任

収斂

ナル者ハ白糖麻屑混失更ラ加ヘテ散シテ或ハ白糖饅心申膏等ヲ加ヘ
テ凡トナシ或ハ香竈ノ菜呂酸果ノ舍利別等ヲ和シテ孟德設ルトナシ或ハ
規尼捏四ハヨリ六ハ至乳糖ニ和シタル者ヲ取テ齒跟ニ摩塗捺シ或ハ規尼
捏六ハヨリ八ハ至忽布消鎮痛液半々ノ溶解ノ心窩ニ塗捺ス乳糖及ヒ
忽布消ノ五方ハ小兒藥劑ヲ用ユルノ能ワサル者ニ殊ニ珍セリ或ハ小量ノ渣胸劑
トナシ用ヒ之レモ又小兒ニ効アリ或ハ外用ノ法ニ從フベシ乃チ規尼捏六ハヨリ十ハ
至境膏ニ和シテ皮膚脆薄ノ部腋ノ下ノ腋ニ付貼スルカ如シ○規尼阿乙実混ハ諸
医規尼涅ヲ製煉シ其滓渣中ニ於テハルスヲ得テ解熱藥トシ一九二ハノ丸
ヲ造リ間歇熱ノ免熱時一時毎一九ヲ用ヒ或ハ收斂虫的兒ニ溶シ与フ共
規尼捏ニ異ナルヲナシ只惜ムラクハ劇シク胃ニ感動シテ動モスレハ輒チ嘔吐ヲナ
ス而シテ價ニ賤ナルヲ以テ便ナリ解熱ノ効ニ在リ

○和蘭茶鏡神經炎論篇保固強壯劑用法

感動甚ク銳敏ニ症ニ初ヨリ此劑ヲ投スレハ其收固ノ効力ニ由テ脈管纖維
愈々收縮ノ更ニ寧急ニ増テ其症轉劇盛ナリ又感動太ク遲鈍ノ症ニ
是ヲ用シハ脈管纖維メ大ニ罷弊シ羊ハ疝ニル者愈々收縮ノ瘻至塞ニ是
ヲ揮活醒覺スルノ能ワサルニ至ル故ニ此ノ二症共ニ初發ハ害アリ宜ク揮發衝動
劑ヲ用フベシ○然レモ若シ感動甚ク遲鈍ノ者此劑ノ的當スヘキ症アルハ是
ニ揮發衝動劑ヲ加エ用フ可シ假令ハ葡萄酒忽布消液竜胆セルニシテ燒酒
等ノ如シ是ニ因テ收固ノ藥性揮發ノ其功效敏捷ナリ

○強壯解熱劑 保固強壯藥

○鐵ヘリウム

療癒病ノ恐レる者ニ預防劑トシテ用テ大効アリ

此藥ハ胃腸ノ諸液ニ混和スト至ニ其性少クモ變化セズ血中ニ浸透シ周身ニ普達ス其功驗
ヲ效スナリ中本藥ノ收瀟藥ハ是ヲ服メ胃腸ノ諸液ニ泡釀消化セラレハ其性能
洵爽ノ善ク全身ニ達シ難シ

性収斂ニ有カノ調血藥タリ故ニ血液ノ運行ヲ將火進シ其亦分ノ不足ヲ給シ
飲食消化ノ機ヲ變理シ器械弛緩メ血液過多ナルヲ減シ又官能遲怠ノ必
液缺乏ニシテ増進スル等其功太ク碩也○下腹或ハ陰部ノ諸管脈弛緩スル
ニ或ハ官能萎衰スルニ因テ經閉スル者ニ通經劑トシテ用テ効アリ○凝膠薄弱
ナルニ因テ胃寒ニ任再日ヲ経テ愈ヘサル者ハ之ヲ用ヒテ凝膠ヲ收固スルハ即治ス
水腫ニ用ヒテ纖維ノ條固カラ回復ス○鐵屑鉄ハ胃中ニ入テ酸化シ而メ后
自家ノ能ヲ逞クス故ニ酸敗液ニ由テ消食機ヲ虧傷スル者及ヒ子宮病萎黃

補一
補一
補一
補一
補一
補一
補一
補一
補一
補一

病白帶下諸厄利設病水腫虫等用ヒテ良効アリ○患者ノ年記ニ應ヒ
一月二日ヨリ二十日迄九散トシ用フ鉄屑ハ動モスレハ胃部壓迫心下煩悶使
秘ホノ如キ胃中ノ損害繼テ全ス故ニ香麝若采ノ品ヲ用スレ○越嶺屋布
斯末兒扶斯一性効鐵屑ト同シ鉄屑ノ如ク胃ヲ感動ス○九若ノ散トナシ毎服一丸ヨリ六丸ニ
至ル○格碌屈斯末兒扶私此鉄屑ニ比スレハ効力差強ク損害ヲ繼テ全スルモ
亦他ノ鉄塩ノ多キカ如クナラス○全軀ノ衰弱萎黃病及ヒ慢性ノ神経病乃チ
癩面痛胃完痛子宮病舞蹈病等ノ如キニ用ヒテ驗アリ○九日ニ五丸ヨリ二十
丸ニ至ル顔面痛ハ二十丸ヨリ三十丸至ラ散トナシ用フ○外用散トナシ潰瘍ニ撒
ス○酸物ヲ忌ムコ前劑ノ如シ○固鉄舖ハ鉄粉ニ比スレハ消化ニ易シ單果
用スルモ亦可ナリ○撒尔末尔扶私ハ強壯收喘殺虫ノ効アリ○外用ハ水ニ溶
解メ浸解ノ蝕性ノ潰瘍ヲ洗滌ス○散九若クハ溶液トシ毎服二丸ヨリ十丸至
ル日ニ三三次○固サルムルチス此劑下利ノ効アリ故ニ下利入ルコトヲ禁ス又外
敷メ止血ノ効アリ○収斂鉄液止血ノ良劑ニメ内外共ニ供用ス故ニ虚性ノ諸失
血殊ニ子宮ノ脱血瘵体ノ大ニ弛緩スル者流体溶崩ニ傾ク者ニ効アリ○三十
滴ヨリ六十滴ヲ以テ粘滑ノ飲液ニ和シ服ス○開達鉄丁幾劑主効諸鉄劑
ニ内シク禁忌亦同シ○二十滴ヨリ八十滴ニ至ル○棋植加鉄丁幾主治諸鉄製劑

○月ニ三十滴ヨリ六十滴ニ至ル○確鉄華ハ保固強壯通經殺虫開達ノ効アリ故
ニ慢性神經病内臟ノ閉塞諸腺病ヲ治シ經ヲ通シ出ラ殺ス○凡毎服五丸ヨ
リ十五丸ニ至ル日ニ三三次○弊點告肝神經丁幾劑ハ強壯鎮疼止痛ノ効アリ
二十滴ヨリ六十滴ヲ以テ白糖孟屈設尔ニ和シ服ス

○單苦味

○健真亞那

健胃ノ良薬タリ故ニ消食機ノ虚弱ヨリ生スル諸病論ヘハ酸敗液凡気膨
脹虫出回歇熱ホニ効アリ○瘰癧病ノ初起依利昆捏兒子宮病脚氣及
ヒ痛凡ノ癆作后劇病性熱回後ノ時期等ニ佳効アリ○散每腹一丸ヨリ二丸
ニ至日ニ二次水浸劑或ハ酒浸劑ハ半丸ヨリ一丸ニ至浸出ハ半丸或ハ十二丸ヲ
取リ一時毎一七ヲ服ス○越嶺私劑ハ日ニ一丸ヨリ二丸至老或ハ孟屈設尔
ト用フ此劑尤モ穩當ニメ用ヒ易シ健真亞那丁幾毎腹一丸ヨリ二丸ニ至○後方
幾劑○健真亞那令利別

○括失亞

リグニムロクワソニア羅

固世刺戟セズ飲食消化ノ扶ケ胃腸ノ敗液ヲ飯ニ苦味ノ薬ニ比スレ
ハ緩性ニメ固ク妨ケズ脈管血液ヲ刺戟セズ痰ヲ増発セズ

壯若

保固強壯ノ性復原重那ニ勝レリ又内臓衰弱ヨリ発スル黄疸下利ヲ治シ
又歳首間歇熱ニ用ヒテ速カニ其熱ヲ解截ス○煎劑ハ一日ヨリ半夕至
前ハハ夕ヲ取リ脈ス凡劑ハ用フルヲ稀ナリ○煎汁ハ能蠲ヲ殺ス○日越幾
乾日ニ脈ノ一夕ニ至ル○下幾劑毎脈十滴ヨリ六十滴ニ至ル日ニ三次(越幾煎
三四回煎シハ必マ酒石酸酢漿草酸ノ如キ酸性ノ加ル幾其液ヲ出ス)

○珊島里

ハルバ・サントリ・ロー

主治性効健復安那ニ月ニ加之解凝ノ効最峻ナルヲ以テ粘液ヨリ生スル内臓
ノ閉塞ニ因テ発スル間歇熱水腫等ニ殊効アリ○越幾斯性効徳当九一夕ヨ
リ三夕至孟僂設ルニ和シ用フ

○腫菜

ハルバ・トリ・ホリ・イロー・ヒラリ・ニ羅

秋月花後ニ収スル者カ良リ

腸胃ノ衰弱ヨリ発スル諸症乃消化不消ノ者間歇熱依利昆徑兒ニ殊効アリ
又閉塞ヨリ生スル黄疸水腫ニ宜シ又失苟兒倍者ノ景況アル者ニ効アリ○夕
クニ越幾私半夕ヨリ一夕ヲ凡トナシ用フ○前劑ハ生絞汁ノ如ク失苟兒倍者
瘍ニ外用スルノモ

○拾綸僕

ラダキスロコリエンホ

因脈動ヲ増進ス又起漿ノ業ニ非ズ改ニ内伏熱ニ用ユ

因胃腸ヲ使ニ腐敗ヲ防ユス粘滑復ヲ合ニテ緩和鎮痛ノ効アリ殊ニ腐敗腸房ノ胆液

ヲ回復ス改ニ致那及ニ安復担母ノ如ク驅熱ノ偉効アルヲ毫疑ナシ

此菜ハ忽チ胆液ニ混和シ腐敗ヲ挽回シ惡臭ヲ集ムルハ更黒利加地方ノ壳暴ナ
胆液熱ニ用ヒテ實驗スル知ナリ又諸液ノ酸敗ヲ防過シ既ニ酸敗スル者ハ是ヲ中和塩ト
為ス異能アリ

單苦味ノ保固強壯菜ニ兼テ粘液復ヲ具有シ多少緩和ノ効アリ胃及ヒ
自餘内臓虚弱殊ニ其虚弱ニ由テ胆液ノ分泌常調ヲ失フ者ニ偉効アリ又下
利ノ在再タル者痢疾霍亂胆液ヲ吐スル者ニ用ヒテ佳ナリ○散每脈十五ハヨリ
三十ハ至ル日ニ三四次○越幾私劑日ニ一夕或ハ二夕ヲ取テ凡若ク孟僂設
ルトナシ用フ○下幾劑健胃ノ菜液ニ加ヘ用ヒテ屢ニ効アリ一夕ヨリ二夕ニ至

○粘滑苦味

此品ハ多量ノ粘液ヲ含蓄セテ以テ緩和粘滑ノ部ニ算収スル者アリ
リ然レモ余ハ其保固ノ性ニ就テ強収菜中ニ列ス○發熱或ハ痲衝ノ如
キ脈管ヲ刺衝スルノ景況アル者之ヲ用ヒハ自餘ノ粘滑菜ノ如ク相
症セザルノミナラズ却テ害アリ

○依蘭若

リン・ヒロ・イン・スラン・ヂキ・ユス・羅

因生鮮ノ者ハ微利ノ効アリ

第一(生刀脫衰及ヒ羸瘦)暴泻失血及ヒ亡液ノ候ニ在再回復ノ微アリテ

強壯

生カ沈衰シ身躰羸瘦スル者殊効アリ
第一肺臟病一肺癆ノ一妙茶
タリ○間歇熱或ハ聖京低熱ノ後屢々遺留スル者慢性咳嗽兼テ多
量ノ粘痰ヲ咯出スル者殊効アリ○膿瘍破潰シ周縁弛緩メ「フレウ」ヲ稀
膿夥シク流出スル者蘭苔缺ク「カウサル」ノ病トス○肺癆ニ嗽衝ノ症アル者
ニハ用フベカラトス○第三百日咳第四泌尿器病第五飲販毒第六下利泄瀉
腸瘍等殊効アリ○蘭苔ノ此諸病ニ効アル所以ノ者ハ唯其粘液ヲ以テ毒
ヲ包摂スルノ緊要タルノミナラス更ニ又苦味ト纖維依蘭苔、レフヲ以テ物ノ弛衰
ヲ強健ス故ニ殊ニ病末病後惟ニ轉ニ用ヒテ効アリ○粘液若味等ノ耗脱セサ
ラントフ要セハ半勺ヨリ一勺至テ水十二勺ヨリ十四勺至テ以テ煎スルハ小半時ナ
ルヘシ唯粘液ノミヲ得ント要セハ先ツ水浸スルハ八分時ニメ後之ヲ煎スヘシ○依
蘭苔傑列ニ毎次ニ勺ヨリ四勺至五頓服ス

○鹹性苦味

味若クメ且ツ各種ノ塩ヲ含ミ強壯解凝ノ効アルハ單苦味茶ト申
和塩ト配但スル者善ク腹内諸臟ノ壅閉ヲ解凝ス○粘液性ノ喘息
ヲ殊ニ効アリ○新絞汁越幾私劑ヲ常用ス○半カカリ一
勺ヲ服ス

○鬚髻タリ○此品ハ能ク其性カヲメ粘液腺ニ達セシム故ニ胃腸ノ衰弱
或ハ粘液腸胃中ニ滯蓄スルニ由テ生スル諸病ニ効アリ

○葛兒カルクヤイ、ベ子ク子

保固強壯汗解凝利尿ノ効アリ○間歇熱熱内臟被是ノ閉塞ニ由リ持
久スルヲ以テ幾那ヲ用フベカラサルノ症ニ良効アリ○粘液熱及ヒ神經ノ粘液熱
ニ殊ニ効アリ○聖京低病一發熱咳嗽其他諸症ノ聖京低被是ヲ論セス之ヲ
用シハ能ク蒸氣ヲ發シ痰ヲメ咯出シ易カラシメ「胃病」一胃弱ニ因テ發スル所ノ
諸病酸敗液凡氣等ヲ兼ル者ニ良驗アリ○慢性諸病一論ハ水腫黃疸依
刺昆兒月經不順等ニ良シ○往昔是ヲ以テ諸癆瘵ノ聖茶トシ天草草ノ
義稱ヲ命セリ○散ニ勺ヨリ三勺至ハ煎劑或ハ浸劑ハ一勺ヲ以ハ勺ヲ取ル
○越幾私月一勺四勺至ハ

○紫葳ヒユミヒア、オヒシナリス

間歇熱黃疸水腫依刺昆兒等内臟ノ閉塞殊ニ門脈ノ閉塞合併シ
タル者ニ殊用ス○石林及ヒ諸結石病等ニハ大黃勿搗碎重石確ヲ加ヘ用ヒテ
其効太ク峻リ○新鮮絞汁ハ内服メ血瘕ヲ淨潔シ外用メ角膜ノ星翳ヲ消
ス○越幾私ハ日一勺ヨリ一勺半ヲ服ス

強壯性苦

○蒲公英 タラキサキユム 羅

解凝ノ効頗ハ烈ナリ故ニ腸及ヒ腸間膜ノ腺門脈脾肝等ノ壅閉或ハ其壅閉ヨリ生スル諸病論ハ間歇熱消食機虚弱酸敗液黄疽水腫依利昆俚兒羸瘦病等ニ良効アリ○新絞汁ハ能ク血質ヲ稀釈淨潔スルノ効アリ故ニ能クハスベツキユムストハンヘツトフルノ病ヲ消散ス○煎劑ハ根一ツヲ以テ煎メ六ツヲ取ル○新絞汁ハ日一ツヨリ二ツ至テ三ツ至テ其生草ノ茎ニ就テ數廻メ其乳汁ヲ吸ヒ取スレハ効力最峻ナリ○越和幾劑日一ツヨリ二ツ至ル

○六尔羅歌 ヒコルカレ 隨代用 洞庭藍

困布液ヲ稀釋シ汗ヲ發シ小便ヲ利ス又月經稀少及ヒ經閉ヲ通シ産婦ノ瘀血ヲ下ス毳布トシ貼メ癰壞疽ヲ治シ乳房結核硬腫ヲ疏散ス

善ク腹内諸臓ノ壅閉ヲ解凝ス○粘液性ノ喘患ニ殊ニ効アリ○新絞汁越幾和劑ヲ賞用ス○半ツヨリ一ツヲ取ス

本草

○矢柘列 ヒコリユム インタービユム 名性凉收斂ス

主治効能蒲公英ニ同シ○越幾和劑一ツヨリ二ツヲ取ス

○傑尼松 ヘミスダチンコトリア

恐水病ニ用ユ 元本ニ詳ニ見ユ

○牛膽 フエル タウリ

腹内諸臓ノ病ニ宜シ故ニ胃虚或ハ粘液酸敗液凡氣膨脹硬秘肝脾門脈腸間膜ノ壅閉黄疽依利昆俚兒蛔虫小兒羸瘦病ノ初起等ニ効ヲ奏ス○慢性ノ神經病及ヒ癩癩舞蹈病ニ効アリ蓋シ牛胆ノ此症ニ効フルハ其原虫出壅閉等ヨリ起ル者ノミナルベシ○外用メ腺ノ硬結腫ヲ分解シ痔瘻ニ和シ用ヒテ角膜ノ星斑ヲ消ス○新鮮ノ者一ツヨリ四ツ至テ香竈ノ水液或ハ葡萄酒ニ溶化シ用ユ○稠凝ノ者ハ日一ツヨリ二ツ至テ九ツ為シ用フ○射注劑トシテ生胆及ヒ稠凝胆共ニ半ツヨリ四ツ至テ寄猪脂四ツヨリ六ツ至テ和シ用フ○醋塩酸塩加爾幾重土硫酸ニ浸淫失更金屬塩及ヒ單寧ヲ含ム器等ハ胆質ヲ分析メ其力ヲ脱スルヲ以テ配伍スルヲ忌ム

○香竈苦味

性太タ温ナルヲ以テ尿管刺戟性ニ多血質ノ者血液局知ニ輻湊スル

強壯

ノ症アル者等ハ用フヘカラス身体虚冷面色蒼白脉遅ニ軟其他官能弛怠ノ粘液積ニ屬スル者ハ能ク的症ス 固若味質ニ華尔私須及ヒ精微揮発ノ油ヲ含テ衝動起熱ノ性アリ故ニ保固強壯茶ヲシ此揮発衝動茶ニ近シ

○亞尔蘇丹 アルストロオフ

〔間歇熱〕〔内臟瘰癧〕論ハ消化機虚弱敵敗液膏蓄黄疽水腫月夏不頂及ヒ経閉白帶下腸虫殊ニ蛇虫等ニ効アリ但シ此ノ品蛇虫ニ効アルマ膏ニ其現在セル者ヲ殺スノミナラス更ニ復生育スルヲ得サラシム○外用蒸漏劑卷蓋劑トナシ河乙液腫羅新様ノ焮衝ヲ分解ス○越幾新劑一又ヨリ一乃至九トモ用フ○浸劑煎劑半分ヨリ一分至一分煎劑六分ヲ取ル○丁幾劑毎服六十滴ヨリ八十滴ニ至ル日ニ三四次○油等急症等急性ノ嘔吐子宮衝逆ノ諸症ニ用フ○一時毎ニ四滴ヨリ八滴ニ至ル○水ハ刺創挫傷閃挫等ニ用ヒテ効アリ

○杭更哥 ヒユアコサ南

和蘭ニ在テハ既ニ久シク有カノ解熱茶ト為シ用ユ

○忽布

消化機虚弱内臟閉塞咽出水腫清腺病諸厄利設病等ニ用ヒテ良効アリ又慢性痿疔瘰癧疔痛風ノ発作ニ用ヒテ殊ニ効アリ○蒸漏劑トモ四肢ニ突スル痛腫咽喉焮衝脚ノ水腫瘍ヲ治ス○散半分ヨリ一分至浸劑一分ヲ以テ煎メ八分ヲ取ル越幾私劑ハ一又ヨリ二又至ワ九或ハ五迄設ルトシ用フ丁幾劑ハ日ニ一分ヨリ二分ニ至ル○忽布ニ黄色苦味ノ粉木アリ是レ忽布ノ効分ニ此物忽布子ノ小木葉状ノ鮮屑ヲナス者ノ中間ニアリ之ヲ律怖カ控ト云服量五分

○土木香 オホクハルマ松栴

〔健胃〕一良薬ニ又小便ヲ利シ蒸気ヲ発スト云フ

強壯解凝殺虫通經ノ効アリ○胸部ノ虚弱若クハ粘凝若クハ官能遲怠等ニ由テ生スル所ノ胸病又粘液熱ノ殊ニ肺ニ感動アル者ニ良シ又痛風病殊ニ運行遲急ノ粘液質ノ者此ノ病ニ嬰リ且ツ内臟ノ官能衰衰ヲ兼ル者ニ偉効アリ○慢性ノ皮膚病殊ニ疥癬ニハ内外共ニ用ヒテ奇効アリ○散劑ハ用スルヲ稀ニ一時半毎ニ一又ヨリ一分至煎劑ハ一分ヲ以テ煎メ八分ヲ取ル越幾私劑ハ日ニ一分ヨリ三分ニ至ル

○安低斯點刺 アンテキスアン

壯

○外敷メ經久腐敗潰瘍瘡疔ホラ治ス

主治効能加私加栗刺及に機那ト内一般ニ殊ニ間歇熱ノ患者消食器大ニ虚弱メ幾那堪ヘズ暴瀉ヲ併發スル者ニ奇効アリ○散劑一カヨリニカニ至ル○煎劑浸劑ハ半カヨリ一カ至浸煎メハカヲ取ル○越幾私劑ハニカ至或ハ孟徒設ルトナシ用フ

○葛新加栗刺 カシリルラ

治ス 因越幾新一カヲ水一カニ溶シ用ヒテ胸肺ノ諸症及ヒ吐血下血亦諸失血ヲ

往古鎮痙ノ効アルヲ稱シ又或ハ幾那ニ代用ス殊ニ稱譽セリ〔替留熱〕〔間歇熱〕但し腸胃虚弱肥癢メ幾那ヲ服シ得サル者ニ殊ニ効アリ或ハ經久ノ嘔吐暴瀉瘧閉等ヲ合併メ一直ニ幾那ヲ用スルヲ能ハサル者ニ用ヒテ諸惡症ヲ排除シ幾那ヲ用フルノ道路ヲ啓クノ効アリ〔泄瀉〕〔赤痢〕共ニ病末期ニ及シテ腸管ノ運營虚憊ニ泄利是カ為ニ綿々止マサル者或ハ慢性病ニ轉セント為ルノ恐アル者ニ用フ〔消耗病〕諸種ノ勞瘵中殊ニ粘液勞ニ頗ル自餘ノ強壯劑ニ勝レリ〔慢性傷寒〕消食機疲憊酸敗液凡氣膨脹胃瘕萎黃疝病等ニ良驗アリ〔胸腔諸臟慢性粘液病〕○散劑每服二十カヨリ一カニ至ル日ニ三四浸劑煎劑ハ一カヲ以テ煎メハカ

ヲ取ル○越幾私劑一カヨリニカニ至ル○丁幾劑ハ一時半毎ニ三十滴ヨリ六十滴ニ至ル

○加蜜列花 フロレスカヒルラ羅

ハ苜蒿花ヲ代用スベシ 因此葉ハ腐敗ヲ歇メ間歇熱ヲ治スルニ幾那ニ減ラズ〔加蜜列花〕飲ルニ過

越尔実告白散末浸劑越幾新ニ為シ用ルハ其効能全ク内ニカラス越古私ハ他ノ苦味葉ニ異ナラス散末ハ強壯ノ効ヲ奏シ浸劑ハ胃中穢物ヲ多蓄スル者ニ温用スレハ初メハ先ツ吐劑トナリ次ニ発汗シ終リニ軟便ヲ導通ス通常用ル浸劑ノ冷服ハ之ニ及メ唯タ鎮痙發汗興奮ノ効アリテ下利ノ効ナシ

強壯肥凡鎮痙發汗通經ノ効アリ○間歇熱ニ機那ヲ用ヒント要セハ先ツ加蜜列ヲ與スルヲ太タ佳ナリトス○凡氣膨脹ヨリ發スル内臟ノ寧急諸症泄瀉亦利慢性ノ神經病乃チ依劑埋兒子宮病又經閉及ヒ經時疼痛諸症ヲ合保スル者妊婦ノ諸惡症産後ノ諸病等皆偉効アリ〔失血〕云々失血燼衝ヲ除ク外自餘百般ノ疾患ニ於テ一ニ之ヲ効能ヲ奏セサル者アルヲ見スト○灌腸蒸滌劑香草蒙琴布等ヲ造リ内臟寧急様ノ諸病ヲ拍頰屢屢屢短久潰瘍脱胆假燼衝等ニ用ヒテ良効アリ○散劑ハ一時若クハ一時半毎ニ一カヨリニカ

強壯

○至ル〇浸劑六分ヨリ一分至ラ浸メ八分或ハ十二分ヲ取ル〇越幾私劑半分ヨリ二分至ル〇油ハ健胃驅風鎮痙ノ藥品ニ加フ一滴ヨリ五滴至ル

○泥昌根 カラフニエス。アロキチニム。羅
〔惡性神經熱腐敗熱粘液熱〕以上ノ三病共ニ末期ニ用ヒテ良効アリ〇肌熱著シク脈數ニメ血頭腦ニ輻湊シ腸胃汚物アル等ノ諸症ハ之ヲ用フルヲ禁ス〔腸胃ノ衰虛〕粘液ノ溢蓄酸敗液凡氣咽虫子宮病等共ニ腸胃ノ虛衰ニ起ル者ヲ治ス〔粘液性諸病〕經年ノ痰咳聖京佐性ノ咳白帶下スレムガラハル等ニ効アリ〔失為兒倍益〕水腫能ク尿ヲ利シ水腫ヲ強壯ス故ニ利尿劑ニ配伍スルノ良藥タリ〕外用經久弛緩ノ寒脫疽狀ノ潰瘍ニ用ヒテ佳シ〇散劑毎分半分ヨリ一分至ラ頰脈ス浸劑ハ半分ヲ以テ浸メ四分或ハ六分ヲ取ルハ侵煎合方ハ先ツ半分ヨリ一分至ラ莖根ヲ取り四分或ハ六分ノ湯ヲ漉出スルヲ四分時許漉メ滓ヲ去リ其滓ニ又ハ分ノ水ヲ加ヘ著テ四分ヲ取り煎液ト相合ス

○橙皮 コルチキヌ。アウランチ。オリユム
健胃興奮驅風ノ効アリ故ニ間歇熱消食機虛備心凡氣膨脹胃ノ急急虛弱ヨリ生スル失血等ニ俾効アリ又機那ニ但用メ胃腕ニ登スル諸惡症ヲ防護スルハ良藥トス〇散劑毎時一分ヨリ半分至ラ頰脈ス浸劑ハ一分ヨリ八分ノ葡菊酒或ハ清水ニ浸出ス〇水ハ二分ヨリ八分至ラ孟依設ルニ和シ用フ〇丁箴劑毎腹一分ヨリ二分至ル日ニ三三次〇舍利別一分ヨリ三分至ル〇油ハ散九孟依設ルニ加ヘテ用フ〇一散一九一七毎ニ一滴ヨリ三滴ヲ含ムニ至ル〇精毎腹二分ヨリ三分至ラ頰脈ス

枸櫞皮 コルチキヌ。シトロリユム

主治効能橙皮ニ同シ若味香竇ハカレヨリ微ナリ〇生枸櫞皮ヨリ油ヲ絞出シ直ニ其油ヲ取り眼中ニ點滴シ經久ノ痿疔痕私性及ヒ聖京佐性ノ眼楯衝角膜翳眼ハ角膜曇暗ヲ療スルノ奇藥タリ經驗ニ得タリ

○攝尔扁太里 ラキキヌ。セルパンタリ。ア。セルガニ。ア。子
善ク蛇咬毒ヲ解スル一種ノ効アリ故ニ或ハ名ケテ蛇根トス〇刺戟強壯汗防腐ノ効アリ〇蒸氣釜ノ閉塞ヨリ生スル消食器ノ諸病ニ用ヒテ良効アリ〇散浸兩劑共ニ用ルト筈ニ就中浸劑ヲ稀用ス散ハ毎腹半分ヨリ一分至浸劑ハ半分ヨリ一分至ラ以テ浸メ六分或ハ八分ヲ取り用フ〇丁箴劑毎腹三十滴ヨリ六十滴至ル

白質若

○桂 コルチキヌ。シシナモ。ニユム

得同強壯興奮驅風微収斂ノ効アリ〇内臟ノ虛冷ニ因テ發シ或ハ是カ為ニ

持久セハ泄瀉ヲ止メ産婦及ヒ子宮病家ノ嘔吐ヲ治シ經年ノ胃虛ニメ惡心
嘔吐風氣等ヲ兼ル者ハ胃ヲ健運シ風氣ヲ驅リ嘔吐惡心ヲ鎮靜ス○尿管
虛衰及ヒ運動萎弱等ヨリ発スル所ノ虛性失血ニ奇驗アリ故ニ尿血及ヒ
産後ノ子宮血ヲ療ス○桂ヲ加ヘテ能ク他藥不在ノ氣ヲ消ス○散劑ハ一
浸劑ハ半多ヲ以テ浸メハ号或ハ十号ヲ取ル○水主治効能本條ニ同シ每服
一管也○桂精ハ每服一管ヨリ四管至ラ頻服ス○丁緩劑ハ毎次二十滴ヨリ
四十滴至ラ頻服ス或ハ一管ヨリ二管至ラ取リ桂水ニ号ヨリ四号至ルニ知シ
每服一食也○桂油ハ胃ノ寧急神經虛衰風氣疝百日咳等ニ殊効アリ
毎次一滴ヨリ三滴至ラ頻服ス

○揮發衝動劑

此藥ハ保固強壯藥ノ如ク体中ニ保任持重スルヲ能ハス速ニ揮散ス即
チ芝不守茶ナリ

○薄荷

數種アリ悉ク元本解ク其功ハ第一道症等諸病(胃症^{胃完} 症等性)
嘔吐等急症及ヒ風氣ヨリ発スル知ノ疝痛等ニ佳シ第二胸腔諸臟症等
諸病病息百日咳等ノ症等ヨリ発スル者ニ良シ第三依利昆控尔子宮病

ノ諸症全神經ノ虛憊ニ驅アリ故ニ眩暈神經頭痛殊ニ其病消食機ノ衰
弱ヲ兼ル者ニ用フべし○第四神經熱腐敗熱殊ニ其熱腸胃等急ノ諸症
ヲ合併スル者ニ良ナリ論ハ惡心嘔吐等急症等ノ如キ之ニ第五外用膠ノ
硬結腫羅斯様ノ表皮癩衝等ヲ分解シ倭ノ瘰癧私痛内臟ノ等急等
ヲ鎮定シ強壯治ニ加ヘテ諸厄利設病或ハ羸瘦病ニ嬰ル小兒ニ用フ又乳
汁分泌ヲ障碍スルノ説ナリ○浸劑半号ヨリ一管至ラ浸メ六号或ハ八号ヲ
取ル外用ニハ茶葉琴布莖漏浴湯灌腸ノ諸劑トス○薄荷水ハ二号ヲ
リ八号至ラ孟佻設尔ニ加ヘ用フ○薄荷油ニ滴ヨリ六滴至白糖或ハ孟佻
設尔ニ知シ用フ又凡若クハ錢トナシ用フ

○茴香

興奮鎮瘵驅風尿祛痰ノ効アリ○小兒諸病殊ニ其ノ因ラ酸敗液ニ資テ
腹痛泄瀉等ヲ合併スル者ニ良シ又ヨク肺胃等ノ粘液病ヲ治ス○根ハ殊
ニ利水ノ効アリ○子根共ニ浸劑トナシ用フ子ハ二号ヨリ三号至根ハ半号至ラ
浸メ液六号或ハ八号ヲ取ル○茴香水ニ号ヨリ八号至孟佻設尔ニ知シ頻
服ス○茴香油ニ滴ヨリ六滴至白糖ニ滴或ハ九劑ニ加ヘテ頻服ス

○過泥子

半袋

茴香之類ス殊ニ驅風劑トシ用ヒテ風氣ヨリ發スル知ノ疝痛ニ良シ○散劑
十八ヨリ三十ニ至頻服ス浸劑ハ三ヤヨリ半ヤ至テ浸ノ六ヤ或ハ八ヤノ液
トシ用○過泥子油二滴ヨリ六滴至白糖若クハ孟依設ル丸劑ニ加ヘ頻服
ス○私煙ル過泥主治本條ニ月々性力勝ル○分量方法モ亦異ナリ

○黙采薩 コロロイ
保固臭奮鎮痙驅風通經ノ効アリ或ハ子宮病家ノ輕易神經諸症眩
暈昏冒心季動等ニ用ヒテ驅アリ○通經ノ効ハ世間通知スル知ナリ○浸劑
ハ二ヤヲ以テ浸ノ夜ハ八ヤヲトル○外用ハ香竈藥劑ノ品ニ但用スル薄荷
知シ○黙采薩水ニヤヨリ八ヤ至孟依設ルニ和シ用フ○被方黙采薩精
○胃虛神經虛憊神經性或ハ痿廣損私性ノ頭痛等急テ木不仁等ニ用
フ○内外共ニ一ヤ三ヤヨリ半ヤ至ル

○迷迭香 コスマリ
性効主治黙采薩ニ同シ○迷迭香精外用ハ一ヤヨリ三ヤ至テ以テ不潔ヲ
洗條ニ患具ヲ消除ス然レモ今世ニ至テハコロケ子水ヲ稱用スルニ由テ人好シテ
用フルニ無シ古人迷迭香精ヲ以テ公羽多利亞水ト名ク

○刺賢堽尔花 テラノブルーム
困神經ノ諸病ニ良心胃子宮ヲ強壯ニシス腐敗ヲマノ開定解凝驅風ノ
効アリ

性効主治迷迭香黙采薩等ニ同シ○浸劑一ヤヨリ二ヤ至浸ノ八ヤヲ取
○刺賢堽尔油一滴ヨリ五滴至散劑或ハ孟依設ルニ和ス○外用刺賢堽尔
油外用諸方皆以油ヲ知ス○刺賢堽尔精不潔ヲ洗條シ患具ヲ消除スニ
ヨリ四ヤ至ル○主治コロケ子水ト同シ

○菩提樹花 ブルンデ
與奮鎮痙ノ効アリ古人多ク痲癩ニ稱譽ス近今殊ニ痙孛指掣ノ状ノ小
兒諸病ニ此花ノ蒸溜水一ヤヨリ四ヤ至孟依設ルニ和シ用フ

○橙花 オラニイ
輓近ニ至テ橙花ノ蒸溜水ヲ以テ自余鎮痙ノ品ニ但マ子宮病痙孛病自神
經諸症ニ用フ○一ヤヨリ二ヤ若クハ每次一食セテ服ス○橙花舍利別味太ク
佳好シ

○下子 コロイト
消食機虛弱胃痙疝痛等ニ同ニ効ヲ奏スルヲアリ○散劑五ヤヨリ十ヤ
ニ至ル油ハ每服二滴ヨリ四滴ニ至ル白糖ニ和シ或ハ丸トナス

○肉豆蔻 ミゴスカートノ

衝動厥爪鎮痙ノ効皆核中ニ含ム知ノ油ニアリ○消食機衰弱内臓粘膠川氣吐病泄瀉疝痛ノ効アリ又ヨク他ノ菓劑ノ醜味ヲ消ス○多ク散ト為シ用フ一時若クハ一時半毎ニ五ハヨリ一ヲ至ル○肉豆蔻搾油主治効能本條ニ同シ軟膏若クハ搽劑トシ用フルハ一莖ヨリ二莖ニ至ル○府利ハ豆蔻按ヲ被覆セハ網狀ノ内膜アリ○能ク消食機ノ虧損ヲ復ス○散トシハヨリ十ハ至ラズ瀕脈ス○之ヲ蒸溜メ亞的尔様ノ芳香快義ノ油ヲ得毎夜二滴ヨリ六滴迄瀕脈ス

○百屈林 ヘクリンム

此豆仁ヲ散ト為シ一莖ヨリ二莖至ラ用ヒテ胃疝泄瀉疝痛ヲ治シ殊ニ虚弱ヨク生スル知ノ白帶下ニ和蘭ノ医別秘名越業淋尽日太々冥用セリ○腹量ハ症ニ隨テ如ク一莖ヨリ加ヘテ二莖ニ至ル

○亞尔尼加 ベルグフワルコロイド

扶歇蘭度曰ク此ノ菓ハ震盪後ノ滯血溢液ヲ速ニ吸收セシムルノ要功アリ花根共ニ猛ニ刺衝シ防腐解凝利尿発汗通經ノ功アリ就中花ハ揮發衝動ノ効多ク根ハ収縮止腐ノ能優ナリ第一間歇性首重兒尼加ヲ以テ此

然レ烈功アルヲ給シ貧家ノ幾那ト名クルニ至レリ然レモ其功アル所以テ推スニ終未ニ他菓ニ勝ルニアラズ只此熱重性ノ神至性成ハ腐敗性ヲ見ハスニ至リ幾那ニ但用メ良効アルノニ第一神熱性第二腐敗性此熱ニハ花根但用スベシ何者己ニ前説ノ如ク根ハ止腐固閉ノ功多キヲ以テニ而メ尚其止腐ノ功ヲ扶ント要メハ竜腦鑛酸等ヲ加フヘシ魁府臣尔及ニ獨乙ノ大学者夫ハ輩此ノ二品ヲ加用メ頻ニ治驗アルヲ給ヒリ第一神經性聖京侯熱性第五粘液熱性第六假歇衝性腐敗性ノ假肺歇衝及ニ假胸膜歇衝或ハ産熱ノ經期或ハ産婦ノ痛アル白腫ノ第三期ニ殊功アリ第七下利神經性腐敗性ノ下利等ニ宜シ第八慢性胃寒ノ咳嗽粘液性喘息ニ二病共ニ多ク粘痰アリテ熱ナリ肺臟虚衰且ツ痙挛模様アルニ由テ冷痰自由ナラザル者ニ良驗アリ第九慢性痿テ復斯一痛風ニ峻効アリ殊ニ之ニ由テ患部ニ痲スル者ニ奇効アリ第十中風痿テ復斯病等ノ右淹滯スル四服ノ一痲黒障眼膀胱ノ括約筋ノ痲スルニ由テ生スル小便失禁等ニ良ナリ第十一神經病ニ癱痲搐搦等急子病依利昆垓尔等ニ用ヒテ間々良驗ヲ奏スルアリ第十二水腫第十三閉塞第十四經閉子宮ノ衰弱或ハ官能遲怠ニ由テ発スル經閉ニ宜シ第十五外用止腐ノ効アルヲ以テ羯布

羅ト但用メ寒脱疽ヲ治スルニ名譽アリ又醋燒酒等ニ配用メ挫傷及
ヒ血液皮下ニ漏溢スル者ヲ治ス○諸ノ真嗽衝血頭胸ニ縞淺スル者諸
尿管諸神經ノ知覺銳敏及ヒ尿管大過胃ノ知覺銳敏或ハ虛弱等ノ
症ハ共ニ更尔尼加ヲ用テ害アリ○根散ハ十五分ヨリ三十分ニ至ル浸煎兩劑
ハ半多ヲ以テ浸或ハ煎メ用フ一匙ヨリ半多ヲ以テ浸メ液六分或ハ八分ヲトル
○白芷 エンゲレン アンゲリカ甸エンゲルウルルニ屬
神經熱腐敗熱腸胃熱等第一道淨潔ニメ精力沈衰脈細數ニメ
震惕シ眼昏乃右乾黑肌膚枯燥メ肌熱燔カ如キ者之ヲ要スルニ知覺
遲鈍ノ諸徵陸續起シ生カ遂次ニ沈衰スル者ニ用フ○浸劑ハ半多ヲ以テ
浸メ六分或ハ八分ノ液ヲ取ル

○胡椒 ズワルテ 健胃驅風ノ功アリ又嘔吐ヲ止メ用フルニ良シ又往時同歇熱ニ賞用セリ

○必百カ提 ベール 器械ノ尔損ナクタタ消化機虛憊スル者ニ殊功アリ而シテ粘液膜ニ毫モ刺
衝ノ光景アルカ或ハ嗽衝ニ陷リ易キヲ微アル者ハ害アリ用ス可カラス
○葶澄茄

胡椒ニ比スレハ辛温共ニ微ク華尔斯類アルヲ以テ多ク粘液膜ノ諸病ニ効
アリ故ニ頭部咽喉気管等ノ梗固ノ胃寒嘔声白帶下胃ニ起固スル頭旋
眩暈等ヲ治ス殊ニ腕近ニ至テ華老福尔多ル其他ノ名匠之ヲ以テ痲病
ノ妙劑トシ稱用ス○散トナシ水若クハ舍利列ヲ加ヘ始メ毎服一茶匙日ニ二
胃之カ為ニ太々感動ノ泄瀉等ヲ奈スルヲナキハ漸次ニ増加メ日ニ一
若シ此感動アルヲ見ハ阿芙蓉少計ヲ加ベシ○又此物ニキヨリ六分ニ至ルニ
雞子黃ヲ和シタル者射注劑トナシ用ヒテ白帶下ヲ治スルヲ痲病ヲ治スルヨリ
尚峻ナリ

○百字兒 ヤスヒカセ 健胃ヲ標的トス散劑ハ五分ヨリ二分ニ至ル○必孟答水 アルク 一多ヨリ六分
ヲ以テ健胃ノ至盡設ルニ和シ与フ

○番椒 マンゲル 消食機衰弱ノ凡氣膨脹ヲ兼ル者鼓脹水腫惡性咽喉嗽衝等ヲ主
治ス○丸劑ハ六分ヨリ十分ニ至ル丁錠劑ハ日ニ二匙ヨリ二匙ニ至ル合漱劑ト
ニ一匙マテヲ取リ八分或ハ十二分ノ液トス

姜 ベル

胃虚食欲尔損風気胸胃、粘液積滯致脹痛凡、胃虚ヲ兼ル者
等ヲ治ス。○會漱劑トモ懸壺重扁桃腺等ノ弛緩ヲ強固シ口筋ノ麻
痺ヲ治ス。○散劑ハ一ヨリニヲ至ス。○糖醃トナレ多ク飲膳ニ供シテ胃ノ消
化ヲ扶ク

○山萸菜

沙羅苗 碎米著

困揮癸油様ノ液ヲ合ソリ失為兒倍若ク用ヒテ良ニコンセルヲ内効シ又
癸汗利尿ノ効アリ

○黑芥子

往昔之ヲ以テ粘液病消食機怠慢右癖等ニ多内用セリ。○白芥子消
食機尔損胸胃粘膠痛凡脚氣等ニ且ニ白芥子一食セリヲフト云。○山
萸碎米芥子ノ三種ハ或ハ単用シ或ハ合用メ共ニ失為尔倍若及ニ失為尔倍
若ヨリ癸スル諸病ニ効アリ。○山萸菜精ハ山萸菜沙羅苗根ノ二品ヲ以テ
製ス。○テ亞從設尔六号中、此精半ヤヨリ一ヤヲ加フ會漱ハ茶液ハ号ヨ
リ十二号中ニ一ヤヲ加ハス。○失為尔倍若舍利別此舍利別ハ桂橙ノ外
失為尔倍若ニ効アル茶品多ク味ヲ配合セル佳味製劑アリ。○此劑一多ニ升永
半ハヨリ一ハヲ加ヘテ又經久ノ微毒ニ稱用ス。○日ニ一多ヨリ二多ヲ服ス。○失為

尔倍若昆設尔弗沙羅苗三号山萸菜半廿碎米葉三号ヲ以テ白ニ入レ萸
テ泥トナシ白糖二廿半醋六号ヲ加ヘテ昆設尔弗トス。○日ニ二食ヒテ服ス
○同舍利別方碎米著液沙羅苗根 揉姜子ヲ以テ磨碎 白糖ヲ三山萸菜葉
液二号右四味研合シ重湯煎ニテ水氣ヲ蒸散シテ舍利別ノ稠トナシ於冷ニ
○又健旗亞那一号幾那苗中各半 右三味ニ水適宜ヲ加ヘ煮テ十二号ノ
液ヲ取リ白糖一廿半ヲ加ヘ水氣ヲ蒸散シ舍利別ノ稠トナシ於冷ニ
別ト子細ニ研和調勻シ用フ。○又升永一ニハヲ加ヘテ經久ノ微毒ヲ治ス。○四七
ヨリハ七ヲ服ス

○鎮症劑

○芸香白（シムル）花アノ名 殊ニヨリ子宮ニ達ス故ニ症ヲテ因テ癸スル所ノ經閉ニ通經茶トシテ用ヒ騷アリ
○子宮病神經頭痛癩癩等ニ用ヒテ又驅風劑トシ用ヒ効アリ。○生鮮ノ
者ヲ患者ノ近傍ニ置キ其烈臭ヲ嗅カシノ以テ小兒ノ搐搦ヲ鎮靖ス内服ニ
ハ水浸劑或ハ水酒各半浸フ用フ其方芸香半号或ハ二号ヲ以テ浸メ八号
或ハ十二号ヲ取ル。○外用ハ茶囊蒸漏溶湯ノ諸劑ト為シ經久ノ寒腫ナ
痺不遂視力之弱等ニ用フ。○芸香油ハ一滴ヨリ五滴ニ至白糖ニ和テ服ス

○又琥珀ヲ治スル灌腸劑ニ加ヘ用フ○芸香水一ウヨリ四ウ尚多量ニ至ル
鎮痙蓋終設ルニ加ヘ用フ○芸香酢ハ多ク嗅茶洗滌劑トメ子宮病ノ
諸症眩暈卒倒等ニ外用ス

○艾アト子フルセム○バーフトト

癩痢ノ良薬トス○幾分心機ヲ勞役スルニ因テ劇甚ナル呢逆ヲ發シ諸薬
毫モ効ナキ者ニ艾根最モ良ナリ○新艾根末半ウヨリ一ウ至患者ノ年記
ニ随ヒ微温ノ稀麦酒ヲ以テ送下ス

○頰草ハレリアナ○ハレリアナ

慢性熱性ノ神經病ニ用ヒテ偉効アリハ的ノ揮發衝動鎮痙薬中ノ奇薬
タリ（神經熱腸胃性聖京依性緩テ負私性等ノ神經熱或ハ瘡疹ヲ兼
發スル所ノ神經等生力減衰シ脉細數指々トメ次序ナク呼吸短促煩悶
呻吟肌膚乾燥メ蒼白或ハ喃々独語筋惕肉跳撮空摸床其他搐搦
ヨリ發スル所ノ不意的諸運轉ヲナス者或ハ眼中黯濁メ物ヲ見ス口吻半
開ニ古ト乾燥煤黒メ震顫シ諸ノ皮膚ヲ生スルノ微アル者ニ殊ニ効アリ○
揮發衝動發汗鎮痙防腐劑根爾精太里亞
龍腦梅那美等宜ク高クテ加ヘ用フベシ）慢性
神經病一舞踏病子宮病依利昆垵兒神經頭痛胃痙痲不遂昏冒粘

液中凡等ニ偉効アリ（烟出病）頰中ハ殺虫ノ効アリ且ツ烟出ニ由テ發スル
神經諸症ヲ鎮靜スルカ故ニ殺虫ノ良薬トス○頰中ハ散トナス者最モ効
アリ一ウヨリ一ウ至ルヲ頰脈ス浸劑ハ半ウヨリ一ウヲ以テ浸メ六ウ或ハ八ウ
ヲ取ル○慢性神經病ニ散劑茶湯トシテ用フルヲ住シトス熱性病ハ漿メ
浸劑ヲ良ナリトス○頰中テ殺劑頰中末一ウ燒酒十五度右頰中末ヲ以テ
燒酒ニ浸出スル一三日○半ウヲ以テ水或葡萄酒或ハ蓋終設ルニ和シ用フ

○阿魏

衝動鎮痙解凝殺虫通經ノ偉効アリ故ニ殊ニ運行遲慢ノ粘液質ノ
者ニ用ヒテ良シ多量衝動質ノ人モ亦用ヒサルニアラスト雖ニ粘液質ノ適應スル
カ如クアラズ但シ微衝ノ微アル者熱ノ景況著シキ者ハ用ヒテ害アリハ神
經病腸管ノ刺衝機太過ニ劇甚ノ事急ヲ發スル者ニ灌腸劑トシ用ヒ
テ緊要ノ者タリ（經久緩慢胸病）大ナル結節腫或ハ腫或ハ膿ノ膏膏等
ナキ者ニ良効アリ○喘息及ヒ百日咳ノ良薬タリ又世ニ所認（三）ラレ
喘急病ニ太食機萎弱ニ起因メ凡氣膨脹ヲ兼發スル酸敗液及ヒ粘
液等ニ殊ニ牛胆大黃等ヲ加ヘ用ヒテ太良ナリ又膨脹ニ用ヒテ太治驗ア
リ○黃疸水腫諸厄利設病萎黃病子宮病依利昆垵兒經久緩慢

ノ下利等ノ如キ壅閉ヨリ生スル諸病ニ効アリ○殺虫通經ノ月經不順或ハ經閉ヲ致ス者ハ之ヲ用ヒテ其寒急ヲ鎮靜シ其壅閉ヲ開達スル中ハ即チ治ス然レト局知ノ嗽衝若クハ尿管ニ血液ノ蓄積タル者然レノ光景アル者等ハ用ヒテ害アリ○運行遲慢ノ粘液積ノ者ハ用ヒテ良ニ(神經熱)本元ニ説ク膏骨疽癰癩瘰癧小瘡骨疽癩疥母度多嶺惡性ノ潰瘍等内外共ニ用ヒテ殊ニ効アリ○一ハヨリ三ハニ至ル○外用ハ灌腸劑トメ一ヨリニクヲ以テ水液ニクヨリハクニ溶ス塗擦劑トメ一クヨリニクニ至ルヲ以テニクヨリ三クニ至ル脂ニ和ス○阿魏丁綫劑一クヨリニクニ至ル日股ス○阿魏膏法元本ニ見ユ

○護謨尾尔拔奴謨此ハハルノ子宮ニ効アルヲ以テ此名アリ作用乳香鎮症解凝通經祛痰ノ効アリ故チ子宮病依利昆垓兒内臟壅閉殊ニ粘液積ヨリ生スル閉肺臟等急ノ感動ニ因テ咯痰所碍セラレ、有胸痛内小液瀦溜及ヒ粘膠物蓄積ノ症アル者等ニ効アリ又或ハ慢性ノ痿疔瘰私痛凡等ニ良ナリ○内用ニハ尼劑乳劑溶劑トシ日ニ一クヨリニクニ至ルヲ用ス外用ニ能ク寒腫膿腺腫等ヲ分解疏散ス○厄尔拔奴謨哥魯加雷母膏ハ分解疏散膿腺ノ良硬膏ナリ

○羯布羅ハムフ

(虚性神至熱及ヒ腐敗熱)精力沈重面色慘澹且ツ濃赤脉弱ニテ教肌膚冷ニテ微シク涅ヒ鄭声独語四支厥冷眼黯濁舌黑苔アル者ハ之ヲ用ヒテ効アリ嗽衝熱嗽衝已甚ナル間ハ害アリ(腸胃熱)胆液熱(聖京依倭)疔瘰新痛凡(身体虚弱)ニ由テ良能病毒ヲ分離スルコトヲラヌメ煩躁ニ暫ラウ神經ノ諸症ヲ瘥スル者ニ良効アリ○肺心胃腸其他ノ諸部ニ病毒轉移スル者殊ニ効アリ○慢性ノ痿疔瘰私病ニ之ヲ用ヒテ屢驗ヲ見ルアリ○腐敗性或ハ慢性ノ痲病ハ太ク効アリ○瘡疹熱珠、痘瘡疔疹赤班熱効アリ(慢性神經病及ヒ瘁瘁病)陰具及ヒ泌尿器病(珠)芒著膜眼ヨリ瘥スル尿血ニ効アリ(壞疽)止腐ノ妙効アリ壞疽ヲ治スルハ衝動ノ性ヲ以テ疽際ノ生肉ヲ奮田發シテ以テ腐肉ヲ分離スルニ由テ之ヲ觀シハ衝動ノ効多キコト居ル消毒○約メ用法一ハヨリ六ハ十ハ迫其収ニ從フテ日ニ之ヲ服ス○外用ニハ羊奶ヨリ合嗽劑一名ヨリ以上ヲ以テ和液○羯布羅丁綫劑ハ生カヲ活潑セントカ為シ洗滌劑ト爲シ外用シテ効アリ○板尔撒謨屋ト佳兒把夫ハ多ク痿疔瘰私痛ニ外用ス

○因性寒然レハ大量ニ用ヒハ血ノ運行増進ス故ニ又性温ノ説アリ少計用ユレハ却テ嗽衝ヲ消シ熱ヲ解ス催腫ノ効アルヲ以テ卒例昏腫病ハ害アリ

○鹿射香モス

竅透衝動鎮瘧發汗ノ効アリ(腐敗熱神經熱)就中生力大ニ振脱シ四支厥冷呃逆其他瘧急指制手ノ諸症ヲ具フル者ニ宜シ(瘧疹熱)皮膚瘧弱ナルカ若クハ瘧急状ノ感動ニ由テ瘧疹快矣セサル者若クハ皮下ニ隠レタル者若クハ已ニ瘧後内陷スル者ニ用ヒテ驗アリ(瘧急指制病後ニ)須私痛瓜(病毒外部)ヨリ内部ノ貴地ニ轉移スル者ニ殊ニ稱アリ(瘧不遂)○内用ハ散九五厘設ルト為シ二匁ヨリ十匁至類脂ス又十匁ヨリ十二匁迄瀉腸劑トシ用フ

○葛私多倭漢

子宮依剥昆兒呃逆心悸動冒ノ瘧痛瘧急等ニ稱シ又子宮ノ虛弱或ハ瘧急ニ因テ癸スル經閉ニ稱用ス○散九共ニ二匁ヨリ十匁至○内丁幾劑十滴ヨリ四十滴至ヲ用フ

○琥珀バルンヂーン

油及ヒ丁幾劑共ニ鎮瘧ノ峻効アリ故ニ子宮病癩痢其他瘧急病ノ効アリ○油ヲ以テ擦劑トシ倭廣須私痛ニ外用ス又阿芙蓉ヲ加ヘテ胸上ニ摩

擦シ百日咳ヲ治スルノ要藥トス

○加那布的油

特ニ右症四肢不遂瘧急子宮病癩痢瘧急様ノ喘息百日咳倭廣須私共ニ多血ノ微若クハ胃腸穢物ノ症アルヲナキ者ニ用フ又能ク水脈ニ乏リ衝動ニ故ニ水腫ニ稱用ス○襪列府油ヲ用メ擦劑トシ倭廣須私痛ニ外用ス又腹脇ニ擦メ視力之弱ニ効アリ○白糖ニ和シ毎滴二滴ヨリ四滴至外用ハ一月ヨリ半年ニ至ル

○寶百尔油ゲールレイキオノリイ

神經諸症ヲ兼併スル間歇熱子宮病癩痢心悸動等ヲ用フ○毎滴十滴ヨリ三十滴至葡萄酒其他適當ノ液ニ和ス日二三回

○垂的児アズワール

第一諸熱病生力太ク虚脱シ脈度不齊數ニ且ツ震物ニ筋惕肉瞤呃逆眩暈ノ如ク神經諸症アル者ニ稱用ス第二慢性神經病即チ粘液中凡ク瘧不遂昏腫病癩痢卒倒心悸動子宮病ニ用フ第三肚腹ノ瘧急論ハ胃瘧瘧急急痧等ニ殊効アリ第四臭菜トシ眩暈假死等外用ス第五天ノ温素ト交カアリ故ニ清涼劑トシ眩暈衛ニ外用ス第六又前法ノ如ク

外用ヲ箱傾貌倭倭ノ其内空氣ヲ含ム者ニ効アリ茅七諸菜ノ効カヲメ
連シ全体ニ通体達セシムル効アリ○冰糖五錢散ルニ和シ与フ十滴ヨリ
二十滴迄頻服ス○兜瀾度碎石劑ハ胆臟ノ結石ニ最モ首稱セリ○忽有満
鎮痛液○主治効本條ニ同シ只ク其力微ナルニ○每服二十滴ヨリ三十滴迄
水或ハ糖ニ和シ頻服ス

○硝石亜的兒アールテル

○甘硝石精

二品共ニ性効同シ然レモ甘硝石精ハ特ニ發汗利尿ノ効アリ○共ニ毎次二十
滴迄水或ハ糖五錢散ルニ和シ頻服ス

○過誤印亜的兒

興奮鎮痙發汗ノ偉効アリ故ニ神經熱腐敗熱若クハ倭テ痙攣痙痛内外
共ニ用ヒテ良シ○毎次二十滴ヨリ四十滴迄頻服ス

○硃砂精

酒毒中風ニ用フ四分時毎ニ十滴ヨリ十五滴ニ至ル○外用ニハ他藥ト配テ擦
劑トシ慢性ノ倭テ痙攣私乳塊等ニ用ヒ又嗅藥トシ眩暈卒扑ニ用フ○硃
砂痙發膏ハ經久慢性ノ痙攣ヲ分解シ吸收機ヲ催進シ諸液ノ骨塞ヲ疏

軟シ疼痛ヲ止メ痙攣ヲ鎮ム○硃砂加燒酒精ハ奮發衝動ノ藥劑ト爲シ
外用ス○硃砂加過泥子精ハ虛性ノ肺臟粘液ノ諸症ニ用ヒテ痰飲ヲ稀割ス
○十滴ヨリ二十滴ニ至ル○硃砂揮發精四十滴ヨリ六十滴ニ至ル○硃砂華十二
時中三々ヲ服ス○硃砂華情三十滴ヨリ六十滴迄水若クハ酒ニ和シ服ス

○麻角塩

散丸溶液共ニ二時毎ニ二瓜ヨリ十瓜ニ至ル○月精毎次二十滴ヨリ三十滴迄水若
クハ酒ニ和シ服ス○麻琉精二十滴ヨリ六十滴迄○右六ニ刺戟衝動鎮痙發汗ノ
峻効アリ故ニ熱性及ニ慢性神經諸症痙攣性ノ喘息胸水病ニ發効發スル
痙攣性ノ胃腕痛及ニ腰痛等ヲ鎮定スルニ奇驗アリ

○昆斯密谷

其因唯胃神經ノ知覺過敏ナルヨリ未ル痙攣性ノ胃痛及ニ嘔吐ニ謹慎又
之ヲ用シハ峻効アリ○一時毎ニ半瓜ヨリ一瓜迄阿芙蓉砂糖テ浸濕失更等ニ
和シ与フ間又已ラナキノ位地ニ至テハ五瓜ヲ用フルニ至ル○胃ノ痙攣性ノ
胃部壓迫ノ二症ヲ根治スルニヒスミコクノ如ク擊撃ノ○此品ハ能ク其性カヲ
粘液腺ニ達セシム故ニ胃腸ノ衰弱或ハ粘液腸胃中ニ蓄積スルニ由テ生ス
ル諸病ニ効アリ良薬ヲ見ス三瓜ヨリ五瓜迄日ニ三四次之ヲ與ヘ三週或ハ四

週間持重セシム○子宮病依利昆垓兒月經將來ラシムルハ症率ヲ發スル者等ニ用ヒテ根治ノ良薬トス

○更鉛華

因發汗劑トス或ハ吐劑下劑トシ用ユルアリ脈量四ハヨリ十二ハ

痘瘡特ニ惡性稠密ノ痘瘡出有急慢若クハ煩序ヲ失ヒ尚且昏冒謔語搐搦水瀉小便水ノ如キ諸症ヲ發スル者ニ殊功アリ此症ハ痘瘡内陷若クハ咽虫若クハ生齒等ノ諸因アリテ發スル者ニ○不皂白ク小兒ト虫凡能ク服用ス之ヲ以テ小兒搐搦狀ノ諸病ニ概用メ一良薬トス○散劑ヲ良トス一ハヨリ六ハ十ハ追糖廣屈溼失重等ニ和シ一時或ハ一時半毎ニ用フ○點眼水トシ十ハヨリ二十ハ追シ液一多ニ溶化ス又眼膏トナシ十ハヨリ二十ハ至テ脂ニクニ和ス或ハ阿芙蓉四ハヨリ六ハ至テ用フハモ可シ

○硃銅礬

癩癩病ニ殊効アリ○身體嬌柔稟賦粘液積メ病因ハ筋纖維弛緩神經衰弱神經感觸シ易キ等ニ在テ尚經久ナラサル者ニ之ヲ用ヒテ多ク治驗アリ入舞蹈病ニ効アリ○散九溶液ト為シ半ハヨリ一ハ追頻服シ肢後患心ヲ覺ユルニ至ル然レハ吐ヲ發スルニ至ル可カラス

○消酸漿 腐蝕劑ノ條ニセツ

○阿芙蓉

扶歇蘭土曰ク水樹根エキニハ一醉止痛鎮靜ノ効アリテ血管系ヲ興奮ヒカルハ恰モ菲汰私マンダラケ等ノ如シ 務私多曰ク阿片ハ三歳以下小兒ニ用ユルヲ禁ス 扶氏曰諸種ノ外部瘰癧肉ニ外用スレハ漸々ニ潤萎シ遂ニ全治スルニ至ル

興奮止痛鎮症催眠其他皮表ノ蒸氣ヲ發シ大便及ヒ諸液ノ通泄ヲ減却スルノ効アリ○第一ニ神經熱腐敗熱ニ不寐劇痛等症搐搦及ヒ煩躁謔言妄休時ナキ者衰耗下利等ニ用フ○昏睡鄭声感觸遲鈍腸胃汚物蓄積經久ノ便秘血液頭腦ニ輻湊スル等ノ症アル者ニ害アリ○第二ニ間歇熱居多ノ神經諸症若クハ暴慢ノ吐瀉崩下利霍亂持久劇甚ノ戰寒其他危險ノ諸症ヲ兼發スル惡性ノ間歇熱ニ効アリ○其熱熾衝性ニ者血液頭腦ニ灌漑スル者第一道汚物滯積セル者大汗淋漓者ノ如キハ之ヲ禁ス○第三ニ嗽衝病純嗽衝病ハ阿芙蓉ハ大害アリ然レハ刺給消嗽劑等ヲ行フニ由テ其盛製己ニ減退シ特リ症率ノ景況ヲ遺ス者ニ惡薬ナリ○第四

麻

嗽衝性ノ瘡疹病一痘瘡疔疹赤斑熱等嗽衝ノ時期ニ於テハ毫モ之ヲ用
ズルヲ得ス然レモ名哲ノ説ニ從ハハ痘瘡灌膿ノ期ニ方テ良膿ヲ醸サス却
テ水様ノ酷后液ヲ生シ或ハ瘡頂平塌惡色ヲ生シ肌膚蒼白ニシ且知覺ヲ
失シ或ハ痘忽シ然レモ萎茶ニ化ラシテ果粒ヲ分クヌ脈細數呼吸不利且呻吟
声嘎四支厥冷居多ノ神經症蜂起シ惡臭ノ衰耗下利ヲ發スル者ハ欠ヘカラサ
ル要茶タリ○殊ニ身急様ノ咳嗽持久ノ患者困苦スル者初頭劇勢ノ泄瀉ヲ發
スル者内陷スル者殊ニ良効アリ○不腫ノ後続ヲ免メ殆ントテリユムトレノ
ノ如キ謔言ノ症アル者ハ世間殊ニ多ク符用スル所ノ刺絡寒奄法滴浴法前
フルヨリ其効勝レリトス○第五(倭廣真私)遊之倭テ復私若シ内部ニ轉移
スル者ハ之ヲ他ノ衝動發汗茶論ヘハ絹布羅麝香等ヲ用ヌ殊ニ効アリ且ツ
疼痛已甚全體之カ為シ瀉瘦スル者ハ欠クベカラサル要茶タリ○第六(泄瀉)
痢病一腸胃汚物アル者多血若クハ嗽衝ノ微アル者ハ太タ害アリ○腐敗積
若クハ神經損ノ惡性痢或ハ流行性ノ痢疾ハ連テ阿芙蓉ト幾那トヲ用レテ
其惡症ヲ避ケ患者ノ精力ヲ保持スヘシ○第七(霍亂)柱皮肉豆蔻等ヲ配
伍ノ霍亂ノ一良茶トス○第八(吐瀉)然レモ其因嗽衝ニ在ルカ若クハ多血ノ入若
クハ器械様ノ刺衝ニ在ル者ハ阿芙蓉害アリ○第九(慢性神至病)強直牙

関以緊急恐水病癩痲瘋癩瘡及シ搗擧等々ハ多量ニ浮血メ後之ヲ
用フヘシ呢逆芽十(テリユム)トレノ芽十一(梅毒)アマリ効アル者ハアラス○第十
二標疽○第十(三)線腫病疼痛アル線瘍ハ良効アリ○又点眼中ノ他茶トヌ
瘰癧復ノ嗽衝ニ用ヒテ効アリ又聖京極性ノ眼嗽衝ノ芽二期ニ於テハ了絨
劑ヲ以テ峻効アリ○第十四(黃疽)○第十五(腐敗性金石毒)○第十六(外用
トシテ説ク所ノ諸病)ハテハ皆外用スヘシ就中搗劑注射劑入局知傳法ニ從
フテ点眼水トシ局知ノ痲痺疼痛ヲ鎮ム○痲痺ニ因テ發スル内臟ノ痲痺痛癩
面痛耳痛翹齒痛梅毒ニ發スル骨痛癰腫皆効アリ○内用ハ散凡溶液
外用ハ灌腸塗搽軟膏硬○四分ハヨリ半ハ至ラテ頓服ス若クハ數服ト為
シ一日ニ數スベシ然レモ其症危險ニメムトフ得サル者ハ四分時若クハ半時毎
ニ服スヘシ故ニ筒方及張牙閉緊急ノ如キハ徐々ニ二十ハヨリ尚多量ニ至ルヲア
リ與奮奮ノ効ヲ得ント要ヒハ半ハヨリ一ハ至ラシテ静息鎮痲症催腫ニ非
ノ効ヲ要セハ一ハヨリ三ハ至ラ用フベシ是共大較ニ○灌腸劑ハ内服常量ノ
一倍ヲ用フベシ多シト雖モ二倍ニ過クベカラス是他ノ腸管ハ甚タ阿芙蓉ニ感
動シ易キヲ以テシ○阿芙蓉瞑眩ノ微ハ昏瞢謔妄昏眩頑固ノ便秘大汗
淋漓トモ阿芙蓉具ヲ帶ヒ顔面赤盈呼吸短促不利中風搦搦ノ如キ是ニ

○阿芙蓉越幾私劑ハ三分ハノ一ヨリ二ハ乃至幾ハヲ頻服ハ外用ハ半ヲ以テ四等或ハ六等ノ液ニ溶シ射注劑トシ用ユ○阿芙蓉酒同下發三滴ヨリ五滴十滴至ラ單用シ若クハ孟儀設ルニ和シ用フ○此液十滴ニ阿片一ハヲ含ム外用魚眼水射注劑ニ加用シ或ハ角膜膜醫ニハ單味一滴ヲ取テ眼中ニ点スルヲ日ニ三次○含電華謨阿芙蓉液此液十二滴中ニ四滴ヨリ八滴十六滴尚多量ヲ膠○把歇尔私允汗散ハ諸病ニ用ヒテ發汗ノ良藥タリ○阿芙蓉硬膏○丹軟膏○莫尔比捏外用ノ百日咳顔面痛肩痛及張暴吐シウマタルギキ等ヲ治ス入醋酸莫尔比捏或ハ塩酸莫尔比捏ハ四分ハノ一ヨリ半ハヤク至ラ取リ創傷ニ撒捺スルヲ日ニ二三回ニ良シ○又此塩ヲ以テ製スルノ劑アリ即チ醋酸莫尔比捏合劑別一時半毎ニ一茶匕ヲ与フ○硫酸莫尔比捏合劑別主治日前○莫尔比捏鎮痛液六滴ヨリ増加メ二十四滴ニ至ルベシ○納尔哥德捏○革德乙捏

○聖藥教ホルレン

哮喘ヲ治シ又和胸藥ニ伍用メ哮喘性ノ咳嗽ヲ鎮定シ瀉腸藥トメ痢疾ノ寤迫拘痛ヲ兼治スル者ヲ停ム○琶布若クハ蒸濕劑トシ用ヒテ痛傷痛腫ヲ治ス○煎劑ハニテヨリ四テ至ラ以テ煎メ四テヨリ六テ至ラ取ル蒸濕劑瀉腸劑

○底里谷茂私

劑ニハ半テヨリ一テ至ラ以テ煎メ六テヨリ八テ至ラ取ル○同合劑別此藥一テヨリ以テ阿芙蓉一ハノ効カアリトス○一テヨリ二テ至ル
唯々催腫止痛鎮咳ノ性ノミアリテ絶テ熱トテ醉ノ性ヲ故ニ熱病嗽衝病ニ於テ靜息催腫之咳止吧鎮咳等ノ効ヲ要スルニ其症阿芙蓉ヲ用スヘキノ位地ヲシモ熱ノ象況アルカ故ニ阿芙蓉ノ刺衝性ニ嫌アル者之ヲ用ヒテ殊ニ功アリ○痰喘ノ胸痛及ヒ咳嗽ハ突芙蓉利私ヲ伍用シ腹痛ハ阿芙蓉ノ加ク使用ヲ起ラズ子宮家病及ヒ依利尼捏兒家ノ恐憂煩悶勞瘵家ニ於スル煩悶疼痛痰喘性ノ咳嗽等ニ効アリ又眼嗽衝感觸過敏ニメ大ニ差明劇痛ニ粘液ヲ分泌スルヲ過多ナル者ハ之ヲ以テ点眼水若クハ卷貼劑トメ妙アリ分量ハ五ハヨリ二十ハ至ル

○菲次私失血母私コロン

○小兒ハ一ハヨリ漸ク加ヘテ四ハ至ル或云一歳ノ兒ハ日ニ二ハ宛与ヘ二歳以上ハ漸ク加テ日ニ四五ハテ用フ小兒ハ多量ニ耐テ眼眩少ナシ此ノ醉性ハ殆ント阿芙蓉ノ敏ニメ熱ト衝動ノ性ヲク又便秘スルヲナシ○若大量ヲ用テ惡心嘔吐眼暗耳聾昏眩瞳子散大顔筋胸動脈細數ニメ

震揚の紅血皮下で滲溢して終て斃るゝに至る○(熱性病)神經病居多症
享症或ハ神經症或ハ大頭痛譫忘不寐搐搦等急性ノ咳嗽若クハ嘔吐
ヲ夾ム者ハ良驗アリ○嗽衝熱已ニ十分ノ消嗽療法ヲ行フノ後唯衝
動症享疼痛ノ模様ノ遺留スル者ハ俾効アリ殊ニ呼吸器ノ嗽衝病症
享性ノ咳嗽ヲ發シ患者頻ニ之ヲ壓息スルハ鎮嗽劑ヲ爲シ用ヒテ奇効アリ
胸腹諸臟症享ノ感動症享性ノ喘息百日咳密爾羅而ノ喘息病
霍亂小便不利及ニ小便閉等其因止ニ症享ニ在ル者等ヲ治ス○凡菲沃
私失血母ノ量ハ一歳ノ兒一日ニ二ハラ尙其年記ニ從ヒ衛リ倍加メ四ハ若
クハ六ハ至ルハ搐搦性ノ慢性遷延神經病劇甚ノ倭テ復私痛伊低葛
痛顔面痛齒齒痛等ノ如キ皆効アリ(硬結腫)閉塞殊ニ瘰癧瘰ノ硬結
腫若クハ閉塞等ニ良ナリ外用軟和分解鎮疼止痛ヲ効アリ故ニコキルウセニ性
ノ硬結腫癰腫及ニ眼嗽衝等ヲ治ス○内用ハ必ス越幾私劑ヲ以テ散九溶劑
トラス小兒ハ一ハヨリ四ハ迄ヲ以テ極トス大人ハ三ハヨリ五ハ至若クハ之ヲ加増スルニ漸
ク以テスルハ尚多量ニ至ルヘシ但シ一頓ニ多量ヲ用スヘカラス○外用ハ葉ヲ以テ
琴布茶囊軟骨灌腸劑等ト爲シ用フ○内油効能脂油眞茶生滑茶
緩和茶ニ内シ○菲沃斯子油靜息鎮疼止痛ノ効アリ○菲沃私昆設尔弗

○百日咳ヲ治スルハ白頭翁エキヌヲ以テ菲沃私莖若等ニ勝レリトス

因越幾私外敷メ鎮痛緩和軟化解凝疏散ノ良薬トス葉ハ外敷メ血
液過盛ノ運行ヲ鎮靜シ嗽衝ヲ消シ清涼止痛鎮疼緩和軟化疏散ノ
峻薬トス

○莖若 ナクトレカドレ和名ハシリトコロ
ドムレベツセン

有毒テ醉薬中ノ巨魁タリ此毒ニアタレハ死ニ至ルヨリ用ユルヲ注意スヘシ○慢
性ノ倭テ復私病若クハ神識ノ諸病論ハ骨憂病癩狂病子宮病依刺
昆徑兒等ニ良効アリ殊ニ此諸病其因皮膚病ノ内陷或ハ居恒漏泄スヘキ
血ノ閉塞或ハ脈内諸臟ノ瘵閉ニ在ル者ニ奇効アリ然レバ嗽衝ノ景况乃知ノ
充血及ヒ血液灌注脈部ノ神經感觸銳敏等ヲ兼ル者ハ共ニ莖若害アリト
ス○茶食共ニ受ルニ能ハス燕下スル毎ニ即吐出スル者ニ莖若末ヲ糖ニ和シ用
フレハ吐ヲ直下ニ鎮靜ス且此茶ハ小兒ニ用ヒ易キヲ以テ尤妙トス但シ之ヲ用フルハ
切ニ小心メ咽喉乾燥昏憤等ヲ發スル至与フヘカラス又肥胖多血ニ人善ク長
育スル兒此病ニ嬰レハ大約初頭血スルカ若クハ血頭腦ニ輻迫スル者ニ此ノ如
キハ用ヒテ害アリ○初生ノ兒ハ先ツ始メテ茶ヲ朝夕八分ハヨリ四分ハ至ヲ与フ一
歳ヨリ二歳ノ間ハ四分ハノ一ヨリ半ハ至ル其他小兒ノ年記ニ從ヒテ二時中三ハヨ

リ尚多量に至るべし但し量ヲ加増スルハ経々ニ且彼是に注意スヘシ○瘰癧腫ヲ分解スル之良薬ナリ○亦班熱に効ル薬劑四方ヲ掲ク○茅一方良越幾私三氏莖溜水二号焼酒一号右混和し患者ノ年記に從ヒ一滴ヨリ二滴至ラ美味ノ液ニ和シ一時若クハ一時半二時毎ニ与フ○茅二方良莖根ニハ白糖十号○茅三方良莖根ニハ糖ニ号○茅四方良根ニハ糖ニ号共ニ取量元本に見ユ○良越幾私ハ外用ノ能ク鎮瘻ノ効ヲ奏ス故ニ眼ノ内部ノ疼痛子宮口ノ挛急肛門括約筋挛縮等ニ良ナリ

○蔓陀羅華 アトルン

慢性ノ神經病神識病乃チ尙憂癩狂峻重ノ搐制手瘻挛痲痺呼吸器ノ挛急病喘息咳嗽百日咳等ニ良シ慢性ノ痿广積私病ニ殊ニ良アリトス○月越幾私劑散九トシ十二時中ニ半ハヨリ一ハ漸加メ五ハ至ル○月丁幾劑催腫鎮痛ノ良薬トス顔面痛ニ摩擦スルヲ日ニ二回メ良シ

○失鳩苓 ドルレケ

因凝結ヲ溶解シ蒸氣ヲ発泄シ疼痛ヲ止ル効アル故ニ梅毒ノ潰瘍ノミナラズ然テ經久ノ患后潰瘍腐骨疽疔内外用ヒテ同々偉効アリ○瘰癧病状ノ遠和閉塞結節腫潰瘍皮膚病等微熱アリト雖モ之ヲ恐ルハナク

内外共に用ヒテ効アリ又胸腹諸臟ノ挛急病百日咳喘息殊ニ其喘急肺臟ノ木節腫ヲ兼ル者胃瘻挛急性ノ呃吐等ニ亦用ス○水銀瘰癧瘻木羯布羅等ニ位メ遷延痿广積私及ヒ痛風慢性延年ノ梅毒等ニ佳ナリ○新鮮絞汁ハ十滴ヨリ二十滴至越幾私劑ハ二ハヨリ漸ク加ヘテ二十ハ服スヘシ乾中ハ性力耗失メ効ナシ又失鳩苓子丁幾ヲ以テ最峻カノ製劑トス○外用ハ生中ハ獨爛者一多ヨリ四号至五号布若クハ蒸劑漏トナシ破潰セハ腺腫及ヒ癌腫瘰癧痛アル潰瘍等ニ用フ

○番木鱉 ブラクノレーテン

殊ニ脊髓及ヒ脊髓ノ神經ニ之ヲ其カラ逞シクス○广癱手腕足脚膀腕等ノ广癱且ツ广癱ニ因ラ発スル所ノ小便閉尿遺黑障眼々眩广癱入想回ノ間歇熱遷延下利等ニ効アリ○末ハ三ハヨリ十五ハ至然レモ末ニ難シ故水製衣越幾私ヲ用フニハ至又虫兒固尔製衣越幾私ハ其性力太ク猛シ一丸ハヨリ二ハヨリ合ム之ヲ用スルハ先ツ十二時中ニ一丸ヨリ二丸至ラ腋マシテ漸ク加ヘテ筋肉痛動スルニ至ルヘシ○私的列幾泥程ハ大人ト量ニ十二時中ニ四分ハノヨリ半ハ至ニ過カス殊ニ痿广積私ヨリ余スル所ノ食味ヲ覺ユサル等ニ用フ○月丁幾劑六滴ヨリ二十四滴至適當ノ液ニ和シ服ス

○雙葉烏菊 モンニクス マクニワト

痛風慢性ノ後一復私等些モ熱状ヲ見ル者經久ノ標毒病等ニ効アリ○
越錢私劑ハ十二時中ニ入ヨリ四八八氏ニ至ル

○実艾答利私 コロド、エンゲル

工私曰ク此系ハ胃ト尿道諸器ノ神經ヲ刺衝スル効アリト云
「誓苗熱間歇此肌膚乾燥メ太ク灼熱シ脉数譎安口渴失血ノ畏レシ者
用ユ○欲衝ノ時期ニハ必ス害アリハ失血殊々咯血崩漏及ヒ妊婦脱血流産
ニ傾カントスル者等之ヲ用ヒテ可シ「利尿」專ラ利尿ノ性ヲ以テ効ヲ奏スル
アラズ唯是ニ兼併セル等急諸症ヲ鎮靜スルニ大効アリ「瘰癧諸病」殊ニ
小兒惡液積ノ容自アリテ肛腹脹滿硬緊スル者ニ太ク効アリ「肺勞」就中フ
ロリダ勞ノ患者其須知覺過敏ナル者若クハ其病ニ嬰ルノ前咯血者若クハ
此病ヲ發スヘキ遺癖アル者ニ効アリ心臟及ヒ大脉管形器状ノ缺損ニ於テ劇
甚ハ心搏動ヲ鎮靜スル始息劑トシテ実艾答利私甚ク妙効アリ○散若クハ
九トシ年紀ヲ較計サハ分ハノヨリ三ハ至服スル一日ニ二回若クハ三四煎劑若クハ
浸劑ハ一カヨリ一カ至煎メ或ハ浸メ六カ或ハ十二カヲ取ル○寒艾答利私ヲ久服
スル者ハ屢々ニ揮発衝動芳芳ヲ如ヘ努力テ其害ヲ制スベシ○実艾答

利私丁錢劑十滴ヨリ二十滴ヲ服ス 因泻下ノ効アリ
○青酸 ブライウミール

此物大毒アリ但シ他液ヲ以テ適宜ニ稀薄シ謹慎メ之ヲ用フルハ肺ノ知覺非常
ニ過敏ナル者胸ノ變急諸症遷延ノ咳嗽等ニ効アリ又或ハ肺勞ノ初起ニ
驗アリト云○青酸利葛更私溶液ヲ以テ止痛ノ劑トシ外用ス

○老利兒結爾斯 ラウケル、アヒス 代用桃葉水或ハ新枝皮ノ蒸溜水
因此毒ヲ解スルハ乳汁ヲ良トス或ハポトアス右鱸ヲ用フ

老利兒水ハ氣味苦扁桃ノ如ク一醉ノ峻性アリ十滴若クハ二十滴ノ少量ヨ
リ漸ク加ヘテ六十滴或ハ八十滴ニ至ルハ次ニ列スル所ノ諸病ニ用ヒテ効アリ
○「第一」肚腹閉塞就中門脉閉塞及ヒ其ヨリ續發スル所ノ諸病殊ニ又瘧疾
症ヲ兼發スル者ニ効アリ○「黒胆液」閉塞ニ由テ發スル所ノ依利兒瘧疾子
宮病前憂病等ニ効アリ蓋シ黒胆液ノ患者毎ニ前憂シ肚腹重キヲ覺
ハ面色慘黯腹軟ニメ膨脹シ脉動不着大便敗色粘膠ニメ屢亦稀涼トナル
「第二」瘰癧病腸間膜壅塞等ニ効アリ殊ニ小兒肛肛緊脹シ隨テ食ハ
隨テ飢工飽食却テ瀉瀉瘦シ肺凉息臭ノ大便ヲ多泄スル者ニ良効アリ「第三」
呼吸器ノ瘧疾諸病論ハ百日咳瘧疾等ニ俾驗アリ「第四」眼水トメ

瘰癧性眼腫ヲ治シ洗劑トシ經久ノ剝脫顔ノ小疹ヲ洗フ又鎮痛ノ峻効
アルヲ稱ス即チ之ヲ以テ片ノ毛布ニ蘸シ痛處ニ敷ク

○埋草タハク

溺死ニ灌腸劑トシ太タ効アリ又劇勢ノ事急症症率性ノ箱頓貌倭僂ニ
良効アリ但し喉衝脫疽等ノ膿アル者切ニ警戒ヲ加フヘシ○散トシ頭ノ聖宗
促病黒障眼等ニ噴茶ト為シ用フ○浸煎ノ兩劑ハ一タヨリニタ至テ取リ
煎メ十二タヲナス

○麦奴ムネ

一第ニ胎産諸症卒穂ナリニ雖ヒ子宮ノ全体若クハ局知ノ衰弱アルニ因テ
陳痛弛怠緩慢ナル者ニ効アリ一第ニ分娩怠慢ノ者及ニ其怠慢ニ由リ
陣痛止マヌメ続テスル所諸病ニ用フ此症ハ太タ強實ニ且ツ粘液類ノ婦或ハ
房勞婦ニ多ク之レ有ル者ニ一第ニ死胎殊ニ久ク子宮ニアル者ハツトテ諸
徴ヲ考究メ其死メ後時ヲ經ルハ久クシキヲ知ルスルハ乃チ麦奴ヲ催テ
母体ノ危険ヲ極フベシ一第ニ四燒期未タ至ラサルニ胎衣宮底ヲ離ルハ太ク
早ク因テ失血シ而メ胎衣未タ宮口ニ出サル者ニ麦奴ヲ用フハ一第ニ子宮ノ率
縮ニ係リ一タハ子宮率縮スルカ故ニ胎衣ニ相壓迫メ出血即チ已ム一第ニ五分

燒後胎衣已ニ宮底ヲ全ク落テ去ルニ論ナク或ハ子宮官能ヲ失スルカ或ハ
一箇妨礙アツテ率縮スルニ能ハス以テ出血ヲ為ス者ニ効アリ一第ニ胎衣
ヲ送下ス○用フルハ産婦ノ病症ヲ窺テ用フベシ詳カニ元本ニ見ユ○経閉若
ハ崩漏其因子宮ノ弛緩ニアル者ニクロシムヘンアメルニカヒ哈血白帶下尿血
衄血等ニ殊ニ稱セリ○散劑ハ六タヨリ三十タ至テ煎服ス浸劑ハ二タヨリ以テ浸
出し流シテ四タヨリ取ルハ小半時毎一食ヒテ脈ス煎劑ハ一タヨリニタ至テ煎メ三タ
若クハ四タヨリ取ルハ小半時若クハ八分時毎一食ヒテ用フ

○羅賓侃斯フキフチ

円丁幾劑瘰癧瘰癧ノ眼眼腫ニ顔面ノ瘡疹ヲ兼發スル者ニ用ヒテ妙効ア
リ十滴ヲ水ニタ溶和ス大人ハ日ニ一哥喜ヒ小兒ハ丁幾

○解凝劑

疏利解凝茶

○食塩

灌腸劑トシ漏泄疏通ヲ催進シ洗滌卷貼浴等ノ諸劑ト為シ肌表ニ供用
メ能ク腺ノ硬結腫ヲ分解シ又朝温卷貼劑トシテ水腫状ノ腫水貌倭屈挫傷
或ハ血頭腦ニ輻添スル者中風等ニ効アリ殊ニ中風症ニハレキレクスルハ人ノ寒卷法

方著効アリ此方ハ食塩硝砂ヲ石炭トス粘液性ノ咽喉焮衝ハ含漱劑ト
シ用ヒテ効アリ○一月ヨリ一ヶ月至水ニ溶化シ服ス○外用ハ二ヶ月ヨリ一ヶ月至ル
○海水 アタラクワ、コリナ

内用ニ疏軟解凝固達刺衝ノ効アリ故ニ能ク腺ノ硬結腫ヲ消散シ吸収
管ノ力能ク増進ス又海水冷溶法ハ能ク肌膚ト其他ノ分泌孔ヲ健運シ
殊ニ神經弛緩シ感痛過敏ナル者ハ海濱ノ波浪中ニ浴メ能ク其弛緩ヲ強
壯シ因テ精力沈衰ヲ治染ス故ニ海水溶ヲ用フルハ其時宜マ從テ温浴ト冷浴
トヲ撰ムベシ○水尿管弛緩シ其官能萎衰スル者水腫ノ僻アル者及ヒ水腫
病ニ効アリ但シ此病ニ之ヲ用フルハ最モ謹慎ヲ加フベシ○慢性ノ痿テ眞諸病
顫振搖製ニ辨等ノ如クハ注意メ冷溶法ヲ行ヘハ極メテ良シ○海水ハ葡萄
酒乳汁水ヲ使ヒ喫スヘシ始ヨリ多量ニ用フルハ困悶嘔吐暴瀉等ヲ發スルアリ
大約一麦酒盞ニ麦酒盞三盞至ラシラス

○硝砂

困尤モ揮發衝動ノ峻茶ニメ神至熱ニ用スルハ其効阿比ニ近シ過用スルハ
衝動太過ニシテ血液溶解シ汗漏泄メ虚脱スル恐アリ
粘液ニ因テ起ル所ノ間歇熱粘液熱ニ苦味香竈茶ヲ併用メ屢卓効ヲ見ヘ○

○酒石葉

聖京僞熱僕ノ積私熱ニハ能ク稠痰ヲ咯出セシメ加之汗尿ノ兩道ヨリメ能ク
吉利者私ヲ促スヲ以テ殊ニ効アリ然レ氏民埜列利精ヲ勝シラス粘液性ノ
咽喉焮衝喘息腺腺ノ閉塞之ニ由テ起ル所ノ黄疸水腫子宮病依利
昆埜児月経不順痔疾効アリ○含嗽劑トシテ粘液性ノ咽喉焮衝ニ用ヒテ
洗滌並漏浴湯琵琶布硬膏等トシテ中風頭瘡挫傷皮下若クハ關節間ニ血
液溢出水腫様ノ腫乳ノ結核ニ用フ○丸若クハ溶劑トシ五々ヨリ二十氏至一時
一時半毎ニ服ス孟侯誤爾劑トナスハ一ヶ月ヨリ三ヶ月至ラテ孟侯誤爾六ヶ月
ヨリ八ヶ月至ル知シ甘中膏ヲ加ヘ毎一次抄ヒテ用フ○外用ハ一ヶ月ヨリ一ヶ月至ル
○酒石葉 ポピリン、コニール

困性緩和ニメ刺戟セズ熱性ノ入ニモ害ナク寒性ノ入ニモ尤モ良シ性効大抵
孕酸酒石ノ如シ刺戟更私ニ醋ヲ加ヘ製スル者ハ泻下ノ効ナシト雖レ利尿
ノ効多シ飲食消化ヲ妨ケス能ク蒸氣ヲ發ス
一月ヨリ一ヶ月至ラテ用ヒテ能ク汗ヲ發シ小便ヲ利ス二ヶ月ヨリ三ヶ月至ラテ用ヒテ緩和
涼清ノ下劑ナル故ニ胆汁性ノ間歇熱及ヒ熱背留熱黃疸水腫殊ニ卒然トメ
冒寒スルモ後或ハ熱性瘡疹病及ヒ赤班熱ノ後ニ發スル所ノ水腫ニ効アリ
又肚腹閉塞之ニ由テ起ル所ノ痔疾依利昆埜児子宮病ニ良シ○酒石葉

液一タヨリニタ至

○酒石葉日明

溶液ト為シ用フニタヨリ半タ至ル殊ニ清凉利尿ノ劑トシ用フ

○稀軟解凝茶

○固性亜ル加里

内用ニハ多量ノ水ヲ以テ稀渙スヘシ其稀渙セハ者ハ制酸利尿碎石鎮痙稀軟解凝ノ効アリ○外用ニ供メ能ク腫瘍ヲ破潰シ疣贅息肉ヲ腐蝕シ狂犬咬傷ヲ治ス○稀軟劑トシ用ヒテ諸般ノ險症ニ効驗アリ即チ喉衝病將ニ凝着糞液ヲ滲出セントスルノ大礙アル者論ハ義膜喉衝咽疾産婦ノ膜喉衝等ニ必用ノ品タリ但シ喉衝劇勢去テ後方絶テ之ヲ用フヘシ否ハトハ害アリ○利尿ノ偉効アリ故ニ水腫病ノ要薬トス殊ニ水尿管ノ力能萎衰若クハ腺ノ閉塞及ヒ硬腫若クハ諸臟ノ閉塞等起ル水腫ニ効アリ又阿芙蓉ニ代用メ筋神經ノ寧急ヲ鎮静セリ○全身浴然テ浴湯トシテ難不遂事急指搦遷延俟テ痙私痛ヲ治ス腺ノ硬結腫及ヒ羅斯性ノ骨膜喉衝ヲ分解消散ス又之ヲ腺疽ニ用ヒテ確効アリトス其法患指ヲ以テ頻々濕灰汁中ニ蘸ス

○刺萵更新

腐蝕ノ性アル故ニ内用ニ供スルハ水ヲ以テ大ニ稀軟シ粘滑液ニ和シ更ニ謹慎ヲ用フヘシ○腺病碎石ノ杯アリ碎石劑(ニキチクキア)液ニ和シ者即チ是ニ腐蝕劑トシ外用ニ確効アリ又浴湯蒸滌劑トシ用ヒテ痙挛指搦ヲ治ス全身浴ニハ一タヨリニタ至ル蒸滌劑ハ一タヨリニタヲ以テ液三十六タ溶解ス内用ハ四分ハ一ヨリニハ至ラ液一タ至ル知ス

○酒石塩

主治効用大概固性亜ル加里塩ニ同シ○之ヲ以テ阿芙蓉及ヒ其他ノ解薬ト互用シ痙挛指搦諸病ニ用フ其方酒石塩ニヨリ一タ至ラ以テ清水四タ至ル容化シ一時毎ニ二食ヒテ取テ阿片一タト伍用ス阿片ハ漸ク其量ヲ倍加スヘシ但シ患者之ヲ脈スルノ間(テ)ヒスコウチクスニ一タヨリニタ至ラ溶化セル温浴ヲ行ヒ又石鹼中ニ朝王塩ヲ溶化スル者ヲ以テ灌腸法ヲ施シ便秘スルヲナキヲ要スヘシ○炭酸亜加里水ハ碎石ノ効アリ○酒石塩ニタヨリ檸檬汁(或ハ檸檬)ヲ灌キ飽饑ニ沸洋全ク止ムニ至ル是ヲ驅痰鎮吐飲(ボク)ト云清凉劑ノ條ヲ参考スヘシ○炭酸刺萵更新(ポト)ト云トフニテ効用酒石塩ニ同シ浸蝕ノ性ニテ散溶ニ劑ニ用フ十ハヨリ二十ハ至ル

○ 鹽蓬塩晶

酒石酸ヲ配メ酒石塩ト成シテ鎮吐散ト爲シ清凉劑酒石酸ノ條ヲ參考スヘシ

○ 石鹼

嬰女児ノ酸敗液ニハ苦味香竄系ヲ加ヘテ位シ○慢性ノ倭テ復私痛及痛風痛ニハ内外兼用スベシ但シ衝動發汗業利屈福烏葛錫布羅安復母厄劑等ヲ加フベシ○肚腹ノ壅塞及ヒ其ヨリ發スル所ノ諸病論ハ肝脾腸間膜腺等ノ壅塞黃疸水腫腺痛等ニ驗アリ○結石ニハ勿擲癸更石鹼ト牡蠣灰ヲ配伍シ用フ○洗滌莖瀉瀉腸劑トシ用ヒテ亮腫乳汁結腫血液溢スル等ヲ消散ス○凡劑若クハ溶トシ用フ一ヨリ一ヨリ若クハニテ至ル○石鹼膏分解消散ノ効アリ○謁多私列爾首稱スル所法効ハ表皮弛緩セシ者及ヒ弛緩ニ由テ胃寒倭テ復私病ニ良薬タリ用法ハ温湯ニ溶化メ全身ヲ洗ヒ又ハ直チニ之皮ニ塗擦メ乾枯セシム方白石鹼 十六号 阿列襪油五号 錫布羅

○ 硫黄

此薬ハ石胆油石炭琥珀膏凡、如キ土中ニ生スル華尔私、總稱シ 医業ニ供スル者ハ硫黄華ニ効能許多ニ即チ下泄解凝發汗祛痰ノ効アリ

殊ニ肚腹ノ血管諸部ノ粘液膜及ヒ表皮ニ走リ連テ全身ニ弥蔓メ硫黄身ヲ蒸氣シ身ニ銀器ヲ帶ル者ハ變メ黑色トナル門脈壅塞ニ肚腹膨脹月經不順若クハ經閉等ニ効アリ(痔疾)痔血閉ニ由テ頭脚及ヒ其他ノ諸部ニ血液衝撞輻湊スル者ニ殊効アリ(慢性)倭テ復私及ヒ痛風經久ノ胃寒及ヒ粘液性ノ喘息ニ皮膚病ニ殊ニ疥癬ニ卓効アリ(中毒)ニ効アリ○散劑若クハ煉茶トシ用フ症ニ從テ一ヨリニテ至ル○泥瀝硫黄ハ主治硫黄華ニ同シ○硫黄更テ油ハ疥癬美ノ瘡疹ヲ治ス○硫黄的列並油ハ瘰癧性ノ硬結腺腫ニ外用ス○硫黄用ス○硫黄疥癬膏ハ疥癬ヲ治ス○硫肝ハ解凝發汗祛痰ノ効アリ又粘液性ノ喘息遷延ノ胃寒脚水腫等ニモ亦大ニ稱用ス○經年ノ倭テ復私痛痛風等ニ内用シ瘰癧性ノ硬結腺腫疥癬性ノ瘡疹病ニ外用メ最要ノ薬劑タリ又利尿ノ瞑眩ニ由テ發スル所ノ流涎ヲ止ムルノ一要薬タリ○凡劑ハ三八ヨリ十ハラ腹ス○溶劑メ洗滌劑浴湯ト爲シニテヨリ四テ至ル○含硫加爾茂肺勞ニ良効アルヲ稱ス○硫鹼水素ハ痛風ニ因テ發スル筋肉癱瘓膀胱ノ慢性聖京侯密様消渴等ニ用フ○硫水素酸遷延ノ倭テ復私痛々爪知毒疝其他礦毒ヲ解メ又洗滌劑トメ疥癬性ノ瘡疹ニ外用ス○一ヨリ一ヨリ一ヨリ返ラ腹ス

○硫黄亞爾回兒アルワール

倭廣積私及痛風之効アリ○每次三滴ヨリ五滴十滴ヲ取り更的兒ヲ加へ又
閉塞ノ僻アルハ蓖仁油ヲ加へ腋ス月ニ三次若クハ二次又脂油ヲ和シ外敷メ痛
風性ノ腫瘍ヲ消散シ先瘡ハハルルム等ヲ排除ス又表皮ノ湯火傷ノ外用
ニ効アリ

○水銀クワツキ
ニルフル

〔微毒病〕永劑ハ實ニ謀毒ノ妙薬ニメテ指テ更ニ他ニ代用スヘキモノアリ
シハ微毒熱心消滅ノ薬ヲ施スノ後水銀ヲ用ヒテ良効アリ乃チ義膜咽喉喉
衝孫兒ノ腦膜微毒淫婦ノ腋膜微毒肝微毒京極性或ハ倭廣積私性
ノ微毒等ノ如ク是ナリ〔慢性諸病〕腺病内臓ノ閉塞若クハ硬腫頑固ノ皮病
水腫等之ニ一種ノ神經病一種ノ神經病就中或ハ狂犬咬傷及ヒ恐水病ニ
科用ス其法水銀膏ヲ塗擦メ流涎ヲ免スルニ至ルハ膽病熱熱ノ地方ニ流行ス
ル患性ノ熱病即チ胆液熱黄色熱及ヒ肝臓ノ諸感ニハ殊ニ加ル茂兒ヲ用
テ賢アリ

○解毒劑

稀釈解毒藥

○水銀

〔高燥〕地ニ住ム人ハ水銀ノ眠眩少ナシ阜濕ハ是ニ反ス

水銀製劑ハ大約衰弱甚シキ者知覺眞神經病出血ノ僻アル者血液鮮崩
ル者腐敗熱失况兒倍苦痛煩ノ癌腫危篤ノ膿潰等ハ害アリ用フ可
ラス○水銀製劑ノ較著シテ次ニ列ス○華涅滿溶赤散ハ殊ニ梅毒
義膜咽喉微毒ノ効アリ又阿芙蓉ヲ伍メ梅毒性ノ痛風骨痛等ノ効アリ
○赤降汞赤降外用ニ供メ經久不潔ノ梅毒瘍ハハルルム性疹頭瘡瘰癧
性ノ眼微腫視力之弱ヲ療ス軌道ニ至テ梅毒ニ内用ス然レモ其性頗ハ慄
悍ナルカ故チ子細ニ注意メ至小ノ量ヲ用フヘシ毎服八分ハノ一ヨリ四分ハノ一
至ハ日ニ一次若クハ二次○越嶺產布新密涅利列此汞劑中最緩性ノ者ト
ス梅毒性若クハ瘰癧性ノ皮病ニ効アリ又腺病多血肥厚ノ小兒腸間膜瘡
閉メ腋滴堅硬腸々々ル者ニ阜驗アリ凡ソ散トナシ用フニハヨリナシ○
凡テ汞劑ヲ用フハ諸酸及ヒ酸性ノ塩類ヲ忌ム○含汞酒劑葛亞斯ニハ
ヨリナシ○升汞性効頗ハ猛烈也諸官遲怠萎衰ノ類ニ精カキヲ衰耗
ニスメ梅毒已ニ深ク根ヲ全身ニ犯シ部分ノ内外ヲ論ヒス經久ノ疾患ナル者ニ
殊ニ効アリ○方今彌爾達夫ハ升汞ヲ以テ倭廣積私性ノ痛風ヲ治スル妙薬

ニクニ至ル ○硝酸汞膏梅毒瘰癧疥癬等ノ瘡疹ニ効アリ ○赤降汞膏効ハ内前殊ニ嗽衝眼腫ニ効アリ又眼ノ外部ノ慢性嗽衝腫此膏麦粒ノ大ヲ取テ眼此目ニ塗スヘシ ○蓮漢規古丸 ○重括八指の厄加ハ梅毒瘰癧瘰癧又下支ノ經久浸蝕病ヲ淨潔シ治スルニ殊ニ効アリ

扶氏曰越嶺屋布和密涅刺列ヲ小兒ニ用ユルニハ日ニ半匁ヨリ一匁ヲ用ユヘシ又白升汞ハ肺ヲ侵シマスキフ以テ勞瘵瘵ノ人ニ用ヒテ的中疼痛ヲ發スル者ノ如キハ他藥ニ代ヘサルヘカラス ○医療正始加爾茂兒一純正肺嗽衝ハ此藥ヲ行フ可キ証ニアラズ其熱ノ劇弊已ニ殺チ局知ノ嗽衝一部ノ硬結瘰癧着ニ變セントスル者ハ正ニ用ユ可キ好節ナリ ○モスト水腫門ニ云兒生シテ六月ニ至ル者ニ下劑トシ用ユルニハ甘汞ノ量四分匁ヨリ半匁ヲ以テ多シレリトス一匁以上ニ及フ者ハ一匁ヨリ三匁ヲ用フ ○扶氏安真赤汞散一安真母投担誤ニ云赤降汞一匁右研合分ツテ八脈トシ朝夕一脈々漸ク脈量ヲ加ヘテ吐涎ノ候ヲ見ハスニ至リ此藥ヲ止メ下劑ヲ用フ右頑固梅毒ニ良シ ○困赤降汞ニ燒酒ヲ加ヘ火ヲ点シモマス三四次ニ用ユルニハ瞑眩ナシ

○鹽酸金塩

○刺戟解凝藥

骨髓骨癢若クハ夜間骨痛堪ヘカサル者經久ノ眼嗽衝潰瘍等ノ卓驗アリ又子宮癌ニ外用ス即チ陰部ノ外面ニ塗擦スルヲ云ナリ又精力脱衰ノ水腫病ニ良藥トス ○ニハフ以テ蒸餾水一匁ニ溶化シ毎脈六滴日ニ三四又九トニ用フルハニハフヨリ三ハフ取リ玫瑰昆設布半匁ヲ和シ分テ二十四トシ朝夕一丸ヲ服ス又散ハ一匁ヨリ二匁至廿中膏末エケニ和シ分テ十二包トシ每晚一包ヲ服ス

○安真誤厄加ガリス紫硫黃ヲ含ム

小量ニ用ヒテ発汗割痰解凝ノ効アリ大量ニ与ヘテ嘔吐泻下ノ効アリ ○安真母尼酒吐酒石兩種共ニ吐劑篇ニ出ス

○金硫黃

是安真母尼劑中ノ一良藥トス小量ニ用ユルニ善ク発汗割痰解凝ノ効アリ且知レバ大量ニ用フニ暴吐泻ヲ起スハ慢性倭廣私及ヒ痛ニ呼吸器ノ諸病其症瘵瘵性者又百日咳ノ第二期喘息ハ肺分泌液略不好ノ者ニ用ヒテヨリ略出ヒルニ熱性ノ瘰癧瘰癧就中瘰癧亦瘰癧熱ニ効アリ一粘液熱ハ内臟ノ閉塞且黃疸水腫ニ効アリ一腺病 ○凡若クハ一時半毎ニ四分匁一匁ヨリ半匁ニ至ル ○結兒茂斯密涅刺列主治金硫黃ニ同シハ分匁ヨリ始メ多シト雖凡ニ此ニ過ズ ○含硫加爾茂安真母担ハ經久ノ倭廣私痛風梅毒瘰癧

刺戟

等、用エ又經久頑固ノ内臟閉塞ニ良アリ○凡ト用フニハヨリ六ハ至ル○
越復屋布和安真母担ハ瘰癧性梅毒性ノ反病ニ殊効アリ凡散共五
ハヨリ十ハ至ル

保

○燒灰海綿 扶氏曰瘰癧毒ヨリ来ル頸腫瘍ニ洗茶ヲ為シテ良効アリ
瘰癧腫靜脈瘤ヲ兼發スルヲナク又痛ヲ去ル者ニ効アリ

○木炭 半クヨリ一クニ至ルヲ与ヘテ泻下ノ効ヲ得シ小量ニ与ヘテ割酸ノ貴茶トモ又不潔
ノ潰瘍殊ニ膿多ク者ニ外用ニ割酸止腐ノ貴品ナリ又濕性ハハルハム不潔ノ
齒齦及ヒ其ヨリ發スル口中惡臭ハ私私真兒トナシ又腐齒散ト為シ用ヒテ
位ナリ

○加爾永重担广里^{ゲルハル} 外用ニ瘰癧狀ノ破潰不潔ノ創傷ニ効アリ又能ク惡液ヲ淨潔ス又方離機ニ
由テ効ヲ發スル止腐ノ一良薬ナリ故ニ医家多ク茲ニ注意シメ供用ス

○沃実^{イヨビユム} 耳腺乳管等ノ腺ノ硬腫ニ奇効ヲ獲タリトモ又咽喉内後面ノ經久潰瘍
己ニ系劑ヲ用ヒテ治セザル者ニ良効アリ又流涎ハ内外兼用フ之ヲ防制スルノ

一種ノ妙効アリ○凡若クハ重兒箇尔溶液トシ用フ毎服八分ハヨリ一ハ至ル日ニ三
○凡丁幾劑大人ハ毎服十滴日ニ三三次○敵度里屋把私利篤更私○凡軟膏
少許ヲ取テ朝夕瘰癧腫及ヒ腺ノ硬腫ニ塗擦ス或ハ又緩和布ヲ其腫トニ
貼スルヲアリ又硬結腫腸疼痛スル者ハ水燈ヲ貼シ向ノ后此膏ヲ用ヒハ確驗
ヲ得ルヲアリ○凡烏私馬魯敵度里屋把私謨軟膏朝夕一カ或ハ半カ最
リ硬結腺ニ塗擦シテ効アリ○乙沃実列女普尔哩白帶下ニ用ヒテ効アリトモ
○普洛多乙沃実列女母協度羅尔業利水銀ノ條ニ出ツ○德島多乙沃
実列女母協度羅尔業利水銀ノ條ニ出ツ

○塩酸^{ソウツレエー} 〔腺病〕論ハ頸腺ノ硬結瘰癧性ノ腺管胃管ノ硬結腺腸間膜腺ノ因
塞高腫瘦病瘡疹疣瘡ニ効アリ〔肺病〕第一道粘液一之ヨリ繼發スル消化不
良閉塞咽出ニ効アリ○芬芳ノ水液殊ニ老利兒水一カニ溶化シ年紀ノ少長ニ
從テ一時半毎十滴ヨリ五十滴ヲ服ス
○塩酸加爾機^{ソウツレエー} 効前ニ同シ殊ニ腺及ヒ水脈ノ因塞ニ用フ○溶劑ト為シ用フ半クヨリ一カヲ以テ蒸
溜水一カニ溶化ス一時或ハ一時半毎二十滴ヨリ三十滴ニ至ル

解社

○固壯強世解疑茶

○白屈菜 和名クサソウ

股臟ノ閉塞肝腫門脈腸間腰腺ノ閉塞ニ大効アリ○越後新ヲ以テ九若クハ

孟僂設ルト為シ用フ每服十ハヨリ一ヨリニ至ル日ニ三

○瀕豐麥

呼吸器ノ慢性粘液病即濕咳疼痛等ヲ治ス又百日咳肝門脈ノ閉塞黃疸

○蜀羊泉 デユルカク

呼吸管腺等ノ官能ヲ活潑シ兼テ皮膚腎臟ノ分泌ヲ増進ス○肺臟ノ粘液

○越後新 エキスタラク

越後新ト云フハ九若クハ孟僂設ルトシ用フ日ニ一ヨリ一ヨリニ至ル

○吐根 イペカクア

〔秘症〕聖京低性ノ咳嗽粘液性ノ喘息ニ効アリ一鎮症一症候于性ノ喘息百日

咳黃疸症等橋脚等々心疝子宮病依利昆哇兒ノ諸症癩病等ニ効アリ

〔発汗〕後廣嶺私痛風又癩疹病及皮膚症等々發現遲滯スル者若クハ全ク内

陷スル者ニ用ヒテ太々偉効アリ〔止瀉〕痢疾ニ効アリ○刺衝ノ効鎮症ノ効ヲ要ス

ハ四分ハヨリ一ハニ至ル催患心劑ノ効ヲ要スハ一ハヨリ三ハニ至ル催吐ノ効ヲ要ス

ハ十ハヨリ三十ハ至ラ散九孟僂設ル等ト為シ用フ又半ヨリ一ヨリ至浸出シ流シ

一ヨリヨリ三ヨリ至ノ液ヲ取り用フ○吐根酒 イペカクア 吐効本條ニ同シ殊ニ小兒ノ吐劑

トシハ五分時毎ニ半ヨリ用ヒテ吐ラ得ルニ至ル○吐根舍利吐劑秘痰劑トシテ小兒

ニ用フ○吐根錠ハ粘液性若クハ聖京低性ノ呼吸器病及胃ノ粘液病ニ秘粘

劑トシ用フ一次毎ニ一錠ヲ服ス日ニ三次○越後新知濕ハ半ハ大人ハ三ハ白色ハ十六

分ハヲ用ヒテ即吐吐ス○越後新知圓一箇九ハノ圓ト為シ半時毎ニ一圓ヲ服ス選

延聖京低性ノ胸病百日咳經久ノ泄瀉等ニ用フ

○吐酒石 ステーション

吐劑トシ用フハ患者ノ年記ニ隨フテ一ハヨリ四ハ至ラ分ツテ數服トナシ頻々ニ用ヒテ

ワクス又一種意識ニ屬スル病乃チ癩狂病ノ如クハ患者通常知覺鈍呆ニメ

吐劑ノ刺戟ヲ恐レサルニヨリ六ハヨリ十ハ尚倍メ用スヘシ其他概シ毒物膽液物

其他ノ汚物已ニ胃中ニ融動メ止リヨリ泄除スヘキ症ニ用ヒテ皆効タリ〔腸胃熱込

吐

〔赤夜熱〕廻出漿、其解凝茶、加用ヒテ効アリ、(聖宗倭熱候、廣私楚問歌
契) 肚腹壅閉、ツ兼ル者、或ハ其壅閉、因テ病持久スル者、効アリ、(延年ノ倭
眞和及ヒ痛瓜) 吐酒石、小量ヲ以テ、雙葡萄、越錢、和曼陀羅、華等、互用シテ
頭然タル奇効アリ、(水腫) 慢性ノ神經病、癩病、癆病、狂病、黑障、眼等、用
フ、(夫シ吐酒石ノ効、ル帝、解凝ノ効、モナラズ、尚且、導摺、臭奮、ノ効アリ、此諸病
之ヲ用フ、ルハ、其量、常ニ、忍心ヲ、覚ユルヲ、要ス、大凡、這般ノ、諸症ハ、吐劑、テ、底心
解、太、鈍、ナル者、ナリ、故ニ、其、忍心ヲ、要ス、ルハ、其量ヲ、大ニ、ス、ヘシ、然レ、漸次、ニ、加増シテ、
其中、毒ヲ、虞、ル、ヘシ、(腦ノ、動搖) 小量ノ、吐酒石ヲ、以テ、二三、多ノ、水ニ、溶化シ、用ヒテ、此ニ、モ
吧ヲ、發、セシ、ル、ヲ、キ、フ、要ス、(肺、嗽、衝、脇、痛、義、膜、咽、候、喉、衝) 防、嗽、劑、トシ、用フルハ
六、氏、若、リ、ハ、十二、氏、若、ク、ハ、十五、氏、以テ、蒸、溜、水、六、多、ニ、溶化シ、一、時、毎、ニ、一、管、ニ、ツ、テ、吐
酒石ノ、量ハ、毎、日、三、氏、ヲ、増、加シ、十二、時、中、ニ、十二、氏、ヨリ、十五、氏、至ラ、服ス、(外用) 軟、硬、二、膏
ト、作、メ、皮、膚、ニ、擦、塗、ス、ル、ハ、其、狀、殆、ト、牛、痘、ト、同、一、般、ノ、疹ヲ、發、ス、ル、性、アリ、故ニ、引、赤
導、摺、ノ、劑、ト、為シ、用フ、ヘシ、(百日、咳) 治ス、ル、ハ、吐酒石、膏ヲ、鳩、尾、ニ、摩、擦、ス、是、百
日、咳、ニ、効、アリ、ス、其、法、吐酒石、一、多、若、ク、ハ、二、多、
若、ク、ハ、一、ト、大、ヲ、以テ、皮、上、ニ、擦、ス、ル、日、一、回、若、ク、ハ、二、回、若、ク、ハ、三、回、此、ノ、若、ク、ス、ル、多
時、ニ、メ、其、部、若、多、ノ、疹ヲ、發、ス、此、ノ、時、尚、輪、回シ、テ、屢、擦、ス、ル、ハ、其、疹、愈、多シ、愈、長

大トナリ、或ハ紅豆ヲ含高スルニイタルコトアリ

因ツ量、用ヒテ、鎮、症ノ、効、アリ、此、茶ノ、神、至、及ヒ、諸、筋ノ、失、常ノ、運、動ヲ、鎮、定、ス、ル、一
種ノ、殊、能、ニ、メ、曾、テ、病、毒ヲ、排、除、ス、ル、効、ニ、非、ス、吐、血、及ヒ、崩、漏、ホ、用ヒテ、効、多シ、是、レ
血、脈、諸、管ノ、症、亦、手、指、制、手ノ、運、動ヲ、鎮、定、ス、ル、ニ、因、ル

○安填母尼酒 エー、カ、ラ、ン、ス

因、汗、劑、諸、痰、劑、ト、ス、ル、ハ、二、カ、ヨリ、一、カ、ニ、テ、一、服、ト、ス、熱、病、遷、延、病、冒、寒、傷、寒、冷
三、毒、亦、蒸、氣、瘴、瘧、ヨリ、發、ス、ル、諸、症、咳、嗽、胸、肺、衝、候、様ノ、症ヲ、治、ス

催吐解凝發汗祛痰ノ効アリ

○膽礬 ブ、ラ、イ、エ 硫酸銅

峻、吐、劑ノ、屬、ニ、メ、浸、蝕、性ノ、毒、アリ、故ニ、慎、戒、ノ、用、フ、ヘシ、(散、丸、若、ク、ハ、溶、劑、トシ、用、フ、三
氏、ヨリ、六、氏、ニ、至、ル、膽、礬、若、ク、ハ、母、ヲ、消、ス、ル、ニ、蒸、餾、シ、用、フ

○皓礬 オ、ハ、イ、ト、リ 硫酸亞鉛

大、毒ノ、品、タル、ヲ、以テ、近、今、之ヲ、用、フ、ル、ヲ、稀、ラ、リ、(丸、若、ク、ハ、溶、劑、ト、ス、四、氏、ヨリ、十二、氏、ニ、至、ル

○下劑

清涼下泄茶

○苔麻林度 因酒石英ト性効同シ代用スヘシ

胆酸漿其他熱性諸病失血嘔血吐血等共胆液ノ刺衝ノ癸スル者胆液性ノ假胆酸衝肺酸衝胸膜酸衝血液頭腦ノ蓄積スル者痔血閉酸衝ノ症ヲ併スル者等ニ下劑トシ用ヒテ効アリ ○煎劑トシ用フニヨリ三ヨリ五ヨリ以テ煎メ八ヨリヨリ十二ヨリ至ル ○能ク痰核ヲ撰ヒ去テ純粹ト爲シタル者ヲビユルバタミクシドリュムト名ク日ニヨリ三ヨリ五ヨリ以テ五箇設ル昆設ル弗等ニ和シ用フ

○阿波勒

清涼緩下ノ効アリ 荅ハ林度ノ如シ故ニ主治モ亦荅ハ林度ニ内シ ○一ヨリニヨリ至五箇設ル若クハ昆設ル弗トシ用フ腹痛風氣等ヲ防治センカ爲ニ香竈葉或ハ中和塩ヲ加用スヘシ ○梅肉膏シユルカ ○泻利煉膏善良ノ清涼下劑トス日ニ一ヨリニヨリ至一時毎ニ一大茶匙或ハ一食匕ヲ服ス

○芒硝スワフハルシユ 硫酸曹達

一ヨリ四ヨリ至ノ小量ヲ用ヒテ解凝痰汗利尿ノ効アリ故ニ腸胃粘液ノ蓄積腸若クハ腸間膜腺ノ壅塞及ヒ其ヨリ癸スル消食機虛弱小兒ノ瀉瀉痲病水腫聖京痲病等ハ苦味ノ越幾私劑ト配用メ良ナリ ○半ヨリ一ヨリ半至ノ大量ヲ頻服メ良性ノ下劑トス ○蒸漏劑瀉腸劑トシ外用メ清涼分解ノ効アリ

○西勒王塩セフツルシユ

此ノ塩ハ溶解シ難キヲ以テ下劑トシ用フルノ積滯ナリ但シ腺臟ノ粘膠若クハ閉塞及ヒ夫レヨリ生スル固軟漿消化不良黃疸水腫等ノ如キハ苦味解凝葉或ハ峻カ下劑ヲ加ヘ用ヒテ効アリ ○解凝ノ効ヲ要スルハ一ヨリヨリ三ヨリ至散若クハ溶劑トシ用フ下劑トメニヨリ半ヨリ至ラフ

○泻利塩セフツルシユ 硫酸苦工 漢名凝水石

効霸王塩ノ如ク小量ニ与ヘテ解凝利尿ノ効アリ大量ニ用ヒテ下劑ノ効アリ 瘧閉鉛毒疝腸痛箱傾貌倭倭等ノ如キ速効ヲ要スル者ハ殊ニ効アリ ○下劑ハ半ヨリニヨリ至香竈ノ液ニ溶化シ傾服ス或ハ分服ス解凝利尿ノ劑トメ一ヨリヨリ三ヨリ至ラフ瀉腸劑ニハ半ヨリニヨリ至ラフ加ヘ用フヘシ

○純精酒石セフツルシユ 一名酒石英 酸性酒酸加里

清涼下劑ノ一良藥ナリ故ニ胆液漿ニ特用ス ○下劑ノ効ヲ要スルハ一ヨリ一ヨリ半至散若クハ五箇設ルトシ用フ又半ヨリニヨリ至ラフ用ヒテ清涼解凝利尿ノ効アリ 因此葉ハ主治酒石英ト同ニ故ニ近赤是ヲ用ヒズ酒石英ヲ以テ解凝劑ト爲

○孕酸酒石セフツルシユ 酒酸加里

スハ一ヨリ下劑ト爲メ自四五一ヨリマデ

緩下ノ効アリ旃那及ヒ葦尔私ノ下劑ニ加用メ其カ為ニ發スル所ノ腹痛ヲ防キ且其効ヲ迅速ナラシム又疏利解凝ノ効アリ○痔疾殊ニ盲痔ニ用ヒテ尻殿ノ燒カ如キ者若シテ減シ煖腫アル痔囊ヲ薄クシ腹中ノ煩悶飽滿及ヒ血液ノ頭ニ逼進スルヲ減ス○吐血及ヒ「ズワルテシキテハンビボカラテス」ニ腫アリ又能ク吐止ラ鎮靜ス○溶劑ト為シ用フルハ半号ヨリ一号ニ至ル○酒石酸利烏重斯曹達エトトリイグー性効本條ニ同シ○礬酸曹達ボスボリス、ソグー性効本條ニ同シ○兩品共ニ不佳、氣微ナルヲ以テ小兒或ハ茶臭ヲ嫌忌スル者ニ用テ良シ

○緩性下泄茶

○瀉那

漢人所謂甘露刺蜜ノ姜ナリ和蘭ニ是ヲ「ヘーノルター」ト名ク天露ノ莖ナリ瀉那ハ日用糧食ノ莖ニ其説ニ云天函齋荒地ノ莖ヲ懸テ甘露ヲ此ホニ降シ鹹礬ムウレヒ「ナカラシム」

軟化包摂下利ノ効アリ故ニ腸胃ノ輕嫩衝腸胃熱火聖京僞熱呼吸器ノ嫩衝妊婦勞瘵等ニ用ヒテ良シ○瀉那ノ性凡氣膨脹煩悶ヲ發シ易シ故ニ依利昆垠兒子宮病刺衝積虛弱實久ニ喜ンテ用フ「カラス」強テ之ヲ用ヒシヲ要スハ香竄駝瓜ノ品ヲ配スヘシ但シ嫩衝ノ景況アル者ハ之ヲ配スルヲ禁ズ○孟屈設尔トシ大人ハ日ニ号ニ号至小兒ハ一号ヨリ二号若クハ一号至又合利別

○蜂蜜ハルハ

○蜂蜜ハルハ

八日ニ半号ヨリ一号
緩和解凝祛痰下利ノ効アリ故ニ粘液性聖京僞熱呼吸器病或ハ腹中ノ悶塞及ヒ夫ヨリ發スル諸病譬ハ「黄痘烟虫」等ニ効アリ又油類ヲ但用メ鉛石病ニ傍發スル疼痛堪ヘ難キ者ヲ緩輕ス○外用ニハ撒尔菲亞若クハ没薬等ヲ加ヘテ含漱劑トシテ口中ノ失況尔倍若病ニ用ヒテ効アリ又咽喉嫩衝ニハ緩和解凝劑ヲ加ヘテ用ヒテ良シ又灌腸劑トシテ大便ノ通利ヲ促ス○溶劑ハ半号ヨリ二号含漱劑灌腸劑等ハ一号ヨリ二号ニ至ル○屋施茂兒ハ清涼ニ稀釈祛痰ノ効アリ故ニ呼吸器ノ嫩腫病ニ良驗アリ一号ヨリ二号

○強壯下泄茶

○大黃ダイカウ

圖大黃ノ復ニ護護ト葦尔私アリゴム類尤モ多シ又香竄揮發ノ復ト收瀉ノ類トアリ輝發ノ復ハ瀉下ニ收瀉ノ類ハ強壯ノ効ヲナス腸胃虛弱ニメ肚腹閉塞子宮衝逆黃胖病ニ効アリ又粘液熱火等ニハ苦果強壯解凝驅熱ノ藥品ヲ加ヘテ良ナリ又泄瀉疝痛腸胃ノ汚物ニ因テ發スル者黃疸ニハ苦味劑ヲ加用メ腸胃ノ官能怠慢ヲ治スルニモナラス尚且粘

液滞積ヲ豫防ス○下劑ハ十八ヨリ一乃至散丸若クハ紙劑トシ用フ又浸劑
ハ二ヨリ三乃至浸出ノ液ハ多ク取ル○強壯劑トシ用フルハ毎服二ハヨリ四ハ
六ハ至日ニ三四次○酒製大黃丁幾強壯劑トシ用フ一ヨリ四ヨリ至ル凡ラ大
黃丁幾ハ強壯劑トシ用ヒ下劑トシ用タルト稀ナリ○大黃丁幾一ヨリ二乃至○水
劑大黃丁幾小兒ノ酸敗液ニ緩下劑トシ用ヒテ良ナリ大人ハ毎次一ヨリ一乃至
ヲ鍾腹ス小兒ハ一茶匕ヲ与フ○大黃舍利別殊ニ小兒ニ下劑トシ用フニ多
ヨリ一乃至鍾腹ス或ハ二次三次ニ分テ服ス

黃胖病ハ男女共ニ之ヲ患フ便テ萎黃病ノ如ク鉄劑ノ的症ナリ
○峻下泄系

○旃那 アラビヤ子、アラビヤ子
峻下系中最モ緩ナル者ナリ故ニ過度ノ泻下ヲ要スル者ハ之ヲ用ヒテ効アリ但シ
脈紋痛ヲ免スルアリ故ニ茴香ノ如ク香竈ヲ加ヘテ共宜ヲ防クベシ○散劑ハ
一ヨリ一乃至二浸劑一ヨリ四乃至五浸出シ海ノ六乃至七若クハ十二乃至十五
泻利煉膏阿勒殺ノ條ニ出ツ○旃那舍利別小兒ニ用ヒテ緩下ノ良薬ナリ
○二乃至一乃至二○襖方旃那丁幾劑一乃至二乃至三或ハ單用ニ或ハ五
伍散ルニ和シ用フ○軒能西私利泻水一乃至三乃至○葛菴鬼腹提

○盧菴 アラビヤ子
胃腸虚弱血行遲怠粘液停積等ヨリ發スル肚腹ノ閉塞ニ効アリ又苦味
解凝系ヲ加ヘテ消化不良黃疸水腫ニ用フ○入ト爲リ粘液填メ皮膚層
灰色動作倦怠肚腹ノ血行遲怠粘液停積子宮虚弱若クハ子宮ノ官能
停止等ヨリ經閉ヲ將出シ来ル者ニ通經ノ良薬ナリ又痔血閉止ニ因テ諸
症ヲ奈スル者ニ用ヒテ良薬ト云○外用メ纖維弛緩ニ且ツ不潔ノ潰瘍及ヒ
腐骨疽ヲ生シクニ効アリ○丸劑トシ用フ三ハヨリ五ハ至ル外用ニハ散末若
ク散軟膏ト爲シ用フ○丁幾劑一乃至三乃至○襖方盧菴丁幾劑二乃至
三乃至四乃至五乃至六乃至外用メ失況児倍苦痛ヲ淨潔ニ方盧菴丁幾浸茶丁
幾拈輪蓮葛丁幾 名ナク 三味混合ス○水製盧菴會越幾私劑十ハヨリ十五
ハ至ル○哥西亞丸十ハヨリ二十ハ至ル○律比丸每服十ハヨリ二十ハ至ル日ニ
○藥刺巴 アラビヤ子 固腹量末トシ五ハヨリ半匙迄水煎ハ三匙迄此ノ薬ハハハスル合
ムク多ク故ニ之ヲ腹ノ胃腸ニ粘著メ溶化セザルナリ故ニ砂糖或ハ石礮類
品ヲ是ニ研和シ用ヒテ良ハスル一ハヨリ十二ハ至ル咽喉喉嚨喉嚨等ニ初
癸刺結ヲ施シ連ヒ此薬ヲ用スルハ大効アリ

小量用ヒテ衝動ノ効アリ 瀉ハ久ノ間歇腸間膜因塞及ヒ夫レヨリ突
スル諸厄利更病劣瘰癧等ノ効アリ ○導泄劑トシテ經久瘰癧性ノ皮膚病腸
水腫ノ効用ス ○導泄劑トシテ瘰癧性ノ皮膚病腸水腫ノ効用ス ○緩
下ノ効ヲ要セハ新研末ハ八分ヨリ十分至小兒ハ五分ヨリ六分至峻下ハ十分ヨリ
三十分至小兒ハ八分ヨリ十分至用ス ○刺動導泄ノ効ヲ要セハ四分ヨリ六分至
小兒ハ一分ヨリ三分至用ス ○刺動已華尔私ノ性本條トシテ勢ハ最モ烈ナリ
散劑五分ヨリ十分至又丸劑乳劑トシテ用ス

○枯碌葦篤 コロキリンチゲス

多ク峻刺導泄解凝ノ劑トシテ用ス 則チ腹肚粘液ノ壅塞閉頑固ナル者水腫
精神病下肢ノ麻痺ノ効アリ 散若クハ浸劑トシテ下利ノ効ヲ要スルハ散劑三
ヨリ五分至刺戟ノ効ヲ要スルハ八分ヨリ十分至ハ一分至ハ一分至ハ一分至ハ
三十滴至至

○墨列僕里 スワルト、テイリス、 通經劑篇ニ出ワ

○藤黃 フユウ

世効枯碌葦度ヨリ猛烈ナリ故ニ謹慎メ之ヲ用フベシ ○條虫、殊称アリ故ニ
條虫病ノ如ク頑固ニシテ且ツ脆脂タル症ニ用フル茶劑ハ大約藤黃ヲ以テ之ヲ居茶

トス ○散丸若クハ散劑若クハ浸劑一分ヨリ六分至至

○換甘母担

刺戟ノ峻下劑トス 其効殆シト藥劑巴ト内々腹痛急等ヲ起ス ○腸胃
大ニ官能ヲ失スル者服水條虫等ニ用フル自餘峻下茶ノ如ク小量ニ用ヒテ衝
動解凝ノ効アリ ○散丸散劑孟終設尔等ト為シ与フ下利ノ効ヲ要スルハ八
分ヨリ十分至至 衝動解凝ノ効ヲ要スルハ二分ヨリ八分至至

○尾刺扶阿刺

主治効用藤黃換甘母担ニ同シ ○葉ハ散トシテ用フ一月ヨリ二月至至ハ又浸
劑トシテ用フルハ一分ヨリ二分至浸出シ瀉過ノハ一分ヨリ取ル根モ亦散劑トスハ一分ヨリ
十分至至

○巴豆油 オウゴン、オウゴン、

性効最峻ナリ故ニ油四分滴或ハ半滴ヲ用ヒテ大ニ泄瀉シ腹痛ヲ併發スルナリ
殊ニ頑固ノ便秘知毒疝腸胃大ニ官能ヲ失スル者充液瘰癧血頭部ノ積留スル
者卒中風水腫 傲慢病等ノ頑固ノ便秘ヲ兼ル者ニ用スル又條虫ニ用ヒテ驅虫
ノ効アリ ○此ノ油ハ通常一滴ヨリ二滴ヲ取リ甘美ノ舍利別ニ和シ用フ ○外用ハ巴
豆油六滴ヲ以テ阿列磯油若クハ他ノ脂油一テ混和シ脂肚ニ塗擦メ内服ト

効ラ内フスト云フ

○加印加根 ラゲオス
カインカ

水腫病依利昆埋兒腸胃壅閉殊々同敬熱之利秩阿刺之代用良し

○煎劑一斗水十六斗加へ煎め半減し一時若くは一斗半毎二食七用フ○

水製越錢私十二人ヨリ二十人ニ至ル

○落葉松茸 カハクシ
スワカ

勞瘵之癸スル病汗ヲ停住スル堅に要ノ品トス十八ヨリ十五人至每晚之ヲ服ス○下

利ノ効ヲ要スルハ半斗ヨリ一斗ニ至ル

○癸汗劑

○温湯 ワタルカ
ワルカ

蒸氣膏閉之由テ癸スル契病及之其契病瘥疼痛嫩衝ノ症ヲ兼テ皮膚瘡

采起ノ乾燥灼熱シ脉小實ニ緊スル者ニ殊効アリ

○蒸氣浴 タムカハツ
ハツ 附録ニ出ツ

○接骨木 ツクリム 園露春花舍利別酷行毒ヲ甘和シ蒸氣ヲ排泄シ諸痛ヲ

止メ睡ラシム小兒ノ指搦ニ良効アリ

○卷ノ効聖京僞性若クハ倭ノ眞私性ノ急慢諸病嫩衝性ノ皮膚病粘液

性若クハ聖京僞性ノ病之或ハ單用シ或ハ他ノ癸汗劑ニ配伍メ効アリ○外用ハ

羅斯性ノ嫩衝聖京僞痛倭ノ眞私痛等ニ茶囊トシ粘液性ノ咽喉嫩腫ニ

ハ含漱劑トシテ用フ○接骨木花次皮 カハクシ
シマ 水腫病ニ効アリ○接骨木子合

利別殊ニ熱病ニヨリ一斗ヨリ三斗至○日花水癸汗劑トシ孟佺説ルニ知用

フ又眼水病ニ加フ○ニ斗ヨリハ斗至 園接骨木花鎮産ノ効アリ

○加密列 カヒ 園雜布蘭丁錢並氣及之汗ヲ癸シ病毒惡液ヲ表及ニ癸

ニ思性ノ痘潜伏内陷ノ症ニ用ヒテ速効アリ

○山牛蒡根 キリ

癸汗利尿解凝ノ効アリ故ニ聖京僞倭ノ眞私痛風病殊々呼吸器ノ聖言

僞病蒸氣膏閉ヨリ癸スル水腫石癩腺病ニ効アリ○延久ノ梅毒ニハ癩瘡木

薩爾沙巴利爾羅等配用メ驗アリ○煎劑トシ用フニ斗ヨリ三斗ヲ以テ煎メ瀉

過シテ十斗ヨリ十二斗ヲトル

○癩瘡木 カハクシ
カハクシ 園辛楚衝動ハ公ニ大量用シハ大ニ瀉下ス

慢性ノ倭ノ眞私及之痛風病慢性ノ皮膚病殊々癩瘡性ノ皮膚病腺病就中運行

遲怠惰弛緩瘡ノ人ニ癸スル皮膚病ニ奇驗アリ然レ這般ノ諸病ニ共ニ其効

癩瘡木葦爾斯及ハス○煎劑大約一斗ヨリ三斗至ヲ煎メ十二斗若クハ二十

若し其効切実ナラント要セハ臥蓐ノ台漸く温飲ヲ用フヘシ

○双膏菊 一醉劑篇ニ出ル 確砂解凝劑篇ニ出ル (酒石葉日)

○民埜列精 ゲインデリス 困清澄ノ中和鹽液ニ味辛不佳此劑ハ諸酸味更ニ加利塩

類炭酸アルカリ塩石灰水明礬金屬塩ホラ兼用スル性効既失ス

聖京屈儀一積私焚等ノ初期又焚性ノ瘡疹病乃痘瘡亦班焚ノ如嫩
衛大劑ヲラサハ者ニ俾効アリ ○外用ハ含漱劑眼水腫洗滌劑トシ乃輕症
ノ咽喉嫩衝ハ眼水トシ羅私性ノ嫩衝世傷儀一積私性若ク聖京屈性
ノ頭痛ハ洗滌劑トシ用フルカ如シ ○日ニ一ウヨリ二ウ至五倍設ルニ和し服ス外
用ニ一ウヨリ二ウ若ク三ウ至五倍單用シ或ハ清涼解凝劑等ノ液ニ和し用フ

○利尿劑

○洋芥 ベテルセリ ○日子水ハ緩利尿ノ殊効アリ四ウヨリ十ウヲ以テ利尿孟儀設
ルニ和し用フ ○日亞的兒油ハ利尿劑トシ用フ殊ニ能ク髮風ヲ消散ス

○海葱 セイン 困刺戟ノ効甚ニコカカ為メ之ヲ用テハ過多ナルハ嘔吐及下利ヲ突ス
熱病内臟短久閉塞膿狀水腫ニハ此葉用テラ禁ス 困海葱蜜ニガクアンモニアキ

茴香水ヲ加ヘ用ヒテ水病ニ奇効アリ

〔利尿〕水脈ノ官能萎衰ニ因ラ突スハ皮膚水腫腹水等腸胃粘液滯滯之症

ヲ兼ル者ニ俾効アリ (祛痰) 短久ノ肺臟聖京屈病ノ痰粘膠ヲ咯出し難キ者粘

液性ノ喘息病百日咳等ニ良キ (催吐) 殊ニ小兒ノ肺胃大ニ粘液ヲ生息スル者

ニ吐劑ト為シ用ヒテ良キ (解凝) 苦味解凝ノ越後私劑鉄劑等ヲ加用ス

一道ノ粘液閉塞腸胃膜腺ノ閉塞黃疸等ニ効アリ 殊ニ其諸病凝滯官

能大ニ衰耗スル者ニ佳キ ○散劑煎劑浸劑トシ用フ就中散劑ヲ常用トス

半ルヨリ二ルニ至ルニ至ル ○海葱醋ニ一ウヨリ二ウ至五倍水或ハ薄ク何水四ウヨリ六

ウ至七ウ和シ一時若クハ一時半毎ニ一食ニ用ヒテ利尿祛痰ノ効アリ 大量ニ用ヒ

テ嘔吐ヲ突ス ○護謨海葱膏ハ寒腫ニ塗擦ノ効アリ 予此方ヲ試驗

スルニ膝ノ慢性腫脹ヲ分解スルニ良キ ○海葱醋蜜祛痰劑トシ用ヒテ粘

液性ノ喘息百日咳ニ効アリ 半ウヨリ三ウ至五ウ用フト日ニ二次或ハ三次 ○海葱酒

珠ニ利尿ノ効アリ ○海葱越後私劑性効本條ニ同シ 毎服二ルヨリ六ル至日ニ三

次若クハ三次 ○海葱凡粘液性ノ遷延肺ノ感傷ニ祛痰劑トシ用ヒテ殊効アリ

○月ニ十ルヨリ二十ルヲ用ス 困石腦油 ヒキミナ 一種土中ノハルニ積リ液ヲ吐

ク窺透刺戟シ小便ヲ通シ性効強シト琥珀油ノ如シ又強壯肥凡稀釋愈劑ノ

効アリ 蛔虫ニハ阿魏ヲ加ヘテ良 外敷ノ効ハ底列並那油ニ減ス又齒痛ニ貼メ効アリ

○格児失屈誤 ハルフトロター

水腫粘液性ノ宿息ニ効アリ又慢性ノ倭ノ有私ニ効アリ○格児失屈誤酒
一月ヨリ三月ニ至ル○格児失屈誤醋蜜半ヤリニクワ腹マ○評尔的標ハ此劑
ニ民控列利精ヲ加ヘラ水腫ノ奇時ノ効アリトシ由ラ次方ヲ劑ス洋芥水ニ民控列
利精格児失屈誤醋蜜各ニクワ右三味調勻ニ時毎ニヒラ与フ○格児失屈誤
実丁幾劑毎腋二十滴日ニ二次三次若クハ四次○格児失屈誤実酒効力緩ニ味苞

○杜松実 ハルスト子エニル

利尿発汗温暖肥凡ノ効アリ又蒸気閉塞内臓ノ官能萎衰若クハ衰弱等ニ由
テ奈ムル腹水ニ殊効アリ又胃虚及ヒ之ニ併発スル凡氣膨脹酸敗液粘液貯積
等ニ効アリ○散劑酒浸劑水浸劑トシ用フ散ハ一カヨリ二カ至糖ニ研和ハ水浸酒
浸ハ共ニ半カヨリ一カ至浸メハカヨリハカヨリノ液ヲトル○杜松実油ニ滴ヨリ十
滴ニ至ル○襖方杜松実精ハ利尿健胃肥凡ノ尤良効アリ但水腫ニハ三カヨリ
四カ至實又若里私海葱等ニ但用メ良ナリ○杜松実傑列乙ロブライユ一カヨリ
一カ至自餘ノ利尿劑ニ加ヘ用フ

○実芙蓉利和 コロドコロイロニシケンフツワ

水腫ニ効アリ又顔面滲澹皮膚層冷脈弱ニメ結且不齊身軀浮腫メ皮膚柔軟

筒

○栝蔞葉 ヒユコフラーデン

水腫ニ此葉一カヲ浸シ液十カヲ取り半時毎ニ七或ハ二ヒヲ與ヘラ腸胃ヲ強

○加印加 下劑篇峻下茶ノ條ニ出ツ

此消食機ヲ健運シ下劑ヲ静息ス

○木賊 ハルデンタール

利尿ノ峻効アル外更ニ保固収斂ノ強ヲ兼有シテ血ノ運行及ヒ神經等ニ確著
ノ變動ヲ起スヲマシ○腎臓ノ血脈衰弛シテ黒血尿ト共ニ流池スルノ尿血ニ
用フ又腎ノ分泌機疲備心ノ尿ヲ分泌スル能ハハル此ヲ用フハ腎ヲ保固強壯
ノ尿モ亦隨ラ泄利シ易キニ至ル又膀胱中ニ粘液或ハ細石等貯積スル者ヲ
泄除ス○大汗淋漓清身身體是カ考ニ衰弱スル者ハ腎ト皮膚トノ關係太ク親
密ナル故ヲ以テ之ヲ用ヒテ腎ノ官能ヲ増盛シ使フメ此ニ道ヲ棧メ良効ヲ奏ス
セシムルアリ又蒸氣吸入ノニ營營衰憊メ洩乙株ノ液貯積スル者ハ其功
諸葉ニ冠タリ○散劑ハ煎劑トシ用フ但し煎劑ヲ良トスニクワヨリ三カ至ラ
以テ淨水半カニ若クハ澱湯ニ患者年紀ニ隨ヒ之ヲ用フ小兒ハ一カ或ハ二カ大

利

八分茶碗或ハ一茶碗ヲ一時毎ニ用フ○外用ハ乳汁ニ煮テ陰部ニ温卷メ

小便淋痛ヲ治ス
○拔尔撒誤霍汗骨 因ハハルサカナード壯効肢量円シバルサムトリウ凝結

ヲ疏解シ肺瘍ヲ用ヒテ愈創排膿淨刷ノ効アリ他ノハルサム類ハ皆熱性

泌尿管ノ粘液膜ニ殊効アリ故ニ泌尿管ノ粘液諸病就中痲病ニ効アリ又腎
膿潰膀胱ノ膿潰根護腺ノ膿潰白帶下及ニ慢性膀胱ノ聖京伍等ニ

効アリ然レニ却衝ヲ兼ムル者ハ害アリ○毎次二十滴ヨリ三十滴ニ至ル日ニ三
次但シ白糖若クハ香竈水ヲ加ヘ用フヘシ然ラザレハ轉テ胃ヲ損害スルハナリ

○草澄和 揮発衝動劑着ニ出ツ
○拔尔撒誤加奈答 カナダセルサム 因外用ノ纖維弛虚衰弱ヲ強健ニシ潰瘍等

主治拔尔撒誤骨汗拔ニ用ヒ
○的列並底那 テレヒンテーン ヲ治ス

○全身ノ衰弱ヨリ来ラ泌尿管ノ官能萎衰ヲ兼ル者ニ利尿劑トシ用ヒテ殊効
アリ○丸劑昆設尔弗乳劑等ヲ製スルハ亞刺更護誤足虫黄等ヲ加スル
五ハヨリ二十ハニ至ル○外用ハ軟硬工膏ノ君品トス○我鳥掌凡拔尔撒誤○的

列並軟膏的列並底那蛋黃ニ味ヲ以テ製ス

○的列並底那油 (テレヒン 驅虫飲) 的油 亞羅各ニテ薄荷水ハ右研和早
朝空心ニ半劑ヲ服ス (驅虫キリスティ) 的油 鶏子黄一酒杯水十字

小兒ハ其量ヲ減ス但シ壯疾ノ症ハ害アリ外用防腐ノ峻効アリ然テ神經
及ニ腰ノ損傷ニ外敷メ時効ノ早トス

慢性ノ痿ラ損和痛風珠ニ腰痛膀胱痛ニ太ク効アリ又腸ノ感心融大ニ頑麻
スニ因ラ発スル知ノ頑固ノ便秘ニ稱答トス○條虫ニ用ヒテ効アリ又殊ニ産熱ニ

稱用ス○外用ハ衝動分解ノ塗工擦系軟膏等ニ和シ用フ○殺虫劑及ニ下
劑ハ半量ヨリ一量ニ至ラテニ次若クハ三次ニ分服ス小兒ハ一月ヨリ二月ニ至ラテ以テ

誤漿滿那合利別ニ和シ用フ利尿劑ハ五滴ヨリ十滴ニ至ル射注灌腸ハ半
量ヨリ二量ニ至ラテ依テ加フ○硫黄的列並油 硫黄ノ條ニ出セリ

○羌菁 (スハルヂン) 性効羌菁ト内フマテ、緩弱ナリ水腫小便用ニ驅水ノ効効アリ

極末トシ初メ半量許ヲ取リ合利別ニ和シ漸々肢量ヲ増加シ用フ狂犬咬傷ニ
奇効アリ患人ノ年ニ隨ヒ此虫一個ノハ分ヨリ半分マデ一服トシ半時毎ニ手ヘテ尿更ヲ

発スルニ至ル大人ハ一ハ半ヨリ二ハニテ消石或ハ更羅比更ゴムヲ加ヘ二時若クハ三時毎ニ用フ

第一只全身衰弱スルノミコト也。他ノ固シキ物アリテ、
能萎衰或ハ疝瘕ニ由テ小便秘閉シテ、
ノ癸スル小便閉又膀胱ノ括約筋亦痺レテ癸スル小便失禁遺尿等ヲ治ス。第
三、精液ノ漏出甚ク者及ヒ其ヨリ癸スル著息力ノ脱失^{臨夫ノ}ハ男ヲ向
ハテ又劇甚ノ自帶下真ノ衰弱ニ由テ持久スル者ニ良ナリ。○神經炎ノ知覺昏瞶
スル者或ハ神經諸症百出スル者ニ効アリ。又室咳百日咳ノ病末ニ用テ○更刺此
更獲母甘扁桃等ヲ加ヘテ九若クハ乳劑ヲ製シ用テ四分ハノヨリ半ハ一ハ至
ハ但シ多クハ丁幾勿^レトシ可ク。○丁幾勿^レ花菁一タ燒酒ニ十度者 右液出ニ日
○主治効能禁戒等本條ニ月ニ五滴ヨリ十滴ニ至ル粘滑飲料ニ知レ服ス。固
ニオヨリ四オ近ノ兎ニ三滴マダフルヲ月ニ三次一オヨリニオ近ハ二滴マダフルヲ月ニ三次

○孕礪酒石^{タハタリユムボラキサチユス} 下泄解^{ケレモハタハタリゾリユモリス} 確乎タリ利尿ノ効アリ故ニ全身水腫腰水等ニ用ヒテ奇効アリ
殊ニ水腫病彼此ノ器械^ハ嫩衛ノ景況ヲ併合セム者即チ赤班^ハ熨后^ハ中用スル乃
ハ半オ癸スル寒ノ水腫ノ如キ者ニ佳ナリ。○功ヲ腎臟ニ直セント要スル者ハ少量
ニ用スレ乃半オヨリ一オ至ラ道空ノ水ニ溶シ昼ノ間半時或ハ一時毎ニ食^レモリ
食^レモラ肢ス又利尿^レカ利ト功ヲ一オ^レ進シセント要スル者ハ稍大量ニ用スレ

即チ一オヨリ二オ至ラ頸脈ス但シ之ヲ長服スレハ腸胃衰弱ニ其諸症ヲ癸ス故ニ若
シ多ク持重セント要セハ頻ク保固強壯茶ヲ加用スレ
○塩酸金塩 解毒劑^ハ篇ニ出セリ
○亞松百律羅 亞松字^ハ及私越^ハ私及ヒ合利別
○板尔浴谷葉 百魯羅葉 舍汝必羅
右五品ハ近世出ル寒ノ利尿茶ナリ然レテ諸病ニ試験スルニ其効^ハ未ク十分ナ
ラサルヲ以テ常用ニ供スベカラス

○通經劑

○護謨安母尼亞幾^{アムモニアキ} 鎮瘻通經祛痰解毒ノ効アリ(第一内臟若クハ脈管ノ官能萎衰シ粘液
瀰留或ハ閉塞ヲ兼供スルニ因テ癸スル肚腹ノ慢性病ニ偉効アリ)苦味茶鉄劑^ハ没
草等^ハ症ニ從テ用スレ第一痛急慢性ノ胃寒等局處ニ衰弱或ハ官能萎
衰痰凝稠^ハ略出シ難キ者ニ良ナリ(第二脾腸間膜等ノ閉塞ニ因テ癸スル
腺水^ハ効アリ)○外用ニ能ク寒腫硬結腺ヲ分解消散メ治ス○通常丸劑トシ
服ス十ハヨリ三十ハ至ル○若縮膏○護謨海葱膏 海葱ノ條ニ出セリ
○阿魏 鎮瘻劑^ハ篇ニ出セリ○尾尔板奴謨 月前ニ出セリ

○蘆會 峻下泄系條に出セリ

○改茶 キユムレシナリ。モハラノ羅

第一消化不良腸間膜腺閉塞等之良方(第一陰具弛緩或ハ官能萎
衰ヨリ発スル諸病乃チ月經不順經閉白帶下等之佳藥) (第二慢性肺病
論ハ粘痰性ノ喘急遷延ノ冒寒經久ノ痰咳粘痰癆又真カ肺癆ノ如キ
皆効アリ) (第三不潔癆瘡骨疽脫疽口中ノ失荷兒倍若病梅毒性及自餘ノ
咽疾癆等之外用ノ効アリ) (散劑若クハ丸劑ト爲シ五ハヨリ一カ至ラ頻服之外
用ハ散溶液軟膏トナス) (改茶丁裁劑合漱茶洗滌トシテ不潔ノ失荷兒
倍若癆及ヒ癰瘡等之外用スル) (半カヨリ一カ至ラ) (月越幾秘殊粘
液性ノ胎病ニ撰用ス) (每服十ハヨリ二十ハ日ニ數次)

○甚香 ユーンロイト 鎮痙劑以痛ニ効アリ

○薩昆那 サキナ 調經丸 ガムアンモニア改茶 各ニモ 戸會 一カサビナ油

十二滴 右調勻三ハワカト五カヨリ用ヘ一日ニ四カ 葉末ハ外敷ノ腐蝕茶トス
又油ハ齧齒ニ帖メ止痛ノ効アリ

感觸遲鈍ノ入血ノ運行寔流シ陰部ノ官能大ニ萎衰衰シ或ハ弛緩スルニ因テ經
閉ライタス者ハ特ニ異効アリ又子宮病白帶下顔色青色ニモ惡液積等ヲ兼ヘ若

○奇アリ又膏骨疽之外用メ止痛ノ効アリ ○散劑浸劑トモ用フ日ニ半カヨリ

一カ至ラ ○月油ハ半滴ヨリ四滴至十倍加メ用フベシ散丸ト考ス

○薄荷 揮發油効劑篇ニ出リ

○加密列花 香竈苦味系條に出セリ

○墨列僕利 スワロハトニス 神志尙憂癡狂ノ如キ者ニ効アリ又水腫其因閉塞ニアリテ虛弱性ノ者ナ

ハ用ヒラ佳ナリ並劑ニカヲ以テ並メハカヲ取ル ○月丁錢三十滴ヨリ六十滴至 ○
日越幾秘劑利尿通經ノ効アリ ○每服三ハヨリ八ハ至ラ日ニ二次若クハ三次

○墨列僕利 改茶凡水腫ニ用ス始メ朝夕一カヲ服シ而メ日漸ク加増
シハ九ヨリ十カ至ラ月ニ之ヲ服スルニ至

○硼砂 ホラスロシユボ

通經ノ効ヲ秘ス故ニ血復ノ人瘥事ノ因ヨリメ月更變流シ或ハ遲滯アリ
且疼痛ヲ兼ルノ症ニ專ラ用ス又子宮虛弱ノ者或ハ分燒經久遲延念スル
ニ因テ子宮斂力カワ脱シ疎痛以テ微クナル者ニ効アリ又分娩ノ良効アリ ○
外用メ惡性ノ粘痰咽喉腫口中ノ失荷兒倍若癆瘡口瘡乳婦ノ乳房
濕爛等ヲ治ス ○散劑ニ劑トス十ハヨリ三十ハ至ラ ○合漱劑若クハ各上

ノ聖劑トシ用フルハ一ツヨリニツ至ラ以テニツヨリ四ツノ合利別若クハ哮喘
和シ用フ 困血液大過ノ運動ヲ降鎮シ催腫ノ功アリ故コトヲ清涼阿芙蓉ト名
ク又更余加利塩ヲ含ムル多クテテ一箱ノ副酸茶トシ凝結ヲ疏散シ輕ク瀉下シ
セ便ヲ利シ經肉ヲ通シ分婉肥ネラ下ス

○鉄 保固強壯茶條ト出セリ
○麥奴 麻酔劑篇ト出セリ 鏡子宮一局知ノ神經ヲ衝動セズ故ニ喉嚨ヲ兼ヌ
ハ諸症ニ用テ妨害ニ服量示ハ日ニニツマ月ニ三ツ或ハ半ツトク三ツ

○松痰劑

○甘草 ストトホウト 園無花果甘和松痰ノ効アリ

呼吸器ノ急性慢性諸病ニ効アリ又緩和粘稠色振ノ効スラ以テ肺ノ聖藥
傷風寒ヨリ発スル咳嗽声嘎肺病ノ粘稠肺病等ニ殊効アリ○泌尿器
ノ痲痺痲疾ノ痲痺小便難結石病等ハ他ノ適應ノ劑ニ加用メ良ク○
散若クハ浸劑トシ用フ散劑ハ二十ハヨリ一ツ至浸劑ハ半ツヨリ一ツ至ラ以テ
浸メハ若クハ十ツノ液ヲ取ル○日越緩和劑一ツヨリニツ至ル○精製
日中膏一ツヨリニツ以上ニ製劑効用本條ト日シ

○乳糖 ヲイキル

大量ニ与フレハ下利ヲナシ小量ニ用ヒテ緩和粘痰ノ効アリ○呼吸器ノ痲痺病
殊ニ痲痺性ノ患者ニ太ク良ク又慢性ノ胸病遷延ノ感冒粘痰性
急等患者ノ知覚過敏ナル者ニ用ヒテ良ク又玫瑰浸劑ヲ合シテ内臓ノ
閉塞ヲ解達ス○散劑ニ劑トス日ニ一ツヨリニツ至ル○乳清骨蒸熱肺
房内臓閉塞痲痺病諸厄利更病皮膚病泌尿器ノ諸病ニ用ヒテ効アリ

○痰失刺慈 アスワレフコウ 和胸劑トス○肺ノ慢性粘痰病肺病ノ弛緩ヲ兼ル者又痲痺痲質ノ肺
臟結節腫ニ用ス○煎劑一ツヨリニツ至ラ以テ煎メ十二ツヲ取ル○日新絞汁
此物乾葉ヨリ良クメ効モ亦著シ日ニ一ツヨリニツ至ル

○哈列阿普失松 ケイゴロトフン 和胸諸病ニ用メ粘痰咳ヲ治ス又勞瘵就中粘痰癆ノ知息心ノ良薬ナリ
然レハ肺病ヲ治スルノ品ニアラヌ○煎劑ニ若クハ濃浸茶トス毎飯半ツヨリ
一ツ或ハ一茶匙ヨリ一食ト至ル

○伊里斯弗魯標底那 フロレーテリ 生鮮者ハ催吐峻下ノ効アリ乾乾者ハ緩衝動シ殊ニ功ヲ肺ニ達ス故ニ粘
痰性ノ胸病遷延ノ喘急及ヒ咳等ニ良ク○散劑ヲ任トス大人ハ一ツヨリ

半字至小児ハ三ハ用フ又嬰孩一歳生業ノ期ハ方テ此根ヲ咀嚼セシノ
或ハ吸熱セシノ口内ヲ滋潤シ津唾ノ分泌ヲ増進セシムル也

○遠志 コトハテハルハランヒテゲキフケヘ

能ク功ヲ呼吸器粘液膜ニ達ス故ハ痰太ク粘凝シ着クハ肺ノ衰弱ニ由テ大ニ咯痰
ヲ防碍スル諸症ニ良効アリ又肺嫩衝ノ後痰飲ノ咯出ヲ防碍スル者ニ之ヲ用フシハ能ク再ニ咯出スルヲ
得セシムルヲ以テ能ク危咳ノ諸症ヲ極フ○遷延神經炎就中神經性聖宗
偏癱肺假嫩衝ヲ兼依スル者ハ疹及ヒ自餘傳染性ノ瘡疹炎ニ呼吸
器殊ニ感傷ヲ受ル者或ハ疹内陷ノ肺ノ假嫩衝ヲ起ス者等ニ良効アリ
○水腫病粘液性ノ喘息ニ良効アリ○散劑トシ用フ但シ浸劑トシ用フハ但シ浸劑トシ用フ
散劑ト用フハ稀シテ一ツヨリ半ツ至テ浸メハ多ク若クハ十ツヲ取ル但シ始メ
リ大量ニ用スラ禁ス若シ大量ニ用フシハ咽喉胃中灼カ知テ覺エ暴吐汚煩
悶等ヲ發シ易シ

○魯弊咽那應布羅谷葉 デフラーテンフリンデロベリナ

小量ニ用ヒテ粘液性及ヒ痙攣性ノ喘息或ハ遷延ノ粘液咳等ニ種々効
カトヲ稱ス○下痰劑トシ用スラ良トス一時半毎ニ十五滴ヲ用ヒ漸ク加倍ノ量ニ之

○感能レ輕吐ヲ發スル迄持重スヘシ

○百尔爾 杜品誤 シケル

粘液汚瘍ノ緣固死繼セルカ為ニ膿液既多ムカ或ハ陸續持久スルハ良効
アリ又云眞膿スルニ此品刺衝性ノ外更ニ廣解ノ性ヲ兼ルハ失鳴答ノ知シ故ハ粘
液膜ノ知覺過敏及ヒ其レヨリ統榮スル所ノ粘液過多ニ症ニ殊効アリ○之ヲ
用フハ諸症ハ大率廣解ノ性ヲ以テ咳嗽ヲ制調シ咯痰ヲ追テ減シ更ニ飲
食消化ヲ扶ク○散劑ヲ良トス始メ十ハヨリ二十ハ後一ツヨリ二ツ至日ニ之ヲ
服ス又浸劑ハ半ツヨリ一ツ至テ浸メ六ツ若クハ八ツヲ取ル

○通經劑篇ニ出ツ 改葉日上

○安息香花 ルニエフ

祛痰ノ良薬トス又肺嫩衝ノ終期肺臟ノ痲痺セントスルノ恐ルルハ安息香花
六ハ或ハ之ニ竜腦ニハ加ヘテ一時毎ニ服スラ良トス殊ニ粘液性ノ喘息遷延ノ
胃空酒客ノ粘液咳ニ宜シ○散劑一時若クハ一時半毎ニ五ハヨリ十ハ十五ハ至
又此ノ下痰ノ水ヲ加ヘ洗滌劑トシ面部ノ小疹ニ用フ

○殺虫劑

○攝縮失那 フンカサドセー

散トシテ蜜或ハ自餘ノ下池系即チ中和塩ノ如キヲ加ヘ煉劑ト爲シ與フルヲ
尤モ佳トス一ツヨリ一ツヨリ至テ用フ浸劑ハ一ツヨリ一ツ半至ラテ浸メ六ツ或ハ八
ツヨリ取ル但シ大人ノ量ナリ○更的兒製根綿失那越幾斯劑咽出燒虫ニ卑
偉ノ効アリ○小兒ハ一尺ヨリ三尺ニ至リ四五歳及ヒ大人ハ十尺ニ至ル

○驅虫膏方額草末セマン末各ニツ藥刺巴末三ツ石海慈密道五ツ以テ煉和
レ毎服一茶匕 因魏腦掃虫飲石腦油半ツ阿魏丁幾ニツ右調勻一時コレニ卵
白○同掃虫丸石腦油ニツ阿魏末三ツゲンケアノ末適右九ト爲シ○驅虫軟膏
牛胆石膽各一ツタナセケム油適宜右研和メ腹部ニ搽 ○スビゲリア殺虫ノ聖藥
トス稍廣瘰癧毒アリ一頓過服スヘラス小兒ハ散劑七ツ一服トス或ハ八ツ小兒ハ
十尺ニ至リ兩度用フ大人ハ一ツ一服トシ朝夕一服ツ用フ服量適宜ニ用フハ
吧氣ヲ癸セス熱症用ヒテ熱ヲ増サズ

○太那設熱謨イシラントモ 因温煖用達健胃止痛防腐驅熱破氣ノ効アリ
ス尿道ヲ淨刷シ小便ヲ利シ汗ヲ癸ス水煎ハ水腫ヲ治シ月經ヲ通ス
燒炭ニ用ヒ又燒虫ニ因テ插劑手症ヲ癸ス者殊ニ佳ナリ○浸劑ハ半ツヨリ
一ツ至ラテ浸メ六ツヨリ八ツ至ラ取ル散ハ一ツヨリ一ツニ至リ灌腸劑ハ一ツ
至ル○凡油ハ内外ニ用ヒテ殺虫ノ効アリ内服ハ自餘ノ殺虫孟屈設尔ニ加ヘ用

○外用ニハ搽劑トス○二滴ヨリ五滴ニ至ル

○綿馬ワルタル。デム。マン

大人ニツヨリ三ツ至ラ香露水ニ和シ但シ散末ナリ○凡油條虫ヲ殺スハ此油十八
滴ヨリ二十滴ヲ取テ毎朝毎夕空心ニ服スハツ更レリトス○凡トシ三尺ヨリ四尺至或ハ合
判別ヲ加ヘ或ハ菟子油ニ和シ用フ○

○鵝鴝菜ワルムド。デンド。

瘰癧及ヒ瘰癧腫ニ搽用ス○散劑ハ十尺ヨリ二ツ至煎劑ハ二ツヨリ半ツ至

煎メ四ツ若クハ八ツトス

○傑臘弗魯伊ワルム。

殊ニ殺虫ニ用フ散劑ハ五尺ヨリ二十尺三十尺ニ至ル煎劑ハ一ツヲ以テ殺メハ一ツト

為ス○傑臘弗魯伊丁或寄効本條ニ日シ四十滴ヨリ八十滴ニ至ル

○石榴根皮カウノ。トフ

寄寄効ニツヨリ以テ殺メ十二ツノ液トス但シ散劑ヲ用フトスハ光ハ一ツ大人ハ二ツ

ヲ以テ四分時ハ用フ

○大蒜ワルリユム。サケヒユム

乳汁ニ煮テ灌腸劑トシ腸虫ニ用ヒ効アリス利水ノ効アリ

○的列底那油 テレヒンテイ 利尿劑 爲之也

○加整尔真油 オリユムフンテヒン

條出鏈虫之稱用ス每朝タニ哥喜ヒテ取り水ツ許ニ和シ服ス其ノ惡味ヲ消センコト爲コト子至支、如キ美味ヲ品ヲ取テ咀嚼スベシ

○制酸劑

○石灰 カルシウム

生石灰ハ單ニテ供セス○石灰ハカハリ酸敗液就中酸敗液ニ下利ヲ第ル者又碎石ノ効アリ殊ニ腎石膀胱石等尿酸ヨリ生スル者ニ良驗アリ

○腸及ビ尿管ノ潰瘍ニ位ナリ○外用ニ瘰癧性ノ瘡疹疥癬濕脫疽腐骨疽失角兎倍苦性腐壞性浸蝕性ノ不潔瘍ヲ乾癒ス又下疳ニ科用セリ

又云石灰水ヲ灌腸スルニ燒虫ノ効アリ○目ニ二ツヨリ二ツ尚多量ニ至ル乳汁ヲ加ヘ用フ○外用ハ洗滌射注灌腸ノ諸劑トナス

○結露土

○結露土 天造自然ノ鉛粉ニ性効鉛粉ノ月ニ性ニ土質ノ茶ハ渋滞ヲ同塞スハユエニテ詳ク用スベシ ○結露土 外敷ニ喉赤腫痛ヲ消シ酸腐毒ヲ除ク

精製モノ用フヘシ即チ精製結露土 ○散劑若クハ孟僂設ルニ用テ汗下利ヲ止ム一ツ至テ類肢ス 固凡ソ亞爾加利性ノ土ハ酸敗液ヲ消化スルニミナラス又酸腐毒ヲ

粘液ノ衝動刺戟スルヲ抑制スル効アリ

○蛭石 シリカ

固此系又ハ卵壳ホハ石灰質ノエト生族ノ粘液質トシテ散劑トシテハヨリ三十分至テ用ヒテ能ク酸敗液ヲ制伏ス又利尿汗下利ヲ止ム

凝結ヲ疏解スル効アリ

○麻屈涅失重 コルヒウレヒツテハアーヘテ内 炭酸若ク

制酸ノ奇策トス胃中ノ酸液ト合テ一種ノ塩トナリ其塩能ク下利ヲ止メ故ニ酸敗液及ビ其レヨリ癸スル所ノ諸症兼テ便秘スル者ニ良効アリ又石癖腎石等

屬

ニ用ヒテ無害ノ良薬トス○阿芙蓉及ビ根ヲ但用メ泄瀉ニ良効アリ又全屬酸ノ中毒ハ即時ニ屈涅失重ヲ用フレハ消毒ノ効歴々タリ○屈涅失重ハ常ニ香窺系ヲ但用スベシ何者酸液ト屈涅失重ハ相合スルハ胃中

○曹達泉 附録ニ出ツ

○炭酸泉

○清凉劑

清凉劑

ハヨリ一ツ至テ用スベシ 固小兒ハ二ツヨリ十ツ迄大人ハ半匁ヨリ一匁但ニ毎時

○水 ワウト

○**固痰益舍利別**

口中咽喉腫ホ良薬ヲ奏ス

収斂清涼ヲ滋润シ水齒病ノ下利赤痢及ヒ

○**眼**

眼腫頭部創傷咽挫腕臼骨裂痿屈火傷四肢凍瘡内臓ノ出血若クハ

○**洗滌**

洗滌法珠ニ皮膚干燥灼炎シ謔言妄詔狂乱脉細数ナ者ニ用フヘシ

○**良薬**

○**枸橼汁**

嗽衝熱胆液等ノ灼炎ヲ清涼スルニ此醋ニ粘液或ハ白糖ヲ加ヘテリモナリテ

○**沸滾**

沸滾ニ乗シ用サテ能ク痊愈性ノ呢吐ヲ鎮定ス是ヲヘリクニス鎮吐飲トシテ

○**去り**

去リ其一端ヲ切り之ヲ子宮内ニ送り其汁ヲレボリ尋テ枸橼汁ニ茲ニトシテハ

○**栗蠶子**

清涼防腐ノ性アリ枸橼汁ト内効ナリ故ニ嗽衝熱熾盛熱等ニハ此効アリ

○**酸模**

清涼防腐ノ用ニ供シ失苟尔倍者、内効供用ノ効アリ

○**醋**

清涼鎮痙防腐殺汗ノ効アリ故ニ胆液性ノ嗽衝熱及ヒ腐敗ニ傾ク嗽衝

熱ニ内外供用ス○**羅斯性**ノ嗽衝熱挫皮下溢血慢炎眼嗽衝等ニハ洗

滌劑劇性ノ頭痛ニ卷匙劑惡性ノ咽喉腫ニハ含漱劑頑固ノ便秘ニ

ハ灌腸劑ト又嗽衝病殊ニ義膜咽喉腫ニ用ヒテ驗アリ○**半分ヨリ**ニ

ニテラ腹ス外用ハ半分ヨリ四テラ至ラ四テラ或ハ六テラ液ニ和シ用フ○**蒸餾醋**

効用本條ニ同シ○**醇精醋**悍烈揮発浸蝕ス臭茶或ハ腐茶ノ外用フルニ

○**香竈**嗅茶トシテ用ヒテ神經諸症ニ殊効アリ又惡性ノ傳染病ニ豫防薬

トシ用ヒテ驗アリ **固脂**ハ凝血ヲ溶解スト雖モ乳汁及ヒ脂油類ノ液ニ加シ急

ク凝固ス故ニ乳汁ヲ腹ス人成ハ乳児ニ之ヲ與フレハ乳汁胃中ニ凝固メ消化セ

清

○酒石酸 クエーンステーン
シュールラン

清凉ノ一良薬ナリ枸橼汁缺ルニ會々代用スベシ腸胃炎燄衝炎及ニ其炎稍腐敗性若クハ神經性ニ傾ク者ニ良ナリ但シ下利ヲ發シテ其症恐ハベキ者ハ之ヲ用フルト勿シ何者之ヲ久用スルハ下利ヲ發スルカ故ナリ○一々若クニ多ク取テ通宜ノ水液ニ溶化シ白糖ヲ加ヘ美味ノ飲液ト為シ用フ

○硼酸 ホウ酸
シュール

清凉ノ効ヲ要スルハ二十ハヨリ四十ハ至ワ取リ二杯ノ水ニ溶化シ頻ニ少量ヲ服ス

○消石 サハヘ

清凉防腐ノ魁品ナリ故ニ動脈ノ効力大過及ニ肌熱ヲ減シ血液ヲ溶解セシメ血液大ニ凝結スルヲ稀淡シ且利尿ノ効アリ又大量ニ用ヒテ下劑ヲ為ス但シ持重スルハ消食器ヲ損ス○真ノ燄衝性ニハ之レト功ラ比スル者ナシ然レニ胃腸腎ノ燄衝ノ如クハ之ヲ禁ス○日ニ一ヨリ一々ニ分若クハ三分ヲ以テ粘液ニ溶化シ服ス

○引赤癸泡腐蝕劑

○芥子 セミナシ子、セオス
モスクー、ヘドサート

水或ハ醋ト蒸饑心ヲ加ヘ毳布トシ温メ貼ス○之ヲ貼スルノ部疾患ノ所在ニ就

テ各内シカラス頭痛諸等ハ之ヲ項若クハ胸ニ貼シ咽喉燄衝ハ之ヲ頰ニ圍繞ス又倭ノ痲私性ノ燄衝要地ニ癸スルハ差共部ヲ距テ之ヲ貼ス之ヲ導濕劑ト名ク奮起衝動ノ効ヲ要スルハ努力テ直ク患部ニ貼スベシ疔瘡ノ部ニ貼メ疔瘡ヲ復ス症平指掣等ハ以下神經ノ最近密ナル部ヲ探シテ之ヲ貼ス○効ヲ猛ナラシメント要セハ芫菁下等沙羅藤等ヲ加用スベシ

○山萸菜 トウモロコシ

○瑞香 トウモロコシ

外敷メ引赤癸泡ノ効アリ○打膿ニ瑞香皮若クハ瑞香皮膏ヲ貼メ持スルニ經年ノ潰瘍容易ニ治シ以テ害ヲ癸スルナシ○内用メ延年ノ梅毒及ニ痛風ヲ癢ス殊ニ梅毒骨痛々凡ク挾ム者ニ偉効アリ遠般ノ症ニハ之ヲ木類煎ニ加ヘ用フ要効癸汗ニ在リトス○瑞香毒ヲ解スルハ醋ヲ長トメ改ニ瑞香皮ヲ内用スルハ常ニ醋ヲ許ラ加フベシ○内用ハ半ヨリニクテ五葉ノ十二号若クハ十六号ヲ取ル○瑞香皮膏打膿ヲメ症サウラムカカ為シ日ニ少量ヲ取ラ創止ニ置ク一二次

○芫菁 スハーンセフ
リローゲン

「狂犬咬傷消毒丸」芫菁末ニ甘草ニ半ニ量ニ添テ丸トシ毎夜一服トス感觸甚ナクハ芫菁下等ヲ外敷シ或ハ芫菁末ヲ内利穢油ニ研和シ塗テ良

引赤

効用自餘ノ腐茶ニ月シ然レヒ温ニ會テ流動ス故ニ傍邊ノ良肉ヲ害シ却テ其効ヲ本地ニ遺クムルヲ詳シ

○砒石 コウイド

皮膚癩瘡ヲ治ス又鼻或ハ面部ニ発スル所ノ浸蝕性ハルウラハ良効ヲ外用ニモ供フ然レヒ總大毒ナル藥本書ト能見合セ用フヘシ ○砒石液頑固ノ間歇熱ノ外用フベラス先ツ一歳ヨリ四歳迄ハ毎夜二滴ヨリ五滴ヨリ二次或ハ三次年期ニ從テ二滴三滴ヲ増加ス十八歳以上毎夜十二滴ヨリ三次ニ用ユ是亦注意ヲ用ユベシ且ツ本書ヲ煥見メ用ユヘシ

○礦泉

○浴湯

○硫黄泉 グロウチン

血液ノ混和宜シキヲ失ヒ發スル所ノ疥癬濕性ハルウラハ天刑病等ノ頑患病他區未タ強テ冷硫黄泉ヲ命セザル者ニ予病三週ヨリ六週ノ間冷硫黄泉ヲ服セシノ兼テ硫黄ニ浴セシメテ其効ヲ獲ルノ神ノ如シニ倭ノ類ニ諸瘡癩作ノ同ハ硫黄浴全ク益ニマヨリ論ナシ但シ癩癩已ニ退ク、後速ニ其餘病ヲ全治シ股節ノ失常ヲ其本然ニ回復セシムルハ硫黄泉ヲ内服併用スルニ勝ル者絶テアルナシ 慢性倭ノ類私痛筋纖維ニ感スル者或ハ神經ニ感スル者

或ハ肩如ク固着セシ者論ハ顔面痛倭ノ類私性胃痛及ニ膝痛等ノ如ク或ハ遊芝スル者等ハ共ニ硫黄浴法ノ効他ノ外用局部等ニ勝テ速ニ外用局部等ハ温覆法ニ塗擦茶膏茶布ニ掲ハ所ノ諸病ヲ用ヒテ効ナキ者ハ極メテ良ナリ一痛風經久標毒鉛毒水銀毒痔瘡病

○剛鐵泉 コウテスターン

夫レ鉄ハ保固強壯茶中ノ絶品タリ故ニ腸胃ヲ強壯シ血中ニ混メ血ノ精カヲ活深シテ運行ヲ獎進ス ○剛鐵水ノ主治脈管系統若クハ排洩或ハ惡液類或ハ血液ノ醸成缺敗スル等ニ因テ已ニ著シク衰弱セシ者若クハ特ニ衰弱ニ傾ントスル微スル者ニ用フベシ ○剛鐵水ヲ内用スルハ症共ノ最スル者ハ過大ノ血暴汚經久瀉粘液漏洩房室過度等ヨリ發スル全体ノ衰弱ニ良シ姜黃病粘液性ノ全体水腫諸厄利重病遷延間歇熱等ニ良シ又依利昆垓兒子宮病不孕ノ者等共ニ固全身ノ衰弱或ハ内臟ノ虚弱ニ在ル者或ハ兼テ養息機ノ缺損スル者ニ良シ

○炭酸曹達泉 カールヒュッレ

緩解凝制酸ノ効アリ故ニ胃中ノ酸敗液粘液胃瘕胃ノ壓迫惡心嘔吐休ハ時ヲ若ク吞酸黃疸石淋結石ノ如ク共ニ効アリ

○硫酸遺毒泉

○苦塩泉 ピツテルソウ。ベウテンデ。コウヂ。エン。ワル。フロンチン

腸ノ運営怠慢及閉塞若クハ粘滯ヲ治ス又肚腹ノ多血及之由テ
癸スル諸病中風ノ僻アハ若肝病ノ僻スル者脾病ノ僻スル者依剥昆堃児
神志昏憂病等ニ効アリ

○海塩泉

ミ子。ラ。ロ。シ。ロ。グ。ロ。ン。チ。ン

胃ノ粘液及之由テ癸スル所ノ消化機怠慢閉塞ノ僻スル者萎黄病
等ニ良ナリ ○腺病乃チ「スコロビュラ」ニトリエス」等ニ効アリ

○海水

冷海水或ハ時旦ニ從テ温乳ヲ加ヘ温メタル海水ハ海塩泉若塩泉等ヲ粘
用タル所ノ諸病ニ飲服セシメテ皆良ナリ故ニ粘液病閉塞病腺病等ニ因
ヒテ宜シ

○人工鑛水

ミ子。ラ。ロ。シ。ロ。グ。ロ。ン。チ。ン

○蒸氣浴

ダン。フ。ラ。フ。ス。ト。ム。バ。ワ。ト

慢性倭病類私病就中骨節強直及寒腫或ハ頑固ノ局知倭病類
私痛或ハ皮膚水腫等ヲ治ス ○身臭等ニ施スルハ漏斗ヲ用スル計
トニ眼ニ施スルハ小茶碗ヲ用スル計ニ但シ茶碗ハ熱湯ヲ以テ頻ニ洗テ之ヲ用
スル ○定知ノ疼痛乃チ倭病類私病ノ一種若クハ頑痛等ノ患部ニ
隨テ之ヲ施シテ要セバ茶籠ニ熱湯ヲ盛り蒸氣ヲ直ニ患部ニ衝撞
セシメ以テ燒カ知マク骨見ユルニ至ルベシ

