

RODAK COLOR CONTROL PATCHES
© The Munsell Color Services Laboratory, Inc. 2000
LICENSED PRODUCT



A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 B 13 14 15 17 18 19




古方類聚集成

中部

武 9.
290





古女藤

美王堂藏

東洞先生遺稿

古方類聚集成 全

美玉堂藏版

門 七
番 290
卷

古方類聚集成

目次

明治四十一年 廿四日

中村健 氏寄贈

桂枝湯^乙

桂枝加桂湯

桂枝加芍藥湯

桂枝去芍藥湯^二

桂枝加葛根湯

桂枝加黃耆湯

括蕞桂枝湯^三

桂枝加芍藥大黃湯

桂枝加厚朴杏子湯

烏頭桂枝湯

桂枝加附子^四

桂枝芍藥加附子湯

桂枝附子湯

桂枝附子芍藥加木湯^五

桂枝芍藥加苓朮湯

桂枝芍藥黃辛附湯

桂枝芍藥加皂莢湯^六

桂枝加龍骨牡蠣湯

桂枝加芍藥生薑人參湯

桂枝芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯^七

桂枝二麻黃一湯

桂枝二越婢一湯

桂枝麻黃各半湯^八 小建中湯

黃耆建中湯 黃耆桂枝五物湯^九

黃耆桂枝苦酒湯 桂枝甘肅湯

半夏散及湯 桂枝甘肅附子湯^十

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

桂枝人蔘湯

人蔘湯^{十一}

茯苓甘草湯

茯苓杏仁甘草湯

茯苓戎塩湯

葵子茯苓散^{十二}

苓桂朮甘湯^{十三}

苓桂甘棗湯

苓桂五味甘草湯

苓甘五味姜辛湯^{十四}

苓甘姜味辛夏湯

苓甘姜味辛夏仁湯

苓甘姜味辛夏仁黃湯

茯苓澤瀉湯^{十五}

澤瀉湯

五苓散

茵陳五苓散^{十六}

猪苓湯

猪苓散

牡蠣澤瀉散

八味丸^{十七}

括蕞瞿麥丸

麻黃湯^{十八}

麻黃加朮湯

麻黃甘草湯

麻黃附子甘草湯^{十九}

麻黃杏人甘艸石膏湯

麻黃附子細辛湯

麻黃杏仁薏苡甘艸湯

牡蠣湯 二十

麻黃醇酒湯

半夏麻黃丸 二十一

大青龍湯

小青龍湯

文蛤湯 二十三

越婢湯

越婢加木湯

越婢加半夏湯

葛根湯 二十三

葛根黃連黃芩湯

小柴胡湯 二十四

柴胡加芒硝湯

柴胡加桂枝湯 二十五

柴胡姜桂湯

柴胡加龍骨牡蠣湯

大柴胡湯 二十六

白虎湯

白虎加人蔘湯 二十七

白虎加桂湯

小承氣湯

厚朴三物湯

厚朴大黃湯 三八

厚朴七物湯

大承氣湯

大黃黃連瀉心湯

瀉心湯

附子瀉心湯

大黃附子湯 三十一

大黃甘遂湯

抵當湯

抵當丸 三十一

橘皮大黃朴消湯

大黃消石湯

大黃牡丹湯 三十一

大黃甘草湯

調胃承氣湯

桃核承氣湯

下瘀血湯 三十三

土瓜根散

甘州湯 三十四

桔梗湯

排膿湯

芍藥甘州湯

甘遂半夏湯

甘麥大棗湯 三十五

芍藥甘州附子湯

甘州粉蜜湯

生薑甘州湯 三十六

甘州乾姜湯

四逆湯

通脈四逆湯 三十七

四逆加人蔘湯

茯苓四逆湯

通脉四逆加猪膽汁湯

附子粳米湯 三八

薏苡附子散

薏苡附子敗漿散

大烏頭煎

烏頭湯 三九

赤丸

真武湯 四〇

附子湯

天雄散

梔子豉湯 四一

梔子甘州豉湯

梔子生姜湯

枳實梔子豉湯 四二

梔子大黃湯

茵陳蒿湯

梔子蘘皮湯

梔子厚朴湯 四三

梔子乾姜湯

大陷胸湯

大陷胸丸

小陷胸湯 四四

枳實薤白半夏湯

瓜蒂散 四五

文蛤散

大半夏湯

小半夏湯 四六

生姜半夏湯

小半夏加茯苓湯

半夏苦酒湯

半夏厚朴湯 四七

半夏乾姜散

乾姜人蔘半夏丸

半夏瀉心湯四八

甘州瀉心湯

生姜瀉心湯

吳茱萸湯四九

厚朴生姜半夏甘州人蔘湯

黃連湯

括蕪薤白酒湯

乾姜黃連黃芩人蔘湯五〇

大建中湯

黃連阿膠湯

黃芩湯五一

黃芩加半夏生姜湯

六物黃芩湯

三物黃芩湯五二

白頭翁湯

白頭翁加甘州阿膠湯

木防已湯

木防已去石膏加茯苓芩消湯五三

防已茯苓湯

防已黃耆湯

枳實芍藥散五四

枳木湯

排膿散

桂枝枳實生薑湯

枳實薤白桂枝湯五五

橘皮枳實生薑湯

茯苓飲

橘皮竹茹湯五十六

橘皮湯

桂枝茯苓丸

芎歸膠艾湯

菴覆花代赭石湯五十七

赤石脂禹餘糧湯

桃花湯

酸棗仁湯五十八

葶藶大棗瀉肺湯

蜜煎導

麻仁丸五十九

已椒蘆黃丸

蜀漆散

十棗湯六十

桔梗白散

走馬湯六十一

備急圓

礬石湯

消礬散六十二

礬石丸

蛇床子散

遺補

炙甘草湯六十三

麻黃連軀赤小豆湯

猪膚湯六十四

四逆散

烏梅圓

六五

當歸四逆湯

六六

當歸四逆加吳茱萸生薑湯

麻黃升麻湯

六六

燒裨散方

一物瓜蒂湯

六七

百合知母湯

滑石代赫湯

六八

百合雞子湯

百合地黃湯

百合洗方

括蕒牡蛎散

百合滑石散

赤小豆當歸散

升麻鱉甲湯

七一

鱉甲煎丸

七二

侯氏黑散

七三

風引湯

防己地黃湯

七四

續命湯

三黃湯

七五

朮附湯

薯蕷丸

七六

大黃蟄虫丸

獺肝散

七七

射干麻黃湯

澤漆湯

七八

小青竜加石湯

奔豚湯

九痛丸

七九

旋覆花湯

紫參湯 全

訶梨勒散

王不留行散

黃連粉 全

藜蘆甘草湯

附子湯

當飯散

朮散 全

竹葉湯

竹皮大丸 全

當飯建中湯

溫經湯 全

膠姜湯 全

紅藍花酒

紫胡飲子

長服訶梨勒丸 全

紫石寒食散

還魂湯 全

又方

治馬墜及一切筋骨損方

烏頭赤石脂丸 全

雄黃薰

頭風摩散 全

皂莢丸

葦莖湯

當歸生姜羊肉湯 全

蒲灰散 全

滑石白魚散

猪膏髮煎

栝葉湯 全

黃土湯

雞屎白散

蜘蛛散

當歸芍藥散 全

歸母苦參丸

狼牙湯

小兒疳虫齒蝕方 全

牡原湯

都計二百六十九方

目次終

古方類聚集成

東洞先生遺稿

桂枝湯 治上衝頭痛發熱汗出惡

風者

桂枝芍藥大棗

生姜 各七分半

甘州 五分

右五味以水一盞四分煮取六分

桂枝加桂湯

治本方証而上下衝劇

者

於本方加桂五分

右煮法同前

桂枝加芍藥湯

治本方証而腹拘

攣甚者

桂枝 大棗 各六分

芍藥 二分

甘草 四分 生姜 六分

右煮法同前

桂枝去芍藥湯

治本方証而不拘

攣者

桂枝 大棗 各九分

甘草 六分

生姜 九分

右煮法同前

桂枝加葛根湯

治本方証而項背

強急者

桂枝

芍藥

各六分

甘艸

四分

葛根

八分

大棗

生姜

各六分

右六味

以水二盞煮取六分

桂枝加黃耆湯

治本方証而黃汗

若自汗盜汗者

桂枝

芍藥

生姜

大棗

各六分

甘艸

黃耆

各四分

右六味

以水一盞六分煮取六分

括藁桂枝湯

治本方証而渴者

括藁根

四分

桂枝

芍藥

大棗

生姜

各六分

甘艸

四分

右六味

以水一盞八分煮取六分

桂枝加芍藥大黃湯

治桂枝加芍

藥湯証而有停滯者

桂枝

生姜

各六分

大黃

二分

大棗

六分

芍藥

二分

甘艸

四分

右六味以水一盞四分三煮取六分三
桂枝加厚朴杏子湯 治本方証而
胸滿微喘者

桂枝 芍藥 大棗 生姜各六分

甘草 厚朴 杏仁各四分

右七味以水一盞四分煮取六分三

烏頭桂枝湯 治腹中絞痛手足逆
冷或不仁或身疼痛者

烏頭五分

右一味以水六勺煮取二勺去滓內

蜜四勺煮取二勺作桂枝湯二勺合之

服之

桂枝加附子湯 治本方証而惡寒

或支節微痛者

桂枝 芍藥 大棗 生姜各七分

甘草五分 附子三分

右六味以_ニ水一盞四分_ヲ煮取_テ六分_ヲ
桂枝去芍藥加附子湯 治_ス桂枝去
芍藥湯証而惡寒者_ヲ

桂枝 大棗 各九分
生薑 九分 附子 四分半
甘草 六分

右煮法同前

桂枝附子湯 治_ス桂枝去芍藥湯証
而身體疼煩不能_ニ自轉側者_ヲ

桂枝 一枚 附子 一分半
大棗 一枚
生薑 各七分半 甘草 五分

右五味以_ニ水一盞八分_ヲ煮取_テ六分_ヲ
桂枝附子去桂加朮湯 治_ス本方証

而大便硬小便自利不_ニ上衝者_ヲ
朮 八分 附子 九分
甘草 四分

大棗 生薑 各六分
右煮法同前

桂枝去桂加苓朮湯

治桂枝湯証_五

而悸小便不利不_{ニル}上_一衝者_上

芍藥 大棗 茯苓 朮

生姜分各六 甘艸分四

右六味以_{ニテ}水一盞四分_ヲ煮取_テ六分_ヲ

桂姜艸棗黃辛附湯 治桂枝去芍

藥湯麻黃附子細辛湯二方証相合_ル

者_ヲ

桂枝 生姜 大棗分各六 甘艸

麻黃 細辛分各四 附子分三

右七味以_{ニテ}水二盞煮取_テ六分_ヲ

桂枝芍藥加皂莢湯 治桂枝芍

芍藥湯症而吐濁唾涎沫者_上

桂枝 生姜 大棗分各七

甘艸 皂莢分各五

右五味以_{ニテ}水一盞四分_ヲ煮取_テ六分_ヲ

桂枝加龍骨牡蠣湯 治桂枝湯証

而胸腹有動者

桂枝 芍藥 生姜 大棗

龍骨 牡蠣 各六分 甘草 四分

右七味以水一盞四分煮取六分

桂枝加芍藥生姜人蔘湯 治桂枝湯証而心下痞鞭或拘攣及嘔者

桂枝 大棗 人蔘 各六分

生姜 芍藥 各八分 甘草 四分

右六味以水二盞四分煮取六分

桂枝芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯

治桂枝芍藥湯証而胸腹動劇者

桂枝 大棗 生姜 蜀漆 各六分

牡蠣 一分 龍骨 八分 甘草 四分

右煮法同前

桂枝二麻黃湯 治桂枝湯証多麻

黄湯証少者

桂枝八分芍藥 大棗

生姜各六分麻黄三分

甘草五分杏仁三分

右七味以水一盞半煮取六分

桂枝二越婢一湯 治桂枝湯証多

越婢湯証少者

桂枝 芍藥 甘草 麻黄各四分

大棗 石膏各六分 生姜七分

右煮法同前

桂枝麻黄各半湯 治桂枝湯麻黄

湯二方証相半者

桂枝五分芍藥 生姜 甘草

麻黄 大棗各三分 杏仁三分

右七味以水一盞六分煮取六分

小建中湯 治裏急腹皮拘急及急

痛者

芍藥

二分

桂枝

甘草

大棗

生姜

各六分

膠飴

三分

右六味

上五味

以水一盞

四分

煮取

六分

去滓

內膠飴

更上

微火消解

黃耆建中湯

治本方証而盜汗或

自汗者

於本方

加黃耆

三分

土

姜

一分

右煮法同前

黃耆桂枝五物湯

治桂枝湯

嘔身體麻痺不急迫者

黃耆

芍藥

桂枝

大棗

各七分

生姜

一分

右五味

以水一盞

八分

煮取

六分

黃耆桂枝苦酒湯

治身體腫發熱

汗出汗沾衣色正黃

如藥汁者

黄耆

一分半

芍藥

桂枝

各七分半

右三味

以苦酒二分水一盞四分煮

取六分

桂枝甘艸湯

治上衝急迫者

桂枝

二分

甘艸

一分

右二味

以水一盞八分煮取六分

半夏散及湯

治咽喉痛上衝急迫者

者

半夏

桂枝

甘艸

各

右三味

搗篩以水一盞煎七沸内散

更煮三沸少飲之

桂枝甘艸附子湯

治桂枝甘艸湯

証而骨節煩疼小便不利者

甘艸

朮

各六分

附子

九分

桂枝

一分

右四味以水一盞二分煮取六分

桂枝甘州龍骨牡蠣湯

治胸腹有

動急迫者

桂枝

分四

甘州

龍骨

牡蠣

各八

右四味

以水

一盞

二分

煮取

六分

桂枝人蔘湯

治人蔘湯証而上衝

急迫劇者

桂枝

甘州

七分

人蔘

乾姜

各六

右四味

以水

一盞

八分

煮取

一盞

桂枝煮取六分

人蔘湯

治心下痞鞭小便不利或

急痛或胸中痺者

人蔘

右四味

以水

一盞

六分

煮取

六分

茯苓甘州湯

治心下悸上衝而嘔

者

茯苓

桂枝

各一分

生姜

一分半

甘艸

五分

右四味

以水

一盞

二分

煮取

六分

茯苓杏仁甘艸湯

治悸而胸中痺

者

茯苓

一分半

杏仁

一分

甘艸

五分

右三味

以水

一盞

二分

煮取

六分

茯苓戎鹽湯

治心下悸小便不利

者

茯苓

四分

朮

六分

鹽

一分半

右三味

以水

一盞

二分

煮取

六分

滓內鹽令消

私曰

平井氏

分量考

曰戎鹽一名青鹽漢渡只一種今不

易得無已則可以食鹽代用又曰食

鹽可用出于播州赤穗者

葵子茯苓散

治小便不利心下悸

腫滿者スラ

葵子

之一斤 之四十八私日弱今

茯苓

三兩 私日今

之九 者弱

右二味為散飲服方寸匕日三服ス

苓姜朮甘湯

治心下悸小便自利

腰中冷如坐水中若疼重形如キ水狀

者上

朮

甘艸各四分

乾姜

茯苓各八分

右四味以水一盞煮取六分ラ

苓桂朮甘湯

治心下悸上衝起則

頭眩小水不利者ラ

茯苓

一分 桂枝七分

朮

甘艸各五分

右四味以水一盞二分煮取六分ラ

苓桂甘棗湯

治臍下悸而寧急上

衝者上

茯苓

二分

甘艸

四分

大棗

五分

桂枝

分六

右四味

以水二盞煮取六分

苓桂五味甘艸湯

治心下悸上衝

咳而急迫者

桂枝

茯苓各八分

甘艸六分

五味子

二分

右四味

以水一盞六分煮取六分

苓甘五味姜辛湯

治前方証而不

上衝痰飲滿者

茯苓

分六

甘艸

乾姜

細辛各四分

五味子

分九

右五味

以水一盞六分煮取六分

苓甘五味辛夏湯

治前方証而嘔

者

茯苓

分六

甘艸

細辛

乾姜

各三分

五味子 半夏各九分

右六味以水一盞六分，煮取六分。

苓甘姜味辛夏仁湯 治前方証而

微浮腫者。

甘草 乾姜 細辛各三分 杏仁

半夏 五味子各六分 茯苓四分

右七味以水二盞，煮取六分。

苓甘姜味辛夏仁黃湯 治前方証

而腹中微結者。

於前方加大黃三分。

右煮法同前。

茯苓澤瀉湯 治心下悸，小便不利。

上衝及嘔吐，渴欲飲水者。

茯苓一分 澤瀉六分 甘草

桂枝各三分 朮四分 生姜六分

右六味以水二盞四分，煮五味取八

分内澤瀉更煮取六分

澤瀉湯 治苦冒眩小便不利者

澤瀉半二 木一

右二味以水一盞二分煮取六分

五苓散 治消渴小便不利若渴欲

飲水水入則吐者

澤瀉一 茯苓 猪苓

木各六 桂枝四

右五味為散白飲服方寸匕

茵陳五苓散 治發黃兼前方証者

茵陳蒿十分 苓五分 散五分

五苓散三分 散七分 散五分 散五分

右二物和服方寸匕日三服

猪苓湯 治小便不利若淋瀝若渴

欲飲水者

猪苓 澤瀉 茯苓 滑石

阿膠各六

右五味上，四味以水一盞二分煮取六分，內膠令消七

猪苓散 治渴而心下悸，小便不利者

猪苓 茯苓 木各等

右三味為散，飲服，方寸匕，日三服

牡蠣澤瀉散 治身體水腫，腹中有

動渴而小便不利者

牡蠣 澤瀉 括婁根 蜀漆

葶藶 海藻 高陸各等

右七味為末，白飲和服，方寸匕，日三服

服

八味丸 治臍下不仁，小便不利者

乾地黄之八兩 山茱萸之八兩

薯蕷之各十四兩 茯苓之各十四兩

之各十四兩 二兩 弱私日今

牡丹皮

今各三兩

私曰

挂枝

十七

附子

聚各方一兩

外臺私曰

要今之

挂枝

二弱類

附子

徒子之二兩

澤瀉

今三兩

九私曰

弱曰

右八味末之煉蜜和丸

梧子大

酒下

三

服

十五丸日再服

括萋瞿麥丸

治心下悸小便不利

惡寒而渴者

括萋根

今二兩

私曰

茯苓

薯蕷

今各三兩

九私曰

附子

私曰

今

五分

瞿麥

今一兩

三私曰

梧子

大飲

三服

右五味末之煉蜜丸

梧子大

飲服

三

服

丸日三服

麻黃湯

治喘而無汗頭痛發熱惡

寒身體疼者

麻黃

二分

桂枝

八分

杏仁

二分

甘草

四分

右四味以水二盞四分十八煮取六分
麻黃加朮湯 治本方証而小便不利者

麻黃七分 桂枝五分 杏仁七分

朮一分 甘草二分

右五味以水二盞二分煮取六分

麻黃甘草湯 治喘急息迫或自汗或不汗者

甘草一分 麻黃二分

右二味以水二盞煮取六分

麻黃附子甘草湯 治前方証而惡寒或身微痛者

甘草 麻黃各一分 附子七分

右三味以水一盞四分煮取六分

麻黃杏仁甘草石膏湯 治麻黃甘草湯証而咳煩渴者

麻黃

二分

杏仁

六分

甘州

六分

十九

石膏

四分

右四味

以水二盞煮取六分

麻黃附子細辛湯

治麻黃附子甘

艸湯証而不急迫有痰飲之變者

麻黃

細辛

各一分

附子

七分

右三味以水二盞煮取六分

麻黃杏仁薏苡甘州湯

治麻黃杏

仁甘州石膏湯証而不煩渴有水氣者

薏苡仁

二分

甘州

五分

麻黃

一分

杏仁

五分

右四味以水一盞半煮取六分

牡蠣湯

治麻黃甘州湯証而胸中

有動者

牡蠣

一分

甘州

五分

麻黃

一分

蜀漆

七分半

右四味以水二盞四分煮蜀漆麻黃

得一盞八分內二味煮取六分

麻黃醇酒湯 治喘而發黃或身疼

者

麻黃

三

右一味以清酒一盞二分煮取六分

頓服

半夏麻黃丸

治喘而嘔者

半夏

麻黃

各等分

右二味末之蜜丸小豆大飲服三丸

日一

大青龍湯

治喘及咳嗽渴飲水

上衝或身疼惡風寒者

麻黃

一分

桂枝

甘草

各四分

杏仁

四分

石膏

一分

生姜

大棗各六分

右七味以水一盞八分煮取六分

小青龍湯 治咳喘上衝頭痛發熱

惡風或乾嘔者

麻黃 芍藥 甘草 乾姜

桂枝 細辛各三分 半夏

五味子各六分

右八味以水二盞煮取六分

文蛤湯 治煩渴而喘咳急者

文蛤一分 麻黃 甘草 生姜各六分

石膏一分 杏仁四分 大棗六分

右七味以水一盞八分煮取六分

越婢湯 治大青龍湯証而不咳嗽

上衝者

麻黃一分 石膏一分 甘草四分

生姜六分 大棗七分

右五味以_ニ水一_テ盞二分_ヲ煮取_テ六分_ヲ
越婢加朮湯 治_ス本方証而小便不利者_ヲ

麻黄_{分九} 石膏_{分二} 大棗

朮_{分各六} 甘草_{分二} 生姜_{分四}

右六味以_ニ水一_テ盞二分_ヲ煮取_テ六分_ヲ

越婢加半夏湯 治_ス本方証而嘔逆者_ヲ

麻黄_{分九} 石膏_{分二} 甘草_{分三}

生姜_{分四} 大棗_{分六} 半夏_{分七}

右煮法同前

葛根湯 治_ス項背強急發熱惡風或

喘或身疼者_ヲ

葛根_{分八} 麻黄_{分六} 桂枝 芍藥

甘草_{分各四} 大棗 生姜_{分各六}

右七味以_ニ水二_テ盞煮取_テ六分_ヲ

葛根加半夏湯 治本方証而嘔者

葛根分六 麻黃分四 桂枝

甘艸分三 芍藥分三 半夏分九

大棗分四 生姜分四

右八味以水二盞煮取六分

葛根黃連黃芩湯 治項背強急心

悸而不利者

葛根分一 甘艸分一 黃芩分四

黃連分六 右四味以水二盞煮取六分

小柴胡湯 治胸脇苦滿或寒熱往

來或嘔者

柴胡分八 黃芩 人蔞 甘艸

生姜 大棗各三 半夏分六

右七味以水二盞四分煮取半

再煎取六分

柴胡加芒消湯

治小柴胡湯証而

苦滿難解者

於本方加芒硝六分

右煮法同前而內芒硝上微火令消

柴胡太半夏加括蕒湯

治小柴胡

湯証而渴不嘔者

柴胡八分 括蕒根四分 人蔘

黃芩 甘草 大棗各三 生姜三

右七味以水二盞四分煮取半升滓再煎取六分

柴胡加桂枝湯

治小柴胡湯與桂

枝湯二方証相合者

桂枝二分 芍藥三分 黃芩

人蔘 半夏 甘草 大棗各三

柴胡八分 半夏六分 甘草二分

右煮法同前

柴胡姜桂湯

治小柴胡湯証而不

嘔不痞上衝而渴腹中有動者

柴胡分八 桂枝 乾姜 牡蠣

黃芩分各三 括蕒根分四 甘草分二

右煮法同前

柴胡加龍骨牡蠣湯

治小柴胡湯

証而從臍下至胸腹有動上逆心下

悸者

柴胡分八 半夏分五 大黃分四

大棗 生姜 人蔘 桂枝

茯苓 鈇朮 龍骨 牡蠣各分三

右十一味以水二盞四分煮減分半太

滓內分二大黃再煎取分六

大柴胡湯

治小柴胡湯証而心下

不痞鞭腹滿拘攣或嘔者

柴胡分八 黃芩 芍藥 大棗各分三

半夏分六

枳實分四

大黃分二

生姜分五

右八味以水二盞四分煮減半太滓再煎取六分

白虎湯

治大渴引飲煩燥者

石膏分四

知母分九

粳米分一

甘草分三

右四味以水二盞煮取一盞二分太滓內粳米煮取六分

白虎加人參湯

治本方証而心下痞鞭者

於本方加人參四分半

右煮法同前

白虎加桂枝湯

治本方証而上衝者

知母分六

石膏分一

粳米分四

甘艸分二 桂枝分三

右煮法同前二

小承氣湯 治ス腹滿而大便鞭者キ

大黃二分 厚朴分六 枳實分九

右三味以水二盞煮取分六

厚朴三物湯 治ス小承氣湯証而腹

滿劇者キ

厚朴分六 大黃分八 枳實分一

右三味以水二盞四分先煮分二味取分二

一盞內大黃煮取分六

厚朴大黃湯 治ス厚朴三物湯証而

腹滿劇者キ

厚朴分四 大黃分九 枳實分六

右三味以水一盞半煮取分六

厚朴七物湯 治ス腹滿發熱上逆嘔キ

者キ

厚朴二分 甘草 大黄各四分

桂枝三分 枳實 生姜各七分

大棗四分

右七味以水一盞半煮取六分

大承氣湯 治腹堅滿若下利臭穢

若燥屎者凡有燥屎者臍下磊砢也

肌層枯燥

大黄八分 厚朴六分 枳實一分

芒硝一分

右四味以水二盞煮二物取一盞半

太滓內大黃煮取六分內芒硝令消

大黃黃連瀉心湯 治心煩心下痞

按之濡者

大黃二分 黃連一分

右以麻沸湯六分漬之須臾絞太滓

服

瀉心湯

治心氣不定心下痞按之

濡者十九

大黃一分

黃連

黃芩

各六分

右以麻沸湯六分漬之須臾絞去滓服

附子瀉心湯

治瀉心湯証而惡寒者

大黃一分

黃連

黃芩

各五分

附子七分

右以水九分先煮附子取六分去滓令沸內諸藥漬之須臾絞去滓服

大黃附子湯

治腹絞痛惡寒者

大黃一分

附子一分

各一分

細辛六分

右三味以水一盞半煮取六分

大黃甘遂湯

治小腹滿如敦狀小便微難或經水不調者

便微難或經水不調者

大黃一分 阿膠 甘遂各六分

右三味以水一盞八分煮取六分

私曰按如敦狀猶謂叔世如覆杯字

書曰敦盛黍稷之器可以知

抵當湯 治瘀血者凡有瘀血者二

焉少腹鞭滿小便快利者一也腹不

滿其人言我滿者二也急則以湯緩

則以丸

水蛭 蠱蟲各十箇 大黃二分

桃仁七分

右四味為末以水一盞煮取六分

抵當丸

水蛭二十箇 蠱蟲二十箇 桃仁二十箇

私曰一兩也今大黃三兩九分私曰

也之三也

右四味杵分為四丸以水九分煮

丸_一取_二六分_一服_ス

橘皮大黃朴硝湯

治_ス心_二胸間有_一宿

滯_一而結_二者_一

橘皮_{分六} 大黃 朴硝_{各一分}

右三味以_ニ水_一一盞二分_ヲ煮_テ取_ル六分_ヲ

大黃硝石湯 治_ス發_ス黃_一腹_二中有_一結_二塊_一

者_上

大黃 黃蘗 硝石_{各八} 枳子_{分四}

右四味以_ニ水_一一盞二分_ヲ煮_テ取_ル六分_ヲ

滓_内硝石_令消_セ

大黃牡丹湯 治_ス臍_下有_堅塊_按之_之

即_チ痛_ミ及_ビ便_膿血_者

大黃_{分八} 牡丹皮_{分六} 桃仁_{分四}

瓜子_{二分} 硝石_{分四}

右五味以_ニ水_一三盞_ヲ煮_テ取_ル六分_ヲ太_滓内_ニ

硝石_令消_セ

大黃甘艸湯

治_ス秘閉急迫者_ヲ

三十二

大黃

貳二

甘艸

分三

右二味

以_テ水

一盞

八分

煮取

六分_ヲ

調胃承氣湯

治_ス前方証_ヲ而實者_ヲ

大黃

貳一

甘艸

分五

硝石

貳二

右三味

以_テ水

一盞

八分

煮取

六分_内

硝石

令消_セ

桃核承氣湯

治_ス血証小腹急結上

衝者_ヲ

桃仁

桂枝

甘艸

芒硝

各五

分五

大黃

貳一

右五味

以_テ水

一盞

七分

煮取

六分_内

硝石

令消_セ

下瘀血湯

治_ス臍下毒痛及_ヒ經水不

利者_ヲ

桃仁

個三十

蟅蟲

枚二十

大黃

兩二

私曰今之
六衰弱

右三味末之煉蜜和為四丸以酒八分煮一丸取六分頓服之

土瓜根散

治少腹拘急經水不利

或下白物者

芍藥

桂枝

土瓜根

麋蟲

今各三分五分私曰一分

右四味為末酒服方寸匕

甘州湯

治病逼迫及咽急痛者

甘州

右一味

以水一盞二分煮取六分

桔梗湯

治前方証而有膿或粘痰

者

甘州

桔梗

右二味

以水一盞八分煮取六分

排膿湯

治膿血及粘痰急迫者

甘草 分八

桔梗 一分

生姜 分四

大棗 一分

右煮法同前

芍藥甘草湯

治拘攣急迫者

芍藥

甘草 各一分

右二味以水一盞二分煮取六分

甘遂半夏湯

治前方証而心下鞭

滿者

甘遂 分三

甘草 一分

芍藥 一分

半夏 分六

右四味以水一盞半煮取四分弱內

蜜四分弱煎取六分

甘麥大棗湯

治急迫而狂驚者

甘草 分六

小麥 分四

大棗 分五

右三味以水一盞二分煮取六分

芍藥甘草附子湯

治芍藥甘草湯

証而惡寒者

芍藥 甘州各一分 附子六分

右三味以水二盞煮取六分

甘州粉蜜湯 治吐涎吐蟲心痛發

作有時者

甘州二分 粉一分 蜜四分

右三味以水九分先煮甘州取六分

太萍內二味攪令煎如薄粥 和私

曰平井氏分量考曰粉千金方為梁

米粉外臺秘要作黍米粉此經所謂

粉者粉錫也一名鉛粉即黑錫灰藥

舖稱鉛胡粉者是也

生薑甘州湯 治咳唾涎沫不止心

下痞鞭急迫者

生薑一分 甘州八分 大棗七分

人蔘六分

右四味以水一盞四分煮取六分
甘艸乾姜湯 治厥而煩燥多涎唾者

甘艸 二錢 乾姜 一錢

右二味以水一盞二分煮取六分

四逆湯 治四肢逆厥身體疼痛下利

清穀或小便清利者

甘艸 二錢 乾姜 一錢 附子 各九分

右三味以水一盞半煮取六分

通脈四逆湯 治前方証而劇者

甘艸 一錢 附子 半錢 乾姜 半錢

右煮法同前

四逆加入葶湯 治四逆湯証而心

下痞者

甘艸 一錢 乾姜 半錢 附子 半錢

人葶 五分

右煮法同前

茯苓四逆湯

治前方証而悸者

乾姜

附子

各三分

甘草

四分

茯苓

二分

人蔘

三分

右五味

以水一盞

煮取六分

通脈四逆加猪膽汁湯

治通脈四

逆湯証而急結者

於本方加膽汁一大蜆殼餘依本方

附子粳米湯

治腹中雷鳴切痛或

嘔吐者

附子

三分

半夏

二分

甘草

二分

大棗

五分

粳米

二

右五味

以水一盞

六分煮取六分

薏苡附子散

治胸中痺惡寒者

薏苡仁

附子

各等

右二味為散服方寸匕日三

薏苡附子敗漿散

治身甲錯腹皮

急按之濡如腫狀腹無積聚者

薏苡仁十分七私五分日分今弱

附子二分私一分日分今弱

敗漿五分七私分日今弱之

右三味為散取方寸匕以水一盞二

分煮減半頓服

大烏頭煎

治毒繞臍絞痛或自汗

出手足厥冷者

烏頭四

右一味以水九分煮取三分去滓內

蜜六分再煎取六分

烏頭湯

治骨節疼痛不可屈伸若

自汗或盜汗若腹中絞痛者

麻黃芍藥黃耆甘草各六

烏頭大一烏頭五分煎法如

右以水九分煮四味取三分太滓内
蜜煎中更煎和服

赤丸 治心下悸有痰飲惡寒或微

厥者

茯苓 半夏 各四兩 今之十兩 二私曰

烏頭 之六兩 貳私曰今 細辛 一兩 今

之三

右四味未之内真朱為煉蜜丸如麻
子大先食酒飲下三九日三私曰

平井氏分量考曰内真朱為色以淡

紅色為度加一兩半可也貞庵曰今

之四貳五分弱也

真武湯 治心中躁身𦓐動振欲

擲地小便不利或嘔若下利若拘痛

者

茯苓 芍藥 生姜 各九分

附子

四分半

木六分

右五味

以水一盞六分テ煮取六分ル

附子湯

治ス身體癱痛小便不利心

下痞鞭若腹痛者ヲ

茯苓

芍藥

附子各六分

木八分

人蔘四分

右煮法同前ニ

天雄散

治ス小便不利上逆臍下有

動惡寒者ヲ

天雄

今四兩之半

私曰五分三枚也

龍骨

今三兩之九

私曰今五分一枚也

十也

桂枝

今六兩之八

右四味

為散酒服ス三錢テ匕ラ日三ヒ

梔子豉湯

治ス心中懊懷者ヲ

梔子

四分

豉二枚

右二味以水一盞六分先煮梔子取テ

一盞_ヲ太_レ滓_ヲ内_レ豉_ヲ煮_テ取_ル六_分_ヲ

梔子甘_州豉湯 治_ス本_方証_ニ而_レ急_迫

者_ヲ

於_テ本_方加_フ甘_州一_錢_ヲ

右_ニ煮_法同_前

梔子生_姜豉湯 治_ス本_方証_ニ而_レ嘔_者

於_テ本_方加_フ生_姜二_錢半_ヲ

右_ニ煮_法同_前

枳實_{梔子}豉湯 治_ス本_方証_ニ而_レ胸_滿

者_ヲ

枳實_{六分} 梔子_{七分} 豉_{四分}_ヲ

右_ニ三_味以_テ水_{一盞}六_分先_ツ煮_テ二_味取_リ

八_分下_レ豉_ヲ煮_テ取_ル六_分_ヲ

梔子大_黃湯 治_ス前_方証_ニ而_レ閉_者

梔子_{六分} 枳實_{一分}_ヲ 大_黃_{三分}

豉_{四分}

右四味以水一盞八分煮三味取一盞下鼓取六分

茵陳蒿湯

治一身發黃大便難者

茵陳蒿八分

梔子七分

大黃六分

右三味以水二盞煮茵陳蒿取一盞二分內二味煮取六分

梔子蘘皮湯

治身黃發熱心煩者

梔子二分

甘州六分

黃蘗二分

梔子厚朴湯

治胸腹煩滿者

厚朴

枳實各一分

梔子七分

梔子乾姜湯

治心中微煩者

梔子四分

乾姜一分

右二味以水一盞四分煮取六分

大陷胸湯

治結胸或從心下至少腹鞭滿者

大黃分九

芒硝分二

甘遂分七厘半

四十三

右以水一盞八分煮大黃取六分內

芒硝令沸內甘遂末服

大陷胸丸

治結胸或項背强者

大黃

之二杏仁之半

芒硝

私曰今

葶藶

今半斤之十私曰今

右五味

上四味搗和取如彈丸一枚

以白蜜一分強水一盞二分煮取六

分內甘遂末服

小陷胸湯

治小結胸者

黃連

半夏

栝蒌實分八

右三味以水一盞八分煮栝蒌實取

九分內二味煮取六分

栝蒌薤白白酒湯

治胸背痛喘息

咳唾者

括萋實分六 薤白四分 白酒二盞

右三味同煮取六分 私曰平井氏

分量考曰白酒千金方作白截漿即

酢也今試用之氣味猛烈而難下于

咽嗌也故不采用按白酒之來尚矣

靈樞經曰足陽明之筋病以白酒和

桂以塗其緩者云

括萋薤白半夏湯 治前方証而嘔

者

括萋實分三 薤白分九 白酒半二盞

半夏一分

右煮法同前

瓜蒂散 治欲溫吐者

瓜蒂分五 赤小豆分五

右二味為散先以香豉二匙熱湯七

分煮作稀糜去滓取汁和散溫頓服

之

文蛤散

治渴者

文蛤

之五兩
五私曰今

右一味為散以沸湯和一錢匕服意欲水反不渴者與之

大半夏湯

治嘔吐而心下痞鞭者

半夏

四二錢

人蔘

分三

蜜

分二錢七
分五厘

右三味以水三盞弱煮取六分

小半夏湯

治吐而不渴者

半夏

四二錢

生姜

分一錢

右二味以水二盞八分煮取六分

生姜半夏湯

治似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦心中憤々然無奈何者

半夏

三

生姜汁

右以水一盞二分煮半夏取八分內

生姜汁四分煮取六分

小半夏加茯苓湯 治本方証而賦

悸者上

半夏四分 生姜一分 茯苓六分

右三味以水二盞八分煮取六分

半夏苦酒湯 治咽中生瘡音啞者

半夏五分 雞子一枚 去黃存白

右內半夏於雞子殼中安火上令三

沸去滓少含嚥之私曰今以

造法不成宜從原法誠以半夏著苦

酒一夜為佳雞子乃可從東洞氏之

說唯不內苦酒已

半夏厚朴湯 治咽中如有炙臍或

嘔或心下悸者上

厚朴三分 半夏一分 茯苓四分

乾蘇葉二分 生姜五分

右五味以水一盞煮取六分

半夏乾姜散

治乾嘔吐逆涎沫者

半夏

乾姜

各等分

右二味為散取方寸匕以水一盞三分煮取六分

乾姜人蔘半夏丸

治嘔吐不止心

下痞鞭者

乾姜

人蔘

各一兩

三錢

私曰

半夏

今二兩

私曰

右三味末之以生薑汁糊為丸如梧子大服十九日三

半夏瀉心湯

治心下痞鞭腹中雷

鳴者

半夏

九分

黃連

一分

黃芩

人蔘

大棗

乾姜

甘艸

各四分

右七味以水二盞煮取一盞二分滓再煎取六分

甘艸瀉心湯 治前方証而心煩不

得安者上

甘艸分六 半夏分九 黃連半一分

黃芩 人蔞 大棗 乾姜分各四分

右煮法同前

生姜瀉心湯 治半夏瀉心湯証而

嘔者上

生姜分六 半夏分九 黃連半一分

黃芩半四分 乾姜半一分 人蔞

甘艸 大棗分各四分

右煮法同前

吳茱萸湯 治胸滿心下痞鞭嘔者

吳茱萸一錢五厘 人蔞 大棗分各四分

生姜分九

右四味以水二盞一分煮取六分

厚朴生薑半夏甘艸人蔞湯 治胸

腹滿而嘔者

厚朴

生姜

各一分

半夏

九分

甘州

人蔘

一分

右五味

以水二盞煮取六分

黃連湯

治心煩心下痞欲嘔吐上

衝者

黃連

甘州

乾姜

桂枝

各四分

人蔘

半夏

九分

大棗

四分

右七味

以水二盞煮取一盞二分

乾姜黃連黃芩人蔘湯

治心煩心

下痞鞭吐下者

乾姜

黃連

黃芩

人蔘

各七分

右四味

以水一盞八分煮取六分

大建中湯

治腹大痛嘔不能食腹

皮起如頭足者

蜀椒

乾姜

一分

人蔘

八分

膠飴

十五勺即十六勺

右四味上，三味以水一盞六分煮取八分，太滓內飴煎取六分。

黃連阿膠湯

治心中悸而煩不得

眠者上

黃連

二分

黃芩

三分

芍藥

六分

雞子黃

一枚之三分

阿膠

九分

右五味以水一盞半先煮三物取六分，太滓內膠烱盡，小冷內雞子黃攪令相得，溫服。

黃芩湯

治下利腹拘急者

黃芩

大棗

各九分

甘草

芍藥

各六分

右四味以水二盞煮取六分

黃芩加半夏生姜湯

治前方証而

嘔逆者

黃芩

大棗各六分

甘州四分

芍藥四分

半夏一分

生姜六分

右煮法同前

六物黃芩湯

治心下痞鞭乾嘔下

利上衝者

黃芩

大棗

人蔘

乾姜各四分半

桂枝一分半

半夏九分

右六味以水一盞四分煮取六分

三物黃芩湯

治心胸苦煩者

黃芩四分

苦參八分

乾地黄一分

右三味以水一盞八分煮取六分

白頭翁湯

治熱利下重而心悸者

白頭翁五分

黃栢

黃連

秦皮各七分半

右四味以水二盞煮取六分

白頭翁加甘州阿膠湯

治前方証

而有血証急迫者

白頭翁分四 黃連 黃栢

秦皮分各六 甘州 阿膠分各四

右六味上五味以水一盞七分煮取

六分內膠令消セ

木防已湯 治心下痞鞭煩渴者

防已半七分 石膏一分 桂枝五分

人蔘一分

右四味以水一盞八分煮取六分

木防已太石膏加茯苓芒硝湯 治

心下痞堅而悸者

防已分六 桂枝分四 人蔘分八

茯苓分八 芒硝一分

右五味上四味以水一盞八分煮取

六分內芒硝令消セ

防已茯苓湯 治四肢聶動水氣

在皮膚而上衝者_上

防已 黃耆 桂枝 各四分

茯苓 九分 甘州 三分

右五味以水一盞八分煮取六分_一

防已黃耆湯 治水病身重汗出惡

風小便不利者_一

防已 六分 甘州 三分 黃耆 七分

木 大棗 生姜 各四分

右六味以水一盞八分煮取六分_一

枳實芍藥散 治腹滿拘攣或痛者_一

枳實 芍藥 各等分

右二味為末服方寸匕日三_一

枳木湯 治心下堅滿小便不利者_一

枳實 二分 木 六分

右二味以水一盞煮取六分_一

排膿散 治瘡家胸腹拘滿若吐粘

痰或便膿血者^上

枳實^{六一}芍藥^六桔梗^二

右三味為末取雞子黃三分以藥末

與雞子黃相等揉和令相得飲和之

日一服

桂枝枳實生薑湯 治胸滿上逆或

嘔者

桂枝^九枳實^五生薑^九

右三味以水一盞二分煮取六分

枳實薤白桂枝湯 治胸中痺滿痛

者

枳實^八薤白^六桂枝^二

枳實^八厚朴^八

右五味以水一盞八分先煮枳實厚

朴取八分太滓內諸藥煮取六分

橘皮枳實生薑湯 治胸中痺滿而

嘔者

橘皮

四分

枳實

四分

生姜

一分

右三味

以水

一盞

半煮取

六分

茯苓飲

治心下痞鞭而悸小便不

利胸滿而自吐宿水者

茯苓

人蔘

朮

各六分

枳實

四分

橘皮

五分

生姜

八分

橘皮竹茹湯

治胸中痺吃逆者

橘皮

三分

竹茹

八分

大棗

七分半

生姜

八分

甘草

五分

人蔘

一分

右煮法同前

橘皮湯

治胸中痺嘔噦者

橘皮

二分

生姜

四分

右二味

以水

一盞

四分

煮取

六分

桂枝茯苓丸

治拘攣上衝心下悸

經水有變或胎動者

桂枝 茯苓 芍藥 桃仁

牡丹皮 各等

右五味末之蜜丸大升

芎歸膠艾湯 治漏下腹中痛者

芎藭 阿膠 甘艸各三 艾葉

當歸各四分 芍藥六 乾地黄九

右七味以水一盞清酒一盞合煮取

六分內膠令消

薤覆花代赭石湯 治心下痞鞭噎

氣不除者

薤覆花 甘艸各六 人蔘四

半夏一分 生姜一分 代赭石二分

大棗五分

右七味以水二盞煮取一盞二分

滓再煎取六分

赤石脂禹餘糧湯

治毒在臍下而

利者上

赤石脂 禹餘糧各一分

右二味以水一盞八分煮取六分

桃花湯 治便膿血者

赤石脂一分 乾姜七分 粳米二分

右三味以水二盞煮取六分更內赤

赤石脂末方寸匕

酸棗仁湯 治煩燥不得眠者

酸棗仁四分 甘草一分 知母

芎藭 茯苓各二分

右五味以水一盞六分先煮酸棗仁

取一盞二分內諸藥煮取六分

葶歷大棗瀉肺湯 治浮腫咳逆喘

鳴迫塞胸滿強急者

葶歷一分 大棗八十分

右二味先以水一盞八分煮取一盞
二分去滓內葶藶煮取六分

蜜煎導

治肛中乾燥大便澁者

蜜之七合 私曰今

右一味內銅器中微火煎之稍凝似

飴狀擾之勿令焦著欲可丸併手捻

作挺令頭銳大如指長二寸許當熱

時急作冷則硬以內穀道中以手急

抱欲大便時乃去之私曰二寸今

之一寸四分強

麻仁丸

治平日大便秘者

麻子仁之二升 私曰今 芍藥半斤

今之二十 大黃之一斤 私曰今

厚朴之一尺 私曰今 枳實半斤

之二十 杏仁之一升 私曰今

右六味為末煉蜜為丸梧子大飲服

十九日三

已椒薤黃丸

治腹滿口舌乾燥

便澁滯者

防已

椒目

葶藶

大黃

各一兩

今之三

右四味末之蜜和丸梧子大服一九

日三

蜀漆散

治寒熱發作有時臍下有

蜀漆

雲母

龍骨

各等

右三味為末發前以漿水服半錢匕

平井氏分量考曰地漿水一名土漿

造法詳于本艸云一方盛赤土於

器內入水造之亦可備急也

十棗湯

治病在胸腹掣痛者

芫花

甘遂

大戟

各等分

六十

大棗

枚十

右以水一盞煮大棗取六分去滓內

散一錢匕羸人半錢匕

桔梗白散

治毒在胸咽或吐下如

膿汁者

上

桔梗

三分 五分 五分 五分 五分 五分 五分 五分 五分 五分

貝母同

巴豆

一分 一分 一分 一分 一分 一分 一分 一分 一分 一分

右三味為末以白飲服半錢匕羸者減之

走馬湯

治胸腹有毒若心痛若腹

痛者

杏仁

枚二

巴豆

枚二

右二味以綿纏槌令碎熱湯六分捻

取白汁飲之

備急圓

治心腹急痛者

大黃 巴豆 乾姜 各一兩 三錢 弱 私曰

右為末蜜丸

礬石湯 治脚氣痿弱不仁及上入

捨心者

礬石 今之兩六錢私曰

右一味以漿水一斗五升煎三五沸

浸脚良 私曰漿水說見蜀漆散方

後一斗五升乃今之一升五合弱也

消礬散 治一身悉黃腹脹如水狀

大便黑時澹者

礬石 消石 各等

右二味為散以大麥粥汁和服方寸

七日三

礬石丸 治經水不利下白物者

礬石 三分 二錢 分私曰今之

杏仁 一分 五厘 分私曰今

右二味末之煉蜜和丸棗核大以內藏中

蛇床子散 治下白物陰中痒或有

小瘡者上

蛇床子

右一味末之以白粉少許和令相得

如棗大綿裹內之自然温陰中坐

藥白粉即

補遺

炙甘草湯 治傷寒脉結代心動悸

○虚勞不足汗出而悶脉結悸行動

如常不出百日危急者十一日死○

肺痿涎唾多心中温々液々者

甘草炙四兩 生姜 桂枝各三

人參 阿膠各二 生芩介一

麥門冬 麻子仁各半 大棗枚十二

右九味以清酒七升水八升先煮八味取三升去滓内膠烱消盡温服一升日三服一名復脉湯

麻黄連軀赤小豆湯 治傷寒瘀熱

在身必發黃

麻黄 連翹 生姜 各二 赤小豆

生梓白皮 枲 杏仁 各一 十

大棗 枚十二 甘草 兩一

右八味以潦水一斗先煮麻黄再沸去上沫内諸藥煮取三升分温三服半日服盡

猪膚湯 治少陰病下利咽痛胸滿

心煩者

猪膚 斤一

右一味以水一斗煮取五升去滓加白蜜一升白粉五合熬香和相得温

分六服

四逆散

治少陰病四逆其人或效

或悸或小便不利或腹中痛或泄利
下重者

甘草 枳實 柴胡 芍藥

右四味各十分搗篩白飲和服方寸

匕日三服後加減法效者加五味子

干薑各五分并主下利悸者加桂枝

五分小便不利者加茯苓五分腹中

痛者加附子一枚泄利下重者先以

水五升煮薤白三升煮取三升去滓

以散方三寸七內湯中煮取一升半

分溫三服

烏梅圓

治傷寒脈微而厥至七八

日膚冷其人躁無暫安時者此為藏

厥非為虵厥也虵厥者其人當吐虵

六十五
愈病者，靜而復時煩，此為截寒。虵上入膈，故煩。須臾復止，得食而嘔，又煩者，虵聞食臭，出其人當自吐虵，々厥者。

烏梅 個三百 細辛 附子 桂枝

人參 黃藥 兩各六 干姜 兩十

黃連 勅一 當飯 兩四 蜀椒 兩四

右十味異擣篩合治之，以苦酒漬烏

梅一宿，去核蒸之，五升米下飯熟，擣成泥，和藥令相得，內白中，與蜜杵二千，下圓如梧桐子，大先食飲，服二十圓，日三服，稍加至二十圓，禁生冷消物，臭食等。

當歸四逆湯 治手足厥寒，脉細欲

絕者，○下利脉大者，虛也，以其強下之故也。設脉浮革，因爾腸鳴者。

當飯 桂枝 芍藥 各三 細辛

甘草 通草 各二 大棗 二十個

右七味以水八升煮取三升去滓温服一升日三服

當飯 四逆加吳茱萸生姜湯 治者

其人內有久寒者

當飯 芍藥 桂枝 細辛 各三

甘草 通草 各二 生姜 半斤

吳茱萸 仁 大棗 五十枚

右九味以水六升清酒六升和煮取

五升去滓温分五服一方水酒各四

升

麻黄升麻湯 治傷寒六七日大下

後寸脉沈而遲手足厥逆下部脉不

至咽喉不利唾膿血泄利不止者

麻黄 二兩 升麻 當飯 各一分

知母 黃芩 姜蕤各十 石膏

朮 干姜 芍藥 天門冬 桂枝

茯苓 甘草各六

右十四味以水一斗先煮麻黃一兩
沸去上沫內諸藥煮取三升去滓分
溫三服相去如炊三斗米頃令盡汗
出愈

燒視散方 治傷寒陰陽易之為病

其人身體重少氣少腹裏急或引陰
中拘攣熱上衝胸頭重不欲舉眼中
生花膝胫拘急者

右取婦人中視近隱處剪燒灰以水
和服方寸匕日三服小便即利陰頭
微腫則愈婦人病取男子視當燒灰
一物瓜蒂湯 治大陽中暍身熱疼
重而脈微弱此以夏月傷冷水々行

皮中野致也 ○諸黃

瓜蒂 二十箇

右剉以水一升煮取五合去滓頓服

百合知母湯 治下百合病發汗後者

百合 七枚 知母 三兩

右先以百合漬一宿當白沫出去其

水更以泉水二升煎知母取一升去

滓後合和煎取一升五分溫再服

滑石代赭湯 治百合病下之後者

百合 七枚 滑石 三兩 代赭石 如彈丸一枚

右先以水洗百合漬一宿當白沫出

去其水更以泉水二升煎取一升去

滓別以泉水二升煎滑石代赭取一

升去滓後合和重煎取一升五分

溫服

百合雞子湯 治百合病吐之後者

百合七枚 雞子黃一枚

右先以水洗百合漬一宿當白沫出

去其水更以泉水二升煎取一升去

滓內雞子黃攪勻煎五分溫服

百合地黄湯 治百合病不經吐下

發汗病形如初者

百合七枚 生薑汁一分

右以水洗百合漬一宿當白沫去其

水更以泉水二升煎取一升去滓內

地黃汁煎取一升五分溫再服中

病勿更服大便當如漆

百合洗方 治百合病一月不解變

成渴者

右以百合一升以水一斗漬之一宿

以洗身洗已食煮餅勿以鹽也

括萋牡蛎散 治百合病渴不差者

括萎根 牡蛎等

右為細末飲服方寸七日三服

百合滑石散 治百合病變發熱者

百合兩一 滑石兩三

右為散飲服方寸七日三服當微利

者止服熱則除

赤小豆當飯散 治病者脉數無熱

微煩默默但欲卧汗出初得之三四

日日赤如鳩眼七八日目四眦黑若

能食者膿已成也○下血先血後便

此近血也

赤小豆升三 當飯兩十

右二味杵為散漿水服方寸七日三

服

升麻鱉甲湯 治陽毒之為病面赤

斑々如錦文咽喉痛唾膿血五日可

治七日不可治。○陰毒之為病面目青身痛如被杖咽喉痛五日可治。七日不可治。去雄黃蜀椒主之。時後千金方用雄黃無鱉甲有桂陰毒用甘草

升麻 甘草 當歸

蜀椒 雄黃 鱉甲

右六味以水四升煮取一升頓服之。老少再服取汗。

鱉甲煎丸 治病瘡以月一日發當

以十五日愈。設不差當月盡解如其不差當去何師去此結為癥瘕名曰瘡母急治之。

鱉甲	赤消	烏扇	黃芩
鼠婦	干姜	大黃	桂枝
厚朴	紫威	阿膠	柴胡
蜣螂	芍藥	牡丹	

麩虫 各五
葶歷 半夏

人參 各一
瞿麥 桃仁 各二

蜂窠

右二十三味為末取銀竈下灰一斗

酒一斛五斗浸灰候酒盡下半着鱉

甲於中煮令泛爛如膠漆絞取汁內

諸藥煎為丸如梧子大空心服七丸

日三服海金三方用大蠶甲十二分蠶又五

分無煎婦赤消二味以鱉甲煎和諸藥為丸

侯氏黑散 治大風四肢煩重心中

惡寒不足者外風治

菊花 各十 木 防風 各十 細辛

茯苓 牡蛎 人參 礬石 當飯

干姜 芎藭 桂枝 各三 桔梗 各八

黃芩 各五

右十四味杵為散酒服方寸匕日一

服初服二十日温酒調服禁一切魚肉大蒜常宜冷食自能助藥力在腹中不下也熱食即下矣冷食自能助藥力

風引湯

治熱癰癩

治大人驚癰瘦引日少

兼數十後脚氣宜風引湯

大黃 干姜 龍骨 桂枝

甘草 牡蛎 寒水石 滑石

赤石脂 白石脂 紫石英

石膏 各六兩

右十二味杵麤篩以韋囊盛之取三指撮并花水三升煮三沸温服一升

防已地黄湯

治病如狂狀妄行獨

語不休無寒熱其脉浮

防已 桂枝 防風

甘草

右四味以酒一盃浸之一宿絞取汁生地黄二斤以吹咀蒸之如斗米飯久銅器盛其汁更絞地黄汁和分再服續命湯治中風身躄不能自

口不能言冒昧不知痛處或拘急不

得顛側姚云與大續命同兼治婦人

麻黃 桂枝 當歸 人參 石膏

干姜 甘草 芍藥 芎藭

杏仁四十

右九味以水一斗煮取四升温服一

升當小汗薄覆脊憑坐汗出則愈不

汗更服無所禁勿當風并治但伏不

得卧欬逆上氣面目浮腫

三黃湯 治中風手足拘急百節疼

痛煩熱心乱惡寒經日不欲飲食

麻黃五 獨活四 細辛

黃芪 各二 黃芩 各三

右五味以水六升，煮取二升，分温三服。一服，小汗；二服，大汗。心熱加大黃二分，腹滿加枳實一枚，氣逆加人參三分，悸加牡蛎三分，渴加括萎根三分。先有寒加附子一枚。

朮附湯 治風虛頭重眩苦極不知食味，煖肌補中，益精氣。

朮 兩二 甘草 兩一 附子 半一枚

右三味剉，每五錢，七姜五片，棗一枚，水煮，半煎，七分，太滓，温服。

薯蕷丸 治虛勞諸不足，風氣百疾。

薯蕷 各三十 當飯 桂枝 乾地黄

麴 豆黃卷 各十 甘草 八分

芎藭 麥門冬 芍藥 朮

杏仁 各六 人參 阿膠 各七

紫胡 桔梗 茯苓各五 干姜三

白欬二 防風六 大棗百枚 為膏

右二十一味末之煉蜜和丸如彈子

大空腹酒服一九一百丸為齊

大黃蠶虫丸 治五勞虛極羸瘦腹

滿不能飲食々傷憂傷飲傷房室傷

飢傷勞傷至絡榮衛氣傷內有軋血

肌膚甲錯兩目黯黑緩中補虛

大黃斤 黃芩兩 甘草兩 桃仁

杏仁 蠶虫 蟻螬各一 芍藥兩

軋地黄兩 軋漆兩 水蛭枚百

蠶虫升半

右十二味末之煉蜜和丸小豆大酒

飲服五丸日三服

獺肝散 治冷勞又主鬼疰一門相

漆

獺肝一具炙乾末之水服方寸匕日

三服

射干麻黃湯 治欬而上氣喉中水

雞聲一

射干五十三兩一枚

細辛 紫苑

欵冬花兩各三

五味子半 大棗七枚

半夏一大法者八枚

右九味以水一斗二升先煮麻黃兩

沸去上沫內諸藥煮取三升分温服

澤漆湯 治欬而脉沈者

半夏半 紫參五兩一作紫苑

澤漆三斗 煎以東流 生薑五兩

白前五兩 甘草 黃芩 人參

挂枝兩各三

右九味以水一斗二升先煮麻黃兩

温服五合至夜盡

小青龍加石湯

治肺脹欬而上氣

煩燥而喘脉浮者心下有水澀

更引加三缺骨下

於小青龍湯方內加石膏二兩

奔豚湯

治奔豚氣上衝胸腹痛往

來寒熱

甘草 芎藭 當歸 黃芩

芍藥

各二

半夏

生姜

各四

生葛

兩

甘李根白皮

升

右九味以水二升煮取五升温服一

升日三服夜一服

九痛丸

治九種心痛○兼治卒中

惡腹脹痛口不能言又治連年積冷

流注心胸痛冷腫上氣落馬墜車血

疾等皆主之忌口如常法

附子兩三 生狼牙 巴豆 人參

干姜 吳茱萸略一

右六味末之煉蜜三丸如桐子大酒下

強人初服三丸日三服弱者二丸

旋覆花湯 治肝着其人常欲踏其

胸上先未苦時但欲飲熱○寸口脉

弦而大弦則為減大則為乳減則為

寒乳則為虛寒虛相搏名曰革婦人

則半產漏下

旋覆花兩三 葱十四 新絳少

右三味以水三升煮取一升頓服之

紫參湯 治下利肺痛

紫參兩三 甘草兩三

右二味以水五升先煮紫參取二升

內甘草煮取一升半分温三服

訶梨勒散 治氣利

訶梨勒枚十

右一味為散粥飲和頓服

王不留行散治寸口脉浮微而澀

然當亡血者汗出設不汗者云何答

曰身有瘡被刀斧所傷亡血故也病

金瘡

王不留行 蒴藿 細葉

桑東南根 甘草各十 川椒各三

黃芩 干姜 芍藥 厚朴各二

右九味桑根皮以上三味燒灰存性

勿令灰過各別杵篩合治之為散服

方寸匕小瘡即粉之大瘡但服之在

後亦可服若風寒桑東根勿取之前

三物皆陰乾百日

黃連粉 治浸淫瘡

藜蘆甘草湯 治病人常以手指臂

腫動，此人身軀暈々者。

附子湯

治婦人懷娠六七月脉弦

發熱其胎愈脹腹痛惡寒者少腹如

扇所以然者子臧開故也當以此湯

温其臧

當皈散

婦人妊娠宜常服

當皈

黃芩

芍藥

各一

升

右五味杵為散酒飲服方寸匕七日

再服妊娠常服即易產胎無苦疾產

後百病悉主之

朮散

妊娠養胎

朮

芎藭

蜀椒

各三

牡蛎

分二

右四味杵為散酒服一棗匕日三服

夜一服但腹痛加芍藥心下毒痛倍

加芎藭心煩吐痛不能食飲加細辛

一兩半夏大者二十枚服之後更以醋漿水服之若嘔以醋漿水服之復不解者小麥汁服之已後渴者大麥粥服之病雖愈服之勿置

竹葉湯 治產後中風發熱面赤喘

而頭痛

竹葉把一 葛根兩三 防風 桔梗

桂枝 人參 甘草略一 附子枚一

大棗枚五 生姜兩五

右十味以水一斗煮取二升半分溫三服溫覆使汗出頭項強用大附子一枚破之如豆大入前藥揚去沫吐者加半夏半升洗

竹皮大丸 治婦人乳中虛煩亂嘔

逆安中益氣

生竹筴 石膏各二 桂枝

白薇各一 甘草分七

右五味末之蜜肉和丸彈子大以飲服一丸日三服夜二服有熱者倍白微煩喘者加柏實一分

當飯建中湯 治婦人產後虛羸不

足腹中刺痛不止吸々少氣或苦少腹中急寧痛引腰背不能食飲產後一月日得服四五齊為善令人強壯

宜カラ

當飯兩四 桂枝 生姜各三

芍藥兩六 甘草兩二 大棗樹二

右六味以水一斗煮取三升分温三服一日令盡若大虛加飴糖六兩湯成內之於火上煖令飴消若去血過多崩傷內衄不止加地黄六兩阿膠二兩合八味湯成內阿膠若無當飯

以_テ芎窮_ヲ代_レ之_ニ若_シ無_シ生_シ姜_ヲ以_テ干_シ姜_ヲ代_レ之_ニ
 温經湯 治_ス婦人年五十_ノ所_レ病下_レ利
 數十日不_レ止暮發熱少腹裏急腹滿
 手掌煩熱唇口乾燥何也師曰此病
 屬_ス帶下_ニ何_ヲ以_テ故_シ曾_レ經_テ半_ニ產_ラ瘀_レ血在_ニ少
 腹_ニ不_レ去何_ヲ以_テ知_レ之_ヲ其証唇口乾燥故_ニ
 知_レ之_ヲ○婦人少腹寒久不受_レ胎兼治_ス
 崩中去_レ血或月水來_テ過多及至_テ期不

來_ラ

吳茱萸_三 當皈 芎窮 芍藥

人參 桂枝 阿膠 生姜

牡丹皮 甘草_{各二} 半夏_半

麥門冬_{升一}

右十二味以_テ水一斗_ヲ煮取三升_ヲ分_テ温_テ
 三服_ス

膠姜湯 治_ス婦人陷_シ莖漏_シ下黑不_レ解_レ

紅藍花酒

治婦人六十二種風及

八十五

腹中血氣刺痛

紅藍花酒

右一味以酒一大升煎減半頓服

半未止再服

柴胡飲子

加減時

治五臟虛熱

枳實

冬加

柴胡

木

大腹槓榔

橘皮

生姜

桔梗

三七月加

枳實

減

木

夏共三六月加

生姜

三

枳實

五分

甘草

〇三

秋分三共

月八

加味

橘皮

八三分

共

右各吹咀分為三帖一帖以水三升

煮取二升分溫三服如人行四五里

進一服如四肢壅添甘草少許每貼

分作三小帖每小帖以水一升煮取

一合溫服再合滓為一服重煮都成

四服

長服訶梨勒丸

訶梨勒 橘皮 厚朴各三

右三味末之煉蜜丸梧子大酒飲服

二十九丸加至三十九丸

紫石寒食散 治傷寒令愈不復

紫石英 白石英 赤石脂 鍾乳

括萎根 防風 桔梗 文蛤

鬼臼 太一余量各十 干姜

桂枝 附子各四

右十三味杵為散酒服方寸匕

還魂湯 救卒死客忤死主卒忤死

擊飛尸禁物不棄忽氣絕無復覺或已不

下藥者下復增取一左升須更立懸

麻黃方三兩一 杏仁七 甘草一

桂枝千金用二兩 右三味以水八升煮

取三升去滓分令咽之通治諸感性

又方 韭根把一 烏梅箇七十 吳茱萸拌

右三味以水一斗煮之以病入擲內

中三沸擲浮者生沈者死煮取三升

去滓分飲之

治馬墜及一切筋骨損方

大黃兩一 緋帛如手 亂髮如雞子大

久用炊草布尺一 敗蒲三一 搥

桃仁如箇十 甘草指如節

右七味以童子小便量多少煎湯成

內酒一大盞次下大黃去滓分溫三

服先剉敗蒲席半領煎湯浴衣被蓋

覆斯須通利數行痛楚立差利及浴

水赤勿怪即瘀血也

烏頭赤石脂丸 治心痛徹背々痛

徹心

蜀椒

法一兩一分

烏頭

一分

附子

法一兩一分

干姜

法一兩一分

赤石子

法一兩一分

右五味末之

蜜丸如梧子大先食服

一九日

三服不知稍加服

雄黃薰

治蝕於肛者

雄黃

右一味為末筒瓦二枚合之燒向肛

薰之

頭風摩散

大附子一枚

鹽等

右二味為散沐了以方寸匕已摩疾

上令藥力行

皂莢丸

治欬逆上氣時々吐濁但

坐不得眠

皂莢

兩八

右一味末之蜜丸梧子大以棗膏和

湯服三丸日三夜一服

葦莖湯

治咳有微熱煩滿胸中甲

錯是為肺癰

葦莖

升二 薏苡仁升

右四味以水一斗先煮葦莖得五升

去滓內諸藥煮取二升服一升再服

當歸

當歸生薑羊肉湯

治寒疝腹中痛

及脇痛裏急者○產後腹疝痛主之

并治腹中寒疝虛勞不足

當歸

兩三 生薑兩 羊肉斤

右三味以水八升煮取三升溫服七

合日三服

蒲灰散

小便不利主之滑石白魚

散茯苓戎鹽并主之○厥而皮水者

蒲灰

分七 滑石分二

右二味為散飲服方寸七日三服

滑石白魚散 主治見前

滑石二分 乱髮燒二分 白魚二分

右三味杵為散飲服方寸七日三服

猪膏髮煎 猪膏半斤 乱髮雞子大

右二味和膏中煎之髮消藥成分再

服病從小便出○諸黃胃氣下泄陰

吹而喧此壳氣之實也

栝葉湯 治吐血不止者

栝葉 干姜各三分 艾把二

右三味以水五升取馬通汁一升合

煮取一升分温再服

黄土湯 治下血先便後血此遠血

也○吐血衄血

甘草 干地黄 朮 附子 阿膠

黃芩各三分 竈中黄土半斤

右七味以水八升煮取三升分温服二

雞屎白散 治轉筋之為病其人臂

脚直脉上下行微弦轉筋入腹者

雞屎白 十斤 再服

右一味為散取方寸匕以水六合和

温服

蜘蛛散 治陰狐疝氣者偏有小大

時上一下

蜘蛛 枚十四 桂枝 兩

右二味為散取八分一匕飲和服日

再服蜜丸亦可

當歸芍藥散 治婦人懷妊腹中疝

痛 〇婦人腹中諸疾痛

當飯 兩三 芍藥 斤一 茯苓 兩四 朮 兩四

澤瀉 斤半 芎藭 斤三 兩一

右六味拊為散取方寸匕酒和日三服

歸母苦參丸 治妊娠小便難飲食

如故

當飯 貝母 苦參 各四

右三味末之煉蜜丸如小豆大飲服

三丸加至十丸

狼牙湯 治少陰脉滑而數者陰中

生瘡陰中蝕瘡爛者

狼牙 兩三

右一味以水四升煮取半升以綿纏

筋如齒浸湯瀝陰中日四遍

小兒疳虫齒蝕方

雄黃 葶歷

右二味末之取臘日猪脂鎔以槐枝

綿裹頭四五枚點藥烙之也

壯原湯

治_三下焦虛寒中滿腫脹小

水不利上氣喘急陰囊兩腿皆腫或

面有_二浮氣

人蔘 白朮_{各二} 茯苓

破胡紙_{各一} 桂心 附子 乾薑

砂仁_{各一} 陳皮_{各七}

右水煎食遠服有_六痰加_二半夏喉中痰

聲加_二棗白皮以下_二云々

浮石_三 茶石_三 雜質_二 五日

宿食停滯腹痛甚良求吐以然

