

武
308
卷 9

新刊醫林狀元濟世全書卷之二

太醫院吏目金路雲林龔廷賢子才編著

男守國 定國

手錄

寧國 安國

廣信府同知涪州灼無陳 直 校正

明人慈谿庠生羅國榮

臨川黃 卷

偃師庠生史 洞

打都潘士炫

南陽指揮王貴卿

同邑胡廷訓

大梁王有年

傳鍾奇

信陽吳至善

陶本字

豫章萬稟初

劉思岐全校

洪都龔敬言

金陵書坊萬卷樓存義堂如泉周文耀刊行



諸氣

脉理玄要云：下手脉沉便知是氣沉極則伏瀆弱難治其或沉滑氣兼

痰飲
八真天也陰陽之氣以生藉血肉以成其形一氣周流于其中以成其
神形神俱備乃為全人故氣陽而血陰灌漑周身而無一息之間斷
也血則隨氣而行載乎血者也有是氣必有是血有是血必乘乎是
氣二者行則俱行一息有間則病矣今之人不知忿怒驚恐悲哀而
損其身憂愁思慮以傷其氣故人之疾多從氣而生致有中滿腹脹
積聚喘急五膈五噎皆由于氣

分心氣飲 主方 治男子婦人一切氣不和多因憂愁思慮忿怒傷神
或臨食憂慮或事不隨意使抑鬱之氣留滯不散停於胸膈之間不

能流暢致心胸痞悶脇肋虛脹噎塞不通噎氣吞酸嘔噦惡心頭目
昏眩四肢倦怠面色痿黃口舌乾苦飲食咸少口斬羸瘦或大腸虛
秘或因病之後胸中虛痞不思飲食並皆治之

- 青皮 去蘘筴 炒五錢 陳皮 去白 五錢 半夏 湯泡 姜炒 三錢 白茯苓 去皮 三錢
- 紫蘇 二兩 大腹皮 洗淨 桑白皮 五錢 羌活 五錢
- 赤芍 三錢半 木通 三錢半 官桂 三錢半 甘草 二錢半

右剉一兩生姜三片棗一枚燈草十莖水煎食遠溫服

○一方去赤芍羌活加枳殼桔梗木香檳榔香附莪朮藿香治憂思
鬱怒諸氣痞滿○水氣面目浮腫加猪苓澤瀉車前子木瓜莖
麥門冬○性急加柴胡○多怒加黃芩○食少加砂仁神麩○咳
嗽加桔梗半夏○胸膈痞悶加枳實香附○二焦不和加烏藥○
氣閉加薤藷子○氣滯腰疼加木瓜枳殼○上焦熱盛加黃芩○

下焦熱盛加山梔子○翻胃加沉香磨服

四七湯 喜怒憂思悲驚恐之氣結成痰涎狀如綿絮或如梅核在咽喉間咯不出咽不下此七情所為也或中脘痞滿氣不舒快痰涎壅盛上氣喘急痰飲嘔逆惡心

紫蘇 二兩 厚朴去皮姜 白茯苓去皮 半夏湯泡 切片姜炒

右劉生姜七片棗一枚水煎熱服若因思慮過度陰陽不分清濁相干小便白濁用此藥下青州白丸子○婦人惡阻尤宜服之○痰作鼻氣加枳實香附○余常用此方加桔梗枳實甘草治痰氣痞塞殊效

利氣丸 治一切氣滯心腹滿悶疼痛脇肋膨脹難消嘔吐酸水痰涎不利頭目昏眩并食積酒毒及米穀不化或下痢膿血大便結滯不快風癩積熱口苦煩燥涕唾稠粘此藥最能流濕潤燥推陳致新

滋陰抑陽散 破結活血通經治氣分之聖藥也

大黃 四兩 黑牽牛 四兩 木香 一兩 檳榔 一兩 枳殼 炒
香附 炒 四兩 青皮 去穢 一兩 陳皮 一兩 莪朮 炒 一兩 黃連 一兩
黃栢 去皮 三兩

右為細末水丸如梧子大每服五七十九或百丸臨臥淡姜湯送下以利為度如不利再加丸數通利則愈瑞竹堂加黃芩當歸各一兩亦效

剪紅丸 李英峯 治諸氣痞塞飲食結聚關膈不通胃脘肚腹疼痛鼓

脹水腫諸症皆治

三稜 醋煨乾 莪朮 醋煨乾 檳榔 青皮 去穢 黑牽牛 取頭
大黃 生 木通 滑石 各一兩 甘遂 雷丸 各五錢
史君子肉 三錢

右為細末，麩糊為丸，如梧子大，每五十丸，空心白滾湯下，忌生冷油膩，此方神效。

開膈順氣丸 右男婦七情憂鬱，胸膈痞悶，肚腹脹痛，痞塊疼痛，不思飲食。

蒼朮 二兩 米泔製 陳皮 一兩 半 川厚朴 姜汁炒 香附米 四兩 醋炒

烏藥 炒 一兩 枳殼 炒 去穢 麩 青皮 去穢 七錢 莪朮 醋炒 五錢

甘草 炙 五錢

右為細末，酒煮稀麩糊為丸，如梧子大，每服七十丸，酒送下，姜湯亦可。

沉麩丸 內錄蘇沈方 治諸血諸氣痛不可忍及心脾氣血諸痛，又治

血滯腰痛

朱砂 沉香 血竭 沒藥 各一分 木香 半分 麝香 半分

右生為末，磁器煖生甘草膏丸，如皂子大，每十九丸，姜湯下。○產後血痛氣痛，亦治脾痛血滯，腰痛，用續斷牛膝桃仁炒煎湯磨下。○血暈用乳香泡湯研化服。

二下分消導氣丸 功勝分心氣飲

黃連 姜炒 一兩 半夏 姜炒 一兩 瓜蒌仁 去殼 桔梗 去蘆 二兩 桑白皮 蜜炙 一兩

枳殼 炒 二兩 川芎 一兩 川厚朴 姜製 二兩 青皮 炒 一兩 香附 童便炒 二兩

白茯苓 去皮 澤瀉 一兩 木通 一兩 檳榔 二兩 麥苳 炒 一兩

甘草梢 五錢

右為細末，姜湯打神麩糊為丸，如梧子大，每七十丸，米湯下，作湯劑，姜煎服亦可。

痞滿

劉河間曰痞與否同不通泰也心膈悶而不通者為痞滿內外皆急脹者為腫脹聚而成塊者為積塊也

夫痞者皆上之症也與脹滿有輕重之分痞則內覺痞悶而外無脹急之形者是也有中氣虛弱不能運化精微為痞者有飲食痰積不能施化為痞者有濕熱太甚為痞者

消痞湯 主方

人參

白木

白茯苓

陳皮

半夏

厚朴

枳實

黃連

砂仁

澤瀉

生薑二片水煎溫服

七氣湯 治心膈所傷憂思鬱結肺臟氣不和平心腹痞悶

半夏

白茯苓

川厚朴

蘇梗

加香附

右劉一劑生薑二片水煎溫服

補中益氣湯 方見內傷

治內傷元氣心下痞脹分悶

依本方加白芍酒炒

黃連

厚朴

枳實

木香

砂仁

內消丸 治痞悶氣積食積

青皮

陳皮

三棱

莪朮

神麩

麥芽

香附

右為末醋糊為丸梧子大每三五丸茶下

大消痞丸 治一切心下痞滿及年久不愈者

黃連

黃芩

枳實

半夏

陳皮

厚朴

白木

猪苓

澤瀉

姜黃

乾生薑

人參

神麩

砂仁

甘草

右為細末湯泡蒸餅為丸梧子大每五十九至百九空心日湯下

虫盤症

即脹滿

盤症本要有二曰單腹脹曰雙腹脹急急氣滿睡卧不安四肢微腫此
單腹脹因內傷七情所致取効微遲四肢浮腫肚大身重此雙腹脹
因外感風濕所致取効甚速又有水腫氣腫以指按腫處有陷隨指
隨起者氣腫先須理氣陷而起遲者水腫只須導水即愈凡人五十
已前氣血壯者得効之後善自調攝終身不發五十以來氣血稍衰
攝不嚴時或再復此復能治之但屢復屢心元氣耗盡則難矣脉
浮洪易治沉細難治

詩曰

九觀諸蠱要先知 且看臍間亞似梨 肚上青筋休要問

陰囊無縫定難醫 眼黑鼻黑終須死 掌上無紋在寸時

有命只消三兩日 項卑頭轉二朝危

消蠱湯主方 治氣作蠱脹但腹滿而四肢頭面不腫

紫蘇 辣桂 青皮 陳皮 三稜

菝朮 木香 檳榔 白豆蔻 肉豆蔻

草澄茄 蘿蔔子生 枳殼 半夏 砂仁

甘草 姜棗煎服

○按右方治鼓脹初起及壯盛之人可服

補氣健中湯主方 治鼓脹元氣脾胃虛損宜補中行濕利小便切不

可下

人參 八分 白朮 錢半 白茯苓 錢半 陳皮 錢半 蒼朮 錢半

厚朴 姜炒五分 麥門冬 去心五分 黃芩 土炒八分 澤瀉 五分 水煎服

朝急暮寬者倍參朮肥白人氣虛者亦同。

朝寬暮急者加黃連姜炒當歸白芍炒香附川芎炒減參黑瘦人氣

執亦同

朝暮急者氣血俱虛宜雙補之

氣不運加沐香木通氣下陷加柴胡升麻

六君子湯方見補益治脾虛鼓脹手足倦怠氣滯泄者

服此藥下咽之後必增脹滿勿疑之經曰寒因寒用故用補劑以

治脹滿初服則脹久服則通此惟精達經旨者知之俗醫未也

○按右方治鼓脹屬虛弱者可服

五子十皮湯 治一切蠱脹并氣虛中滿單腹脹

紫蘇子 兔絲子 大腹子 車前子 葶藶子

茯苓皮 草果皮 五加皮 大腹皮 牡丹皮

地骨皮 生姜皮 木通皮 木瓜皮 甘草皮

右剉水煎溫服如要斷根將前藥各一錢五分用公猪肚一箇不

見水先將溫水煮一滾以竹尖鑽孔入藥在內蒸熟切片蠱脹難

食之不過一二箇永不發也

○按右方治蠱脹專攻之劑

清脹丸秘方 治積塊消蠱脹

青皮去穢 陳皮一兩 三棱醋炒 義木醋炒 一乾姜炮 五錢

香附子兩半醋煮焙乾 陳倉米二兩用巴豆四十九粒同炒黃

右為末醋糊為丸梧子大每五六十丸姜湯下

○按右方治鼓脹腹中有積塊者可服有經驗簡易方開後具對症選

治氣蠱 大蝦蟇一箇以砂仁推其口使吞入腹以滿為度用泥罐封固炭

火煨至透紅烟盡取出候冷去泥研末為一服或酒或陳皮湯送下候散屁多乃見其効

治氣蠱

用粟米菘豆各一抄猪肝一葉切碎三味煮作粥食之重者不過五次其腫自消切忌氣惱生冷

秘方

治鼓脹氣脹水脹等症
鷄雞屎一升瓦上炒焦地上出火毒研細以百沸湯三升淋汁瀉過每服一太盞調水香檳榔末各一錢日三服以平為期

治單腹脹

用七八年母猪大臙頭一截并血數塊用厚煮血水炊爛食之至半夜腹大痛而大便瀉去一桶即消

治鼓脹攻水之方

連根葉大戟一握 大棗一斗

右二物同煮一時去大戟不用只吃棗無時服大戟寒而不寒味苦甘有小毒能下十二經之水大棗味甘取其大補脾胃而不為攻下所傷也

海上方 專治單腹脹雙腹脹單腹脹在腹中間腫雙腹脹在腹兩傍

用大水的泡晒乾羅過每早以新水調三四匙咽下吃後放屁吃兩早後病者自知放屁其腫自消切不可將針放水水去即死

治蠱症

黑牽牛頭末木香甘遂各一錢為末用猪腰一對俱分破將藥撒在二腰子內合住帛包灰火燒熟空心或食一個或食二個大便行膿血見効

三花神祐丸 治中滿腹脹喘嗽淋閉一切水濕腫滿濕熱腸垢沉積

變生疾病久病不已黃瘦困倦氣血壅滯不得宣通或風熱燥鬱肢體麻痺走注疼痛風痰涎嗽頭目眩暈瘧疾不已癥瘕積聚堅滿痞悶酒積食積一切痰飲嘔逆及婦人經病不快帶下淋瀝無問赤白并男子婦人傷寒濕熱腹滿實痛久新瘦弱俗不能別辨或泛常只為轉動之藥兼治新久腰痛并一切下痢及小兒驚疳積熱乳癖腫滿並治

大戟 芫花 醋炒 甘遂 各五錢 牽牛 二兩 大黃 一兩 輕粉 一錢

右為末水先如小豆大每十九量重實如減忌熱甘草

○按右方皆攻剋之劑宜壯盛人可服

水腫

通身皮膚光腫如泡手按成窩舉于即滿者是因脾虛不能制水水漬

妄行故也去當補脾使脾氣得實則自健運切不可下忌食羊肉腰

以上腫宜發汗腰以下腫宜利小便此仲景之法湯水脈浮數陰水

脈沉遲治之初起及壯盛之人宜先服木香流氣飲即効如未効服

行濕補氣養血湯若久病虛弱不須服流氣飲即服行濕補氣養血

湯及健脾九腎氣丸之類兼而進之乃收全効

不治症 先四肢而後歸於腹 大便滑泄 唇黑 缺盆平

臍突 肉硬 男從腳下腫上 女從身上腫下 脈浮大者生

沉細者死

木香流氣飲 治諸氣痞滯不通胸膈膨脹口苦咽乾嘔吐不食或肩

背腹脇走注刺痛及喘急痰嗽而自虛浮四肢腫滿大便閉小便澀

又治憂思太過怔忡鬱積脚氣風濕聚結腫痛喘滿脹急九治蠱脹

當先用此藥調順榮衛流通血脉快利三焦安和五臟

木香 七錢半
 丁香 七錢半
 藿香 七錢半
 半夏 湯泡切片姜炒二錢
 人參 五錢
 白朮 去油薑 五錢
 赤茯苓 五錢
 厚朴 姜炒二兩
 青皮 去穢二兩
 陳皮 四兩
 草果 七錢半
 檳榔 七錢半
 大腹皮 七錢
 香附子 二兩
 紫蘇 二兩
 木瓜 五錢
 白芷 五錢
 麥門冬 去心 七錢
 我朮 煨 七錢
 肉桂 七錢半
 木通 一兩
 甘草 二兩
 石菖蒲 五錢

右每劑五錢生薑三片棗二枚水一鐘加煎七分去滓熱服

本方去藿香石菖蒲加沉香枳殼大黃名二千四味流氣飲○壘腫加白豆蔻○頭面腫加葱白○肚腹腫加枳實倍青皮陳皮○臍至脚腫加桑白皮○腫滿加黑牽牛

按右方治諸水腫初起者宜服

行氣補氣養血湯 主方 治氣血虛弱單鼓腹脹浮腫

人參 白朮 白茯苓 當歸 川芎

白芍 蘇梗 陳皮 厚朴 大腹皮

薤白子 海金沙 木通 木香 甘草 生

姜棗煎服○氣虛倍參木茯苓○血虛倍芍歸白芍○小便短少再加猪苓澤瀉滑石○服後腫脹俱退惟面足不消此陽明經氣虛倍用白木茯苓

調中健脾丸 治單腹脹及脾虛腫滿膈中閉塞或胃中作痛

黃芪 蜜炙 二兩
 人參 二兩
 白朮 黃土水 六兩
 茯苓 二兩
 陳皮 薑水炒 三兩
 半夏 酒七次 蒼朮 米泔浸炒 二兩
 香附 童便炒 三兩
 白芍 酒炒 二兩
 黃連 吳茱萸煎湯浸炒 蘇子 炒 一兩
 薤白子 炒 一兩
 山查肉 三兩
 薤白仁 兩
 澤瀉 炒 二兩
 沉香 磨 六錢
 另 五加皮 二兩
 草豆蔻 酒拌炒 一兩半

法製瓜萋一兩用木瓜萋二箇，鐵一孔，每箇入川椒三錢，多年者藥二錢，糯米粒大外，以棉帛糊完，再用香筋蓋泥封固，晒乾炭火煨通紅，取出去泥，其黑色一井入水。

右為末，前荷葉大腹皮湯打黃米糊為丸，如梧子大，每服百丸，日進三次，白湯下。此藥不傷元氣，大有補益，勿輕視之。

金匱腎氣丸 治脾腎虛寒，腰重脚腫，濕飲留積，小便不利，或肚腹腫脹，四肢浮腫，或喘急痰盛，已成蠱者，此症多因脾胃虛弱，治失其宜，元氣復傷而變者，非此藥不效。

白茯苓 三兩 大附子炮裂，燬去皮，臍切片，薑使浸。 懷牛膝去蘆，酒洗。

肉桂 澤瀉 車前子 山茱萸酒洗，去核。 懷山藥

牡丹皮略一懷生地黃，酒拌砂鍋內蒸黑四兩。

右精製秤為一處，搗成餅，晒乾為末，煉蜜為丸，如梧子大，每服四五十丸，空心米湯下。

按右方治鼓腫，令病人空心服金匱腎氣丸，已時服行濕補血湯，一服未時將渣煎服，晚上臨卧服調中健脾丸一服，每日如此服四次，不可間斷。又久服之元氣漸充，脾胃壯，腎水漸生，相火漸消，濕熱漸除，腫脹諸病自廖矣。

又方 用白商陸根似人形者，搗取汁，一合，生姜汁二點，黃酒一盞，和服，空心三日服一次，元氣厚者服五次，薄者三次止。忌葷醬，凡人年五十以上者，可服五十以外者，不必服。

治蠱腫秘方

田螺不拘多少，水漂加香油一盞，于水內其涎自然吐出，取其涎晒乾為末，每服不過三分，酒調下，其水自小便而下，其氣自大便而出，其腫即消，再服補養脾胃之藥為妙。

治腫脹自去水

真水銀粉二錢 巴豆去油四兩 生硫黃一錢 同研成膏作餅子
先以新綿一片鋪臍上 次以藥餅當臍掩之外 用帛縛定 約入行
五里 自然瀉下惡水 待三五次 除去藥溫 臍補之久 患愈 隔日
浴水腫膨脹神妙方

大田螺四箇 大蒜五箇 去皮 車前子為末三錢

右三件研為一處為餅 一餅貼臍中 以手帕縛之 貼藥後少頃
水從小便出 一二餅而愈

秘方 治水腫脹滿

癩蝦蟆一二枚 裝在猪肚內 用好酒煮一伏時 去蝦蟆 將猪肚與
酒服盡 大便如雷 或水下 水腫自消 加宿砂此須尤妙

秘方 治水腫水氣五壘 脹氣此方乃臨頗楊運治一人患腹脹陰囊
腫大諸醫不治 鄉人舉之 下劑而病愈 病者言遇神仙也 又治數人

俱效 余托諸親友 邇來遂得之後 屢試屢驗

甘遂赤皮細槌 不甞者不拘多少 用蕎麥麩水和作厚餅 內按神麩
末如帛厚 包甘遂在內 灰火中煨熟 取出晒乾 為末 每用一錢二分
以細麩約一兩許 合和水調 擇作麩片 次用商陸二錢半 巴豆一箇
去殼 水一碗半 砂鍋內煎至一碗 去渣 再入鐵鍋內 入前麩片 煮熟
食之 其商陸湯任其意服 與不服不在其限 服之不一二時 水從大
便出 如是血鼓 卽下血氣 鼓卽下氣 當時消 若有喘嗽 盡皆爰貼 若
腹中有塊 亦漸消散 只用一服 見効 忌搗薑 冬瓜香油 薑腥之物 半
月後 用益亦須炒過 用之 若蠱症 加胡椒一錢 與巴豆同煮 其巴豆
須看虛實 加減其壯者 加至一二箇 亦可

○按右諸單方 治水腫皆神効之方也

蟠桃丸 治男婦渾身頭手足浮腫 肚腹脹滿疼痛

沉香

木香

乳香 苦上炙

沒藥 苦上炙

白牽牛

生用取頭末

黑牽牛

用牙皂煎濃汁浸半日鋪鍋底焙一平生一平熟取出研末

檳榔

一兩一分生一分用牙皂煎汁

琥珀 丁錢或五分

右為末牙皂水打稀麪糊為丸如梧子大每服二錢七分五更砂糖煎湯送下

○按右方皆經驗百發百中者此藥專攻宜間而服之不可久服

積聚

脈宜買大不宜沉小

丹溪曰塊乃有形之物氣不能成形痰與食積死血也在中為痰飲在右為食積在左為死血大法鹹以軟之堅以削之行氣開滯為主不可專用下藥徒損其氣病亦不主當道使之鎔化其死血塊去須

大補痞塊在皮裏膜外須用補藥香附開之兼二陳湯加補氣藥先須斷厚味

指迷七氣湯 主方

治五積六聚狀若癥瘕隨氣上下發作有痔心腹

痞痛攻刺脇肋上氣窒塞喘嗽滿悶小腹膜脹大小便不利

三棱

莪木

青皮 去穰

陳皮

藿香

桔梗

肉桂

益智仁

香附

甘草

右剉作劑生薑煎服○心腹痛加烏藥枳殼

○按右方治積聚專攻之劑

化積湯 治婦人氣積血塊癥瘕不拘左右上下年月新久

當歸 酒洗

白芍 酒炒

川芎 一錢

生地黃 一錢

熟地黃 姜汁

赤芍 一錢

玄胡索 一錢

桃仁 五分

紅花 三分

青皮 去穰

陳皮 五分

三棱 醋炒

莪木 醋炒

貝母 一錢

生夏 姜炒

木香三分不 香附 一錢半

右共十七味作一劑。生姜三片。水煎空心服。

○按右方治積聚攻補兼施之劑

神仙一塊氣 治諸氣食積及噎膈痞滿胸脇刺痛癥瘕吐氣並治

青皮去穢 陳皮 三稜醋炒 莪木醋炒 香附童便炒

神麩炒 麥芽炒 蘿蔔子炒 白牽牛頭末 檳榔

鬱金 黃連薑炒 各 枳實炒 三皂角二錢半 百草霜二錢

右為細末稀麩糊為丸如菉豆大每三四十九視疾之上下為食之先後熱酒姜湯任下

瀉丸子治塊痰

三稜炒 莪木炒 一兩 青皮去穢 陳皮去白 胡椒

胡黃連 苦練子各五錢 黑牽牛七錢半 生半炒 木香四錢

共雜 薑了 二兩微炒

右為末麩糊為丸黍米大每六七十丸蘿蔔湯下忌腥物生冷每
日一服五日後執退

○按右方治積塊專攻之劑壯盛之人可服

千金化鐵丹 治男婦氣血痰飲食積諸般積塊癥瘕脹滿諸症

當歸 一兩半 白芍 兩半 川芎 七錢半 生地黄 酒洗 一兩半

白木 一兩半 白茯苓 一兩 陳皮 兩 青皮 去穢 七錢半

木香 二錢半 檳榔 五錢 香附 炒 一兩 枳實 炒 七錢半

半夏 姜炒 一厚片 去皮 薑 兩 蘿蔔子 炒 五錢 三稜 醋炒 一兩半

莪木 醋炒 一兩 杏仁 五錢 紅花 五錢 乾漆 炒 五錢

礞砂 用磁器盛放灰中 琥珀 五錢

右共二十二味為末醋糊為丸如梧子大每六七十丸米湯下

○按右方治積塊攻補兼施之劑。
化痞膏

肥皂煎水 皮硝 大蒜 葱白 生姜 各四兩

右五味入石臼內搗爛入水二碗取汁將渣再搗入水二碗取汁
再搗仍入水二碗取汁共搗三次約水四五碗慢火熬入大黃末
四兩同熬至一碗許即成膏矣先將塊上五花各灸五七壯將膏
攤膏貼塊上二日一換內服化鐵丹一月塊消神効。

貼男婦腹中積塊及小兒疳疾

朱砂三錢 礶砂三錢 血竭三錢 巴豆去油三錢為末聽用
每一貼用大黃二兩 村硝二兩為末將前藥四味止用一錢入內
加雞子二箇搗成膏如調不濕又加好醋加在油帛上貼患處加
乾取下來加醋再搗三日一換

○按右方治積塊外治之方

神化丹 消癖塊 破血氣 下鬼胎 通經脈 及諸癖積血

礶砂 乾漆 炒 血竭 各一錢 紅娘子 二十箇

斑猫 二十箇 乳香 一錢半

右為末棗肉為丸 豌豆大 每一丸服至三五丸 臨卧棗湯下 或姜
湯或紅花蘇木煎湯下

取積丹 錦紋 大黃為末 以好醋熬成膏 凡如梧子 大每服百丸 量虛

保安丸 治癥積 心腹內結 如拳漸上 撞心痛 及腹痛 不可忍

大黃 三兩 酒浸一宿 蒸 乾姜 炮 一兩 大附子 炮 去皮 五錢

驚甲 灸黃 三 兩半 醋煮 一伏時

右為末 陳米醋一升 煮去四五合 後和藥丸 梧子大 每一十九五

更醋湯下天明時不動再服五丸取積如魚腸膿血爛泥而下
三稜煎丸 治過傷飲食痞悶疼痛食不消化久而成癥又治婦人血
積血塊乾血氣經閉

大黃八兩為三稜 莪朮各一兩二味濕帛包煨為末

右先將大黃銀石器內好醋漬令平慢火熬微乾入二味為丸如
菘豆大每服十丸二十丸食後白湯下看虛實加減服大人如梧
子六每服四十丸

○按右方治積塊皆專攻之劑宜對症選用

五疸

大抵脈大者死微細者生無脈鼻氣冷者不治也

其症有五 黃汗 黃疸 酒疸 穀疸 女勞疸 病雖有五不過

濕熱而已

丹溪治疸症不必分五同是濕熱如蠶麩相似周身皮膚并眼如施子

汁染因食積黃者量虛實下之其食積自消且以利小便為先小便
利白其黃自退

清熱除濕湯 主方

黃連炒 黃芩炒 梔子炒黑 茵陳 猪苓

澤瀉 蒼木米泔浸 去穰炒 草龍膽 各五錢

穀疸加三稜莪朮陳皮砂仁神麩剉散水煎溫服

治發黃疽身如俱黃如釜色小便如濃者柏汁諸藥不效

柴胡 黃連 黃芩 黃柏 梔子

茵陳 龍膽草 木通 滑石 升麻

甘草 剉劑燈心煎服○大便實加大黃○目睛黃者龍胆

草 虛弱人倍人參

茵陳五苓散

治黃疸專屬濕熱益髓相似

茵陳二錢

白木

去蘆一錢半

赤苓

一錢半

猪苓

一錢

澤瀉

一錢

蒼朮

一分

山梔

一分

滑石

一分

官桂

二分

甘草

二分

燈心水煎服

按右方治五疸除濕熱之劑

治五疸黃腫

綠礬 不拘多少炒至白色

右為神木煮紅棗肉為丸如櫻桃大每服五丸早午晚各一服用

冷黃酒送下忌醋生冷發物百發百中或有虫即吐也

治酒疸遍身面自發黃如金色者 蔣雲山傳

好茵陳一兩黃酒一鍾半煎至八分食後溫服不過四五服全愈

治黃病如神 安陵馬進齋傳

露珠即土豆形如姜搗爛取汁半碗服之

○按右方治黃疸必效之方也

胃苓湯 治黃疸倦怠脾胃不和食少小便赤加滑石

鐵砂丸 治黃腫

猪苓

澤瀉

白木

去油蘆

赤茯苓

五錢

蒼朮

砂仁

香附

厚朴

各二兩

烏藥

茵陳

草果

針砂

醋煨七次

各一兩

木香

青皮

去穢

陳皮 各七錢

右為細末老酒打麪糊為丸梧子大每七十九酒送下忌魚雞

有塊加三稜莪朮各一兩

治虛弱人久病黃疸肌瘦二方神效

補中益氣湯依本方加茵陳蒼朮梔子猪苓澤瀉黃連滑石亦茯苓
共十六味

六味地黃丸依本方加蒼朮白朮茵陳黃柏各三兩與前湯藥兼服

又當歸服綠礬丸

綠礬丸 治五疸良方

茅山蒼朮米泔浸一宿去粗皮咀片 陳皮洗

川厚朴去皮姜炒各 白朮去油薑 甘草各二兩

綠礬米醋拌慢火炒乾傾礮上冷定再炒如此三次炒用砂鍋丁

右為細末用神麩二兩打糊為丸如棗且大每服五七十九白湯送下

治黃疸口淡怔忡耳鳴脚軟微寒發熱小便白濁此為虛症宜四君子湯吞下八味丸

茵陳四逆湯 治發黃脉沉細而遲肢體逆冷腰已上白汗

茵陳 一兩 大附子 一枚 乾姜 炮 一兩 甘草 炙 一兩

右切四劑水煎服

治女勞疸

四苓散合四物湯去川芎加茵陳麥門冬滑石甘草

○按石方治黃疸殊効宜選而用之

治黃疸病醫不愈耳日俱黃食飲不消胃中脹熱生黃衣蓋胃中有乾

糞致病耳用煎猪脂一小升溫熱頓服之以三燥尿下去乃愈

疝證

畢丸痛連小腹痛者是也其痛在畢丸內若有痛在五樞穴遺精或無形無聲或有形如瓜有聲如蛙素問者以為寒也專主肝經與腎經

絕無相于宜灸太敦三陰交一穴

法治諸疝用鹽半斤炒極熱以舊帛包熨痛處
一方用葱白搗如泥換餅置臍中上用熨斗熨之或上置艾灼之妙
神功七疝湯 治七疝寒水筋血氣厥之總司也

枳實

橘核 小枳 山施

山查

吳茱萸 湯泡

荔枝核

寒疝囊冷結硬得於寒濕而發及月者加吳茱萸桂枝乾姜

水疝腎囊腫痛陰汗時出囊或腫如水晶得於飲水醉酒者加猪苓澤
瀉茯苓

筋疝陰脰腫脹或莖中痛痛極則痺或挺縫不收得於房勞所致加炒
黃連白木茯苓

血疝狀如冬瓜在小腹兩旁橫骨兩端紋中俗云便癰也又或強制精

欲泄不泄亦成斯疾加菟仁披虛加參朮

氣疝其狀上連腎區下及陰囊或因號哭忿怒氣鬱而復發者加柴胡

青皮香附

狐疝其狀如瓦卧則入小腹行立則出小腹入囊中者加青皮香附朮

蒼朮

癰疝陰囊腫縮如升如斗不痒不痛得之也氣卑濕加白朮茯苓諸苓

澤瀉蒼朮

神仙救苦丸 方見通 治諸疝疼痛殊効

一捻金 主方 治七疝及奔豚氣痛不可忍者 水山劉太守累驗

玄胡索

小茴香

川練子

全蝎 炒

人參

大附子 炮

山梔子

木香

右各等分爲末每服三錢黃酒調服

治疝氣偏墜 尹巨川

青蘘 二錢 木通 一錢

燈草 一錢 水煎服

治偏墜氣 受泉經驗

川練子 小茴香

吳茱萸 青蘘

滑石 甘草

治偏墜疝氣小腸氣 南塘驗

猪苓 澤瀉

川木通 白芍

青皮 紫蘇

甘草 生姜煎服

甘草 一錢 川烏 炮三錢

胡蘆巴 酒炒 黑牽牛 炒 大黃

烏藥 木香 木通

水煎服

蒼朮 赤苓 桂皮

川練子 玄胡索 烏藥

馬蔞花 橘核仁 三十尖 檳榔

治疝秘方 張振甫

川練子 益智仁

小茴香 柴胡

冬加麻黃 水煎服

猪苓 澤瀉

川練子 牽牛

右共十味水煎空服

○按右方治諸般疝氣宜對症選用

五積散 治醉飽後色慾不節觸傷小腹致成疝氣其疝自小腹痛連

腰膝下心頭吊痛額上汗出依本方加玄胡索

○按右方治虛弱入中寒疝氣作痛者

馬蔞花 滑石 海金沙

水通 甘草

木通 甘草

水通 赤茯苓 胡巴

巴戟 桂竹茹 海藻

神効金鈴丸 嚴副使方

治疝氣外腎腫痛服此除根

木香

乳香

沒藥

大附子

全蝎

小茴

川練子

女胡索

人參 各等分

右為末好酒打糊為丸梧子大每服百丸空心温酒送下一服立

加味地黃丸

治疝氣偏墜疼痛依本方六味地黃丸內加

人參 三兩

甘枸杞子

巴戟肉

懷生地黃

兩

兩

兩

兩

破故紙

至

碗

同

并

巴

戟

肉

○按右方治疝氣久服除根

治小腸氣偏墜痛

用猪懸蹄燒存性為末每服三錢黃酒調服

又方用

猪毛燒灰每一錢空心熱黃酒送下立愈一方加小茴

治疝氣腫痛不可忍

用大黃為末醱醋調塗上立消

又方 用槐子一錢炒為末入鹽三分空心黃酒送下

治偏墜氣

五楮子五六箇燒存性為末好酒調下以醉為度

治偏墜疝氣腫痛不可忍者周少峯傳

用黃上水和泥烘熱熨痛處冷則再換熱泥神効

治疝氣偏墜服之一料除根

蒼朮一斤重便好酒各浸三百炒乾核二兩同為末酒糊丸

如梧子大每百丸空心酒下

治下元虛冷寒疝攻痛 小茴香等水炒每三錢空心燒酒調下
○按右方治疝氣宜對症選用
治暑傷偏墜疝氣腫痛

朱苓 澤瀉 枳殼 厚朴 不通

香茹 扁豆 烏藥 甘草

右剉水煎溫服立止冬月去茹豆加麻黃赤芍

○按右方治暑月疝氣作痛宜之

四聖散 治疝氣外腎腫脹

小茴香 炒 穿山甲 炒 全蝎 炒 南木香 各等分

右為末每服二錢一服痛止用酒調服

治小腹下毛際邊或左或右生氣核如瘰狀按之則散時伏時見用

黑牽牛 炒頭末 一兩半 檳榔 一兩 粟米 裹煨 青木香 七錢 半 破故布 一

革澄茄 一兩 為末水浸稀糊為丸如菖豆大每五十丸用後

猪苓 澤瀉 白朮 茯苓 肉桂

川練子 葱白 燈心煎湯吞下立效

荔枝散 治腎大如斗不過三服除根

船上小茴香 青皮 荔枝核 各等分

右剉散炒黃出火毒為細末酒調二錢日進三服

雄黃湯 治陰腫大如斗核痛

雄黃 一兩 白礬 二兩 甘草 五錢 煎湯浸洗

秘方 治肛門陰囊腎莖癢痒抓破出血好了又痒又抓又破並治

人言一二錢用醃醋二碗熬至一碗洗患處立已

又方 治陰痒不可忍者

猪肉湯加胡椒煎湯洗之立已

治陰囊濕痒

胡椒 三錢

白疾黎 一兩

水煎先薰後洗神效

士大夫年近五旬患疝氣經年舉發百藥罔效余以延齡固本丹一料服之除根

方見中風

依本方加金鈴子小茴各一兩

附鶴膝風

脚氣

夫脚氣者病雖起於足實因乎身此外症與傷寒類焉但卒然脚痛為真耳或壯熱頭疼或增寒身痛或百節拘攣或十指走注或轉筋急痛或小腹不仁以致心腹脹滿喘急煩悶怔忡錯語腹痛下痢嘔噦痰涎壅閉食氣見食則吐大小便多秘自腿至膝痛自經絡脚蹠軟弱頑痺急酸疼或腫不腫皆其候也切不可補陽淋洗此醫家之大戒也

菴活導滯湯

治脚氣初發一身盡痛或肢節腫痛便溺阻隔先以此藥導之後用當歸拈痛湯

當歸 一錢

枳實 一錢

菴活 一錢

獨活 一錢

防已 炒一錢

大黃 酒浸一錢半

右剉一劑水煎空心服

按右方治脚氣初作者宜之

當歸拈痛湯

治濕熱脚氣為病肢節煩疼肩背沉重胸脇不利

兼遍身疼痛下注足脛腫痛脚膝生瘡赤腫及裏外生瘡膿水不絕或痒或痛並宜服之

菴活 一錢

人參

苦參

升麻

葛根

蒼朮 各四分

甘草 炙

黃芩 酒炒

茵陳 酒洗各一錢

防風

當歸身 酒洗

知母 炒去毛酒

猪苓

澤瀉

白朮 去蘆各五分

右剉一劑水煎空心温服

○按右方治濕熱作腫痛者
治脚氣冲心

用白礬三兩以水一斗五升煎三四沸浸洗脚即已

大防風湯 去風順氣活血壯筋又治痢後脚弱緩痛不能行復名曰
痢風或兩脚腫痛足脛枯細名曰鶴膝風一切麻痺痿軟風濕擦處
之候

當歸酒洗一錢 川芎七分 白芍酒炒一錢 熟地黄一錢 黃芪密炙一錢

人參五分 防風一錢 羌活五分 牛膝酒洗五分 杜仲姜炒一錢

白朮去蘆半錢 大附子炮去皮臍七分 甘草炙五分

右剉一劑生姜五片棗一枚水煎空心温服

五積散 治寒濕脚氣加木瓜檳榔穿山甲青藤

五加酒 馬伏所 治脚膝腫痛并手足俱疼或五心煩熱

五加皮八兩 川歸三兩 川牛膝去蘆三兩 川杜仲去皮姜汁炒三兩

地骨皮二兩 懷生地黃三兩

用熟生酒一壘入前藥以絹袋盛之煮一炷香為度埋土內二日
取出任服

神仙飛馬酒 心泉姪 治脚膝或腫或痛不能動履

蒼朮一兩 尖川烏一兩 川南星一兩 威靈仙一兩 大當歸三兩

白芍一兩 檳榔一兩 木瓜一兩 獨活一兩 羌活一兩

秦艽一兩 薏苡仁二兩 白茯苓二兩 川續斷二兩 漢防己一兩

甘枸杞子一兩 川牛膝去蘆一兩 川杜仲去皮一兩 天麻一兩 破故帛

小茴各一兩 肉桂五錢 烏藥一兩 黃芪一兩 川芎一兩

懷生地二兩 自然銅五錢 銅粉盛炭 乳香五錢 沒藥五錢

虎脛骨一兩 猪油塗灸 甘草節五錢

右藥用生頭酒十壺入藥攪熟如春夏止用藥一半冬月用全料早晚任意服

八味丸 治脚弱加續斷草薛 若人加牛膝鹿茸

鶴膝風加入參鹿茸牛膝

八味丸 治脚氣足少陰經脚氣入腹腹脹痛上氣喘急腎經虛寒所致也此症最急以腎乘心水剋火死不旋踵

神仙飛步丹 治脚膝腫痛新久可服

當歸身 酒洗 兩 川芎 八錢 白芍 酒炒 一兩半 大懷生地黃 酒洗 兩

川黃栢 酒炒 二兩 知母 蒸水炒 一兩 蒼朮 米泔浸 一兩 牛膝 去蘆酒洗 一兩 木瓜 一兩

杜仲 酒炒 一兩 薏苡仁 略 一兩 防己 七錢 防風 七錢 威靈仙 七錢

羌活 七錢 苑仁 七錢 紅花 五錢 黃連 酒炒 一兩 黃芩 酒炒 一兩

肉桂 三錢 陳皮 一兩 五加皮 一兩 虎胫骨 酥炙

右為細末酒糊丸每七十丸空心鹽湯下

治一切寒濕虛冷脚氣腫痛焦枯經年卧床不能動履者用獨活寄生湯各等分入好酒煮熟飲之効 方見腰痛

按右方治下元虛弱作脚痛者

家傳健步丸 治兩足痿弱軟痛或如火燎從足踝下上脚腿膝此是

過食酒慾而成濕熱之病兩脚不能搖動內有防己通行十二經治

下焦濕熱 蒼朮 米泔浸 黃栢 去皮酒浸晒乾 川牛膝 去蘆酒洗

歸尾 酒洗 川草薢 防己 熟地黃 各一兩

右為細末酒打糊為丸梧子大每服六七十丸空心鹽湯送下

二妙散

蒼朮 米泔浸 黃栢 去皮乳濁 為末每服三錢空心酒調下

右治濕熱疼痛不拘上下用之蒼朮妙干燥濕黃柏妙于去熱二物
 皆有雄壯之性亦簡易之方也加牛膝則治濕熱下流兩脚麻木或
 如火烙之熱痛甚加姜心煎服
 ○按右方治濕熱作痛者
 治兩膝疼痛麻木神方

蒼朮米泔浸三日一日一 白朮去蘆陳壁 厚黃柏去皮鹽酒炒
 薏苡仁糯米炒六兩 五加皮三兩 懷牛膝去蘆酒洗
 羌活二兩 防己半兩 半夏麩三兩 膽星二兩
 白茯苓去皮 廣陳皮去白二兩半 茵陳二兩
 天花粉三兩 人參二兩 當歸二兩 川芎一兩五錢
 白芍酒炒 懷生地酒洗 懷山藥六兩
 右為末先用竹瀝姜汁和入藥內後用
 糊為丸如梧子大

治兩膝疼痛麻木神方
 每服百丸空心鹽湯下○若有虛火加玄
 兩酒拌蒸過

黃芪一兩 人參五錢 當歸一兩半 熟地黃一兩 蒼朮一兩半
 獨活一兩 杜仲酒沙一兩 牛膝去蘆酒洗一兩 秦艽一兩 官桂三錢
 小茴五錢 桑寄生一兩 木瓜五錢 石斛一兩
 右為末酒糊丸每百丸空心酒下
 治兩脚跟兩脚指麻木疼痛神方
 當歸酒洗六兩 川芎二兩 白芍酒炒二兩 懷熟艾酒蒸四兩 懷生艾酒浸四兩
 天門冬去心酒浸四兩 麥門冬去心酒浸四兩 透五味子二兩 黃柏去皮蜜炒酒炒
 知母去毛酒浸三兩 懷山藥二兩 懷牛膝去蘆酒浸四兩
 枯苓去毛酒浸四兩 龜板去邊醋炙微黃用 山茱萸酒蒸去核四兩
 人參六錢 右為末煉蜜丸如梧子大每七八十丸空心鹽湯送

下良鐵器製

神仙疔痛酒 李時源傳

治脚膝腫痛不可忍者

羌活

獨活

防風

天麻

姜蚕

蒼朮

秦艽

何首烏

續斷

蘇梗

烏藥

烏藥

穿山甲炒

紅花

香附

粉草

荆芥

薄荷

白芥子

木瓜

貝母

陳皮

石菖蒲

薄桂各三錢

白芍

川芎

白朮

熟苧

麥門冬

茯苓

茯神

酸棗仁炒

杜仲去皮

牛膝去蘆各五錢

半夏

南星

白礬研皂生薑煎水者過各五錢

細辛

木香

白芷各二錢

鹿茸酥炙

虎骨酥炙各三錢

當歸身一兩 山藥五錢

右共四十三味精製入酒一罈煨熟空心溫飲一二盞隨量飲之

治脚氣腫痛足不能任地用槐皮去粗皮好黃酒煎空心服避風

治足跟腫痛 有痰 有血熱

血熱四物湯加黃柏知母牛膝 有痰唾者五積散加水瓜

人參敗毒散 治三陽經脚氣流注脚踝上煨熟赤腫寒熱如瘡自汗

惡風本方各一錢加蒼朮米泔浸炒木黃蒸各一錢作一服生薑三

片水煎食前服皮膚癢痒赤疹加蟬退

一婦人下體腫痛人參敗毒散加蒼朮黃柏威靈仙病減更以

四物湯加蒼朮黃柏防已紅花澤瀉

人有氣如火從脚下入腹者此虛極也蓋火起於九泉之下也此病十

不救一治以四物湯加黃柏知母降火藥服外以大附子未津調貼

脚心湧泉穴以引火下行

按此條言猶有未盡者如果勞悞陰虛之人有此固當作陰虛治若

壯實之人有此則是濕鬱成熱之候也予嘗治以家傳健步丸醫之
數人皆驗若誤作陰虛治則成癆症矣學者當明辨之可也

治脚氣腫痛多是風濕凝注用全言二兩水煮滾熟再入鹽片如雞屎
樣大片入內同煮令汁乾取出或晒或焙乾將鹽片裹脚板上汗如
濕透又換一片出令汗盡即止

蒸法 治腎氣虛弱脾胃肝三經受風寒濕停於腿膝使經絡凝而不
行變成脚痺故發疼痛此和榮衛通經絡

川椒 一把 葱 三大莖 鹽 一把 小麥麩 約日五升許
酒 一盞

右用醋和濕潤得所於銀器炒令極熟攤於席下將所患脚腿就
卧重蒸薄衣被蓋得汗出勻遍約半箇時辰徹去炒麩止就鋪褥
中卧待一兩時辰覺汗稍解勿令見風效

洗足方

川椒 一兩 獨活 一 羌活 一 木瓜 各五錢 白芷 三錢

荆芥 二兩

用水一壺煎至半壺去渣避風處溫浴洗後拭乾仍用川椒炒熟
絹帛包裏患處鹽亦可熨之

治脚氣腫痛用木瓜為末好酒溫熱調敷患處

治脚氣或腫或痛皆受寒濕所致

艾葉桃葉煎湯桶盛熱氣薰蒸汗出為度

一方用 川椒 一兩 葱 一握 生姜 一大塊水煎湯洗之立已凡
人患寒濕脚氣疼痛不仁者內服前劑外宜以此湯蒸洗無有不良

治脚氣腫痛并鶴膝風不能動止

真生姜汁一碗入牛膠一兩熬成膏入乳香沒藥各一錢攪勻絹帛

難貼腫消痛止次日將滾水入藥碗內去水又攤又貼
治兩脚俱是疔瘡腫毒骨痛

獨蒜切片鋪放腫痛處每蒜一片用艾灸二壯去蒜再換再灸至
愈為度

治兩足痛如刀刺不可忍者只用生薑切片蘸香油擦痛處隨用生薑
火燒搗爛敷患處須更姜乾痛止

○按右方皆外治之劑選而用之

七聖散 治風濕流注經絡間肢節緩縱不隨脚膝疼痛不能履地

牛膝去蘆酒 杜仲去皮 續斷 川草薢 防風

獨活 甘草各一兩

右烘乾為細末每服二錢空心溫酒調下

治足疾腫痛拘攣

難貼腫消痛止次日將滾水入藥碗內去水又攤又貼

治兩脚俱是疔瘡腫毒骨痛

獨蒜切片鋪放腫痛處每蒜一片用艾灸二壯去蒜再換再灸至
愈為度

治兩足痛如刀刺不可忍者只用生薑切片蘸香油擦痛處隨用生薑
火燒搗爛敷患處須更姜乾痛止

○按右方皆外治之劑選而用之

七聖散 治風濕流注經絡間肢節緩縱不隨脚膝疼痛不能履地

牛膝去蘆酒 杜仲去皮 續斷 川草薢 防風

獨活 甘草各一兩

右烘乾為細末每服二錢空心溫酒調下

治足疾腫痛拘攣

威靈仙 牛膝去蘆酒洗

右為末煉蜜為丸梧子大每三千丸熟水下忌茶

秘方 治脚氣腫痛

乳香 沒藥 天麻 白附子 姜黃

右各等分為細末每服五分空心酒調下

治寒濕氣作脚腿痛此藥服後竟長痛處出汗如神

番木鱉子炒乾 一兩 牛油煤黃色 兩頭尖 三錢 火炮

右共為細末每服四分空心燒酒調下未止次日再服

治脚氣冷痛

用陳雞屎四五升沸湯發之將脚蒸洗

神仙救苦丸 方見通治

治脚跟疼痛神效

痿躄

痿音威不能舉也 躄音壁跛跛不能行也

風痺痿軟宜虛濡忌急疾

夫痿者手足不能舉持是也又名軟風下身瘦弱不能趨步及手戰搖不能握物此症屬血虛血虛乃陰虛陰虛則內熱熱則筋弛步履艱難而手足軟弱此乃血氣兩虛風淫之症古方通用風藥治之非也我東垣丹溪二公治法始合經意而以清燥湯主之

子和云痿因肺熱相傳四臟其脈多浮而大不可作寒濕脚氣治之

主方 治痿躄四肢軟弱不能舉動
當歸身酒洗一錢熟地黃二錢白芍酒炒一川芎七分 人參五分
白朮去蘆一錢茯苓一錢 麥門冬去心一錢五味子十二粒牛膝去蘆酒洗一錢
杜仲去皮酒炒一錢蒼朮米泔浸炒一錢黃連酒炒五分黃相酒炒一知母五分

水煎空心服

清燥湯 治濕熱成痿以燥金受濕之邪是絕寒水生化之源絕則昏虧痿厥之病大作腰以下痿軟癱瘓不能動

- 黃芪 人參 白朮 蒼朮 陳皮
- 茯苓 黃連 當歸 生地黃 黃柏
- 麥門冬 五味子 猪苓 澤瀉 柴胡
- 升麻 神麩 甘草
- 右剉生姜一片水煎服

○按右方治痿躄攻補兼施之劑
治兩足痿躄不能動履
鹿茸 人參 各五錢
剉一劑水煎空心連進數服而愈

○按右方治痿躄屬氣虛者宜之

鹿角膠丸 治氣血兩虛雙足軟弱不能健運行走久卧床褥

鹿角膠 八兩 鹿角霜 四兩 懷熟地黃 用懷生地酒蒸四兩

川牛膝 去蘆酒洗一兩 白茯苓 去皮一兩 兔絲子 酒製一兩

當歸 酒洗六兩 白芍 鹽酒炒二兩 白朮 去蘆土炒二兩 川杜仲 去皮姜汁炒二兩

虎脛骨 酥炙一兩 龜板 酥炙一兩 蒼朮 酒浸二兩 黃柏 去皮鹽酒炒二兩

右為細末將鹿膠好酒溶化和為丸如梧子大每服百丸空心薑

姜湯下忌生冷寒濕之物

起痿丹 治腎氣虛憊腰膝酸疼行步無力

兔絲子 酒淘浸蒸二兩 肉苁蓉 酒浸 川菖蒲 破故紙

葫蘆巴 酒炒 沙苑蒺藜 微炒 川牛膝 去蘆酒洗 川杜仲 酒炒

甘枸杞子 防風 酒洗各二兩

河間方去枸杞加桂減半

右為末酒煮猪腰子搗爛和丸梧子大每七八十丸空心溫酒下
○按右方治兩足軟弱大補之劑久服奏效
治兩足痿弱不能行

用新磚火燒紅用好醋澆之將濕茶包烙脚上遍處立能行

痺痛

附白虎歷節

夫痺痛即痛風也四肢百節走痛是也因風寒濕三氣合而成痺故曰
痛痺筋骨掣痛也曰著痺者而不行也曰行痺走痛不定也曰週痺
周身疼痛也皆邪氣有餘之候也○痺之為病寒多則掣痛風多則
引注濕多則重著爾

主方 治一切遍身骨節流注作痛

人參 白朮 去蘆油 白茯苓 去皮 當歸

川芎

赤芍

生地黄

防風

羌活

獨活

天麻

南星

陳皮

黃芩酒炒

甘草

生薑煎服

參伍秦光湯

治痛風腰背手足肢節疼痛乃血虛氣弱經絡枯澀

滯而然也痛甚者乃曰白虎歷節風走注風膝大脛瘦白鶴膝風是也

當歸一錢

芍藥七分

赤芍酒炒七分

生地黄一錢 秦艽一錢半

蒼木

重便浸

羌活一錢半

川獨活一錢 單解一錢

五加皮二錢

黑狗脊

去根

黃連二錢

黃柏酒炒一錢

黃芩酒炒一錢半

紅花酒洗八分

黃芪

酒炒

人參二錢

牛膝去蘆酒洗一錢半

杜仲

去皮每

兩用小茴香一錢 鹽

甘草生三分

右劉朮枝七根每長一寸半燈心七根煎熟入童便好酒各一盞

空心溫服忌酒麪鯉魚羊鵝如天將作雨陰晦時日而頭先覺痛

甚者加防風升麻天麻○午後夜甚者血弱陰虛加升麻五分牡

丹皮一錢○早上午前者氣滯陽弱加連翹沉香竹瀝乳汁○

痛甚者倍羌活紅花各連酒炒涼血則痛止

○按右方攻補兼施止痛之劑

虎脛骨方 治白虎風走注疼痛兩膝熱腫

虎脛骨酥炙

黑附子炮製去皮臍

右為末每服二錢空心溫酒調下七日再服

如聖散 治一切風疾血脈凝滯經絡手足拘攣四肢骨節疼痛行步

艱難半身不遂口眼喎斜及遍身盡痛又治婦人兒枕痛

玄胡索炒

當歸身酒洗 官桂各等分

右為末每服三錢酒調早晚各一服○腰痛加杜仲酒炒 小茴香

酒炒 各等分

乳香定痛丸 朱柳河

治諸風遍身骨節疼痛或腿膝痛及筋骨風

蒼木 米淮浸 川烏 炮去皮 當歸 一兩 川芎 一兩 乳香
沒藥 各三錢 丁香 五錢

右為末 棗肉為丸 如梧子大 每五六十九丸 酒下

○按右方 治遍身筋骨疼痛 專攻之劑

十全大補湯 治勞倦 遍身痛 加製半夏 倍桂

○按右方 治虛弱之人 遍身疼痛 之劑

五積散 見中寒

治遍身四肢骨節痛 加羌活 獨活 川山 用隨所痛取

甲炒成珠 入麝香少許 姜棗水煎服

○按右方 治感寒邪 遍身骨節疼痛 之劑

一治因感濕患 白虎 歷節 風症 遍身抽掣 疼痛 足不能履地 者 壬午百

方不効 身體羸瘦 骨立 幾死

以木通 一兩 剉細 長流水煎汁 頻服 後一時 遍身痒甚 上體發紅 斑 隨出 隨沒 出江 至腰 上體不痛 矣 次日 又服 又發 斑 出汗 至足 底汗 乾後 遍身通暢 而無痛 矣

○按右方 木通 乃利濕之藥 濕去 則痛除 矣

治兩手臂麻木疼痛

當歸

川芎

白芷

黃芩 酒炒

黃連 姜炒

蒼朮

羌活

防風

桔梗

南星 姜炒

半夏 姜炒

桂枝

甘草

生姜煎服

治兩足麻木疼痛

當歸

白芍

白朮

蒼朮

陳皮

半夏

茯苓

黃柏

牛膝

威靈仙

桃仁

紅花

甘草

生姜煎入竹瀝服

一婦人年七十餘遍身作痛筋骨尤甚不能伸屈遍身作痒如虫行口乾目赤頭暈痰壅胸膈不利小便短赤夜間殊甚用六味地黃丸料加山梔子柴胡

續斷丸

治寒濕之氣痺滯關節麻木疼痛

黃芪

酒炒

一人參

七錢

白朮

去蘆

白茯苓

去皮

熟地黃

山藥

一兩

山茱萸

酒蒸

去核

一兩

牡丹皮

一兩

薏苡仁

一兩

續斷

一兩

麥門冬

去心

一兩

石斛

一兩

防風

土錢

桂心

鹿角膠

二兩

右為末煉蜜為丸如梧子大每服五十九空心溫酒下
一治中年人濕痰壅滯經絡不運兩臂作疼不能梳洗及治手足疼痛麻痺行步艱難服之即效

陳皮

鹽水炒

半兩

二兩用白礬牙皂生薑各一兩煎湯浸七日

白茯苓

去皮

一兩半

風化硝

一兩

海桐皮

酒洗

一兩

片子姜黃

一兩

木瓜

一兩

薄桂

去皮

五錢

甘草

炙四錢

白芍

酒炒

二兩

黃芪

鹽水炒

二兩

右為細末姜汁竹瀝為丸如梧子大每服百九空心白湯送下
秘傳藥酒方 治男婦風濕相搏腰膝痛或因坐卧濕地雨露所襲遍身骨節疼痛風濕脚氣並治

白芷

桔梗

白芍

川芎

麻黃

茯苓

半兩

肉桂

甘草

各一兩

陳皮

厚朴

姜汁炒

枳殼

煨炒

當歸

各一兩

蒼朮

米泔浸炒

四兩

牛膝

去蘆

二兩

杜仲

酒炒

一兩

木瓜

一兩半

檳榔

一兩半

烏藥

防己

一兩

獨活

一兩半

各劉以苧布袋盛之，用好酒三斗，將藥袋懸於壇內，密封固壇口，鍋內煮之，一時久，然後取出，過三日，後去藥，隨量飲之，渣晒乾，為末，酒糊為丸，如梧子大，每服七八十九，空心酒下，腿膝疼痛，加川烏虎脛骨，腰痛，加肉蓯蓉，破故布，枸杞子。

洗痛風方

治手足冷痛如虎咬者

用樟木屑一斗，以急流水一擔，熬爛，入大桶內，桶邊放一瓦盆，令坐桶邊，放脚在內外，以草薦一領圍之，勿令湯氣入眼，恐壞眼，其功甚捷。

一治遍身上下前後攻作，滾痛，此寒邪在表，宜用木粗碗盛柴灰火，其實一碗，以燒昏，蓋之外，又以麻布蓋住，噴熱酒在上，撲在患處，拖遍身上下，須臾，腫消毒散。

治風濕癭痛諸風腫痛

- 防風 荆芥 川芎 白芷 羌活

- 苦參 威靈仙 何首烏 楮槐 榆柳桑

膏藥方

生姜帶皮取汁一碗，葱連鬚帶葉取汁一碗，用牛皮膠半斤，慢火熬成膏，入麝香一錢，在內用布攤膏藥，貼痛處，取出濕水，如愈，九得氣流注之病痛，不可忍，用。

金銀花帶葉和酒糟研爛，用淨瓦離放火中烘熟，敷患處，立愈。

消渴

脈宜洪大，忌微少。

上消者肺也，多飲水而少食，小便如常。

中消者胃也多飲食而小便赤黃

下消者腎也小便濁淋如膏之狀○三消皆禁用生薑

丹溪曰三消者多屬血虛不生津液俱宜四物湯為主治

上消者四物湯加入參麥門冬五味子天花粉入生藕汁入乳飲酒人加生葛根汁

中消者四物湯加知母石膏滑石寒水石以降胃水

下消者四物湯加黃柏知母熟地黃五味子以滋腎水又當閉與繖絲湯為上策

繖絲湯 治三消渴如神

如無繖絲湯却以原蚕醃殼絲綿煎湯皆可代之無時飲之殊効

三才膏 治三消渴

黃連天花粉二味為末藕汁入乳生地黃汁佐以蜜姜汁為膏和

末留舌上徐徐以白湯少許送下能食者加石羔

天華散 治消渴如神

天花粉一兩 生地黃一兩 麥門冬五錢 五味子 五錢

乾葛 五錢 甘草 五錢

右剉一兩糯米一撮水煎服

加減八味丸 治常人平日口乾作渴因飲酒食炙博補藥房勞九若

此類過多故有此症後必有癰疽發也宜先服此以絕其源及癰疽

愈後服此有益

懷生地黃 酒浸蒸晒乾 山藥 一兩 白茯苓 去皮八錢

山茱萸 酒蒸去核晒乾 澤瀉 酒浸飯上蒸過晒乾八錢

五味子 一兩半 肉桂 五錢 牡丹皮 八錢

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服五六十九五更時温酒或淡

鹽湯下。

參芪五味湯 治腎水枯竭不能運上消渴恐生癰疽

黃芪 人參 粉草 五味子

麥門冬 去心各等分

右劉水煎入朱砂少許不拘時服

黃芪六一湯 治消渴飲水太多致生癰疽

黃芪 蜜炙黃 甘草一兩 棗一枚水煎無時溫服

生地黄膏 治消渴通用

生地黄 東如常礬大 人參五錢 白茯苓 去皮一兩

麥門冬 去心一兩 五味子五錢

右將地黄洗切研細以新水一碗調開用蜜煎至半次入下藥末
拌和磁器密收匙挑服

有人消渴引飲無度或令食菲薄或炒或作羹無入益日服三五兩其

渴遂止

玉壺丸 治消渴引飲無度

人參天花粉等分為末煉蜜為丸梧子大每三十丸麥門冬湯下
有人病渴用渴藥累年不愈用加減八味丸而愈其疾本以腎水枯竭
不能制火心火上炎是以生渴此藥降火為最降心火生腎水

九消渴之人當防患癰疽所怕者一飲酒二房勞鹹食及麪俱宜忌也

黃連猪肚丸 清心止渴治中消

黃連 五兩 麥門冬 去心 知母 去毛 瓜蒌仁 去殼各四兩

右為末入猪肚內縫之蒸熟乘熱於石臼內搗爛如乾加煉蜜

丸如梧子大每百丸食後米湯下

玄兔丹 治三消溫神藥

兔絲子酒浸軟乘濕研

白茯苓去皮

蓮肉三兩

遼五味子七兩酒浸

山藥六兩

右為木酒煮麪糊為丸梧子大每服五十九用天花粉五味子煎湯下脚膝無力木瓜湯下

濁症

夫白濁者因思慮過度嗜慾不節遂使水火不交精元失所斯是為赤白濁之患赤濁者心虛有熱多因思慮而得之白濁者腎虛有寒過於嗜慾而得之流脚澄下凝如膏糊是也用中和之藥治之使水火既濟脾土自堅其流必清矣

清心蓮子飲主方

治心中發熱煩燥思慮憂愁抑鬱小便白濁或有

沙膜夜夢走泄遺瀝沙痛便赤如膏或酒色過度上盛下虛心火炎

上肺金受剋故口乾燥漸成消渴四肢倦怠男子五淋婦人帶下赤白五心煩熱此藥溫平清心養神

黃芪蜜炒一錢 赤茯苓去皮二錢 人參二錢半 石蓮肉去心二錢半

麥門冬去心 黃芩 地骨皮 車前子 各一錢五分

甘草炙一錢

右剉丁剉燈心五根生姜三片水煎服○上盛下虛加酒炒黃柏

知母○熱加柴胡薄荷各一錢半

內經論便濁之症因脾胃之濕熱下流滲入膀胱故使便尿赤白渾濁不清也宜燥中官之濕用升麻柴胡提氣使大便潤而小便清宜純用寒涼傷血之藥

主方

陳皮八分 半夏八分 茯苓一錢 蒼朮七分 黃柏七分 酒

柴胡七分 升麻三分 白朮五分去芦炒 神麴五分炒 牡蠣煨三分
 梔子仁一錢 蛤粉三分 滑石一錢 甘草三分
 右剉一劑 生姜三片 白菓一枚 水煎 空心服 渣再煎 服忌煎炒辛辣之物

水火分清飲 治赤白濁

益智仁五分 萹蓄五分 石菖蒲五分 赤茯苓七分 車前子五分
 猪苓五分 澤瀉五分 白朮五分 陳皮五分 枳殼五分
 麻黃五分 甘草三分

右剉一劑 半水半酒煎 空心溫服 久病去麻黃 易升麻
 治赤白濁症

水通去骨 滑石三錢 粉草四錢 黃荆子一勻
 右剉水煎 空心服

治白濁淋瀝痛因房慾不節或精未施泄而成將成下疳者
 菡豆不拘多少 搗井花水澄清 空心服

洗法 用花椒三錢 葱白七根 水煎 先薰後洗

清濁鎖精丹 治白濁 大能化痰

枯白礬二兩 滑石二兩

右為末 早米糊為丸 如梧子大 每五十丸 米飲空心下

治白濁經年不愈 或時夢遺 形瘦 當作心虛 治用定志丸 加黃柏 酒炒 朱砂 蛤粉 為衣

夢泄

邪客於陰 神不守舍 故心有所感 夢而後泄也 其候有三年少氣盛 驟
 曠矜持 制情慾 不自覺知 此泄如瓶之滿而溢者也 人或有一是為

無病勿藥可矣。心家氣虛不能主宰，或心受熱陽氣不收，此泄如瓶之側而出者也。人多有之，其病猶輕，合用和平之劑，臟腑積弱，真元久虧，心不攝念，腎不攝精，此泄如瓶之罅而漏者也。人少有之，其病最重，須當大作補湯，或為夢泄，尤甚於房勞，此世俗習聞其說也。獨不觀症候之有重輕乎？外此又有二輩神氣消靡，橫竇橫生，風邪乘其虛，鬼氣干其正，往往與妖魅交通，是又厄運之不可曉者也。法藥相助，誠哉是言。

承濟湯 治男子失精，女人夢交，自汗盜汗，六脈孔動微緊。

桂枝 白芍 酒炒 龍骨 牡蠣各三錢 甘草炙二分

右剉棗一枚，水煎，空心溫服。

按右方治遺精盜汗，兩治之劑。

白濁遺精 蓋心神寧靜則精固，君相火息則濁清，有是証者始因。

乎心搖乎精而然也。龍雷火動，其水濁而不澄，尾間不燃，即精竭地而不固，治宜補心寧神，滋陰固本。

主方

黃芪蜜炒 一錢 人參 三錢 白朮去蘆炒 白茯苓去皮木

當歸身 一錢 白芍酒炒 一錢 麥門冬去心 巴戟去心 三錢

五味子十二粒 夏月十六粒 益智去殼 一錢 酸棗仁炒 一錢

山藥 一錢 澤瀉 一錢 升麻 五分 黃連酒炒 一錢半

黃芩 二錢 黃柏酒炒 七分 知母 二錢 蓮花鬚 一錢

生甘草稍 一錢半 右剉，水煎，空心溫服。

按右方治遺精，心腎虧損，補益之劑。

玉環丹 治遺精白濁。

五色龍骨煨 左顧牡蠣煨 蓮花蕊

芡實去殼

石蓮子去殼

五味子 川黃柏 酒炒各一兩

右為細末用金櫻子煎為糊入相內搗干餘下成劑為丸如梧子大每五十丸空心益湯下

固精安神丸 治心神不安腎虛自泄精

黃柏 酒炒一知母 一兩炒 龍骨 煨 牡蠣 煨 芡實 去殼

蓮鬚 白茯苓 遠志 去心 山茱萸 酒蒸去核各三錢

右為細末煮山藥糊為丸如梧子大朱砂為衣每五十丸空心益湯下

○按右方瀝精之劑

治男子水腫虛憊遺精盜汗往往夜夢遺交

積猪腰一枚以刀開法筋膜入附子末一錢七以濕紙裹煨熟空心稍熱服即飲酒一二盞多飲亦妙三五服效

石蓮散 唐普王府方 治遺精

石蓮肉 蓮鬚 芡實 人參 麥門冬

白茯苓 遠志 甘草 右剉水煎空心服

○按右方養心瀝精之劑

樗根丸 治白濁夢泄遺精及滑出而不收

樗根白皮 有莢者是 黃柏 炒褐色 蛤粉 炒 青黛

乾姜 炒微黑 滑石

右為末水和丸如梧子大每百丸空心溫酒下○虛勞者四物湯吞下

固本鎖精丹 治元陽虛憊精氣不固夢寐遺精夜多盜汗遺泄不禁

並治之此大補元氣瀝精固陽健脾胃除濕熱

嫩黃芪 蜜水炒二兩 人參 一兩半 甘枸杞子 兩 鎖陽 二兩

遼五味子兩 石蓮肉半兩 山藥二兩 海蛤粉二兩

川黃柏去皮酒拌晒乾 知母去毛酒拌晒乾炒二兩

右為細末用白朮去蘆油六兩水五碗煎至二碗傾出木汁另放
再用水四碗煎至二碗去渣與前一碗汁同煎至一碗如膏攪
和前藥末為丸梧子大每五十九加至六七十丸空心溫酒或淡
鹽湯下

○按右方治夢遺精滑大補元陽之劑

六味地黃丸 治精不固加牡蠣火煨二兩

○按右方滋陰補腎涼精平補之妙劑也

固真丸 治精滑久不愈用好龍骨細研水飛過每服一錢用好燒酒

調服

又方 牡蠣不拘多少砂鍋內煨醋淬七遍為末醋糊為丸如梧子大

每五十九空心鹽湯下一方加鹿角霜

○按右方濕精專攻之劑

珍寶玉堂丸 治夢遺精滑晝夜長流神効

蓮鬚色黃者佳 一斤 石蓮肉 淨半斤

麥門冬 去心四兩

用公猪肚一箇入家蓮肉帶心皮一斤砂鍋內入水煮爛去肚將
蓮肉晒乾同前藥為細末煉蜜為丸如梧子大每百丸空心蓮鬚
煎湯送下

秘精丹 治遺精用

霜蟬蛸 韭子 各一兩 芡實仁 白茯苓 各二兩 梧子仁

遠志去骨各 人參 二錢 甘草 一錢半

右為末煉蜜為丸梧子大每服七十九空心酒下

淋閉

附尿血

夫五淋者氣石血膏勞是也氣淋為病小便澀常有餘滴石淋莖中痛尿不得卒出膏淋尿似膏出勞淋勞倦即發痛引氣衝血淋遇熱即發甚則尿血候其鼻頭色黃者小便難也太抵此証多由心腎不足積蘊熱毒或酒後房勞服食熱燥七情鬱結所致

海金沙散 主方

治五淋

服此小便內打下砂石子後服六味地黃丸收功或加車前子牛膝去蘆

當歸 酒浸

雄黃

川牛膝 去蘆酒

大黃 酒浸

木香

海金沙 各等分

右為細末每服一錢半臨卧酒調服立效

○按右方治五淋皆效

治淋濁妙方

牙皂

滑石

竹葉

燈心

皮硝

少許

熬湯露一宿次早溫服立效

○按右方治淋滑皆治之劑

治久下泄不止效

當歸

川芎

白芍

熟苧

陳皮

半夏

升麻

柴胡

牛膝

黃柏

知母

白朮

蒼朮

茯苓

甘草 各一錢

水煎露一宿空心服

○按右方治下淋屬陰虛有濕者宜之

補中益氣湯 方見內傷

治五淋夫淋多是膀胱之氣虛損不能運用

水道故滯而不通而成諸淋也此方補元氣故有太效

○按右方補元氣則水道運行而淋不作矣

治血淋

阿膠炒二兩 猪苓

澤瀉

赤苓各一兩

車前子五錢

水煎空心服

治苦病淋而莖中痛不可忍者

六君子湯加黃柏知母滑石石葦琥珀水煎服

六味地黃丸方見補益

治尿血因心腎氣結所致或憂鬱房室過度

而得之實由精氣滑脫陰虛火動榮血妄行耳尿行則不痛尿淋血

行則痛依本方加黃柏知母海金沙琥珀作湯藥服之殊效

八味丸方見補益

若老人陰痿思色精不出而內敗小便道澀痛如

淋依本方加車前子牛膝若老人精已竭而復耗之大小道牽痛愈

痛愈欲便愈便則愈痛此藥最效

遺尿

夫尿者賴心腎二氣之所傳送膀胱為傳送之腑心腎氣虛陽氣衰冷

致令膀胱傳送失度則必有遺尿失禁之患矣經云膀胱不利為癃

閉不約為遺尿也大宜溫補清心寡慾又有產後不順致傷膀胱及

小兒脾冷俱能令人遺尿各須隨症照後方治之

滋榮養衛湯主方

治身體虛瘦夜常遺尿失禁及小便頻數

人參八分

白朮去蘆

山藥一錢

益智仁七分

山茱萸酒浸去核七分

當歸酒洗一錢

白芍酒炒一錢

黃芪蜜炙一錢

酸棗仁炒七分

甘草炙四分

水煎溫服

縮泉丸 治解氣不足小便頻數日夜百餘次

益智仁

天台烏藥大如磨者

右各等分爲末酒煮山藥打糊爲丸如梧子大臨卧時用益酒送下五七十九

治小水頻方 此疾乃下元虛所致

人參五錢 黃柏酒浸五錢 益智仁六錢如用後覺 甘草一錢

右各爲末煉蜜丸梧子大五更臨卧每五六十九白滾水下用酒亦可

治遺尿失禁 遺尿者枯礬牡蠣煨等分爲末米湯調下

益智仁七箇 桑螵蛸七箇

右爲末酒調服用熟白菓七箇送下

治小便不禁有熱者

五苓散去桂加黃連黃柏梔子山茱萸五味子水煎空心服

治小便虛弱不禁者

五苓散合四物湯加山茱萸五味子水煎空心服

治老人氣短小便不禁

四物湯加黃芪人參煎湯送下通關丸

加味地黃丸

治腎與膀胱俱虛冷氣乘之不能約制故遺尿不禁或

睡中自出

懷生地黃 酒蒸四兩 懷山藥 二兩 牡丹皮 半兩 澤瀉 一兩

白茯苓 一兩 山茱萸 酒蒸去核二兩 破故布 酒炒二兩

益智仁 炒 一兩 人參 一兩 肉桂 五錢

右爲細末煉蜜爲丸如梧子大每服七十丸淡鹽湯送下

治夜多小便 用胡莢慢火煨熟臨卧溫酒下嚼

治夜多小便 用益智子二十四箇搥碎入盆同煎服有奇驗

治小便多者 夜煎葶藶一味服之永不夜起

治小便桶內起泡盈桶此腎氣衰也

用紅雞冠為末每三錢空心溫酒調下

附轉胞

小便閉

導赤散 治小腸實熱小便秘赤

懷生地黃 木通

甘草

淡竹葉水煎空心服

八正散

治心經蘊熱臟腑閉結小便赤澀降閉不通及熱淋血淋如

濁後忿怒而得者則小便將出而痛既出而痒以此藥主之

大黃

瞿麥

木通

滑石

篇蓄

車前子

梔子仁

甘草各等分

右劉涓子心水煎服

治小便不通

麝香 少許

半夏末填臍中上用葱白田螺搗成餅封臍上用布帶傳

住下用皂角烟薰入陰中自通女人用皂角煎湯洗陰戶內○卒不

得小便不通炒鹽內臍下即通

治小便不通

皮硝丁合連鬚蔥一根搗為一處用青布攤在上似膏藥樣貼臍上

用熱瓦熨之

治小便不通

蚯蚓五七條研爛投涼水一碗攪勻澄清去泥飲水即時通大難熟

疾不知人事欲死服之立効

又方 治小便不通用猪膽投熱酒中服之立通

治小便不通腹脹疼痛欲死

野地蕪蕪子不拘多少焙黃色為末溫黃酒調服

治小便不通登時見效

火麻燒灰黃酒調服

治小便不通心腎有熱并治血淋尿血

車前子草不拘多少連根帶葉搗自然汁入蜜少許同服立通

治小便不通

大黃酒煮乾為末酒丸用扁竹根煎水送下

小便不通服涼藥日久不通脹滿幾死

附子理中湯加琥珀末同服立通

治小便不通并傷寒雜症而不可以通利之藥者用此即通

皮硝煎化用青布蘸水搭臍上并小便上熱則易之

治小便不通如神

用蠶蛹一箇焙熟嚼吃黃酒送下

治小便不通兩尺脈俱沉微乃陰虛故也嘗服通滑之劑不效者

大附子一枚重一兩者炮去皮臍鹽水浸瀉一兩二味剉作四劑

燈心七根水煎食遠服

治小便不通小腹脹滿不急治即殺人用

連根葱白一斤搗爛炒熟以布裹分作兩處更替射臍下即通加此

麝更妙

治小便不通諸藥無效或轉胞至死此法用之小便自出

猪尿管一箇傾出尿用鵝毛筒去頭尾插入竅孔內線點至足以口吹

氣令滿胞用線管下再扎住將管口放在小便頭上向竅孔解後下

線手搓其氣透裏自然小便即出

陰陽關格前後不通尋常通利大腑小水自行中有轉胞一証諸藥

不效失收則悶亂而死予嘗以甘遂末水調敷臍下內以甘草節煎

湯飲之及藥汁至臍二藥相反胞自轉矣小便來如湧泉此救急之良訣也

八味丸 治小腹急痛不得小便不問男女孕婦轉胞小便不利命在反掌此藥一服小便如湧而安力見補益

大便秘

大便秘結其名有五有風秘氣秘濕秘寒秘熱秘風秘者風痰結於大腸秘而不通也氣秘者氣滯後重煩悶脹滿大便結燥而不通也寒秘者年高腸冷及痰癖冷氣結滯大腸而不利也熱秘者內腑積熱消耗津液大便結燥而不通也濕秘者濕熱鬱結津液不行大便秘結也此証皆由體虛之人攝養乖方三焦氣滯轉運不行而凝滯於腸胃之間遂成秘結之患又有年若之人新產之婦氣血虛腸胃結

澀而秘結者不可妄用通利之藥恐傷元氣惟當滋血潤燥而已大抵秘結治法燥則潤之溫則滑之秘則通之寒則溫之熱則涼之風則散之氣則順之要在隨症審察焉

治大便秘塞不通 主方

細茶一撮 生芝麻一撮 生薤仁七枚 生大黃一錢或二三錢
甘草五錢 右用長流水生搗爛服立通

秘方 治大便秘結

用商陸搗爛敷臍上立通 并小便不通亦効

- 一方 用生大黃末二錢皮硝五錢用好熱燒酒一碗泡化服立通
- 一方 用皮硝五錢熱酒化開澄去渣加香油三四茶匙溫服立通
- 一方 用大黃皮硝牙皂三味等分水煎服立通
- 一方 用生蜜一盞入芒硝三錢滾湯調服

一方 治大便不通用黃荊子凉水吞服

○按右方俱治實熱閉結者擇便選用

通幽潤燥湯 主方 治大便難幽門不通上衝吸門不開噎塞不便燥

閉氣不得下治在幽門以辛潤之

當歸身一錢 生芩五分 熟芩五分 桃仁一錢 紅花一錢

升麻一錢 甘草炙 大黃煨一錢 火麻仁一錢

右剉一劑水煎去渣調橫柳末五分稍熟食前服

潤腸丸

大當歸 酒洗 二兩 生地黃 一兩 熟地黃 五錢 火麻仁 一兩 枳殼 去穢 七

杏仁 去皮尖 五錢

右為末蜜丸每服七十丸空心溫湯送下

治大便不通并傷寒雜症用藥不行者立通 持通庸方

粟米水煮至熟入火麻仁微炒不拘多少入粥內再煮三二沸飲湯

立効

按右方治血枯虛閉者宜之

六磨湯 治氣滯腹急大便閉結

沉香 木香 不見火 檳榔 烏藥 枳殼 土炒

大黃 各等分

用熱水磨濃汁合而服之立通

仁子粥 能順氣滑大便

火麻子仁 紫蘇子 不拘多少 二味研爛水濾取汁煮粥食之

○按右方治氣閉不通者宜之

治大便不通及老人風虛閉結

陳皂角燒灰存性以碗蓋在地下宿空心酒下立通或以雞子

子插冷水下立通

獨膽汁導法

治自汗小便利而大便燥硬不可攻以此法導之

猪膽一枚傾去一小半仍入醋在內用竹管相接套入穀道中以手指撚之令膽汁直射入內少時即通蓋酸苦益陰以潤燥也

治大便不通腹脹死在須臾

竹管蘸葱汁深入大便內以香油一半溫水一半同入猪尿胞內撚入竹管將病人倒放脚向上半時即順立通

蜜導法

治自汗大便閉結不通且便於老人并日久不能服藥者

蜜煉如脂乘熱撚如指大長二寸兩頭如鏡納谷道中良久下燥糞若加真角末少許更効如無蜜以香油灌入谷道中亦効

治大便閉結至極或不知入大田螺二三枚鹽一撮和殼生搗碎置臍者臍下一寸三分用寬帛繫繫之即通亦治脚氣

治大便不通

用烏相木方停一寸來劈破以水煎取小半盞服之立通不用多吃其功神聖兼能取水

治氣血乾涸津液枯竭時常大便秘結入珍湯加肉苁蓉又服自通去燥糞 生姜削如小指長二寸鹽塗之內下部中

關格

天關格者謂膈中覺有所碍欲升不升欲降不降飲食不食此為氣之橫格也必用吐以提其氣之橫格不必在出痰也有痰以二陳湯探吐之吐中便有降有氣虛不運者補氣藥中升降

丹溪曰此症多死寒在上熱在下也寒在胸中過絕不入無入之理故曰格熱在下焦填塞不通無出入之由故曰關格則吐逆關則不得

小便

內經云人迎與氣口俱盛四倍已上為關格關格之脈虛不能極於天地之精氣則死矣

兩枳三陳湯 治關格上焦痰壅兩寸脈盛是也

陳皮

半夏 各二兩

白茯苓 半兩

南星

枳殼

枳實

甘草 各一兩

右剉每服五錢水煎服用鵝毛患人咽喉探吐之如病虛弱不可用也

大小便秘

治關格脹滿大小便不通用獨頭木蒸燒熟去皮綿裹納下部氣立通又治腹滿不能服藥以此導之冷即易

溲溺不通証細故也期朝不通便令人喘名曰關格又曰不通而死矣

一見嘔症便不可救經曰出入竅則神機化滅升降息則氣立孤危此之謂也

治大小便閉結不通肚腹脹滿咽喉閉塞水漿不入痰壅氣喘傷寒結胸即不倒床此幽門氣閉不通死在須臾

瞻陽吳進士傳

甘遂五分麩裹火煨熟取出為末入麝香三釐搗飯為丸淡姜湯下

治大小便不通

六七月間尋生糞中有大蠅蛆不拘多少用線串起陰乾收貯用時取一箇要全者放淨磚上四面以灰火烘乾以刀從腰切斷如大便閉用上半截小便閉用下半截各為末新汲水調服二便俱閉則全用之

治大小便不通

蝟牛三枚連殼為泥再加麝少許貼臍中以手揉按之立通田螺所
治大小二便不通

連根葱一莖洗帶土生薑一塊淡豆豉二十丁箇鹽二匙同研爛攤
餅烘熟掩臍中以帛縛定良久氣自透即通不然再換一餅

鐵脚丸 治大小便不通

皂角去皮子灰 為末酒麪糊為丸如梧子大每服三五丸酒下

顛倒散 治臍腑實熱或小便不通或大便不通或大小便俱不通

大黃六錢 滑石三錢 皂角三錢

古為末黃酒送下如大便不通依前分兩服如小便不通黃三錢

石六錢角如前如大小便俱不通黃石均分角亦如前

二便俱閉甚難醫 急炒鹽來塞滿臍 蒜片覆鹽堆艾熨 利便良

法少人知

治大小便不通經三五日者

不蛀皂角燒灰以米湯調下三錢

治大小便不通

猪牙皂角末猪膽調竹筒吹入糞門○小便不通葱津吹入馬口

痔漏

夫痔漏者肛門邊內外有瘡是也若成癰不破者曰痔破潰而出膿血
黃水浸淫淋瀝久不止者曰漏也皆由濕熱風燥四氣相合而致也
痔有五種謂牡痔牝痔脈痔腸痔血痔也古方又有酒痔氣痔虫痔
翻花蠅蛄等痔之名不一究其因亦不過以嗜辛熱炙博新酒及房
勞憂思蘊積熱毒憤鬱之氣所致也或藏於肛門之內或突於肛門
之外若蘊毒深者其狀大蘊毒淺者其狀小大者蓮花鷄冠核莖之

脈世全書 卷之三

狀小者如牛疥雞心櫻桃之類或流膿水或出鮮血有妨行坐又而不愈則成漏矣治法在外者宜點之洗之在內者宜祛其風而除其濕消其熱解其毒斯得治之法矣大抵脈滑而大者易治懸絕者難

主方 治痔瘡腫痛

黃連一錢 黃芩一錢 黃柏一錢 連翹一錢 赤芍一錢

梔子一錢 槐花一錢 苦參一錢半 大黃一錢半

右剉水煎空心服

逐瘀湯 治痔漏疼痛內有瘀血作痛要通利大小腸取下惡物立効兼赤痢血痢如神

川芎 白芷 枳殼麩炒 赤芍 阿膠炒

茯苓 義木 生地黄 茯神 木通

甘草 五靈脂炒各一錢 桃仁去皮尖 大黃各一錢半

生薑三片蜜三匙水煎空心服以利為度

治痔漏如神 先用猪鬃三條竹刀刮開將鬃斬去頭取血將鬃焯熟用鬃血塗上乘熱坐在糞門上冷則再換其痔不可當冷則取出鬃脚有小虫在上無其數然後服後藥

蔓荆子二錢 槐花二錢 條芩三錢 黃連二錢

生甘草梢五分 右作一劑水煎空心服

又一方用猪肚上屎皮貼在痔上夾住引出小虫為効

治蓮花痔瘡余紹坤

黃連三錢 烏梅三箇 大黃三錢 穿山甲炒三錢

右剉散水煎服

治痔漏神方二府陳灼無

陳棕燒有性 魚鱔一兩 廣膠一兩二味用炒為珠 栝子仁炒

共為末每服三錢酒調下

四治丸 治痔漏脫肛便血

黃連多用酒浸約三日

枳殼去穢炒二兩 防風去蘆二兩 當歸用全四兩

右四味為末以前浸黃連酒和麩糊為丸如梧子大每六七十丸空心米飲或沸湯送下忌煎炒酒麵羊鵝魚之物

潤腸化毒丸 治痔漏方

槐花一兩 枳殼炒一兩 蠟皮二兩 雷丸三錢 蘄艾一兩

梔子一兩 右共為末入公猪大臍內黃極爛搗下為丸每服

五六十丸空心滾水送下

○按右方治痔漏專攻之劑壯盛者宜之

臟連固本丸 凡衣食豐饒入患痔漏必干於飲食色慾所致及有乘

酒犯房若要除根必須服此滋陰內補藥宜戒酒厚味寡慾乃可也

懷生地黃六兩 山藥四兩 白茯苓去皮三兩 牡丹皮三兩 山茱萸酒蒸去核四兩

澤瀉二兩 川黃連四兩 川黃柏去皮四兩 知母去毛三兩 槐角三兩

人參三兩 當歸二兩 皂角二兩 天花粉一兩

右各為末用雄猪大臍頭一段去脂油灌藥末于內兩頭用黃絲線縛住用糯米二升煮飯將半熟撈起去湯藥腸盤藏于飯中如蒸飯之熟待冷此取出去兩頭無藥線縛之腸將藥腸淨石柏內杵爛揀出腸渣筋如不粘加些飯杵之丸如梧子大曬乾每空心百丸白湯下

三補丸 治痔漏神方

白茯苓去皮 赤茯苓去皮 沒藥各二兩 補骨脂四兩

右藥俱不犯鐵器放石柏內搗成一塊春秋酒浸三日夏二日冬五日取出木籠蒸熟曬乾為末酒糊為丸梧子大每二十九丸緩緩

加至五十九止酒送下

○按右方治痔漏虛弱之人可服
痔病成漏不破也

黑牽牛 白牽牛

頭末各一錢半用猪腰一箇竹刀劈開

入藥末在內線扎帛裹水濕火煨熟去帛空心嚼吃至巳時打下
先膿後血毒氣出盡永不再發

曹藩韓內相傳治痔効方

皮硝一斤入猪木臍內填實扎定入罐內封固火煨存性取出為
末每服二錢黃酒調下一料除根

治痔漏用獾猪肚一箇內入皂角刺一兩槐花一兩縫住黃爛去查任
意食肚不用鹽醬淡服二三枚極効

治痔漏肛門周匝有孔數十諸藥不効用熟大肉蘸濃藍汁空心食之

七日自安

治漏瘡土茯苓每服四兩水煎當茶食之渣曝乾焙乾餅食之忌猪肉
食水菜豆

○按右方治痔瘡專攻之劑

治痔漏卧床非策杖不能移步者

旱蓮草一把連根水洗淨用粗碗研極細如泥極熱酒一盞沖入飲
之餘渣再搗爛敷患處重者不過三服

治婦人久病心焦多怒遂成痔疾狀如蓮子熱腫而痛

熊膽八片腦研猪膽汁調塗瘡立已

一方用葱頭共蜜搗點一指頭腫處水冷即消

治痔瘡道中虫痒不止用水銀棗膏各二兩同研相和搽如棗形狀瘡
綿片果內下部明日虫出而已

治痔并漏極痛者

椒欖核燒灰存性一錢

熊膽五分

冰片七分

右為細末先將冬瓜皮煎湯洗淨如無臭桐葉湯洗將指蘸藥抹上二三次立已

治肛門邊腫硬痒痛

白礬三分碎研用童便二盞化開洗痔上一日二三次洗之

治漏瘡血水不止


蛇皮燒灰五倍子龍骨各五錢川續斷五錢麝香少許

右為末用津吐調敷濕則乾疹奇効

治痔漏用鰻鱧魚燒烟薰糞閉痔虫盡死

治久冷漏瘡

用活鱸魚五六條擲地以竹針貫之要脊長尺當有虫出如線



之使盡用檳榔黃連末敷明日以乾艾作湯投白礬二三錢洗下月而愈

一洗痔妙方

曲曲菜 小虫卧单 馬齒菜 猪牙草 花椒

槐條 胎根 右煎水先薰後洗後用

珍珠煨一錢琥珀一錢片腦二錢為末搽上

洗漏瘡魯府田承奉傳

槐皮 槐子 槐花 蘄艾焙乾

右煎水先薰後洗令爭將真紅鉛搽入不二三洗去病根

治痔瘡腫痛脫肛

生桐子去外皮用內搗爛煎水先薰蒸待溫浸洗不過二次全愈

薰洗痔漏良方

枳殼 三兩 當歸 二兩 荊芥 二兩 五倍子 二兩 黃葵花 二兩

木賊 一兩 朴硝 一兩 甘草 一兩

水煎乘熱薰過溫洗年深痛不止者藥到立已

生肌散

五倍子 炒黃色 二兩 乳香 沒藥 孩兒茶 各一

枯礬 五分

右為末每次用管吹入漏瘡內

薰洗痔漏秘方

茄根葱艾馬齒菜 五倍皮硝更用椒

七味煎湯薰洗過 多年痔漏一齊消

治漏瘡 冬瓜瓢燒滾水入罐內洗數次妙

刺蝟皮 切碎艾一塊 拳大 頭髮 一兩 黑驢乾糞 五六塊 醃浸 三四次



地下為一小坑內留小口照糞明黑若有蟲牛日瘡乾為度

灸痔疾 先以柳枝濃煎湯洗痔便艾灸其上連灸三五壯忽覺一道

氣轉入腸中因火轉為先血後穢

先痔妙方 用地茄根水煎洗之三次即愈神効

○按右方皆外敷貼薰洗之劑

治漏瘡惡水自天腸出

用黑牽牛頭末一分入猪腰子內以線扎青菅葉包火煨熟細嚼

鹽酒送下

愚按治痔之法不過涼血清熱而已至於漏初則宜涼血燥濕久則

宜溫敷殺虫而兼乎溫散也或曰痔漏屬火何故而用溫澀之藥殊

不知痔止出血始終是熱漏流膿水始是濕熱終是濕寒蓋此方雖

溫散又兼補養故丹溪云漏當大補氣血為主蓋有所自矣余每治

痔漏久不愈先服千金不換刀塗散以去風濕之毒則愈如未愈即服後方

追風補腎十漏大金丹 庚申甲子成除日合

- 當歸二兩 人參一兩 生地黃一兩 熟地黃二兩 天門冬一兩
 - 麥門冬二兩 破故布二兩 小茴一兩 大茴三兩 肉蓯蓉二兩
 - 山藥二兩 白茯苓二兩 鹿茸二兩 大附子一箇 川烏一兩
 - 丁香五錢 木香一兩 青木香一兩 砂仁一兩 厚朴一兩
 - 青皮一兩 陳皮一兩 枳殼二兩 枳實三兩 香附四兩
 - 烏藥一兩 白芷二兩 肉寇一兩 天麻一兩 杏仁二兩
 - 松節四兩 硃砂五錢 乳香一兩 沒藥一兩
- 右為細末煉蜜為丸如彈子大金箔為衣每服一丸空心酒化下張驛宰服効

○按有方治漏經年不愈屬虛者宜之

脫肛

夫脫肛者肛門翻出也蓋肺與大腸為表裏肛者大腸之門肺實熱則秘結肺虛寒則脫出腎主大便故肺腎虛者多有此症肺虛者補中益氣湯腎虛者六味地黃丸若大腸濕熱用升陽除濕湯身下而上者引而竭之

- 柴胡 升麻 防風 猪苓 澤瀉
- 蒼朮 陳皮 神麩 麥芽 甘草

治脫肛腸出數寸大蜘蛛尾上焙焦為末每少許擦上即收
治脫肛用浮萍草為末敷之

沿大腸又積虛每因大便脫肛按不得入

石灰炒令熟故帛裹坐其上入則易之

治脫肛白礬五倍子煎水洗又用浮萍末摻肛上

諸虫

夫人身有諸蟲若無則人身不成不立蟲與人俱生狀如馬尾或如薄筋出則在脾入則在臟古方論凡人皆有之固不待辯而知矣皆由脾胃俱虛飲食生冷甘肥油膩等物節宜不時腐敗停滯所以發蟲之為病嘔吐惡心口出涎沫有去有來乍發乍止是也

九蟲形狀

一曰伏蟲長四分

二曰蛟蟲又曰長蟲動則吐清水出則心痛貫心則殺入

三曰白蟲長一寸又曰寸白蟲相生子孫轉大長至四五尺或因

腑虛弱而動或因食甘肥而動其發動則腹痛發作腫聚去來上

下有休息亦攻心痛口苦吐涎及吐清水貫傷心者死

四曰肉蟲狀如爛杏令人煩滿

五曰肺蟲狀如蠶令久咳嗽

六曰胃蟲狀如蝦蟇令人嘔逆吐喜噦

七曰腸蟲狀如瓜瓣又名腸蟲令人多噎

八曰赤蟲狀如生肉令人腸鳴

九曰蟻蟲形至細微狀如菜蟲居洞腸之間因臟腑虛弱而致發動

則為痔為疥癬因入瘡處以生諸癰疽癩癧疥癬虫無所不為

穀道蟲者由胃弱腸虛而蟻蟲下乘之也穀道肛門太腸之候蟻蟲

者九蟲之內一蟲也在於腸間若臟腑氣爽則不妄動胃弱腸虛

則蟻蟲乘之輕者或痒或蟲從穀道中溢出重者侵食肛門瘡爛
治此蟲或心如力刺口吐清水用生艾取汁夜宿勿食但取肥香脯一
方寸片先吃令蟲開香然後飲艾汁當下出効

大七氣湯 治諸般痞積面色痿黃肌體羸瘦四肢無力皆緣內有蟲

積或好食生米或好食壁泥或好食茶炭鹹辣等物者只此一服除

青皮 去穢 陳皮 去白 三稜 醋炒 莪朮 醋炒 香附

益智仁 藿香 官桂 桔梗 大黃

檳榔 甘草

右剉水煎露一宿空心溫服不得些少飲食不然則藥力減而蟲
積不行矣服後食頃腹必痛當下如魚凍或長虫或血驚至日午
蟲積下盡方用溫粥止之後服綠礬丸一料而愈 方見五疳

煎應丸 治諸蟲

黑牽牛 四兩 大黃 八兩 檳榔 五兩

右各爲末外用苦練根皮一片皂角肥而不蛀者十枚二味用水

一大碗熬成膏子入前三味攪和一處爲丸如梧子大先用沉香

爲衣後用雷丸木香爲衣每服三九四更特用砂糖水送下三味

各一兩如心脾痛有蟲者必面上白斑唇紅又痛後便能食時作

時止者是也上半月蟲頭向上易治下半月蟲頭向下難治先以

肉汁及糖蜜食下則引蟲頭向上然後用藥打出

治下部蟲痒大棗蒸取膏以水銀和捻長三寸以綿裹宿內下部明早

蟲皆出

一入腹中積塊面黃肌瘦腹大如鼓死在且夕用端午日收下菖蒲陰

乾切薄片放碗內用滾米湯泡熟蓋之待溫飲之打下蜈蚣數百條

內有一大條長一尺許病即愈

治蟲已食下部肚盡腸穿者取長股蝦蟇青龍者一枚雞骨一分麩為
灰合吹下部令極深大驗

去蟲積一擯榔一味為末蜜水調下令患者先一日少吃飯臨晚亦勿
食次早五更服之

治婦人陰蝕瘡陰戶中有蛔蟲其痒不可當食入臟腑即死令入發寒
熱變勞症相似用猪肝切大片以花椒葱拌猪油煎乾待冷入陰戶
中少頃取出再換一片其蟲入肝盡出再以洗楊散洗淨

五倍子 花椒 蛇床子 苦參 白礬 葱荳豉水煎洗
一方 治婦人陰痒不可忍以鹽納陰中即好

治下部生蟲食其肛爛見五臟便效
艾葉入雄黃末入管中薰下部令烟入即已

治蛔蟲方

用苦練根生子者東向不出土者刮去外粗皮取內白皮二兩以水三碗煮取
一碗半去粗用晚粳米三合煮糜粥空心先以炒肉一二片吃引蟲
向上然後進藥粥一二口少頃又吃一二口漸加至一碗或二碗其
蟲盡下而愈

張秀才年近六旬素稟虛怯憂患過度面黃肌瘦飲食少思精神昏倦
忽患遍身上下狀如蟲行因循日久似覺蛇在皮裏行走迨半年漸
漸長大每五更覺在丹田食精微微響動或遊走上下不定使人昏
沉心不自在十分難過一日三兩次攻作若覺昏沉自已將心執正
抖擻精神其物不見忽一日其蛇自腹中下至左膝腿後被患者將
兩手緊拿左腿不放一時許坐在書屋不見入至手力氣盡不得已
而放之其蛇永不脚異乎怪哉症出多端難以名狀諸醫調治皆
用殺蟲化痰攻擊之過以致虛羸之甚召余診左手瀉數右脈洪滑

氣口脈盛予曰此元氣虧損脾胃虛弱不能運化精微使抑鬱
醜哉痰火結聚化為斯疾予以補中益氣湯加半夏茯苓貝母枳實
香附晚服以補元氣理脾胃兼化痰清鬱以六味地黃丸加遠志石
菖蒲人參當歸早服以養心滋腎一藥兼進服至一月其物及作漸
減服至兩月間或攻作三日全愈身體康強如舊其物永不見踪

