

徽毒要方

全

十武
316





門 中武
歸 316
卷



徽毒要方序
聖人之教其設雖廣要在利吾不
在自利也傳云大舜善與人同可
以見一端焉天下百事專務利已
不肯利世焉則其功雖大其德雖
博不異於糞土矣專以利人不肯
自利焉則其技雖薄其術雖劣全



藏書畫之記

青山志精堂

玉不如矣蓋也俗之誤德也痴迷
專利不復顧忌矣故其於心術也
一善一伎施及於世可得奇貨者
必秘於己不傳於人也乘虛而利
貧憐無狀不可勝論者鑿或甚焉
是乃時運之使於乎道義之不明
也石橋忠庵信古篤學性固好鑿

善視病之端亦屢奏其功焉傍於
激毒最得其術焉嘗著激毒療法
四卷志具治瘡今復撰其藥製舉
經驗方二三題曰激毒要方因先
上木以公於世其階是而進則足
以救下流深激毒百骸潰爛死
不得幸吟酸苦者是唯主利者不

欲自利也

文化七年庚午春

江戸 平田宗愷撰



東城首明書



徽毒要方題辭

夫生々乳ハ。徽家ノ的劑ナルヲ。人皆知
 ル所ナリ。其製法。諸書ニ見ユトイエ凡。
 詳悉ナラス。故ニ穎敏ノ士トイエ凡。其
 ロ訣面授ヲ得ザレバ。自製スルヲ能ハ
 ズ。適其製法ヲ知ル者ハ。金王ニ比ノ奥
 秘ス。故ニ此製法ヲ知ル者。至テ希シ。因
 テ其功ヲ知ル者。亦自ラ鮮シ。又藥舖ニ
 鬻グモノ。其性辨ズベカラズ。且價黄金

ヨリ貴シ。價黄金ヨリ貴キユエシハ。其
 製法ヲ知ル者希ニシカモ其病ニ益
 アルヲ。他藥ノ能ク及ブ所ニ非レバニ。
 若然ラズンバ。人誰カ黄金ヨリ貴トセ
 ンヤ。然レバ價貴ヲ以ノ故ニ。富ル者ハ
 能ク用ヒ。貧キ者ハ用ユルヲ能ハズ。故
 ニ此藥未ダ廣ク世ニ行ハレズ。今自ラ
 是ヲ製スルニ。殊ニ高價ノ品ニ非ズ。夫
 奇藥靈丹トイエシ。高價ニノ常ニ用ヒ

難キモノハ。世人ニ益無シ。世人ニ益無
 キモノハ。名有テ實無ク。真ノ寶ニ非ズ。
 夫寶ハ廣ク人ニ益有ルヲ以テ寶トス。
 譬バ水火ノ如シ。天下水火ヨリ多キモ
 ノ無シ。又水火ヨリ人ニ益有ルモノ無
 シ。若水火ノ價黄金ヨリ貴クハ。益アリ
 氏。人々一時モ快ク用ユルヲ能ハシ。故
 ニ常ニ少シテ。普ク通シ用ヒ難キモノ
 ハ。美トイエシ。寶トスルニ足ラズ。然

レ天ノ物ヲ生ズル。又各自ラ多或少有
 リテ。其少シテ。人ニ益アルモノハ。其價
 亦自ラ貴シ。此人カノ能ク及ブ所ノモ
 ノニ非ズ。麝香犀角等ノ如キ是也。是藥
 ノ如キハ此ニ異ナリ。天生ニ非ズ。人
 爲之。故ニ人製スレバ。常ニ夥ク有テ。水
 火ニ等シ。人製セザレバ。常ニ少シテ。黃
 金ヨリ貴シ。且夫天下ノ人。富者ハ寡ク。
 貧者衆シ。其徽氣ノ如キハ。貧者ノ病ム

一 殊ニ多シ。其毒ノ劇者ニ至テハ。此藥
 ヲ得レバ則チ生ク。得ザレバ死ス。假令
 坐ノ其死ヲ俟モ。價貴ノ財ノ給セザル
 ヲ如何セン。此時ニ當テ醫タル者。自製
 メ其費ヲ省ニ非レバ。何ヲ以テカ。廣ク
 病者ヲ救フヲ得ンヤ。予幸ニ此製法
 ヲ師家ニ受テ。其効ヲ試ル。數年。實ニ
 奇驗ノ妙劑也。但常ニ此藥ノ未ダ博ク
 世ニ行ハレザルヲ憾ム。故ニ今固陋ヲ

顧ニズ。俚言鄙語ヲ用ヒ。只其論シ易キ
 ヲ要トシ。其製法ヲ委曲詳悉ニシ。輕粉
 製法。及方法數條ヲ併セ編シテ。徽毒要
 方ト号シ。以テ梓ニ上ゲ。普ク同志ノ者
 ニ傳フ。冀ハ人々。此書ニ藉テ自製セバ。
 樽水火ノ如ク。常ニ用ヒテ盡ズ。病家財
 ヲ費スノ憂無ク。醫モ亦自ラ利ニ汚ル
 ノ名無ク。瘡疾癘病ノ者。其福ヲ受ル
 下。多カラント云爾。

徽毒要方

凡例

一 此書編用國字者。為使見者易論也。只
 充晤言示子身耳。見者無相棄。則施於
 徽家。不無小補也。
 一 生々乳之製。雖載諸書。人蹇其難論。故
 今不厭繁迂。不撰俚言。一用國字。詳其
 製法。專欲使易論。冀遠境僻里。普其流
 傳。是此書編集第一義也。

一 丸散薰蒸膏方。雖悉載徽毒療法。未上
稗。故暫錄經驗者。二三別為一小冊。以
便搜索耳。

一 此書唯急生々乳製法。故方法及療法
多畧之。湯劑亦缺之。不錄者。其證多端。
而非短紙之所能盡也。見者幸勿咎。
一 製藥分量。以下當今所通用者識之。

徽毒要方

目錄

生々乳劑	十五方
輕粉劑	十二方
生々乳燒法	三則
輕粉燒法	一則
嗅劑	四方
下劑	十五方
蒸劑	四方

惡瘡諸藥無效者皆主治之。

鬱金八 大黃六 丁香一

生々乳一錢五分

右各細末糊丸。麻子大十五丸。空心白湯服之。日二次。癰病輕重增減丸數。凡生々乳。瞑眩雖緩於輕粉。然久服之。則不必無。瞑眩口中發惡臭。則將腐爛之候也。若不壞。瞑眩者。當其時。早用下劑。下之。一二日。則不至口中腐爛。而瞑眩。

此。然後病仍不盡。則服之。如初。後方皆微之。凡服生々乳輕粉之丸者。就嚼之。小兒六七歲以下用之者。金銀箔厚。以温湯服之。要令急過咽也。

一方 主治同上。

角石 大黃各八 生々乳一錢五分

辰砂二 丁香一

右丸法服法同上。

一方 主治同上。

赤石脂 人參各五 生々乳一
辰砂二 五分

右九法服法同上。

一方 主治同上。

大黃 硝石各十 生々乳二

右九法服法同上。

一方 主治同上。

礬石 大黃各八 生々乳一
五分

右九法服法同上。

陳氏化毒丸 主治先發便毒嗣作筋疼

瘡發耳項脇肋甚則筋痿不能起

或四肢發塊痛楚或蛙爛腿膝痛

痺交作等證

升麻三 牛黃四 雄黃 生々乳

朱砂 乳香各一 白殭蠶

月々紅即血餘 川山甲 白蘚皮各一

木香 大黃 牡丹皮各二

右各細末糊丸。麻子大硃砂為衣。空

白湯服十五丸日二次。

一方 主治內作筋疼攻走脇肋上至於

頭下至足轉側艱難手不能舉足

不能步或頸項發塊或破爛等之

證。

牛黃 丁香 牙皂各五分 生々乳

琥珀 鬱金各一 硃砂 雄黃

月々紅 白蘚皮 乳香 川山甲

各一分 大黃二 僵蠶四

右丸法服法同上。

一方 主治瘡發肩臂兩手甚則毒攻

子或發喉癰漸蝕鼻梁多作痰唾

或十指流痛久則毒攻舌本等之

證。

牛黃 珍珠各五分 犀角 血竭

紫艸 硃砂 雄黃 月々紅

乳香 白蘚皮各一分 川山甲

僵蠶 蟬退各一分 生々乳一

芍藥二

右九法服法同上。

一方 主治毒注瞳仁似内障或見或不

見或毒聚舌本作腫或十指慘疼

無時或瘡生遍體不易結痂而腐

爛不已等證。

牛黃 珍珠 蜈蚣各四 生々乳

犀角 牙皂 血竭 麝金各一

月々紅 白蘚皮 硃砂各一分

川山甲 雄黃 乳香各一 大黃

貝母各二 琥珀分五

右九法服法同上。

一方 主治瘡發髮際口吻或毒堆肛門

甚則伏臑內骨痛體疼髓裂發塊

百會委中湧泉等穴證。

牛黃分四 升麻 生々乳各一 木香

硃砂 雄黃 川山甲 白蘚皮

乳香各一分 大黃 威靈仙 血竭

德壽堂 金 五 補腦

貝母 沒藥 各一分

右九法服法同上。

一方 主治外為小塊。肌肉蛀爛蔓延。或

發大塊。腿膝破潰等證。

牛黃 牙皂 各五分 川山甲 朱砂

雄黃 白蘚皮 月々紅 各一分

乳香 沒藥 血竭 各一分 大黃

僵蠶 各二分 生々乳 一分

右九法服法同上。

一方 主治瘡發腋胸臆面頰甚則毒聚

咽噎或作筋疼久則毒結膺臆臂

膊等證。

牛黃 四分 蟬退 川山甲 貝母 各二分

鬱金 鍾乳石 生々乳 各一分

木香 乳香 月々紅 白蘚皮

雄黃 各一分 硃砂 一分

右九法服法同上。

一方 主治作喉癰多痰唾漸蝕鼻梁低

六 番園

陷或肌膚生癬等證。

牛黃五分 白花蛇 蜂房 槐花

白蘚皮 羚羊角 貝母各二分 乳香

月々紅 川山甲 硃砂 雄黃各五分

鐘乳石 生々乳各一分 神水七分

右丸法服法同上。

一方 主治始生下疳續而骨痛瘡發耳

內陰囊頭項背脊甚則毒傷陰陽

二竅或發大瘡上下左右相對

痛連心或眉髮脫落眼昏多淚或

作偏正頭痛甚則目昏耳閉久則

毒發囊穿等證。

牛黃五分 虎脛骨 龜版 硃砂

川山甲各一分 乳香 沒藥 雄黃

白蘚皮各一分 蟬退 貝母各二分

沉香 琥珀各七分 生々乳一分

右丸法服法同上。

一方 主治內骨痛流注上下抽掣時痛

發塊百會委中湧泉等穴。或陽物腐爛不已。或陰囊腫脹作潰等之證。

牛黃分五 鹿角 何首烏各三 沉香

生々乳 神水各一 硃砂 雄黃

月々紅 白蘚皮 乳香 川山甲

各一 人中白各二

右九法服法同上。以上十方者。陳氏十字九也。若其詳者。乃就本書可見之。

○輕粉劑

七寶丸 主治衛毒痼疾。骨節疼痛。四肢

攣急。或徧身發惡瘡。潰爛不已。或

毒攻九竅。或頭頂穿陷。眉髮脫落

等證。

午藤 輕粉各二 土茯苓一

大黃八 丁香分五

右五味細末糊丸。日服四五分。至一錢以上。權病之輕重。加減丸量。本曰朝服。

四分。晚服四分。服之六日。至第七日。服後七寶丸。下之三日。予多用輕粉之劑。驗之。或有服之三四日。而瞑眩甚者。或有五七日十日以上。而不瞑眩者。不瞑眩者。其效薄。故以為不可拘日數。當以瞑眩為度。而後用下劑也。用下劑亦不拘日數。當以瞑眩息為度也。瞑眩息而後病仍不盡者。更服之。如初後方皆微之。

一方 主治同上。

礬石 四錢 大黃 輕粉 各二錢

丁香 香 五錢 同。

右丸法服法同上。

一方 主治同上。

大黃 四錢 牙皂 輕粉 各二錢

丁香 香 五錢

右丸法服法同上。

一方 主治同上。

鬱金

錢四

角石

大黃

輕粉

錢二

右丸法服法同上。

一方 主治同上。

古茶

舩底苔

燒各
錢四

丁香

分五

輕粉

右丸法服法同上。

一方 主治同上。

鍾乳石

珍珠

龜版

輕粉

虎脛骨

各等

右丸法服法同上。

一方 主治同上。

輕粉

右一味糊丸。胡麻子大。日服二三分毒

結咽喉壅閉。或口舌腫痛。不堪藥多服

者。可與此丸也。

神效丸 主治同上。

舩底苔

燒六

川芎

大黃

牽牛各四 巴豆二十 輕粉二

右六味細末糊丸。空心服三四分。日一服。以得快下利為度。加減九量。

梅肉丸 主治同上。

梅肉燒 梔子燒各一 巴豆

輕粉 黃連各一

右丸法服法同上。以上二方者。以有巴豆多瀉下。故有不堪日服者。且臨時而斟酌也。或代用下劑亦可也。

五寶丹 主治同上。

鍾乳石三 龍腦五 珍珠三

琥珀 辰砂各二 白麪一

右細末糊丸。以土茯苓湯服之。此方雖非輕粉之劑。然以徽毒家之通藥。故收錄于茲。

再造散

鬱金五 牽牛 反鼻各六

皂角刺二 大黃八

右五味細末。日服一二匙。

白州散

反鼻

角石

津蟹

燒各等分

右三味細末。服同上。以上二方。雖非輕粉劑。亦以療諸瘡。右益徽家故編之。

生々乳製法口訣

硝石十六

礬石十二

綠礬十八

雲母二

青塩三

食塩五

水銀九

礪石三

今擬用礪石俗所謂石見銀山崩投灰毒者即是也

右八味先七味ヲ共ニ細末ノ後水銀ヲ

内レ研合セ。瓦瓶ノ中ニ内レテ燒ク。但

シ水銀ハ諸藥ト交和シ難キモノナリ。


依テ水銀一味ヲ。小器ニ入レテ。水一二

滴入レ。椀招ノ毛少シ束テ。茶筥ノ如ク

シ。茶ヲ調スル如クスレバ。數萬環星ト
 ナリテ。泡ノ如クナルナリ。其時ニ諸藥
 中エ入レ研ルトキハ。和合シ易シ。○或
 曰。諸藥調合ノ。蓄置一三四旬ニモ。取出
 シ焼ベシト。是モ可シ。又諸藥調合ノ。即
 時ニ焼モ可シ。○春夏温炎ノ時ハ。諸藥
 藥研中ニテ研レバ。自ラ濕氣出テ。粉餅
 ノ如クナルニ。其時瓶中ニ入レ。少シ火
 ニ上レバ。融和ノ流レ漫ルニ。假令濕氣

出テズ。細末ノ俵。瓶中ニ内テモ。火ニ上
 レバ。忽チ融和スルニ。秋冬凝燥ノ時分
 ニハ。食塩ヲ倍サレバ。融和シカヌル
 一アリ。若シ塩ヲ倍シテモ。融和シカヌ
 ル時ハ。少シ水ヲ加エ。泥ノ如クニ煉テ。
 瓶中ニ内レベシ。然レモ右様ノ一ハ希
 ナリ。多クハ水ヲ加エテ。煉ニハ及バズ。
 藥末ノ俵。瓶中ニ入レ。ヒニテ能押付ケ。
 蓋ヲシテ。火ニ上レバ。融和スルニ。

瓦瓶之圖



蓋アル器ハ其蓋ヲ用ユベシ。
 或ハ蓋アリテモ反覆スル
 ニ不便ナルカ。又ハ蓋ナキ器
 ナラバ別ニ板ニテ蓋ヲコシ
 ラユベキナリ。

瓦瓶大小。定準ナシト
 イエ。右薬ノ分量ニ
 テハ。大抵二三升ヲ受
 ルホドノモノ可シ。形
 子圖ノ如ク。口濶ク底
 平ナルモノ善シ。今東
 都ニテハ。淺州焼ノ炭
 燧瓦瓶ヲ用テ可ナリ。
 其他磁器銅鍍器類。皆

用ユベシ。又形容及大小。強チ泥ム
 ベカラズ。圖スル所ノモノニ準ジテ。其
 國其處ノ便ニ從ヒ用ユベシ。然レバ底
 平ナラザレバ。火ヲ上置ニ便惡シ。又底
 尖窄ナルモノハ。藥未融和スレバ。一處
 ニ聚リ在ルユエニ。反覆ノ後。流レ落ル
 害アルベシ。
 底ヲ除テ。外惣躰ヲ。紙ニテ五七遍モ重
 テ。糊ヲ強クシテ張ルベシ。然ラザレバ。


火氣内ニ薫蒸スルユエニ。瓦瓶破裂ス
 ルヲアリ。磁器ハ最モ破レ易シ。鍊線或
 ハ麻繩ヲ用テ緊扎メ。破裂セザル用意
 スベシ。故ニ磁藥アル器ヲ好マズ。常ニ
 瓦器ヲ用ユベキニ。若シ火ヲ上置テ後
 瓦瓶ヒレ割レテ。煙泄ルヲ有ラバ。灰
 ト塩ト合セテ。水ニテ軟ニ煉リ。垢レ目
 上流シカクベシ。煙止ルナリ。
 右藥末。瓦瓶ニ入レ。アマリ散ケヌヤウ

ニ。子ヨボリト置キ。ヒニテ能ク押付テ。
 其俛少シ火ニ上レバ。溶化ノ泡立チ。泥
 ノ如クナリテ。底一面ニ流レ付クニ。其
 時ニ蓋ヲシテ。氣ノ泄レザルヤウニ。紙
 ニテ能ク目張シテ。少シ冷シテ反覆
 シ。火ヲ底ノ上ニ置テ焼クニ。但シ少シ
 冷サレバ。反覆スルトキニ。藥流レ隕
 ルヲアリ。且最初ヨリ。蓋ヲ封シテ火ニ
 上セ。藥末溶化スル頃ヲ俟ヒ。少シ冷シ

反覆シテ。可ナリトイエ。若シ藥末尽ク能ク。溶化セザルトキハ。反覆スルトキニ。藥末必ズ落子散ルヲアリ。故ニ燒法未熟ノ間ハ。先ツ能ク溶化スルヤ否ヲ見テ。能ク溶化シテ後。蓋ヲ封シ。反覆シテ。燒クベシ。

○左ニ圖スル如ク。瓶ヲ反覆シテ。平ナル板ノ上ニ置キ。底一面ニ。炭火ヲ山ノ如ク。積置テ燒ク。火ノ緩急ニヨリテ。

瓦瓶反覆之圖



少シノ差ハ。アレ。凡線香三本ホド。灰ヲ度トシテ。火ヲ去リ。灰ヲ掃除シテ。封ヲ開キ。霜ヲ取り收ムベシ。是ヲ下ゲ。燒ト云ニ。又織キ針ノ如キ。苴類。交リ有ユエニ。針燒。云。是極上ノ品。

右法ノ如ク焼クトキハ。瓶内ノ薬末底
 ヲ隔テ、自ラ焼ケ。瓶内ニテ煙薫蒸シ
 テ。霜ノ如クニナリテ。蓋ノ上ニ降積ル。
 是即チ生々乳ナリ。大凡右ノ薬ノ分量
 ニテ。生々乳八九錢得相當トス。焼ク
 ノ過不及ニ隨テ。霜量ノ多少アリ。焼終
 リテ。封ヲ開キ見ルニ。霜上黄色ヲ帶タ
 ルモノハ。焼クノ過タルナリ。又焼渣
 ヲ火ニ投入テ見ルニ。仍少シク煙アル

モノハ。焼クノ不及ナルナリ。再ビ蓋
 ヲ封シテ。焼クベシ。

又法

○前條ノ如ク。諸薬ヲ調合シテ。瓶中ニ
 内レ火ニ上ケ。融和シテ蓋ヲ封シ。瓶ノ
 深サニ地ヲ掘テ。瓶ヲ反覆シテ埋メ。瓶
 底ヲ覆シ。回リヲ築封シ。火ヲ瓶底ニ置
 テ焼クナリ。此法ノ如クスルトキハ。假
 令瓶底フクラミテ。平ナラザレド。火ヲ

上置ニ便ナリ。又瓦瓶ツボヒ割ルツボアリ
テモ。煙外ツボ工泄ツボルツボ無シ。

又瓶底ツボフクラミ。平ナラズシテ。火ツボ上
置キ難ク。或ハ市ツボ中杯ツボニテ。瓶ツボヲ埋ツボノ焼
ニモ。場地無キトキハ。石灰ツボ或ハ土ツボヲ煉
テ。底ノ周リツボ工。堤ノ如クニツボ支ツボ工。其中ツボ工
火ツボヲ上置ツボテ。焼クベキナリ。

又法

○前法ノ如ク。藥末ツボヲ調合ツボシテ。瓶ツボ中ニ

入レ。又別ニ瓶ツボ一ツ。播盆ノ如キモノ可ナリ其上ニ重子

蓋トシ。石灰ツボヲ煉リテ。合セ目ツボヲ能クク

封シ。氣ノ泄ツボザルヤウニシテ。爐ツボ上ニ安

シ。下ヨリ焼クベシ。但シ上ノ瓶ツボ中ニ。水

ヲ注ギ置キ。水熱ツボスレバ。更ニ冷ツボ水ツボヲ替

エベシ。煙薰蒸ツボノ霜トナリ。上ノ瓶ツボ底ニ

弁ツボリ附クモノ。是即ツボ于生々乳ナリ。燒法

皆前ニ同シ。三炷ツボ香ツボヲ度トメ。封ツボヲ開キ。

霜ツボヲ削リ取收ツボムベシ。

○生々乳ヲ製スルノ時。汚穢不淨ヲ近
 ツクベカラズ。又心ヲ用テ密封シ。氣ノ
 泄レザルヤウニスベシ。氣泄ルトキハ。
 霜量減ズルノミナラズ。若シ人此氣ニ
 觸冒スレバ。種々ノ瞑眩アルナリ。慎
 ムベキナリ。

○當今生々乳ヲ談ズルモノ。多クハ微
 毒ニ効アルヲ言テ。其他ヲ遺ス。是皆
 未ダ自ラ其効ヲ驗セズ。只犬ノ吠聲者

ナリ。夫微氣ト他證トヲ論ゼズ。生々乳
 ノ最モ功アルモノハ。身體疼痛。惡腫惡
 瘡等ナリ。微氣ノ毒タル。體痛ニザレバ。
 必惡瘡ヲ發ス。其證萬端ナリトイハレ
 大抵ニ若ク離レズ。故ニ生々乳ヲ得
 レバ。即チ治スルニ。生々乳本微氣ノ爲
 ニ。設ルノミニ非ズ。微氣自ラ。生々乳主
 治ノ證ヲ發スルナリ。故曰。生々乳微氣
 ノミノ藥ニ非ズ。老幼ヲ論ゼズ。他證ニ

施シテ。亦其効神ノ如シ。凡小兒胎瘡及
 頭面頸項咽喉等ニ。發腫結核シ。或痛或
 不痛。或色或不色。或消或發者。其中ニ多
 ク。危難ノ證有リ。假令危カラザルモ。若
 久シテ。膿ヲ成ストキハ。瘡如急ニ收メ
 ラズ。愈テ後。瘡痕兀引ツリ。奇石怪岩ノ
 如クニメ。甚醜シ。長育シテ後ハ。黧瘡痕
 ニ疑アリ。女子ノ如キハ。人最モ忌嫌メ。
 嫁娶ニ妨アルコトアリ。始メ生々乳ヲ用

エレバ。膿ヲ成サズシテ愈ユ。不幸ニメ。
 外敷ノ藥杯ヲ用ヒ。其醜ヲ助ケ長ス者
 アリ。又老人。四肢脇肋腰背等。起痛癢急
 メ。年ヲ重子テ愈エズ。或痰或瘀血。或水
 氣トメ療スレド。諸治効無キ者アリ。俗
 呼テ長壽痛ト稱ス。生々乳ヲ得テ即チ
 愈ユ。此ニノ者ハ。遺毒餘毒ニ屬ストイ
 エド。當今黧家ノ部ニ闕ラズ。然レド皆
 此藥ニ宜シ。餘ハ推テ知ルベシ。其他耳

目鼻口痔漏淋瀝。猫鼠犬蟲蛇咬傷ノ
 毒ニ至ルマデ。主治セザルナク無シ。膏内
 服スルノミナラズ。外傳ノ出痔ヲ療シ。
 惡肉ヲ截リ。癭ヲ枯シ。瘰癧ヲ消スル等。其
 功枚擧スルニ遑アラズ。古人既ニ論ズ
 ルヲ詳ナリ。予亦嘗テ驗スルモノヲ緝
 メテ。徽毒療法及生々乳竒効考ヲ撰ス。
 故ニ今茲ニ贅セズ。能ク試ユル者。聞塚
 ヲ爲シテ。治ヲ遺スナカシ。

輕粉製法口訣

水銀

食塩各十

礬石二十

右三味。生々乳ノ法ノ如ク。爐上ニ安置
 シ。下ヨリ燒ク。又瓶ヲ反覆メ。全ク生
 々乳ヲ燒ク法ノ如クスルモ亦可シ。但
 輕粉勢州ニ製シ。今藥舖ニ賣モノ効ア
 リ。且高價ナラズ。用ユベシ。但雲母ヲ交
 工偽ルナリ。故ニ此ヲナクハ自製メ
 用ユベキナリ。

予常ニ多ク微毒ヲ療スルニ。輕粉ヲ
 用テ。其功甚速ナリ。一モ其害アル者ヲ
 見ズ。然ルニ世俗多ク此劑ヲ怖ル、モ
 ノハ何ゾヤ。思フニ其是ヲ用ユル。法
 ヲ得ズノ。病毒尽ザレバナリ。頃年普ク。
 微毒ヲ療スル者ヲ聞ニ。時師多クハ。利
 ニ遊レ財ヲ貪ル。故ニ其療法或ハ七日
 或ハ十日ヲ。一回ト稱シ。財ヲ先ニシ治ヲ
 後ニス。病者モ亦其意ニ讓ラク。假令其

藥效無クモ。日數限アリ。一回ヲ試テ止
 ニノミト。彼此相背馳メ。心ニ懇切ヲ失
 フ。何ノ病カ能ク愈ル。ヲ得ンヤ。於是
 其藥ヲ峻シテ。只一時ノ效ヲ急ニス。幸
 ニメニ三四回ヲ服メ。病一旦愈ル者モア
 リ。又愈ザル者ハ。財ニ困ニ嫌疑ヲ生ジ。
 半途ニメ藥ヲ止ム。此時ニ於テ。醫亦藥
 ヲ勸メテ久服セシメ。全ク病毒ヲ抜ク
 不能ハズ。何トナレバ。始ヨリ財ヲ先ニ

スレバミ。故ニ財ニ疾迷スルハ。醫ノ蔽
 ニメ。全ク病ヲ治スルノ能ハズ。凡ハ毒ノ輕
 ノ毒タル。一たび病ヲ受ル者ハ。毒ノ輕
 キ者トイエ。或ハ五七十日。或ハ百日
 ヲ經ザレバ。全ク愈ユベカラズ。其重キ
 者ニ至テハ。何ゾ醫數百日ノミナラン
 ヤ。數年ヲ重子テ。服藥セザレバ。全ク愈
 ザル者アリ。夫輕粉毒家ノ聖藥ナリト
 イエ。何ゾ七日十日ヲ限リテ。効ヲ奏

センヤ。故ニ醫ノ病ヲ療スルノ要日數
 ニ在ラス。全ク愈スニ在ルノミ。況輕粉
 ヲ用ユル。大ニ口訣アリ。其劑ヲ緩ニ
 メ。長服ニ宜キ者アリ。亦其劑ヲ急ニメ。
 短服ニ宜キ者アリ。何ゾ日數ニ拘セン
 ヤ。微毒療法ニ議ニ記ス。亦嗣テ刻スベ
 シ。就テ見ルベシ。若シ初發表證ノ者杯
 ニ。此劑ヲ誤リ用ユルトキハ。病愈サル
 ノミナラズ。却テ毒ヲ引テ。内ニ入ラシ

御製本草綱目卷之... 百州霜

ムルヲアリ。時師深ク察セズ。妄ニ用ヒ
テ。其功ヲ急ニス。故ニ唯其眩甚シキ
ノ之ニテ。病必愈エズ。或ハ一旦愈ルニ
似タルモ。久カラズシテ後必復發ス。此
餘邪未ダ盡ザルヲ知ラス。遂ニ粉毒
ノ名ヲ生ジ。嚙々トメ輕粉ヲ非テ止マ
ザラシム。此病ニ臨ミ此藥ヲ施ス者。深
ク意ヲ潛ムベキナリ。

○嗅劑

一方 主治 骨節疼痛。或一身發瘡。肌肉
腐爛。或目盲耳聾。或口舌腫痛。鼻
梁缺陷。或頭頂穿潰。頸結塊。或
偏正頭痛如割等。用生々乳輕粉
等諸藥。而無驗者。凡毒結上部者
最有効。

硃砂 百州霜
右二味合勻。每一錢作紙條。點火嗅其

本草綱目卷之... 百州霜

煙日一條三嗅之。其日數同。輕粉劑以
頭眩為度。用下劑亦準之。若不堪頭眩
者。宜晝嗅之。而夜下之。或今日嗅之。明
日下之。亦可也。如此。或其夜或間日下
之。則不至口中齿爛也。

作紙條法。交加熟艾葉少許。如作灸
法。紙止排置。拾為紙條。如筆管長六七
寸許。則火不熄而便於嗅也。若病重者
日嗅二條。○又嗅法。盛麻油。紙條為

燈心點火。而置器中。以厚紙或板為蓋。
令煙不泄。蓋上穿小孔。以竹管貫其孔。
而嗅其煙。如此法。則不加艾葉也。

一方 主治同上。

硃砂

沉香 各二

金箔 片四

百艸霜 四

右嗅法同上。

一方 主治同上。

沈香

桂枝 各五

丁香 各二

硃砂一錢五分 百州霜三錢

右嗅法同上。

一方 主治同上。

水銀一錢半 辰砂 黃丹

錫 鈆各一錢

右五味。先燒末三味。冷後加辰砂黃丹。

合勻。○燒法。三味入土器。置火上溶化。

投入艾葉少許。以匕攪之。如此而不休。

則為細末也。作紙條及嗅法皆同上。

○下劑

後七寶丸

巴豆一錢 大黃二錢 丁香五錢

右細末糊丸。服三四分。日一服。得快下。

利為度。加減丸量。

紫圓

赤石脂 代赭石 巴豆各二錢

杏仁四錢

右細末糊丸。服法同上。

備急丸

巴豆 大黄 乾姜 各等

右糊丸。服法同上。

巴豆丸

巴豆一 杏仁二 大黄四

右糊丸。服法同上。以上九方。投生々乳

輕粉之後。宜撰用之。雖以下九散亦當

隨證而用之。或不堪巴豆者。宜撰用之。

故雖似贅旒。今列下而便搜索耳。

芎黃散 兼上氣頭痛者與之。

川芎六 大黄十 蕎麥三

右三味細末。散服。

桂黃散 兼上衝者主之。

桂枝四 大黄八

右二味同上。

承氣丸 兼宿食腹堅滿者可服之。

大黄八 硝石十

右二味細末糊丸。

三黃丸 兼心中煩悸者。可用之。

大黃八 黃連各四 黃芩各四

右三味同上。

消石圓 兼心下痞鞅者。可施之。

人參 甘州 當歸各四 消石十六

大黃二十

右五味細末。醋糊丸。

浮石丸 兼血證者。可飲之。

浮石 桃仁 大黃 硝石各等

右四味。細末糊丸。

滾痰丸 兼諸痰飲者。用之。

大黃八 黃芩四 硝石五

礞石五 俱以硝石五 炒為金色

右四味。細末糊丸。

控涎丹 兼痰飲水氣者。可服之。

大戟 甘遂 白芥子

右三味。細末糊丸。或蜜丸。

平水丸 兼脚氣水病者。宜用之。

吳茱

硝石

芫花

各三

商陸

四

甘遂

一

右五味細末糊丸。

牽牛丸

治同上。

牽牛

黑白相半半生半炒或加枳椇減半。

右一味糊丸散服亦可。

桃花散 兼水氣小便利者與之。

白桃花

用今年之者或加大黃減半。

右一味末服或煎服亦可。

○蒸劑

一方 主治 身體腫痛 肌膚潰爛者。

礬石

五

右以苦酒五合煎沸先蒸後洗拭乾或

膏藥或摻藥。下隨其證傳之。

一方 主治同上。

烏頭

桂枝

當歸

川芎

地黃

蔥

各等分

右水煎蒸法同上。

鶴壽要方 卷之...

一方 主治下疳瘡及爛瘡癢痛者

苦薏 倭荒花 黑胡麻

蓮葉各等 或加浮萍等分

右水煎同上。

一方 王治同上。

蛇床子 苦薏 葱冬

荊苳各等

右水煎同上。

○ 摻劑

一方 主治下疳瘡及肌肉爛黃者

雄黃 密陀僧各一分 辰砂五分

右三味細末。先以蒸藥洗淨而後摻之。

一方 主治同上。

天石一分 辰砂五分

右二味細末。同上。

一方 主治同上。

枯礬 雄黃 黃栢各等

文...

右三味細末同上。

一方 主治同上。

鈆 燒

寒水石

輕粉

硼砂

辰砂 硃砂

右五味細末同上。

燒鈆法。入土器置火上溶化以之攪之

良久則為細末也。時々入艾葉少許攪

之。易細末也。

○膏方

一方 主治諸瘡

當歸 川芎 芍藥 白芷

桂枝 地黄 玄參 大黃

黃連 黃芩 黃柏各五分

右十一味以麻油四十升浸之十日餘

燂火煎用布濾去滓入黃丹十六升再

煎以篋攪之勿停手變黑色則成也。從

軟堅增成黃丹

一方 排膿去腐肉生新肉

白蠟各十 松脂 牛脂各八

綠青 膽礬各六 乳香

沒藥各四

右七味用麻油四十先煮蠟松脂牛

脂溶化冷而後入諸藥末煉合從

加減蠟以下用蠟者皆同

一方 生肌肉療諸瘡

白蠟十二 唐土十 家猪脂

牛脂各六 冰片一 麻油四十

右煉法同上

一方 止痛生肌肉

黃蠟十二 耶子油 牛脂

猪脂各六 黃栢 麝香 血竭各四

麻油四十

右煉法同上

一方 能消腫生肌肉止痛

黃蠟十六 耶子油 牛脂各八

辰砂 朱砂各四 黃丹八

麻油四十

右煉法同上。

一方 排膿生肉治爛瘡癩癩。

白蠟十六 豬脂 牛脂各六 枯礬

膽礬各四 水片一 麻油四十

右煉法同上。

一方 吸膿消腫止痛生肉療諸瘡。

黃蠟十二 知也一 卒十二 蒜三

麻油四十

右先以麻油煮蒜。蒜淨為度去蒜。入知也。卒。再煮。用布瀝去滓。入蠟。煎合。

右徽毒之為病。雖洗劑以下外敷之藥。非所能及者。然暫施之。以救一時之痛。苦且可為內治之輔也。

徽毒要方全終



每部有圖章見者須認此為真

徽毒要方附言

予嘗寓于城北淺艸。其地接近娼里。患徽氣者尤衆矣。投予門而請治者亦不少矣。與以輕粉生々乳之劑。猶響之應聲。無一不愈者也。但方劑之峻烈。人憚其眩眩。夫徽氣之為病也。其根深其毒猛。斯毒而憚斯藥。病何得能治乎。其眩眩甚者。乃毒之除亦殊速矣。是以至雖始憚其眩眩者。乎。見其効之速而卒服之。不疑也。且生々

乳之於輕粉也。瞑眩稍緩。而功在於其上。然亦各有所主。不可概言也。借設畧舉其證。則主骨節疼痛者。生々乳。主發瘡爛潰者。輕粉也。且夫雖此證之多端。字要皆不出于表裏之二者。苟審斯二者。而後採用粉乳之劑。兼以湯液。翼以薰蒸。以下之方法。則無毒而不拔也。故予撰徵毒療法。及生々乳奇効考四卷。具論表裏本末。以詳載治術。然未上梓也。惟毒之峻酷也。藥亦

不峻劇。不能勝其毒。故怖瞑眩者。難與謀治也。

古人曰。生々乳之為藥也。不獨徵瘡毒氣之聖藥也。配風藥。而治大麻風。配癆藥。而治傳屍勞。配蟲藥。而治諸蟲疾。配膈藥。而治噎塞翻胃。配瘡藥。而治頑毒頑癬。久漏骨痛。其他種々奇効。不可枚舉也。又曰。諸疾病經年不愈。諸治無効者。先與輕粉。而視其動靜也。予嘗聞此言。因屢試屢驗焉。

始識古人之不我欺也。雖然宋元以降。好補惡攻之俗已久矣。醫亦相唱和。而遂為世之通蔽。是以世俗聞攻劑則怖畏也。是故施此等之劑者。宜先審證候。而無誤投。豫諭於病者。而使無憚且疑也。若苟且投之。則相悖忤。而不能全功也。夫施藥而不能全功。則不啻無益於病者。乃至使人忌憚此劑。如虎狼蛇蝎。而無敢再服者也。若夫審終始而得其端的。則實起廢生。死之

功。可刺日而全者。其惟輕粉生々乳也歟。甚矣哉。世俗之怖粉劑也。其言曰。雖輕粉能拔病毒乎。然藥氣留滯體中。遂為終身之患也。是病不全愈之故也。何為有病去而獨藥氣留滯之理乎。愚亦甚矣。於是乎保護沈毒。不知去之。徒籲天而歎息。亦何益之有。歲月任冉。終為廢痼。坐俟天年之盡。豈不傷哉。當此時。仍泥平易之劑。而誤百年之軀。豈不惑乎。然又顧其志意。未必

無所由也。時師多不審當否。不論終始。而妄投之。以誤病者。是以藥未半。而頭眩尋至。不堪其苦楚。告情而謝治。止藥。故匪特不病除。而竟使歸罪於藥也。是使世俗忌憚此藥之所由來。是醫之罪。而非藥之罪也。且夫就利遠害者。人之情也。故曰。蠶之蠶爾。室女愛養之。蠋之蛸焉。烏獲毛起。利與不利也。夫一時之利。尚且如此。而况終身之利乎。一朝之頭眩。而去終身之患。利

莫大焉。雖愚夫愚婦。亦當知其利也。是故病全愈乎。怯者走而趨焉。病不全愈乎。悍夫不屑服此藥也。故曰。非百發百中。不足稱善射。十治一失。乃使病者懲也。豈其輕粉生々乳之謂乎。唱古醫方者。亦可不深思乎。

石橋忠庵正炳



東階書林

關口平次衛門

小斬馬四三寸目

竹川頼兵衛

日本齋四日市

英平吉

本石田十神吉

西宮頼兵衛

日本齋青四日

文小次郎平

以月吉日

齋毒藥去隔出

Handwritten notes at the bottom of the page, including the characters '平吉' and '英平吉'.

